BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
12
3 L
23

39

12
7
F
26

IO. SCORIDIS
LIBRI OCTO GRAECE ET LATINE.

Castigationes in eosdem libros.

PARISIIS,
Impensis viduæ Arnoldi Birkmanni.
1549

Cum priuilegio Regis, ad sexennium.

12.3.L-23

Ἐκ τῆ Γαληνῆ ἐν τῷ περὶ ἁπλῶν φαρμάκων δυνάμεων

Ὁ δὲ ἀναζαρβεὺς Διοσκορίδης ἐν ᾗ βιβλίοις ὧν χρήσιμον ἁπάντων ὕλην ἔγραψεν ἐ βοτανῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ζώων, καὶ καρπῶν καὶ χυμῶν, καὶ ὀπῶν· ἔτι τε τῶν μεταλλευομένων ἁπάντων, καὶ τῶν ἐν τοῖς ὠοῖς μορίων μνημονεύσας· καὶ μοι δοκεῖ πλεωνάζων τῶν πάντων ὅπως ἂν ὕλης τῶν φαρμάκων ἀκριβεστέραν ποιήσαιτο. πολλὰ μὲν γὰρ τοῖς ἐμφερέσιν ὑπ' αὐτῶν γέγραπται καλῶς, ἀλλ' οὐ πάντως εὐδηλα.

Ἐκ τῆ Θεμισωνος ἐν τῷ τέ τῶν ἰατρικῶν συναγωγῶν.

Ἡ γνῶσις τῶν ἁπλῶν φαρμάκων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων οὕτως ἠκριβωμένη κατέστηκεν, ὡς μὴ δ' οἷόν τε εἶναι χωρὶς ταύτης ἰατρεύειν ὀρθῶς. ἅμα τε εὐπορείας τ' οὖσι καὶ κατὰ πᾶσαν χώραν οὐκ ἐσαεὶ εὐχερῶς εὑρισκόμενα, καὶ εἰς τὰς ἐπικρίσεις τῶν συνθέτων δυνάμεων εὔχρηστον ἡ γνῶσις. ἔτι δ' εἰς τὰς εὑρέσεις αὐτῶν καθόλου τὸ τεχνικὸν ἐπιφαίνει πρὸς πᾶσιν ἡ τούτων εἴδησις.

Περὶ τούτου Διοσκορίδους ὡς παρὰ Γαληνῷ λαμβάνεται.

Ἐκ τῶν Σουΐδα.

Διοσκορίδης ἀναζαρβεὺς ἰατρὸς ὁ ἐπικληθεὶς φακᾶς, διὰ τὸν ἐπὶ τῆς ὄψεως φακούς. συνῆν δὲ Κλεοπάτρᾳ ἐπὶ Αντωνίου, καὶ γέγραπται αὐτῷ βιβλία κε'. τὰ πάντα ἰατρικὰ θεωρήματα.

Typographus lectoribus.

CVM DEI Opt. Max. benignitate consequutus essem, vt hæ literarum formæ, quas exculpsi, multis probarentur, hoc mihi studiũ fuit, vt optimum quenque librum in quamplurima exemplaria hac scribendi ratione transfunderem. Initium itaque huius rei à Sacrificiis mihi faciendum putaui: quas veluti primitias cùm Deo persoluissem, alios huius linguæ auctores præsertim bonos exprimere aggressus sum. Quam ad rem cùm aliorum etiam doctorum & nobis amicorũ hominum, tum Iacobi Goupyli medici opera ac iudicio vsi sumus, qui nobis vt Dioscoridis libros ita exprimeremus, vt in angustum quoddam spatium contraherentur, consilium dedit, benignissiméque pollicitus est se ea diligentia, quam maximam adhibere posset, effecturum, vt hic auctor ex multorum veterum codicum fide emendatus in manus hominum perueniret. Quod vt præstaret exemplaria ab aliis excusa cum multis veteribus libris manu scriptis contulit, locósque omnes, qui peruersè descripti, aut deficientes essent, asteriſco annotauit, vt eos postea restitueret. (ea enim libros castigãdi ratio potior ei visa est, quàm vt ea, quæ iam recepta essent, induceret) Id autem quanta fide ac diligẽtia ab eo sit præstitum videbitis in castigationibus, quas is in hunc auctorem scripsit: vos igitur his nostris laboribus interim fruimini, dum vobis expressam imaginem plantarum, de quibus in hoc auctore tractatio est apparamus. Valete.

12-8-F. 11

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΠΕΡΙ
ὕλης ἰατρικῆς λόγοι ἕξ.

Τῶν αὐτῶν περὶ ἰοβόλων, ἐν οἷς περὶ λυσσώντος κυνὸς, σημείωσίς τε τῶν ὑπ' αὐτῶν δηχθέντων, καὶ θεραπεία.

PEDACII DIOSCORIDIS
de materia medica libri sex.

Eiusdem de venenatis animalibus libri duo, in quibus tractatio est de cane rabido, & de notis, quib⁹ agnoscimus eos, qui ab animalibus venenum relinquentibus icti sunt.

Digitized by Google

ΠΙΝΑΞ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ-εχομένων ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ. ἐν ᾧ ὁ μὲν πρῶτος ἀριθμὸς τὸ βιβλίον, ὁ δὲ δεύτερος, τὸ κεφάλαιον ὑποδεικνύει.

Α

Ἀβρότονον	γ. κθ.	δος δεδηγμένων	η. ια.
ἀγάλλοχον	α. κα.	αἶρα	β. ρκβ.
ἀγαρικόν	γ. α.	ἀκακαλίς	α. ριθ.
ἀγήρατον	δ. οθ.	ἀκακία	α. ρλδ.
ἄγνος	α. ρλϛ.	ἀκαλύφη	δ. ϛδ.
ἀγριελαία	α. ρλκ.	ἄκανθα	γ. ιθ.
ἀγριομηλέα	α. ρξδ.	ἄκανθα ἀγρία	γ. κ.
ἀγριορίγανον	γ. λδ.	ἄκανθα ἀραβική	γ. ιε.
ἄγρωστις	δ. σϛ.	ἄκανθα λευκή.	γ. ιδ.
ἄγρωστις ἡ ἐν παρνασσῷ	δ. λβ.	ἀκάνθιον	γ. ιη.
ἄγχουσα	δ. κγ.	ἄκινος	γ. ν.
ἄγχουσα ἑτέρα	δ. κδ.	ἀκόνη	ε. ρξη.
ἄγχουσα τρίτη	δ. κϛ.	ἀκόνιτον	δ. οζ.
ἀδάρκης	ε. ρλζ.	ἀκόνιτον	ϛ. ζ.
ἀδίαντον	δ. ρλϛ.	ἀκόνιτον ἕτερον	δ. ρνβ.
ἀείζωον τὸ μέγα	δ. πθ.	ἄκορον	α. α.
ἀείζωον τὸ μικρὸν	δ. ρϛ.	ἀκρίδες	β. γζ.
ἀείζωον ἕτερον	δ. θβ.	ἀκτή	δ. ροβ.
ἀθήρα	β. ριδ.	ἀλεκτορίς	β. νβ.
αἴγειρος	α. ριδ.	ἀλεκτορίδος ἐγκέφαλος	β. νγ.
αἰγίλωψ	δ. ργθ.	ἅλες	ε. ρκϛ.
αἰδοῖον ἄρρενος ἐλάφου	β. δγ.	ἀλθαία	γ. ρξδ.
αἰθάλη λιβανωτοῦ	α. πε.	ἄλιμος	α. ρκα.
αἰθιοπίς	δ. ρε.	ἄλισμα	γ. ρξζ.
αἴλουροι	β. κθ.	ἄλυσσον	γ. ρζ.
αἷμα	β. ϛζ.	ἀλκέα	γ. ρξε.
αἷμα ταύρειον	ϛ. κε.	ἀλκυόνιον	ε. ρλϛ.
Περὶ Αἱμόρρου	ζ. ιγ.	ἀλόη	γ. [illegible]
Περὶ τῶν ὑφ' Αἱμόρρου καὶ διψά-		ἅλμη	ε.

ἄλος ἄνθος ε. ρκϑ.
ἀλὸς ἄχνη ε. ρκζ.
ἀλσίγη δ. πζ.
ἄλυπον δ. ροζ.
ἀμβροσία γ. ϛλ.
ἄμμι γ. ο.
ἄμμος ε. ρζ.
ἀμμωνιακὸν γ. ϛϑ.
ἀμόργη α. ϛλε.
ἀμπελόωσασον β. ρϛ.
ἄμπελος ἀγρία δ. ρπ.
ἄμπελος ἀγρία ε. β.
ἄμπελος λευκὴ δ. ϛπα.
ἄμπελος μέλαινα δ. ϛπβ.
ἄμπελος οἰνοφόρος ε. α.
ἀμυγδαλὴ α. ροζ.
ἄμυλον β. ρκγ.
Πρὶ Ἀμφισβαίνης ζ. ια.
Πρὶ τῶν ὑπ' Ἀμφισβαίνης δε-
δηγμϑώων η. ϑ.
ἄμωμον α. ιδ.
ἀναγαλλὶς β. σϑ.
ἀνάγυεις γ. ρνι.
ἀνδράχνη β. σν.
ἀνδράχνη ἀγρία β. ϛνα.
ἀνδρόσαιμον γ. ροδ.
ἀνδρόσακες γ. ϛνα.
ἀνεμώνη β. σζ.
ἄνηθον γ. ξζ.
ἀνθεμὶς γ. ϛνε.
ἄνθος χαλκοῦ ε. πη.
ἀνθυλλὶς γ. ϛνδ.
ἄνισον γ. ξε.
ἀνιπαθὲς ε. ρμ.
ἀνίφιον δ. ϛλγ.
ἀντίποδα ε. ϛιϛ.
ἀντίποδα γ. κα.
ἀνωνὶς ε. ωϛ.
ἄξος γ. ϛϛ.
ἀπαρίνη α. ρξη.
ἄπιος δ. ϛο.
ἄπιος δ. πα.
ἀπόκυπον β. ϛη.
ἀπύρετος β. ξη.
ἀρϑμὸν β. σιη.
ἀρχεμώνη β. σϛη.
ἀρίσαρον γ. ϛ.
ἀριστολοχία κληματῖτις γ. ε.
ἀριστολοχία μακρά γ. δ.
ἀριστολοχία στρογγύλη δ. ϛζ.
ἄρκειον α. ρδ.
ἀρκευθὶς ρ. ϛε.
ἄρκιον β. ρϛγ.
ἀρνόγλωσσος ε. ϛζ.
ἄρσην ε. ϛκα.
ἀρσενικὸν γ. ρκϑ.
ἀρτεμισία λεπτόφυλλος γ. ϛκη.
ἀρτεμισία πολύκλονος α. ϑ.
ἄσαρον ε. ϛκδ.
ἄσβεστος ε. σπϛ.
ἀσβόλη δ. ϛλ.
ἀσκληπιὰς γ. ϛϛ.
ἄσκυρον γ. ροχ.
ἀσπάλαθος α. ιϑ.
ἀσπάραγος β. ϛνϛ.
Πρὶ Ἀσπίδος ζ. ιη.
Πρὶ τῶν ὑπ' Ἀσπίδος δηχθέν-
των η. ιϑ.
ἄσπλιον γ. ϛνβ.
ἀστὴρ ἀπιὸς δ. σκ.
ἀστράγαλος δ. ξβ.

ἀσφάλαλος ὗς β. ξϛ.
ἄσφαλτος α. ϱ.
ἀσφόδελος β. ϱθ.
ἀβακτυλλίς γ. ϱζ.
ἀβάφαξις β. ρμε.
ἀφάκη β. ρον.
ἀφρόνιζον ε. σκα.
ἀχίλλειος δ. σις.
ἄχρας α. ροδ.
ἀψίνθιον γ. κς.
ἀψίνθιον θαλάσσιον γ. κζ.
ἀψίνθιον σαρδώνιον γ. κη.

Β

Βάκχαεις β. να.
βάλανοι α. ρμδ.
βάλανος μυρεψικὴ δ. ρξ.
βαλαύστια α. ρνε
βαλλωτή. γ. ριζ.
Πρὶ βασιλίσκη ζ. ιϑ.
Πρὶ τῶν ὑπὸ βασιλίσκου δη-
χθέντων ν. ις.
βάτος δ. λζ.
βάτος ἰδαία δ. λη.
βαβάχιον β. σς.
βάβαχοι β. κη.
βδέλλα ς. λ.
βήχιον γ. ρκς.
βλήτιον ϛ. ργ.
βολβός β. σα.
βολβὸς ἐδώδιμος β. σ.
βόρβις γ. ρλ.
βύγλοσσον δ. ρκη.
βουνιάς β. ρλς.
βουώτιον δ. ρκδ.
βύσσος β. ξς.
βύσσος θαλασσία ς. γ.
βούτυρος καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς λιπαρὸς.
βρύον θαλάσσιον δ. ϛϑ.
βρῶμος β. ριϛ.
βρῶμος ὁ πόα δ. ρμ.

Γ

Γάλα β. οϛ.
γάλα γυναικεῖον β ον.
γάλα ἐμπυπαδὲν ς. κς.
γάλα ὄρνεον β. οζ.
γαλὴ κατοικίδιος. β. κζ.
γαλίοψις δ. ϛε.
γάλλιον δ. ϛϛ
γάρρος β. λδ.
γλυπανὴ γ. γ.
γεράνιον γ. ρλα.
γῆ ε. ϱο.
γῆ ἀμπελῖτις. ε. ρπα.
γῆ ἐρετριὰς ε. ροα.
γῆ ἡ ἐκ τῶν καμίνων ε. ροδ.
γῆ κιμωλία ε. ροϛ.
γῆ μηλιὰς ε. ρπ.
γῆ πιτῖτις δ ροζ.
γῆ σαμία ε. ροβ.
γῆ σελινουσία ε. ροε.
γῆ χία ε. ϱοδ.
γῆς ἔντερα β. οϛ.
Γῆρας ὄφεως β. ιϑ.
γιγγίδιον β. ξξζ.
γλαύκιον γ. ρ.
γλαῦξ δ. ϱμα.
γλήχων γ. λϛ.

γλυκύβρίζα γ. ζ.
γναφάλιον γ. ϛλβ.
γογγύλη β. ϛλδ.
γογγύλη ἀγρία β. ρλε.
γύψος ϛ. κδ.

Δ

Δάκρυον ἐλαίας αὐθοπικῆς. α. ρμβ.
δαῶκος γ. ϖγ.
δάφνη α. ρζ.
δάφνη δ. ρμζ.
δαφνοειδές δ. ϛμη.
δελφίνιον γ. ϖδ.
δελφίνιον ἕτερον γ. ϖε.
δευτερία ε. ιγ.
δίκταμνος γ. λζ.
δίκταμνος ὁ ἁπτικός γ. λϑ.
δίψακος β. ιγ.
Περὶ Διψάδος ζ. ισ.
δορύκνιον δ. οε.
δορύκνιον ϛ. ϛ
δράβη β. ρϖζ.
δρακόντιον β. ρϛϛ.
δράκων θαλάσσιος β. πε.
Περὶ Δρυΐνης ζ. ιβ.
Περὶ τῶν ἀπὸ Δρυΐνης δεδηγμένων. π. ι.
δρυοπτερὶς δ. ϛπϑ.
δρῦς α. ϛμγ.

Ε

Εβενος α. ρλ.
ἐλαία α.ϛ. ρλϑ.
ἐλαιόμελι α. λζ.
ἔλαιον ἀβροτόνινον, α. ζα.
ἔλαιον ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας. α. λα καὶ λϐ
ἔλαιον ἀμυγδάλινον α. ϛμα.
ἔλαιον ἀμυγδάλινον πικρόν α. ξθ.
ἔλαιον ἀνήθινον α. λθ.
ἔλαιον βαλάνινον α. ξβ.
ἔλαιον γλεύκινον α. μ.
ἔλαιον δάφνινον α. ξη.
ἔλαιον ἐλάτινον. α. γ.
ἔλαιον ἔλινον α. νε.
ἔλαιον καρύϊνον α. ξζ.
ἔλαιον κίκινον α. μβ.
ἔλαιον διὰ τῶν κιδρίνων κόκκων. α. λπ.
ἔλαιον κηίκινον α. μδ.
ἔλαιον κοινὸν. α. με.
ἐλάαι κολυμβάδες α. λ.
ἔλαιον κρόκινον α. ϛμ.
ἔλαιον κύπριον α. ξε.
ἔλαιον λευκὸν α. ξϛ.
ἔλαιον μαστίχινον α. λβ.
ἔλαιον μεγάλινον α. νϛ.
ἔλαιον μελάνθινον α. α.
ἔλαιον μύλινον. α. μζ.
ἔλαιον μυρσίνινον α. νϛ.
ἔλαιον ναρκίσσινον α. μθ.
ἔλαιον οἰνάνθινον α. ξδ.
ἔλαιον ῥαφάνινον α. νζ.
ἔλαιον ῥόδινον α. μϛ.
ἔλαιον σαμψύχινον α. νϑ.
ἔλαιον σισάμινον α. μα.
ἔλαιον σκιλλίτιον. α. λγ.
ἔλαιον σπάνιον α. μη.
ἔλαιον σούσινον α. ξγ.
ἔλαιον σχίνινον α. να.
ἔλαιον τῆλινον α. νη.
ἔλαιον

ἔλαιον ὀσκυάμινον α. μγ.
ἔλαιον ὠμόμυινον α. ξ.
ἔλαιον ὠμοπ[illegible]ές. α. κθ.
ἐλαιοστέλινον γ. ος
ἐλατήριον δ. ργε
ἐλατίνη δ. μ.
ἐλαφόβοσκον γ. π.
ἐλάφου κέρας α. ξγ.
ἐλελίσφακον γ. μ.
ἐλένιον α. κζ.
ἐλένιον αἰγύπτιον α. κη.
ἐλίφας β. ξα.
ἑλίχρυσον δ. νζ.
ἐλλέβορος λευκός. δ. ργ.
ἐλλέβορος μέλας δ. ργα.
ἐλξίνη δ. λθ.
ἐλξίνη δ. πς.
ἑλυμὸς β. ρκ.
ἔμβρυον φθόριον ε. οζ.
ἐμπυτρον δ. ρπα.
ἐπίθυμον δ. ροθ.
ἐπιμύδιον δ. ιθ.
ἐπιπακτίς. δ. ρθ.
ἐρέβινθος β. ρκς.
ἐρείκη α. ριπ.
ἔρια β. πδ.
ἔρια χειμωμύα β. πγ.
ἔρινος δ. κϑ.
ἔρπυλλον γ. μς.
ἐρυθρόδανον γ. ρξα.
ἐρύσιμον β. ρπη.
εὔζωμον β. ρο.
εὐπατώριον δ. μα.
εὐόρβιον γ. ος.
ἐφήμερον δ. πε.
ἐφήμερον ε. ρ.
Ζ
Ζειὰ β. ρια.
ζιγγίβερι β. ρπ.
ζύθος β. πη.
ζωμὸς νεαρῶν ἰχθύων β. λη.
ζώπυρα α. ςθ.
Η
Ηδύοσμος ἄγριος γ. μδ.
ἡδύοσμος ἥμερος γ. μα.
ἡδύσαρον γ. ρμς.
Ηδύχροον α. οα.
ἡλιοσκόπος δ. ρξδ.
ἡλιοτρόπιον τὸ μέγα δ. ρςγ.
ἡλιοτρόπιον τὸ μικρόν. δ. ρςδ.
ἡμεροκαλλίς. γ. ρλζ.
ἡμιονῖτις γ. ργδ.
ἧπαρ αἰγός. β. μζ.
ἧπαρ αἰθύας β. ν.
ἧπαρ κάπρου β. μη.
ἧπαρ ὄνειον α. σλ.
ἡρυγέρων δ. ςζ.
ἡσείγιον γ. κδ.
Θ
Θαλασσόμιλι α. κα.
Θάλικτρον δ. ςη.
Θαψία δ. ργζ.
Θεῖον ε. σκδ.
Θύ[illegible]ος

ἕρμος ἥμερος καὶ ἄγριος β. ρλϛ.
ρλγ.
Σηλυπτείς. δ. ρπϛ.
Σῆλις δ. ρξε.
Σλάσσι β. ρπϛ.
Σφίδαξ ἄγριος β. ρξϛ.
Σφίδαξ ἥμερος β. ρξε.
Σύμβερα γ. με.
Συμελαία δ. ρογ
Συμοξάλμη ε. κδ.
Σύμος γ. μδ.

Ι

Ιδαία ῥίζα δ. μδ.
ἱερὰ βοτάνη δ. ξα.
ἱεράκιον τὸ μέγα γ. οβ.
ἱεράκιον τὸ μικρόν. γ. ογ.
ἱερόβοτάνη δ. ξϛ.
ἰξίας ϛ. κα.
ἰξός. γ. ρδ.
ὁ Κοινὸς τῶν ἰοβόλων Θηριακεία. ι.α.
ἴον δ. ρκϛ.
ἰόνια β. ϛ.
ἶξος γ. ζγ.
ἰὸς ξηρός. ε. ϛα.
ἰὸς σιδήρου ε. ϛγ.
ἰὸς σκώληκος ε. ϛϛ.
ἱππάλη β. π.
ἱππόγλωσσον δ. ρλϛ.
ἱππόκαμπος β. γ.
ἱπποκάστανος β. ρμα.
ἱπποκρηπὶς ἀφροδίτης γ. ωϛ.
ἱπποπόταμου ὄρχις β. κε.
ἱππόσιλινον β. οη.
ἵππουρις δ. μϛ.
ἵππουρις ἑτέρα δ. μζ.

ἱπποφαὲς δ. ρξϛ.
ἱππόφαιστον δ. ρξγ.
ἶρις α. α.
ἰσάπις ἀγρία β. σιϛ.
ἰσάπις ἥμερος β. σιε.
ἰσόπυρον δ. ρκα.
ἰτέα α. ρλζ.
ἰχθυοκόλλα γ. ρβ.

Κ

Κάγκαμον α. κγ.
κάγχρυ γ. ωη.
καδμία ε. πδ.
καηλία δ. ρκγ.
καλαμάγρωστις δ. λα.
καλαμίνθη γ. μγ.
κάλαμος α. ριε.
κάλαμος ἀρωματικός, α. ιζ.
κάμπη β. ξδ.
καυθαείς. ϛ. α.
καυθαεῖδες β. ξε.
καύναξις ἀγρία γ. ρξϛ.
καύναξις ἥμερος γ. ρξε.
καπνὸς δ. ρι.
κάππαρις β. σδ.
κάρδαμος β. ρπε.
καρδάμωμον α. ε.
κάρυα γ. ξϛ.
καρυΐνος χερσαῖος β. ιϛ.
κάρυα βασιλικά. α. ροδ.
κάρυα ποντικά α. ρπ.
κασσία α. ιϛ.
κάστανα α. ρμϛ.
κάστορος ὄρχις β. κϛ.
καταράγη δ. ρλ. δ.
καπύματα β. να.

χαμ-

κωνκαλίς. β. ρξθ.
Περὶ τῶν ὑπὸ Κερχνιδίου δηχθέν-
των. π. ιγ.
κέγχρος ς. ις.
Περὶ Κέγχρου ζ. δ.
κέδρος α. ρς.
καντάυειον τὸ μέγα γ. π.
καντάυειον τὸ μικρόν. γ. θ.
κεφάσια α. ργπ.
Περὶ Κεφάσου. ς. ιζ.
Περὶ τῶν ὑπὸ Κεφάσου δηχθέν-
των π. ιδ.
κεφάπια α. ρτθ.
κέφρον δ. α.
κηκίς. α. ρμζ.
κηπαία γ. ρξπ.
κηφὸς. β. ρι.
κήρυκες β. ε.
κίκι δ. ρξδ.
κιννάβαρι ε. ρθ.
κιννάμωμον α. ιδ.
κιρκαία γ. ρλδ.
κίρσιον δ. ριθ.
κίσθος α. ρκζ.
κίσσηρις ς. ρκε.
κιστὸς. β. σι.
κλιματὶς. δ. ζ.
κλιματῖτις δ. ρθ.
κλιτοπέδιλον γ. μι.
κλύμενον δ. ιγ.
κνιδέλαιον α. μδ.
κνικέλαιον α. μι.
κνίκος δ. ρς.
κοκκυμηλέα α. ροι.
κόκκος βαφικὸς. δ. μα.
κόλλα γ. ρα.
κολόκυνθα β. ρξβ.
κολοκυνθὶς. δ. ρον.
κολχικόν. δ. πδ.
κόμαρος α. ρος.
κονδρίλλη β. ρξα.
κονία συκῆς α. ρπζ.
κόνυζα γ. ρλς.
κορεάλλιον ε. ρλθ.
κόρεις οἱ ἀπὸ κλίνης β. μς.
κόριον γ. οα.
κόριον ς. θ.
κόρις β. λς. γ. ροδ.
κορυδαλλὸς β. νθ.
κορωνόπους β. ζτπ.
κόστος α. ιε.
κοτυληδὼν. δ. ςδ.
κοτυληδὼν ἑτέρα δ. ςγ.
κουβαρίδες β. λζ.
κοῦρμι β. ρι.
κοχλίας χερσαῖος β. ια.
κράμβη ἄγριος β. ρμδ.
κράμβη ἥμερος β. ρμς.
κράμβη θαλασσία β. ρμπ.
κρανία α. ρογ.
κρατευόγονον γ. ρλθ.
κριθὴ. β. ρπ.
κρίθμον β. ρνζ.
κρίμνον β. ριδ.
κρίνον γ. ρις.
κροκοδείλιον γ. ιδ.
κροκόμαγμα α. κς.
κρόκος α. κα.
κρόμμυα β. ρπα.
κύαμος αἰγύπτιος. β. ρκπ.
κύαμος

κύαμος ἑλληνικός. β. ρκζ.
κυανός. ε. ρϛ.
κυκλάμινος β. ρϛδ.
κυκλάμινος ἑτέρα β. ρϛε.
κύμινον γ. ξη.
κύμινον ἄγριον γ. ξθ.
κυνόγλωσσον δ. ρκθ.
κυνοκράμβη δ. ρϛβ.
κυνόσβατον α. ρκδ.
κυπαρισσίας δ. ρξε.
κυπάρισσος α. ργ.
κύπειρος α. δ.
κύπρος α. ρκε.
κυτίσ. α. ργ.
κύτισος δ. ργ.
κῦφι α. κδ.
κύων λυσσῶν β. μθ.
Σημεῖα κυνὸς λυσσῶντος καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ δεδηγμένων. ζ. β.
Περὶ διαίτης τῶν ὑπὸ κυνὸς λυσσῶντος δηχθέντων ζ. δ.
Θεραπεία τοπικὴ τῶν λυσσῶντος κυνὸς δηγμάτων. ζ. γ.
κωβιός. β. λβ.
κώνειον δ. οθ, καὶ ϛ. ια.

Λ

Λαγωὸς θαλάττιος β. ϛ.
λαγωὸς χερσαῖος β. ιθ.
λαγώπους δ. ιζ.
λάδανος α. ρκθ.
λαθυρίς. δ. ρξθ.
λάπαθον β. ρμ.
λαμψάνη β. ρμϛ.
λειμώνιον δ. ιϛ.
λειχῆνες ἵππων β. με.
λεοντοπέταλον γ. ρι.
λεοντοπόδιον δ. ρλα.
λεπίδιον β. σε.
λεπίς. ε. πθ.
λεπίδος στόμωμα ε. ϛ.
λευκάκανθα γ. κϛ.
λευκὰς ὀρεινή γ. ργ.
λεύκη α. ρι.
λευκόϊον γ. ρλη.
λευκὸν ᾠοῦ β. νε.
λιβανωτίς. γ. πζ.
λιβανωτὶς ῥουσμαρίνου γ. πθ.
λίβανος α. πϛ.
λιβάνου φλοιὸς α. πγ.
λιγνὺς ἡ ἐξ ὑγρᾶς πίσσης α. ϛζ.
λιγνύος σκευασία α. πϛ.
λιγυστικόν. γ. νη.
λιθάργυρος ε. ρϛ.
λιθάργυρος ποθεῖσα ϛ. κζ.
λιθοκόλλα ε. ρξδ.
λίθος ἀετίτης ε. ρξα.
λίθος αἱματίτης ε. ρμδ.
λίθος ἀλαβαστρίτης ε. ργ.
λίθος ἀμίαντος ε. ρνϛ.
λίθος ἀραβικός. ε. ρμθ.
λίθος ἀρμένιος ε. ρε.
λίθος ἄσσιος ε. ρμϛ.
λίθος γαγάτης ε. ρμϛ.
λίθος γαλακτίτης ε. ρν.
λίθος γεώδης ε. ρξθ.
λίθος θρακίας ε. ρμζ.
λίθος θυΐτης ε. ρνδ.
λίθος ἴασπις ε. ρξ.
λίθος ἰνδικός. ε. ρζ.
λίθος ἰουδαϊκός. ε. ρνε.

λίθος μαγνῆτις ε. ρμη. μανδραγόρας ς. ις.
λίθος μελιτίτης ε. ρνα. μανδραγορείτης ε. πα.
λίθος μεμφίτης ε. ρνη. μάνια λιβανίου α. πδ.
λίθος μολιβδοειδὴς ε. σε. μάραθρον γ. πα.
λίθος μόρυχθος ε. ρνδ. μάρσιπος γ. μη.
λίθος ὀστρακίτης ε. ρξε. μεῖον α. γ.
λίθος ὀφίτης ε. ρξβ. μελαίνθιον γ. ςγ.
λίθος πυρίτης ε. ρμγ. μέλαν ε. ρτγ.
λίθος ὁ ἐν τῇ σαμίᾳ γῇ ε. ρογ. μελαντηρία ε. ριη.
λίθος σάπφειρος ε. ργζ. μέλι καθόλου β. ρα.
λίθος σελωνίτης ε. ργθ. μέλι τὸ ἐν ἀρακλείᾳ ς. κ.
λίθοι οἱ ἐν τοῖς ἀσήγγοις ε. ρξγ. μέλι ποντικόν β. ργ.
λίθος ὀψιτός. ε. ρμε. μέλι σακχάρου β. ρδ.
λίθος φύγλος ε. ρμα. μέλι σαρδῶον β. ρϐ.
λιθόσπερμον γ. ρνη. μελία α. ρθ.
λιμνιὰς γῆ ε. ριγ. μελίκρατον ε. ιζ.
λινόζωστις δ. ρςα. μελίλωτον γ. μη.
λίνον β. ρκε. μελίσσυλα α. ρξϐ.
λογχῖτις γ. ρξα. μελισσόφυλλον γ. ριη.
λογχῖτις ἑτέρα γ. ρξϛ. μηδικὴ σίτη α. ογ.
λυγκούριον β. ϙ. μήκωνα α. ρο.
λύκιον α. ρλγ. μήκωνα ἑτέρα α. ρα.
λύκοψις δ. κς. μετώπιον α. οϛ.
λιτριμάχιον δ. γ. μηδικὴ β. ροζ.
λυχνὶς ἀγρία γ. ριε. μήδιον δ. ιη.
λυχνὶς στεφανωματικὴ γ. ριδ. μήκων δ. ξδ.
λωτὸς ἄγριος δ. ριϐ. μήκων ς. ιζ.
λωτὸς αἰγύπτιος δ. ριδ. μήκων ἀφρώδης δ. ξζ.
λωτὸς ἥμερος. δ. ρια. μήκων ἥμερος δ. ξε.
M μήκων κερατίτης δ. ξς.
Μανίδες β. λα. μήκων κερατίτης ς. ιη.
μάκης α. ρια. μήκων ῥοιὰς δ. ξδ.
μαλάβαθρον α. ια. μηλέα α. ρξ.
μαλάχη β. ρμδ. μηλόμελι ε. κϑ.
μανδραγόρας δ. ος. μῆλα ἀμυγδαλικὰ α. ρξς.
μῆλα

μῦλα ἠπειρωτικά. α. ρξδ.
μῦλα κυδώνια α. ρξα.
μῦλα μηδικά. α. ρξζ.
μῦλα σβρτικά. α. ρξε.
μύλτος σιγωπική. ε. ρια.
μύσυ ε. ριζ.
μολίβδαινα ε. ρ-
μόλιβδος κεκαυμμένος ε. ςς.
μόλιβδος πεπλυμμένος ε. ςε.
μορέα α. ρπα.
μύαγρος δ. ριζ.
μύακες β. ζ.
Περὶ μυγαλῆς. ζ. θ.
Περὶ τῶν ὑπὸ Μυγαλῆς δηλη-
μθέντων κ. ζ.
μυκοί. β. ςε.
μύκητες δ. πγ.
μύκητες ς. κγ.
μυγάλη. β. σγ.
μυείκια α. ριξ.
μυελόφυλλον δ. ρια.
μύες δ. ρις.
μύρων σύνθεσις α. ργ.
μυρσίνη α. ριζ.
μυρσίνη ἀγρία δ. ρμς.
μυρτίδανος α. ργζ.
μύρων κινναμώμινον α. οε.
μύρων μαλαβάθρινον α. οζ.
μύρων ναρδῖνον α. ος.
μύες. β. οδ.
μυὸς ὦτα β. σιδ.
μῶλυ γ. νδ.

N

Ναρδος α. ς.
ναρδος κελτικὴ. α. ζ.
ναρδος ὀρεινή. α. η.
ναρδηξ γ. ςα.
νάρκη β. ιζ.
νάρκισσος γ. ρξα.
νάσκαφθον α. κϛ.
νάφθα α. ρϛ.
νήειον γ. πβ.
νίτρον ε. ρλ.
νυμφαία γ. ρμη.
νυμφαία ἑτέρα γ. ρμθ.

Ξ

Ξαύδιον δ. ρλη.
Ξηρεῖς. δ. κϛ.
ξιφίον δ. κ.

O

Οδόννη β. σια.
οἰναύθη ε. ε.
οἰναύθινος ε. λγ.
οἰνόμελι ε. ις.
οἶνος ε. ζ.π.θ.ι.ια.
οἶνος ἀκοεί τις. ε. γ.
οἶνος ἀπίτης ε. λβ.
οἶνος ἀρκαδικὸς ε. μς.
οἶνος ἀρωματίτης ε. ξδ.
οἶνος ἀσαρείτης ε. ξη.
οἶνος ἀψινθίτης ε. μθ.
οἶνος βουνίτης ε. νς.
οἶνος δαυκίτης ε. ο.
οἶνος δευτερείας ε. ηι.
οἶνος δικταμνίτης ε. νζ.
οἶνος ἐλελισφακίτης ε. οα.
οἶνος ἐλλεβορίτης ε. πϛ.
οἶνοι θαλάσσιοι ε. κζ.
οἶνος θυμβρίτης ε. ξ.
οἶνος

οἶνος θυμελαΐτης ε. ον.
οἶνος θυμίτης ε. γθ.
οἶνος καλαμινθίτης καὶ ἕτεροι. ε. ξϛ.
οἶνος κατοχίτης. ε. μα.
οἶνος κέδρινος ε. με.
οἶνος καδρίτης ε. μζ.
οἶνος κισρίτης ε. νδ.
οἶνος κονυζίτης ε. ζγ.
οἶνος κυδωνίτης ε. κη.
οἶνος μανδραγορίτης ε. πα.
οἶνος μαραθρίτης καὶ ἀγήθινος. ε. οε.
οἶνος μελιτίτης ε. ιε.
οἶνος μυρσινίτης ε. λζ.
οἶνος μυρτίτης ε. λϛ.
οἶνος ναρδίτης ε. ξζ.
οἶνος ὁ διὰ τῆ ἀγρίας ναρδ. ε. ζθ.
οἶνος νεκταρίτης ε. ξϛ.
οἶνος ὀμφακίτης ε. ιβ.
οἶνος ὀρειγανίτης ε. ξα.
οἶνος παπακίτης καὶ οἶνος ἀκοείτης. ε. οβ.
οἶνος πισσίτης ε. μη.
οἶνος σφραγίτης ε. γη.
οἶνος ῥητινίτης ε. μγ.
οἶνος ῥοδίτης ε. λε.
οἶνος ῥοίτης ε. λδ.
οἶνος σελινίτης ε. οδ.
οἶνος σκαμμωνίτης ε. πγ.
οἶνος σκιλλητικός ε. κϛ.
οἶνος ἐκ σμύρνης καὶ ἄλλων ε. ξε.
οἶνος ἐκ τῆ ἀγρίας σταφυλῆς. ε. ιδ.
οἶνος στοιχαδίτης ε. νβ.
οἶνος στροβιλίτης ε. μδ.
οἶνος συκομορίτης ε. μβ.
οἶνος χιτίτης ε. λη.
οἶνος τε-

οἶνος τερμινθίνος ε. λϑ.
οἶνος βαρρειγανίτης ε. νε.
οἶνος ὑοσκυάμινος ε. ρα.
οἶνος φοινικίτης ε. μ.
οἶνος χαμαιδρυΐτης ε. να.
οἶνος χαμαιπιτύϊνος ε. π.
οἶνος χαμαιλαΐτης ε. οϑ.
εἴσυπες β. πδ.
ἐλέσιον δ. ία.
ὄλωθοι α. ϙπϛ.
ὄλυρα β. ρη.
ὀμφάκιον ε. ϛ.
ὀμφακόμελι ε. λα.
ὀνάγρα δ. ριπ.
ὀνῶπις γ. λϑ.
ὀνοβρυχὶς γ. ρο.
ὄνοσμα γ. ϙμζ.
ὄνυχες β. ι.
ὄνυχες αἰγῶν β. με.
ὄνυχες ὄνων β. μδ.
ὀξάλμη ε. κγ.
ὄξος ε. κσ.
ὄξος σκιλλητικόν ε. κε.
ὄξος στοιχαδικόν ε. νγ.
ὀξυάκανθα α. ϙκγ.
ὀξύμελι ε. κβ.
ὀπὸς χαρπάσου ϛ. ιγ.
ὀρεοσέλινον γ. οϛ.
ὀρίγανον σ. λβ.
ὄρμινον ἥμερον γ. ρμε.
ὀρνιθόγαλον β. ϙοδ.
ὀρσοδάκνη β. ϙοϛ.
ὄρσος β. ϙλβ.
ὀρρὸς γάλακτος β. οϛ.
ὄρυζα β. ϙιζ.

ἔρχεσ. γ. ρμα.
ἔρχεσ ἔτερον γ. ρμβ.
ἔστακα ε. ρση.
ἔσυεις δ. ρμχ.
οὖα α. ροδ.
οὖσεν β. σθ.

Π

Παγκράτιον β. σγ.
πανονία γ. ργζ.
παλίουρος α. ρκβ.
παράκας γ. νε.
παράκας ἀσκληποῦ γ. νς.
παράκας χειρώνιον γ. νζ.
πάπυρος α. ρις
παρδάλιον γ. ρνε.
παρωγυχία δ. νδ.
πεντάφυλλον δ. μβ.
πέφυκεν β. ρπθ.
πικρὶς δ. ρξθ.
πίλος δ. ρξη.
πίπων β. ρξδ.
πιτασίτης δ. ρη.
ποικιλόμωρον δ. ιδ.
πολιτειῶν. δ. ξ.
πρόσια α. ρπη.
πτεροσύλιον γ. οζ.
πυκίδανος γ. σβ.
πύγανον γ. νβ.
πύγανον ἄγριον γ. νγ.
πῶσαι ξηραὶ α. σβ.
πῶσαι ὑγραὶ α. σε.
πτέρια α. ρον.
πτισάνιον α. νς.
πυπάσφυτος α. ρα.
πυτύα λαγωοῦ β. πι.

πυΐδες α. πκ.
πυοκάμπη ς. β.
πύουσα δ. ρξς.
πῖτυς α. πζ.
πλάτανος α. ρκ.
πνεύμων ἀλώπεκος β. μα.
πνεύμων θαλάσσιος β. λθ.
πνεύμων χοίρειος ἢ ἄρνειος ἢ ἀρ-
κείος β. μ.
ποιότητες τῶν οἴνων ἀπ τῆς ὑλι-
κίας ε. ζ.
ἀπ τῆς χρόας ε. η.
ἀπ τῆς γεύσεως ἢ τῶν μεμιγμέ-
νων ε. θ.
πολεμώνιον δ. π.
πόλιον γ. ρκδ.
πολύγαλον δ. ρμβ.
πολυγόνατον δ. ς.
πολύγονον ἄρρεν δ. δ.
πολύγονον θῆλυ δ. ε.
πολύκνημον γ. ρη.
πολυπόδιον δ. ρτη.
πομφόλυξ ε. πε.
πορφύρα β. δ.
ποταμογείτων δ. ρα.
ποτήριον γ. ιζ.
φεύσιον γ. ριθ.
φεύσον κεφαλωτόν. β. ροθ.
φεύπλις β. ξς.
παρμικὴ. β. ξς.
πελία α. ριβ.
πίεις δ. ξπς.
πυκνόκομον δ. ξος.
πύρεθρον γ. πς.
πυρεὶ β. ρζ.

Ρ

Ρᾶ γ. β.
ῥάμνος α. ξκ.
ῥαφανὶς β. ρλζ.
ῥαφανὶς ἀγρία ϛ. ρλη.
ῥητίνη ὀρνίνη α. τα.
ῥητίνη ὑγρὰ πτυΐνη ἢ πευκίνη. α. τγ.
ῥόα α. ρϐ.
ῥόδα α. ρλα.
ῥοδία ῥίζα δ. μα.
ῥοδίδες α. ρλϛ.
ῥοιᾶς α. ρμη.
ῥύπος βαλανείων α. λδ.
ῥύπος γυμνασίων α. λς.
ῥύπος ἐκ τῆς παλαίστρας α. λε.

Σ

Σαγάπηνον γ. τε.
σαλαμαίδρα ε. δ.
σάμψυχον γ. μζ.
σανδαράχη ε. ρκϐ.
σανδύξ α. ργ.
σαρδόνια πόα ε. ιδ.
σαρκοκόλλα γ. ϛθ.
σαρξιφράγης β. ιζ.
σατύριον γ. ρμγ.
σατύριον ἐρυθρόγιον γ. ρμδ.
σαῦρα β. ξθ.
σέλινον γ. οδ.
σέριες ἥμερος β. ξξ.
σέσελι αἰθιοπικόν. γ. ξα.
σέσελι μασσαλιωτικόν γ. ξ.
σέσελι πελοποννησιακόν. γ. ξϐ.
σηπία β. κγ.
σησαμοειδὲς τὸ μέγα δ. ργϐ.
μικρόν. ργ.
σίσαμος ϛ. ρκα.
σίνηπι ϛ. ο.
σιδηρῖτις γ. λγ.
σιδηρῖτις ἑτέρα γ. λδ.
σιδηρῖτις τρίτη γ. λε.
σίδια α. ργδ.
σίκυος ἥμερος δ. ργδ.
σίλυβον δ. ργϑ.
σίλφη β. λκ.
σίλφιον γ. ϛδ.
σίνηπι β. ρπδ.
σίον β. ργδ.
σίσαρον β. γλθ.
σισύμβριον β. ρνε.
σισύμβριον ἕτερον β. ρνϛ.
σίσων γ. ξδ.
σκαμμωνία δ. ροε.
σκαῦδυξ β. ρξπ.
σκίγκος β. οα.
σκίλλα β. σϐ.
σκολοπένδρα β. ις.
Περὶ Σκολοπένδρας ζ. ϛ.
Περὶ τῶν ὑπὸ σκολοπένδρου δηγμάτων. π. δ.
σκόλυμος γ. ις.
σκόρδιον γ. ρκε.
σκορδόπρασον β. ρπγ.
σκόροδα β. ϛπϐ.
σκορπιοειδές. δ. ρϛε.
Περὶ Σκορπίου ζ. ζ.
Περὶ τῶν ὑπὸ σκορπίου δηγμάτων π. ε.
σκορπὶος θαλάσσιος β. ιδ.
σκορπὶος χερσαῖος β. τγ.
σκωρία ἀργύρου ε. ρα.

σωρεία μολίβδου ε. ςζ.
σωρεία σιδήρου ε. ςδ.
σωσείδες β. λ.
σμίλαξ β. ρος.
σμίλαξ ς. ιβ.
σμίλαξ λεία γ. ρμε.
σμίλαξ τραχεία γ. ρμδ.
σμύλαξ γ. π.
σμύεις ε. ρξς.
σμύρνα α. οκ.
σμύρνα βοιωτική. α. οθ.
σμύρνιον γ. οθ.
σόκχος β. γνθ.
σπαργάνιον γ. κα.
σπαρτίον δ. ρον.
σπόγγοι ε. ρλη.
σαφίς. ε. δ.
σακτή. α. οδ.
σαφὶς ἀγεία δ. ρμς.
σαφυλή. ε. γ.
σαφυλῖνος ἄγχιος γ. νθ.
σάχυς γ. ρκ.
σέαρ καθόλου β. πς.
σεάτων δυώαμις β. ςδ.
σέαρ πῶς ἀρωματιςέον β. ςα.
σέαρ πῶς σαμψυχίζεται β. ςϛ.
σέαρ βόειον β. πθ.
σέαρ ταύρειον καὶ παρδάλειον, καὶ λεόντειον β. ς.
σέαρ τράγειον καὶ τραγελάφειον καὶ ἐλάφειον β. πκ.
σέαρ ὕειον καὶ ἄρνειον β. πζ.
σέαρ χηνήειον, καὶ ὀρνίθειον β. ςγ.
σίμμοι ε. ςθ.
σιλφὰς γ. λα.
σοιβή. γ. ιϛ.
σπαπώτης δ. ρϛ.
σπαπώτης ὁ χιλιόφυλλος δ. ρχ.
σρόβιλοι α. πθ.
σρούθιον β. ρςγ.
σρύχνος ἀλικάκαβος γ. οϛ.
σρύχνος κυπαῖος γ. οα.
σρύχνος μανικός. γ. οδ.
σρύχνος ὑπνωτικός. γ. σχ.
σύραξ α. π.
συπηνία ε. ρκγ.
συκῆ ἀγεία α. ρπε.
συκόμορεον α. ρπϛ.
σῦμα α. ρπδ.
σῦκον κύφριον α. ρπγ.
σύμφυτον πετραῖον γ. θ.
σύμφυτον ἄλλο γ. ι.
χίνος α. ις. καὶ δ. νϛ.
χίνος τὸ ἥμερον α. ς.
χηλὶ Θεραπείας τῶν ὑπὸ σφηκῶν ἢ μελισσῶν δεδηγμένων ν. β.
χρόνδυλον γ. ς.
χῶρυ ε. ριθ.

Τ

Τεκτονική. ε. ςιϛ.
τελλῖναι β. ν.
τέρμινθος α. ςϛ.
τέπιγες β. νς.
τεύκριον γ. ρια.
τεῦτλον β. ρμθ.
τέφρα ε. λε.
τηλέφιον β. σιζ.
τῆλις β. ρκδ.
τίτανος ς. κθ.
τιτυμάλλων ἑπτὰ εἴδη δ. ρξε.

πορδίλιον γ. ξγ.
πραγάναθα γ. κγ.
πράγιον δ. μθ.
πράγιον ἄλλο δ. ν.
πραγοπώγων β. ργ.
πραγορείαιον γ. λε.
πράγος β. ριε. καὶ δ. να.
πρέβολον δ. ιε.
πρέγλη β. κδ.
πρεπόλιον δ. ρλε.
πρίφυλλον γ. ρκγ.
πριχομαρὲς δ. ρλζ.
πρυγὼν θαλαττία β. κ.
ὡς τὸ Πρυγόνος θαλαττίας. ζ. ν.
ὡς τῶν ὑπὸ Πρυγόνος θαλαττίων δεδηγμένων ν. ς.
πρύξ. ε. ρλδ.
πυρὸς νεαρός. β. οθ.
πύφη γ. ρλγ.

Τ

Τάκηθος δ. ξγ.
ὕδιον β. ροε.
ὑδραάργυρος ε. ρι.
ὑδραάργυρος πεπεῖσα ς. κη.
ὑδρόμηλον ε. λ.
ὑδροπίπερι β. ρσα.
περὶ Τδρου ζ. ιε.
περὶ τοῦ ὑφ' ὕδρυ δηχθέντων ν. ιδ.
ὕδωρ ε. ιη.
ὕδωρ θαλάσσιον ε. ιθ.
ὕδωρ ψυχρόν. ς. λδ.
ὑοσκύαμος δ. ξθ.
ὑοσκύαμος ς. ιε.
ὑπάτικόν γ. ροα.
ὑπάτικον δ. ξη.
ὑποκιστὶς. α. ρκη.
ὕσσωπον β. λ.

Φ

Φακὸς β. ρκθ.
φακὸς ἐπὶ τῶν τελμάτων δ. πη.
φαλάγγιον γ. ρκδ.
περὶ Φαλαγγίου ζ. ε.
περὶ τοῦ ὑπὸ Φαλαγγίων δεδηγμένων. ν. γ.
φάλαεις γ. ρνθ.
φασίολος β. ξλ.
φηγός. α. ρμε.
φιλλυρέα α. ρκς.
φίνις β. νη.
φλοιὸς λιβανου α. πγ.
φλόμος δ. ρδ.
φοίνιξ δ. μγ. καὶ α. ρμθ.
φοίνιξ ἢ καὶ ἐλάτη α. ργα.
φοινικὰς θηβαϊκὴ. α. ρν.
φοῦ α. ε.
φρυγὸς ε. λα.
φῦκος θαλάσσιον δ. ς.
φυλλίτις γ. ρκα.
φύλλον γ. ριά.
φύτευμα δ. ξλ.

Χ

Χαβαΐνη γ. ςζ.
χαλκανθον ε. ριδ.
χαλκίτις ε. ρια.
χαλκὸς κεκαυμένος ε. πζ.
χαμαιάκτη δ. ροε.
χαμαιδάφνη δ. ρμθ.
χαμαίδρυς ς. ριδ.
χαμαίκισσος δ. ρκς.
χαμαιλεύκη δ. ρκζ.

χαμαιλέων ὁ λευκός.	γ. ι.	Ψ	
χαμαιλέων ὁ μέλας	γ. ια.	Ψευδοδούνιον	δ. ρκε.
χαμαιπίτυς	γ. ξε.	ψευδοδίκταμνος	γ. λη.
χαμαιπίτυς ἑτέρα	γ. ος.	ψευδοκωπία	α. ιγ.
χαμαισύκη	δ. ρο.	ψευδοκυπάρισσος	α. ιε.
χαμελαία	δ. ροϛ.	ψιμμίθιον	ε. ξγ.
χελιδόνες	β. οξ.	ψιμμίθιον	ϛ. κβ.
χελιδόνιον τὸ μέγα	β. σια.	ψύλλιον	δ. ο.
χελιδόνιον τὸ μικρόν	β. σιϛ.	ψύλλον	ϛ. ι.
χυμοί.	β. θ.	ψωρικόν.	ε. ριϛ.
χολὴ	β. ϛϛ.	Ω	
χόνδρος	β. ξιη.	Ωκιμοειδές.	δ. κη.
χρυσάνθεμον	δ. νη.	ὦκιμον	β. ροα.
χρυσόζογον	δ. νϛ.	ὠμοτάειχος	β. λγ.
χρυσοκόλλη	ε. ρδ.	ὠόν.	β. γδ.
χρυσοκόμη	δ. νι.	ὦχρα	ε. ξη.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ.

INDEX OMNIVM QVÆ IN DIOSCORIDE CONTINENTVR.

Prior numerus librum, posterior caput indicat.

A

Abrotonum 3.29
Absinthium 3.26
Absinthium marinum 3.27
Absinthium Santonicum 3.28
Acacalis 1.119
Acacia 1.134
Acanthus 3.19
Acanthus sylvestris 3.20
Acanthium 3.18
Acetum 5.21
Acetum mulsum 5.22
Acetum scillinum 5.25
Acetum è stœchade 5.53
Achillea 4.36
Achras 1.169
Acida muria 5.23
Acinos 3.50
Acorum 1.2
Aconitum 4.77.78,6.7
Adarces 5.137
Adeps omnis 2.86,94
Adeps sampsuchi odore imbuitur 2,92
Adianton 4.136
Ægilops 4.139
Æris squamma 5.89
Æris flos 5.88
Ærugo rasa 5.91
Ærugo scolecia 5.92
Æs vstum 5.87
Æthiopis 4.105
Aëtites lapis 5.161
Agallochon 1.21
Agaricum 3.1
Ageraton 4.59
Agnus 1.36
Aiuga 3.175,176
Alabastrites 5.153
Alcea 3.164
Alcyonium 5.136
Alisma 3.169
Allium 2.144
Aloë 3.25
Alsine 4.87
Althæa 3.139
Althæa 3.165
Alumen 5.72
Alumen scissile 5.72
Alysson 3.105
Ambrosia 3.129
Amiantus lapis 5.156
Ammi 3.70
Ammoniacon 3.98
Amomum 1.14
Ampelitis terra 5.181
Ampeloprason 2.180

Amphisbænæ ictus notæ eius curatio 8.9
Amurca 1.135
Amygdalæ amaræ 1.177
Amylum 2.123
Anagallis 2.209
Anagyris 3.167
Anchusa 4.23, 24.25
Andrachne sylvestris 2.151
Androsaces 3.150
Androsæmon 3.173
Anemone 2.207
Anethum 3.67
Anguium senectus 2.18
Anisum 3.65
Anonis 3.21
Anserinus adeps 2.93
Anthemis 3.154
Anthericum
Anthillis 3.153
Antipathes 5.140
Antirrhinon 4.153
Antispoda 5.86
Aparine 3.104
Aphaca 2.178
Apiastrum 3.118
Apios 4.177
Apium 3.74
Apocynon 4.81
Apollinaris 4.69
Apri iecur 2.39
Apum ictus curatio 8.2
Aqua 5.18
Aqua frigida 6.34
Aquâ marina 5.19
Aqua mulsa 5.17
Arabicus lapis 5.149
Araneus 2.150
Arbutus 2.176
Arcion 4.107
Arction 4.106
Arcturon 4.106
Arena 5.16
Argemone 2.208
Argenti recrementum 5.101
Argenti scoria 5.101
Argenti spuma 5.102, 6.27
Argentum viuum 5.110, 6.28
Arisarum 2.198
Aristolochia 4.5.6
Armeniaca mala 1.166
Armenius lapis 5.105
Aron 2.197
Arrhenogonon 3.120
Artemisia 3.127.128
Arundo, vide Harundo.
Asarum 19
Asclepias 3.106
Ascyron 3.172
Asius lapis 5.142
Aspalathus 1.19
Asparagus 2.152
Asplenon 3.151
Aspidis ictus notæ curatio, 7.18, 8.15.
Aster Atticus 4.120
Astragalus 4.62
Athamanticum 1.3
Athera 2.114
Atractylis 3.107

Atramentum librarium 5.183
Atramentum sutoriũ 5.114
Atriplex 2.145
Auellana nux 1.180
Auena 2.116
Auricula muris 2.214
Auripigmentum, siue arsenicon 5.121.6.29

B

Baccæ lauri 1.90
Baccharis 3.51
Balaustium 1.155
Ballote 3.117
Balsamum 1.18
Barbula hirci 2.173
Basilisci ictus notæ eius curatio 7.19
Bdellium 1.81,8.16
Beta 2.149
Betonica 4.1
Bitumen 1.100
Blatta pistrinaria 2.24
Bliton 2.143
Botrys 3.130
Brassica 2.146
Brassica marina 2.148
Brasica sylueſtris 2.147
Britanica 4.2
Bromus 4.140
Bryon 1.20
Bubulum sæuum 2.89
Buccina 2.5
Bugloſſum 4.128
Bulbus esculentus 2.200
Bulbus vomitorius 2.201
Bunion 4.124
Bupreſtis 6.3
Buphthalmos 3.156
Butyrum 2.81
Butyri fuligo 2.81

C

Cacalia 4.123
Cadmia 5.84
Cæciliæ ictus notæ curatio eadẽ quę viperę morsus 7.11
Calamus odoratus 1.16
Calamintha 3.43
Calcifraga 4.181
Calx viua 5.133
Cancamum 1.25
Canchris 3.80
Cancri 2.12
Canis rubus 1.124
Canis rabiosi signa 7.2
curatio morsus eius 7.3
ab eo morsorum victus ratio 7.4
Cannabis 3.165.166
Cantharides 6.1
Capnos 4.110
Capparis 2.204
Cardamomum 1.5
Cardamina 2.120
Carduus 3.16
Carpasi succus 6.13
Cariotæ 1.125
Carum 3.66
Caseus recens 2.79
Caseus equinus 2.80
Cassia 1.12

Caſtanea 1.146
Caſtorium 2.122
Catanance 4.134
Caucalis 2.169
Cedrus 1.106
Celticum nardum 1.7
Cenchri ictus notæ remedia 7.16,8.13.
Centaurium magnum 3.8
Centaurium minus 3.9
Cepa 2.181
Cepæa 3.168
Cera 2.105
Ceraſia 1.158
Ceraſtæ ictus notæ curatio. 7.17,8.14.
Cerui genitale 2.36
Ceruinum cornu 2.50
Ceruinum fœuum 2.88
Ceruſſa 5.103,6.22
Ceſtron 4.1
Chalcitis 5.115
Chamæ 2.9
Chamæacte 4.175
Chamæciſſos 4.126
Chamædaphne 4.149
Chamædrys 3.94
Chamæleo albus 3.10
Chamæleo niger 3.11
Chamæleuce 4.127
Chamæpitys 3.175
Chamæſyce 4.170
Chamælea 4.172
Chelidonium 2.211
Chelidonium minus 2.212
Chia terræ 5.174
Chryſanthemon 4.58
Chryſocolla 5.104
Chryſocome 4.55
Chryſogonon 4.56
Cicadæ 2.43
Cicer ſatiuum 2.126
Cicer arietinum 2.96
Cicer ſylueſtre 2.96
Cichorion 2.125
Cici 4.145
Cicuta 4.79,6.11
Cimices 2.36
Cimolia 5.176
Ciparisſias 4.165
Cinis ſarmentinus 5.135
Cinnabaris 5.109
Cinnamomum 1.13
Cionia 2.6
Circæa 3.134
Cirſium 4.119
Ciſtus 1.127
Citria mala 1.131
Clematis 4.7.182
Clinopodion 3.109
Clymenon 4.13
Cnicus 4.190
Coagulum 2.85
Coccum gnidion 4.154
Coccum infectorium 4.48
Cochleæ 2.11
Cœruleus 5.106
Colchicon 4.84
Colocynthis 4.178
Colymbades oleæ 1.140

Conyza 3. 136
Corallium 5. 139.
Coriandrum 3. 71. 69.
Coria veteramentaria 2. 51.
Coriarius frutex 1. 124
Coris 3. 174
Coronopus 2. 118
Cornus 1. 173
Corruda 2. 117
Cos Naxia 5. 168
Coſtus 1. 15
Cotonea mala 1. 161
Crateogonum 5.139
Crithmum ſeu crithamon. 2. 157.
Crocodilion 3. 12
Crocomagma 1. 26
Crocum 1. 25
Croton 4. 245
Cucurbita 9. 162
Cucumis ſatiuus 2. 163
Cucumis ſylueſtris 4. 154
Cuminum ſatiuum. 3. 68
Cuminum ſylueſtre 3. 69
Cunila 3. 28
Cupreſſus 1. 103
Curmi 2. 110
Cyclaminus 2. 294
Cyclaminus altera. 2. 195
Cydonomeli 5. 18
Cynia 4. 270
Cynocrambe 4. 192
Cynogloſſon 4. 129
Cynoſorchis 3. 121
Cypariſsias tithymalus. 4. 156
Cyphi 2. 24
Cypirus 1. 4
Cytinus 1. 153
Cytiſus 4. 113.

D

Damaſcena pruna 1. 137
Damaſonion 3. 144
Daphnoides 4. 148
Daucus 3. 83
Delphinium 3. 84. 85
Dendroides tithima 4. 165
Deuteria 5. 18
Dictamum. 3. 37
Dictamnum Cretéſe. 3. 39
Diphryges 5. 120
Dipſacum 3. 13
Dipſadis morſus notę eius curatio 7. 14. 8. 11
Dorycnion 4. 75. 66
Draba 2. 187
Draco marinus 2. 15
Draconis marini ictus remedia 6. 40
Dracunculus 2. 196
Dryini ictus notæ curatio. 7. 12. 8. 10.
Dryopteris 4. 189
Dulcis radix 3. 7

E

Ebenus 1. 130
Ebulum 4. 155
Ebur 2. 48
Echinus 2. 1
Echinus terreſtris 2. 2
Echium 4. 27

Elapho-

Elaphoboſcon. 3. 80.
Elaterion 4. 155
Elatine 4. 40
Electrum 1. 93
Elæomeli 1. 37
Eleoſelinum 3. 75
Elichryſon 4. 57
Empetron 4. 181
Ephemeron 4. 85. 6. 5
Epimedion 4. 19
Epimelis 1. 133
Epipactis 4. 109
Epirotica mala 1. 131
Equiſetum 4. 46. 47
Eretria terra 5. 171
Erica 1. 118
Erinaceus 2. 1
Erinei 1. 146
Erinus 4. 29
Eruca 2. 170
Erucæ olerum 2. 51
Erucæ pinorum 6. 2
Eruum 2. 131
Eryngium 3. 24
Eryſimon 2. 149.
Eupatorium 4. 41
Euphorbium 3. 96.

F

Faba 2. 127
Faba ægyptia 2. 128
Fæx 5. 132
Fagus 1. 145
Farina craſsior 2. 112
Fel 2. 95
Ferri rubigo 5. 93
Ferula 3. 91
Feſtuca 4. 139
Fibrini teſtes 2. 26
Ficus 1. 183. 184
Ficus ſylueſtris 1. 185
Ficus lixiuium 1. 187
Filicula 4. 188
Filix 4. 186
Filix fœmina 4. 187
Fimum 2. 98
Flos æris 5. 88
Flos ſalis 5. 129
Flos punicæ 1. 127
Flos ſyueſtris punici 1. 127
Fœniculum erraticum 3. 82
Fœnum græcum 2. 124
Fraxinus 1. 109
Fuligo è myrrha, reſina, ſtyrace. 1. 86
Fuligo liquidæ picis 1. 97
Fuligo pictoria 5. 182
Fuligo reſinæ 1. 94
Fuligo thuris 1. 85
Fumaria 4. 110
Fungi 4. 83. 6. 23.

G

Gagates lapis 5. 146
Galactites lapis 5. 150
Galbanum 3. 97
Galla 1. 147
Gallina 2. 41. 51
Gallinæ cerebellum 2. 53
Gallinaceus adeps 2. 93
Garum 2. 34
Genitale cerui 2. 36

Gentiana 3. 3
Geramion 3. 131
Geodes lapis 3.159
Gingiberis 2. 190
Gingidion 2. 167
Gith 9. 3
Gladiolus 4. 20.
Glans 1. 144
Glans Iouis 1. 122
Glans ſardiana 1. 122
Glans vnguentaria 4. 160
Glaſtum ſatiuum 2. 215
Glaſtum ſylueſtre 2. 216
Glaucium 3. 100
Glaux 4. 141
Gluten piſcium 3. 102
Glutinum 3. 101
Gnaphalion 3. 132
Gnobius 2. 32
Gramen 4. 30
Gramen arundinaceũ. 4. 31
Gramen parnaſi 4. 32
Groſsi 1. 186
Gypſum 5.134. 6.24.

H

Hæmatites 5.144
Hæmorrhoi notæ eius curatio 7. 13. 8.11
Halica 2. 118
Halicacabon ſolanum 4. 72
Halimus 1. 121
Harundo 1. 151
Harundo cypria 1. 115
Harundo vallatoria 1. 115
Haſtula regia 2. 199
Hedera 2. 210
Helenium 1. 27
Helenium alterum 1. 28
Helioſcopius 4. 165
Heliotropiũ magnum 4. 193
Heliotropiũ paruum 4. 194
Helleborum album 4. 133
Helleborum nigrum 4. 134
Helxine 4. 39. 86
Hemerocallis 3. 137
Hemionitis 3. 152
Herba Sabina 1. 105
Heriacium magnum 3. 72
Heriacium paruum 3. 73
Hippace 2. 63
Hippocampus 2. 3
Hippogloſſon 4. 132
Hippolapathon 2. 141
Hippophaës 4. 162
Hippophæſton 4. 163
Hippopotami teſtes 3. 25
Hippoſelinon 3. 78
Hirci herbula 3. 78
Hircinum fœuum 2. 88
Hirculus 1. 7
Hirundines 2. 57
Hirudo 6. 32
Hordeum 2. 108
Horminum 3. 145
Hyacinthus 4. 63
Hydromeli 4. 63
Hydromelon 5. 30
Hydropiper 2. 191
Hyoſciamus 4. 69. 6. 15
Hypecoon 4. 68

Hypociſtis 1. 128
Hyſſopum 3. 30.

I

Iaſpis 1.1. 5.160
Iberis 1. 180
Idæa radix 4. 144
Ilex 1. 145
Indicum 5. 107
Inguinalis 4. 120
Intybus 2. 150
Irio 2. 188
Iris 1. 1
Iſopyron 4. 121
Iudaicus lapis 5.155
Iuncus 4. 52
Iuncus odoratus 1. 16
Iuniperus 1. 104
Ius piſcium 2. 35
Ixia 6. 21.

L

Labrum Veneris 3. 13
Labruſca 5. 2
Lac 2. 75
Lac coagulatum 6.26
Lac humanum 2. 78
Lac muliebre 2. 78
Lactuca ſatiua 2. 165
Lactuca ſylueſtris 2.166
Ladanum 1. 129
Lagopus 4. 17
Lampſana 2. 142
Lana 2. 82
Lana cremata 2.83
Lanaria herba 2.193
Lappa 4. 138
Lapathum 2. 140
Laſer 3.94.
Laſerpitium 3. 94
Lathyris 4. 167
Lauer 2. 154
Laurus 1. 108
Laurus Alexandrina 4.147
Lauri baccæ 1. 90
Lemnia terra 5. 113
Lens 2. 29
Lens paluſtris 4. 88
Lentiſcus 1.90.
Lentiſcina reſina 1. 91
Leontopelaton 3. 110
Leonum pinguia 2. 90
Leontopodion 4. 133.110
Lepidium 2. 205
Leptocarya 1. 142
Lepus marinus 2.20. 6. 30
Lepus terreſtris 2. 21
Leucacantha 3. 22.
Leucanthemon 3.131
Leucas 3. 113
Leucoion 3. 138
Lichen 4. 53
Lignorum marcor 1. 113
Liguſticum 3. 58
Liguſtrum 1. 25
Lilium 3. 116
Lilium ſylueſtre 3. 137
Limonion 4. 16
Lingua bubula 4. 128
Linozoſtis 4. 169
Linum 2. 125
Lithocolla 5. 164

Locuſtę

Lithoſpermon 3. 158
Lolium 2. 122
Lonchitis 3. 161.162
Lora 5. 13
Lotus arbor 1. 172
Lotus Ægyptia 4. 114
Lotus ſylueſtris 4. 112
Lotus vrbana 4. 111
Lupinus 2. 132
Lupinus ſylueſtris 2. 133
Lychnis coronaria 3. 14
Lychnis ſylueſtris 3. 15
Lycium 1. 133
Lycopſis 4. 26
Lygos 1. 116
Lyncis vrina 2. 110
Lyſimachia 4. 3

M

Macer 1. 111
Mænæ 2. 31
Magnes 5. 148
Malabathrum 1. 11
Malicorium 1. 154
Malua 2. 144
Malum 1. 160
Malum Armeniacum 1. 166
Malum cotoneum 1. 161
Malum dulce 1. 131
Malum Epiroticum 1. 131
Malum Medicum 1. 131
Malum orbiculatum 1. 131
Malum Perſicum 1. 131
Malum præcox 1. 131
Malum punicum 1. 152
Malum ſylueſtre. 1. 164
Mandragora 4. 76 6. 16
Manna thuris 1. 72
Marcor lignorum 1. 96
Maron 3. 49
Marrubium 3. 110.119
Marrubium nigrum 3. 110
Maſtiche 1. 75
Meconium 6. 17
Medica mala 1. 177
Medion 4. 18
Medulla 1. 95
Mel Ponticum 2. 103
Mel 2. 101
Mel ſaccharum 2. 103
Mel Sardou. 2. 102
Mel heraclion 6. 8
Melampſithium 5. 69
Melanteria 5. 118
Malanthium 3. 93
Melia terra 5. 180
Melilotos 3. 48
Melimela 3. 162
Meliſſophyllon 3. 99
Melitites lapis 5. 156
Melomeli 5. 29
Memphites 5. 158
Mentha 3. 41
Mentaſtrum 3. 42
Meon 1. 3
Mercurialis 4. 191
Meſpilus 1. 170. 171
Milium. 2. 119
Millefolium 4. 115
Millepedæ 2. 33
Miſy 5. 117

Mituli 2.7
Moly 3. 54
Molybdæna 5. 100
Molybdoides lapis 5. 98
Morochthus 5. 152
Morus 1. 181
Mullus 2. 24
Mulſum 5. 16
Muria 5. 128
Mures 2. 74
Muris auricula 2. 175
Murus araneus 2. 73
Muris aranei ictus notæ eius curatio 7.9.87.
Muſcus 1. 20
Muſcus Marinus 4. 99
Muſtela 2. 27
Myagron 4. 117
Myoſotis 2. 175
Myrica 1. 117
Myrrha 1. 78
Myrrha Bœotica 1. 179
Myrrhis 4. 116
Myrtydanum 1. 157
Myrtus ſatiua 1. 156
Myrtus ſylueſtris 4. 129.

N

Naphtha 1. 102
Napus 2. 136
Narcaphthon 1. 22
Narciſſus 4. 161
Nardi genera 1. 6
Nardum Celticum 1. 7
Nardum montanum 1. 8
Nardinum vnguentum. 1. 74
Naſturtiũ.
Naſturtium 2. 185
Natricis ictus notæ eius curatio 7. 15. 8. 12
Nepeta 3. 34
Nitrum 5. 130
Nitri ſpuma 5. 131
Nux auellana 1. 180
Nux iuglans 1. 179
Nux pinea 1. 74
Nymphæa 3. 148. 149.

O

Ochra 5. 107
Oeimaſtrum 4. 28
Oenanthe 3. 135. 5. 5
Oeſypum 2. 8
Olea 1. 139
Olea ſylueſtris 1. 138
Oleaſter 1. 130
Oleæ æthiopicæ lachryma. 1. 142
Olei vires 1. 27
Oleum amygdalinũ. 1. 139
Oleum balaninum 1. 40
Oleum candidum 1. 32
Oleum carynum 1. 42
Oleum cicinum 1. 38
Oleum gnicinum 1. 46
Oleum commune 1. 50
Oleũ è gnidio grano 1. 44
Oleum hyoſcyaminũ. 1. 35
Oleum laurinum 1. 50
Oleum lentiſcinum 1. 51
Oleum maſtichinum 1. 52.
Oleum melanthinum 1. 47
Oleum myrtheum 1. 49

Oleum

Oleũ oliuæ ſylueſt. 1. 131.141.
Oleum omphacinum 1. 67
Oleum picinum 1. 96
Oleum rhaphaninum 1. 46
Oleum ſeſaminum 1. 41
Oleum Sicyonium 1. 33
Oleum ſinapinum 1. 48
Omphacium 1. 29. 56
Omphacomelites 5. 31
Onagra 4. 118
Onitis 3. 33
Onobrychis 3. 170
Ononis 3. 18
Onoſma 3. 147
Onyx 7. 2
Ophioſcorodon 2. 144
Ophites lapis 5. 162
Opium 4. 55
Opobalſamum 1. 28
Opopanax 3. 46
Orbiculata mala 1. 131.
Oreoſelinon. 3. 77
Origanum 3. 32
Origanum ſylueſtre 3. 34
Ornithogalum 2. 174
Orobanche 2. 172
Oryza 2. 117
Oſtracites 5. 165
Oſyris 4. 143
Othonna 2. 213
Ouillum ſæuum 2. 88.

P

Pæonia 3. 157
Paliurus 1. 122
Palma 1. 149
Palma elate 1. 151
Palmæ Thebaicæ 1. 150
Panaces Æſclepij 3. 56
Panaces Chironium 3. 57
Panaces Herocleum 3. 55.
Pancration 2. 203
Panicum 2. 120
Papauer corniculatũ 4. 66. 6. 18.
Papauer erraticum 4. 64
Papauer ſatiuum 4. 64
Papauer ſpumeum 4. 67
Papyrus 1. 116
Pardorum pinguia 2. 90
Paronychia 4. 54
Parthenium 3. 15
Paſtinaca herba 3. 59
Paſtinaca marina 2. 22
Paſtinacæ marinæ ictus notæ eius curatio 7.8. 8.6
Peplis 4. 169
Peplos 4. 168
Pepo 2. 164
Periclymenon 4. 14
Perſea 1. 188
Perſica mala 1. 165
Perſonata 4. 107
Petaſites 4. 10
Petroſelinum 3. 77
Peucedanon 3. 92
Phalangium 3. 122
Phalangij morſus notæ eius curatio 7. 5. 8. 3
Phalaris 3. 159
Phaſioli 2. 130

Phœnix 4. 43
Phrygius lapis 5. 141
Phu 1. 10
Phycus marinus 4. 100
Phyllitis 3. 121
Phyllon 3. 142
Phyteuma 4. 130
Picea 1. 87
Pinguia 1. 90. 91
Pinorum erucæ 6. 2
Pinus 1. 87
Piper 2. 189
Piſſaſphaltos 1. 101.
Piſtacia 1. 178
Pityides 1. 88
Pityuſa 4. 166
Pix liquida 1. 95
Pix ſicca 1. 98
Plantago 2. 153
Platyphyllos 4. 165
Plumbago 5. 100
Plumbum elotum 5. 95
Plumbum vſtum 5. 96
Pnigitis terra 5. 177
Polemonia 4. 8
Polion. 3. 24
Polycnemon 3. 108
Polygala 4. 142
Polygonaron 4. 6
Polygonon 4. 4
Polypodion 4. 188
Pompholyx 5. 85
Populus alba 1. 110
Populus nigra 1. 114
Porrum capitatum 2. 179
Portulaca 2. 150
Potamogeton 4. 101
Poterion 3. 17
Propolis 2. 106
Prunus, pruna 1. 175
Pſeudobunion 4. 125
Pſoricon 5. 116
Pſyllion 4. 70. 6. 10
Ptarmica 2. 192
Pulegium 3. 36
Pumex 5. 125
Purpura 2. 4
Pycnocomon 4. 176
Pyrethrum 3. 86
Pyrites 5. 143
Pyrorum genera 1. 168.

Q

Quercus 1. 145
Quinque folium 4. 42

R

Radicula 2. 193
Radix 2. 137
Rana 2. 28
Rana paluſtris 6. 31
Ranunculum 2. 206
Rapum 2. 134
Recrementum argenti 5. 101
Reſinæ variæ 1. 93
Rha 3. 2
Rhamnus 1. 120
Rhaphanus 2. 137
Rhaphanus ſylueſtris 2. 138
Rhodia radix 4. 45
Rhododendron 4. 8
Rhus 1. 148

Ricinus 4. 164
Rosa 1. 131
Rosei pastilli 1. 132
Rosmarinus 3. 187
Rosmarinum coronarium. 3. 89.
Rubeta 6. 31
Rubia 3. 160
Rubigo ferri 5. 93
Rubrica fabrilis 5. 112
Rubrica Sinopica 5. 111
Rubus 4. 37
Rubus canis 1. 124
Rubus Idæus 4. 38
Rumex 2. 140
Ruscum 4. 146
Ruta 3. 52
Ruta sylvestris 3. 53

S

Sacra herba 4. 61
Sagapenum 3. 95
Sal 5. 126
Salis flos 5. 129
Salis spuma 5. 126
Salamandra 6. 4
Salix 1. 137
Saluia 3. 40
Sambucus 4. 174
Samia terra 5. 172
Samius lapis 5. 173
Sampsuchum 3. 47
Sandaracha 5. 122. 6. 29
Sanguinaria 4. 4
Sanguinaria fœmina 4. 5
Sanguis 2. 97
Sanguis tauri 6. 29
Sapphirus 5. 157
Sarcocolla 3. 99
Sardianæ glandes 1. 122
Sardonia 6. 14
Sarmentitius cinis 5. 135
Satureia 3. 45
Satyrion 3. 143
Satyrion erythrionio. 3. 144
Scammonia 4. 171
Scandix 2. 168
Schistum lac 2. 77
Schistos lapis 5. 145
Scilla 2. 202
Scolopendra 2. 16
Scolopendræ ictus notæ & eius curatio 7.6.8.4
Scordion 3. 125
Scorodoprasum 2. 185
Scoria ferri 5. 94
Scoria plumbi 5. 97
Scorpioides 4. 195
Scorpius marinus 2. 14
Scorpius terrestris 2. 13
Scorpij ictus notæ eius & curatio. 7. 7. 8. 5
Securidaca 3. 146
Sedum magnum 4. 89
Selenites lapis 5. 159
Selinusia terra 5. 175
Semperuiuum 4. 89. 91
Semperuiuum minus 4. 90
Senecta anguium 2. 19
Senecio 4. 97
Sepia 2. 23

Seps 2. 70
Seris 2. 160
Serpillum 3. 46
Sertula campana 3. 48
Serum lactis 2. 76
Sesama 2. 12
Sesamoides 4. 152. 153
Seseli 3. 60
Seseli Æthiopicum 3. 61
Seseli Creticum 3. 63
Seseli Peloponnense 3. 62
Sicyonium oleum 1. 35
Sideritis 4. 33. 34. 35
Sidion 1. 154
Siligo 2. 113
Siliquæ 1. 159
Silurus 2. 29
Silybum 4. 159
Sinapi 2. 184
Sion 2. 154
Siser 2. 139
Sison 3. 94
Sisymbrion vtrunque 2. 155. 156.
Smarides pisces 2. 30
Smilax 2. 176
Smilax aspera 4. 144
Smilax læuis 4. 145
Smyris lapis 5. 166
Smyrnion 3. 79
Solanum hortense 4. 71
Solanum manicum 4. 74
Solanum somniferum. 4 73
Soncus 2. 159
Sorba 1. 174
Sory 5. 119
Sparganion 4. 21
Spartion 4. 158
Spondylion 3. 90
Spina acuta 1. 12 3
Spina alba 3. 14
Spina Arabica 3. 15
Spongiæ 5. 138
Spongiarum lapides 5. 163
Spuma nitri 5. 131
Spuma salis 5. 126
Spuma argenti 5. 102
Squamma æris 5. 89
Squamma ex acie decussa. 5. 90
Stachys 3. 120
Stacte 1. 74
Staphis agria 4. 156
Stibium 5. 99
Stimni 5. 99
Stœbe 4. 12
Stœchas 3. 31
Stomoma 5. 90
Stratiotes 4. 102
Stratiotes millefolium 4. 103
Strigmenta balnearum. 1. 34
Strigmenta gymnasiorum. 1. 36.
Strigmenta palæstrica. 1. 35
Strobili 1. 84
Struthion 2. 193
Styrax 1. 80
Suillus adeps 2. 87
Suillus pulmo 2. 40
Sulphur 5. 124

Sycomorus 1. 182
Symphyton 4. 9. 10
T
Taxus 4. 80. 5. 12
Tauri sanguis 2. 6
Taurorum pinguia 2. 90
Telephion 2. 217
Tellinæ 2. 8
Terebinthus 1. 92
Terra 5. 170
Terra fornacum 5. 179
Testæ 5. 178
Testiculus canis 3. 141. 142
Teucrion, Teucris 3. 111
Thalassomeli 5. 20
Thalictron 4. 98
Thapsia 4. 157
Thlapsi 2. 186
Thracias lapis 5. 147
Thunnus 2. 33
Thus 1. 82
Thuris cortex 1. 83
Thuris fuligo 1. 105
Thuris manna 1. 84
Thyites lapis 5. 154
Thymelæa 4. 173
Thymoxalme 5. 24
Thymus 3. 44
Tilia 1. 126
Tithymali 4. 165
Torpedo piscis 2. 17
Toxicon 6. 20
Tragacantha 3. 23
Tragium 4. 49. 50
Tragoriganum 3. 35
Tragos 2. 115. 4. 51
Tribubus 4. 15
Trichomanes 4. 137
Triphyllon 3. 123
Tripollium 4. 135
Trissago 3. 112
Triticum 2. 107
Tuber 2. 375
Tussilago 3. 126
Typha 3. 133
V
Venenata 7. 2
Veneris vmbilicus 4. 92. 93
Veratrum album 4. 150
Veratrum nigrum 4. 11
Verbascum 4. 104
Verbenaca 4. 60
Vermes terreni 2. 72.
Vesparum ictus curatio 8. 2
Vini natura 5. 7. 9. 10. 11.
Vinum absinthites 5. 49
Vinum acorites 5. 73
Vinum adynamon 5. 13
Vinum album 5. 8
Vinum anethinum 5. 75
Vinum apiites 5. 32. 74
Vinum aromatites 5. 64
Vinum asarites 5. 68
Vinum è betonica 5. 54
Vinum bunites 5. 56
Vinum calaminthites 5. 52
Vinum catorchites 5. 41
Vinum cedrinum 5. 45
Vinum cedrites 5. 47
Vinum cestrites 5. 53

Vinum chamædrytes 5.51
Vinum è chamælæa 5.79
Vinum chamæpityinũ 5.80
Vinum è conyza 5.63
Vinum cydonites 5.28
Vinum daucites 5.70
Vinum dictamnites 5.57
Vinum ex fœniculo 5.75
Vinum è flore ſalis 5.76
Vinum helleborites 5.82
Vinum hyſſopites 5.50
Vinum ex iride 5.65
Vinum iuniperinum 5.46
Vinum lentiſcinum 5.38
Vinum mandragorites 5.81
Vinum marathrites 5.75
Vinum marinum 5.27
Vinum è marrubio 5.55
Vinum melites 5.51
Vinum melitites 5.15
Vinum melomeli 5.29
Vinum è myrrha 5.65
Vinum myrſinites 5.37
Vinum myrtites 5.36
Vinum è nardo ſylueſtri 5.69
Vinum nectarites 5.66
Vinum œnanthinum 5.33
Vinum omphacites 5.12
Vinum originites 5.61
Vinum palmeum 5.40
Vinum panacites 5.72
Vinum phthorion 5.77
Vinum picatum 5.48
Vinum pineum 5.65
Vinum è pipere 5.65
Vinum reſinatum 5.63
Vinum rhodites 5.35
Vinum rhœtes 5.34
Vinum ſaluiatum 5.71
Vinum è ſatureia 5.60
Vinum ſcammonites 5.83
Vinum ſcillinum 5.26
Vinum ſtœchadites 5.52
Vinum ſtrobilites 5.44
Vinum è ſycomoris 5.42
Vinum è Syriaca nardo, Celtica, malabathro 5.67
Vinum terebinthinum 5.39
Vinum thymites 5.59
Vinum è thymelæa 5.78
Vinum tragoriganites 5.55
Viola alba 3.138
Viola purpurea 4.122
Viperæ ictus notæ & eius curatio 7.10, 8.8
Viperinæ carnes 2.18
Virulentorum ictuum curatio 8.1
Viſcum 3.103, 8.1.
Vitex 1.136
Vitis alba 4.184
Vitis nigra 4.185
Vitis ſylueſtris 4.183
Vitis vinifera 5.1
Vlmus 1.112
Vmbilicus veneris 4.92.93
Vnguentorum ratio 5.3
Vng. abrotoninum 1.61
Vng. amaracinum 1.69
Vng. anethinum 1.62

Vng. cinnamominum	1.75	Vng. ſampſuchinum	1.59
Vng. crocinum	1.65	Vng. ſuſinum	1.63
Vng. cyprinum	1.66	Vng. telinum	1.58
Vng. elatinum	1.55	Vnguis odoratus	2.10
Vng. gleucinum	1.68	Vrina	2.99
Vng. hedychroon	1.71	Vrſinus adeps	2.87
Vng. irinum	1.67	Vrtica	4.94
Vng. malabathrinum	1.77	Vua	5.3
Vng. megalinum	1.70	Vua paſſa	5.4
Vng. melinum	1.56	Vulpinus pulmo	2.41
Vng mendeſium	1.73	X	
Vng. metopion	1.72	Xanthion	4.138
Vng. narciſsinum	1.64	Xyris	4.22
Vng. nardinum	1.76	Z	
Vng. ociminum	1.60	Zea, ſeu ſemen	2.111
Vng. œnanthinum	1.57	Zopiſſa	1.99
Vng. roſaceum	1.54	Zytum	2.109

INDICIS FINIS.

Franciscus Fontanonus Monspessulensis
φιλιάτρους. S. P. D.

MAGNA profectò habenda gratia, & benè præcandum his hominibus est, qui operam, studium, cogitationes deniq; omnes eò conferunt, vt veteres scriptores enarrent. Ab his enim non minus beneficiũ accepimus, quàm si ὥσπερ νεκρο μαντίᾳ τινὶ eos nobis excitarent, à quibus ad omnem humanitatem informaremur: cum nihil aliud sit audire eum, qui Hippocratis, Platonis, Aristotelis, & Galeni scripta ita enarret, vt mentis eorum sensum aperiat, quàm eos loquentes adhuc audire: quod Iac. Syluiũ Lutetiæ professoré Regium, Ioan. Schironium, Anto. Saportam, Guill. Rondelletium, Petr. Guichardum Monspess. medicos eximios facere quotidie experimur. Quibus Iacobũ Goupylum annumerandũ putamus, qui Socratis illud apud Xenophontem probè tenens τὸ μὲ ἐργάτην εἶναι, ὠφελίμου τε ἀνθρώπῳ καὶ ἀγαθὸν εἶναι· τὸ δὲ ἀργὸν, βλαβερόν τε καὶ κακόν, præterquam quòd bonos auctores nobis interpretatur, diligẽtissimè etiam conquisitis vetustis exemplaribus, eorũ scripta magna fide ita emẽdat, vt in eis tutò versari possimus. Cuius rei fidé facit Dioscorides, ita ab eo suo nitori restitutus, vt de alio nõ melius, quę ad materiam medicam pertinent, discere possimus. Itaque hos bonos, & doctos viros amemus, colamus, & obseruemus: atque tandem non opinione, sed firma persuasione imbuamur, vt ab iis pendeamus, qui vetustate quandam auctoritatem præ se ferunt, & certa scribẽdi ratione rectissimè nos informant. Dioscoridem igitur verissimum fidelissimumque plantarum descriptorem, tam bene castigatum, pulchréq; expressum diligẽter legamus, eiúsque perdoctum explanatorem benevolè attentéque audiamus. Bene Valete. Ex Lutetia Parisiorum ad III. Cal. Augusti.

ΠΕΔΑ- PEDANII

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

DIOSCORIDIS Anazarbei de medicinali materia libri primi præfatio,

Io. Ruellio Sueßionẽſi interprete.

ΠΟΛΛΩΝ ἐμοῦ μόνου ἀρχαίων, ἀλλὰ καὶ νέων συνταξαμένων περὶ τῆς τῶν φαρμάκων συνθέσεώς τε καὶ δυνάμεως, ἣν δοκιμασίας φίλτατε Ἀρειπερέσομαί σοι παρασχεῖν μὴ κενὴν, μὴ δὲ ἄλογον ὁρμὴν ἐγχειρεῖν περὶ τούτου τῷ πραγματείαν. διὰ τὸ τῶν μὲν αὐτῶν, μὴ τετελειωκέναι, τῶν δὲ ἐξ ἰσοτείας τὰ πλεῖστα ἀνηρῆσθαι. Ἰόλας μὲν γὰρ ὁ Βιθυνὸς καὶ Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος, ἐπ' ὀλίγον ἥψαντο τῆς αὐτῆς πραγματείας. τῷ βοτανικῷ παντελῶς ἐάσαντες περισθσαι. οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν μεταλλικῶν, ἀρωμάτων πάντες ἐμνημόνευσαν.* Κρατεύας δὲ ῥιζοτόμος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἰατρὸς, οὗτοι γὰρ δοκοῦσιν ἀκριβέστερον τῶν λοιπῶν περὶ τοῦτο τὸ μέρος ἀνεγράψθαι, πολλὰς ῥίζας εὐχρηστοτάτας, καί τινας βοτάνας ἀπαραδειγμάτους εἴασαν. πλὴν τοῖς μὴ ἀρχαίοις μαρτυρητέον μετὰ τῆς

QVanquã amiciſsime Aree, complures nõ veterũ modò, ſed recẽtiorũ quoq;, de medicamẽtorũ cõpoſitione, viribꝰ atq; probatione cõmẽtati ſunt: nobis tũ nec vanũ, nec à ratiõe abhorrẽtẽ impetũ animi ad hoc opꝰ inceſsiſſe, tibi oſtẽdere tẽtabimꝰ: ꝙ eorũ nõnulli abſolutũ nihil ẽdiderũt, alij q̃ plurima, q̃ auditu percũctãdo didicerãt, ſcriptis tradiderũt. Siqdẽ Bithinꝰ Iolas & Heraclides Tarentinus, omiſſa prſus herbarũ tractatiõe, rẽ ſanè q̃ paucis perſtrixerũt. Neq; verò oẽs illi de metallicis quicq̃ rebꝰ aut odoramẽtis memoriæ prodiderũt. Crateuas autẽ herbariꝰ, & Andreas medicꝰ, q̃ cæteris diligẽtius hac in parte verſati vidẽtur, radices multas apprimè vtileis, herbaſq; haudquaquã adnotatas, reliquerũt. Veruntamen priſcorũ ſubſcribere oportet ſentẽtiis: quos etſi a pauca

pauca ipsis referátur accepta, magná tamé impédisse diligentiá cóstat. Iunioribus minus assentiendú: è qbus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius, Niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, medicinalé materiá vernaculá cognitáq; vulgò, digná césuerút quę ab ipsis literis exactè mádarent: & vt medicamétorú vires ꝓbationésq; cursim cóplexi, sic nullo experimento corú effectus colligétes, inani verò reddédarú causarú studio verba fundétes, alia ꝓ aliis scriptitádo, ré in aceruú cógeriéq; cótrouersiarú extulerút. Siquidé qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbiú, nascétis in Italia, chamelææ succú esse cótédit: androsæmónq; eandé herbá cú hyperico esse. quin etiá aloën in Iudæa fossilé nasci, & pleraq; his similia exponit, reclamáte euidétia, q̃ prorsus veritati refragãt. Quibus cóiectura colligi potest, ea nó oculata fide sed narratióe potiꝰ ab aliis accepisse. In ordine iidé ipsi aberrarút, partí eorú discrepáteis nulláq; cognatione cóiúctas vireis collidétes: partí ꝑ eleméta literarú scripta ĩ ordiné digerétes, quò faciliꝰ memorię mádarétur, genera & eorú effectus

τῆς ὀλιγότητος τῶν παραδοθέντων, καὶ τὴν ἀκρίβειαν προσπαραλαβοῦσι. τοῖς μέντοι νέοις οὐ συγκαταθετέον, ὧν ἐστι Βάσσος ὁ ἰυλαῖος, καὶ Νικήρατος, καὶ Πετρόνιος, Νίγερ, καὶ Διόδοτος, ἀσκληπιάδαι πάντες. οἱ τὴν μὲν πᾶσι σύμφυλλον καὶ γνώριμον ὕλην, ἠξίωσαν ἐπὶ ποσὸν ἀναγραφῆς ἀκριβοῦς· τὰς δὲ τῶν φαρμάκων δυνάμεις καὶ δοκιμασίας ἐξ ἐπιδρομῆς παρέδοσαν, οὐ τῇ πείρᾳ τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν κανονίζοντες. τῇ δὲ τῆς αἰτίας κενοφωνίᾳ, εἰς * ὄγκον διαφορὰς ἑκάστου αὐτῶν ἀναφέροντες μετὰ τοῦ καὶ ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων ἀναγράφειν. ὁ γοῦν διαφέρειν δοκῶν εἶναι ἐν αὐτοῖς Νίγερ, τὸ εὐφόρβιον φησὶν ὀπὸν εἶναι χαμελαίας, γινομένης ἐν ἰταλίᾳ. καὶ τὸ ἀνδρόσαιμον, ταυτὸν ὑπάρχειν ὑπερικῷ, ἀλόην δὲ ὀρυκτὴν ἐν ἰουδαίᾳ γίνεσθαι. καὶ ἄλλα τούτοις ὅμοια πλεῖστα παρὰ τὴν ἀλήθειαν ἐκτίθεται ψευδῶς. ἅπερ ἐστὶ τεκμήρια οὐκ αὐτοψίας, ἀλλὰ τῆς ἐκ παρακουσμάτων ἱστορίας. ἥμαρτον δὲ καὶ περὶ τὴν τάξιν. οἱ μὲν ἀσυμφύλλους δυνάμεις συγκρούσαντες, οἱ δὲ κατὰ στοιχεῖα * ἀναγράψαντες. διέζευξαν * τὰς ὁμογενεῖς, τά τε γένη καὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν,

τῶν, ὡς διὰ τοῦτο συμπέμπουσα γίνεσθαι. ἡμεῖς δ' * ὡς ἐστιν εἰπεῖν ἐκ προφάσεως ἡλικίας, ἄλλην τινὰ ἔχοντες ἐπιθυμίαν περὶ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ὕλης, καὶ πολλῷ γ' ὡς ἐπιλήθοντες. εἶδα γὰρ ἡμῖν πραπωτικὸν τὸν βίον, συναγωνώχαμεν τὴν πραγματείαν ἐν ἓξ βιβλίοις σῶ προηγεφαμένῳ, ὧ καὶ τὴν σύνταξιν ἀνατεθείκαμεν, εὐχάριστον ἐκπληροῦντες πάθος. διὰ ταῦτ' ἔχεις πρὸς ἡμᾶς διάθεσιν, φύσει μὲν πρὸς πάντας τοὺς ἀπὸ παιδείας ἀναμεμιγμένους οἰκείως, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς ὁμοτέχνους, ἰδιαίτερον δ' πρὸς ἡμᾶς, δεῖγμα δὲ ἀσμικρὸν σὺ ἐν σοὶ καταλαλιάς, καὶ ἡ τοῦ κρατίστου Λικινίου Βάσσου πρὸς σὲ διάθεσις, ἣν ἔγνωμεν συνδιάγοντες ὑμῖν, ἀξιοζήλωτον τὸ παρ' ἀμφοτέρων ὑμῶν πρὸς ἀλλήλους εὔνοιαν ὁρῶντες, παρακαλοῦμεν δέ σε καὶ τοὺς ἐντυγχανομένους τοῖς ὑπομνήμασι, μὴ τὴν ἐν λόγοις ἡμῶν δύναμιν σκοπεῖν, ἀλλὰ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι μετ' ἐμπειρίας ἐπιμέλειαν. μετὰ γὰρ πλείστης ἀκριβείας τὰ μὲν πλεῖστα δι' αὐτοψίας γνόντες, τὰ δὲ ἐξ ἰσοτείας συμφώνου τοῖς πᾶσι καὶ ἀνυποκρίτου τῶν παρ' ἑκάστοις ἐπιχωρίων ἀκριβώσαντες, πειρασόμεθα καὶ τῇ τάξει διαφόρως χρήσασθαι, καὶ τὰ ἡμῖν καὶ παρ' ἑκάστου αὐτῶν ἀναγρά-

effectꝰ à ſua cognitiõe diſiũgẽtes. Nos verò ab ĩeũte, vt ita dicã, ĩuẽta. iugi deſiderio cognoſcẽdæ materiæ allecti, ꝓmultis regiõibꝰ peragratis (nec. n. neſcis nos militarẽ vitã exegiſſe) tuo hortatu cõmẽtationẽ ĩ ſex libros cõtulimus. quod opꝰ tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obſequẽtes, ob eũ quo nos ꝓſequeris affectũ. Etenim naturã cũ in omneis eruditione excultos, tũ verò in eos qbꝰ cũ tibi eiuſdẽ artis neceſsitudo ĩtercedit, ꝓnꝰ ad amiticiã eẽ ſoles: in nos etiã aliquãto peculiariꝰ. Enimuerò nõ paruũ ꝓbet tuæ ꝓbitatis argumẽtũ, optimi viri Licinij Baſsi ſingularis erga te amicitia: quã vnà nobiſcũ degẽtes nouimus, cũ mutuã ĩter vos bñuolẽtiã ęmulatiõe dignã intueremur. Admonitũ aũt te velim, eóſq; qui in hoſce cõmẽtarios incidẽt, ne ĩ verbis facultatẽ noſtrã æſtimetis, ſed potius adhibitã rebꝰ cũ peritia curã. Etenĩ prurima viſu ipſi exactiſſimè cognouimꝰ: quędã etiã ex ea, de qua ĩter oẽs cõuenit, hiſtoria ꝓcũctatiõéq; rerũ apud ſingulos vernacularũ diligẽter accepimꝰ. Dabimus igiť operã, vt differẽti ab aliũ ſordine tradito, genera medicinarũ vitéſq;

describãt. Quòd aũt necessaria sit medicamẽtorũ ratio nemo est fermè q ignoret, q ea & toti arti cõiũcta sit, vniuersisq; eius partib⁹ efficax administret auxiliũ. Quare per medicamẽtorũ cõpositiones atq; misturas, & facta in morbis pericula extẽdi, & incremẽtũ capescere potest, q̃ plurimũ conferẽte singulorũ medicaminũ cognitiõe. Quinetiã vernaculã familiarẽq; materiã cõplectemur, vt pfecta sit quę à nobis relinquet doctrina. Verũ imprimis curã impẽdere oportet, vt suis tẽporib⁹ singula & demetãtur & recõdãtur. certè p horũ ratione aut valẽt virib⁹, aut euanido nullóq; munere fũgũtur. Serena igitur cœli cõstitutiõe demetẽda sũt. Magni siqdẽ refert ĩter colligẽdũ, si vel squalores vel ĩbres infesti sint: quẽadmodũ si loca, in qb⁹ prodeũt, cliuosa, & vẽtis exposita sint & pflata, frigidáq; & aquis carẽtia: in his. n. locis vires eorũ lõgè validiores intelligũtur. Cõtrà, quæ in cãpestribus, riguis, & opacis, cæterisq; locis à vẽto silẽtibus enascũtur, plerũq; degenerãt, & min⁹ virib. valẽt, multóq; magis, si nõ suo tẽpore nec opportunè colligantur, [illegible] aut

γράψασθαι. Ὅτι γε μὴν ἀναγκαῖος ὑπάρχει ὁ περὶ φαρμάκων λόγος, παντί που δῆλον, συνεζευγμένος ὅλῃ τῇ τέχνῃ, καὶ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ συμμαχίαν ἀήττητον παντὶ μέρει παρεχόμενος. καὶ διότι δύναται αὔξεσθαι κατά τε τὰς σκευασίας καὶ τὰς μίξεις καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν παθῶν πειρασμοὺς, πλεῖστα συμβαλλομένης τῆς περὶ ἕκαστον τῶν φαρμάκων γνώσεως. προσαναγραψόμεθα δὲ καὶ τὴν συνήθη καὶ σύμφυλλον ὕλην, ἵνα ἡ γραφὴ γένηται τελεία. πρὸ πάντων οὖν φροντίζειν τῆς ἀποθέσεως καὶ συλλογῆς ἑκάστου κατὰ τοὺς οἰκείους καιροὺς προσήκει. παρὰ γὰρ δὴ τούτους ἢ ἐνεργεῖ, ἢ ἐξίτηλα γίνεται τὰ φάρμακα. αἰθρίου γὰρ ὄντος τοῦ καταστήματος συλλέγειν δεῖ. μεγάλη γὰρ * κἂν τούτῳ ὑπάρχει διαφορὰ, * τῶν αὐχμῶν ἢ ὄμβρων γενομένων τὴν συλλογὴν ποιεῖσθαι. ὥς περ καὶ τὸ ὀρεινοὺς καὶ ὑψηλοὺς καὶ διαπνεομένους καὶ ψυχροὺς καὶ ἀνύδρους εἶναι τοὺς τόπους· ἰσχυρότεραι γάρ εἰσιν αἱ δυνάμεις αὐτῶν, αἱ δὲ ἐν πεδινοῖς καὶ καθύγροις καὶ κατασκίοις καὶ μὴ διαπνεομένοις, ἀτονώτεραι κατὰ τὸ πλεῖστον, καὶ μᾶλλον εἰ μὴ καθ᾽ ὥραν εὐκαίρως συλλεγεῖσαι, ἢ δι'

δι' ἀσθένειαν ἐφθινήκωσι. καὶ ἀγνοητέον μέντοι ὅτι πολλάκις, ταῦτα παρὰ τὴν ἰδιότητα τῆς χώρας, καὶ παρὰ τὴν σύγκρασιν τοῦ ἔτους, τάχιον ἢ βράδιον ἀκμάζει. ἔνια δὲ καὶ παρὰ τὴν ἑαυτῶν ἰδιότητα, ἐν χειμῶνι ἀνθεῖ τε καὶ φύλλα φέρει· τινὰ δὲ καὶ δὶς τοῦ ἔτους ἀνθοφορεῖ. τὸν δὲ βουλόμενον ἐν τούτοις ἐμπειρίαν ἔχειν, δεῖ κατά γε τὴν ἀρτιφυῆ βλάστησιν ἐκ τῆς γῆς, ἀκμάζουσι καὶ παρακμάζουσι παρατυγχάνειν. οὔτε γὰρ ὁ τῇ βλάστῃ ἐντετυχηκὼς μόνον, δύναται τὸ ἀκμάζον γνωρίσαι, οὔτε ὁ ἑωρακὼς τὰ ἀκμάζοντα, τὸ ἀρτιφυὲς ἐπιγνῶναι. παρὰ γὰρ τοὺς μετασχηματισμοὺς τῶν φύλλων, καὶ τὰ μεγέθη τῶν καυλῶν καὶ ἀνθῶν καὶ καρπῶν, καί τινας ἄλλας ἰδιότητας, μεγάλη πλάνη γίνεται ἐπ' ἐνίοις τοῖς μὴ οὕτω τὴν θέαν πεποιημένοις. παρὰ ταύτην γοῦν τὴν αἰτίαν, τινὲς τῶν ἀναγραψάντων ἐπλανήθησαν, εἰπόντες τινὰ μήτε ἄνθη μήτε καυλὸν μήτε καρπὸν φέρειν. καθάπερ ἐπὶ τῆς ἀγρώστεως καὶ βηχίου καὶ πενταφύλλου. ὁ δὲ πολλάκις* ἐντετυχηκὼς αὐτοῖς καὶ ἐν πολλοῖς τόποις μάλιστα τὴν ἐπίγνωσιν ποιήσεται. χρὴ μέντοι εἰδέναι ὅτι μόνα τῶν βοτανικῶν φαρμάκων ἐπὶ πολλὰ ἔτη διαμένει, οἷον ἐλλέβορος ὁ λευκὸς καὶ μέλας, τὰ δὲ λοιπὰ μέχρι τριετίας ἐπιτοπλεῖστον εἰσὶν * εὔχρηστα.

*ἃ μὲν

aut ſi per imbecillitatem intabuerint. Neq; ignorandum, ſæpe pro peculiari loci natura, aut anni clemẽtia, maturiꝰ aut ſeriꝰ adoleſcere. Nõnulla propria vi, hyeme florent & folia pariũt: quędã bis anno florifera. Quare cui in animo eſt horũ peritiã aſſeq̃, neceſſe eſt eũ prima germinatiõe ſolo emergentibus, adultis & ſeneſcentibꝰ adeſſe. Nã qui pullulãti herbę dũtaxat adſtiterit, adultã cognoſcere nõ poteſt, neque qui adultã tantũ inſpexerit, nuper erũpentẽ noſcet. Quo fit, vt ꝓpter mutatã foliorũ faciẽ, cauliũ proceritates, florũ ſeminiſq; magnitudinẽ, & id genus alias peculiares notas, nõnulli q̃ olĩ has rerũ varietates nõ ꝑſpexerũt, magno in errore verſẽtur. Quæ cauſa etiã nonnullis ſcriptoribꝰ ĩpoſuit, q̃ herbas quaſdã, verbi gratia, gramẽ, q̃nquefolium, & tuſſilaginẽ emittere florẽ, fructũ & caulẽ, negãt. Ergo qui ſæpius ad viſendas herbas & earũ natales ſe contulerit, earũ cognitionẽ maximè cõſequet̃. Scire etiamnũ cõuenit, ſola ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum, inquã, & cãdidũ multis edurare annis: reliqua à trimatu ĩutilia.

Quę vero fruticosa sunt, sicut stœchas, trixago, poliũ, abrotonũ, seriphũ, absinthiũ, hyssopũ, & alia id gen⁹, semine pręgnãtia demetãt. flores quoq; antea, q̃ spõte sua decidãt. fruct⁹ aũt, vt maturi decerpãt necesse est: & semina, vbi siccari cœperit, priusq̃ defluãt. Herbarũ succus & foliorũ elici debet, germinãtib⁹ tũ primũ cauliculis. Lac & lachrymæ excipiãtur, ĩciso per summũ adolescẽtię vigorũ caule. Radices, & liquamẽta, corticésve vt recõdant, eximere cõuenit cũ herbę suis foliis exuũtur. Siccãtur etiã expurgatę ini bi, locis asperginé nõ redolẽtib⁹: sed quę luto aut puluere sũt obsitæ, aqua elui debẽt. Flores & omnia quæ iucundũ odoré efflãt, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponãtur. Nõnunq̃ charta aut foliis semina, vt perennẽt, aptè iuuoluũtur. Liquidis medicaminibus désior materia, argentea, vitrea, aut cornea cõuenit. Fictilis etiã, si modò rara nõ sit, accõmodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ęnea vasa ocularis medicamẽtis liquidísq;, & oĩb⁹ iis quę aceto, pice liq̃da, aut cedria cõponũtur. Adipé autẽ & medullas stagneis vasis recõdi cõuenit.

Iris.

*ἃ μὲν οὖν εὐώδη ἐστὶ, στοιχάς, χαμαίδρυς, πόλιον, ἀβρότονον, σέριφον, ἀψίνθιον, ὕσσωπον, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, συλλέγειν δεῖ, ἐγκύμονα τῶν σπερμάτων. ἄνθη δὲ πρὸ τῆς ἀποπτώσεως αὐτῶν. τοὺς δὲ καρποὺς πεπείρους ὄντας, καὶ τὰ σπέρματα δὲ ἀρχόμενα ξηραίνεσθαι πρὸ τοῦ ἀποῤῥεῖν, χυλίζειν δὲ καὶ τὰς βοτάνας, ἀρτιβλάστων ὄντων τῶν καυλῶν, ὁμοίως καὶ τὰ φύλλα, ὀποὺς δὲ καὶ δάκρυα λαμβάνειν, τέμνοντας ἐν ἀκμῇ, *ἔτι τοὺς καυλούς, τὰς δὲ εἰς ἀπόθεσιν ῥίζας καὶ χυλίσματα καὶ φλοιοὺς ἀφαιρεῖν ἀρχομένων φυλλοῤῥοεῖν τῶν βοτανῶν, καὶ τὰς μὲν καθαρὰς αὐτόθι ξηραίνειν ἐν τόποις ἀνοτίστοις, τὰς δὲ κατεχούσας γῆς ἢ πηλοῦ, πλύνειν ὕδατι. ἀποτίθεσθαι δὲ καὶ ἄνθη, καὶ ὅσα εὐώδη τυγχάνει ἐν κιβωτίοις φιλλυρίνοις ἀνοτίστοις, ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐν χάρταις ἢ φύλλοις χρησίμως δεῖται πρὸς διαμονὴν τῶν σπερμάτων, πρὸς δὲ τὰ ὑγρὰ φάρμακα ἁρμόσει ὕλη πᾶσα ἢ πυκνὴ ἐξ ἀργύρου ἢ ὑέλου ἢ κεράτων γεγενημένη, καὶ ὀστρακίνη δὲ ἡ μὴ ἀραιὰ εὔθετος. *ξυλίνων δὲ ὅσα ἐκ πύξου κατασκευάζεται· τὰ δὲ χαλκᾶ ἀγγεῖα, ἁρμόσει πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ *φάρμακα καὶ ὑγρὰ, καὶ ὅσα δι᾽ ὄξους ἢ πίσσης ὑγρᾶς ἢ κεδρίας κατασκευάζεται. στέατα δὲ καὶ μυελοὺς, ἐν κασσιτερίνοις ἀγγείοις ἀποτίθεσθαι δεῖ.

Περὶ

Περὶ Ἰριδος. Κεφ. α.

Ρις ἀπὸ μὲν τῆς κατ' ἐφανὴν ἐμφερείας ὠνόμασται, φύλλα δὲ φέρει ἐμοια ξιφίῳ, μείζονα δὲ καὶ πλατύτερα καὶ λιπαρώτερα. ἄνθη δὲ ἐπὶ καυλῷ παρήλληλα, ἐπικαμπῆ, ποικίλα· ἢ γὰρ λευκὰ ἢ ὠχρὰ ἢ μέλινα ἢ πορφυρᾶ ἢ κυανίζοντα ὁρᾶται· ὅθεν διὰ τὴν ποικιλίαν ἀπεικάζεται Ἰριδι τῇ οὐρανίᾳ. ῥίζαι ὑπάρχουσι γενατώδεις, στερεαὶ, εὐώδεις, ἃς δεῖ μετὰ τὸν τομὴν ξηράναντα ἐν σκιᾷ καὶ διείραντα λινῷ, ἀποτίθεσθαι. ἔστι δὲ βελτίων ἡ Ἰλλυρικὴ καὶ ἡ μακεδονικὴ καὶ ἐν πᾶσιν ἀείσιν ἡ πυκνόῤῥιζος, καὶ ὑποκόλοβος, καὶ σύνθεσις, καὶ τῇ χρόᾳ ὑποχώῤῥους, καὶ σφόδρα εὐώδης καὶ τῇ γεύσει πυρωτέρα. πίνεται δὲ ὁμοίως εἰλικρινὴς, καὶ μὴ νοσοῦσα. πάρεισί τε ἐν τῷ κόπτεσθαι κινοῦσα.* ἡ λευκὴ δὲ λευκὴ κατὰ χρόαν, πικρὰ θερὸς γεῦσιν δευτερεύουσα τῇ δυνάμει, παλαιοῦσθαι δ' περιδονίζονται. εὐωδέστερα μὲν τοι τότε γίνονται. δύναται δ' ἔχοντα πᾶσα θερμαντικῶν, λεπτυντικὴν ἁρμόζουσαν θερὸς ἕξαιρεῖν, καὶ τὰ δυσαπόπτωτα ὑγρὰ λεπτοποιοῦσα. καθαίρουσι δὲ* χολὰς πιπτζόμεναι μεθ' ὑδρομέλιτος, ὀλκῆς ≺ ζ'. εἰσὶ δ' καὶ ὑπνοποιοί, καὶ δακρυοποιοί.

Iris. Cap. I.

Ris à cœlestis arcus similitudine nomẽ accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores in caule æqualib⁹ inter se spatijs distant, incurui, varij: siquidẽ cãdidi, pallẽtes, lutei, purpurei, aut cœrulei cõspiciũtur: qua diuersi coloris specie quædã cœlestis arcus imago representari videtur. Radices subiacẽt geniculatę, duræ, odoratæ, quæ frustatim dissectæ, in vmbra siccantur, & traiectæ lino recondũtur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ pumila ferè & densa cõstat radice, frangenti cõtumax, subrufo colore, gustu amaro, odore pquã syncero, ita vt nullũ prorsus sitũ redoleat: quæ dum tũditur sternutamẽta mouet. Secundum locum habet Africana, candicans, gustúq; amara. Teredines in vetustate sentiũt, tũc tamẽ odoratiores reddi solẽt. Vis omnib⁹ excalfactoria, extenuãs, cõtra tussim efficax: humorũ q ægrè reijciunt crassitiem digerũt, bilé crassámque pituitam ex hydromelite drachmis septem epotę purgãt, somnũ cõciliãt, lachrymas ciunt

 termini

torminibus medentur. Eædem potæ ex aceto auxiliãtur serpentiũ ictibꝰ, lienosis, cõuulsis, ꝑfrictionibus, horroribꝰ, & q̄bus genitura effluit: menses ex vino potæ pellũt. Decoctũ earũ, fœminarum fotibus vtiliter imponit̄, ad emolliẽdos locos, laxandáq; in eis venarũ spiracula, ischiadicis infundit̄, fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glãdis modò subditæ, partꝰ extrahũt: quietiã coctæ & illitę, strumas, veterésq; duritias emolliũt. Siccæ quoq; vlcera replẽt, & cũ melle purgãt: nudata ossa corpore operiũt: doloribꝰ capitis, cũ aceto & rosaceo magna vtilitate illinunt̄. Admotæ cũ albo veratro & duabꝰ mellis partibꝰ, lẽtigines & vitia cutis in facie à sole cõtracta emaculat: pessis, malagmatis, & acopis inserũtur. In vniuersum, magni ad oĩa vsus.

Acorum. Cap. II.

Acorũ folia iridis habet, angustiora tamẽ: radices non dissimiles, complicatas, nõ in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas geniculis interceptas, albicãtes, gustu acres, odore nõ ingratas. Optimum est densum, candidũ, plenũ, carie nõ exesum, odoratũ,

cuiusmodi

καὶ στρόφους ἰῶνται). μετ' ὄξους δὲ πινόμεναι θηριοδήκτοις ἀρήγουσι, καὶ σπληνικοῖς, καὶ σπωμένοις, καὶ περιψυχομένοις ἢ ῥιγοῦσι, καὶ τοῖς γόνον προϊεμένοις· σὺν οἴνῳ δὲ ποθεῖσαι, ἄγουσιν ἔμμηνα, καὶ τὸ ἀπόζεμα δὲ αὐτῶν, πρὸς γυναικείας πυρίας εὔθετον, μαλάσσον τοὺς τόπους καὶ ἀναστομοῦν, ἰσχιάδας τε εἰς ἔγκλυσμα, καὶ συρίγγων καὶ κόλπων σαρκωτικόν. προστεθεῖσαι δὲ ὡς κολλύριον μετὰ μέλιτος, ἔμβρυα κατασπῶσι, μαλάσσουσι δὲ χοιράδας καὶ σκιρρώματα παλαιὰ ἑφθαὶ καταπλασθεῖσαι, ξηραὶ δὲ πληροῦσιν ἕλκη, καὶ ἀνακαθαίρουσι μετὰ μέλιτος, καὶ τὰ ἐψιλωμένα τῶν ὀστέων σαρκοῦσιν· ὠφελοῦσι δὲ καὶ κεφαλαλγίας, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ καταπλασθεῖσαι. φακούς τε καὶ ἐφήλεις ἀποκαθαίρουσι, σὺν ἐλλεβόρῳ λευκῷ καὶ διπλασίονι μέλιτι καταπλασθεῖσαι, μίγνυνται δὲ καὶ πεσσοῖς καὶ μαλάγμασι καὶ ἀκόποις, καὶ καθόλου εἰσὶ πολύχρηστοι.

Περὶ Ἀκόρου. Κεφ. β'.

Ἄκορον τὰ μὲν φύλλα ἔχει ἐμφερῆ ἴριδι, στενώτερα δὲ καὶ τὰς ῥίζας οὐκ ἀνομοίους, διαπεπλεγμένας δὲ καὶ οὐκ εἰς εὐθὺ πεφυκυίας, ἀλλὰ πλαγίας καὶ ἐξ ἐπιπολῆς, γόνασι διειλημμένας, ὑπολεύκους, δριμείας τῇ γεύσει, καὶ τῇ ὀσμῇ οὐκ ἀηδεῖς. διαφέρει δὲ τὸ πυκνὸν καὶ λευκόν, ἄβρωτόν τε καὶ πλῆρες εὐῶδες.

τοῦτο

τοῦτο δέ ὅτι τὸ ἐν χαλκίδι καὶ τῇ γαλατίᾳ ἀσπλήτιον λεγόμενον. Δυώδεκα δ' ἔχει ἡ ῥίζα θερμαντικὴν, πονόμενον δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς ὕρα κινεῖ· ἁρμόζον πρὸς πλευρᾶς πόνον καὶ θώρακος καὶ ἥπατος, φθόους, ῥήγματα, ἀπάσματα· ἀσπλήνους τήκει, ὠφελεῖ καὶ φαγεδαινιῶντας, θηριοδήκτοις καὶ εἰς ἕλκωσιν ὡς ἶρις πρὸς τὰ γυναικεῖα, *ὁ δὲ χυλὸς ἡ ῥίζης ἀποκαθαίρει τὰ ἐπισκοτοῦντα τὰς κόρας, μίσυι δὲ καὶ τοῖς αὐτοδότοις ἡ ῥίζα χρηστόμως.

cuiusmodi Colchidicũ & Galaticum, quod aſpletion dicũt. Radici vis calfactoria. Decoctum potu vrinã cit: prodeſt lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: itẽ torminibus, vulſis, ruptis: lienẽ abſumit, vrinæ ſtillicidio & ſerpentum ictibus auxiliatur, inſidentibus ad muliebres affectꝰ iridis modo vtiliter imponitur, oculorũ caligines ſucco diſcutit, antidotis radix magno vſu cõmiſcetur.

Περὶ Μέου. Κεφ. γ'.

Μέον τὸ καλούμενον ἀθαμανικὸν, φυᾶται πλεῖστον ἐν μακεδονίᾳ καὶ ἱσπανίᾳ, ὅμοιον κωνείῳ καὶ τοῖς φύλλοις ἀνήθῳ, παχύτερον δὲ τῷ ἀνήθῳ. δίπηχύ που καὶ ἀβαῖον, τοῖς ῥίζαις ὑπεστηριγμένον λεπτῇσι πλαγίαις, καὶ εὐώδεσι, μακραῖς εὐώδεσι, θερμαινούσαις τὴν γλῶτταν, αἱ πυκνὸν ἀποξεσθεῖσαι μεθ' ὕδατος ἢ καὶ λεῖαι δίχα ἑψήσεως ποθεῖσαι, τὰ στηθικὰ περὶ κύησιν καὶ νεφρούς πάθη παραμορφοῦσι, καὶ δυσουρίαις ἁρμόζουσι. στομάχου τε ἐμπνευματώσεσι καὶ τροφοῖς, ὑστερικῶς τε διαθέσεσι, ἀρθρων πόνοις, θώρακι ῥευματιζομένῳ σὺν μέλιτι λεῖαι αὐτὶ ἐκλικτοῦ βοηθοῦσιν, αἷμα τε ἄρσεσι δι' ἐμμηνων ἀποξεσθεῖσαι εἰς ἕλκωσιν. παιδίων δὲ καταπλασθεῖσαι ἐφηβαίοις οὐρα ἄρουσιν,

Meum. Cap. III.

Meon, quod Athamanticum vocãt, in Macedonia & Hiſpania plurimum gignitur, anetho foliis & caule ſimile, ſed eo craſſius. binũm fermè cubitorũ altitudine attollitur, ſparſis ſi obliquum rectumq; radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ feruefactæ ex aqua, vel tritæ citra coctionẽ, præcluſorum renũ veſicæq; farctæ vitia potu leniunt, vrinæ difficultati medẽtur, ſtomachi inflatiões diſcutiũt. Torminibus, affectæ vuluæ, articulorũ doloribꝰ, atq; fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in eclegmate auxiliãtur, ſanguinẽ per mẽſtrua pellũt, diſceſſionibus feruefactæ: infantibꝰ autẽ illitæ imo vẽtri, vrinas mouẽt:

quòd

q; si plus quàm deceat ex his bibatur, caput dolore afficiũt.

Cypirus. Cap. III I.

Cypirus, quem aliqui eryſiſceptrum, vt aſpalatum appellant, folia fert porraceis proxima, ſed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiorẽ, anguloſum, in cuius cacumine minuta folia cum ſemine exoriuntur: radices, quarum in medicina eſt vſus, cohærentes inter ſe oleis oblongis ſimiles, aut rotundæ, nigro colore, ſuaui odore, amaro guſtu. In lacunoſis, paluſtribus & cultis enaſcit. Optima eſt grauiſſima, dẽſa, fractu contumax, plena & aſpera, odoris cũ quadã acrimonia iucũdi, qualis eſt Cilicia, Syriaca, & quę á Cycladibus inſulis petit. Huic calida vis ineſt. Venarũ ſpiraculla laxat, vrinam ciet, ad calculos aquámq; ſubter cuté vtiliſſimè bibitur, aduerſus ſcorpionum ictus remedio eſt, perfrictionib⁹ vuluæ & p̃cluſionib⁹ fotu ꝓdeſt, pellit mẽſes. Cõtra vlcera oris etiã ſi depaſcãt vorẽtq;, farina ei⁹ efficax eſt. Malagmatis calfaciẽtib⁹, & vnguẽ torũ ſpiſſamẽtis bene adijci ſolet. Aliud cypiri gen⁹ tradũt in India naſci, gingiberis effigie, quod

ἔστι δὲ καὶ κεφαλαλγὲς πλεῖον ἢ δεῖ πινόμενον.

Περὶ Κυπείρου. Κεφ. λ'.

Κυπείρος, οἱ δὲ ἐρυσίσκηπτρον ὡς τινὲς ἀσπάλαθον καλοῦσι, φύλλα δ' ἔχει ὁμοια πρασίῳ, μακρότερα δ' καὶ ἰσχνότερα, καυλὸν δὲ πυχναῖον, ἢ καὶ μείζονα, γωνιώδη, ὅμοιον σχίνῳ, οὗ κατὰ κορυφὴν φυλλαείων ἐστὶν ἔκφυσις μικρῶν καὶ σπέρματος. ῥίξαι δ' ὕπεισιν ὧν καὶ ἡ χρῆσις, ἐπικήλις ὥσπερ ἐλαίας συναφεῖς ἑαυταῖς, ἢ καὶ στρογγύλαι, μέλαιναι, εὐώδεις, ἔμπικροι, φύεται δὲ ἐν τόποις ἑλεγείοις καὶ πελματώδεσιν. ἀείσιη δὲ ἐστιν ἡ βαρυτάτη καὶ πυκνὴ καὶ ἄδρα, δύσθραυστος, στρακτία, εὐώδης μετά τινος δριμύτητος. τοιαύτη δὲ ὅτι ἡ Κιλίκισσα, καὶ ἡ συριακὴ, καὶ ἡ ἀπὸ τῶν κυκλάδων νήσων. δύναμις δ' ἐστὶν αὐτῆ θερμαντικὴ, ἀγασμωτικὴ, διουρητικὴ· λιθίασι καὶ ὑδρωπικοῖς πινομένη βοηθεῖ, καὶ σκορπιοδήκτοις, καὶ τοῖς σὺν μύσει δὲ κατακλύσεσι καὶ μύσεσι πνευμωδῶν· ἁρμόζει, ἄζουσα ἐμμηνα· ποιεῖ δὲ καὶ τοῖς ἐν στόματι ἕλκεσι καὶ νεμομένοις ξηρὰ λεῖα· μίγνυται καὶ μαλάγμασι θερμαντικοῖς, καὶ εἰς τὰ στίγματα τῶν μύρων ἐνδετέον. ἰσορρεῖ δ' καὶ ἕτερον εἶδος κυπείρου ἐν ἰνδίᾳ γινόμενον, ὁμοιοικὰς ζιγιβέρι. ὃ δια-

ὁ διαμασηθὲν* κροκῶδες καὶ πικρὸν εὑρίσκεται, καταχρισθὲν δὲ, παράχρημα ψιλοῖ τὰς τρίχας.

Περὶ Καρδαμώμου. Κεφ. ε.

Καρδάμωμον ἄριστον τὸ ἐκ τῆς Κομμαγηνῆς καὶ Ἀρμενίας καὶ Βοσπόρου κομιζόμενον. γίνεται δὲ καὶ ἐν Ἰνδίᾳ καὶ Ἀραβίᾳ. ἐκλέγου δὲ τὸ δύσθραυστον, πλῆρες, μεμυκὸς, τὸ γὰρ μὴ τοιοῦτον, ἔξωρόν ἐστι, καὶ τὸ τῇ ὀσμῇ πληκτικὸν, γεύσει δὲ δριμὺ καὶ ὑπόπικρον, δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικήν. ποιεῖ δὲ μεθ' ὕδατος πινόμενον πρὸς ἐπιληπτικοὺς, βήττοντας, ἰσχιαδικοὺς, καὶ παράλυσιν, ῥήγματα, σπάσματα, στρόφους, καὶ ἕλμινθα πλατεῖαν ἐκβάλλει, μετ' οἴνου δὲ πινόμενον, νεφρικοῖς, δυσουροῦσι, σκορπιοπλήκτοις, καὶ πᾶσι τοῖς ἰοβόλοις ἁρμόζει, μετὰ δὲ δάφνης ῥίζης φλοιοῦ ποθὲν ὅσον < λίθους θρύπτει, φθείρει καὶ ἔμβρυα ὑποθυμιώμενον, καὶ ψώρας ἐξαίρει σὺν ὄξει καταχριόμενον, μίγνυται δὲ καὶ εἰς τὰς τῶν μύρων στύψεις.

Περὶ Νάρδου. Κεφ. ϛ'.

Νάρδου ἐστὶ δύο γένη· ἡ μὲν, γάρ τις καλεῖται Ἰνδική· ἡ δὲ Συριακή. οὐχ ὅτι ἐν Συρίᾳ εὑρίσκεται. ἀλλ' ὅτι τοῦ ὄρους ἐν ᾧ γίνεται, τὸ μὲν πρὸς Συρίαν τέτραπται, τὸ δὲ πρὸς Ἰνδούς, καὶ τῆς λεγομένης Συριακῆς, ἐστὶ βελτίων ἡ πρόσφατος, καὶ

quod mãducatũ croci vim reddit,gustu amaro sentit, & illitũ pręsenté psilothri vim exhibet.

Cardamomum. Cap. V.

Cardamomũ optimũ est,qđ ex Comagene, Armenia, Bosphoróq; deuehit:in India quoque & Arabia ꝑuenit.Eligi debet plenũ,frangenti cõtumax, occlusum,farctúmq;(qđ enim huiusmodi non est,exoletũ iudicatur)& gustu acre, subamarum,& odore caput tentãs. Ex calfactoriã vim habet potúmque ex aqua facit ad comitiales,ischiadicos,tusses, neruorũ resolutioné.Ité ad rupta,vulsa, tormina:latas vẽtris tineas excutit.Ex vino auté potũ, renibus,difficultati vrinæ, à scorpione ictis,neq; non omnibus venenũ vibrãtibus, auxilio est. Cũ cortice radicis lauri epota drachma calculos comminuit, partus suffitu enecat,scabié ex aceto illitum adimit.Et ad vnguentorũ spissamenta additur,

Nardum. Cap. VI.

Duo nardi genera:vnũ Indicum,alterum Syriacũ appellatur,non ꝙ in Syria proueniat, sed quòd mõtis in quo oritur, pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere pręcipuũ est recés &

& leue, largã gerés comã, flauũ colore, perquàm odoratum, ac cyperum redolens, breui ſpica, amaro ſapore, linguã ſiccante, quod diu in ſua odoris gratia permaneat. Ex Indicis aũt nardum quoddã Gangitis vocaſ, à fluuio Gange, apud quẽ enaſcitur, montẽ præterfluente: qđ genus ob multã loci, in quo pdit, vliginem, viribus infirmius eſt, atq; proceri⁹ adoleſcit, plures ferens ſpicas ab vnica radice comoſas, vnáq; conuolutas, ac grauiter olẽtes. Montanum autẽ odoratius, ſpica breui ac mutila, odore cypero vicino, cęteras habés Syriaci dotes. Eſt & genus quoddã cui Sãpharitico nomen locus indidit, frutice breui, ĩ magnas ſe ſpargés ſpicas candidiore interim medio caule, hircorũ virus ſupra modũ redolente: quod improbatur. Madefactũ vẽdi ſolet: qđ vitium ex eo deprehenditur, ꝙ cãdida ſit ſpica, & ſqualida, nulóq; puluere obſita. Adulteratur ſtilbio cum aqua aut palmeo vino, inſpiſſationis ponderiſq; cauſa inſpirato. Intueri autem oportet ſi lutũ radicibus inſideat, & in cerniculo puluerem excutere, eluédis manib⁹ vtilem. Vim habẽt excalfactoriam, ἢ κόφη, πολύκαμος, ξανθὴ τῇ χρόα, εὐωδὴς ἄγαν, ἢ μετρίως κινοῦσα ζῆν ἐν τῇ ὀσμῇ, μικρὸν ἔχουσα τὸ κάχυν, πικρὰ τῇ γεύσει, ἢ γλώσσης ἀναξηραντικὴ, ὅπερ μιμοῦσά τε τὴν εὐωδίαν ἐφ' ἱκανόν. τὸ δὲ ἰνδικὸν ἢ μώτις λέγε) γαγγῖτις. ἀπό τινος ποταμοῦ παραῤῥέοντος τῇ ὄρει γάγγη χαλκοῦν, παρ' ὃ φύε). ἄλλο γένος κατ' ἰδίαν ὅσα διὰ τὸ ἐφ' ὑδατωδῶν τόπων εἶναι καὶ ὀπιμοτέρα, πλείονας τε ἔχουσα τοὺς κάχυς, ἀπὸ τῆς αὐτῆς ῥίζης καὶ πολυκόμους καὶ τριπεπλεγμένους, βρομώδεις κατὰ τὴν ὀσμήν. ἢ δὲ ὀρεινοτέρα, εὐωδεστέρα, κολοβοτέροις κυπαρίζουσα κατὰ τὴν εὐωδίαν. ἔχουσά τε καὶ ἄλλα ἐν αὐτῇ, ὅπερ καὶ ἡ συριακὴ λεγομένη) δέ τις καὶ σμαραγδῖτις, σπόδρα κολοβὴ, ἀπὸ χωρίου ὠνομασμένη, μεγαλόσταχυς, λευκότερον κοιλὴν, ἔνθ' ὅτι μέσον ἔχουσα, ὑπερβαλλόντα τῇ ὀσμῇ, ἣν δεῖ ἀπικνεῖσθαι. πεπρασμένη) δὲ καὶ ἀποδιεῤῥεγμένην, ὅταν γινώσκε) ἐν τῷ λευκὸν εἶναι τὸ κάχυ καὶ ἀκαχυνεῖν, καὶ μὴ ἔχειν τὸ χνῆν. δολοῦσι δὲ αὐτὴν ἐμφυσῶντες σίμωμι μετ' ὕδατος ἢ οἴνῳ φοινικίτῃ, πρὸς τὸ συμπλοῦσθαι αὐτὴν, καὶ βαρυτέραν γίνεσθαι. σὺν ᾗ δὲ τὸ χρεία ἀφαιρεῖν δεῖ, εἰ περισείειν τὴν ῥίζαις πολὺς, καὶ σύθην χωρεῖζοντα τὸ κονιορτόν. εὐχρηστοῦντα εἰς χειρόνιπτρον. λύκιον ᾗ ἔχουσι θρμαντικόν.

κὴν, ξηραντικὴν, ἀρκτικὴν, ὅθεν καὶ λίαν τὰ ἰσχία πινομένου, καὶ ταῖς ἐκμύξαις ῥύσεις θεραπεύεται, καὶ ἰχῶρας στέλλει. βοηθεῖ δὲ καὶ ναυτίαις, σὺν ὑγρῷ ὕδατι πινόμενον, καὶ καρδιωγμοῖς, καὶ ἐμπνευματικοῖς, καὶ παντικοῖς τε καὶ ἐκλυτικοῖς καὶ νεφριτικοῖς, ἐναφιεμένου δὲ ὕδατι, καὶ πυελισθεῖσι, εἰς ἐγκάθισμα φλεγμονὰς μύξας ἰῶν ταμπτοῦσι καὶ πρὸς τοὺς ἐν ὀφθαλμοῖς μυδήσεις τῶν βλεφάρων, ξύφουσι καὶ διασώσασι τοὺς βλεφαρίδας, καθύγροις τε σώμασι διάπασμα. μίγνυται δὲ καὶ αὐτοδόλοις. ἀποπίθεται δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, ἐν ἀλγείῳ χυμῷ ἀκονίτῳ, λεοβιεισθεῖσα σὺν οἴνῳ καὶ ἀναπλασθεῖσα.

Περὶ Κύπρου Νάρδου. Κεφ. ζ.

Ἡ δὲ κελτικὴ νάρδος, χλωρὰ μὲν ἐν τοῖς κατ' Λιγυρίαν Ἄλπεσιν ὀπὸ χωρίου ὠνομασμένη* ἀλισίγγια. χλωρὰ δὲ ἐν τῇ Ἰστρίᾳ. ἔστι δὲ βαιτίσκος μικρὸς σὺν τῇ ῥίζαις, εἰς δέσμας ἀναλαμβανόμενος χειροπληθεῖς. ἔχει δὲ φύλλα ὑπομήκη, ὑπόξανθα, ἄνθος μίλανον, μόναι δὲ τῶν χυμῶν ὅτι καὶ τῶν ῥιζῶν ἡ χρῆσις καὶ ἡ εὐωδία. ὅθεν δεῖ πρὸ μιᾶς ἡμέρας καταῤῥάναντας ὕδατι τὰς δέσμας, καὶ χωρίζοντας τὸ γλῶδες, πιθέναι ἐπ' ἐδάφους νοτροῦ, προϋποκλύσαντα χάρτῃ, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ καθαίρειν, οὗ γὰρ σωματοκαθαίρεται τῷ ἀχρεώδει καὶ ἀλλοτείῳ

riam, & exiccantẽ. Vrinam mouent, aluum potu sistunt, vuluę profluuia, saniémque appositа supprimũt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi rosionibus, inflationi, iocineri, regio morbo, renum vitijs. Aquæ autẽ incoctæ fotu ad insessum, vuluæ inflãmationibus medentur: ad glabras oculorũ genas valent: siquidem eas ad densioré pilum reducunt, perfusis humore corporib⁹ inspar guntur. Miscentur antidotis, & in fictili nouo non picato ad ocularia medicamenta recõduntur, trita in farinam, & cũ vino in pastillos coacta.

Nardũ Celticũ. Cap. VII.

Celticum nardum nascitur in Liguriæ Alpibus, saliunca patrio nomine appellatum, prouenítque in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat vsus est, & odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempta terra pauito solo atq; huméti subiecta charta reponere, postridie repurgare, siquidẽ vtile, cũ acerosò alienóq;

álienóq; propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur impósita herba símili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. nanque herba candidioreſt, ſine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odorata, vti verum nardum eſt. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti ſecernúntur, vino excipiuntur, digeruntúrque in paſtillos, & ita fictili nouo diligenter operto, aſſeruari debét. Laudatur maximè recens, iucúdi odoris, radice numeroſa cohærés, plenú, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacú pollet: ſed vehementius vrinam cit, & ſtomacho vtilius eſt. Inflammationibus iocineris, & felle ſuffuſis auxiliatur. Contra ſtomachi inflationes, cum abſinthij decocto bibitur: item aduerſus lienem, renum & veſicæ vitia & venenatos ictus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & cal facientia vnguenta.

ἀλλοτείω τὸ εὔχρηστον, διὰ τὴν ἐκ τῆς ἰκμάδος εὐτονίαν. δολίζεται δὲ συναποπλυνόμενον αὐτῇ, πόας ἐμφερὴς, ἣν διὰ τὸ ἀεὶ τὴν ὀσμὴν βεομῶδες, βάσον καλοῦσιν. εὐχερὴς δὲ ἡ ἐπίγνωσις, ἄκαυλος γάρ ἐστιν ἡ πόα καὶ λευκοτέρα, καὶ ἧττον ὀσμύκη τὰ φύλλα ἔχει, ἡ δὲ ῥίζαν πικρὰν ἢ ἀρωματίζουσ᾽ ὥσπερ ὁπὸ τῆς ἀληθινῆς ἔχει. ἀποκρίνας δὲν τὰ καυλία καὶ τὰς ῥίζας, τὰ δὲ φύλλα ῥίψας, εἰ βούλει δ᾽ ἀποτίθεσθαι, ἀναλαμβάνων λείᾳ οἴνῳ, καὶ βοχάσκης ἀναπλάσας φύλαττε ἐν ὀστρακίνῳ ἀγγείῳ καινῷ, πυμάζων ὀπιμελῶς. ἀεί ἐστι δὲ ὅτι ἡ εὐόσματος καὶ εὐώδης, πολύῤῥιζος, οὐκ εὐθρυπτος, πλήρης. δυνάμεις δὲ ὅσα καὶ ἡ σύεια κή. δηκτικωτέρα τε καὶ εὐστομαχωτέρα. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὰς ἀεὶ τὸ ἧπαρ φλεγμονάς, καὶ ἰκτερικούς. καὶ πνευματώσεις στομάχου, μετ᾽ ἀφεψήματος ἀψινθίου πινόμενον. ὁμοίως καὶ σπλῆνα, καὶ τὰ ἀεὶ τὴν κύστιν καὶ νεφρούς. καὶ πρὸς τὰ ἰοβόλων δήγματα σὺν οἴνῳ. καὶ εἰς τὰ μαλάγματα μίγνυται καὶ ποτίσματα, καὶ χρίσματα θερμαντικά.

Mótanũ nardũ. Cap. VIII.

Montanum nardum, quod ab aliquibus thylacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria naſcitur, ſurculo & folijs eringio ſimilibus, minoribus, minimè

Περὶ Ὀρεινῆς Νάρδου. Κεφ. η.

Ἡ δὲ ὀρεινὴ νάρδος, καλουμένη δὲ ὑπό τινων καὶ θυλακίτις καὶ νῆρις, γίνεται ἐν κιλικίᾳ καὶ συρίᾳ. φύλλα καὶ καυλοὺς ὅμοια ἠρυγγίῳ ἔχουσα, μικρότερα μὲν, ἢ μᾶλ-

οὐ μὴν πραχέα καὶ ἀκαυθώδη. ῥίζαι δὲ ὑπεισι μέλαιναι ἐυώδεις δύο, ἢ καὶ πλείους, ὥσπερ ἀσφοδέλου, ἰσχνότεραι καὶ μικρότεραι πολλῶ. οὔτε δὲ χυλὸν, οὔτε καρπὸν, οὔτε αὖθος φέρει. ποιεῖ δὲ ἡ ῥίζα θερὸς ὅσα καὶ ἡ κελτικὴ νάρδος.

nimè tamen ſpinoſis, aſperiſq;. Radicib⁹ binis nititur, aut plurib⁹, nigris, odoratis, ceu baſtulæ regię, ſed longè graciliorib⁹, & lõgè minoribus. Neq; caulem, neque fructum, neq; florẽ profert. Ad eadem ad quę Celticum efficax.

Περὶ Ἀσάρου. Κεφ. θ'.

Ἄσαρον, οἱ δὲ, νάρδον ἀγρίαν καλοῦσι πόα ἐυώδης στεφανωματική. φύλλα ἔχει κισσῷ ὅμοια, μικρότερα δὲ πολλῶ καὶ στρογγυλώτερα. αὖθη μεταξὺ τῶν φύλλων θερὸς τῇ ῥίζῃ, πορφυρᾶ, ἐυώδη, ὑοσκυάμῳ κυτίνῳ ἐμφερῆ, ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα ἐοικὸς γιγάρτῳ. *ῥίζαι ὕπεισι πολλαί, γονατώδεις, λεπταί, στελέχια ὅμοια ἀχρώστει. ἰσχνότεραι μὲν τοι πολλῶ καὶ ἐυώδεις θερμαίνουσι καὶ διάκνουσι λίαν ἢ γλῶσαν. δύναμις δὲ αὐτῶν διουρητικὴ θερμαντική, ἀρμόζουσι ὑδρωπικοῖς, ἰκτεριδικοῖς χρονίοις, ἀγρίοις δὲ καὶ ἕμμικτα μετὰ μελικράτου ποθεῖσαι αἱ ῥίζαι πλῆθος ∠ ε'. καθαίρουσιν ὡς ἑλλέβορος λευκός. μίγνυται δὲ ἐν μύροις, φύεται δὲ ἐν ὑποσκιοις ὄρεσι, στελέχη δὲ ἐν πόντῳ καὶ φρυγία καὶ ἰλλυρεί δι, καὶ * ἰουστίνη τῆς ἰταλίας.

Asarum. Cap. IX.

Aſarum, quod & ipſum aliqui ſylueſtre nardum appellãt, hederæ foliis minoribus multò, rotundioribúsque, floribus cytino hyoſcyami ſimilibus, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus ſemen acinoſum. gradices numeroſas, geniculatas, tenues, obliquas, gramini non diſſimiles, longè tamen graciliores, odoratas, excalfaciẽtes, & quæ linguam vehementer mordent. Excalfactoriam vim habet: vrinã cit, hydropicis & vetuſto coxendicum dolori prodeſt. Radices ſenis drachmis ex aqua mulſa potę, menſes trahunt, & veratri albi modo purgant. In vnguenta additur. Vmbroſis mõtibus ꝓuenit, ſed plurimum in Póto, Phrygia, Illyrico, & Italiæ Iuſtinienſi agro.

Περὶ Φοῦ. Κεφ. ι.

Φοῦ, οἱ δὲ, καὶ τῦτο ἀγρίαν νάρδον

Phu. Cap. X.

Phu, quod & aliqui ſylueſtre nardum

nardum appellant, naſcitur in Ponto, folio oluſatri, aut elaphoboſci, caule cubitali, aut altiore, lęui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narciſſo proximis, maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice ſuperius ad digiti minoris craſsitudinem, ex obliquo villoſa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamẽtis inuicem cõtextis, flaueſcentibus, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum æmulantibus. Excalfacit, vrinã mouet, ſi ſicca potui detur. Decoctum eadem præſtare poteſt. ad lateris etiam dolorem efficax, menſes cit, antidotis inſeritur. Adulteratur radice ruſci ammiſta: ſed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura eſt, & frangenti contumax, ſine vlla odoris gratia.

Malabathrum. Cap. XI.

Malabathrum arbitrãtur aliqui eſſe Indici nardi folium, falſi quadam odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, aſarum, niris. ſecus autem res ſe habet. Nanque malabathrum foliũ ſui generis eſt, quod Indicæ gignunt paludes, lentis paluſtris

ναρδον καλοῦσι, γλυνᾶ δ' μὲν ἐν πόντῳ, φύλλα ὁ ἐλαφοβόσκῳ ἢ ἱππουρίδι παραπλήσια ἔχει, καυλὸν πηχυαῖον, ἢ μείζω, λεῖον, πυῤῥὸν ἐμπόρφυρον, μεσόκοιλον, διειλημμένον γόνασιν, αὐξομένῳ πρὸς τὸ τοῦ ναρκίσσου, μείζω δὲ καὶ πυῤῥότερα, καὶ ἐν τῷ ὑπολεύκῳ διαπόρφυρα· ῥίζα δὲ ἡ μὲν αὐτοτέρω, πρὸς δακτύλου μικροῦ τὸ πάχος, πλάγια δὲ ὑπερρίζια ἔχει καθάπερ χῖγος ἢ μέλας ἑλλέβορος, ἀλλήλοις ὑπεμπεπλεγμένα, ὑποξανθα, εὐώδη, ναρδίζοντα τῇ ὀσμῇ, μετά τινος βάρεως βραμώδους. δύναται δὲ θερμαίνειν, οὐρεῖν κινεῖν ἐπὶ πότιζόμενον, καὶ τὸ ἀπόζεμα ὑπ' αὐτῆς, τὸ αὐτὸ δύναται ποιεῖν, καὶ πρὸς πλευρᾶς πόνον, ἐμπλαστά τε ἄγει καὶ αὐτάδοτοις μίγνυται. δολοῦται δὲ ὀξυμυρσίνης ῥίζαις παραμιγνυμένη· ἐυχρὸς δὲ ἡ ὑπόχυσις αὐτῆς ὄζει· σκληρὰ γὰρ εἰσιν αὗται καὶ δύσθρυπτοι δίχα ἐυοδίας.

Περὶ Μαλαβάθρου. Κεφ. ιά.

Μαλάβαθρον ἔνιοι ὑπολαμβάνουσιν εἶναι τῆς ἰνδικῆς ναρδου φύλλον πλανώμενοι ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ὀσμὴν ἐμφερείας πολλὰ γὰρ ὅμοια τῇ ὀσμῇ ναρδῳ, ὡς τὸ φοῦ, ἄσαρον, νῆρις. οὐκ ἔχει δὲ οὕτως. ἴδιον γάρ ὄζει γλοῦς φυόμενον ἐν τοῖς ἰνδικοῖς τέλμασι, φύλλον ὃν ὑπο-

πηχέ-

IPSA quæ nunc dicetur herbarum claritas medicinæ tantum gratia gignente eas tellure, in admirationem curæ priſcorum diligentiæque animum agit. Nihil ergo intentatum inexpertumq; illis fuit. Nihil deinde occultatum quod nō prodeſſe poſteris vellent. At nos elaborata iis abſcondere atque ſupprimere cupimus, & fraudare vitā etiam alienis bonis. Ita certè recōdunt, qui pauca aliqua nouere, inuidentes aliis: & neminē docere, in auctoritatem ſciētiæ eſt. Tantum ab excogitandis nouis, ac adiuuanda vita mores abſunt. Summumq; opus ingeniorum diu in hoc fuit, vt intra vnumquenq; rectè facta veterum perirent. At hercule ſingula quoſdam inuenta deorum numero addidere, omniumque vitam clariorem fecere cognominibus herbarum, tam benigne gratiam memoria referēte. Non æquè hæc cura eorum mira eſſet in his quæ ſatu blandiuntur, aut cibo inuitant, ſed culmina quoq; montium inuia & ſolitudines abditas, omníſque terræ fibras ſcrutati inuenere, quid quæque radix polleret ad quos vſus herbarum folia pertinerent, etiam quadrupedum pabulo intacta ad ſalutis vſus vertentes. Minus hoc quàm par erat, noſtri celebrauere, omnium vtilitatum & virtutum rapaciſsimi. Primusq; & diu ſolus idē ille M. Cato, omnium bonarum artium magiſter, paucis dūtaxat attigit, boum etiam medicina non omiſſa. Poſt eam vnus illuſtrium tentauit C. Valgius, eruditione ſpectatus, imperfecto volumine ad diuum Auguſtum, inchoata etiam præfatione religioſa, vt omnibus malis humanis illius principis potiſsimum ſemper medicetur maieſtas. Antea condiderat ſolus apud nos, quod equidem inueni, Pompeius Læneus, Magni libertus, quo primùm tempore hanc ſcientiam ad noſtros peruenisſe animaduerto. Nanque Mithridates maximus ſua ætate regū, quem debellauit Pompeius, omnium ante ſe genitorum diligentiſsimus vitæ fuiſſe argumentis præterquam fama intelligitur. Vni ei excogita-

tum,quotidie venenum bibere,præsumptis remediis,vt consuetudine ipsa innoxium fieret. Primò inuenta genera antidoti,ex quibus vnum etiam nomen eius retinet.Illius inuentum autumant,sanguinem anatum Ponticarum miscere antidotis,quoniam veneno viuerent. Ad illum Asclepiadis medendi arte clari, volumina composita extant: cum solicitatus ex vrbe Roma,præcepta pro se mitteret. Illũ solum mortalium vigintiduabus linguis locutũ certum est, nec de subiectis gentibus vllum hominem per interpretem appellatum ab eo annis LVI. quibus regnauit. Is ergo in reliqua ingenij magnitudine medicinæ peculiariter curiosus,ab hominibus subiectis,qui fuere pars magna terrarũ, singula exquirés scrinium commentationum harum & exemplaria,effectusq; in arcanis suis reliquit.Pompeius autẽ omni regia præda potitus,transferre ea sermone nostro libertum suum Lenæum, grammaticæ artis doctissimum,iussit: vitæq; ita profuit non minus quàm reipublicæ victoria illa,præter hos Græci autores medicinæ prodidere,quos suis locis diximus. Ex his Euax rex Arabum,qui de simplicium effectibus ad Neronem scripsit:Crateuas,Dionysius,Metrodorus,ratione blãdissima,sed qua nihil penè aliud quàm rei difficultas intelligatur.Pinxere nanq; effigies herbarũ atq; ita subscripsere effectus. Verũ & pictura fallax est,& coloribus tàm numerosis, præsertim in æmulatione naturæ,multum degenerat transcribentium fors varia.Præterea parum est singulas earũ ætates pingi,cum quadripartitis varietatibus anni faciem mutent. Quare cæteri sermone eas tradidere. Aliqui ne effigie quidem indicata, & nudis plerũque nominibus defuncti, quoniam satis videbatur potestates vimque demõstrare quærere volentibus. Nec est difficile cognitu,nobis certè,exceptis admodum paucis contigit reliquas contemplari scientia Antonij Castoris, cui summa authoritas erat in ea arte nostro æuo, visendo hortulo eius in quo plurimas alebat, cẽtesimum ætatis annũ excedens,nullum corporis malum expertus,ac ne ętate quidem memoria aut vigore concussis,& cæt.

νηχόμενον τῷ ὕδατι, καθάπερ ἡ ἐπὶ τῶν τελμάτων φακῆ. ῥίζαν δὲ ἔχον, ὅσην συλλέγοντες, εὐθέως διαπείρουσι λίνῳ, καὶ ξηράναντες ἀποτίθενται. φασὶ δὲ καὶ τὴν ἀγαξηρασθέντος τοῦ ὕδατος, καίεσθαι φρυγάνοις τοῖς γλίσχροις, μὴ ἄλλο μόνον τὸ τέτε μηκέτι φύεσθαι. ἔστι δὲ καλὸν τὸ φερόμενον καὶ ὑπόλευκον, ἐν τῷ μελανίζειν ἀδρανοῦν τε καὶ ὁλόκληρον, πλικτικὸν τῇ ὀσμῇ, καὶ ὑπνοδιάμυσον τῇ εὐωδίᾳ, ναρδίζον δὲ τῇ γεύσει μὴ ἀλμυρίζον. τὸ δὲ ἀδρανὲς καὶ τὸ λεπτοκοπόμυον, εὐρωτιῶσαν ἔχον τὴν ἀποφόρησιν, φαῦλον, δυώδη ἔχει τινὰ αὐτοῖς τῇ ναρδῳ. ἐνεργέστερον δὲ ἐκείνη πάντα ποιεῖ. δηριπικωτέρα μύτοι καὶ εὐστομαχωτέρα ἐστὶν, ἡ τῆς μαλαβάθρου δυώδης, καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμικὰς φλεγμονὰς ἁρμόζει ἀναζεσθὲν ἐν οἴνῳ καὶ λεῖον ὑπιχριόμενον· ὑποτίθεται δὲ καὶ γλώσσῃ πρὸς εὐωδίαν στόματος, καὶ σὺν ἱματίοις τίθεται· ἄδηρα γὰρ καὶ εὐώδη ταῦτα τηρεῖ.

Περὶ Κασίας. Κεφ. ιβ'.

Κασίας δὲ ὅτι πλείονα εἴδη, περὶ τινὰ ἀρωματοφόρον ἀραβίαν γινόμενα. ἔχει δ' ῥάβδον παχύφλοιον, φύλλα δ' ὡς πιπέρεως. ἐκλέγω δ' ἐγκυρρόν, εὔχροον, καραλίζουσαν, στιλπνὸν λίαν, μακρὰν καὶ παχεῖαν, τοῖς συεγγίοις πλήρη, δηκτικὴν

lustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transfuitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticib⁹ vri: quod vbi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in sua vi odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum verò & minutum contusum, præsertim si carioſum virus olet, vitioſum est. Easdē nardo sortitur vires; sed efficacius omnia præstat. Vrinam vehementius ciet, ac stomacho magis ꝓdest malabathri vis, Lippitudinibus, inflā mationibúsq; tritū & in vino feruefactum cōmodè illinitur: subditū linguæ, oris halitū & suauitatem cōmēdat. Vestium quoque odorem interpositum seruat, & ab eroſione tuetur.

Caſsia. Cap. XII.

Caſsia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, craſsi corticis sarmento, foliis piperis. Eligēda est fulueſcēs, pulchri coloris, coralli æmula, perquā anguſta, longa, craſſa, & fiſtuloſa,

guſtu mordens,& cũ aliquanto feruore aſtringens, aromatica,vinoſo odore, cuiuſmodi eſt,quæ ab incolis,achy appellatur,ab Alexandriæ negociatoribus,daphnitis.Huic præferẽ craſſa, purpurea & nigricans, Zigir cognomine, quæ roſam odore imitatur, ſcipui in medicina vſus. Secundum locum tenet antedicta.Tertia,cui Muſeletico blaſto, id eſt germini, cognomen eſt. Reliquæ viles, & quæ aphemum dicitur, nigra,inſuauis, cortice tenui, ac rimoſo : & quæ darca,& citto vocitatur barbaro nomine.Similior huic eſt pſeudocaſsia, quàm vt explicari poſsit, quæ guſtu coarguitur, cùm nec acris,nec odorata ſit, hærentéq; medullæ corticé habeat. Inuenitur etiam lata quædam fiſtula,mollis,leuis,ſurculoſa, q̃ antedictæ præfertur. Damnatur candicans,ſcabra,hircinum virus redolens, & quæ tenui fiſtula, & ſcabra cute ſit. Vim obtinet calfaciẽdi ,vrinam ciendi.ſiccandi,& leniter aſtringendi. Cõuenit ad medicamẽta oculorum , quæ præſtandæ claritatis gratia cõcinnãtur, & ad malagmata. Lẽtigines tollit cum melle illita,menſes trahit,

δηκτικὴν ἐν τῇ γεύσει, ἢ εὐφουσαν μὴ πολλῆς πυρώσεως, ἀρωματίζουσαν, οἰνίζουσαν τῇ ὀσμῇ, ἣ δὲ τοιαύτη ἀπὸ τῶν ἐμπορείων ἄχυ καλεῖται, δαφνῖτις δὲ πρεσβευέται ἀπὸ τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἐμπόρων. πρὸ δὲ τούτης ἐστὶν ἡ μέλαινα ἢ ἐμπύρευμος πυκνή, ζίγις καλουμένη, ῥοδίζουσα τῇ ὀσμῇ μάλιστα πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν εὔθετος. δευτερεύει δὲ ἡ πρεσφημένη. τρίτη δὲ ὅτιν ἡ καλουμένη βλάκτος μουλήτις. αἱ δὲ λοιπαὶ εὐτελεῖς, ὡς ἡ καλουμένη ἀσυφήμων, μέλαινα ἢ ἀνδὴς ἢ λεπτόφλοιος, ἢ ἢ φλοιορρόα γὴς· ὡς ἢ κιτρία ἢ δάκαρ καλουμένη. Ἔστι δέ τις ἢ ψευδοκασσία ἀφάτως ἐμφερὴς, ἥτις ἐλέγχεται τῇ γεύσει, ἀκὸ οὖσα δριμεῖα, ἃ δὲ ἀρωματώδης, πρὸς τὸ χρῶμά τε τὸ φλοιὸν ἔχει τὴν ἐντεριώνη. ἐυείσκεται δὲ ἢ πλατεῖα συεχῆ, ἁπαλὴ, κύφη, ἐυερνὴς, διαφέρουσα δὲ τὸ ἄλλης. ἀποδοκίμαζε δὲ τὴν ὑπόλευκον ἢ ψωρώδη, τραχίζουσαν ἐν τῇ ὀσμῇ, ἢ τὴν μὴ ἔχουσαν δὲ τὴν σύεργα πα χεῖαν, ψωρώδη δὲ ἢ λεπτήν. δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν ἢ οὐρητικὴν, ξηραντικὴν, εὐφουσαν πρὸς ὄψεις. ἁρμόζει δὲ εἰς τὰ πρὸς ὀξυδορκίαν ὀφθαλμικὰ ἢ μαλάγματα· φακὸς ἢ ἄιρη μὲ μίλιτος κατα χριομένη, καὶ ἔμμηνα ἄγει,

καὶ ἐχμοδύκτοις βοηθεῖ πινομένη, καὶ πρὸς τὰς ἐντὸς φλεγμονὰς πάσας ποθεῖσα καὶ πρὸς νεφρούς. εἰς ἐγκαθίσματά τε καὶ καπνισμάτα γυναιξὶ, πρὸς ἀνευρυσμὸν μήτρας. διπλάσιον δὲ αὐτῆς μυρίμνον τοῖς φαρμάκοις, εἰ μὴ παρείη κιννάμωμον, τὸ αὐτὸ δρᾶ, ἄζαι δὲ ὀλίγον πολύχρηστος.

Περὶ Κιννα μώμι. Κεφ. γ'.

Κιννα μώμι ἐστὶ πλείονα εἴδη, ὀνομαζόμενα ἐπιχωρίως. διαφέρει δὲ τὸ μόσυλον, διὰ τὸ σώσειν ποσῶς ἐμφέρειαν, πρὸς τὴν μοσυλίτην καλουμένην κασίαν. ἐν τούτῳ πρὸς τὸ πρόσφατον, τῇ χρόᾳ μέλαν, τεφρίζον ἐν τῷ οἰνώδει, λεπτὸν δὲ τοῖς ῥαβδίοις καὶ λεῖον, ὅλοις συνεχόσι κεχρημένον, σφόδρα εὐῶδες. ἡδὺ γὰρ ἡ τοῦ ἀείσυου χρᾶσις ἐστὶ πρὸς τὴν ἐν τῇ εὐωδίᾳ ἰδιότητα. εὑρίσκεται γὰρ μετὰ τοῦ ἀείσυου καὶ ἰδιάζοντος ἡ ὀσμὴ πηγαίζουσα ἢ καρδαμώμῳ ἐμφορής. ἔτι δ' ἁπαλὸν καὶ δακτυλῶδες τῇ γεύσει, καὶ ὑφαλμυρίζον μετὰ θερμασίας, ἔντερα τῇ παρατρίψει μὴ ταχέως διασυρόμενον, καὶ ἐν τῷ θραύεσθαι χροῶδες καὶ λεῖον ἔχον τὸ μεταξὺ τῶν ὄζων. δοκίμαζε δὲ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης λαμβάνων τὸν πολλόν. εὐχρηὲς γὰρ ἡ τοιαύτη δοκιμασία. τὰ γὰρ θραύσματα, μίγματα τυγχάνει, καὶ

cótra viperarũ ictus pota auxiliat, aduersus ĩtestinas inflãmationes omneis & renum vitia, pota proficit. Fœminis in folio desidẽtib⁹, aut suffimẽtis, pdest ad dilatationẽ vuluæ. Ea duplo pondere medicamentis mixta cinnamomi vicẽ supplet, si ipsum desit: nã eosdẽ effect⁹ prębet, ad plurima perquã vtilis.

Cinnamomũ. Cap. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen vendicãtia. Præfertur tamen mosyliticum, quòd casiæ, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiẽ. Sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinerium vergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nobis cinctum, perquàm iucundè olẽs. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate cóstat. Inuenitur enim cũ optimo, eo q; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo pxim⁹. Insup acre, mordẽs, & cũ calfactiõe quadantenus salsum, quod nõ citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, leuib⁹ tamen internodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculũ. facilis est huiusce modi probatio: náq; fragmẽta miscellanea qdã esse vidẽtur.

Quæ autē melius ſpirāt, ſuo habitu cū nares primū cōſulūtur, olfactū explentia, deterioris dignotionē impediūt. Eſt etiam montanū, craſſum, pumilū, fulueſcens ādmodū. Tertiū à Moſylitico, perquā ſuauiter olet, nigrū, fruticoſum, paucis intercedētibus geniculis. Quartum, fungoſum, cādicās, aſpectu tuberoſum, vile, ac friabile, magnā habēs radicē, quæ caſsiam planè repreſentat. Quintū genus, odore nares feriens, ſubrufum, & cortice fuluæ caſsiæ ſimile, tangēti firmū, minus neruoſum, denſa radice firmatum. Iis quæ thuris, caſsiæ, myrti, aut amomi odorem ſpirant, minus ſuauitatis ineſt. Deligito ſcabrum, albū, rugoſum: at læue, & lignoſum circa radicem, vt inutile reijcito. Eſt etiamnum ſimile aliud, cui pſeudocinnamomo cognomē eſt, vile, inualidi odoris, ſolutarūq; viriū. Vocatur etiam Zingiber, cū tamē ſit xylocinnamomum, præbēs quandam cinnamomi faciem. Eſt aūt lignoſum cinnamomū, ſarmēta lōga robuſtāq; ferens, odore lōgē cinnamomo inferiore. Sūt qui xylocinamomū, à cinnamomo genere differre dicāt, ꝙ à natura ei⁹ abhorreat.

Cinnamum

καὶ κατὰ τὴν τῶν ὀπῶν δοκιμασίαν τὰ χρείττονα ἀπεπίονται καὶ πληροῦντα τὴν ὄσφρησιν, ἐμπο δίζει τὴν τῆς ἥδονος ἐπίκρισιν. ἔστι δὲ καὶ ὀφρυὸν, παχὺ, κολοβὸν, σφόδρα ὑπόκιρρον ἢ χρόαν. καὶ τέτον παρὰ τὸ μόσυλον, μέλαν καὶ λίαν εὐώδες, εὐρώδες δὲ καὶ οὐ πολυχρόνατον. τέταρτον, λευκὸν, χαῦνον, ὀλιγώδες, ἰνώδες καὶ εὐτελὲς, εὐθραυστόν τι καὶ μικάλλω ἔχον ῥίζαν καπίζουσαν. πέμπτον τῇ ὀσμῇ θλικτικὸν, ὑπόκιρρον ὃ καὶ σφοδρῶς μυρίζει καπία πυρᾷ, σφὸς τὴν ἁφὴν δὲ στερεὸν, ὑπάργυ ἰνῶδες, παχύρριζον, τέτων δὲ τὸ πρῶτον λιβανωτῷ ἢ μυρσίνῃ ἢ καπίᾳ ἢ ἀμώμῳ εὐωδίας ἥττον ὄζει. ἀπολέγου δὲ τὸ λευκὸν καὶ τὸ ψωρῶδες, καὶ τὸ εὐανθέκαρφον· καὶ λεῖον, καὶ τὸ ξυλῶδες δὲ κ' ἡ ῥίζαν ὡς ἄχρειον παραιτῶ. Ἔστι δέ τι καὶ ἄλλο ὅμοιον τὸ καλούμενον ψευδοκιννάμωμον εὐτελὲς ἐκ σύτονον τῇ ὀσμῇ, ἐκλελυμένον δὲ καὶ τῇ δυνάμει. καλεῖται δὲ καὶ ζιγγίβερις ξυλοκιννάμωμον ὄν. ἔχον δὲ πνα ἐμφέρειαν κινναμώμῳ. ἔστι δ' ξυλῶδες κιννάμωμον, ἔχον ῥάβδους μακρὰς καὶ ῥωμαλέας καὶ τὴν εὐωδίαν πολὺ καταδεεστέρας. λέγεται δὲ ὑπ' ἐνίων καὶ κατὰ γένος διαφέρειν τοῦ κινναμώμου τὸ ξυλοκιννάμωμον ἑτέρας ὂν φύσεως.

δύναμιν

δύναμιν δὲ ἔχει πᾶν κιννάμωμον θερμαντικήν, οὐρητικήν, μαλακτικήν, πεπτικήν. ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα πινόμενον καὶ προστιθέμενον μετὰ σμύρνης, καὶ ἰοβόλοις θηρίοις καὶ θανασίμοις ἁρμόζει· καὶ τὰ ταῖς κόραις ἐπισκοτοῦντα ἀποκαθαίρει, θερμαίνει τε καὶ λεπτύνει, καὶ ἔστι διουρητικόν, φακούς τε καὶ ἐφήλεις ἀποκαθαίρει μετὰ μέλιτος ἐπιχρισθέν· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς βῆχας· καὶ καταρρόους, ὕδρωπας, νεφρίτιδας, δυσουρίας, μίγνυται δὲ καὶ τοῖς πολυτελέσι μύροις· καὶ καθόλου ἐστὶ πολύχρηστον. ἀποτίθεται δὲ εἰς διαμονὴν λεῖον οἴνῳ ἀναλαμβανόμενον, καὶ ξηραινόμενον ἐν σκιᾷ.

Cinnamomum omne excalfacit, emollit, & concoquit, vrinā ciet, tā mēses, quàm partus potum aut ex myrrha impositum pellit, contra bestias, quæ virus eiaculātur, venenáq; cōuenit: caliginē pupillis oculorū obuersantem discutit, crassitiem extenuat, lentigines, & vitia cutis in facie ex melle illitū detergit: cōtra tusses, defluxiones, aquam subter cutē fusam, renū vitia, & vrinæ difficultatē efficax est, vnguentis preciosis inseri solet: & in summa, magni ad omnia vsus. Tritū vino excipitur, vmbraq; siccatum, quò diutius eduret, reconditur.

Περὶ Ἀμώμου. Κεφ. ιδʹ.

Ἄμωμόν ἐστι θαμνίσκος οἱονεὶ βότρυς, ἐκ ξύλου αὐτεμπεπλεγμένος ἑαυτῷ. ἔχει δέ τι καὶ ἄνθος μικρόν, ὡς λευκοΐου, φύλλα δὲ βρυωνίᾳ ὅμοια. κάλλιστον δέ ἐστι τὸ ἀρμένιον, χρυσίζον τῇ χρόᾳ, ἔχον τε τὸ ξύλον ὑπόκιρρον, εὐῶδες ἱκανῶς. τὸ δὲ μηδικὸν διὰ τὸ ἐν πεδίοις καὶ ἐν ἐφύδροις τόποις φύεσθαι, ἀδυνατώτερον. ἔστι δὲ μέγα καὶ ὑπόχλωρον, καὶ πρὸς τὴν ἀφὴν ἁπαλόν, καὶ ἰνῶδες τοῖς ξύλοις,* πηγανίζον τῇ ὀσμῇ. τὸ δὲ ποντικὸν ὑπόκιρρον, οὐ μακρόν, οὐ δὲ δύσθραυστον, βοτρυῶδες, πλῆρες καρποῦ, καὶ τῇ ὀσμῇ πληκτικόν. ἐκ

Amomum. Cap. XIIII.

Amomum exiguè fruticat, ex ligno se conuoluēs in racemi modum, flore, ceu candidæ violæ, paruo: folijs vitis albæ similibus. Laudatur quàmmaximè Armeniacū fuluo auri colore, ligno subruso, valde odorato. Medicum, quoniam in campestribus, & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice venoso, odore origani. Pōticum verò subrufum, paruum, fragile, racemosū fructu turgens, & odore nares feriēs

Deligito recens, candidum vel subrubrum, quod nec astrictum cohæreat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur, seminis plenum, vuis paruis simile, graue, valde odoratum, modo cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, astringendi, exiccãdi. Somnum allicit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitque: iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorum, viscerúmque lenit ex vua passa, ad vuluarũ vitia, in pessis, aut infessionibus vtile est. Decoctum iocineri, renibus, podagræ, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & precioßimis vnguentis. Adulteratur amomum herba simili, quæ amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusce modi probationib⁹ fragmẽta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab vna radice integros surculos emittunt.

ἐκλέγε δὲ τὸ θερόφατον καὶ λευκὸν ἢ ὑπέρυθρον, ἐ πεπλακυίνον ἢ συμπεπλεγμένον, λελυμένον δὲ καὶ διακεχυμένον, σπέρματος πλήρες, ὅμοιον βοτρυδίοις, βαρὺ, σφόδρα εὐῶδες, δίχα ἐυρώτος, καὶ δριμύ, δάκνον δὲ γεύσει, ἁπλοῦν δὲ χρόαν καὶ ἀ ποικίλον. δύναμιν δ' ἔχει θερμαντικὴν, συστατικὴν, ξηραντικὴν, ὑπνοποιὸν, ἀνώδυνον τῶ μετώπῳ καταπλασσόμενον, φλεγμονὰς δὲ καὶ μελικηρίδας πέπαυει καὶ διαφορεῖ. σκορπιοπλήκτοις τὲ μὴ ὠκίμῳ καταπλασθὲν ὠφελεῖ, ποδαγρικοῖς συμβάλλε⁹ καὶ ὠφελεῖ, καὶ παραρρεῖ, καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς· καὶ ταῖς ἐν αὐλάγχοις σὺν σταφίδι, ἕδραις δὲ τὲ γυναικείαις καὶ ἐν ἕδραδύτοις καὶ ἐν ἐγκαθίσμασι χρήσιμον, πιθὲν δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῦ ἀρμόζει νεφριτικοῖς, νεφριτικοῖς, πεδαγρικοῖς. μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις, καὶ τοῖς πολυτελεστάτοις τῶν μύρων. ὁλίζουσιν δέ τινες τὸ ἄμωμον τὴ λεγομένη ἀμωμίδι, ἐμφερεῖ ὄσπ ἀμώμῳ ἀνόσμῳ μέν τοι καὶ ἀκάρπῳ, γινωμένη δὲ ἐν ἀρμενίᾳ, αὖθος ἔχουσι ἐμφερὲς ὀρηγάνῳ. δεῖ δὲ ἐν τοῖς τ τοιούτων δοκιμασίαις τὰ θραύσματα ἐκφεύγειν. ἐκλέγειν δὲ τὰ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ἔχοντα κλάδους τελείους.

Costus. Cap. XV.

Præcellit Arabicus, cãdidus, leuis,

Πρὶ Κόστου. Κεφ. νέ.

Κόστου διαφέρει ὁ ἀραβικὸς, λευκὸς, ὃν

ὢν καὶ κοῦφος, πλείστην ἔχων καὶ ἡδεῖαν τὴν ὀσμήν. δεύτερος ὁ ἰνδικὸς ἁδρὸς ὢν καὶ κοῦφος καὶ μέλας ὡς ναρδηξ. τρίτος δέ ἐστιν ὁ συριακὸς, βαρύς, τὴν χρόαν πυξάδης, πικτικὸς τὴν ὀσμήν. ἄριστος δέ ἐστιν ὁ θεόσφαλος, λευκὸς, πλήρης δόλυς, πυκνὸς, ξηρὸς, ἀτερηδόνητος, ἀδρωμος, γαύσει δηκτικὸς, καὶ πυρώδης. δύναμιν δ' ἔχει θερμαντικὴν, διαπτικὴν, ἐμμιλώων ἀγωγὸν καὶ τὰ περὶ ὑστέραν παθῶν ἀρωγὸν, ἐν θεραπέμασι καὶ καταντλήμασι καὶ πυριάσεσι, πινόμενος δὲ ἐχιοδήκτοις βοηθεῖ ἀγγίας β'. πλῆθος, καὶ πρὸς θώρακος πόνους καὶ ἀσάσματα, καὶ πνευματώσεις μετ' οἴνου καὶ ἀφηνθίου, καὶ ἀφροδίσια δὲ παρθρμᾶ μετ' οἰνομέλιτος, ἄγει δὲ καὶ ἕλμινθας πλατεῖαν μεθ' ὕδατος, σύγχει σμά τε ῥιζοῦσι μετ' ἐλαίου πρὸ τῆς ἐπισημασίας, καὶ παραλυτικοῖς, καθαίρει δὲ καὶ ἔφηλιν καταχριθεὶς μεθ' ὕδατος ἢ μέλιτος. μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι καὶ ἀντιδότοις, μιγνύουσι δ' ἔνιοι τὰς ῥωμαλεωτάτας τοῦ κομμαγηνοῦ ἑλενίου ῥίζας, δολοῦντες αὐτὸν, συχρὰς δὲ ἡ διάγνωσις, ὅτε μὲν πυρροῦ τὸν χεῦσιν τὸ ἑλένιον, ὅτε δὲ ὑπωδίαν εὔτονον καὶ πλικτικὴν παρέχει.

leuis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, leuis, vber, vt ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abundè plenus, dēfusus, aridus, à teredinibus non eroſus, fine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excalfactoria, vrinam ciet, mēses pellit, vitijs quæ vuluā malè habent, tam impositu quàm fotu & suffitu auxiliatur. Cōtra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationésque, ex vino & absinthio: venerem ex mulso stimulat, latas ventris tineas ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admistis helenij comageni præduris radicibus, adulterēt, quod deprehēsu facile est: siquidem neq; gustu feruet helenium, neque validū odorem vibrat, vt caput tentare possit.

Περὶ Σχίνου. Κεφ. ις'.

Σχῖνος, ἡ μὲν τις γίνεται ἐν λιβύῃ.

Odoratæ iúcus. Cap. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa

ἡ δὲ,

& Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rusus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisq; est vsus. Vim vrinæ ciundæ habet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè astringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu vtilis sanguinem reijcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum, miscetur antidotis. Radix astringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma vnà cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflãmationibus, ad desidentium fotus vtile est.

ἢ δὲ, ἐν ἀραβίᾳ. ἐτέρα δὲ ἐν τῇ βαταταίᾳ λεγομένη· ἥτις ἐστὶ κρατίστη. δευτερεύει δὲ ἡ ἀραβική, ἣν ἔνιοι βαβυλώνιον καλοῦσιν, οἱ δὲ, τευχίτην. ἡ δὲ λιβυκὴ ἄχρηστος. ἐκλέγειν δὲ τὴν πρόσφατον, ἔμπυρον, πολυανθῆ, ῥιζομένην καὶ ἐμπόρφυρον καὶ λεπτὴν, καὶ ῥοδίζουσαν τῇ ὀσμῇ. ἐπιτείνει δὲ τὴν χροιὰν καὶ γλῶσσαν μετὰ πολλῆς πυρώσεως. χρῶνται δὲ τῷ ἄνθει καὶ τῷ καλάμῳ καὶ τῇ ῥίζῃ. δύναμιν δὲ ἔχει διεκτικὴν, ἐμμιλώσεων ἀγωγὸν, πνευμάτων διαλυτικὴν, κεφαλῆς καρηκαρικὴν, ὑποσύφουσαν μετρίως, ἔτι καὶ βυσσικὴν, πεπτικὴν, καὶ ἀναστομωτικήν. τὸ μὲν οὖν ἄνθος αὐτῆς, ποτίσμασι χρήσιμον πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς καὶ πόνους στόμαχου, πνεύμονος, ἥπατος, νεφρῶν, μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις, ἡ δὲ ῥίζα συπικωτέρα. διὸ καὶ τοῖς ἀστόμοις στόμαχος δίδοται ὑδρωπιῶσί τε καὶ σπάσμασι μετὰ ἴσου πεπέρεως πρὸς ἡμέρας τινάς. τὸ δὲ ἀπόζεμα αὐτῆς, πρὸς μίψαν φλεγμονὰς εἰς ἐγκάθισμα ἁρμόδιον.

Calamꝰ odoratus. Cap. XVII.

Περὶ Καλάμου. Κεφ. ιζ'.

CALAMVS odoratus in India nascitur: melior est fuluus, dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum

Κάλαμος ἀρωματικὸς, φύεται μὲν ἐν ἰνδίᾳ. ἔστι δὲ αὐτῶν κάλλιστος ὁ χρυσοῦς, πυκνογόνατος, καὶ εἰς πολλὰς σκυδαλώδεις θραυόμενος, πλήρων ἀραχίων

ἀραχνίων ἡ σύριγγα, ὑπόλευκος, ἐν ᾧ τῇ διαμασήσῃ γλίσχρος· συπικὸς, ὑπόδριμυς, δριμὺς δ' ὥρα κινεῖν ποδείς. δέον ἀμύζει μὴ ἀγρώστεως ἢ σιλίνε σπέρματος ἀφεψηθεὶς καὶ ποθεὶς, ὑδρωπικοῖς, νεφριτικοῖς, φραγγειώσι, ῥήγμασιν. ἄγει δὲ καὶ ἐμμηνα πτόμβους καὶ ὑστερόμβους, βῆχάς τε ἰᾶται ὑποθυμιώμενος καθ' ἑαυτόν, καὶ σὺν ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ, τῷ καπνῷ διὰ σύριγγος ἑλκομένῳ τῷ σώματι, ἀφίησι δὲ καὶ εἰς ἐγκαθίσματα γυναικεῖα, καὶ ἐκλύσματα, μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι, καὶ θυμάμασι πρὸς εὐωδίαν.

araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Vrinam potu ciet: quare cúgraminis, aut apij semine coctus, in aquæ subter cuté fusę morbo, renum vitiis, stillicidio vrinæ, ruptísq;, cómodè bibitur: mẽses & potu & appositu pellit. tusi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundiné fumo: ad muliebres insessus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagmatísque odoris gratia cómiscetur.

Περὶ Βαλσάμου. Κεφ. ιή.

Βάλσαμον τὸ μὲν δένδρεον κατὰ μέγεθος λευκοίου ἢ πυρακάνθης βλέπεται, φύλλα ἔχον ὅμοια σηπαίῳ λευκότερα δὲ πολλῷ καὶ ἀειθαλλέστερα, ἡμινώμυον ἐν μόνῃ Ἰουδαίᾳ, κατά τινα αὐλῶνα καὶ ἐν αἰγύπτῳ, διαφέρον αὐτὸ ἑαυτῷ τραχύτητι καὶ μίκει καὶ ἰσχνότητι, λέγεται γοῦν τὸ λεπτὸν καὶ τειχῶδες τοῦ βάλσαμου θερμότερον. ἴσως διὰ τὸ εὐχερῶς θερίζεσθαι ἰσχὺν ὄν. Τὸ δὲ ὀποβάλσαμον λερόμυον ὀπίζεται ἐν τοῖς ὑπὸ κυνὸς καὶ μάσην ἐντεμνομένοις σιδήρεσιν ὄνυξι τοῦ δένδρου, ῥεῖ δὲ ὀλίγον, ὡς καθ' ἕκαστον ἔτος μὴ πλεῖον ἢ ἓξ ἢ ἑπτὰ χόας

Balsamũ. Cap. XVIII.

Balsamũ, arbor albæ violę, lycij, siue pyracãthæ magnitudine cõspicitur. Foliũ rutæ proximũ, lógè cãdidius, perpetuò virens: in Iudæa solũ quadã vallo & Ægypto nascés. his differés modis: scabritia, pceritate, gracilitate. Quod igit̃ tenui & capillacea coma est, theristũ vocant quasi demesile: fortassis quoniam ob gracilitatẽ facile demetatur. Æstiuis sub ortu Canis ardoribus, arbos vnguibus ferreis inciditur, manátque è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plures quidé quàm seni septémve congij

congij cògantur, inibíq; pódus duplo repéditur argéto. Succi probatio est, vt sit recés, validi odoris, syncerus, non ad acoré vergés, dilui facilis, lævis, astringés, ac modicè mordés gustu. Sed variè vitiatur, místo ab aliquibus terebinthi, cypri, létisci, balani vnguéto: ité susino, metopio, melle, aut Cypri cera liquida. quod maleficium facilè deprehéditur. Nanq; merus in laneam vestē fusus, neq; macula facit, neq; si eluatur notā relinquit: vitiatus autē inhęret: & lac instillatus coagulat, quod adulterat⁹ nó efficit. Quinetiā syncerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloréq; lactescit: vitiat⁹ verò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modū diffundés. Syncerus senescens crassescit, deteriórq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretū pessum ire, & ad ima sidere arbitrātur, postea dissipatū supernatare. E ligni genere, quod xylobalsamum vocant, probatur recēs, sarmento tenui, fuluum, odoratum, quadámtenus opobalsamum spirās. Necessarius etiā feminis erumpit vsus: quare eligatur flauum, plenum, grande, póderosum, mordés gustu, ferues

χέας συναθροίσει δ', πολεῖ) ϑ ἐν τῷ τύπῳ καθιὸς αὐτῆ πρὸς πλῶν ἀρύριον. ἔστι ϑ ὁπὸς καλὸς ὁ παχύσαρκος, τῇ ὀσμῇ σύντονος καὶ εἰλικρινὴς, καὶ μὴ παροξύνων, εὐδιάντος, λεῖος, σύφων καὶ δάκνων μετρίως ϑ γλῶσσαν. δολοῦται ϑ ποικίλοις, οἱ μὲ γὰρ χρίσμασι μίσγουσιν αὐτό. ὡς τὸ τερεβίνθινον, κύπρινον, ῥήτινον, σίσινον, βαλανίνον, μετώπιον, μέλι, κηρῷ ϑ ιωρσίνην ἢ κυπρίνην ὑγρὰν, λείαν. ἐλέγχε) ϑ τὸ εὐχερῶς ὁ τοιοῦτος ἐπισπείρεις γὰρ ὃ ἀκέραιος εἰς ϑ ἐρίων ὕφος, καὶ ἐκπλυθεὶς, καθίσας ὃ ποιεῖ οὐδὲ στίλον. ὁ ϑ δεδολωμένος προσμένει καὶ γάλακτι ϑ ἐπισπείρεις πήγνυσι ϑ τὸ ὕδωρ. δεδολωμένος ὃ δρᾷ, ἔτι ὁ ἀκέραιος ἐπιχυθεὶς γάλακτι ἢ ὕδατι χεῖται τε καὶ γάλακτος). ὁ ϑ δεδολωμένος ἐπιπλεῖ καθάπερ ἔλαιον, συσφιγόμενος ἢ διαχεόμενος ἀστροειδῶς, τῷ μὲν τοι χρόνῳ καὶ ὁ ἀκέραιος παχυνόμενος, ἐαυτῇ ϑ χείρων γίνεται). πλανῶνται) ϑ ἢ νομίζοντες ϑ τὸν ἀκέραιον ἐπισπείρεσθαι ὕδατι εἰς χαλκεῖν εἰς βάθος πρῶτον. εἶτα ἀναπλεῖν εὐδιάχυτον. * Τὸ ϑ ξύλον ὁ καλεῖ) ξυλοβάλσαμον, δοκιμῶν ὅτι τὸ πρόσφατον καὶ λεπόκαρφον, καὶ πυῤῥὸν εὐῶδες, βραχὺ πικρὸν ὀποδιδόμενον. τὸ ϑ καρπῶ, καὶ γὰρ τούτῳ ἡ χρῆσις ἀναγκαία. ἐκλέγου τὸν ξανθὸν, πλήρη, μέγαν, βαρὺ, δάκνοντα τῇ γεύσει

καὶ πυρσίζοντα, μετρίως παραπνέοντα τοῦ ὀποβαλσάμου, φέρεται δέ τι ἀπὸ τῆς πέτρας, ᾧ δολίζουσι τὸν καρπὸν, σπέρμα ὑπερικῷ ὅμοιον. ὅπερ γνώσῃ ἐκ τοῦ μεῖζόν τι εἶναι καὶ κενὸν καὶ ἀδύναμον, πεπερίζον τῇ γεύσει. δύναμιν δὲ ἔχει ἐνεργεστάτην ὁ ὀπὸς, θερμαντικώτατος ὤν, σμήχων τὰ ἐπισκοτοῦντα ταῖς κόραις, καὶ τὰς περὶ μήτραν ψύξεις ἰώμενος, προστιθέμενος μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς, ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα, καὶ δεύτερα, καὶ ἔμβρυα, καὶ ῥίγη συγχρισθεὶς λύει, καθαίρει δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν. ἔστι δὲ καὶ πεπτικὸς καὶ οὐρητικὸς πινόμενος, δυσπνοοῦσιν ἁρμόζων, καὶ τοῖς ἀκόνιτον πεπωκόσι μετὰ γάλακτος, καὶ θηριοδήκτοις. μίγνυται δὲ καὶ ἀκόποις, καὶ μαλάγμασι καὶ ἀντιδότοις, καὶ καθόλου δραστικωτάτην ἔχει τὴν δύναμιν ὁ ὀπὸς τοῦ βαλσάμου, δευτέραν δὲ ὁ καρπὸς, ἐλαχίστην δὲ τὸ ξύλον. ὁ δὲ καρπὸς πινόμενος, ἁρμόζει πλευριτικοῖς, περιπνευμονικοῖς, βήσσουσιν, ἰσχιαδικοῖς, ἐπιληπτικοῖς, σκοτωματικοῖς, ὀρθοπνοϊκοῖς, στροφουμένοις, δυσουροῦσι, θηριοδήκτοις, καὶ εἰς τὰ γυναικεῖα δὲ ὑποθυμιάματα εὐθετεῖ, καὶ εἰς ἐγκαθίσματα ἀφεψόμενος ἀναστομοῖ τὴν μήτραν, καὶ ἐπισπᾶται ὑγρασίαν. Τὸ δὲ ξύλον τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τῷ καρπῷ, ἥσσονα μέντοι

βοηθεῖ

feruens in ore, modicè opobalsamum olés. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & quàm maximè calfaciens: abstergit quæ tenebras oculorũ pupillis offundũt, medetur per frictionibus vuluæ cum rosaceo cerato appositus: menses quoque, secũdas & partus extrahit, horrores illitu discutit, vlcera sordida expurgat & cruda concoquit, vrinam potu ciet, ægrè spirantibus prodest: datur in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium ictus: miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa, præcipua authoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur doloribus lateris, pulmonum vitiis, tussi, ischiadicis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, vrinæ difficultati, torminibus ac serpentum morsibus: ad muliebres suffitus perquàm vtile est: vuluam aperit in desessionib⁹ balnearũ decoctum, & humorem euocat. Lignũ easdem habet vires, aliquantò minores.

Ex

Ex aqua potum cruditatibus, torminosis, vulsis, venatorum ictibus opitulatur, vrinam cit, ad capitis vulnera cum sicca Iri cóuenit, squammas osium extrahit, & ad vnguentorum spissamenta additur.

βοηθεῖ δὲ ἀφεψηθὲν ὕδατι καὶ πινόμενον ἀπεψίαις, στρόφοις, θηριοδήκτοις, ἀποπληκτικοῖς, πράττει ἄγει, καὶ πρὸς τὰ ἐν κεφαλῇ τραύματα μετὰ ἴριδος αὐτόζει ξηρᾶς, ἀνάγει δὲ καὶ λεπίδας, πήγνυται δὲ καὶ εἰς τὰ τῶν μύρων σύμματα.

Aspalathus. Cap. XIX.

Aspalathus, aliis eryfisceptrum, frutex est furculosus, multis spinis horrens. nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad vnguentorũ spissamenta pigmentarij vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram vergẽs, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Vim calfaciẽdi cum astrictione obtinet. vnde decoctum cum vino ad tetra oris vlcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordida vlcera infunditur: subiectum in pesso, partum extrahit, aluum sistit eius decoctum: & sanguinis reiectioné potu cohibet, vrinæ difficultatem inflationésque discutit.

Περὶ ἀσπαλάθου. Κεφ. ιθ'.

Ἀσπάλαθος, * οἱ δὲ ἐρυσίσκηπτρον, θάμνος ἐστὶ ξυλώδης, ἀκανθας πολλὰς κεκτημένος, γλυνόμενος ἐν ἴσρῳ καὶ νισύρῳ καὶ συρίᾳ καὶ ῥόδῳ, ᾧ χρῶνται οἱ μυρεψοὶ εἰς τὰς τῶν μύρων σύνθεσις. ἔστι δὲ καλὸς ὁ βαρὺς, καὶ μετὰ τὸ ἀφαιρεθῆναι τὸν φλοιὸν ὑπέρυθρος ἢ πορφυρίζων, πυκνὸς, εὐώδης, πικρίζων ἐν τῇ γεύσει, ἔστι δέ τι καὶ ἕτερον εἶδος αὐτῆ λευκὸν, ξυλῶδες, ἄοσμον, ὃ δὴ καὶ χεῖρον καθέστηκε. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν μετὰ στύψεως. ὅθεν πρός τε τὰς ἕλκωσις ἐμβαθεῖς μετ' οἴνου καὶ διακλυζόμενος ἁρμόζει * καὶ πρὸς τὰ ἐν αἰδοίοις καὶ νομὰς καὶ ἀκαθαρσίας ἐγκλυζόμενος, καὶ πρὸς τὰς ἕξεις, ἔμβρυά τε καταπᾶ μιγνύμενος πίνειν, τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτοῦ κοιλίαν ἵστησι· καὶ αἵματος ἀναγωγὴν πόσιν, δυσουρίαν τε καὶ ἐμπυημάτων λύει.

Myrrha. Cap. XX.

Bryon, id est musc°, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro

Περὶ Βρύου. Κεφ. κ'.

Βρύον, ὑπό τινων δὲ σπλάγχνον καλεῖται, εὑρισκόμενον ἐπὶ κέδρῳ

δένδρων κεδρείνων, ἢ λευκίνων ἢ δριάνων. διαφέρει δὲ τὸ *κέδρινον. δεύτερον δὲ τὸ λεύκινον, ἔστι δὲ αὐτῶν τὸ εὐωδέστερον, καὶ λευκὸν καλὸν, τὸ δὲ μελανίζον χεῖρον. Δώδεκα δὲ ἔχει συμπικλῶ ποιοῦντα πρὸς τὰ περὶ μύτρειαν ἐν ἀφεψήματι εἰς ἐγκάθισμα, μίγνυται δὲ καὶ μύρεσι βαλανίνοις καὶ χρίσμασι διὰ τὸ ἐν αὐτῷ συμπικνόν, καὶ εἰς θυμιαμάτων δὲ καὶ ἀκόπων σκευασίαν ἐστὶν εὔθετον.

Περὶ Ἀγαλλόχου. Κεφ. κά.

Ἀγάλλοχον ξύλον ἐστὶ φερόμενον ἐκ τῆς ἰνδίας, καὶ * ἀραβίας θυΐνῳ, ὀστεμβύῳ, ἐυώδες, παρεμφερὲς ἐν τῇ γεύσει μὴ πόσῃς πικρίας, φλοιὸν ἔχον δερματώδη, καὶ ὑποστύπτικον. ποιεῖ δὲ διαμασώμενον καὶ διακλυζόμενον τὸ ἀφέψημα πρὸς ἐυωδίαν στόματος, καὶ διάπασμα ὅλου τοῦ σώματός ἐστι· θυμιῶνται δὲ αὐτὸ λιβανωτοῦ, ἢ δὲ ῥίζα αὐτῆς < ὀλκὴ πυρμύρη, σταφύχου πλάδον καὶ ἀτονίαν καὶ καῦσωνα παρηγορεῖ· τοῖς τε ἀλγοῦσι πλευρὴν καὶ ὑπαρ ἢ δυσεντερικοῖς ἢ φθορυμένοις, ἀρήγει πυρμύρη μεθ' ὕδατος.

Περὶ Νασκάφθου. Κεφ. κέ.

Νάσκαφθον, οἱ δὲ ναρκάφθον, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ἰνδικῆς κομίζεται. ἔστι δὲ φλοιῶδες, συγκαμπὲς λεπισμαῖς ὁμοιος,

cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneum: in quo genere candidum & odoratius præstat, nigricans improbatur. Astringendi vim habet. Decoctum insidentium vuluis vtile: vnguento balanino, oleísque insplssandi gratia inferitur, thymiamatum, acoporúmque compositionibus conueniens.

Agallochum. Cap. XXI.

Agallochũ, lignum est quod ex India atque Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute verius quàm cortice vestitur, aliquantulum versicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. Sudores arcet toto corpori insparsum: prothure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmę vni pondere, humida stomachi vitia, & imbecillitatẽ, feruorémque mulcet: si lateris, iocinerísue dolor excruciat, si dysenteriæ, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Narcaphthum. Cap. XXII.

Narchaphtũ ex India defert, corticosum, simile sycomori libro:

bro quod iucũdi odoris gratia ſuffitur. Miſcetur thymiamatis compoſitis : conſtrictionibus vuluæ ſuffitu prodeſt.

Cancamum. Cap. XXIII.

Cancamum Arabici ligni lachryma eſt, mirrhæ quodammodo ſimilis, viroſi guſtus, quã ad ſuffimenta vſurpant. Veſtes eo, additis ſtyrace & myrrha, ſuffitũtur. Vim proditur obtinere extenuãdi obeſos, ſi ternũm obolorum põdere ex aqua, aut mulſo aceto pluſculos dies ebibatur, lienoſis datur, comitialibus, & ſuſpirioſis: menſes cum aqua mulſa pellit, oculorũ cicatrices confeſtim emẽdat, vino madefactũ medetur eorũdem hebetudinibus, aduerſus gingiuas humore prægnanteis, dolo reſq; dẽtiũ, nõ aliud efficacius.

Cyphi. Cap. XXIIII.

Cyphi odorati ſuffimẽti cõpoſitio eſt, dicata diis, qua abũ dẽ Ægyptij ſacerdotes vtũtur. In antidota miſceri ſolet, ſuſpirioſis datur in potu. Permultæ componendi rationes, quarũ vna hæc eſt: Sumito cyperi dimidiũ ſextarium, cũ pari bacarum iuniperi adultæ modo: vuæ paſſæ pinguis, exẽptis vinaceis, minas duodecim : reſinæ repurgatæ minas quinq; calami

κὸς, θυμιώμενον διὰ τ῀ ξυωδίαν, καὶ μιγνύμενον τοῖς σκευασθῖς θυμιάμασι, ὠφελῖ καὶ μήτραν ἐστιγνωμόνως τὸ θυμιαθέν.

Περὶ Καγκάμου. Κεφ. κγ'.

Κάγκαμον δάκρυόν ἐστιν ἀφαικοῦ ξύλου σμύρνῃ* παραπλήσιος, βρωμῶδες ἐν τῇ γεύσει, ὥσπερ ὡς θυμιάματι χρῶνται. τὸ καπνίζοισι δὲ καὶ τὰ ἱμάτια μὴ σμύρνης καὶ στύρακος. διύαμιν δὲ ἐστρεῖται ἔχειν, ἰσχαντικὴν τῶν καταπιμένων, περιοδόλου πλῆθος πόνομον, συὺ ὕδατι ἢ ὀξυμέλιτι ἐφ' ἡμέρας, δίδοται καὶ πλευριτικοῖς, καὶ σπληνικοῖς, καὶ ἀσθματικοῖς· ἐμμηνά τ' ἄγει σὺν μελικράτῳ, καθαίρει δ' καὶ ταῖς ἐν ὀφθαλμοῖς ταχέως οὐλαῖς, καὶ ἀμαυρώσεις ἰᾶται, σθεῖν οἴνῳ πρός τε μυδήσεις οὐλῶν καὶ ὀδοντολογίας, ὡς οὐδὲν ἕτερον ποιεῖ.

Περὶ Κύφεως. Κεφ. κδ'.

Κῦφι θυμιάματός ἐστι σκευασία καταπεπεισμένη θεοῖς. χρῶνται δὲ αὐτῷ καπνοῦ ὀρεως οἱ ἐν αἰγύπτῳ ἱερεῖς. μίγνυται δὲ καὶ αὐτηδύοσμος, καὶ ἀσθματικοῖς δίδοται ἐν ποτίσμασι. σκευασίαι δὲ αὐτοῦ ἐμφέρονται πλείονες, ἐν αἷς ἐστι καὶ αὕτη· κυπέρου ἡμίξεστον, ἀρκευθίδος ἀδρᾶς τὸ αὐτό· σταφίδων λιπαρῶν ἐκλεγαρτισμένων μνᾶς ις· ῥητίνης ἀποκεκαθαρμένης μνᾶς ε· καλάμου

μοῦ ἀρωματικοῦ, ἀσπαλάθου, χείνου, ἑκάστου μνᾶν ά. σμύρνης < ιϛ'. οἴνου παλαιοῦ ξέστας θ'. μέλιτος μνᾶς β'. ἐκμιγαρτίσας πρῶτα σαφίδα κόψον καὶ λέανον μετ' οἴνου καὶ τῆς σμύρνης, καὶ τὰ ἄλλα κόψας καὶ σήσας, μίξον τούτοις, ἐάσον τε συμτριῆν ἡμέρας ά. εἶτα ἑψήσας τὸ μέλι ἄχρι κολλώδους συστάσιος, μίξον ὀπιμελῶς πρῶτον τὴν ῥητίνην τε τηκῶν· εἶτα τὰ λοιπὰ σωσαπτείσας ὀπιμελῶς ἀποπίθιον εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον.

Περὶ Κρόκου. Κεφ. κέ.

Κρόκος ἐστὶ κράτιστος ὁ ἐαρινὴν χρόαν, ὁ πορφυρος, ὠρόσφατος καὶ εὔχροις, ὀλίγον τὸ λευκὸν ἔχων ὑπὸ τῆς ἕλικος, ὀπιμύκης, ὁλομελής, ἄθραυστος, * αὐτελείπτης, πολύρις, βάπτων ὑ δίδωσι τὰς χεῖρας, οὐα ἀνθρωπῶν ἢ ἰνμάζων, ἐπακτικὸς δὲ ὁ τῆ ὀσμῆ καὶ δριμύς· ὁ γὰρ μὴ τοιοῦτος ἢ παλαιός ὅστιν, ἢ βεβρεγμένος. δευτερεύει δὲ ὁ ἐκ τῆς Θρῄκης λυκίαν καρυκίου, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ λυκιακοῦ ὀλύμπου. εἶτα ὁ ἐξ αἰγῶν τῆς αἰτωλίας, ὁ δὲ κυρηναϊκὸς ὁ ἐκ κνιτοείας, πάντων τῶν κατὰ τὴν σικελίαν, ἀδένης κατὰ δύναμιν, λαχανώδεις ὄντες πάντες. διὰ μὴν τοι τὸ πολύχυλον καὶ εὔχροον οἱ ἐν τῆ ἰταλίᾳ τὴν θύαν βάπτοντες, τούτῳ χρῶνται. πολλοῦ

lami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhae duodecim: vini veteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis: vtuam passam detractis vinaceis tusam, cum vino & myrrha subigito: cætera tusa & cribrata adiicito, die vno humorem cõbibere sinito, dein mel coquito dum sibi glutinis ascisat crassitudinem, eliquatã resinam accuratè permisceto cũ reliquis diligẽter cõtritis, & in fictile vas recõdito.

Crocum. Cap. XXV.

Crocum optimũ in medẽdi vsu coryceũ, recẽs, & boni coloris, paulũ candidi gerẽs in capreolo, oblongũ, omnibus suis partibus cõstãs, nõ fragile, plenũ, à quo detractũ est nihil, qđ madefactũ manus inficit, nec sitũ redolet, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis nõ est, aut vetus, aut humore perfusũ creditur. Secũdus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, è mõte Olympo. dein ex Ægibus Ætoliæ. Cyrenaicũ & Cẽturipinũ inter Sicilica omnia viribus infirmius est. Omniũ natura oleracea. Itali tamẽ ob succi copiã, & coloris venustatẽ, tingẽdis mortariis dicauerunt: quibus

quibus de causis magno venditur, Vtilißimũ in medicina qđ antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ sublitu: contrita, quò pondus adiiciatur, simul argẽti spuma, aut plũbagine: sed maleficiũ declarat insidens puluis, præsertim si defrutum in odorãdo subolet. Thessalus ipsam tantum odoratũ esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habet: vrinam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passo biberint, crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitũ cum humano lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorũ causa tẽperantur: ad vuluę etiã sedisq; cataplasmata, vtiliter inditur: venerẽ stimulat, vergẽtes ad ignẽ sacrum inflãmationes mulcet, auriculariis collectionibus vtile. Quò facilius cõteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; versari. Vrinam mouet radix ex passo pota.

πολλοῦ δὲ πιπράσκεται διὰ τοῦτο. εἰς δὲ τὰ φάρμακα, ὁ προειρημένος ἐστὶ χρήσιμος. δολοῦται δὲ μίξει κροκομάγματος κεκομμένου, ἢ δι' ἑψήματος ὑποδηφθόμενος συντετριμμένου, εἰς τὸ βαρυσταθμῆσαι, λιθαργύρου ἢ μολυβδαίνης. δηλοῖ δὲ ταῦτα τό, τε ἐντρέχον κονιορτῶδες, καὶ τὸ τῆς ὀσμῆς ἑψηματῶδη τυγχάνειν. *Ἔχει δύναμιν πεπτικήν, μαλακτικήν, ὑποστύφουσαν, οὐρητικήν, παρέχει εὐχροιαν, καὶ ἀκραιπάλους ἐστὶ μετὰ γλυκέος πινόμενος· ῥεύματά τε ὀφθαλμῶν ἐπιχριόμενος στέλλει σὺν γάλακτι γυναικείῳ· μίγνυται δὲ καὶ τοῖς πρὸς τὰ ἐντὸς ποτίσμασι χρησίμως, καὶ προσθέμασι καὶ καταπλάσμασι τοῖς πρὸς τὴν μήτραν καὶ δακτύλιον, παρείσησι δὲ καὶ πρὸς ἀφροδίσια, τάς τε ἐρυσιπελατώδεις φλεγμονὰς πραΰνει καταχριόμενος, καὶ εἰς τὰς ὠτικὰς χρησιμεύει· φασὶ δὲ καὶ ἀναιρετικὸν αὐτὸν εἶναι μεθ' ὕδατος πινόμενον πλῆθος < γ'. πρὸς δὲ τὸ εὐλέαντον αὐτὸν γίνεσθαι, δεῖ ἐν ἡλίῳ ψύχειν ἐν ὀστρακίνῳ θερμῷ, ταχέως τε δεῖ στρέφειν, καὶ ἡ ῥίζα δὲ αὐτοῦ πινομένη σὺν γλυκεῖ, οὖρα κινεῖ.

Crocomagma. Cap. XXVI.

Περὶ Κροκομάγματος. Κεφ. κς'.

Fit etiam expreßis vnguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, qđ crocomagma vocant

Τὸ δὲ Κροκόμαγμα γίνεται ἐκ τοῦ κροκίνου μύρου, τῶν ἀρωμάτων ἐκπιεσθέντων, καὶ ἀναπλασθέντων,

δέντων, ἔστ δ' αὐτῆ τὸ ὑυῶδες καλὸν, μέσως καταμύρνον, βαρὺ, μέλαν, ἄξυλον, ἐν τῷ διεθλῶσι ἱκανῶς, κρηκῶδες τῷ χρόαν, λεῖον, ὑοσκύαμον, βάπτον ἰσχυρῶς τοὺς ὀδόντας καὶ τὴν γλῶσσαν, ὀπιμύον τε συχνὰς ὥρας.* Δώσαμεν δὲ ἔχει σμηκτικὸν, τῶν ὑποσκοτούντων τοὺς κόρας. οὐρητικὸν, μαλακτικὸν, πεπτικὸν, θερμαντικόν. ἀναλογεῖ δὲ κατὰ ποσὸν τῇ τοῦ κρόκου δυνάμει. πλεῖστον γὰρ τούτου μετέλαφεν.

vocant. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, læue, subamarum, quod madefactũ croci colorem reddit, gustatumque veheméter dentes ac linguam inficit, multis durãs annis, quale est quod à Syria defertur. Habet suas vires ad delenda quę caliginem oculis obuersant: vrinã cit, calfacit, cõcoquit, & emollit. vires croci proportione quadamtenus repræsentat, quandoquidé plurimam croci partem sibi crocomagma vendicat.

Περὶ ἑλενίου. Κεφ. κζ'.

Ἑλένιον φύλλα ἔχει φλόμῳ τῷ μεγαφύλλῳ παραπλήσια, τραχύτερα δὲ καὶ ὀπιμύκη, κοιλὸν δὲ οὐκ ἀγίνιον ἔν τισι τόποις· ῥίζαν *ὑοσκύαμον, ὑώδη μεγάλην, ὑποδεικνύει, ἀφ' ἧς εἰς τὴν φύτευσιν καθάπερ ἐπὶ τῶν κρίνων ἢ ἀρτον λιπαρὰ παραφυάδες λαμβάνονται. γίνεται δὲ ἐν ὀρεινοῖς καὶ ὑσκίοις καὶ ἀνέμοις τόποις. ὀρύσσεται δὲ ἡ ῥίζα θέρους, καὶ τεμνομένη ξηραίνεται, κινεῖ δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον οὖρα καὶ ἔμμηνα· αὐτὴ δὲ ἡ ῥίζα λαμβανομένη ἐν ἐκλικτῷ μετὰ μέλιτος, ἀφύζει βηξὶν ὀρθοπνοίας, ῥήγμασι, ἀσάσμασιν, ἐμπνεύμασι τόσι, θηλείαν δύναμιν καθόλου θερμαντικὴν ὑπάρχουσαν. τὰ δὲ

Helenium. Cap. XXVII.

Helenium folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdam in locis non emittit: radicé subalbidam, interdum subrufam, odoratam, subacré, vegetam, magnam, ex qua agnatę propagines liliorum aut ari modo seruntur. Montibus in vmbrosis, siccóq; solo prouenit. Foditur æstate radix, particulatimque dissecta siccatur. Potum radicis decoctum menses & vrinas ciet. ipsaq; in eclegmate ex melle prodest tussi, orthopnœæ, ruptis, cõuulsis, inflationibus, & serpentiũ morsibus. In summa excalfaciens.

Folia ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinũtur. Heleniũ sto macho vtile in passo cõditũ: siquidem salgamarij paululum siccatam radicem, mox decoctum, & frigida aqua madefactam, in sapam conijciunt, & ad vsus recondunt. Trita potáque ad cruentas excreationes efficax est.

Heleniũ Ægyptiacum.

Cap. XXVIII.

Alterũ helenij genus in Ægypto gigni Crateuas tradit: herba est cubitalibus ramulis, serpilli modo per humum repentibus, foliis lenticulæ circa ramos, sed longioribus crebrísque, radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis collibúsque. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacium, oleúmq;

Cap. XXIX.

Oleũ quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos vsus rectè valétibus accómodatissimũ: omphacinũ id appellatur. Præstat recés, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho vtile

τὰ δὲ φύλλα αὐτῆς ἐπιπλάττει τὰ ἀφεψηθέντα μετ' οἴνου, ἰσχιαδικοῖς ὠφελίμως· ἔστι δὲ καὶ ἐυστόμαχος ταριχευθεῖσα ἐν γλυκεῖ· ξηράναντες γὰρ αὐτὴν ὀλίγον οἱ ἁλμευταὶ, εἶτα ἀφεψήσαντες, ἀποβρέχουσιν ὕδατι ψυχρῷ· εἶτα βάλλοντες εἰς ἕψημα, ἀποτίθενται εἰς χρῆσιν, ποιεῖ δὲ λεῖα πρὸς μύξαν, αἱμοπτοϊκοῖς.

Περὶ Ελενίου ἀμυγδαλίνου.

Κεφ. κή

Ελένιον ἄλλο ἰσχυρὸν κρατεύας γινώσθω ἐν αἰγύπτῳ· πόα δὲ ὀξυκλώνας ἔχουσα πηχυαίους, ἐπὶ γῆς ἐρριμμένοις ὥσπερ τὸ ἕρπυλλον. φύλλα δὲ τοῖς τοῦ φακοῦ ὅμοια, μακρότερα δὲ καὶ πολλὰ ἐπὶ τοῖς κλωνίοις, ῥίζαν ὠχρὰν, πάχος δακτύλου μικροῦ, κάτωθεν λεπτὴν, αὔωθεν δὲ παχυτέραν, φλοιὸν ἔχουσαν μέλανα. φύεται δὲ ἐν παραθαλασσίοις τόποις καὶ χαλκόφοις. Δύναμιν δὲ ἔχει μετ' οἴνου πινομένη μία ῥίζα, σκιοδήκτοις βοηθεῖν.

Περὶ Ελαίου ἀμυγδαλίνου.

Κεφ. κθ'.

Ελαιον πρὸς τὰ ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν ἄριστον τὸ ἀμυγδαλίνου· ὃ καὶ ὀμφάκινον καλεῖται· τούτου διαφέρει τὸ νέον. ἄδηκτον ἐυῶδες, χρήσιμον δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ εἰς τὴν τῶν μύρων κατασκευήν. ἔστι δὲ καὶ ἐυστόμαχον διὰ

μὰ τὸ σύφειν· καὶ οὖλων παλτικόν· καὶ ὀδόντων κραπωτικόν, κρατύνμυον ἐν τῷ στόματι. καὶ ἰδρώτων ἐφεκτικόν.

Περὶ Ελαίου κοινῶς. Κεφ. λ'.

Τὸ δὲ καὶ παλαιότερον καὶ λιπαρώτερον, εἰς τὴν τῶν φαρμάκων χρῆσιν εὔθετον. κοινῶς δὲ πᾶν ἔλαιον, θερμαντικόν ἐστι καὶ μαλακτικὸν γαστρὸς, διαπερίψυκτον φυλάσσον τὸ σῶμα, ἐτοιμότερον πρὸς τὰς ὑγείας ποιῶν. ἔστι δὲ καὶ εὐκοίλιον καὶ μαλακτικὸν, ἀμβλύνον τε τὰς τῶν ἑλκόντων φαρμάκων δυνάμεις ἐν τῇ μίξει, δίδοται δὲ καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα συνεχῶς πινόμενον καὶ ἐξεμούμενον. καθαίρει δὲ ὅσον κοτύλιον σὺν πιτύης ἴσῳ χυλῷ πυθέν ἢ ὕδατι. φορυμένοις τε ἐν πόλῳ, ὠφελίμως δίδοται μὴ πηγαίᾳ ἐμφθὲν *κυάθων ἓξ πλῆθος, ἐλμινθάς τε ἐκβάλλει, καὶ ἐνίεται δὲ τὸ αὐτὸ, μάλιστα πρὸς τὰς εἰλεώδεις. τὸ δὲ παλαιὸν θερμαντικώτερον καὶ διαφορητικώτερον· πρὸς ὀξυδορκίαν τε τὸ πάλαιμμα, μικλέον δὲ εἰ μὴ παρείη παλαιὸν ἔλαιον ὕστω, *κατακεράσας εἰς ἀγγεῖον τῶ παρόντος τὸ χρεῶδες, ἕως ἔχῃ μέλιτος πάχος καὶ χρῶ ᾗ χρῶ τὸ αὐτὸν τῷ προφερομένῳ εἰσφέρεται δυνάμιν.

Περὶ Ελαίου ἐκ τῶ ἀγρίας ἐλαίας. Κεφ. λά.

Τὸ δὲ ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας ἔλαιον, *συντικώτερον, πρὸς μὲν τὰ

vtile est, quòd astringat: gingiuas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore, sudores cohibet.

Oleū cōmune. Cap. XXX.

Et quò vetustius ac pinguius, eò ad medicamenta aptius est. Et (vt reliqua in commune dicantur) omne oleum calfacit, emollit ventrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsúmque promptius ad obeunda munera reddit, aluū emollit, vlcerátium venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur, assiduè potū red ditúmque vomitionibus, soluit aluum heminæ mensura cū pari ptisanæ succo aut aqua potum, ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextariis in potu datur, ventris animalia pellit, idem maximè ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorum claritati sublitū confert. Si vetusti non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, vt vetustaté repræsentet.

Oleum sylvestris oliuæ. Cap. XXXI.

Oleū qđ sylvestres oliuę fundūt, vehemēter astringit, & ad

ſanorũ vſus ſecundũ ſibi locũ vẽdicat. In doloribꝰ capitis vtiliter ꝓ roſaceo ſubſtituitur, ſudores arcet, defluẽtes capillos inhibet, furfures, vlcera capitis manãtia, ſcabiẽ lepráſq; abſtergit: tardius canitiẽ ſentiũt, qui eo quotidie perunguntur.

Oleũ candidũ. Cap. XXXII.

Candidum oleũ fit hoc modo: Album colore, nec anniculo vetuſtius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum menſura, & ſub ſolem media quaque die cõcha refunditur: ex altóque demittitur, vt aſsidua deuolutiõe, ictúque agitatú reſpumet: octaua die fœnumgrecũ mũdũ quinquaginta denariorũ pondere, calida aqua madefactũ donec emolleſcat, in ſupradictũ oleũ deiicitur, ita ne extillet aqua: poſtea tedæ præpinguis piceę, aſſulatim cæſæ æquale pondus adiicitur, & trãſactis octo diebus, oleũ cõcha mouetur. Vbi candoré contraxerit, in vas nouũ vetere vino affuſum recõdi debet, ſubſtratis ſertulæ Cãpanę corollis drachmas vndecim pẽdentibus, cũ pari iridis pondere: ſin minus, rurſus ſoli mãdandũ, & idem munus obeundum, vſque dum inalbeſcat.

Sicyoniũ.

ἢ ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν, ἀλεύρου. κεφαλὴν χρῶσι δὲ αὐτῷ ῥοδίνῳ ἀμύζει, ἐπέχει καὶ πεί χασιν οὔσας, ἀποσμήχει δὲ καὶ πίτυρα, καὶ ἀχῶρας, καὶ ψώρας, καὶ λέπρας· βρᾶδιον ἢ πολιοῖ καθ' ἑκάστην ἡ- 5
μέραν ἐπαλαιφόμενον.

Ελαιον λευκόν. Κεφ. λϛ'.

Λευκαίνει ὃ ἔλαιον ὅπω λαβὼν τὸ τῇ χρόᾳ μᾶλ λευκὸν, ἢ ὑλικίαν ὃ μὴ πλέον ἐνιαυσίου, ἔχει εἰς χαλκέων ἀγγεῖον πλατύστομον, χωνὸν, 10
ἔσω ὃ μέλιτι κολλυβαρ'. εἶτα θεὶς ὑφ' ἥλιον, ἀνάχει κόσχῳ καθ' ἑκάστην ἡμέραν κ' τὸ μέσον. ὑφάθι τῇ καθαφορᾷ χρώμενος, ἵνα τῇ συνεχεῖ κινήσει καὶ πληγῇ μεταβάλλῃ καὶ ἀφρίσῃ. τῇ δὲ ἕβδομῃ ἡμέρᾳ, βρέ- 15
ξας πίλεως καθαρᾶς < ν'. ἐν ὕδατι θερμῷ, ἔμβαλε μαλακὴν χλωμὴν εἰς τὸ φερόμενον ἔλαιον χωρὶς τῆς σταγίσιν τὸ ὕδωρ· προσαπόδος ὃ καὶ δαλὸν πιτύινον ὡς ὅπι λεπαρώτατον καὶ εἰς λεπτὰ κατεσχισμέ- 20
νον ταῖς ἴσαις ἐλαχὰς, καὶ ὅτως ἔασον ἄλλας ὁλόκληρους ἡμέρας ἑπτὰ θεῖν· μεθ' ὃ ταῦτας ἀνάχει τῷ κόσχῳ τὸ ἔλαιον. τὸ δὲ λοιπὸν εἰ μὲν εἴη τέλειος πεπυκνός, εἰς χωνὸν ἀγγεῖον σφο- 25
εκλυσμένον, οἴνῳ παλαιῷ καὶ ακεράσας, ἀποτίθεσο προϋπεσπεισμένων μελιλώτων στεφανίσκων· ἀλίσκων ὁλκῶν ιά. καὶ ἔρεως τ ὅσης· εἰ δὲ μὴ, πάλιν ἐν ἡλίῳ θέλεον αὐλό. καὶ ἐρεσίον ἄχρις ἂν λευκὸν γένηται.

Περὶ

Περὶ Σικυωνίου ἐλαίου.

Κεφ. λγ.

Ενεστὶ δὲ τῷ σικυώνιον τὸ σκευαζόμενον οὕτω σκευάζειν· εἰς λέβητα καινοτέρωμένον, πλατύστομον, ἐγχέας νέου ἐλαίου ὡμοτέρου τοῦ λευκοῦ χόα ά. καὶ ὕδατος ἡμίχοα, ἕψε κούφῳ πυρὶ κινῶν σφοδρῶς· ὅταν δὲ ἀναζέσῃ δὶς, ὑπόσπασον τὸ πῦρ καὶ ψύξας ἀποκόνησον τὸ ἔλαιον, εἶτα ἄλλο ἐπιβαλὼν ὕδωρ συναναζέσον αὐτῷ καὶ τὰ λοιπὰ ποιήσας καθὼς σοι ὑποδέδεικται, ἀπόθου. σκευάζεται δὲ τοῦτο μάλιστα ἐν σικυωνίᾳ σικυώνιον καλούμενον. Δύναμιν δὲ ἔχει ποσῶς θερμαντικὴν, ἀρμόζον ἐν πυρετοῖς καὶ τοῖς σὺν νεύροις πάθεσι. χρῶνται δὲ αὐτῷ καὶ γυναῖκες, ὅπῃ πρὸς * σιλφίῳ.

Ρύπος βαλανείων.

Κεφ. λδ'.

Ο ὑπὸ τοῖς βαλανείοις συναθροίζόμενος, διὰ ὠὰ θερμαίνῃ, μαλάσσειν, διαφορεῖν, ῥαγάσι τε καὶ κονδυλώμασιν ἐν διαχρίσεσι.

Ρύπος ἐκ τῆς παλαίστρας.

Κεφ. λέ.

Ο δὲ ὑπὸ τῆς παλαίστρας συνειλημμένος τῷ κόνιν, ἐοικὼς δὲ ῥύπῳ, τὰς περὶ τοὺς κονδύλους συρροὰς ὑπιδέμενος ὠφελεῖ· καὶ ἰσχιαδικοὺς θερμῶς αὐτὶ μαλάγματος ἢ πυρίας ὑπιδέμενος.

Sicyonium. Cap. XXXIII.

Sicyonij componendi ratio hæc est: In lebetē oris lati stanno inductum, funditur olei albi quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius vnus, aquæ semicongius: leui id igne coquitur, leniter mouendo: at vbi bis efferbuit, & subtracto igne refrixit, innatans oleū concha decapulatur, & adiecta noua aqua cōferuescit, & reliquis vt diximus peractis reponitur. In Sicyonia maximè fieri cōsueuit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriā ad quendam vsq; modum vim habet. Febri ac neruorum vitiis prodest. fœminę ad commendandum faciei nitorē eo vtūtur.

Strigmenta balnearum. Cap. XXXIIII.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt: ad sedis rimas & condylomata illinuntur.

Strigmēta palæstrica. Cap. XXXV.

Illa verò quæ ex palæstris puluerē sibi asciuerunt, in sordis speciem redacta, articulorum nodos impositā adiuuāt: ischiadicis in fotus aut malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur.

Strigméta gymnaſiorú.
Cap. XXXVI.

Deraſę gymnaſiorum parietibus ſimulacriſque ſordes, calfaciunt: tubercula, quę ægrè ad coctionem perducuntur, diſsipant: deſquammatis & vlceribus ſenum proſunt.

Elæomeli. Cap. XXXVII.

In Palmyris Syriæ, quod eleomeli vocant, ex quodā caudice manat, oleum melle craſſius, ſapore dulci. Bilem, cruditatéſq; detrahit, ſextario cū vna aquæ hemina dato. Sed qui ſumpſere, torpeſcunt & viribus deficiuntur: quod minimè vereri oportet, verúm crebrò excitare, ne veterno preſſi ſomnos captent. Fit & oleum è pinguitudine ſurculorum oleę: optimum vetus, craſſum, pingue, non turbidum. Calfacit, priuatímque caliginibus oculorum illinitur: lepras, neruorúmque dolores illitum emendat.

Cicinum oleum.
Cap. XXXVIII.

Cicinum oleū hoc modo tēperatur: Maturi ricini qua voles quātitate torrido ſole flacceſcunt, & vuarū more inſtrati tātiſper inſolātur, dū veſtiēs cortex

Ρύπος γυμναϲίων.
Κεφ. λϛ'.

Καὶ ὁ ἐν τοῖς τῶν γυμναϲίων τοίχοις ῥύπος, καὶ ὁ ἀπὸ τ' αὐθμιαύτων, θερμαίνῃ τὲ καὶ διαχεῖ τὰ δύϲπεπτα φύματα, καὶ πρὸς ἀποσύρματα καὶ πρὸς ἕλκη ϲηϲυντικὰ ἁρμόζει.

Περὶ ἐλαομέλιτος.
Κεφ. λζ'.

Ελαόμελι κτ' παλμυρᾷ τ' συρίας ἔκ τινος στελέχους, ἔλαιον μέλιτος παχύτερον ῥεῖ, γλυκὺ τῇ γεύϲῃ, ὅϲῳ πινόμενον πλῆθος κυάθων β' μ' κοτύλης μιᾶς ὕδατος, ἄγει κατὰ κοιλίαν ὠμόν· καὶ χολώδες· ἔννωθροι δ' γίνονται καὶ ἔκλυτοι οἱ λαμβάνοντες, ὅϲῳ ϲ δεῖ ϲυλαβεῖϲθαι, διεγείρειν δὲ αὐτοὺς μὴ ἐῶντας καταφέρεϲθαι. ϲκεπάζεται δὲ καὶ ἐκ τῶ λίπους τ' θηλῶν ἔλαιον· ἔϲτι δὲ αὐτῆ κάλλιϲτον καὶ παλαιὸν, καὶ παχὺ καὶ λιπαρὲν, οὐ τεθολωμένον· θερμαίνει δὲ ἰδίως πιτυΐνῃ πρὸς τὰ ὀπιϲκοτοῦϲπα τῶν κόραις ὀπιχριόμενον, καὶ λέπρας καὶ ἀλγήματα ϲὺν νεύρῳ ἐγχριόμενον ὠφελεῖ.

Περὶ κικίνου ἐλαίου.
Κεφ. λή.

Κίκινον ἔλαιον ϲκευάζεται τούτῳ τῷ τρόπῳ· λαβὼν ὡρίμων κροτώνων ὅϲον ἂν δόξῃ, καὶ ψύξας εἰς ἥλιον, καταϲτώϲας ὑπολεπέϲθω τρόπον ἕως ἂν ὁ περικείμενος φλοιὸς

φλοιὸς ἀποῤῥαγεὶς ἐκπέσοι, συναλαγὼν τὴν σάρκα, ἔμβαλε εἰς ὅλμον καὶ κόψας ὀπιμιγῶς εἰς λέβητα καινὸν ἀστερωμένον βάλε, ὕδωρ ἔχοντα, καὶ ἀνάθρασον ὑποκαίων, ὅταν δὲ ἀνῶσι τὴν ἐν αὐλοῖς ὑγρότητα πᾶσαν, ἄρας τὸν λέβητα ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἀποψαύσας τὸ ἐπιπλέον ἔλαιον καὶ ἀποτίθεσο. οἱ δὲ αἰγύπτιοι διὰ τὸ δαψιλῶς χρῆζειν, ἕτερος αὐτὸ σκευάζουσι, μὴ δὲ τὸ καθάραι εἰς μύλην ἀποδιδόντες τῶν χρότωνας, ἀλήθουσιν ὀπιμελῶς· εἶτα εἰς σανιδίας ἐμβαλόντες τὸ ἀλισθὲν, διὰ ὀχάνου ἐκθλίβουσιν, ὥσει μοι δέ εἰσιν οἱ χρότωνες, ὅταν ὑπὸ τῶν περιεχόντων αὐλοὺς σφαιρίων ἀπολύωνται. ποιεῖ δὲ τὸ κίκινον πρὸς ἀχῶρας καὶ ψώρας καὶ ταῖς ἐν ἕδρᾳ φλεγμοναῖς, πρός τε ὑστέρας μύσεις καὶ διαστροφάς· ἔτι δὲ οὐλὰς ἀφαιρετεῖς καὶ ὠτιδῶν, ἐμπλάστροις τε μιγνὺς, ἐμφακτοτέρας αὐτὰς ἐργάζεται· ἄγει δὲ καὶ κοιλίαν ὑδατώδεις ποδὸς, ἀκρίνει δὲ καὶ ἕλμινθας.

cortex fractus decidat. Caro colligitur, & conjecta in pilam diligenter tunditur: postea in lebetem stanno illito, qui aquam habeat, demittitur, subiectóque igni feruescunt: & vbi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni vase, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Ægypto, vbi largior increbuit vsus, longè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos molæ mandant, & accuratè molitos per sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cùm continentibus orbiculis exuuntur. Ad pforas, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vuluis conuersis atque præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficicaciora reddit additum, potu aquâ aluo extrahit, ventris animalia pellit.

Περὶ Ἀμυγδαλίνου ἐλαίου.

Κεφ. λθ.

Ἀμυγδάλινον ἔλαιον ὅ τινες μετόπιον καλοῦσι· σκευάζεται οὕτως· ἀμυγδάλων πικρῶν * χδβ'. καθάρας καὶ ξηράνας, κόψον ὑποῤῥυὲν λίνῳ ἐν ὅλμῳ κούφως μέχρις μᾶζα γένηται, ὀπιχέας τι ζεστοῦ ὕδατος κοτύλας β'.

Amygdalinũ. Cap. XXXIX.

Amygdalinum oleum, quod aliqui metopium vocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatísque, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquę quæ ferbuerit sextarius adiicitur,

 & vbi

& vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quàm antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Presis nucibus rursum hemina aquæ inspergitur, & postquam ebiberint: idem opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundé locorũ inflammationes, & efficax est: vitiis renum, calculosis, difficili vrinæ, suspiriosis, lienosisque proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitúsque discutit: maculas & vitia cutis tollit è facie, & eam erugat cũ melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo cerato: & oculorũ hebetudines emendat, vlcera capitis manãtia & furfures cum vino abstergit.

ἕα συμπιεῖν ἡμιώβολον, ἀφ' ἧς πάλιν βιαιότερον τείνε, εἶτα ἀποθλίβων πρὸς πλάκα ἐξίπου, καὶ τὸ ἀπὸ τῶν δακτύλων εἰς μύακα ἀναλάμβανε· εἶτα πάλιν εἰς τὸ ἀποτεθλιμμένον κοτύλιον ὕδατος μίαν ὀπτήσας, καὶ συμπιεῖν ἐάσας, τὸ αὐτὸ ποίει. ἀποδίδωσι δὲ κοτύλια ἃ τὸ πεζαχόινικον. ποιεῖ δὲ πρὸς τὰς ἐν μήτρᾳ ἀλγηδόνας καὶ πήγας ὑστερικὰς, διαστροφάς τε καὶ φλεγμονὰς τῶν αὐτῶν τόπων· ἔτι δὲ κεφαλαλγίας καὶ ὤτων πόνους, καὶ ἤχους καὶ συριγμούς· ὠφελεῖ δὲ καὶ νεφριτικοὺς, καὶ δυσουριῶντας, καὶ λιθιῶντας, καὶ ἀθματικοὺς, καὶ σπληνικούς· αἴρει δὲ καὶ σπίλους ἐκ προσώπου, καὶ ἐφήλεις καὶ ῥυτίδας, μέλιτι μιγνύμενον καὶ κρίνου ῥίζῃ καὶ κυπαρίνῃ ἢ ῥοδίνῃ κηρωτῇ, καὶ ἀμβλυωπίας δὲ ἐστιν ἀναστηπτικόν· σὺν οἴνῳ δὲ ἀχῶρας καὶ πίτυρα σμήχει.

Sesa-

Balaninum.

Cap. XL.

Simili modo fit Balaninum oleum, quod repurgat maculas, lentigines, varos, & cicatrices nigras. Aluum soluit, stomacho aduersatur, contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum.

Περὶ Βαλανίνου ἐλαίου.

Κεφ. μ΄.

Εἰκότως δὲ καὶ τὸ βαλάνινον σκευάζεται· δύναμιν δὲ ἔχει καθαρτικὴν σπίλων, φακῶν, ἰόνθων, οὐλῶν μελανίας, κοιλίας καθαρτικὴν, ἔστι δὲ κακοστόμαχον· ἀρμόζει καὶ ὠταλγίαις, καὶ ἤχοις, καὶ συριγμοῖς, μετὰ χηνείου στέατος ἐγχεόμενον.

Elaion

Ελαιον σησάμινον. Κεφ. μά.

Ομοίως δὲ σκευάζεται τοῖς προειρημένοις, τὸ, τι σησάμινον ἐκ τοῦ σησάμου.

Ελαιον καρύϊνον. Κεφ. μβ'.

Καὶ τὸ καρύϊνον ἐκ τῶ βασιλικῶν καρύων συνπιέζεται. δύναμιν δ' ἔχει τ' αὐτὴν τῷ βαλανίνῳ.

Περὶ Ιοσκυαμίνου ἐλαίου. Κεφ. μγ'.

Καὶ τὸ ὑοσκυάμινον δὲ σκευάζεται ὅταν λαβὼν τὸν λευκὸν καρπὸν ξηρὸν πρόσφατον καὶ κόψας, ὕδατι θερμῷ φύσα ὡς προείρηται ἐπὶ τοῦ ἀμυγδαλίνου. ἐλαίζων δὲ τὰ ὑπὸ χεῖρα ἐπαινόμενα αὐτοῦ μέρη, τῷ ὅλῳ ἀναμίσγε· καὶ τὸ αὐτὸ πάλιν ἄχρις ἂν μελανθῇ καὶ δυσῶδες γένηται· εἶτα διηθήσας καὶ ἐκθλίψας ἀποτίθεσο. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ὠταλγίας, καὶ πεπονῆς μίγνυται μαλακτικὸν ὄν.

Περὶ Κνιδιλαίου. Κεφ. μδ'.

Ομοίως δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ κνιδέου σκευάζεται κόκκου λεπτυνθέντος καὶ κοπέντος, καθαρτικὴν δὲ ἔχει δύναμιν κοιλίας πιόμενον.

Περὶ Κνικελαίου. Κεφ. με.

Ωσαύτως δὲ καὶ τὸ κνικινοσκευάζεται. δύναμις δ' ἡ αὐτὴ τῷ διὰ τ' κνιδέου κόκκου, ἀσθενεστέρα δὲ μᾶλλον.

Περὶ Ραφανελαίου. Κεφ. μς'.

Τὸ δὲ ραφάνινον σκευάζεται ἐκ τ' αὐτ' σπέρματος ὥς περ καὶ τὰ λοιπά. τοῖς ἐκ νόσου δὲ φθειριῶσιν ἀρμόζει, καὶ τὰς ἐκ τοῦ προσώπου σμήχει

Sesaminum. Cap. XLI.

SIMILIS sesaminij ratio.

Caryinũ. Cap. XLII.

Fit etiã è nuce iuglãde oleũ, quod caryinũ vocant. Eádem vim habet quam Balaninum.

Hyoscyaminũ. Cap. XLIII.

Hyoscyaminum sic fit: Semẽ candidum, recens ac siccũ tũditur, & calida aspergĩt aqua, vt in amygdalino diximus, dr̃que insolatur, siccatæ, quæ sub manu sunt, partes cum reliqua massa permiscentur: hoc autẽ fieri oportet dum nigrescat & grauiter oleat: mox pressũ atq; excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est, pessis misceatur, ad emolliendũ vtile.

Gnidicũ oleũ. Ca. XLIIII.

Fit & è grano gnido purgato & tuso. Vis ei aluum soluere potu.

Cnicinũ oleũ. Cap. XLV.

Non secus cnicinum oleũ temperatur: cui facultas eadẽ est quæ facto è gnido grano, verum inualidior.

Oleũ Raphanicũ. Ca. XLVI.

Raphaninum è raphani semine fieri solet, cæterorum more. Phthiriases mala valetudine contractas tollit, scabritias

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

britias cutis in facie emendat. Ad obsonia vtuntur Ægyptij.

Melanthinum oleum.

Cap. XLVII.

Melanthinum idem quod raphaninum potest.

Oleũ Sinapicũ. Cap. XLVIII.

Tritũ sinapis semẽ, & calida aqua madefactũ, adiecto post ea oleo exprimit, id ad diuturnos dolores efficax est, trãsfert humores q in aliqua parte cõcreuerũt. Mirteũ. Cap. XLIX.

Myrtei faciũdi ratio hęc est: E myrto nigra sylvestri, aut satiua, foliorũ molissima quęque tusa premunt: succo pares omphacini olei portiões adiiciũt, subiectisq; carbonib⁹ iferuescũt donec cõcoquant, innatãs oleũ deradit. Sed lõgè facilior hęc cõpositio: Tenera folia cõtusa coquũt in oleo & aqua, & qđ innatat eximit. Priuatim alij deiecta i oleũ folia i sole macerãt: alij pri⁹ oleũ ispissant malicorio, cupresso, cypiro et iũco odorato. Efficaci⁹ est amarum gustu & oleosũ, viride, translucens, & olens myrtũ. Astringit ex indurat, ideò medicamentis miscetur quæ cicatricẽ obducunt: prodest vlceribus in capite manantibus, ambustis igni &

σμήχει τραχύτατας. χρῶνται δὲ αὐτῷ οἱ ἐν αἰγύπτῳ τοῖς σφυσφάμασι συνέχοντες αὐτό.

Περὶ Μελανθελαίου. Κεφ. μζ'.

Καὶ τὸ μελάνθινον δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, καὶ σκευασίαν τῷ ῥαφανίνῳ.

Περὶ Σιναπελαίου. Κεφ. μη'.

Τὸ δὲ σινάπινον σκευάζεται, λεαινομένου σινήπεως καὶ βρεχομένου ὕδατι· ψυχρῷ, ἔπειτα μιγνυμένου ἐλαίῳ, καὶ συνεκθλιβομένου· ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ χρόνια ἀλγήματα μετὰ σύγχρισιν. Περὶ μυρσινελαίου. Κεφ. μθ'.

Μυρσίνινον δὲ σκευάζεται οὕτως· λαβὼν τὰ ἁπαλὰ φύλλα τῆς μελαίνης μυρσίνης ἢ ἀγρίας ἢ ἡμέρου, κόπτε πίζων· ἴσον δὲ τῷ χυλῷ, ἐλαίου ὀμφακίνου μίσγων, χλίαινε ἐπ' ἀνθράκων, ἕως ἂν σωσφυηθῇ αἴρων τὸ ἐφισάμενον. εὐκοπωτέρα δὲ σκευασία, τὰ ἁπαλὰ τῶν φύλλων κόψαντα, ἕψην μὲθ' ὕδατος, καὶ ἐλαίου, καὶ τὸ ἐφισάμενον ἀποψᾶν, ἰδίως δὲ τὰ φύλλα καθέντα εἰς ἥλιον, ἐν ἐλαίῳ ἀποβρέχειν. ἔνιοι δὲ μετρύφοισι τὸ ἔλαιον σιδίοις, κυπαρίσσου, κυπείρῳ, σχίνῳ. ἔστι δὲ ἐμπρακτικώτερον τῇ γεύσει πικρίζον, καὶ ἐλαιῶδες, χλωρὸν, διαφανὲς ὅζον μυρσίνης. Δύναμις δὲ αὐτῆς συστατικὴ, σκληρωτικὴ, διὸ καὶ ποιεῖ μιγνύμενον ἀπουλωτικῶς, καὶ πρὸς πυείκμασι, ἀχῶρας, πήπυ-

ες.

ρα, ἐξανθήματα, παρατείμματα, ῥαγάδας καὶ ὑλώματα ἄρθρα κεχαλασμένα· ἰδρῶτας στέλλει, καὶ ὅσα σύψεως ἢ πυκνώσεως ἔχει χρείαν.

Περὶ Δαφνελαίου.

Κεφ. ν'.

Τὸ δὲ δάφνινον σκευάζεται διὰ τῶν δαφνίδων, ὅταν ὧσι ῥυσπετεῖς, ἐψωμένων μὲθ' ὕδατος· ἐν ᾧ τῷ φοινικικῷ λέπους, ἀνίσην λιπαρίαν πνέ, ὧν διακόψαντες χρῶν εἰς μύαγρας ἀναλαμβάνουσιν. ἔνιοι δὲ ὀμφάκινον ἔλαιον θερύψαντες, κυπείρῳ, καὶ ῥόδῳ καὶ καλάμῳ καὶ μετὰ ταῦτα δάφνης φύλλα ἁπαλὰ βαλόντες, σωφίουσιν. οἱ δὲ, καὶ δαφνίδας ἕως ἂν ἱκανὸν χλόντων τῇ ὀσμῇ. ἔνιοι δὲ καὶ σύραγα μίσγουσι καὶ μυρσίνῳ. ἀείσει δὲ θερὸς σκευασθὲν ἢ ὀρεινὴ ἢ πλατύφυλλος δάφνη. διαφέρει δὲ τὸ δαφνίνου τὸ θερόφατον, χλοερὸν τῇ χρόᾳ, πικρότατον, δριμύ. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, ἀνασωματικὴν, κόπων λυτικήν. ἁρμόζει καὶ τοῖς θερὶ τὰ νῶτα πάθεσι πᾶσι, καὶ ὠταλγίαις, καὶ καταῤῥοιζουμένοις*· ἔστι δὲ καὶ ναυτιῶδες πεθέν.

Περὶ Σχινελαίου. Κεφ. νά.

Τὸ δὲ σχίνινον ὁμοίως ἐν τῷ καρπῷ πιπερίου σκευασθὲν, ὡς τὸ δάφνινον, θερυφθὲν. ὑγιάζει

& papularũ eruptionib⁹. Facit ad attrita & furfures, ſedis rimas, cõdylomata, articulos laxatos, corporis ſudores cõpeſcit, & omnia quæ aſtrictionẽ inſpiſſationemq; deſiderant.

Laurinum. Cap. L.

Laurinũ fit hoc modo: Lauri baccæ cum maturæ ſunt, in aqua coquuntur: ſiquidem ex obducto cortice quandã pinguitudiné reddunt, quæ manibus ſubacta, cõcha excipitur. Alij omphacinũ prius oleũ cypiro, iũco odorato, & calamo inſpiſſant, deinde tenera lauri folia cõcoquũt. alij etiam baccas, donec oleũ odoré cõtraxerit. alij ſtyracé & myrtũ addunt, Optima laurus ad id latifolia & montana. Oleũ laurinũ vtilius quò recẽti⁹, quoq; viridius colore: amariſimũ, & acre. Vis ei excalfactoria, emolliens: venarũ ſpiracula aperit, laſsitudines diſcutit, omnibus neruorũ vitijs, algoribus, deſtillationib⁹, auriũ doloribus, malis renum frigore cõtractis, illitũ non aliud iuuantius: attamen potum nauſeam parit.

Lentiſcinum. Cap. LI.

Similis lẽtiſcini ratio.. Nã é maturo fructu tẽperatã, factis prius ſpiſſamẽtis, vt í laurino diximꝰ.

Hoc

Hoc ſcabiem iumentorum canúmque ſanat, vtiliſsimũ peſſis, acopis, & leprarum medica métis: ſudores cohibet. Nec ſecus terebinthinum fieri ſolet, quod refrigerat & aſtringit.

Maſtichinum. Cap. LII.

Maſtichinum è trita fit maſtiche, quod contra omnia vulnæ mala efficax eſt: mediocriter calfacit, aſtringit, & emollit. Aduerſus prominentes ſtomachi duritias, cœliacorum, dyſentericorúmque cruciatus vtile: facié emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio inſula componitur.

Vnguentorum cópoſitio. Cap. LIII.

De ratione vnguentorũ cõ ſequéter tractãdũ exiſtimauimus, quãdoquidé ea in nõnullis corporũ vitijs, aut medicamétis miſta, aut corpori perfuſa, aut narib⁹ obiecta, plurimũ proſunt. in quorũ probationibus cõſulere nares oportet, an ea oleãt ex quibus tẽperãtur. Optimũ huiuſcemodi iudiciũ, qđ in qbuſdã planè obſeruari nõ poteſt, ꝓpter ea q̃ admiſcẽt odore cẽteris ꝑualétia: vt in amaracino & crocino, telino et pleriſq; aliis, q̃ crebra circa hęc meditatiõe experiri cõueniet.

Roſacẽũ. ὑγιάζει ψώρας κτηνῶν καὶ κυνῶν καὶ εἰς πεσσοὺς καὶ εἰς ἄκοπα καὶ λεπρικὰ ἐπιτηδείως μίγνυται. σέλλει δὲ καὶ ἱδρῶτας, καὶ τὸ περιττὸν δὲ ὁμοίως σκυάλζεται· ψύχει δὲ καὶ σύφει. 5

Περὶ Μαστιχελαίου. Κεφ. νϛ'.

Τὸ δὲ μαστίχινον, ἐκ τῆς μαστίχης λείας σκευάζεται. πυκτεῖ δὲ πρὸς τὰ ἐν ὑστέρᾳ πάντα, ἤπιος θερμαίνων, σύφων, μαλάσσων, καὶ πρὸς τὰ πρὸ τὸν στόμαχον ἐπιῤῥιπτόμενα σκιῤῥώματα καὶ κοιλιακὰ, καὶ δυσεντερικὰ, καὶ τὰ ἐπὶ τῶ προσώπου καθαίρων, καὶ εὔχροιαν ποιῶν· σωτήδεται δ' ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ κάλλιστον. 10 15

Σωθησις περὶ Μύρων. Κεφ. ηʹ.

Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ μύρα ἐυθετεῖ ἐπ' ἐλαίων παθῶν καὶ μυγμάτων φαρμάκοις καὶ ἐμβρεχόμενα καὶ ὀσφραινόμενα, ἀκόλουθον ἡγούμεθα καὶ τῶν τούτων παράδοσιν ποιήσασθαι, ἃ δεῖ δοκιμάζοντας ἐπιβλέπειν, εἰ ἀφ' ἧς ἡ χρᾶσις ἐστὶ τῶ μύρου, ἐκεῖνο ποιεῖ καὶ ἡ ὄσφρησιν. ἀεὶ δ' ἔστιν ἡ τοιαύτη κρίσις ἐπ' ἐλαίων μόνων οὐ φυλάττει δὲ τὸ τοιοῦτον δι' ὀπτρά τειαν μιγμάτων σφοδροτέρων, ὡς ἐπὶ ἀμαρακίνου καὶ κροκίνου καὶ τηλίνου καὶ ἄλλων τινῶν ἄν ἐκ τῆς πρὸ αὐτὰ γυμνασίας δοκιμασίαν. 20 25

Περὶ

Περὶ ῥοδίνου σκευασίας. Κεφ. νδ'.

Ῥόδινον ἔλαιον γίνεται οὕτω· ἀφύκνου λίτρας ε'. ὑγρᾶς ἡ. ἐλαίου λίτρας κ'. ὑγρᾶς ε'. κόψας καὶ φυράσας ὕδατι, ἕψε ἀνακινῶν· εἶτα ἀποθήσας εἰς ταὶς κ'. λίτρας καὶ ὑγρᾶς ε'. ἐλαίου, βάλε ῥόδων ἀβρόχων ἀριθμῷ χίλια πέντε καὶ ταὶς χεῖρας μέλιτι χρίσας, ἀνακίνει πλεονάκις ὑποθλίβων ἠρέμα· ἔπειτα ἐάσας τὴν νύκτα ἔκθλιβε, ὅταν δὲ τὸ τρυγῶδες ὑποσῇ, ἄλλαξον τὸ ὑποδεχόμενον ἀγγεῖον· ἀποτίθεσο δὲ εἰς κρατῆρα μέλιτι κατακεχρισμένον. βαλὼν δὲ εἰς λεπτεί δίον τὰ ἐξιπωθέντα ῥόδα, ὀπίχει λίτρας ἡ. οὐγγίας γ'. τῶ ἐσυμμύου ἐλαίου, καὶ πάλιν ἐξίπου. ἔστι δέ σοι τοῦτο δεύτερον, κἂν βουληθῇς ἄχει γ'. ἢ δ'. ἀποδεσχῶς ἐπιχέων ἐξίπου. γίνεται γὸ τὸ μὲν ά. τὸ δὲ β'. τὸ δὲ γ'. τὸ δὲ δ' μύρον. ὁσάκις δ' ἂν ποιῇς, τὸν κρατῆρα, προκατάχριε μέλιτι. εἰ δὲ θέλεις δευτέραν ἐμβολὴν ποιήσασθαι, εἰς τὸ πρῶτον ἐξιπωθὲν ἔλαιον, τὸν ἴσον ἀριθμὸν προσφάτων ῥόδων ἀβρόχων ἔμβαλε καὶ ἀνακινῶν ταῖς χερσὶ προσθλίβων μέλιτι, ἐκπίεζε, καὶ ποίει τὸ δεύτερον καὶ τέταρτον ὁμοίως ἐκθλίβων. καὶ ὁσάκις δ' ἂν ποιῇς τοῦτο, νυκτὸς ὀνυχίζων προβάλε

Roſaceum. Cap. LIIII.

Roſaceum ſic fit: Iunci odorati quinque libras & beſſem tundito, et ſubactas aqua in viginti olei libris & quincunce ſubinde mouẽdo, coquito: dũque percolaueris, in olei libras viginti & quicuncem, adiicito roſas non madefactas numero mille, & manib⁹ melle perunctis, identidem moueto, interdiu premens, finito nocte tota macerari, poſtea exprimito: & vbi recremẽtum peſſum ierit, mutato vaſe, in craterẽ melle illitũ recondito. Cæterùm roſas quæ antea preſſæ fuerunt, in tabellum demittito, & affuſis octo libris & quadrãte ſpiſſati olei, iterum premito, eritque ſecũdarium oleum: Quòd ſi tertias vſq;, quartásve perfuſiones infundés exprimere voles, ſecundarium fiet, tertiariũ, & quartarium vnguẽtum. Sed quoties id feceris, vaſa melle oblini debent. Si verò ſecundã infuſionem inſtituere libet, in expreſſum oleum, numero pari recẽtes roſas, nullo humore imbutas inijcito: manib⁹ melle præmadefactis, agitãs ſæpius: & iterum, tertio aut quarto ſimili modo exprimés facito, totiéſq; recẽtes roſas detractis vnguib⁹ immittito

immittito: fiet enim ita oleum multò validius: nam ſepties oleum roſarum infuſionem admittit, nec amplius. Prelum melle perũgatur, oleum à ſucco diligenter ſecerni oportet: nam ſi minimum quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis vnguibus, roſas tantùm oleo macerant in ſole hoc modo: Roſæ quæ ſelibram pondere æquant in ſextario olei diebus octo madeſcunt, & vſque tertiam perfuſionem quadraginta diebus inſolantur, & ſic oleum reconditur. Alij calamo, aut aſpalatho prius olei ſpiſſamenta faciũt. Alij coloris cauſa anchuſam admiſcent, & ſalem, quò minus oleat. Vim aſtringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplaſmatibus vtile. Potũ ſoluit aluum, ſtomachi ardorem reſtringit, vlcera caua replet & mulcet, quæ cacoëthe vocantur: vlceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dẽtes inter initia doloris collui, pdeſt, ad genarum duritias illitũ efficax eſt, ad laceſita interanea & concitatas vulnus vtiliſsimè ſubiicitur.

Elatinũ.

σεσσαλε ῥόδα, δυναμικώτερον γὰρ γίνεται· ἄχρι δὲ ἑβδόμης ἡμερῶν, ὅτε δέχεται τὸ ἔλαιον· τῷ ἐμβολῷ τῶν ῥόδων, ἔπειτα δὲ οὐκέτι. κηρίδιον δὲ καὶ ἁλὸς μίλτῳ, δεῖ δὲ ὅπως μελῶς τὸ ἔλαιον τοῦ χυλοῦ χωρίζειν· ἀπολιθοῖ γὰρ τὸ ὑλάγιστον, τὸ μύρον φθείρει. ἔνιοι δὲ αὐτὰ μόνα τὰ ῥόδα ὀνυχίσαντες καὶ ἁλίσαντες, ἐναποβρέχουσι τῷ ἐλαίῳ ἔχοντα σταθμὸν οὐγγίας ς'. εἰς μίαν ξέστου ἐλαίου, καὶ ἀλλάσσοντες, ἡμέρας ι'. καὶ ἁλίζοντες ὅτε ἡμέρας μ'. ἄχρι τείτης ἐμβροχῆς, οὕτως ἀποτίθενται. ἔνιοι δὲ προσύφουσι τὸ ἔλαιον, κάλαμον καὶ ἀσπάλαθον ἐμβάλλοντες· οἱ δὲ, καὶ ἄγχουσαν ἕνεκεν εὐχροίας, καὶ ἄλας πρὸς τὸ μὴ φθείρεσθαι. δυνάμεως δὲ ἔχει συστηκτικῆς, ψυκτικῆς, εὐδέτου εἰς ἐμβρέγματα καὶ καταπλασμάτων μίξεις· λύει δὲ καὶ κοιλίαν πυκτζόμενον, καὶ καῦσον σβέννυσι στομάχου. ἕστι δὲ καὶ θρεπτικὸν κοίλων ἑλκῶν, καὶ τῶν κακοήθων προϊόντων, ἀχώρων καὶ ἐπιζεμάτων ἐπάλειμμα. καὶ κεφαλαλγίας ἔμβρεγμα, ἐν ἀρχῇ ὀδοντολγίας διάκλυσμα· τιθεῖ δὲ καὶ πρὸς βλέφαρα ἐσκληρυμένα ἐγχριόμενον, πρός τε ἑτέρων ἐρεθισμοὺς καὶ ὑστέρας ἐγκλυζόμενον χρήσιμον.

Περὶ

Περὶ Ελατίνης σκευασίας. Κεφ. νέ.

Ελάτινα θλάσα καὶ διακόψας, ἔμβαλε εἰς λουτῆρα καὶ ἐπίχει ὀμφάκινον ἔλαιον ὅσον ἡμέρας γ'. ἀγγειόμβοός τε εἰς ασυρίδα ἐξίστω. ἔχω δὲ ἑκάτερα ἰσόσταθμα, εἶτα ἀποθέμβους ἐν καθαρῷ ἀγγείῳ, χεῦ. δώσαμεν δὲ ἔχει ἀναλογοῦσαν τῷ ῥοδίνῳ, κοιλίαν δὲ ἡ μαλάσσει.

Elatinum. Cap. LV.

Fracta elate tusa & scarificata, in labellū deiicitur: omphacinū oleum triduo infunditur, mox per sportulā exprimitur: verùm pares esse debēt vtriusque portiones, dein mūdo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo ꝓportione respōdet: aluum tamen non mollit.

Περὶ μηλίνου σκευασίας. Κεφ. νς'.

Ελαιον μήλινον σκευάζειν τὸν τρόπον τόνδε· ἐλαίου ξέστας ς'. ὕδατος ξέστας ί. μίξας, ὡς σέμβαλε λαπάθης τεθλασμένης οὐγγίας γ'· χάνε οὐγγίαν ά. κὴ ἐάσας ἡμέραν μίαν, ἔψησον, εἶτα ἀποθήσας τὸ ἔλαιον, βάλε εἰς ἀγγεῖον πλατύστομον, ὅπου εἰς τε ξύπον ἐν καλάμου, ἢ ῥοιάδος* ἀραιαὶ, ἄνωθέν τε ὅπου εἰς κυδώνια μῆλα κὴ ἀπεκαλύψας ἱματίοις, ἔασον ἡμέρας ἑπτὰς ἕως ἂν ὀσμασθῆται ἀπὸ τῶν μήλων δύναμιν τὸ ἔλαιον. ἔνιοι δὲ τὰ μῆλα ἐμβάλλοντες ἱματίοις ὅπου ἡμέρας ί, ἵνα συνέχῃ κὴ μὴ διαπνέῃ ἡ εὐωδία, μετὰ ταῦτα ἀποβρέχουσι τῷ ἐλαίῳ ἡμέρας β' κὴ νύκτας· εἶτα ἐξιπώσαντες ἀποτίθενται. Δώσαμεν δὲ ἔχει συστολὴν, ψυκτικὴν· ποιεῖ δὲ ἐς τὰ ῥωγώδη ἕλκη καὶ πίτυρα, χίμβλα, ἕρπητας, κὴ ἐς τὰς ἐν ὑστέρᾳ ἑλκώσεις ἐγχριόμενον, οὐδέ τε ἠρεθισμένα σέλλῃ

Melinum. Cap. LVI.

Melinum hoc modo tēperatur: Olei congius decē aquæ sextariis admiscetur. Adiicitur elatæ palmarum fractæ quadrans, & iunci odorati vncia: quæ die vno macerata coquūtur, mox in vas oris patuli oleū excolatur, & indita arundinacea crate, aut vetusta tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimētis operta tantisper inibi resident, dum malorū vires ad se oleum alliciat. Aliqui cotonea, decem dierum spatio operimentis inuoluunt, vt contineat odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimūtur, oleumq; recōditur. Id vim refrigeratoriam & astringentē habet. Cōtra scabiosa vlcera & quæ serpunt, ac furfures, perniūculósque prębet: exulceratis vuluis infunditur, citatá vrinā

sistit

sistit infusum, sudores cohibet, contra cantharidas, bupreſtim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

OEnanthini compoſitio. Cap. LVII.

OEnanthe è labruſca, optimè olens poſtquam emarcuit, deiecta in omphacinũ oleum mouetur, voluitúrque: & cùm biduo manſerit, exprimitur, & reconditur. Aſtringit, proximum roſaceo effectum præbens: ſed aluum non reſoluit, aut mollit. Probatiſimum eſt, quod odore œnãthen refert.

Telini componendi ratio. Cap. LVIII.

Fœnigræci libræ quinque, calami libra vna, cypiri libræ duæ, olei libris nouem, ſeptenis diebus macerantur, quotidie ter mouẽtur, poſtea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomũ ſubſtituũt, & cypiri loco xylobalſamum macerãt. Alij oleo antea his odoribus ſpiſſato fœnũgræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abſceſſus emollit, & concoquit, omnibus vuluarum duritiis magnopere cõuenit, fœminis difficilè pariẽtibus ſubiicit, vbi præ excretis

στέλλει ἐγκλυζόμενον, καὶ ἱδρῶτας ἱᾶται, πίνεται δὲ καὶ πρὸς καταπλάσεις, βουπρήστεις,* πτυοκάμπτων. ἔστι δὲ ἄριστον δόκιμον τὸ κυδωνίων ὄζον μῆλον.

Περὶ Οἰναν θίνης σκευασίας. Κεφ. ξ'. 5

Οἰναν θίνην τριῶν ὀκτωλῶν ξυώδη μαράνας, βάλε εἰς ὀμφάκινον ἔλαιον, καὶ κίνει μεταστρέφων, ἐπὶ πᾶσι δὲ ἡμέρας δύο, ἐξέπασον, καὶ ἀποτίθεσο. Δύναμιν δὲ ἔχει συστατικὴν, ἀναλογοῦσαν τῇ τῶν ῥοδίνων· ἐπὶ τοῖς δὲ τριῶν κοιλίαν λύειν καὶ μαλάσσειν. καὶ τοῦτο δὲ ὅτι δοκιμώτατον, τὸ ἐμφαῖνον ἐν τῇ ὀσμῇ τριῶν οἰναν θίνην. 10

Περὶ Τηλίνης σκευασίας. Κεφ. νή'. 15

Τήλεως λίβας ε'. ἐλαίου λίβας θ'. καλάμου λίβαν ά. κυπείρου λίτρας β'. ἀποβρεχε τῷ ἐλαίῳ ἐπὶ ἡμέρας ζ'. κινῶν ἑκάστης ἡμέρας τρὶς· εἶτα ἔξίπτου καὶ ἀποτίθεσο. οἱ δὲ, ἀντὶ μὲν καλάμου καρδάμωμον, ἀντὶ δὲ τῆς κυπείρου, ξυλοβάλσαμον σωναποβρέχουσιν. οἱ δὲ, προσθέντες τὸ ἔλαιον τούτοις, καὶ μετὰ ταῦτα τριῶν τὴν ἀποβρέχοντες ἐξίπτουσι. Δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν ἀποσημάτων, πεπαντικήν. μάλιστα δὲ ἁρμόζει τοῖς περὶ μήτραν πᾶσι σκληρώμασι. δυσκούστους τε ἐγχυματίζεται ἐπειδὰν καταξηρανθῇ τὸ περὶ 20 25

καὶ ἐπὶ τοὺς τόπους γλύπται, προσεκκριθέντων τῶν ὑγρῶν, πρός τε τὰς ἐν* δακτυλίῳ φλεγμονὰς, καὶ ἐγκλύζεται ἐπὶ τῶν τετηγσμῶν ὠφελίμως, πίτυρά τε ἢ ἀχῶρας σμήχει, καὶ πρὸς κατακαύματα ἢ χλωτλα ποιεῖ μετὰ κηροῦ, σμήχει τὰ ἐφήλιδας· καὶ εἰς σπληρώματα μίγνυται. ἐκλέγου δὲ τὸ πρόσφατον ἢ μὴ λίαν παρεμφαῖνον τὴν τῆς πήλεως ὀσμὴν, σμῆχον τὰς χεῖρας. γλυκύπικρον ἐν τῇ γεύσει, τὸ γὸ τοιοῦτον κάλλιστον.

Περὶ Σαμψυχίνου σκευασίας. Κεφ. νδ'.

Ερπύλου, καπίας, ἀβροτόνου, στοιβρίου αὐθους, μυρσίνης, πεταλων σαμψύχου, ἑκάστου λαμβάνων ϛ χαμαὶ, πρὸς τὴν ἑκάστου αὐτῶν δύναμιν ἀποβλέπων, κόπτε ἐν τῷ αὐτῷ πάντα, ἢ ἐπίχεε ἐλαίου ὀμφακίνου τοσοῦτον, ὥς τε μὴ καταπρατεῖσθαι ὑπ' ἀνάγκης τὸ ἐν αὐτῷ βρεχόμενον, ἢ ἔασον ἡμέρας τέτταρας ἢ ἔκθλιβε, ἢ πάλιν τὸ αὐτὸ σπληθος τῶν αὐτῶν προσφάτων, ἀπόβρεχε ὑπ' ἴσον χρόνον, καὶ ἐξίστα ἔτσι γὸ εὐτονώτερον. ἐκλέγου δὲ τὸ μέλαν χλωρὸν τῇ χρόᾳ σάμψυχον, ὀπιπολὺ ὄζον, μετρίως δριμύ. Δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν, λεπτυντικὴν, δριμεῖαν, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς μύσιν ἢ διαφορὰν ὑστέρας, ἔμμηνά τε ἢ ἔμ-

cretis humoribus loci siccitatem cõtraxerunt, sedis inflammationes lenit, teneſmo subditum prodeſt, vlcera capitis mãtia furfuresq; expurgat, ambuſtis, & pernionibus addita cera proficit, vitia cutis in facie emẽdat, pigmẽtis ad cõciliandum facici nitorẽ inſerit. Eligi oportet recens, quod nõ vehementer fœnigræci odorẽ præ ſe ferat, & manus abſtergat, ſapore ex dulci in amarũ inclinato: tale enĩ optimũ iudicat.

Sampſuchini cõpoſitio Cap. LIX.

Serpilli, caſsiæ, abrotoni, florum ſiſymbrij, frondiũ myrti, ſampſuchi ſingulæ portiones, quadã pro viribus ipſorũ coniectatione, vnà tundunt, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium vires nõ euincat: hæc poſt quatriduum exprimũtur. Denuo noua alia, ſimili mẽſura, & æquali tẽpore macerata pmũtur: ita enĩ validius reddi ſolet. Eligi oportet ſampſuchũ colore ex atro viridi, plurimum redolẽs, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuãtem, aduerſus vuluæ præcluſiones cõuerſionésque efficax eſt, mẽſes & ſecundas & partus extrahit,

vuluæ ſtrangulatus recreat, lúborum inguinúmque dolores lenit: ſed cum melle vti eo præſtat, quandoquidem vehementi aſtrictione locos indurat. Laſsitudines illitum diſcutit, in opiſthotonicorum, vulſorúmq; cataplaſmata vtiliſsimè additur.

Ocimini compoſitio. Cap. LX.

Ociminum oleum fit vt cyprinum: Ocimi folia decerpta librarum vndecim, & beſſis pondo, die noctúque viginti olei libris macerato, premito, colato: cúmque exhauſeris quallum, rurſus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id ſecundarium: nam tertiæ perfuſionis non eſt capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, vt in roſaceo diximus, rurſus maceratur, & cùm tanto temporis ſpatio maduerit, exprimitur, & oleum recunditur. quod ſi in animo fuerit ter aut quater madefacere, ſemper ocimum recens addes. Poteſt ex omphacino cõfici: ſed illo modo melius.

Idem quod ſampſuchinum poteſt, ſed ineſficacius.

Abroto-

βρυα ἐπιπασᾶ), καὶ πήγας ὑγρικὰς ἀναπτᾶ) ὀσφύων τε καὶ βυβώνων ἀλγήματα θεραπεύει, σὺν μέλιτι δὲ ἀπὸ τῶν βέλτιον, ἐπεὶ τῇ σφοδρᾷ σύνεσει σκληραίνει τοὺς τόπους, λύει καὶ κόπους συγχεόμενον, εἴς τε τὰ ἐπὶ τῶν ὀπισθοτονικῶν καταπλάσματα, ἐπιτηδείως μίγνυται, καὶ τἄλλως ἀποβύων.

Περὶ Ὠκιμίνου σκευασίας. Κεφ. ξ'.

Λαβὼν ἐλαίου λίτρας κ'. ὠκιμοῦ ταθμῷ λίτρας μά. οὐγγίας ή. ἀποφυλλίσας, ἀπόβρεχε νύκτα καὶ ἡμέραν ἐν τῷ ἐλαίῳ, εἶτα ἐξίπου καὶ ἀποτίθεσο· ἐκκενώσας δὲ τὰ ἀπὸ τῆς κυρτίδος, ἐπίχει πάλιν τὸ ἴσον σταθμὸς τοῦ ἐλαίου καὶ ἐξίπου. καλεῖται δὲ τοῦτο δευτερεῖον· τείτην γὰρ οὐκ ἐπιδέχεται βρεχμόν. εἶτα φρέσφατον ὤκιμον λαβὼν ἴσον, πάλιν ἀπόβρεχε ὡς ἐπὶ τοῦ ῥοδίνου εἴρηται, τὸ δὲ ἤδη ἀποβεβρεγμένον ἐπίχεον καὶ ἐῶν τὸν αὐτὸν χρόνον, ἐκθλίβε καὶ ἀποτίθεσο. κἂν τρὶς δὲ ἢ τετράκις θέλῃς, ἀπόβρεχε, φρέσφατον ἀεὶ ὤκιμον ἐμβάλλων. δύναται δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὀμφακίνου σκευάζεσθαι· βέλτιον δὲ ἐκείνως. δύναται δὲ τὰ αὐτὰ τῷ σαμψύχινον ἔλαιον ἐργάζεσθαι.

Περὶ

Πρὶ Ἀβροτονίνου σκευασίας. Κεφ. ξά.

Ἀβροτόνινον ἐν τῷ εἰς τὸ χύσριον ἡρωμαΐ ισμένῳ ἐλαίνῳ λίβρας θ'. οὐγγίας ε'. ἀβροτόνης φύλλων λίτρας ἡ'. ἐμβαλὼν καὶ ἀποβρέξας, νύκτα καὶ ἡμέραν ἐξίπου. πολυχρόνιον δ' εἰ βούλῃ ποιῆσαι, ἐμβαλὼν τὰ πρῶτα φύλλα, ἔμβαλε ἕτερα φύλλα, καὶ ἀποβρέχων ἐκπίεζε. Δώσαμεν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, ποιοῦσαν πρὸς τὰς ἐν ὑστέρᾳ μύσεις καὶ σκληρίας, ἄγον ἔμμηνα καὶ δεύτερα.

Πρὶ Ἀνηθίνου σκευασίας. Κεφ. ξϚ'.

Ἐλαίου λίτρας ἡ'. οὐγγίας *δ'. ἀνήθου αὐθοις λίτρας ιά. οὐγγίας ἡ'. ἐναπόβρεχε τῷ ἐλαίῳ ἡμέραν ά· εἶτα ἐκπίεζε ταῖς χερσὶ καὶ ἀποτίθεσο. ἐὰν δὲ βούλῃ διὰ ῥοχοῦ ποιῆσαι, πρόσφαλον ἀνήθου ὠσαύτως ἀπόβρεχε. δύναται δὲ μαλάττειν τὰ περὶ μήτραν καὶ ἀγασμοὺς, ἁρμόζον πρὸς τὰ ῥιγοδιακὰ ῥίγη θερμαῖνον καὶ *κόπους λύον, καὶ ἀλγήματα ἄρθρων ὠφελοῦν.

Περὶ Σουσίνου σκευασίας. Κεφ. ξγ'.

ΤΟ δὲ σούσινον, ὃ ἔνιοι κρίνινον καλοῦσιν, οὕτω σκευάζεται· ἐλαίου λίτρας δ'. οὐγγίας ε'. καλάμου λίτρας ε'. οὐγγίας γ'. σμύρνης οὐγγίας ε'. φυρίσας

Abrotonini compositio. Cap. LXI.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die noctúque madefactas, premito. Quòd si in longum tempus oleum velis asseruari, eiectis prioribus foliis noua appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vuluæ duritias præclusionésque efficax est, menstrua & secundas pellit.

Anethini compositio. Cap. LXII.

Olei libris octo & dodrãte, florũ anethi libras vndecim & bessem, maceratas in oleo die vna, manibus premito & recõdito. Quod si iterũ perfundere velis, recétes anethi flores cõsimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit, venarũ spiracula laxat, cõtra horrores febriũ circuitu redeũtes auxiliat: calfacit enĩ, & lassitudines discutit: prodest articulorũ doloribus.

Susinum. Cap. LXIII.

Susinum, quod alij lilinum appellant, sic temperatur: Olei libræ nouem cum quincunce, calami libræ quinque & quadrans, myrrhæ vnciæ quinque,

permixto odorifero vino decoquuntur & colato oleo, car damomi tusi & cœlesti aqua madefacti libræ tres, & semis macerantur, premuntúrque, tres libræ cum semisse spissati olei assúmũtur, mille lilia decerptis foliis, in latũ, non tamẽ profundum, labellum demittuntur: iniectum oleum, manibus melle perúctis agitatur: die noctúque conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleũ, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo ĩcerni oportet: (nõ enim, vt rosaceum, moram tolerat: nam concalfactum feruet & cõputrescit: quare sæpius decapulandum) vasa melle illinenda tenuis sal inspargendus, & si qua sordes vasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellum trãsfusis, rursum olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem conijciuntur. Hæc manibus scitè pressa interiecta breui mora expri muntur: quod profluit, repurgatur. Tertio eadẽ infundũtur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactis.

φυρήσας οἴνῳ εὐώδει, ἔψει, εἶτα ἀπαιθρίσας τὸ ἔλαιον, ἀπέχει μὴ καρδαμώμου κεκομμένου καὶ βεβρεγμένου ὕδατι ὁμοίῳ λίτρας γ'. κρίας ς'. καὶ ἐάσας βραχύ τι, ἀποθλίβει· καὶ λαβὼν ἀπὸ τοῦ ἐσυμμένου ἐλαίου τρεῖς καὶ ἥμισυ λίτρας, κρίνα ἀριθμῷ χίλια, ἀποφύλλισας, δὶς ἐν λεκάνῃ πλατεῖ. μὴ βαθεῖ ὅπως χέας τὸ τὸ ἔλαιον, ἀνακίνει ταῖς χερσὶ μέλλι κεχρισμέναις· ἐάσας δὲ ἡμέραν μίαν καὶ νύκτα, πρωὶ ἐκλέμβους εἰς πυξίδα ἐξίησι, τὸ δὲ φθόμβιον ἀπόθει εὐθέως ἀπὸ τοῦ συνεκθλιβέντος ὕδατος τῷ ἐλαίῳ· ἐὰν γὰρ ὑπομβύει ὡς τὸ ῥόδινον, συνδιαφθείρεται· δὲ ἀναζεῖ καὶ σήπεται, μετάγγιζε δὲ πολλάκις εἰς ἕτερα ἀγγεῖα μέλιτι κατακεχρισμένα πρωϊαίοις ἄλατι λεπτῷ, καὶ τῷ συλλεχομένῳ ἀκαθαρσίαν ὑπομελῶς ἀφαιροῦν, μεταχειράσας ἢ ἐν τῇ κυψελίδι τὸ ἐξιπωθὲν ἄχυμα εἰς τὴν λεκάνην πάλιν ὑπόχει τῷ ἠρωματισμένῳ ἐλαίῳ τὸ ἴσον πλῆθος τῷ πρωτέρῳ, καὶ καρδαμώμου κεκομμένου συμβαλλε ὀλκὰς ἰ. καὶ ἀνακινήσας χερσὶν ὅμως ταῖς χερσὶ, καὶ ὑπόχεε μικρὸν, ἐξίπου, τὸ ἀποῤῥέον ἀποκαθαίρων. καὶ τέτον ἐπιχέας πάλιν τὸ αὐτὸ ποίει, πρῶτον ἐπιμεβάλλων καὶ τὸ καρδάμωμον καὶ τὸν ἅλας ὁμοίως, καὶ ταῖς χερσὶ χρῆσθαι τῷ μέλιτι ὀλίζον. καὶ

Longè

καὶ ἔσται τὸ μὲ πρότερον ἀκμαιότερον ἄριστον· ἔχομενον δὲ τὸ ἑξῆς· τρίτον δὲ τὸ τελευταῖον. καὶ πάλιν λαβὼν λίνια κρίνα καὶ ἀποφυλλίσας διὰ χειρὸς καὶ σπάσας τὸ πρῶτον ἔλαιον ἐπιχεῖ τὸν μύδρον, τὰ αὐτὰ ποιῶν ὡς πρόσθεν εἰπὼν ὅτι τὸ πρῶτον καρδάμωμον παραμίσγων, εἶτα ἐλαίου, ποιεῖ τὰ αὐτὰ καὶ ὅτι τὸ δευτέρου καὶ τρίτου ὡς εἴρηται. προσεμβάλλων καὶ τὸ καρδάμωμον· εἶτα ἐλαίου καὶ ποιεῖ τὰ αὐτά. ὁσάκις δ' ἂν ἀποθλίβῃς νεαρὰ κρίνα δυναμικώτερον ἕξεις τὸ μύρον. ὅτι τέλειον ὅταν αὐτάρκως ἔχῃ σοι δοκῇ, μίσγε ἑκάστου σκευασίᾳ σμύρνης χρυσῆς ⊀ οϛ'. κρόκου ⊀ ι'. καρδαμώμου ⊀ οἑ'. οἱ δὲ, κρόκου καὶ κιναμώμου τὸ ἴσον κόψας ἔμβαλε εἰς τὴν λεκάνην μεθ' ὕδατος, καὶ ὅπως ἂν τὸ πρῶτον ἐκπιεσθὲν μύρον· εἶτα ἐάσας μικρὸν, ἀναλάμβανε εἰς ἀλαβάστρια μικρὰ ξύρα πρόσκλυσμένα σμύρνα κόμμι ἢ σμύρνῃ, καὶ χρόκῳ καὶ μέλιτι μεθ' ὕδατος διεμμύοις. τὰ δ' αὐτὰ ποιεῖ καὶ ὅτι τὸ δευτέρου ἐκπίσματος καὶ ὅτι τὸ τρίτου. ἔνιοι δὲ τὸ ἁπλοῦν ἐξ ἐλαίου βαλανίνου καὶ κρίνου ἢ ἄλλου ἐλαίου σκευάζουσι. δοκεῖ δὲ διαφέρειν τὸ ἐν φοινίκῃ, καὶ ἐν αἰγύπτῳ γινόμενον. ἄριστον δὲ αὐτῶν τὸ ὅζον κρίνου. δυνάμεις δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, ἀναστομωτικὴν, τῶν περὶ μήτραν μύσεων καὶ φλεγμονῶν.

Longè optimũ erit, quod prius exprimitur: secũdum quod sequitur: tertium locum sibi vendicat, quod nouissimum prodit. Denuo in mille lilia euulsis foliis expressum primo oleum infunditur: tum eadem ratione prosequendum, idemq; faciẽdum, vt prius, addito cardamomo, dein expresso: & quò frequentius recentia lilia maceraberis, eò validius vnguentum efficies. Denique cũ factũ abundè videbitur, singulis cõpositionibus miscere conuenit myrrhæ q̃ optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinq;, & septuaginta: croci verò & cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribratę in lutrã cũ aqua demittũtur, expressumq; primò vnguentum infunditur, & paulò pòst excipiũtur vascu lis siccis, myrrha aut gũmi anteà perfusis, & croco, melle & aqua madefactis. Eadẽ fiunt in altera aut tertia expresione. Aliqui simplex ex balanino, alióve oleo, & liliis componũt. Optimũ esse cõstat in Phœnice, mox Ægypto factũ. Sed cũ primis laudat, qđ lilia redolet. Excalfacit, emollit, vuluæ præclusiones, et collectiões aperit.

vtilissimũ ad muliebria mala: vlcera in capite manátia, ferui das eruptiões, varos, furfurésq; emẽdat: vibices cicatricésq; ce lerrimè ad coloré reducit, ita vt sæpe fallãt. In summa extenuat, potũ bilé per aluũ extrahit, vrinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum. Cap. LXIIII.

Narcissini olei spissamenta ita fiũt: Sex libræ aspalathi cum sextãte tũdunt, olei eloti libræ septuaginta cũ vnciis quinque assumũtur. Aspalathꝰ aqua madefactꝰ in tertia olei parte coquit: quo exépto, calamꝰ quinque libris, & besse adiicitur, cũ myrrhæ gleba cõtundit, cribra taq; ac vino veteri odorato ímista, decoquitur: simul ac autem cũ ijs efferbuerit, eximit: refrigeratũ oleũ excolatur, cuius portio in labellũ mittitur, flores narcissi quáplurimi cójiciũtur: qui bidui spatio (vt in susino dictũ est) permoti expri munt. Oleũ subinde decapulãdum, siquidé celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ duritias, p̃clusiónesq;: sed capitis dolores facit.

Crocinum. Cap. LXV.

Cũ crocinũ cõponere voles, prius

κὴ καθόλε πάντων ἐστὶ χρηστικώτατον πρὸς τὰ γυναικεῖα· ἁρμόζει δ' κὴ πρὸς ἀχῶρας, ἰόνθους, πύρα· ἐκζέματα, μώλωπάς τε καὶ χέως μελασάλλε κὴ ὁμόχρως ποιεῖ. κὴ καθόλε ἐστὶν ἀραιωτικόν, ἄλλ' δ' κὴ χολὴν καὶ κοιλίαν πινόμενον· κινεῖ δὲ κὴ κρασιν. ἔστι δὲ κὴ καχοχύμαχον, κὴ ναυτίας ποιητικόν.

Περὶ Ναρκισσίνε σκευασίας. Κεφ. ξδ'.

Ελαιον ναρκίσσινον ζύφεται οὕτως· ἐλαίου παλυμβύου λίτρας ὀ. οὐγγίας ἑ. ἀσπαλάθου λίτρας ς'. οὐγγίας β'. κόλας καὶ βρέξας ὕδατι, τῷ τείτῳ τῷ ἐλαίου μίξας ἕψε. εἶτα ἐξελὼν τὸν ἀσπάλαθον καλάμου βάλε λίτρας ἑ. οὐγγίας ἡ. καὶ σμύρνης χόνδρον κόλας κὴ σίσας, φύρασον οἴνῳ παλαιῷ εὐώδει, καὶ μίξας ἕψε· ὅταν δὲ καὶ μετὰ τούτων ἀναζέσῃ, ἐξελὼν ἀπόθες τὸ ἔλαιον ψυχρόν· εἶτα λαβὼν ἀπὸ τοῦ ἐλαίου εἰς λουτῆρα, ἀπόχει, καὶ τοῦ ναρκίσσου ὡς ὅπλεῖστον ἔμβαλε τὸ ἄνθος, ἐπὶ ἡμέρας β'. κινῶν. ὡς ἐπὶ τοῦ σουσίνου, ἐξίπου τε καὶ μετάγγιζε πυκνῶς, καὶ γὸ τοῦτο σήπεται. ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ ὑστέρα μαλάττον τὰς ἐπ' αὐτῷ σκληρίας κὴ μύσεις· ἔστι δὲ κεφαλαλγές.

Περὶ κροκίνε σκευασίας. Κεφ. ξέ.

Κρόκινον δὲ σκευάζων, πρῶτον

στῦψον τὸ ἔλαιον ὡς εἴρηται ἐπὶ τοῦ σουσίνου, πλήθει καὶ σταθμῷ τῷ αὐτῷ· λαβὼν δὲ ἐκ τοῦ ἐσκευασμένου ἐλαίου εἰς τὸ σούσινον λίτρας τρεῖς ἥμισυ βάλε κρόκου < ή. καὶ ἀνακίνει πολλάκις τῆς ἡμέρας, ποιῶν τοῦτο συνεχῶς ἐπὶ ἡμέρας έ. τῇ δὲ ἕκτῃ ἀπόχει τὸ ἔλαιον ἀπὸ τοῦ κρόκου καθαρείως, τῷ δ᾽ αὐτῷ κρόκῳ ἐπίχει τὸ ἴσον πλῆθος τοῦ ἐλαίου καὶ ἀνακίνει ἡμέρας γ΄. εἶτα ἀποχέας πρόσμιξον σμύρνης κεκομμένης καὶ σεσησμένης < μ΄. καὶ κίνει ἐν ὅλμῳ χρησίμως, εἶτα ἀπόθου. ἔνιοι δὲ τὸ ἴσον εἰς κύπρινον ἠρωματισμένου ἐλαίου καὶ εἰς τὸ κρόκινον χρῶνται. ἔστι δὲ αὐτοῦ κράτιστον, τὸ κατακόρως κρόκου πνέον, ὅπερ εἰς τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν ἁρμόζει. δεύτερον δὲ τὸ τῇ σμύρνῃ παρεμφερόν. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικήν, ὑπνωτικήν, ὅθεν πολλάκις ἐπὶ φρενιτικῶν ἁρμόζει καταβρεχόμενον, ἢ ἀποσφραινόμενον, ἢ καὶ κατὰ μυξωτήρων διαχριόμενον· ἔστι δὲ καὶ πυοποιόν, καὶ καθαρτικὸν ἑλκῶν, καὶ πρὸς τὰς ἐν μήτρᾳ σκληρίας καὶ μύσεις καὶ τὰ ἐν αὐτῇ κακοήθη, σὺν κηρῷ καὶ κρόκῳ καὶ μυελῷ καὶ ἐλαίῳ διπλασίονι. συμπέπτει γὰρ καὶ μαλάσσει καὶ ὑγραίνει καὶ πραΰνει· ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς ἀπογλαυκώσεις μεθ᾽ ὕδατος ὑπαλειφόμενον. ἀναλογεῖ δὲ αὐτῷ καὶ τὸ λεγόμενον βουτύρινον καὶ ὀνύχινον, καὶ στυράκινον, τοῖς ὀνόμασι μόνον διαφέροντα, τῇ μέντοι

prius olei, vt in ſuſino dixim⁹, ſpiſſamenta facies, eiſdem pôderibus, & menſuris: cuius olei libras treis & ſemiſſem, croci vnciam vnam aſſumes, idétidem quotidie moueto, & ſexta die, quàm hoc aſsiduo pegeris, oleum á croco colis incernito, eidem croco parem olei modum adiicito, moue triduo, dein contuſæ myrrhæ atque cribratæ drachmas quadraginta permiſceto, & in pila agitatum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini cõpoſitione vtuntur. Optimum eſt, quod abundè crocum ſpirat, in medendi vſu expetitum. Proximum, quod myrrham refert. Calfacit, ſomnum allicit, quare perſæpe phreniticis ſubuenit, perfuſum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mouet, vlcera purgat, contra vuluæ duritias atque præcluſiones, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, prodeſt cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere. Concoquit enĩ, emollit, humectat, & permulcet: ad oculorũ glaucitates ex aqua illinitur. Huic autẽ ꝓportione reſpõdẽt butyrinũ, onychinũ & ſtyracinum: quæ etſi

nominibus distant, viribus & compositione cognata sunt.

Cyprini spissamentum.

Cap. LXVI.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ cœlestis tantundem cum semisse, cui⁹ vna parte oleum diluitur, altera adiiciēdis odoramentis admiscetur: dein assumptis aspalathi libris quinq;, & semisse, calami libris sex, & semisse, myrrhæ libra vna, cardamomi libris trib⁹, & dodrāte, olei libris nouem, & vnciis quinque. Aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo donec conferuescat, myrrha autem vino vetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittūtur: & vbi efferbuerint, sublato aheno, oleum percolatur. Cardamomū tusum reliqua aqua aspersum infundit, spatha agitat, nulla, dū refrixerit, interpellatione. Post hęc collato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, qđ cyprū vocāt, sex & quadraginta libræ cum besse instillant, q̄ sufficiēter macefactæ per sportulā exprimūtur. Quòd si copiosi⁹ desideretur, idem recentium florū pōdus iniectū simili modo p̄mat.

&

σκευασία καὶ τῇ δυνάμει ὁμοίως παρόμοια.

Περὶ Κυπρίνου τρίμματος καὶ σκευασίας ἐλαίου. Κεφ. ξς΄.

Ἐλαίου ὀμφακίνου πεπαλυμμένου μέρεσι ε΄, ὕδατος ὀμβρίου μέρεσι ας΄. τὸ μὲν ὑπέχει τῷ ἐλαίῳ, τὸ δὲ φύρεται σὺν τοῖς ἐμβληθησομένοις ἀρώμασιν· εἶτα λαβὼν ἀσπαλάθου λίτρας ε΄, ἄμωμου, καλάμου λίτρας ς΄, ἄμισυ· σμύρνης λίτρας α΄. καρδαμώμου λίτρας γ΄. οὐγγίας θ΄. καὶ ἐλαίου λίτρας θ΄. οὐγγίας ε΄, τὴν ἀσπάλαθον κόψας καὶ βρέξας ἐν ὕδατι ἐμβαλὼν, ἕψει μετὰ τοῦ ἐλαίου ἕως ἂν σιωπαζέσῃ, ἡ δὲ σμύρνα, διεὶς οἴνῳ παλαιῷ εὐώδει τὸν κάλαμον κεκομμένον σὺν ἀναφύρασι μετὰ τῆς σμύρνης, καὶ ἐξελὼν τὴν ἀσπάλαθον, ἐμβαλε τὸ φύραμα τῷ καλάμου· ὅταν δὲ μετὰ τοῦτον ζέσῃ, καθελὼν ἀπόθησον τοῦ χαλκοῦ τὸ ἔλαιον. καὶ κατέχει κατὰ τὸ καρδαμώμου κεκομμένου καὶ πεφυραμένου τῷ λοιπῷ ὕδατι, καὶ κίνει ἀσάλευτον, ἕως ἂν ψυχῇ μὴ διαλείπων. εἶτα ἀποθήσας τὸ ἔλαιον, ἔμβαλε εἰς τὰς κύ. τὸ ἐλαίου λίτρας αὖθις κυπείρου λίτρας μς΄. ὀγγίας ι΄. ἰάσας τὸ ἀποβραχῆναι, ἐξίπτασον διὰ σπυρίδος. ἐὰν δὲ πλείω θύῃς, τὸ γεωργοῦ αὖθις τὸ ἴσον ἐμβαλὼν πλῆθος ὁμοίως ἐξίπτα.

ἐάν

ἐάν τε ἥβροχον ἐάν τε τείβροχον βούλῃ ποιεῖν· δυναμικώτερον γὸ γίνεται. καλέγεσθαι δὲ δεῖ τὸ χρηστὸν καὶ μεθ' ὑωδίας θλικτικόν. ἔνιοι δὲ καὶ κιννάμωμον μίσγουσι. Δυώαμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, ἀνασομωτικὴν, ἁρμόζουσαν τοῖς περὶ μήτραν καὶ νεῦρα πάθεσι, καὶ σπλευετικοῖς καὶ κατάγμασι, καθ' ἑαυτὸ καὶ κηρωτῇ μιγνύμενον. μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι τοῖς ἁρμόζουσιν, ὑπισθοτονικοῖς σπασχικοῖς, βουβώνων φλεγμονῇ, καὶ ἀκόποις.

Περὶ Σπύψεως Ἰείνου.

Κεφ. ξζ'.

Σπάθης λίτρας ς'. οὐγγίας ή. ἐλαίου λίτρας ογ'. οὐγγίας ε. κόψας ὡς λεπτότατα, μίξον ὕδατος χοτύλας ι. καὶ βαλὼν εἰς χαλκοῦν, ἕψε μέχρις αὖ οὗ πίῳ ὀσμὴ ἀναλάβοι· εἶτα ἀπόθες εἰς κρατῆρα μέλιτι κατακεχρισμένον· ἐν τούτου τοῦ ἡρωματισμένου ἐλαίου, τὸ πρῶτον ἔιεινον σκεύαζεται, ἐναποβρεχομένης τῇ ἐσυμμένῳ ἐλαίῳ ἕρεως ὡς ὑωσγέγεσται, ἢ οὗτος· ἐλαίου λίτρας ὁ. οὐγγίας ε. ξυλοβαλσάμου λίτρας ε. οὐγγίας β'. κόψας ὡς εἴρηται, σώιεψε· εἶτα ἐξελὼν τὸ ξυλοβάλσαμον, προσέμβαλε καλάμου κεκομμένου λίτρας β'. οὐγγίας

& iterũ aut tertiò si quis velit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, ora venarum adaperit, vuluæ neruorúmque vitiis conuenit, pleuriticis, fractísque per se vel cerato immistum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur: item in acopa adiicitur.

Irini spissamentum.

Cap. LXVII.

Spathæ quàm minutissimè contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris, & quincunce olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus imbuto oleo, irinum primò temperatur, irino ex oleo insspissato macerata, vt scripsimus. Sed alia est componendi ratio: In olei septuaginta libris & quincunce, xylobalsami (vt dictum est) contusi, libras quinque & sextantem excoquito, postea detracto xylobalsamo noué libras, &

& dextantem adiicito, & myrrhæ glebam vetere vino odorato perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tusæ iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenuè & vehementer distringito. Quòd si vis validius fieri, par pondus iterum ac tertio similiter maceratum exprimito. Lõgè optimum est quod solã irin olet, quale est in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaiæ natum. Vim habet calfactoriam atque emolientem, crustas adimit, sordida vlcera & putrida purgat, confert fœminis vuluæ causariis. Item inflammationibus eiusdem atque præclusionibus, partus eiicit, hæmorrhoidas recludit, contra aurium sonitus ex aceto, ruta & amaris nucibus, prodest: diuturnis destillationibus, naribus illitum, & contra graueolentia earum vlcera, quas ozænas vocant, auxiliatur: aluum purgat cyathus epotus, facit ad ilei cruciatus, vrinam mouet, difficileis vomitiones adiuuat, perũctis eo digitis & immissis, vel iis quæ ad vomitum ciendum induntur: anginæ etiam illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur: item

οὐγγίας ι. σμύρνης χόνδρον οἴνῳ παλαιῷ ἐμβρέχων ἐυώδει· εἶτα λαβὼν ἐν τῷ ἐσυμμένου ἐλαίου ἡ ἡρωματισμένου λίτρας ιδ'. ἐνάπόβρεχε, ἕρεως κεκομμένης ἴσον τῷ σαθμῷ, ἐῶν ἡμέρας β'. καὶ νύκτας β'. εἶτα ἐξίπου βιαίως καὶ νεανικῶς. καὶ εἰ βούλει δυναμικώτερον εἶναι, τὸν ἴσον σαθμὸν καὶ δὶς καὶ τρὶς ὁμοίως ἐναποβρέχων ἐξίπτε. κεράσιον ὃ ὑπάρχει τὸ ἐν ὀσφρήσει μηδενὸς ἄλλης, μόνης δὲ τῆς ἰείδος πιοῦσ. τοῦτον δέ ὅτι τὸ ἐν πέργῃ τῆς παμφυλίας, καὶ ἐν ἤλιδι τῆς ἀχαΐας γηγνόμενον. δυώμεως ὃ ἔχει μαλακτικὴν, θερμαντικὴν, ἐράσεως τε καὶ σπασδόνας καὶ ῥυπαείας αὐαθαίρει, καὶ ταῖς περὶ μήτραν διαθέσεσιν ἁρμόζει, φλεγμονάς τε καὶ μύσεσιν, ἔμβρυά τε ἐκβάλλει, καὶ αἱμορροΐδας αὐαστομοῖ, πρός τι ἤχρως ὠτων σὺν ὄξει καὶ πηγάνῳ καὶ πικροῖς ἀμυγδάλοις, καὶ πρὸς καταῤῥοις χρωνίζοντας, διαχριομένων τῶν μυξωτήρων, καὶ πρὸς ὀζαίνας· καθαίρει δὲ ἡ τὴν κοιλίαν, κυάθου πλῆθος ποθέν. ποιεῖ καὶ πρὸς εἰλεώδη, κυεῖ καὶ οὖρα. καὶ ἐπὶ τῶν δυσχερῶς ἐμουμένων, διαχριομένων τῶν δακτύλων, ἢ τῶν ἐμετηρίων, καὶ ἐπὶ συναγχικῶν διαχριόμενον ἢ αὐαγαργαριζόμενον σὺν μελικράτῳ.

ἡ

καὶ πρὸς τραχύτητα αἰτιείας. δίδοται καὶ τοῖς κώνειον ἢ μύκητας ἢ κόριον πεπωκόσι.

Περὶ Γλευκίνου σκευασίας. Κεφ. ξή.

Γλεύκινον δὲ σκευάζεται τὸ ἁπλοῦν, ἔκτε ἐλαίου ὀμφακίνου, καὶ σχίνου, καὶ καλάμου, καὶ νάρδου κελτικῆς, καὶ σπάθης, καὶ ἀσπαλάθου, καὶ μελιλώτου, καὶ κόστου, καὶ γλεύκους συμπεπτωκότων τῶν στεμφύλλων τῷ ἔχοντι ἀγγείῳ τὰ ἀρώματα καὶ τὸν οἶνον, καὶ τὸ ἔλαιον. κινεῖται δὲ ἐπὶ ἡμέρας λ. δὶς τῆς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκπελθὲν, ἀποτίθεται. δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, ἀνεπικήν· ποιοῦσαν πρὸς τὰ ῥήγματα καὶ τὰ γενικὰ πάθη, καὶ τὰ ἐν ὑστέρᾳ. παντὸς δὲ ἀκόπου μᾶλλον ὠφελεῖ μαλακτικὸν ὄν.

Περὶ Ἀμαρακίνου. Κεφ. ξθ'.

Ἀμάρακινον δὲ ἐν κυζίκῳ κάλλιστον γίνεται· σκευάζεται δὲ διά τε ὀμφακίνου ἐλαίου καὶ βαλανίνου συφωμένων ξυλοβαλσάμῳ, * σχίνῳ, καλάμῳ, ἡδυοσμένων δὲ, ἀμαρακίνῳ, κόστῳ, ἀμώμῳ, νάρδῳ, καρποβαλσάμῳ καὶ σμύρνῃ. οἱ δὲ πολυτελέστερον αὐτὸ ποιοῦντες, μύροισι καὶ κιννάμωμον. παραλαμβάνεται δὲ μέλι καὶ οἶνος εἰς τὴν τῶν ἀγγείων χρῆσιν καὶ φύρασιν τῶν κεκομμένων ἀρωμάτων. ἔστι δὲ θερμαντικὸν, καρω-

item cõtra arteriæ scabritiem. datur etiam iis qui cicutã, coriandrum, aut venena fungorum hauserunt.

Gleucinum. Cap. LXVIII.

Gleucinum absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, celtica nardo, spatha, aspalalatho, fertula campana, costo, & musto: circundatis interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum cõceperat. Tricenis diebus, his in die mouetur postea expressum oleũ reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & neruorum vuluæque vitiis auxiliatur. omni acopo iuuãtius: quippe quòd emolliat.

Amaracinum. Cap. LXIX.

Amaracinum longè optimũ in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissamentis è xylobalsamo, iũco odorato, & calamo factis, conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, casiæ, carpobalsami & myrrhæ odoribº. Aliqui, quò preciosius fiat, cinnamomum addũt. Mel autem & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitionẽ, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinũ calfacit, sopo-

soporem mouet, venarú spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vrinam cît, putrilaginibus ac fistulis per quàm vtile: nec non humentibus herniis, postquam medica manus operam suam impenderit, crustas, & tetra vlcera, quæ theriomata vocant, rumpit: difficili vrinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vuluæ subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vuluæ tumores discutit, vulneratis neruis, & musculis confert, laneo centunculo modicè madefactum & impositum.

καρωτικὸν, ἀγασμωτικὸν, μαλακτικὸν, πυρωτικὸν, οὐρητικὸν, ἐγχεόμενον εἰς τε τὰς σήραγγας καὶ σύριγγας, καὶ ὑδρομήλας μετὰ τὰς χειρουργίας· περιῤῥήγνυται τε τὰς ἐχάρας καὶ τὰ φθειριῶντα ἕλκη· σὺν δὲ δυσουρείαν ἀρμόζει περιχριόμενον τοῦ σακτύλου· καὶ σὺν τοῖς φλεγμοναῖς αὐτοῦ, καὶ σὺν αἱμορῤῥοΐσιν αὐτοσμωσι περιχρίμενον· ἐμμιλιά τι κινεῖ σὺν ὄγκῳ τὴν μήτραν, σκληρίας καὶ οἰδήματα ἐν ὑστέρᾳ διαφορεῖ, καὶ σὺν τοῖς νευρήτρωτα καὶ μυόρρωτα, συμφέρει ἐν φλήμασιν ἀρχαίως βριχόμενον καὶ ὀπτιδήμενον.

Megalinú. Cap. LXX.

Factitabatur olim megalinú, sed nunc compositio exoleuit & prorsus obliterata est. Cuius ad historiæ complementú meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina vnguentis, neque tutelæ neque voluptatis gratia adiicitur, sed coloris crassamentíq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de resina differemus.

Περὶ μεγαλείου. Κεφ. ϛ.

Τὸ δὲ μεγαλεῖον καλούμενον, πάλαι μὲν ποτὲ ἐσκευάζετο, ἐπιλέλοιπε δὲ νῦν. σὺν δὲ ἐπιπλήσσουσι δὲ τῆς ἰσχνάζετο, οὐκ ἔστιν ἄτοπον ἐπιμεμφῆναι. καὶ τούτου δὲ σκευασία ἡ αὐτὴ τῷ ἀμαρακίνῳ, πλεονάζει δὲ τῇ ῥητίνῃ, καὶ ταύτῃ διαφέρει. ἔστι δὲ μαλακτικὸν πάσης. ἡ μὲν τοι ῥητίνη μίγνυται τοῖς μύροις, οὔτε σωλακῆς οὔτε ἡδονῆς χάριν, χρώματος δὲ καὶ πάχους ἕνεκα μίγνυται δὲ ἡ τερεβινθίνη ἀφεψομένη, ἄχρις ἂν ἄοσμος γένηται. ἀναθήσεται δὲ ἐν τοῖς περὶ ῥητίνης ἡ ἕψησις αὐτῆς.

Hedy-

Περὶ Ηδύ-

Περὶ Ἡδύχρου. Κεφ. οά.

Καὶ τὸ καλούμενον δὲ ἡδύχρων, σκευαζόμενον ὃν ἔν τισι χώραις αὐτῆς· ἔχεται δυνάμεώς τε καὶ σκευασίας τῷ ἀμαρακίνῳ, εὐωδέστερον δὲ τυγχάνει.

Hedychroum. Cap. LXXI.

Quod hedychroon vocant, in Co fieri solet: eisdem præditum viribus & misturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

Περὶ Μετωπίου. Κεφ. οβ'.

Σκευάζεται δὲ καὶ ἐν αἰγύπτῳ μύρον, ὃπ χωρίως ὑπ' αὐτῶν καλούμενον μετώπιον, διὰ τὴν τῆς χαλβάνης μίξιν· τὸ γὰρ ξύλον ἐξ οὗ γίνεται ἡ χαλβάνη, μετώπιον καλεῖται. δι' ἀμυγδάλων δὲ πικρῶν καὶ ἐλαίου ὀμφακίνου καὶ καρδαμώμου, σίνου τε καὶ καλάμου καὶ μέλιτος καὶ οἴνου καὶ σμύρνης καὶ βαλσάμου καρποῦ καὶ χαλβάνης καὶ ῥητίνης σωτίζεται. δόκιμον δὲ ὅτι τὸ βαρύοσμον καὶ λιπαρὲν· ἐμφαίνον μᾶλλον τοῦ καρδαμώμου καὶ τῆς σμύρνης, ὕσῳ τῆς χαλβάνης. σφόδρα δὲ θερμαίνει καὶ πυρεῖ καὶ αἰσθομοῖ, ἐπισπαστύ τε καὶ καθαίρει ἕλκη· θεός τε νεῦρα καὶ μῦας διακοπέντα ποιεῖ, ὑδροκήλας τε σὺν σκπάσι. μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι καὶ κηρωτάις. θεός τε ῥίγη καὶ ὀπισθοτονικοῖς ἀπωθύοις χρήσιμεύει· κινεῖ δὲ καὶ ἰδρῶτας, καὶ αἰσθομοῖ τὰ θεῖ ὑστέραν, καὶ σκληρίας ταῖς θεῖ αὐτοῦ χαλᾷ. ἐν καθόλου μαλακτικὴν ἔχει τὴν δύναμιν.

Metopium. Cap. LXXII.

Fit in Ægypto vnguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbani mistionem: ná lignum in quo galbanũ enascitur, metopion vocát. Cóstat amaris nucibus, omphacino oleo, cardamomo odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrha, balsami semine, galbano & resina. Probatur pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrhã, quàm galbanum respiret. Calfacit vehementer, & adurit, atque extrahit, ora vera venarũ aperit, vlcera purgat, extrahítque: ad præcisos neruos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamẽtis efficax est: ceratis & malagmatis inseritur: horroribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum cótracta est, vtile habetur: sudores ciet, vuluæ spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat: in summa molliendi naturam habet.

Men-

τὸ δὲ τοιοῦτον ἔα ἐν ῥητίνῃ, ἀλλ' ἐν σμύρνῃ ἔχει τὸ πάχος· ἡ μὲν γὰρ ῥητίνη οὐ θερμαίνει πικρίαν, οὐδὲ εὐωδίαν. Δυνάμιν δὲ ἔχει σφόδρα δριμεῖαν καὶ θερμαντικὴν καὶ πικράν. αὐαίνομοί γοῦν θερμαίνουσα καὶ διαφορεῖ, καὶ διαχεῖ, καὶ ἐπισπᾶται ὑγρὰ, καὶ πνεύματα· ἔστι δὲ καρηβαρικόν, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ ὦτα μύτταν ζωὴ ἐλαίῳ σὺν πλατείσμῳ καὶ κηρῷ, καὶ μυελῷ. ὅταν γὰρ ἀποβάλλει τὸ πολὺ τῆς δριμύτητος, καὶ γίνεται μαλακτικόν. ἄλλως γὰρ συγκαίει καὶ σκληρύνει βαιότατα πάντων τῶν πυρίων μύρων. ποιεῖ καὶ πρὸς σύριγγας καὶ σήψεις ἐναρῶς· καὶ πρὸς ὑδρωπικὰς καὶ ἀνθρακας καὶ γαγγραίνας σὺν καρδαμώμῳ· πρός τε ῥίγη τὰ φρικώδη καὶ πρὸς τρόμους, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἰοβόλων θηρίων δακνομένοις ἐν συγχρίσμασι, σπόγγοι τε σκορπιοπλήκτοις καὶ φαλαγγιοδήκτοις.*

Id nō ārefina, ſed myrrha craſſitudiné obtinuit: reſina enim neq; amaritudiné præbet, neque vllā odoris gratiā adiicit. Vim habet admodū acré, amarā, & calfacienté. Itaq; ora venarum aperit, calfacit, diſcutit, diffundit, humores & ſpiritus attrahit, caput aggrauat, cōtra vuluæ vitia cū duplo oleo, cera, & medulla efficax eſt. Ita enim ferè multū acrimoniæ exoleſcit, & quædā emolliēdi vis contrahitur. alioqui adurit, & præ omnibus craſsis unguētis indurat. Facit mirū in modum ad fiſtulas & vlcera quę putredinis vitiū ſenſerunt: itē ad hernias humidiores, carbūculos, febriū horrores, tremores, gāgræ náſq; cū cardamomo: aduerſus ſerpentiū morſus illinitur, ſcorpionū & phalangiorū ictibus cum tritis groſsis imponitur.

Περὶ ναρδίνου μύρου. Κεφ. ος'.

Ναρδῖνον μύρον ποικίλως σκευάζεται διὰ τὸ μαλαβαθρίνῳ φύλλῳ καὶ δίχα τούτου· ὡς τὸ πολὺ δὲ μίγνυται τῷ βαλανίνῳ ἐλαίῳ, ἢ ὀμφακίνῳ· ποιεῖ μὴν πλὴν εὐφραίνειν τοῦ ἐλαίου ὄγκος· ποιεῖ δὲ πλὴν εὐωδίαν κόστος, ἄμωμον, νάρδον, σμύρνα, βάλσαμον. ἔστι δὲ χρῆσιν ἡ λεπτὴ, μὴ δριμεῖα, ἔχουσα τὴν εὐωδίαν τῆς ξηρᾶς νάρδου ἢ ἀ-

Nardinum. Cap. LXXVI.

Ratio nardini faciundi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut ſine eo fit: plerunq; autē balanino oleo, aut omphacino: iuncus odoratus ſpiſſamenti gratia adiicitur: ſicuti propter odoris ſuauitatem, coſtus, amomum, nardum, myrrha, balſamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ aut

aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidũ est, nec habet strigmenti crassitudiné, nisi resinãrecipiat. Fit etiã simplex ex omphacino oleo, iũco, calamo, costo & nardo.

Malabathrinũ. Cap. LXXVII.

Malabathrinum spissamenta nardini habet, insuper myrrhæ pluisculũ additur: qua de causa calfacit, crocino aut amaracino viribus respondens.

Myrrha. Cap. LXXVIII.

Myrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Ægyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes, alia circũ caudicé concrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos præpinguis, qua expressa, Stacte emittitur. Alia gabirea pinguissima, læto & pingui solo nascés, ea copiosam sudat stacten. Omnium prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit: splendens, subuiridis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ à troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia

ἢ ἀμώμου. Δυνάμεις δὲ αὐτῆς λεπτυντικὴ, διαιμεῖα, σμηκτικὴ, ἀραιωτικὴ ὑγρῶν, θερμαντικὴ. ὑγρὰ δέ ἐστι καὶ οὐ γλοιώδης, ἐὰν μὴ ῥητίνην ἔχῃ. σκευάζεται δὲ καὶ λιπὴ δι' ὀμφακίνου ἐλαίου καὶ σχίνου, καὶ καλάμου, καὶ κόστου, καὶ νάρδου.

Περὶ Μαλαβαθρίνου. Κεφ. οζ.

Τὸ δὲ μαλαβάθρινον, ἔχει μὲν σύμμαλα ἀ καὶ ἡ νάρδος, σμύρνης δὲ πλέον· διὸ καὶ γίνεται θερμαντικὸν, ἀναλογοῦν τῷ κροκίνῳ καὶ ἀμαρακίνῳ τὴν δύναμιν.*

Περὶ Σμύρνης. Κεφ. οη.

Σμύρνα δάκρυόν ἐστι δένδρου γινομένου ἐν Ἀραβίᾳ, ὅμοιον τῇ αἰγυπτιακῇ ἀκάνθῃ· οὗ ἐγκοπτομένου ἀποῤῥεῖ τὸ δάκρυον εἰς ὑπεστρωμένας ψιάθους· τὸ δὲ, ὃπερ τῷ στελέχει προσπήγνυται. καὶ λέγεται αὐτῆς ἡ μὲν τις πεδιάσιμος λιπαρὰ, ἧς πλείστη γίνεται· ἡ δέ τις γαβιρέα λιπαρωτάτη, ἐν εὐγείοις καὶ λιπαροῖς τόποις γινομένη, ἣ καὶ πολλὴν αὐξησιν τῷ σακτεῖ παρέχεται· πρωτεύει δὲ ἡ τροωγλοδυτικὴ καλουμένη, ἀπὸ τῆς γινώσεως αὐτῷ χώρας· ὑπόχλωρος καὶ δακτικὴ οὖσα, διαυγής. συλλέγεται δέ τις καὶ λέπη μετὰ τῆς τροωγλοδυτικῆς ἀειθαλουμένη, ἐναπάλλος ὡς τὸ βδέλλιον, ὑπόθρωμος τῇ ὀσμῇ, ἐν εὐκλίοις τόποις γινομένη.

ἡ δέ τις

ἡ δέ τις καυκαλὶς λεγομένη, ὑπόξανθος, μέλαινα, κάτοπτος. ἡ δὲ χείριστη ἐν ἁπάσαις, εὐεργασίμη καλεῖται, ψαφαρὰ καὶ ἀλιπὴς, δριμεῖα, κομμίζουσα τῇ ὄψει καὶ τῇ δυνάμει. καὶ ἡ ἀμιννέα δὲ καλουμένη, ἀποδόκιμος. καὶ πίσσματα δὲ ἐξ αὐτῶν γίνεται· ἀπὸ μὲν τῶν λιπαρῶν εὐώδη καὶ λιπαρά· ἀπὸ δὲ τῶν ξηρῶν ἀλιπῆ καὶ οὐκ εὐώδη, ἅτοπος διὰ τὸ μὴ προσειληφέναι ἔλαιον εἰς τὴν ἀνάπλασιν. δολίζεται δὲ κόμμι βραχέτι σμύρνης ἀποβρέγματι καὶ μυρωμένῳ. ἐκλέγου δὲ τὴν νέαν, ψαθυρὰν, κούφην, ὁμόχροον παντοχόθεν, καὶ τὴν ἐν τῷ θλασθῆναι, ἔνδοθεν, λευκὰς, ὀνυχοειδεῖς, ἔχουσι διαφύσεις, λείας, μικρόχωλόν τε, πικρὰν, εὐώδη, δριμεῖαν, θερμαντικήν· ἡ δὲ βραχεῖα καὶ τῇ χρόᾳ πασῶν ἐστὶν ἄχροος. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, καταπτικὴν, κολλυτικὴν, ξηραντικὴν, συστελικὴν, μαλάττει δὲ καὶ μύσσει μεμυκῦσαν καὶ αἱμορροΐ· ἄγει δὲ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα σωτόμως, ζωὰ ἀφανίζων ἢ θέρμων ἀποβεβράσματι, ἢ πιγάνου χυλῷ προστεθεῖσα. λαμβάνεται δὲ αὐτὴ καταποτὴ, μέγεθος κυάμου πρὸς βῆχα χρόνιον καὶ ὀρθόπνοιαν, καὶ πλευρᾶς πόνοι καὶ ὠμόφακος, λύσιν τε κοιλίας. καὶ δυσεντερείας, λύει δὲ καὶ ῥίγη, πρὸς

Alia caucalis cognominatur, præter modũ exoleta, nigra, & retorrida. Omniũ deterrima, quę ergasima dicitur, pingui carẽs, cano situ obducta, acris ad gũmi imaginẽ vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex iis pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è sicciorib⁹ haudquaquam pingues, & inodorati: minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, vndique cõcolor, quæ cõfracta venas vnguium modo candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciẽs: superuacua & inutilis est ponderosa, coloris picei. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccat, astringit, vluam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit, cum absinthio, lupinorum cremore, vel succo rutæ admota: tuberculo fabæ deuorat in vetere tussi, orthopnœa, in laterũ pectorisq; doloribus, in alui profluuio, & dysenteria: horrores discutit,

duabus horis ante febrium acceſsiones, fabæ magnitudinẽ pota cum pipere & aqua: ſubdita linguæ liquatáque, ſcabritiem arteriæ expolit: obtuſam vocem expedit, ventris tineas enecat, contra grauem oris halitum manditur, & aduerſus alarum tædia cum liquido alumine illinitur. gingiuas & dentes ſtabilit, colluto cum vino & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat, medetur fractis auribus ac oſsibꝰ nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus inflammatísque cum meconio, caſtorio, & glaucio: ad varos autem cum caſsia & melle illinitur, impetigines ex aceto purgat, defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita, firmat: diuturnas deſtillationes lenit, illitis penna naribus: oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginem diſcutit, ſcabritiem læuigat, Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo, &, vt poſtea oſtendemus, ad eadem conueniens.

πρὸ δύο ὡρῶν ἢ ἐπιζεχθῆς μὴ πιπάρεως ἢ ὕδαλος τὸ μέγεθος κυάμου πιθεῖσα, ἀφωνίας τε βαχύτητα ἢ δυσουμὲς φωνῆς, ἀποκαθίσησιν ὑποπιεμένη τῇ γλώττῃ καὶ ἀπιχυλιζομένη· κλείνῃ δ' ἢ ἕλμινθας, καὶ πρὸς δυσωδίαν στόματος διαμασᾶσθαι· πρὸς δὲ μαλακῶν πόνους, μὴ συμπήγνυσθαι ὑγρὰς διαχρίεται· σὺν οἴνῳ δὲ ἢ ἐλαίῳ διακλυζομένη, ὀδόντας ἢ ἕλκα κρατύνει· κολλᾷ δὲ ἢ τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ βαύματα ἐπιπαττομένη, ἢ τὰ τεθλασμένα ὦτα ἢ ἐψιλωμένα ὀσᾶ, ἰᾶται σὺν κοχλίου σαρκὶ ἐπιχριομένη, ἢ τὰ πυορρόουντα τῶν ὤτων ἢ φλεγμαίνοντα, σὺν μηκωνίῳ ἢ καστορίῳ ἢ γλαυκίῳ· πρὸς δὲ ἰόνθους μὴ καυσίας ἢ μέλιτος ἐπιχρίει· λιχμῶσα τὲ ἀποσμήχει σὺν ὄξει, ἢ πείσας ῥεύσας μὴ λαδάνῳ ἢ οἴνῳ ἢ μυρσινίνῳ καὶ ἀχριομένη ῥώννυσι· σφαίνει δὲ ἢ τὸν χρονίως καταῤῥέοντα διαχριομένη πτερῷ τῶν ὀξυτήρων· πληροῖ ἢ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ἕλκη, ἢ καταίρει τὰ λευκώματα ἢ τὰ ἐπισκοτοῦντα τῶν κόρας, ἢ βαχώματα σμήχει. γίνεται δὲ ἢ λιχνὶς ἐξ αὐτῆς ὁμοίως τῇ ἐκ τῆς λιβάνου, ὡς ὑποδείξομεν, αἰθάλουσα πρὸς τὰ αὐτά.

Myrrha Bœotica. Cap. LXXIX.

Bœotica myrrha, diſſecta radix eſt arboris cuiuſdã ĩ Bœotia naſcẽtis

Περὶ Βοιωτικῆς σμύρνης. Κεφ. οθ'.

Ἡ δὲ βοιωτικὴ σμύρνα, ἔστι δένδρου πηγὸς ἐν βοιωτίᾳ γινομένου

του ῥίζα τετιμημένη. ἐκλέγου δὲ καὶ ἐμφερῆ σμύρνῃ καὶ εὐωδίαν. Δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, διαπυητικήν. μίγνυται δὲ καὶ τοῖς θυμιάμασι χρησίμως.

Περὶ στύρακος. Κεφ. π'.

Στύραξ δάκρυόν ἐστι δένδρου παρόμοιου κυδωνίῃ. διαφέρει δὲ αὐτῆς ὁ ξανθὸς καὶ λιπαρὸς ῥητινώδης, βρόμιοις ἔχων ὑπολεύκοις, ὅπερ διαμένων τῇ εὐωδίᾳ ὡς ὀπτηλεῖται, καὶ ἐν τῷ μαλάττεσθαι αὐξεῖς ὑγρασίαν πυκνὴ μελιτώδη. τοιοῦτος δέ ἐστιν ὁ καταβαλλόμενος καὶ πιεσθεὶς διαχὺς καὶ κιλίκιος. φαῦλος δὲ ὁ μέλας καὶ * ψαθυρὸς, καὶ πιτυρώδης. εὐείσκεται δὲ καὶ δάκρυον κόμμι ἐοικὸς, διαυγὲς, σμυρνίζον· ὀλίγον δὲ τοῦτο γίνεται. ἀδολίοισι δὲ αὐτὸ τοῖς ἐκ τοῦ δένδρου ἀφίσμασιν ἄκαρ ὑπὸ τῶν σκωλήκων ἀνατιτρᾶται μικρομόρια καὶ μέλιτι καὶ ἕρπεσι ὑποσάθμη, καὶ ἄλλοις τισίν. ἔνιοι δὲ κηρὸν ἢ στέαρ ἀρωματίσαντες συμμιγάσουσιν ἐν τοῖς ὀξυτάτοις ἥλοις τῷ σύραγι, καὶ δι' ὀθονίου ἐκθλίβουσιν εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ποιοῦντες σκωλήκια ἃ καλοῦσι, σκωληκίτην ὀνομάζοντες.* ἐγκρίνουσι δὲ οἱ ἄπειροι τὸν τοιοῦτον ὡς ἀκίρασον, οὐ προσέχοντες τῇ κατὰ τὴν ὀσμὴν ἐυτονίᾳ, δριμὺς γὰρ λίαν ἐστὶν ὁ ἄδολος.

Δύναμιν

tia nascentis, Melior est quæ myrrham odoris suauitate repræsentat. Vis ei calfactoria inest, emollit discutítq; suffimentis commodissimè inseritur.

Styrax. Cap. LXXX.

Styrax lachryma est arboris malo cotoneę similis. Præfertur sordescens, flauus, resinosus, albicãtibus grumis, quàm plurimũ in sua odoris gratia permanés: qui dũ mollitur, melleũ liquorẽ reddit: qualis è Catabalis, Pisidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, furfurosus, friabilis, canóq; situ obductus. Cæterum lachryma inuenitur gũmiũ similitudine, perlucida, & myrthæ ęmula: verũ perpauca manat. Adulterat ligni scobe, quã vermiculi erodẽtes excusserũt, melle, & iridis sedimẽto, & q̃busdã aliis. Alij cerã aut adipẽ odoribus imbutũ, flagrãtissimis solib⁹ cũ styrace subigũt, & p̃ laxa cribri foramina ĩ frigida aqua veluti vermiculos exprimũt, vẽnũdantq;. Styracẽ hũc (quoniã vermiculorũ speciẽ cõtrahat) scholecitẽ cognominant, tanq̃ syncerũ imperiti approbãt, nõ animaduertẽtes ad præcipuam odoris fragrantiã: siquidem acer admodũ est, qui adulterationis vitio caret.

Styrax calfacit,emollit,& concoquit: medetur tuſsi, deſtillationibus, raucedini,grauedini, & interceptæ voci:vuluę præcluſæ duritiáve laboranti conuenit, cit menſes potu appoſitúque,aluú leuiter mollit,ſi exiguum cum reſina terebinthina catapotij modo deuoretur.Miſcetur vtiliter diſcutiétibus malagmatis,acopísque. Adoletur autē & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem conueniés ad quæ thuris fuligo.Ex eo etiam in Syria ſtyracinum oleum componitur,quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauátque, & ſoporem adfert.

Δυώαμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, πεπτικὴν· ποιῶν πρὸς βῆχας καὶ καταῤῥους, χορύζας, βράγχους, ἀποκοπὴν φωνῆς· ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς τὰς ἐν ὑστέρᾳ μύσεις καὶ σκληρίας· ἐμπλαστὰ τε ἄγει πινόμενος καὶ προσπιθέμενος, κοιλίαν τε κούφως μαλάττει καταπινόμενος ὀλίγος μετὰ ῥητίνης τερεβινθίνης. μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι διαφορητικοῖς καὶ ἀκόποις χρησίμως. καίεται δὲ καὶ ὀπτᾶται καὶ φώγνυται καὶ * θαλοῦται ὡς λίβανος· ἁρμόζει τε ἡ αὐθάλη πρὸς ἃ καὶ ἡ τοῦ λιβάνου. τὸ δὲ ἐξ αὐτοῦ σκευαζόμενον χρῖσμα ἐν τῇ συρίᾳ συριγκίνον, θερμαίνει καὶ μαλάττει ἰσχυρῶς· κεφαλαλγὲς μέντοι καὶ βαρὺ καὶ καρωτικὸν καθίστησιν.

Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tuſsi, deſtillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ voci: vuluę præcluſæ duritiáve laboranti conuenit, cit menſes potu appoſitúque, aluú leuiter mollit, ſi exiguum cum reſina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miſcetur vtiliter diſcutiétibus malagmatis, acopísque. Adoletur autē & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem conueniés ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria ſtyracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauátque, & ſoporem adfert.

Bdellium. Cap. LXXXI.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madelcon: lachryma eſt ſaracenicæ arboris. Probatur guſtu amarū, tranſlucidū, taurini glutinis in morē, intus pingue, liqueſcens facile, ligni ac ſordis expers, ſuffitu odoratum, vngui ſimile. Eſt etiamnū bdellij genus ſordidum, nigrū, vberioribꝰ glebulis in offas cōuolutū, aſpalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiā à Petra oppido ſiccū, reſinoſum, liueſcēs, ſed facultate ſecundū.

Περὶ βδελλίου. Κεφ. πά.

Βδέλλιον οἱ δὲ μάδελκον, οἱ δὲ βολχὸν καλοῦσι· δάκρυόν ἐστι δένδρου σαρακηνικοῦ. δόκιμον δέ ὅτιν αὐτὸ τῇ γεύσει πικρὸν, διαυγὲς, πυρακολλῶδες, λιπαρὸν διὰ βάθους καὶ εὐμάλακτον, ἀμιγὲς ζύλων, καὶ ῥυπαρείας, εὑρῶδες ἐν τῇ θυμιάσει, ἐοικὸς ὄνυχι. ἔστι δὲ καὶ * ἕτερον ῥυπαρὸν καὶ μέλαν, ἀδρόβωλον, παλαθῶδες, κομιζόμενον ἀπὸ τῆς ἰνδικῆς. φέρεται δὲ ἀπὸ τῆς πέτρας, ξηρὸν, ῥητινῶδες, εὔσπιλον, δευτερεῦον τῇ δυνάμει.

Adul-

δολοῦ

δολοῦται δὲ μιγνύμενον κόμμι· τὸ δὲ τιοῦτον οὐχ ὁμοίως πικραίνει τὴν γεῦσιν, ἔν τε τῇ ὑποδυμίδι, οὐχ ἥκιστος εὐῶδες ἐστί. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, διαλυτικὴν. βεγχοκηλῶν καὶ σκληρίων καὶ ὑδροκηλῶν, ἐνεδὲν πηλέλῳ ἀσίτου· αὐοστομοῖ καὶ τὴν μήτραν περιτιθέμενον καὶ ὑποδυμιώμενον, ἐφέλκεται δὲ καὶ τὰ ἔμβρυα καὶ πᾶσαν ὑγρασίαν, ῥύπτει δὲ καὶ λίθους πινόμενον, καὶ οὖρα ἄγει, βηχικοῖς τε καὶ θηριοδήκτοις, ὠφελίμως δίδοται· ἀγαθὸν δὲ καὶ πρὸς ῥήγματα, κατάσματα, καὶ πλευρᾶς πόνον καὶ διαῤῥομὰς πνευμάτων· μίσγεται δὲ καὶ μαλάγμασι τοῖς ἁρμόζουσι πρὸς τὰς σκληρίας καὶ δύσεις τῶν νεύρων· καταργάζεται δὲ κοπτόμενον, παραχεομένου οἴνου ἢ ὕδατος θερμοῦ.

Adulteratur gummi, sed ita vitiatum non perinde gustui amaritudinem repæsentat, nec vsque adeò suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humidásque hernias discutit, cum ieiuna saliua dilutum: vuluæ spiracula laxat appositu & suffitu, & partus humiditatésque omneis extrahit, calculos potu comminuit, vrinam mouet tusientibus & à serpente percusis, vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmatis inseritur, quæ contra duritias & neruorum nodos prosunt: contusum resoluitur affuso vino aut aqua calida.

Περὶ λιβάνου. Κεφ. πβ'.

Thus. Cap. LXXXII.

Λίβανος γίνεται μὲν ἐν Ἀραβίᾳ τῇ λιβανοφόρῳ καλουμένῃ, πρωτεύει δὲ ὁ ἄῤῥην καλούμενος σταγόνιας, στρογγύλος φυσικῶς. ἔστι δὲ ὁ τοιοῦτος ἄτομος λευκός τε καὶ θλασθεὶς ἐνδοθεν λιπαρὸς, ὀσφρυμιασθεὶς δὲ ταχέως ἐκκαόμενος. ὁ δὲ ἐνδικὸς ὑποκιῤῥός τε ἐστὶ, καὶ πιλὸς τὴν χρόαν, γίνεται δὲ καὶ κατὰ τὴν ὀπτὴν δεῖσιν στρογγύλος· τέμνοντες γὰρ αὐτὸν εἰς τετράγωνα σχήματα καὶ βάλλοντες εἰς κεκαμένα, κυλίουσιν ἕως

Thus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatú tenet í eo genere masculú, stagonias appellatú, suapte natura rotundí: tale autẽ indiuiduum est, candidú, cùm frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum verò fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria factitant: nam in quadrangulares formas dissectú fictilibus versant,

donec rotunditatē contrahat: verùm huiusmodi thus tēpore flaueſcit, quod atomū aut ſyagrū appellāt. Secundū locū habet Arabicū, & ī Smilo naſcēs, quod aliq copiſcū vocāt, minꝰ multò & fuluius. Eſt & genus aliud, cui amωmitæ cognomen eſt, alioqui cādidum: quod dū mollitur, maſtiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere, pini reſina & gūmi, quod facile deprehēdi poteſt: ſiquidē ſuſſitū gūmi flammā nō eiaculatur, & reſina in fumū euaneſcit, thus verò ſtatim ardet: idē maleficiū odor prodit. Ad calfaciendū & aſtringēdū pollet, oculorū caliginē diſcutit, caua vlcera cōplet & ad cicatricem perducit cruenta vulnera glutinat, infrenatq; cūctas ſanguinis eruptiones, etiamſi cerebri membranis effluat: vlcera quæ cacoēthe vocantur, & ſedis & reliquarum partiū permulcet tritū cū eo & lacte linamentū: formicantes verrucas inter initia, impetiginēſq;, ex aceto & pice illitū, tollit: ambuſta igni pnionēſq; cū ſuillo adipe aut anſerino, & vlcera ī capite mānātia cū nitro, ſi infricetur, ſanat: paronychiis cū melle auribus fractis cum pice, medetur: ad

ἕως ἂν ἀπολάβοι τὸ στρογγύλον σχῆμα· χρόνῳ δὲ ὁ τοιοῦτος ξανθοῦται, ἄτομος ἢ σύαγρος καλούμενος. Δευτερεύει δ' ὁ ἀραβίας καὶ ὁ ἐν σμίλῳ, ὃν ἔνιοι κοπίσκον καλοῦσι, μικρότερον καὶ ἧττον λευκὸν· ἐν δὲ τῷ μαλάττεσθαι ἐνδίδωσιν ὡς μαστίχη. Δολοῦται δὲ πᾶς λίβανος τῇ πιτύινῃ ῥητίνῃ μεθοδευόμενος, καὶ κόμμι. εὐχερὴς δὲ ὅτιν ἡ διάγνωσις. τὸ μὲν γὰρ κόμμι οὐκ ἐναφλογοῦται θυμιώμενον, ἡ δὲ ῥητίνη εἰς καπνὸν ἐκτυφοῦται· ὁ δὲ λίβανος τὸν ἐξάπλετον. Δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ὀσμὴ τὸ τοιοῦτον. Διώσασθαι δὲ θερμαίνειν, σύφειν, ἀποκαθαίρειν τὰ ἐπισκοτοῦντα τῶν κόρων, καὶ τὰ κοῖλα τῶν ἑλκῶν σαρκοῦσθαι καὶ ἀπουλοῦσθαι, κολλᾶν τε τραύματα τραύματα, αἱμορραγίαν τε πᾶσαν, καὶ τὴν ἐκ μηνίγγων ἐπέχειν· φαρμακοῖ καὶ τὰ περὶ δακτύλιον καὶ τὰ λοιπὰ μέρη καχοήθη ἕμμοτος λεῖος, σὺν γάλακτι, καὶ τὰς ἐν ἀρχῇ μυρμηκίας καὶ λειχῆνας, ζυμὴ ὄξει καὶ πίσσῃ καταχριόμενος αἴρει, καὶ τὰ πυέχοντα δὲ ἕλκη καὶ χίμετλα ἰᾶται σὺν στέατι χοιρείῳ ἢ χηνίῳ· ἀχῶρας δὲ σὺν νίτρῳ σμώμενος ἰᾶται. παρωνυχίας τε σὺν μίλτῃ, ὦτων θλάσεις σὺν πίσσῃ

θέλε

πρὸς δὲ τὰ λοιπὰ ἀλγήματα τῶν, ὡς οἴνῳ γλυκεῖ ἐγχεόμενος, μασοῖς τε τῶν ἀπὸ τοκετῶν φλεγμαίνοντας σὺν κιμωλίᾳ καὶ ῥοῦ ὄξει καὶ ἀχρείου ὕδατος ὠφελεῖ. μίγνυται δὲ ἐς τοῖς πρὸς ἀφροδίσια ἀφροδίμως, καὶ τοῖς ἀπλαγχνικοῖς φαρμάκοις, αἱμοπτοϊκοί τε ὠφελεῖ πινόμενος· μανιώδης δὲ ὅτι πινόμενος ὑπὸ τῶν ὑγιαινόντων, πλείων δὲ μετ' οἴνου πεθεὶς καὶ κτείνει. καίεται δὲ λίβανος ἐπ' ὀστράκου καθαροῦ τεθεὶς, ὑφαπτομένου ξύλου ἀναφθέντι ἀπὸ λύχνου, ἄχρις οὗ σβεσθῇ· δεῖ δὲ μὴ πάνυ τελείαν καῦσιν ποιεῖσθαι τινὶ ἄχρις οὗ σβεσθῇ ὅπως μὴ ὑπὸ σποδοῦται. ἔνιοι δὲ περιπλάσασι τῷ λοπαδίῳ ἀγγείου χαλκοῦ, κοῖλον κῶνον μέσον τετρημένον, πρὸς ἔκλειψιν τῆς λιγνύος, ὡς ὑποδείξομεν ἐν τῷ περὶ αὐθάλης λιβανώτου λόγῳ. οἱ δὲ, εἰς ὠμὸν χύτραν βάλλοντες καὶ περιπλάσαντες πηλῷ, καίουσιν ἐν καμίνῳ. φώγουσι δὲ ἐπ' ὀστράκου καινοῦ καὶ αὐστράκων διαπύρων, ἕως οὗ μηκέτι πεμφολυγίζῃ, μὴ δὲ λιπαρίαν τινὰ ἢ ἅλμιδα ἀνίῃ. θρύπτεται δὲ εὐχερῶς μὴ κατακαχωμένος.

ad reliquos auriũ dolores cum dulci vino iufunditur, inflammatæ à partu mammę cum cimolia & rosaceo magna vtilitate perungũtur, additur ad arteriæ visceũmq; medicamenta, prodest sanguinis excreationi potum: sed in secunda valetudine hausturn insaniã mouet, & largius cum vino potum interficit. In fictili mundo thus crematur, flagrante glebula succensum à lucerna, donec exuratur: post perfectam vstionem operire oportet, vsque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, vt in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo viuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporémve emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Περὶ Φλοιοῦ Λιβάνου. Κεφ. πγ'.

Φλοιὸς δὲ λιβάνου διαφερεῖ ὁ παχὺς καὶ λιπαρὸς καὶ εὐώδης, πρόσφατος, λεῖος καὶ μὴ λεπρώδης ἢ ὑμενώδης. δόλοῦται δὲ μιγνυμένῳ

Thuris cortex. Ca. LXXXIII.

Præfertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, leuis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur ad-

miſto pini aut nucis eius cortice, ſed horũ index ignis eſt: ſiquidem reliqui cortices ſuffiti nequaquã incenduntur, ſed ſine odore fumum eructant: thuris verò cortex ardet, & cũ odoris fragrantia vaporem eiaculatur. Thuris modo vritur, & vis eadem quæ thuri, ſed validior aſtringẽtiórq;. Quare potu cruẽtis excreationibus, vluis fluxione laborantibus in peſſo confert, ad cicatrices oculorũ, & caua ſordéſque efficax eſt. toſtus ſcabris lippitudinibus auxiliatur.

Mãna thuris. Ca. LXXXIIII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, ſed inualidiuſculam. Sunt qui cribrata pini reſina, ac polline, aut cortice thuris contuſi adulterant: ſed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æquè ſuffitu aërium vaporem, ſed fuliginoſum & impurũ expuit, & permiſtum ſuaueolentiæ halitus virus habet.

Thuris fuligo.

Ca. LXXXV.

Fuliginem thuris ſic facito: Forcipicula, lucernis accenſas ſingulatim thuris glebas, in noũam fictilem ollam cõcauam impo-

γεμμένῳ αὐτῷ φλοιοῦ τροβιλίνου ἢ πιτυίνου, ἔλεγχος δὲ ἀπὸ τούτων τὸ πῦρ· οἱ μὲν γὰρ λοιποὶ θυμιαθέντες οὐκ ἀναπίπτουσι, καπνιζόμενοι δὲ δίχα εὐωδίας ἐκπύρουσι· ὁ μέντοι τῆς λιβάνου φλοιὸς ἄπεται μὲν εὐωδίας ἐνθυμίαται· καίεται δὲ ἀπὸ οὗτος ὡς λίβανος. Δύναμιν δ' ἔχει ἰσχὺν ἀπὸ ὁ λίβανος· ἐπιβρέστερος δ' ἐστὶν ποθεῖς, αἱμοπτυϊκοῖς μᾶλλον καὶ ῥοϊκοῖς αἱμόζοις ἐν θερμέτῳ· ποιεῖ καὶ πρὸς οὐλὰς ἐν ὀφθαλμοῖς, ἀπὸ κοιλώματα καὶ ὑπαιθρίας· φωχθεὶς δὲ ἀπὸ πρὸς φλυκταινίδας ποιεῖ.

Περὶ Μάννης Λιβάνου. Κεφ. πδ'.

Μάννα δὲ λιβάνου δόκιμός ἐστιν ἡ λευκὴ καὶ καθαρά, ἔγχνοος. Δύναμιν δ' ἔχει ἰσχὺν ὁ λιβανωτὸς, ὑπαιθριώδης δ' μᾶλλον. μίσγουσι δ' ἔνιοι δολίζοντες ῥητίνην πιτυίνην σεσημμένην ἀπὸ γύριν, ἢ φλοιὸν λιβανωτοῦ κεκομμένου· ἐλέγχει δ' ἀπὸ ταῦτα τὸ πῦρ. ὅτε μὲν γὰρ ἴσον ἀπὸ ἰσοτόνως θυμιαθήσεται ἀερίζοντι τῷ ἀτμῷ, ἀσβολώδει δὲ καὶ οὐ καθαρῷ, ἢ τε εὐωδία μικτὴ ἔχει τὴν ἀποφοράν.

Περὶ Αἰθάλης Λιβανωτοῦ. Κεφ. πε'.

Αἰθάλην δ' λιβανωτοῦ ποιήσεται λαβὼν λέβητα καθ' ἕνα χόνδρον τοῦ λιβάνου ἄπτων πρὸς λύχνον, ὑπτίθει εἰς κοῖλον λοπάδιον ὀστράκινον καινόν·

κεινὸν· εἶτα ἐπικάλυψον χάλκωμα ἔγκοιλον, τετρημμένον κατὰ μέσον καὶ ἐσμυγμένον ἐπιμελῶς, *ἐπίθει τι κατὰ τὸ ἕτερον αὐτῶν* μέρος ἢ ἀμφότερα λιθάρια ὑψηλὰ τετραδακτυλιαῖα πρὸς τὸ διαφαίνειν εἰ χώρει· καὶ ἵνα χώρα ᾖ ὑποπίπτειν* ἑτέρους χόνδρους* ἀεί. ἐπὶ τῶν πρώτων χόνδρου ἀποσβεσθῆναι παντελῶς, *καὶ τοῦτο ποίει, ἕως ἂν αὐτάρκη λιγνὺν δέξῃς συναγωγέναι. σπογγιᾷ μέν τοι ἀπόγλυε ἐξ ὕδατος ψυχροῦ πρότερον τὰ ἐκτὸς μέρη τοῦ χαλκώματος· οὕτω γὰρ πρασκαθίζει πᾶσα λιγὺς, μὴ ἄγαν αὖθις πυρουμένου· ἐπεὶ ἀποπίπτοντα διὰ τὴν κουφότητα, μίγνυται τῇ τοῦ λιβάνου ἀποδοχῇ. ἀποψήσας οὖν τὴν πρότερον λιγνύν, ποίει τὸ αὐτὸ ἐφ' ὅσον ἂν δοκῇ, ἀναιρεῖν δὲ καὶ τὴν ἐκ τοῦ καέντος λιβάνου ἀποδοχὴν ἰδίᾳ. Δύναμιν δ' ἔχει πρὸς ὀφθαλμοῖς φλεγμονῶν, σταλτικὴν ῥευμάτων, ἀναπαστικὴν ἑλκῶν, πληρωτικὴν κοιλωμάτων, σταλτικὴν καρκινωμάτων.

imponito: & æreo vase in medio perforato, detersa diligenter sorde, obtegito: alteram admoueto, ex altera eius parte aut vtraque, subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspici queat, si vrantur: & qua locus capax fuerit, glebulas alias superponito, & anteà quàm prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito: donec sufficiẽtem fuliginem videaris coëgisse. Continuò tamen externæ æramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, absterganturita enim téperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit: quæ alioqui per leuitatem decidua, thuris cinerib⁹ admiscetur. Derasa itaque fuligine, cinis cremati thuris seorsum sub strahédus est. Idem opus, quod satisfactum tibi videtur, obeũdum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, caua explet, carcinomata sistit.

Πρὶ λιγνύος σκευασίας. Κεφ. ϟϛ΄.

Fuliginis compositio. Cap. LXXXVI.

Τὸν αὐτὸν τρόπον σκευάζεται καὶ ἐκ τῆς σμύρνης καὶ ἐκ τῆς ῥητίνης, καὶ ἐκ τοῦ στύρακος λιγνὺς ἁρμόζουσα πρὸς τὰ αὐτὰ, καὶ ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν δακρύων ὁμοίως τῆς λιγνὺς λάμβανε.

Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquísque lachrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Πρὶ

Picea

Picea & Pinꝰ. Ca. LXXXVII.

Pinus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitát specierum distinctionẽ, arbores vulgò cognitæ: quarũ cortex astringit, prodest tritus & illitus intertrigini, vlceribus summũ corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma argenti & manna. Vlcera delicatulorum acrimoniam recusantium, cerato myrtino exceptꝰ, ad cicatricem perducit: tritus cum sutorio atramento serpẽtia cohibet, suffitu partus & secundas eijcit, potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorum trita & illita inflammationes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicant, trita autem & decocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent: hepaticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut mulsa pota. Pineæ nucis cortex & folia potu idem præstant. Teda earum particulatim secta si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit spatha acoporum pessorumq; compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti cõfectionem excipitur:

Περὶ Πίτυος. Κεφ. πζ'.

Πίτυς γνώριμον δένδρον ἐστὶ τῇ ἀυτῇ φύσει καὶ ἡ λεγομένη πίτυς, εἴδει διαφέρουσα· ἀμφοτέρων δὲ ὁ φλοιὸς στυπτικὸς, ἀρμόζων πρός τε παραβλήματα λεῖος καὶ παπλαστόμενος, καὶ πρὸς τὰ ἐπιπόλαια τῶν ἑλκῶν καὶ κακοηθῆ σαπὼ λιθαργύρῳ καὶ μάννῃ· ἀναληφθεὶς δὲ κηρωτῇ μυρσίνῃ, ἀπολοῖ τὰ ἐπὶ τῷ βυρδοχεῶνι ἕλκη καὶ τὰ ἑρπυστικὰ ἐπέχει μὴ χαλκάνθης λεῖος, ἔμβρυά τε καὶ δεύτερα ὑστέρα θυμιαθεὶς ἐκβαλλῇ, κοιλίαν τε πεθεὶς ἐφίστησι, καὶ ἤρεμα κινεῖ, καὶ τὰ φύλλα δὲ αὐτῆς καταπλαθέντα λεῖα, φλεγμονὰς παρηγορεῖ, καὶ τραύματα ἀφλέγαντα διατρεῖ, λειαίνοντα δὲ καὶ ἐλκηθέντα ἐν ὄξει. ὀδοντολγίας παύει διακλυζόμενα θερμά· ἁρμίζῃ δὲ καὶ ἡπατικοῖς τὰ φύλλων ἑλκὴ μία σὺν ὕδατι ἢ μελικράτῳ πεθεῖσα. ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ ὁ τῆς στροβίλου φλοιὸς καὶ τὰ φύλλα πεθέντα. καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς δὲ δαδίον καιόμενον εἰς λεκάνην καὶ ἐφθὲν σὺν ὄξει, ὀδοντολγίας παύει, κρατυνομένου τοῦ ἀφεψήματος καὶ τὸ πεπονθὸς ὀδόντος, καὶ σπάθη δὲ ἐξ αὐτῆς γίνεται εἰς ἀκόπων σκευασίας καὶ ποιῶν ἐπιτηδείως· ἡ δὲ ἐξ αὐτῶν λιγνὺς καιομένων, ἐκλαμβάνεται πρὸς μέλανος γραφικοῦ κατασκευὴν ποιοῦσα

πιοῦντα· καὶ πρὸς καλλιβλέφαρα καὶ κανθοὺς βεβρωμένους, πρός τε πτίλα βλέφαρα καὶ ὀφθαλμοὺς δακρύοντας.

Περὶ Πιτυΐδων. Κεφ. πη'.

Πιτυΐδες δὲ καλοῦνται ὁ καρπὸς τῶν πιτύων καὶ τῆς πεύκης, ὁ εὑρισκόμενος ἐν τοῖς κώνοις. Δύναμιν δὲ ἔχουσι, στυπτικὴν, θερμαίνουσαν ποσῶς. βοηθοῦσι δὲ βηξὶ καὶ τοῖς περὶ θώρακα πάθεσι, καθ' ἑαυτὰς ἢ μετὰ μέλιτος λαμβανόμεναι.

Περὶ Στροβίλων. Κεφ. πθ'.

Στρόβιλοι δὲ καὶ καθαροὶ ἐσθιόμενοι, ἢ μετὰ γλυκέος ἢ σικύου σπέρματος πινόμενοι, οὐρητικοί, ἀμβλυντικοὶ τῶν περὶ κύστιν καὶ νεφροὺς δριμυτήτων, παρηγοροῦσι δὲ καὶ στομάχων δηγμούς, μετ' ἀνδράχνης χυλοῦ λαμβανόμενοι ἐξ*ερείδουσι τε ἀτονίαν σώματος, καὶ τὰς τῶν ὑγρῶν διαφθορὰς ἐξαμβλύνουσιν. ὅλοι δὲ οἱ στρόβιλοι ἀπὸ δένδρων πρόσφατοι θλασθέντες ἐν γλυκεῖ καὶ ἑψηθέντες, ἁρμόζουσι παλαιαῖς βηξὶ καὶ φθίσεσι, καὶ τοῦ ἐξ αὐτῶν ὑγροῦ καθ' ἑκάστην ἡμέραν λαμβανομένου κυάθων τὸ πλῆθος τριῶν.

Περὶ Σχίνου. Κεφ. ϟ'.

Σχῖνος δένδρον γνώριμον στυπτικὸν ὅλον· καὶ γὰρ ὁ καρπὸς αὐτῆς καὶ τὸ φύλλον καὶ ὁ φλοιὸς τῶν κλάδων καὶ τῆς ῥίζης ἰσοδυναμοῦσι. γίνεται

ea circũlitionib⁹ efficacißimè imponit, quibus palpebras ornãt, coloréq; mẽtiunt, callibrephara Græci vocãt: arrosis oculorũ angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulat.

Pityides. Cap. 88.

Pityides appellantur pinorum piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriam habent, & aliquãtum excalfacientem: tußi & pectoris vitiis auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti.

Strobili. Cap. LXXXIX.

Nuces pineæ cũ Strobili repurgatæ mãdũtur, aut cũ passo aut cucumeris semine bibuntur, vrinam ciẽt: acrimonias in renibus & vesica hebetãt, stomachi rosiones leniunt: datæ cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoq; humorũ labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerptę in passo frãguntur, & decoctæ, vetustæ tußi ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus. Cap. XC.

Lentiscus nota arbor est, cui toti vis inest astringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibúsq; cognatæ insũt vires.

Liqua-

Liquamentum autē ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquuntur, & vbi abundè cocta refrigeratáque sunt, folia abiiciuntur: aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua sua astringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluuia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acaciæ & hypocistidis vicem repræsentat. Idem facit succus è tritis foliis. Decoctum fotu caua explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, vrinam pellit, motus dētium collutione stabilit. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum, quod prodest cùm quid adstringi opus est.

γίνε) ἢ καὶ χύλισμα ἐκ τοῦ φλοιοῦ, καὶ τῆς ῥίζης καὶ τῶ φύλλων ἑψημάτων σὺν ὕδατι ἐφ' ἱκανὸν· εἶτα μετὰ τὸ ἐψηθῆναι τὰ φύλλα ῥίπτομεν, τὸ δὲ ὕδατος πάλιν ἑψοῦμεν μέχρι μελιτώδους συστάσεως. ποιεῖ δὲ σύφων πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ῥύσεις κοιλίας καὶ δυσεντερίας πινόμενος, καὶ πρὸς τὰς ἐκ μήτρας αἱμορροΐδας, καὶ προπτώσεις ὑστέρας καὶ σκληρίας· καὶ καθόλου ἀντὶ ἀκακίας καὶ ὑποκυστίδος ἔνεστιν αὐτῷ χρῆσις. καὶ ὁ χυλὸς δὲ τῶν φύλλων ἐναλειφόντων τὰ αὐτὰ ποιεῖ. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν καταπλασσόμενον, τὰ ἀσυμπλήρωτα πληροῖ, καὶ τὰ ἀπόρωτα πωρεῖ ὀστέα, καὶ τὰς ἐκ μήτρας *ῥύσεις στέλλει, καὶ τῶν νομῶν ἀποτρεπτικόν καὶ οὐρητικόν ἐστιν, ἴσχει δὲ καὶ στομώδους ὀδόντας διακλυζόμενον. τὰ δὲ ξυλάρια χλωρὰ αὐτὴ καλαμώδων περιβιβόμενα τοῖς ὀδοῦσι, σμήχει τούτους. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔλαιον συπτικόν, ἀμύζον πρὸς τὰ σύφεως δηλούμενα.

Lentiscus. Cap. XC.

Lentiscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, & ab aliquibus, mastiche. Pota vtilis est sanguinem reiicientibus, & tussi veteri: stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentifricia, &

Περὶ Ῥητίνης σχινίνης. Κεφ. ϟά'.

Γεννᾶται δὲ καὶ ῥητίνη ἐξ αὐτῆς σχινίνη καλουμένη, ὅν' εἰσὶν δὲ μαστίχη. χρησιμεύουσα πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς, καὶ πρὸς παλαιὰν βῆχα πινομένη· ἔστι δὲ εὐστόμαχος ἐρευκτική. μίγνυται δὲ καὶ σμήγμασιν ὀδόντων.

καὶ

καὶ ὀπχρίσμασι προσώπου στλεγματιοῦσα. ἀγαχολλᾷ δὲ καὶ πέιλας ἐν ὀφθαλμοῖς, στόματός τε εὐωδίαν ποιεῖ διαμασωμένη, καὶ οὖλων ἐστὶ σαλπική. γίνεται δὲ καὶ καλλίστη καὶ πλείστη ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ. διαφέρει δὲ αὐτῆς ἡ λαμπυρίζουσα, καὶ τυρρηνικῷ κηρῷ ὁμοία τῇ λευκότητι, ἀδρὰ καὶ καταρὰ καὶ εὐθρυπτος καὶ εὐώδης. ἡ δὲ χλωρὰ ἧττων. δολοῦται δὲ λιβανοῦ καὶ ῥητίνης προβιλίνης μιγνυμένων αὐτῇ.

Περὶ Τερμίνθου. Κεφ. σβ'.

Τέρμινθος γνώριμον δένδρον, οὗ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ φλοιὸς συπτικὰ ὄντα ἁρμόζει πρὸς ἃ καὶ ἡ ὄλυνθος, σκληρυνόμενα ὁμοίως καὶ λαμβανόμενα. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς ὅταν ἐδώδιμος, καὶ χολαγωγός, οὐρητικός, θερμαντικός· ἔστι δὲ ἄπεπτος πρὸς ἀφεδρίσια, σὺν οἴνῳ δὲ πινόμενος, πρὸς φαλαγγίων δήγματα ἁρμόζει. ἡ δὲ ἐξ αὐτῆς ῥητίνη κομίζεται μὲν ἐξ Ἀραβίας τὸ δὲ πλεῖστον γίνεται ἔν τε Ἰουδαίᾳ καὶ συρίᾳ καὶ ἐν Κύπρῳ καὶ ἐν Λιβύῃ, καὶ ἐν ταῖς κυκλάσι νήσοις· ἡ δὲ καὶ διαφέρει διαυγεστέρα οὖσα, λευκὴ, ὑαλίζουσα τῷ χρώματι καὶ κυανίζουσα, εὐώδης τερμίνθου πνέουσα. πρεσβύτερα δὲ πασῶν τῶν ῥητινῶν ἡ τερμινθίνη καὶ μετὰ ταύτην ἡ πευκίνη, εἶτα ἡ πιτυίνη καὶ ἡ ἐλατίνη· μὴ

& illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. Palpebras oculis incómodas replicat, mã ducata halitũ oris comnédat, gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Præfertur (nitedulę modo) resplendescẽs, & candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adulta, retorrida, friabilis, odorata, stridorẽ ædens. Viridis autẽ inferior est. Adulteraſ thuris, resinæq; pineæ nucis mistura.

Terebinthus. Cap. XCII.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex adstringunt, & ad eadem ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptáque. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, vrinam mouet, venerem excitat, contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia petræa defertur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Africa & Cycladibus insulis: sed prævalet candida, perlucida, vitreo colore & in cæruleum vergente, odorata, terebinthum olens. Terebinthus resinas omneis antecedit: proxima lentiscina, & è pinu, & abiete: has

has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire discutere, expurgare. tusi ac tabi cõueniũt per se, aut in eclegmate ex melle, vitia pectoris expurgant, vrinam cient, cruda concoquunt, ventrem emolliunt, palpebras commodissimè replicant, lepras tollunt, cum ærugine ac lutorio atramento, nitróque: auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium vtiles malagmatis, acopísque admiscentur. La terũ doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ.

Cap. XCIII.

Liquida resina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet, atque olim á Colophone petebatur: hinc Colophoniæ sibi cognomentum vendicauit. A Gallia quoque subalpina: quã vernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest tusi veteri. Colore inter se distant: siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt laringa. Cupressus etiam liquidã fundit resinam, quæ

μῖδ' ἂς ἀριθμοῦσ) ἥ τε πευκίνη καὶ ἡ τροχιλίνη. ἔστι δὲ πᾶσα ῥητίνη, μαλακτικὴ, θερμαντικὴ, διαχυτικὴ, ἀναλυτικὴ· βηχίαν ἀμύζουσα καὶ φθίσεσιν, ἐν ἐκλικτῖς καθ' ἑαυτὴ ἢ μὴ μέλιτος, ἀναθαίρουσα καὶ τὰ ἐν θώρακος· ἔστι δὲ καὶ ἀρτικὴ καὶ πεπτικὴ, κοιλίαν τε μαλάττει ἔν τε ἀνακολλήσει βλεφάρων ἀμύζει τ' ἐν βλεφάροις, καὶ πρὸς λέπρας συὶ ἰῷ χαλκοῦ καὶ χαλκάνθῳ καὶ νίτρῳ, φορὸς τ' τὰ ἰχωρῥοῦντα ὦτα συὶ μέλιτι καὶ ἐλαίῳ, καὶ πρὸς κνησμὸν αἰδοίων. μίγνυται δὲ καὶ ἐμπλάστροις, καὶ μαλάγμασι καὶ ἀκόπτοις, καὶ πλευρᾶς ἀλγήμασι βοηθεῖ καθ' ἑαυτὴν ἐπιχριθεῖσα καὶ ἐπιπιθεμένη.

Περὶ Πιτύινης ὑγρᾶς Πιτυίνης καὶ Πευκίνης. Κεφ. ϛγ'.

Γίνεται ἡ ῥητίνη ὑγρὰ πιτυίνη καὶ πευκίνη, κομιζόμεναι ἀπὸ γαλλίας καὶ τυῤῥηνίας, καὶ ἀπὸ κολοφῶνος παλαί ποτε ἐκομίζετο. ἔνθεν καὶ ἡ ἐπωνυμίαν ἔσχε κολοφωνία κληθεῖσα. καὶ ἀπὸ γαλατίας τῆς πρὸς τοῖς ἄλπεσιν, ἣν ἐπιχωρίως οἱ τὴν ἔποικοι λάριξα ὀνομάζουσιν. ἐξόχως πεῖσα πρὸς τοὺς χρονίους βήχας ἐν ἐκλικτῶν καθ' ἑαυτήν. διάφοροι δέ εἰσι τῷ χρώματι καὶ αὐταί· ἡ μὲν γὰρ τίς ἐστι λευκὴ, ἡ δὲ ἐλαιώδης, ἡ δὲ μέλιτι ἔοικεν ὥς περ ἡ λάριξ. γίνεται δὲ καὶ κυπαρισσίνη ῥητίνη ὑγρά.

ἣ πε

ἥν τις ποιεῖ πρὸς τὰ αὐτά. τῆς μέν τοι ξηρᾶς, ἡ μέν ἐστι στροβιλίνη καὶ ἐλατίνη, ἡ δὲ πευκίνη, ἡ δὲ πιτυίνη. ἐκλέγου δὲ πασῶν τὴν εὐωδεστάτην καὶ διαυγῆ καὶ μὴ καπυρὰν μὴ δὲ κάθυγρον, κηρώδη δὲ καὶ εὔθρυπτον. διαφέρει δὲ αὐτῶν ἡ πιτυίνη καὶ ἐλατίνη· εὐώδεις γάρ εἰσι καὶ λιβανίζουσαι. κομίζονται δὲ διάφοροι ἐκ Πιτυούσης τῆς νήσου, ἥ τις κεῖται κατὰ τὴν Ἱσπανίαν. ἡ δὲ πευκίνη καὶ στροβιλίνη, καὶ κυπαρισσίνη, ἐνδεέστεραι εἰσί, καὶ οὐχ ὁμοίως κέχρηνται ταῖς δυνάμεσιν ὡς ἐκεῖναι. παραλαμβάνονται δὲ πρὸς ὅσα καὶ ἐκεῖναι. ἡ μέν τοι σχινίνη, ἀναλογεῖ τῇ τερμινθίνῃ.

*Περὶ λιγνύος ῥητίνης. Κε. ϟδ´.

Καίεται δὲ πᾶσα ῥητίνη ὑγρὰ ἐν τετραπλασίονι ἀγγείῳ κατὰ τὸ τοῦ ἐγχεομένου ὑγροῦ πλῆθος. δεῖ γὰρ χοῦν μὲν τῆς ῥητίνης, δύο δὲ χόας ὀμβρίου ὕδατος βαλόντας εἰς ἀγγεῖον, ἕψειν ἐπ' ἀνθράκων πράως, διηνεκῶς κινοῦντας ἄχρις οὗ ἄνοσμος γένηται καὶ εὔθρυπτος καὶ καπυρά. καὶ ὡς τοῖς δακτύλοις εἴκειν. λοιπὸν δεῖ ψύξαντας εἰς κεραμεοῦν ἀγγεῖον ἀκόνιτον, *τουτέστιν ἀπίσσωτον, ἀποτίθεσθαι. γίνεται δὲ ἐξόχως λευκή, δεῖ μέν τοι προδιυλίζειν πᾶσαν ῥητίνην τήκοντας, ἵνα χωρισθῇ τὸ ῥυπῶδες αὐτῆς.

καίονται

quę ad eadē pollet. Quæ verò aridarū generi aſcribunť, quædā ex pineis nucib⁹, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet lógè omniū odoratiſsima, trāslucēs, nō retorrida, neq; diluta, quādā ceræ faciem præbēs, & friabilis. E picea & abiete reſinæ cæteras antecedūt: odoratæ enim ſunt, atq; thus odore imitātur. Præſtantiores à Pityuſa inſula deferunť, quæ ſecūdū Hiſpaniā ſita eſt. Sed q̄ è picea, nucib⁹ pineis & cupreſſo manarūt, nihil ad illas, nec tātis viribus potiūtur. Veruntamen eorundem gratia quorū & illæ ſumi ſolēt. Lentiſcina terebinthinæ reſpōdet.

Fuligo reſinæ. Cap. XCIIII.

Vritur reſina omnis liquida in vaſe quadruplæ capacitatis ad humoré, qui infunditur: itaque reſinæ congius, in duobus aquæ pluuiæ coquiť, ſubiectis leuibus prunis, reſina aſsiduè moueť, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrida reddať, ac digitis cedat. Cęterū vbi rifrixit, in fictile non picatū, quod aconitū vocāt, id eſt non illitum, recōditur. Fiet etiam eximij cādoris, ſi reſina omnis eliquata præcoleť, quó fœculenta ſordes excernatur.

Vruntur

Vruntur quoque sine aqua, primum lento igne: & vbi coire cœperũt. maior carbonũ strues supponitur, & triduo citra intermisſionem discoquuntur, vsque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint: mox, vt dictum est, reponuntur. Aridas vnius diei spatio decoxisse satis est. Vstæ odoratis malagmatibus, & acopis, & vnguentorum colorationibus magnopere vtiles sunt. E resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur. Prodest glabris genis, collachrymationibus, erosisq; oculorum angulis, ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. Cap. XCV.

Pix liquida, quam alij conum vocant, è pinguissimis pini piceæque lignis congregatur. Optima est splendens, syncera, læuis. Contra venena, phthisin, purulentam excreationem, tusses, suspiria, & pectoris humores, qui difficile extusſiuntur, efficax est, eclegmate cyathi mẽsura cũ melle dato. Tonsillarum & vuę inflammationes, anginæq; vtiliter perunguntur: purulẽtis auribus infunditur cum rosaceo,

καίονται δὲ καὶ δίχα ὕδατος ἐπὶ ἀνθράκων κούφως τὸ πρῶτον· ὅταν δὲ μέλλωσι* συστρέφειν ἀθρόως καὶ πολλοὺς ὑποθετέον τοὺς ἄνθρακας, καὶ ἑψητέον ἀδιαλείπτως ἐφ' ἡμέρας καὶ νύκτας τρεῖς, ἄχρις ἂν τὸ προειρημένον ἰδίωμα ἀπολίπωσιν, ἀποτίθεσθαι δὲ ὡς εἴρηται. τὰς μέν τοι ξηρὰς ἀρκέσει δι' ὅλης ἡμέρας ἑψήσαντας ἀποτίθεσθαι. συγχρηστοῦσι δὲ καὶ αἱ κεκαυμέναι, εἴς τε τὰ εὐώδη τῶν μαλαγμάτων καὶ ἄκοπα, καὶ εἰς χρωματισμοὺς μύρων. ἐκλαμβάνεται δὲ καὶ λιγνὺς ῥητίνης ὥσπερ ἐπὶ τοῦ λιβάνου. ἥτις χρησιμεύει πρός τε καλλιβλέφαρα, καὶ περιβεβρωμένους κανθοὺς καὶ μαδῶντα βλέφαρα, καὶ δακρύοντας ὀφθαλμούς. γίνεται δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ μέλαν ᾧ γράφομεν.

Περὶ Πίσσης ὑγρᾶς. Κεφ. ϛε΄.

Πίσσα ἡ μὲν ὑγρὰ ἣν ἔνιοι κῶνον καλοῦσι, συνάγεται μὲν ἐκ τῶν λιπαρωτάτων ξύλων, πεύκης καὶ πίτυος. ἔστι δὲ καλὴ ἡ στίλβουσα καὶ λεία καὶ καθαρά. ποιεῖ δὲ πρὸς θανάσιμα φάρμακα, φθισικούς, ἐμπυϊκούς, βῆχας, ἄσθματα δυσανάγωγα τῶν ἐν θώρακι ὑγρῶν, ἐκλειχομένη κυάθου πλῆθος μετὰ μέλιτος. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰς τῶν παρισθμίων καὶ σταφυλῆς φλεγμονὰς καὶ συνάγχας διαχριομένη· καὶ πρὸς τὰ πυορροοῦντα ὦτα σὺν ῥοδίνῳ.

καὶ θερὲς ἑρπετῶν δάγματα σὺν ἄλσι λείοις καταπλασσόμενον, καὶ ῥῶ δὲ ἴσον μιγεῖσα, λειχῆνας ὄνυχας ἀφίησι, φύματά τε ὑστέρας καὶ σκληρίας δακτυλίου διαφορεῖ· σὺν κριθίνῳ δὲ ἐψηθεῖσα ἀλεύρῳ καὶ παιδὸς οὔρῳ, χοιράδας θεραπεύει· μετὰ δὲ θείου ἢ πίτυος φλοιοῦ ἢ πυρὸν, ἕρπητας ἐπέχει κατὰ χρόμμυον· μαίνη δὲ καὶ κυνῶπι μιγεῖσα, τὰς ὑπερεχούσας περικολλᾷ, θερός τε τὰς ἐν ποσὶ καὶ δακτυλίῳ ῥαγάδας ἀρμόζει κατὰ χρόμμυον, πλὴν ἐστὶ τὰ ἕλκη, καὶ ἀποκαθαίρει σὺν μέλιτι, σὺν ταρίδι δὲ καὶ μέλιτι, ἄνθρακας καὶ σπεδόνας περιχαράσσει· μίγνυται δὲ καὶ σύμφυτος χρωτί μου.

Περὶ Πισσελαίου. Κεφ. ξε'.

Γίνεται δὲ καὶ πισσέλαιον ἐκ τῆς πίσσης, χωριζομένου τοῦ ὑδαλώδους αὐτῆς ἐφίσει. ἔστι τοῦτο καθάπερ ὀρρὸς γάλακτος, καὶ ἐκλαμβάνεται δὲ ὅταν ἡ πίσσης, ὥσπερ εἴρηται, καθαρθῇ, ὅταν ὅταν ἐκ τοῦ ἀναβρασμένου ἁλμυρὰ γένηται. διάβροχον, ἐκθλίβεται εἰς ἀγγεῖον, καὶ τοῦτο γίνεται ἐφ' ὅσον ἂν χρόνον ἡ πίσσα ἕψηται. ποιεῖ δὲ ταῦτα ὅσα καὶ ἡ ὑγρὰ πίσσα. διασώζεται δὲ καὶ ἀλωπεκίας καταπλασσόμενον μετὰ κριθίνου ἀλεύρου· θεραπεύει δ' τοῦτο καὶ ἡ ὑγρὰ πίσσα, καὶ τὰ ὑπὸ τῶν κτηνῶν ἕλκη καὶ ψώρας ὑπογραφόμενον.

Περὶ

& illinit cũ trito ſale ſerpentiũ morſib': adiectaverò pari cera ſcabros vngues extricat, impetiginesq; emẽdat: vuluæ duritias ac ſedis tubercula diſcutit: cũ farináq; hordeacea et pueri ĩpubis vrina decocta, ſtrumas rũpit: cohibet vlcera q̃ ſerpũt, cũ pineo cortice, aut ſulphure, aut furfuribus illita. Cæterũ cũ thuris mãna & cerato ꝓfũdos vlcerũ ſinꝰ cõglutinat, rimis ſedis & pedũ, magno auxilio illinit: vlcera replet, & cum melle purgat: quin & cũ vua paſſa, et melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, diſrumpitq;: erodẽtibus medicamẽtis, quas ſeptas vocãt, ꝓbè immiſcetur.

Picinũ oleũ. Cap. XCVI.

E pice fit quod piſſelæon appellãt, ſeparato liquore aquoſo, qui ſupernatat pici, ſicut ſerum lacti. Nam expanſa, quãdiu pix coquitur, ſupra cortinam vellera pura madeſcunt; acceptóque halitu eius exprimuntur in vas. Quas pix liquida, præbet vtilitates. alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida pix medetur iumẽtorum vlcera ſcabiémque emẽdat.

Fuligo liquidæ picis. Cap. XCVII.

Fit hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua q̃ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernáq; fictili vase in clibani speciem cõformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, vt clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouũ infundito, quo ad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei adstringẽs, acrisq;. Vsui est ad pigmẽta quib' palpebras linunt & venustant, & ad circũlitiones. Item vbi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lachrymosósq; oculos, insuper ad eorũdem vlcera non inutilis est.

Περὶ λιγνύος τῆς ἐξ ὑγρᾶς πίσσης. Κεφ. ςζ'.

Γίνεται δὲ καὶ λιγνὺς τῆς ὑγρᾶς πίσσης οὕτως· εἰς λύχνον καινὸν ἐλλυχνιασμένον δούς τι τῆς πίσσης, ἅψον καὶ πωμάσας τὸν λύχνον καινῷ ἀγγείῳ κεραμέῳ κλιβανοειδεῖ, ἄνωθεν μὲν περιφερεῖ καὶ στενῷ, κάτωθεν δὲ τετρημένῳ ἔχοντι καθάπερ οἱ κλίβανοι, ἔα καίεσθαι, ὅταν δὲ ἀναλωθῇ τὸ πρότερον ὑγρὸν, ἄλλο ἐπίχει, ἕως ἂν αἰθαλώσῃς λιγνὺν αὐτάρκη, καὶ χρῶ. Δύναμιν δὲ ἔχει δριμεῖαν καὶ στυπτικήν. χρηστέον δὲ αὐτῇ, εἰς τὰ καλλιβλέφαρα καὶ περιχριστά, καὶ ὅπου μεμυδηκότα βλέφαρα τριχοφυῆσαι δεῖ, καὶ πρὸς ἀσθενέστερα καὶ δακρυρροοῦντα· ἔτι δὲ εἰς ἑλκώδη ὄμματα χρήσιμος.

Pix arida. Cap. XCVIII

Liquida pix decocta in spissam coit, quã vocant aliqui palimpissam: quo in genere quędam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probat̃ pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæque simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pannósque discutit,

vlcera

Περὶ ξηρᾶς πίσσης. Κεφ. ςή.

Ἡ δὲ ξηρὰ πίσσα, ἑψομένης τῆς ὑγρᾶς γίνεται· καλεῖται δὲ αὐτὴ ὑπ' ἐνίων παλίμπισσα. γίνεται δὲ αὐτῆς, ἡ μέν τις ἰξώδης, βοσκὰς καλουμένη, ἡ δὲ, ξηρά. ἔστι δὲ καλὴ ἡ καθαρὰ, καὶ λιπαρὰ, εὐώδης τε καὶ ὑπόκιῤῥος καὶ ῥητινώδης. τοιαύτη δέ ἐστιν ἡ λυκιακὴ καὶ βρυτία, δύο φύσεων ἔχουσαι πίσσης ἅμα καὶ ῥητίνης. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, πυοποιὸν, διαφορητικὴν φυμάτων καὶ φυγέθλων,

καὶ

καὶ πληρωτικὴν ἑλκῶν, μίγνυσι δὲ καὶ τραυματικοῖς χρηστέον.

Περὶ Ζωπίσσης. Κεφ. ϟθ'.

Ζώπισσαν δέ τινες, εἶπον πρὸς ὅτι τῶν πλοίων ξυομένων ῥητίνην μετὰ τοῦ κηροῦ, καλουμένην ὑπ' ἐνίων ἀπόχυμα, οὖσαν διαχυτικὴν διὰ τὸ ἐν τῇ θαλάσσῃ βρέχεσθαι· οἱ δὲ, πρὸς πιτυΐνην ῥητίνην ἔτυχε ὀνόμασαν.

Περὶ Ἀσφάλτου. Κεφ. ϟ'.

Ἄσφαλτος διαφέρει ἡ ἰουδαϊκὴ τῆς λοιπῆς· ἔστι δὲ καλὴ ἡ πορφυροειδῶς στίλβουσα, εὔτονος τῇ ὀσμῇ καὶ βαρεῖα· ἡ δὲ μέλαινα καὶ ῥυπώδης φαύλη. ὀλοῦται γὰρ πόσης μιγνυμένης. γίνεται καὶ ἐν φοινίκῃ, καὶ ἐν σιδόνι, καὶ ἐν βαβυλῶνι. καὶ ἐν ζακύνθῳ. γίνεται δὲ καὶ κατὰ τὴν ἀκραγαντίνων χώραν τῆς σικελίας, ὑγρὸν ἐπινηχόμενον τῇ κρήνῃ, ᾧ χρῶνται εἰς τοὺς λύχνους ἀντὶ ἐλαίου, καλοῦντες αὐτὸ σικελὸν ἔλαιον, ἁλισκόμενοι· ἔστι γὰρ ἀσφάλτου ὑγρᾶς εἶδος.

Περὶ Πισσασφάλτου. Κεφ. ρά.

Καλεῖται δέ τις καὶ πισσάσφαλτος γίνεται δὲ ἐν ἀπολλωνίᾳ τῇ πρὸς ἐπιδαύρῳ, ἥ τις ἐκ τοῦ κεραυνίου ὀρῶν συγκαταφέρεται, τῇ τοῦ ποταμοῦ ῥύμῃ, καὶ ἐμβεβάπται καὶ τὰς πόνους, βαλωειδῶς συμπεπυγμένα, ὄζουσα πόσης μεμιγμένης ἀσφάλτου.

vlcera replet, vulnerariis medicaminibus cõmodè permiscet.

Zopissa. Cap. XCIX.

Zopissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. Cap. C.

Bitumẽ Iudaicũ cæteris anteponitur. Cuius probatio est, vt purpuræ modo splendeat, sitq; põderosum, ac validũ odorem vibret. Nigrũ autẽ & sordidũ, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agrigantino Siciliæ, fontibus innatans: quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur, qui id Sicilicũ oleũ nominant: nanq; liquidi bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. Cap. CI.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs mõtibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstúque in littus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Naphtha. Cap. CII.

Naphtham vocant Babylonij, bituminis colamen, colore cãdidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex ſpatio protinus in eam tranſiliant. Ad ſuffuſiones oculorum, & albugines vtilis. Bitumen omne diſcutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: vuluarum procidentia, ſtrangulationésque olfactu, ſuffitu, impoſitu, emẽdat: comitiales morbos ſuffitum deprehendit, gagatæ lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & caſtorio potum elicit, tuſim veterem & anhelitum adiuuat, ſerpentium morſibus, coxendicum laterúmque doloribus auxiliatur, datur cœliacis in catapotio deuorandum, cum aceto potum diſcutit ſanguinem cõcretum, dyſentericis cum ptiſana liquatum infunditur, diſtillationibus ſuffitione medetur, mitigat dentiũ dolores oblitum, cæterùm pilos incõmodos ſiccũ replicat, ſpecillo impoſitum: cõcalfactum autem, & cum farina hordeacea, nitro & cera illitũ, podagris, articulorum doloribus, lethargicíſque prodeſt. Piſſaſphaltos eadem,

Περὶ Νάφθας. Κεφ. ρβ'.

Καλεῖται δέ πις ἡ νάφθα, ὃ ἔστι τὸ βαβυλωνίᾳ ἀσφάλτου φλοίσμα, τῷ χρώματι λευκὸν· εὑρίσκεται δὲ καὶ μέλαν. Δύναμιν ἔχον ἁρπακτικὴν τοῦ πυρὸς, ὥς τε ἐκ τοῦ διαστήματος αἱρπάζειν αὐτό, ὅθεν πρὸς ὑποχύσεις χρήσιμεύει καὶ λευκώματα. Δύναμιν δὲ ἔχει πᾶσαν ἄσφαλτος ἀφλεγμαντον. κολλητικὴν, διαφορητικὴν, μαλακτικὴν, πιέσαν πρὸς πήγας ὑστερικὰς καὶ προπτώσεις· πρὸς ὑποθυμιώμενον καὶ ὀσφραινομένην καὶ ὑποθυμιωμένην· ἐλέγχει δὲ καὶ ὀπληπτικοὺς ὑποθυμιαθεῖσα καθάπερ καὶ ὁ γαγάτης λίθος· πινομένη δὲ μετ' οἴνου καὶ καστορέου ἔμμηνα κινεῖ καὶ βηξὶ χρονίαις καὶ ἀθμαντικοῖς καὶ δυσπνοίαις βοηθεῖ, καὶ ἐκ πτῶν δήγμασι, καὶ ἰσχίων πόνοις καὶ πλευρᾶς· δίδοται δὲ καὶ κοιλιακοῖς καταπότιον, καὶ ῥόμβος αἵματος διαλύει σὺν ὄξει ποθεῖσα· ἐγκλύζεται καὶ ἐπὶ δυσεντερικῶν σὺν πτισάνῃ τακεῖσα, καὶ καταῤῥόους ὑποθυμιωμένη θεραπεύει, καὶ ὀδόντων ἀλγήματα πεισταλαθεῖσα παραύνει, ἀγακολλᾷ δὲ καὶ τείχας ἡ ξηρὰ διὰ μηλωτίδος· θερμανθεῖσα δὲ ἀρήγει π, καὶ ποδαγρικοῖς, καὶ ἀρθριτικοῖς καὶ ληθαργικοῖς σὺν ὠμῇ λύσει καὶ κηρῷ καὶ νίτρῳ κατα πλασθεῖσα· ἡ δὲ πισάσφαλτος αὐτὸ δύναται

λώσαται ὅσα πάσα καὶ ἄσφαλτος μιγῆτα.

Περὶ Κυπαρίσσου. Κεφ. ργ'. Κυπάρισσος σύφει, ψύχει ἧς τὰ φύλλα ποθέντα μὴ γλυκέος καὶ σμύρνης ὀλίγης, κύστει ῥευματιζομένῃ καὶ δυσουρείαις βοηθεῖ. τὰ δὲ σφαιρία κοπέντα καὶ σὺν οἴνῳ πινόμενα, αἱμοῖ τὰς ἐς αἷματος ἀναγωγὰς καὶ δυσεντερίαν, καὶ κοιλίας ῥευματισμὸν, ὀρθόπνοιαν, βῆχα· καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν τὸ αὐτὸ ποιεῖ· μαλάττει δὲ καὶ σκληρίας κοπέντα μετὰ σύκου, καὶ πολύποδας τῶν ἐν μυκτῆρσιν ἰᾶται, ἐκβάλλει δὲ καὶ λεπριῶντας ὄνυχας, σὺν ὄξει καθεφθέντα καὶ λειανθέντα μετὰ θέρμων, σέλλει δὲ καὶ ἐπιῤῥοὰς καταπλασθέντα. καὶ τὰ φύλλα δὲ αὐτὰ ποιεῖ. δοκεῖ δὲ καὶ κώνωπας διώκειν τὰ σφαιρία μετὰ τῆς κώνης συμπλασθέντα. τὰ δὲ φύλλα λεῖα καταπλασθέντα, τραύματα κολλᾷ· ἕρπητας δὲ καὶ ἴχαιμα, σὺν ὄξει δὲ λειωθέντα, τείχας βάπτει, καταπλάσσεται δὲ καθ' αὐτὰ καὶ σὺν ἀλφίτῳ πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας, ἄνθρακας, καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, κηρωτῇ δὲ μιγῆτα, στομάχου κρατύνει ἐπίθεμα.

Περὶ ἀρκευθίδος. Κεφ. ρπδ'. Ἔστιν ἀρκευθὶς ἡ μὲ μικρὰ ἡ, ἡ μεγάλη· δρίμειαι δὲ ἀμφότεραι, δυσκπεadem, quæ pix & bitumen, si misceantur, potest.

Cupressus. Cap. CIII.

Cupressus refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis, & vrinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex vino tusæ in dysenteria, alui fluxione, tusi, & orthopnœa, aut si reiiciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdem præbet effectus: tusæ cum fico duritias emolliũt, nariúmque polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros vngues eiiciunt: hernias intestinorum prolapsũ erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita & ipsita, vulnera cõglutinant: sanguinem supprimunt, capillum ex aceto tinguntillinuntur per se, aut cum pollenta ignibus sacris, vlceribus quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus, admota cũ cerato stomachum corroborant.

Iuniperus. Cap. CIIII.

Iuniperi gña duo: altera maior altera minor, vtraque acris est.

Excalfacit,& vrinã mouet,accenſa ſerpétes fugat.Baccarum nõnullæ nucis iuglãdis magnitudine nõnũquã grandeſcere, aliæ nucé Põticã æquare inueniunt:rotũdæ,odoratæ,in mãdendo dulces,ſubamarę,q̃ arceuthides etiã,id eſt baccæ iuniperi,nominant.Modicè calfaciũt:& aſtringũt,ſtomacho vtiles,cõtra pectoris vitia,tuſsim, inflatiões, tormina,& ſerpẽtiũ ictus efficaciſsimè bibunt: vrinã ciẽt,vnde ruptis,cõuulſis,& vuluæ ſtrãgulatui ſubueniunt.

Herba Sabina. Cap. CV.

SABINA duorum generum eſt. Vna foliis cupreſſo ſimilis, ſpinis horridior, grauiter olens, acris & feruens: arbor eſt coactæ breuitatis, quæ ſeſe magis in latitudinem fundit : huius foliis nonnulli pro ſuffitu vtuntur . Altera tamarici folio ſimilis eſt. Vtriuſque folia nomas ſiſtunt, collectiones illitu mitigãt, & cum melle nigritias ſordésque repurgant, carbunculos cum vino, pota rumpunt , ſanguinem per vrinam eliciunt , partus apoſita extrahunt, & ſuffitu idem præſtant, vnguentis calfacientibus immiſcentur , & priuatim

διουρητικὰ καὶ θερμαντικαὶ, θυμιώμεναί τε θηρία διώκουσιν. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῶν ὁ μέν τις καρύου μείζονος εὑρίσκεται· ὁ δὲ καρύου ποντικοῦ ἴσος· στρογγύλος τε καὶ εὐώδης καὶ γλυκὺς ἐν τῷ διαμασᾶσθαι, καὶ εὐστόμαχος, ἀρκευθὶς καλούμενος, θερμαντικὸς μετρίως καὶ συπτικὸς, εὐσύμαχος πιῶν πρὸς τὰ ἐν θώρακι καὶ βῆχας καὶ πνευματώσεις καὶ φόφους καὶ θηρία πνόμενος· ἔστι δὲ καὶ οὐρητικὸς, ὅθεν καὶ ἀπάσμασι καὶ ῥύγμασι καὶ ὑστερικαῖς πνιγμέναις ἁρμόζει. q

Περὶ Βράθυος. Κεφ. ρε'. Βράθυς, ἔνιοι βαράθρον καλοῦσιν, ἔστι δὲ τοῦτο εἴδη δύο. τὸ μὲν δὴ αὐτῶν ἐστὶ τοῖς φύλλοις ὅμοιον κυπαρίσσῳ, ἀκανθωδέστερον δὲ καὶ βαρύοσμον, θρῖμυ, πυρωπὸν· κολοβὸν δὲ τὸ δένδρον καὶ εἰς πλάτος μᾶλλον χεόμενον. χρῶνται δέ τινες τοῖς φύλλοις ἀντὶ θυμιάματος. Τὸ δὲ ἕτερον μυρίκῃ τοῖς φύλλοις ὅμοιον. ἀμφοτέρων δὲ τὰ φύλλα ἴσχειν νομὰς, καὶ φλεγμονὰς καταπλαττόμενα σβεννύει, ἀποκαθαίρει τε μελαγχολίας συὺ μάλιστα καταπλαττόμενα, καὶ ταῖς ὑπαρίαις καὶ ἄνθραξι καὶ ἐρυσιπέλασι συὺ οἴνῳ πινόμενα, καὶ αἷμα δι' ὤρων ἄγει, ἐμμηνα ἐκκενοῖ, ὑστεροπνιγμοὺς καὶ ὑποθυμιαθέντα, τὸ αὐτὸ ποιεῖ μίσυϊ καὶ τοῖς θερμαντικοῖς χρίσμασιν,

ση, ἰδίως δὲ τῶ γλευκίνω.

Περὶ Κέδρου. Κεφ. ϛʹ.

Κέδρος δένδρον ὅτι μέγα, ἐξ οὗ ἡ λεγομένη κεδρία σωάγεται· καρπὸν δὲ ἔχει ὡς τὸ ἀρκεύθος, * φέρουσα μέγεθος, μύρτου περιφερῆ. Τῆς δὲ κεδρίας ἀρίστη ἡ παχεῖα καὶ διαυγὴς, βαφεῖα τῇ ὀσμῇ ἀποχρωμένη δὲ κατ' ἀναλαγμοὺς ὀπτιδιαμένουσα καὶ μὴ διαχρωμένη. Δυνάμιν ὃ ἔχει σηπτικὴν μὲν τῶν ἐμψύχων, φυλακτικὴν δὲ τῶν νεκρῶν σωμάτων· ὅθεν καὶ νεκροῦ ζωλύπνες αὐτὴ ἐκάλεσε. καὶ ἱματία καὶ σπέρματα φθείρει διὰ τὸ θερμαίνειν ὀπτιδιαμένως καὶ ξηραίνειν· εὐθετεῖ δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ὀξυδερκῆ ὄντα ἐγχριόμενη, καὶ λευκώματα, καὶ ὑπὸ σμήχει, σωὺ ὄξει διακλυζομένη, σκώληκας τοὺς ἐν ὠσὶ κλείνει, ἤχους τε καὶ συριγμοὺς παύει σὺν ὑσσώπῳ ἀφεψήματι ἐγχεομένη, εἰς τε ἐμβρώματα ὀδόντων ἐκπαλαττόμενα, θραύει μὲν τὸν ὀδόντα, παύει δὲ τὸν ἀλγεδόνα, σωὺ ὄξει διακλυζομένη τὸ αὐτὸ ποιεῖ, προχριθεῖσα δὲ αἰδοίῳ πρὸ τῆς συνουσίας, ἀτόκιόν ὅτι, σωαλγικῶν τε προεγχριόμενον ὅτι καὶ παιδαρίων φλεγμονὰς βοηθεῖ, φθειρές τε καὶ κόνιδας φθείρει τε ἐγχριθεῖσα, κεφάλου δὲ ῥίσμασι σὺν ἁλὶ καταπλασσομένη, ἀφίησι, πρὸς † λεπρᾶς θαλασσίας πόσιν, σὺν γλυκεῖ λαμβανομένη βοηθεῖ, ὠφελεῖ

priuatim gleucino.

Cedrus. Cap. CVI.

Cedrus arbor magna est, ex qua picé colligunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris: quæ dú effunditur, guttatim nõ disipata coit. Cui ea vis ineſt vt defuncta corpora conseruet, & viuentia corrumpat, qua ex causa mortuorum vitam aliqui appellauere. Vestimenta quoque, & pelles eximia calfaciendi, & siccandi dote, corrumpit: magni ad ocularia medicaméta vsus, quippe illita oculis claritatem affert, albugines cicatricésq; detergit, instillata autem cum aceto vermes aurium necat, cũ hyssopi decocto infusa sonitus sibilósque sedat, cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat, idem facit cùm ex aceto colluitur: peruncto ante coitũ genitali abortiuum fieri constat, anginæ ea perungunt, tonsillarum inflammationibus auxilio est, lendes pediculósq; illitu enecat, ceraſtæ morsibus cum sale impoſita subuenit, cõtra hausta leporis marini venena, in passo sumpta auxiliatur:

in elephantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pulmonum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat: vermes & tineas subter indita necat, & partus extrahit. Fit & oleum, à cedria separatũ, dum coquitur, velleribus supra halitum eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus: priuatim veheméter perunctum scabiem quadrupedum, canũ, boúmque persanat: inhærentes ricinos enecat, vlcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habét, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra hausturn leporem marinum in vino fumuntur, serpentes fugantur, perũcto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandé, quam picea fuligo vim præbet.

ὠφελεῖ καὶ ἐλεφαντιῶντας ἐκλιχμώμενον, καθαίρει καὶ τὸ ἐν πνεύμονι ἕλκη, καὶ ἰᾶται ὅσον κύαθος ῥοφώμενον, σκώληκάς τε καὶ ἀσκαρίδας ἐγκλυζόμενον φθείρει καὶ ἔμβρυα καταπασσόμενον. γίνεται δὲ καὶ ἔλαιον ἐξ αὐτῆς χωριζόμενον ἀπὸ τῆς κεδρίας ὃν ἐείσαφορμένης ἐν τῇ ἑψήσει ὡς ἐπὶ τῆς πίσσης. πνιγῶν ἄκεσμα ὅσα καὶ ἡ κεδρία. θεραπεύει δὲ τὸ ἔλαιον ἰδίως καὶ ταῖς ἐπὶ τῶν περιπόδων ψώραις καὶ κνησμῶν καὶ βοῶν ἀνδρικῶς καταχριόμενον, καὶ τοὺς ἐπ' αὐτῷ κρότωνας φθείρει, καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν κυσῶν γινομένους ἑλκώσεις αὐτῶν ἐπουλοῖ*. τιθῶ δὲ λιγνῶν συναγτέον αὐτῆς ὃς ἂν τιθῇ τῆς πίσσης δύναμιν ἔχουσαν ἡ αὐτιθῶ ἐπίνη. *κεδρίδες δὲ καλοῦσι τοὺς ἐξ αὐτῆς καρπούς. Δυώδμιν δὲ ἔχουσι θερμαντικὴν, κακοστόμαχον. βοηθοῦσι δὲ βηξί, ἀπάσμασι, ῥήγμασι, σφαγουείαις, καὶ ἔμβυα ἄγουσι μετὰ πεπέρεως λείως πινόμενα, καὶ πρὸς λαγῶ θαλαττίῳ πίσσῃ συὸς οἴνῳ λαμβανόμενα. διώκουσι καὶ θηρία χριομένῳ τῷ σώματος συὸς ἐλαφείῳ στέατι ἢ μυελῷ, μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις.

Laurus. Cap. CVII.

Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque excalfactoriá naturam habet, & emolliétem. Vnde decoctũ earum

Περὶ Δάφνης. Κεφ. ϙζ'.

Δάφνη, ἡ μὲν τις ἐστὶ λεπτόφυλλος, ἡ δὲ, πλατυτέρα. θερμαντικαὶ δὲ ἀμφότεραι καὶ μαλακτικαί. ὅθεν τὸ ἀφέψημα αὐτῶν

ἀυτῶν εἰς ἐγκαθίσματα τὰ περὶ μήτραν καὶ κύστιν ἁρμόζει. τὰ δὲ χλωρὰ τῶ φύλλων, ἠρέμα ὑποξύφει· ἀφῃρῆσθαι δὲ λεῖα καταπλασθέντα, σφηκῶν καὶ μελιττῶν πληγάς.

Δυώδεται δὲ καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν περαίνειν συὺ ἀλφίτῳ καὶ ἄρτῳ καταπλασθέντα, ποθένται δὲ περὶ τὸν στόμαχον, καὶ ἐμέτοις κυεῖ. Αἱ δὲ διαφύλλοις θερμαντικώτεραι τῶν φύλλων εἰσί· πιοῦσαι οὖν ἐκλιχόμεναι λεῖαι σὺν μέλιτι ἢ γλυκεῖ, πρὸς φθίσιν καὶ ὀρθόπνοιαν καὶ πόνους περὶ θώρακα ῥευματισμοῖς· πίνονται δὲ σὺν οἴνῳ πρὸς σκορπιοπλήκτους, καὶ ἀλφοὺς δὲ σμήχουσι. τὸ δὲ πίσσωμα ἀυτῶν, ἀνταλγίας καὶ δυσκοίας βοηθεῖ, σὺν οἴνῳ παλαιῷ καὶ ῥοδίνῳ ἐγχριόμενον. μίγνυται καὶ ἀκόποις καὶ συγχρίσμασι θερμαντικοῖς καὶ διαφορητικοῖς. ὁ δὲ φλοιὸς τὰ ῥίζης ἀυτῶν, λίθους θρύπτει καὶ ἕμβρυα κτείνει καὶ ἡπατικοὺς ὠφελεῖ, τετραόβολου πλῆθος σὺν οἴνῳ ἐυώδει πινόμενος.

earũ in muliebres inſeſſus additũ, vuluæ & veſicæ vitiis conuenit. Virétia folia ſenſim ſubſtringũt: illita quoq; ac tritaveſparũ apiúmq; ictib⁹ opitulãtur, eadẽ cum polenta, & pane illita inflammationẽ omnẽ mitigãt, ſed pota ſtomachũ effundunt, & vomitiones mouent. Lauri baccę magis, q̃ folia calfaciũt: ergo in eclegmate tritæ cũ melle vel paſſo proſunt tabi, orthopnœæ, & omnib⁹ thoracis rheumatiſmis: cõtra ſcorpionũ ictus ex vino bibuntur, vitiligines emaculãt. Succ⁹ bac carũ vtiliſsimè auriũ dolori, & grauitati inſtillatur, cũ vino vetere, & roſaceo. In medicamẽta aũt adiiciũtur, quæ neruorũ laſsitudines reficiũt, acopa vocant: & ad vnguẽta, quæ calfaciũt, & diſcutiũt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodeſt, tribus obulis in vino odorato potus.

Περὶ Πλατάνου. Κεφ. ρὴ.

*Πλατάνου τὰ τρυφερὰ τῶ φύλλων ἑψηθέντα ἐν οἴνῳ καὶ καταπλασθέντα, σέλλει ῥεύματα ὀφθαλμῶν, κουφίζει δὲ καὶ τὰ οἰδήματα καὶ φλεγμονάς. ὁ δὲ φλοιὸς ἑψηθεὶς ἐν ὄξει, ὀδοντολγίας ἐστὶ διάκλυσμα. τὰ δὲ σφαιρία χλωρὰ σὺν οἴνῳ ποθέντα, ἕρπητα δήκλοις βοηθεῖ· ἀνα-

Platanus. Cap. CVIII.

Tenerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones ſiſtunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Viridis pilulæ in vino potæ, ſerpétium morſibus auxiliantur:

exce-

exceptæ autem adipe, igni ambustæ sanant. insidēs foliorum pilularúmque lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus. Cap. CIX.

Fraxinus arbor nota est, cuius foliorú succus, & ipsa perunctæ, aut ex vino potæ, viperarum ictibus auxiliātur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobémq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus. Cap. CX.

Potus albę populi cortex vnciæ vnius pondere, ischiadicis ac vrinę stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cú mulino rene bibatur. Folia quoq; cú vino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilulæ, quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriæ prodiderūt, corticem albæ populi, & nigrę particulatim cæsum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre.

Macer. Cap. CXI.

Macer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu

ἀδηφθέντα δὲ σέαπι, πυρέκαυσα θδαπεύῳ. ὁ δὲ χυοῦ τῶν φύλλων καὶ τῶν σφαιρίων, ἀκολὼ καὶ ὄψιν ἐμπιπτῶν, λυμαίνεται.

Περὶ Μυίας. Κεφ. ρθ'.

Μυῖα δένδρον ὃ δὴ γνώριμον, οὗ τὸ φύλλον ὁ χυλὸς καὶ αὐτὰ σὺν οἴνῳ πινόμενα, καὶ καταπλασσόμενα ἐχιοδήκτοις βοηθεῖ. ὁ δ' φλοιὸς καεὶς καὶ καταχρισθεὶς μὲθ' ὕδατος, λέπρας ἀφίησι. τὰ δὲ τορνεύματα τοῦ ξύλου πεθέντα, φασὶν αἱρετικὰ εἶναι.

Περὶ Λεύκης. Κεφ. ρα'.

Λεύκης τὸ δένδρον ὁ φλοιὸς τὸ θεὶς ὅσον οὐγγίαν μίαν πλῆθος. ἰσχιάδας ὠφελεῖ καὶ στραγγουείας. ἰσχεῖται δὲ καὶ ἀτόκιος εἶναι, ποθεὶς μὲτ' ἡμιόνου νεφροῦ. καὶ τὰ φύλλα δὲ πινόμενα μετὰ κάδαρσιν σὺν οἴνῳ, τὸ αὐτὸ δρᾶν λέγεται. ὠφελεῖ καὶ ὠτολγίας ὁ χυλὸς τῶν φύλλων χλιαρὸς ἐνσταζόμενος. τὰ δὲ κατὰ τὴν ἐκλάσησιν τῶν φύλλων σφαιρία λεῖα μετὰ μέλιτος ἐγχριόμενα, ἀμβλυωπίας θεραπεύει. ἔνιοι δὲ ἰσορροποῦσι τὸν φλοιὸν τῆς λεύκης καὶ τῆς αἰγείρου τριφθέντα εἰς λεπτὰ μεγέθη καὶ ἀπαρέντα πρασιαῖς κακοπεισμέναις, ἐν παντὶ χωρῷ μύκητας ἐδώδιμους φύειν.

Περὶ Μάκερος. Κεφ. ριά.

Μάκερ, φλοιός ἐστι κομιζόμενος ἐκ τῆς βαρβαρίας, ὑπόξανθος, παχὺς, σύφων

σύφων ἱκανῶς κατὰ τὴν γεῦσιν· πίνεται δὲ πρὸς αἵματος πτύσιν καὶ δυσεντερίας καὶ κοιλίας ῥευματισμόν.

*Περὶ Πτελέας. Κεφ. ριϚ'.

Πτελέας τὰ φύλλα καὶ οἱ ἀκρέμονες καὶ ὁ φλοιὸς συμπλικά. ποιεῖ δὲ τὰ φύλλα πρὸς λέπρας λεῖα ζωὴ ὄξει ὀπωλατόμμα, καὶ τραύματα κολλᾷ, μᾶλλον δὲ ὁ φλοιὸς αὐτὶ ὀπδέσμου περιειλούμμος· ἔστι γὰρ ἰματώδης. ὁ δὲ παχύτερος φλοιὸς ζωὴ οἴνῳ ἢ ὕδατι* ποθεὶς ὠγγίας ά. πλῆθος, ἄγει φλέγμα, καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ τῶν φύλλων ἢ τοῦ φλοιοῦ τῶν ῥιζῶν καταπλούμμον, ἄταγμα ποιεῖ τάχον. τὸ δὲ ἐν τοῖς φύσεις κατὰ τὴν πρώτην ἐκλάσιν εὐεισκόμμον ὑγιὲν, σίλβει πρόσωπον ὀπχριόμμον. ξηραινόμμον δὲ τὸ ὑγιὲν τοῦτο, ἀναλύεται εἰς θηρία κανοποιεῖ δῆ. λαχανεύεται δὲ τὰ φόσφατα τῶν φύλλων ἑψώμμα εἰς πρόσψημα.

Περὶ Σαπρότητος ξύλων.

Κεφ. ργ'.

Ἡ δὲ ἀπὸ τῶν παλαιῶν ξύλων καὶ σκρίμμων σαπρία σωιζομμένη ὡς πρὸ ὀλίγου καταπλασσομμένη, ἀναλαμβάνει καὶ ἀπουλοῖ ἕλκη· τὰ δὲ σκρυπτικὰ ἐπέχει, σὺν ὄξει ἀγίσῳ φυρασθεῖσα καὶ οἴνῳ, ἐν ὀθόναις τὲ καθεῖσα

gustu perquàm astringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

Vlmus. Cap. CXII.

Vlmi & folia & cortex & rami, vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutinant, sed multò magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur: nam in lori morem flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua frigida vnciatim potus, pituitas trahit: fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum corticis aut radicis foueantur. Humor in folliculis enascés prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciémq; splendidiorem præstat. Qui dum siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum more ad obsonia vsurpantur.

Lignorum marcor. Cap. CXIII.

Ex caudicibus ligníque veteribus caries congeritur, quæ farinæ modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentia cohibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteísq; impo-

impoſita illinatur.

Populus nigra. CXIIII.

Populi nigræ folia cum aceto illita, magna vtilitate podagricis doloribus illinũtur. Reſinã populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potũ ex aceto comitialibus vtile eſt. Lachrymã populorum cõmemorãt, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in ſuccinum, quod electrum vocant, alij chryſophorum. Id attritu iucundum odorem ſpirat, & aurum colore imitatur: tritum potúmque ſtomachi ventríſq; fluxiones ſiſtit.

Harundo. Cap. CXV.

In harundinũ genere quędã naſtos id eſt farctior, vocat, ex qua ſagittæ factitari ſolẽt. Alia fœmina, qua tibiarũ ligulas efficiũt. Alia ꝙ fiſtulis addicta ſit, ſyringias: cui multũ eſt carnis, crebris cícta geniculis, ad librorũ cõſcriptionẽ accõmodata. Alia craſſa, cõcaua, apd amnes naſcẽs, q̃ à qbuſdã cypria, ab aliis donax appellat. Alia phragmites ſeu vallatoria, gracilis, cãdicãs, vulgo cognita: cui trita radix ꝑ ſe, aut cũ bulbis ſuis illita, ſpicula aculeóſq; corpe extrahit: luxata lúborũq; dolores cũ aceto mulcet. Virentia folia tuſa &

καθεῖσα καὶ λεῖα καὶ απλαστομύκη.

Περὶ Αἰγείρου. Κεφ. ριδ'.

Αἴγειρος· τούτου τὰ φύλλα μεθ' ὄξους καταπλαττόμενα, ποδαγρικὰς ὀδύνας ὠφελεῖ. ἡ δὲ ἐξ αὐτῆς ῥητίνη μίγνυται μαλάγμασιν. ὁ καρπὸς δὲ μετὰ ὄξους πινόμενος, ἐπιληπτικοὺς ὠφελεῖ. ἱστορεῖται δὲ ὅτι τὸ ἐξ αὐτῶν δάκρυον κατὰ τὸν ἠριδανὸν ποταμὸν καταχεόμενον, πήγνυται καὶ γίνεται τὸ καλούμενον ἤλεκτρον, ὑφ' ἑνίων δὲ χρυσοφόρον· ἐυῶδες ἐν τῇ παραπλέκει καὶ χρυσοειδὲς τῷ χρώματι, ὅπερ πινόμενον λεῖον, στομάχου καὶ κοιλίας ῥεῦμα ἵστησι.

Περὶ Καλάμου. Κεφ. ριε'.

Κάλαμων δὲ ὁ μὲν τις καλεῖται νασὸς, ἐξ οὗ τὰ βέλη γίνεται. ὁ δέ τις σῦριγξ, ἐξ οὗ αἱ γλωττίδες τοῖς αὐλοῖς κατασκευάζονται. ἄλλος δ' συριγγίας πολύσαρκος, πυκνογόνατος, εἰς βιβλιογραφίαν ἐπιτήδειος. ὁ δέ τις καχὺς καὶ κοῖλος παρὰ ποταμοῖς φυόμενος, ὃς καὶ δόναξ καλεῖται, ὑπό τινων δὲ κύπειρος. καὶ ἕτερος φραγμίτης, *λεπτὸς ὑπολευκὸς, πᾶσι γνώριμος, οὗ ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα λεῖα, καὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ σὺν βολβοῖς, σπασμοὺς καὶ σκόλοπας καὶ ἀκίδας· σὺν ὄξει δὲ ῥέμματα καὶ ὀσφύος ἀλγήματα παρηγορεῖ. τὰ δὲ φύλλα χλωρὰ κοπέντα καὶ

ἢ ἐπιτιθέντα ἐρισιπέλατά τε καὶ ταῖς ἀλφοις φλεγμονὰς ἰᾶται. ὁ δὲ φλοιὸς ἀλωπεκίας θεραπεύει καὶς μετ' ὄξους καταπλασθείς. ἡ δὲ αὐθάλη τῶ καλάμων ἐμπεσοῦσα εἰς τὰς ἀκοὰς, κώφωσιν ἐργάζεται. δύναται δὲ τὰ αὐτὰ καὶ ὁ κύπριος λεγόμενος κάλαμος ποιεῖν.

Περὶ Παπύρου. Κεφ. ριϛ'.

Πάπυρος γνώριμός ἐστι πᾶσι, ἀφ' ἧς ὁ χάρτης κατασκευάζεται, ἐυχρηστεῖ δὲ πρὸς τὰ ἰατρικὰ χρῆσιν· πρὸς αὐασάρωσιν συρίγγων σπασθεῖσα· διάβροχος, σφιγκτικόν τι λίνῳ ἄχρι ξηρασίας. σπασθὲν δὲ καὶ σφιγκτὸν, ἐμπλατυνθὲν ὑγρασίας, καὶ ἐξοιδοῦσα διανοίγει τὰς σύριγγας. ἔχει δέ τι καὶ ῥίζα αὐτῆς καὶ τρόφιμον· διαμασώμενοι γοῦν αὐτὴν οἱ ἐν αἰγύπτῳ, ἀποχυλίζουσιν ἐκπύοντες τὸ διαμάσημα. χρῶνται δὲ καὶ αὐτῇ ξύλων δίκην. ἡ δὲ καυσαμένη πάπυρος ἄχρι τριχώσεως δύναται νομὰς ἐπέχειν ταῖς ἐν στόματι καὶ στόμασι· βέλτιον δὲ ὁ χάρτης καυθεὶς ἀφᾷ τὸ τιτύον.

Περὶ Μυρίκης. Κεφ. ριζ'.

Μυρίκη δένδρον ἐστὶ γνώριμον παρὰ λίμναις καὶ τοῖς στασίμοις ὕδασι φυόμενον, καρπὸν ὡς περ αἴγδος φέρουσα βρυῶδες κατὰ τὸν σύραν. Γενᾶται δέ πως ἐν αἰγύπτῳ καὶ συρία ὅμοιος τῇ ἀγελία. καρπὸν

tusa & imposita ignibus sacris medentur, & cæteris inflamationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopeciæ sanantur, paniculæ lanugo si aures intrauerit, exsurdat. Eundé effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus. Cap. CXVI.

Papyrus qua chartę fiũt, nullis non cognata, præcipuæ in medicina vtilitatis, ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit. cõstricta enim atque immissa in hiatũ, humore cõpletur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid aliméti radix, itaq; Ægyptij eã mandunt, succum tantũ deuorantes, & mansam expuunt. Ipsis radicibus pro ligno vtuntur. Crematæ papyri cinis depascentia vlcera cum omnium partium, tum oris maximè, cohibet: verum melius id combusta charta præstat.

Myrica. Cap. CXVII.

Myrica seu tamarix arbor vulgo cognita est, cũ apud pigras, & stagnantes aquas enascatur, fructũ quasi floré ferens compage muscosum. Ægyptus Syriáque alteram gignunt mitiorẽ, sylvestri cætera similem.

Fructum

Fructum parit gallæ proximũ, inæqualiter astringentẽ gustu: quo conueniẽter vtimur vice gallæ in medicaminibus oculorũ orisq;. Datur cruétæ excreationi in potu, & cœliacis, & cótra profluuia fœminarũ, regium morbũ, & phalangiorũ morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eosdẽ vsus adhibetur. Decoctum foliorũ cum vino potum, lienem absumit: ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & muleribus fluxioni vuluæ opportunis in desessionibus, phthiriasi lendibusque circunfusum prodest, abundantiam fœminarũ sistit impositus arboris cinis, potorios calices è caudice lienosis moliuntur, quò datus in his potus proficiat.

καρπὸν φέρουσα ἐμφερῆ κυκλάδι, ἀνωμάλως σύφοντα κ' πλ γεῦσιν· ἁρμόζοντά τε αὐτὴ κυκλάδος εἰς τὰ στοματικὰ κ ὀφθαλμικὰ, κ πρὸς αἵματος πτύσεις ἐν ποτῷ, κ κοιλιακαῖς καὶ ῥοϊκαῖς γυναιξὶν, ἑκτέρῳ τὸ κ φαλαγγιοδήκτοις· οἱ δὲ μματά τε σέλλει καταπλασθέντα. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ τῷ καρπῷ. τῶν δὲ φύλλων τὸ ἀφέψημα σὺν οἴνῳ ποθὲν, σπληνικοὺς κ ὀδονταλγίας ζωσθεῖσι διακλυζόμενον, ἐγκάθισμά τε ῥοϊκαῖς, κ πρόχυμα τοῖς φθειριῶσι καὶ κόνιδας γλυκῶσιν ἐπιτήδειον, κ ἡ ἀπὸ τ ξύλων τέφρα προσεπιθεῖσα, ῥεῦσιν ἐν μήτρᾳ σέλλει. κατασκευάζουσι δὲ ἔνιοι κ κύλικας ἐκ τοῦ πρέμνου, αἷς ἐπὶ τῶν σπληνικῶν χρῶνται αὐτὴ ποτηρίων. ὡς τοῦ δι' αὐτῶν πόματος ὠφελοῦντος.

Erica. Cap. CXVIII.

Erica fruticosa arbor, myricæ similis, longè minor: cuius flore apes reprobum mel efficiunt, tam flos quàm coma serpentium ictibus illitu medetur.

Περὶ Ερείκης. Κεφ. ριή.

Ερείκη, δένδρον ὃ δὴ θαμνῶδες ὅμοιον μυρίκῃ. μικρότερον δὲ πολλῷ, οὗ τῷ ἄνθει μιγῆσαι χρώμενοι, μέλι ἐργάζονται οὐ σπουδαῖον· ταύτης ἡ κόμη καὶ τὸ ἄνθος καταπλασθέν μμα, ἕρπετῶν δήγματα ἰᾶται.

Acacalis. Cap. CXIX.

Acacalis fructus est nascentis in Ægypto fruticis seminis myricæ quadamtenus similis: cuius aqua in qua maduerit, ad

Περὶ Ακακαλίδος. Κεφ. ριθ'.

Ακακαλὶς θάμνου καρπός ἐστι γινωμένου ἐν αἰγύπτῳ, ἐοικὼς κατά τι τῷ μυρίκης καρπῷ· οὗ τὸ ἀπόβρεγμα μέγου-

τας

ται κολλυρίοις τοῖς πρὸς ὀξυδορκίαν ἁρμόζουσιν.

Περὶ Ῥάμνου. Κεφ. ρκ'.

Ῥάμνος θάμνος ὀζὴ πρὸς φαγμονὴ φυόμενος ῥάβδοις ἔχων ὀρθὰς καὶ ὀξείας ἀκάνθας ὡς ἐπὶ ὀξυάκανθα, φύλλα μικρὰ,* ὑπομήκη, ὑπολίπαρα, μαλακά. ἔστι δὲ καὶ ἕτερα * λευκοτέρα. καὶ τρίτη μελανώτερα ἔχουσα τὰ φύλλα, καὶ πλατύτερα σὺν τῷ ἐρέμα ἐρυθραίνεσθαι, ῥάβδους μακρὰς πηχῶν ὡς πέντε, μᾶλλον ἀκανθώδεις, ἧττον δὲ στερεὰς καὶ ἐπάκμους ἔχει τὰς ἀκάνθας. καρπὸς ὁ πλατὺς, λευκὸς, λεπτὸς ὡς θυλακώδης, ἐοικὼς.* ἀσφοδέλῳ. πυρὶ δὲ πασῶν τὰ φύλλα πρὸς ἐρισιπέλατα καὶ σφύματα καταπλασσόμενα. λέγεται δὲ καὶ κλῶνας αὐτῆς, θύρσαις ἢ θυείσι περιτεθέντας,* ἀπεκφύειν τὰς τῶν φαρμάκων κακουργίας.

Περὶ Ἁλίμου. Κεφ. ρκά.

Ἅλιμος θάμνός ὀζὴ φρυγάνου, ὅμοιος ῥάμνῳ οὐκ ἔχων ἀκάνθας· φύλλα δὲ ἐλαία παραπλήσια, πλατύτερα μὴ τοι φύεται ἐν παραθαλασσίοις καὶ ὄρεσι· λαχανεύεται δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα ἐφθὰ εἰς βρῶσιν. τῆς δὲ ῥίζης < ά. ὁλκὴ ποθεῖσα σὺν μελικράτῳ, σπάσματα, ῥήγματα καὶ φθόους πρὸς ὕνει καὶ γάλα ποιεῖ.

Περὶ

ad collyria additur, quę ad excitādā oculorū aciē cōueniūt.

Rhamnus. Cap. CXX.

Rhamnus fruticat in sepibus ramos ferēs rectos & aculeos in acutæ spinæ modum, foliis paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribúsque foliis constat, & quadamtenus rubentibus: cuius rami quinūm ferè cubitorū longitudinem implent, spinosiores quidē sed infirmioribus minúsq; rigentibus aculeis. Fructum ædit latum, candidū, tenuem, follicularij specie, verticillo similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus vlceribus, efficaciter illinuntur. Fama est ramos huius valuis fenestrísve impositos, veneficia depellere.

Halimus. Cap. CXXI.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, foliis oleæ, sed latioribus: nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborū gratia. Radix, conuulsa, rupta, tormináque mitigat, drachmę pōdere in aqua mulsa pota: eadem lactis vbertatem facit.

Paliurus.

Paliurus. Cap. CXXII.

Paliurus frutex cognoſcitur aculeatus, durꝰ, cuius ſemẽ pingue & fuliginoſum inuenitur: quod potũ tuſsi opitulatur, veſicæ calculos cõminuit, ſerpentiũ ictibus aduerſatur. Folia & radix aſtrictoriam vim habẽt: quorum decoctũ potu aluum ſiſtit, vrinã trahit, contra venena & ſerpentium morſus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoréſque omneis diſcutit, trita & impoſita.

Πεεὶ Παλιύρου. Κεφ. ρκβ'.

Παλίυρος χωρίμυός ἐστι θάμνος, ἀκανθώδης, στερεὸς, οὗ τὸ σπέρμα λιπαρὸν καὶ λιγνυῶδες εὑρίσκεται· ὅθεν πινόμενον βηξὶν ἀρήγει, καὶ τὰς ἐν νόσοις λίθους θρύπτει, καὶ πρὸς ἑρπετῶν δήγματα ποιεῖ. τὸ δὲ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα συστατικὰ, ὧν τὸ ἀφέψημα ποθὲν, κοιλίαν ἵστησιν, οὖρά τε ἄγει καὶ θηριοδήκτοις βοηθεῖ, διαφορεῖ δὲ πάντα τὰ περίσφαται φύματα καὶ οἰδήματα ἡ ῥίζα, λεῖα ὑπαλαθεῖσα.

Acuta ſpina. Ca. CXXIII.

Acuta ſpina, quam pyrinam aut pityanthen aliqui vocant: arbor eſt pyraſtro ſimilis, ſpinoſa valde & minor, baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, altè deſcendentem. Huius baccæ potu aut cibo, alui profluuium, & abundantiam fœminarum ſiſtunt. Radix illita aculeos & ſpicula extrahit, abortum fieri tradunt, ſi ter radice venter, aut ſenſim feriatur, aut perungatur.

Πεεὶ Ὀξυακάνθης. Κεφ. ρκγ'.

Ὀξυάκανθα· οἱ δὲ πυρίναν· οἱ δὲ πιτυάνθην καλοῦσι, δενδρόν ἐστι πεφυτευμένον ἀγρίδι, μικρότερον δὲ καὶ ἀκανθώδες ἄγαν· καρπὸν δὲ φέρει μύρτῳ ἐμφερῆ ἁδρὸν, ἐρυθρὸν, εὔθρυπτον, ἔνδοθεν πυρῆνα ἔχοντα, ῥίζαν πολυσχιδῆ καὶ βαθεῖαν. τούτου ὁ καρπὸς διάῤῥοιαν ἵστησι, καὶ ῥοιῶν γυναικείων πινόμενος καὶ ἐδόμενος. ἡ δὲ ῥίζα καταπλασθεῖσα λεῖα, σκόλοπας καὶ ἀκίδας ὑπαίσσεται. ἱστορεῖται δὲ διώσασθαι τιλὼ ῥίζαν, καὶ ἐκβῶσμὸς ἐργάζεσθαι τῆς κοιλίας ἠσυχῇ τρὶς πληχθείσης ἢ χριωθείσης.

Rubus canis Ca. CXXIIII.

FRVTEX eſt arboris inſtar, rubo longè maior: folia fert multò latiora myrto, robuſtis

Πεεὶ Κυνοσβάτου. Κεφ. ρκδ'.

Κυνόσβατον οἱ δὲ ὀξυάκανθαν καλοῦσι· θάμνος ὃς τοῦ βάτου πολλῷ μείζων, δενδρώδης· φύλλα φέρει πολλῷ πλατύτερα μυρσίνης, ἀκρὰ-

ἀκάνθας ὃ δὲ περὶ τοὺς ῥάβδους ἰσχνὸς, ἄνθος λευκὸν, καρπὸν ὀπωρινὸν, πυρηνῶδη ψαίας ἐοικότα, ἐν τῷ πεπάνσει πυῤῥὸν, τὸ δὲ ἐντὸς ἐερώδη. ἴσχει δὲ κοιλίαν ὁ καρπὸς ξηρὸς· δι' ὃν τοῦ ἐν αὐτῷ ἐερώδους· καυστικὸν γὰρ τῆς ἀρτηρίας τοῦτο ἀποζεννύμενον ἐν οἴνῳ καὶ πινόμενον.

Περὶ Κύπερου. Κεφ. ρκέ.

Κύπερος δένδρον ὃ ἐστι περὶ τοὺς ῥάβδους φύλλα ἔχον ψαίᾳ παραπλήσια, πλατύτερα δὲ καὶ μαλακώτερα καὶ χλωρότερα· ἄνθη λευκὰ βρυώδη, ἐυώδη· σπέρμα μέλαν ὅμοιον τῷ τῆς ἀκτῆς. γίνεται δὲ ἀεὶσι ἐν τῇ ἀσκάλωνι καὶ κανώπῃ. δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα συστηπικὴν· ὅθεν διαμασηθέντα ἄφθας ἰᾶται, καὶ τοὺς ἄλλας πυρώδεις φλεγμονὰς καταπλασθέντα ὠφελεῖ, καὶ ἄνθρακας· τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν, πυεικῶν καταπότημα, ξανθίζει δὲ καὶ τείχας τρυόθου χυλῷ τὰ φύλλα λεῖα βρεχέντα καὶ ἐγχριόμενα. τὸ δὲ ἄνθος ὀπιπλασθὲν τῷ μετώπῳ λεῖον μετ' ὄξους, κεφαλαλγίας παύει· τὸ δὲ σκευαζόμενον ἐξ αὐτοῦ χρίσμα κύπρινον θερμαντικὸν γίνεται καὶ μαλακτικὸν νεύρων.*

Περὶ Φιλλυρέας. Κεφ. ρκέ.

Φιλλυρέα δένδρον ὃ ἐστιν ὅμοιον κύπρῳ κατὰ μέγεθος, φύλλα δὲ ψαίας ὅμοια,

robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili: qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruefacti enim ij in vino, mox poti, arteriam infestant.

Liguſtrum. Cap. CXXV.

Liguſtrum arbor est oleæ foliis circum ramos similibus, latioribus, mollioribus, & colore viridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Folia astrictoriam vim habent: quare commanducata vlceribus oris medentur, illita feruidis inflammationibus, carbunculisque prosunt, decocto eorundem igni ambusta fouentur capillum rufant trita folia, quæ in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, excalfacit, emollítque neruos: si quę feruēti natura prędita sint, assumat.

Tilia. Cap. CXXVI.

TILIA arbor est liguſtri magnitudine, foliis oleæ,

nigrioribus & latioribus, fructu lentisci, nigro, subdulci, racematim cohærente, asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem vtilia ad quæ oleaster, cum astrictione est opus: maximè ad oris vlcera, commanducata, aut si decocto colluantur: pota vrinam ac menses cient.

Cistus Cap. CXXVII.

Cistus, quē aliqui citharon, aut cissaron vocant. ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, foliis rotundis, acerbis, hirsutis. flos masculo vt mali punicæ, fœminæ albet. Vis astringens: vnde flores in vino austero bis in die poti, prosunt dysenterici, & nomas per se illiti cohibent, vetustati vlcerum, & igni ambustis cum cerato medentur.

Hypocistis. Cap. CXXVIII.

Hypocistis, orobethron, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquáque vt in Lycio prosequūtur.

Vires

ας ὅμοια, πλατύτερα δὲ καὶ μελάντερα, χαρπὸν ὃ ἔχει χίνῳ ἐμφερῆ, μέλανα, ὑπόγλυκυν, ὡς ἐν βόστρυσι κείμενον, ἐν βαχέσι δ' τίπτις γινᾶ). τούτης τὰ φύλλα, σύφεα ὡς ἀγριελαία πιοιοῦντα ωρὸς τὰ ῥύψεως διόμνυα, μάλιστα τοῖς ἐυστομοίοις ἕλκεσι διαμάσσημα καὶ διάκλυσμα τὸ ἀφέψημα, καὶ πονόμνυον δ' οὖρα καὶ ἐμμηνα ἄγει.

Περὶ Κίστου. Κεφ. ρκζ'.

Κίσσος, ὃν ἔνιοι κίσσαρον ἢ κίσσαρον καλοῦσι. θάμνος ὀρθὸν ἐν πετρώδεσι τόποις φυόμενος, πολύκλαδος, φυλλώδης, οὐκ ὑψηλὸς, φύλλα ἔχων ωρφερῆ, τρι φυὰ, δασέα. ἄνθη ὡς ωρὸς ῥοιᾶς, ὑπὸ δὲ τῶ θήλεος λευκά. Δυώαμιν δὲ ἔχει συστηπτικήν· ὅθεν τὰ αὐτὰ* λεῖα πονόμνυα δὶς τ' ἡμέρας ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ, δυσεντερείας ἀμύζῃ, καθ' αὐτὰ δὲ καταπλασθέντα, νομὰς ἐφίστησι, σὺν κηρωτῇ δ' πυείκωτα καὶ παλαιὰ ἕλκη ἰᾶται.

Περὶ Ὑποκιστίδος. Κεφ. ρκη'.

Φύεται δὲ ωερὶ τὰς ῥίζας τῶ κίστου ἢ λεχομένη ὑποκιστὶς. ὑπ' ἐνίων δὲ ῥόδανθον, ἢ κύπινος καλουμένη, ὅμοιόν τι κυτίνῳ ῥοιᾶς, καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ κιρρόν· τὸ δὲ χλωρὸν, τὸ δὲ λευκόν· ἔσθ' χυλίζει δ' ὡς ωρὸς ἢ ἀκακία. ἔνιοι δὲ ξηράναντες αὐτὸν, καὶ θλάσαντες, βρέχουσί τε καὶ ἕψουσι, καὶ τὰ ἄλλα ποιοῦσιν, ὡς ὑπὲ τῶ λυκίου.

Δυώα-

Δυνάμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῇ ἀκακίᾳ, συστικωτέραν δὲ καὶ ξηραντικωτέραν, ποιοῦσαν πρὸς κοιλιακοὺς, δυσεντερικοὺς, αἱμοπτοϊκοὺς, ῥοῦν γυναικεῖον πυομύην καὶ ἐκπυόν.

Περὶ Λαδάνου. Κεφ. ρχθ.

Ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος κίστου, καλούμενον ὑπ' ἐνίων λῆδον, θάμνος κατὰ τὰ αὐτὰ φυόμενος τῷ κίστῳ, μακρότερα δὲ τὰ φύλλα ἔχει καὶ μελανώτερα, λιπαείας τινὰς κατὰ τὸ ἔαρ ἐπικωμύμενα, οὗ φύλλων ἡ δύναμις συστικὴ κατέσκηκε ποιοῦσα πρὸς ὅσα καὶ ὁ κίστος. γίνεται δὲ ἐξ αὐτῶν τὸ λεγόμενον λάδανον· τὰ φύλλα γὰρ αὐτῶν νεμόμενα αἱ αἶγες καὶ οἱ πρόβατα τὴν λιπαείαν ἀναλαμβάνουσι τῷ πώγωνι γλοιώμενοι, καὶ τοῖς μηροῖς προσπλατυομένῳ διὰ τὸ τυγχάνειν ἐξώδη, ὧν ἀφαιροῦντες ὑλίζουσι, καὶ ἀποπήγνυται ἀναπλάσσοντες μαγίδας. ἔνιοι δὲ καὶ χρῖα ἐπισύρουσι τοῖς θάμνοις καὶ τὸ προσπλαθὲν αὐτοῖς λίπος ἀποξύσαντες ἀναπλάσσουσι. κράτιστον δέ ἐστιν αὐτῶν εὐῶδες, ὑπόχλωρον, εὐμάλακτον, λιπαρὲς, ἀμύστοχον* φάμμου ἢ φαφαείας, ῥιπτῶδες· τοιοῦτον δὲ ἐστὶ τὸ ἐν Κύπρῳ γινόμενον· τὸ μὲν τοι ἀραβικὸν καὶ λιβυκὸν εὐτελέστερον. Δυνάμιν δὲ ἔχει συστικὴν, θερμαντικὴν, μαλα-

Vires acaciæ habet, verùm aliquanto magis siccat, & astringit. Prodest dysentericis, cæliacis, sanguiné excreantibus: fœminarum profluuio & pota & indita.

Ladanum. Cap. CXXIX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus foliis & nigrioribus: quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum vis astringens, ac eosdem quos cistus effectus præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant: quam depectentes incolæ, colantésque cogunt in offas, & ita recondunt. Alij verò attractis filiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerántque in ladanum. Maximè probatur odoratum, subuiride, facilè molliscens, pingue, quod arenas non collegit nec squalore obsitũ est, resinosum quale in Cypro gignitur. Arabicum verò Libicúmq; vilius. Natura ei spissandi, calfaciédi,

molliendi: ora venarum patefacit, capillum fluentem continet: addito vino, myrrha, & myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit, cum vino illitum: medetur auriú doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit, pessis immissum vuluæ duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimque finiunt, & malagmata vtiliter inseritur: aluum sistit cum vino vetere potú, & vrinam ciet.

Ebenus. Cap. CXXX.

Ebenus optima habetur æthiopica & nigra, nullos habés venarú discursus, factitij cornus læuore: cùm frangitur densa apparet, mordens gustu, atque leniter astringens. Suffitur iucundo odore supra carbones: sine fumi tædio. Recés autem ad igné prolata, ob pinguitudiné accenditur, & trita ad coté rufescit. Altera est indica, internatis segmétis cádicátibus, & modicè fuluis, item frequétibus maculis: cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consimilia pro ebeno væneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil

μελαντικὴν, αὐαστομωτικὴν· ἴσχει δὲ ταῖς ῥίσεσι τείχας, μυρῷ οἴνῳ καὶ σμύρνῃ καὶ μυρσίνῳ ἐλαίῳ, οὐλάς τε εὐπρεπεστέρας ποιεῖ μετ' οἴνου καταχριόμενον, καὶ ὠταλγίας μεθ' ὑδρομέλιτος, ἢ ῥοδίνῳ ἐγχρόμενον θεραπεύει· κωδυμιᾶ δὲ καὶ πρὸς δευτέρων ἐκβολὰς, καὶ σπληνείας θεραπεύει, ταῖς μὲν ἐν ποσῷ μιγνὺς, καὶ τοῖς αὐχμώδεσι καὶ βηχικοῖς καὶ μαλάγμασι χρησίμως μίγνυται· κοιλίαν τε ἵστησι σὺν οἴνῳ παλαιῷ πεσσόν ἐστι δὲ καὶ οὐρητικόν.

Περὶ ἐβένου. Κεφ. λ.

Ἐβένος κρατίστη ἡ αἰθιοπικὴ, καὶ μέλαινα, καὶ μὴ ἔχουσα κιρσοὺς, ἐμφερὴς, κέρατι εἰσχασμένῳ τῇ λειότητι, θλασθεῖσα δὲ πυκνὴ, δακτικὴ ἐν τῇ γεύσει καὶ στρυφνοῦσα· πεθεῖσα τὸ ἐπ' αὐθράκων μετ' εὐωδίας καὶ δίχα καπνοῦ ἐνθυμιωμένη. ἡ δὲ θερσαπος διὰ τὴν λπαρείαν, αὐάπτεται ταχὺ θερσαφθεῖσα, περιφθεῖσα δὲ ἐπ' ἀκόνης, ἐρυθρίζει γίνεται. Ἔστι δέ τις καὶ ἰνδικὴ, ἔχουσα διαφύσεις λευκὰς, καὶ κηρίδας, καὶ κατὰ λοις ὁμοίως πυκνούς· πολὺ βελτίων ἡ πρώτη. ἔγνωσι δὲ τὰ σησάμινα ἢ ἀκανθινα ξύλα ἐμφερῆ ὄντα, αὐτὴ ἐβένου πωλοῦσι· διαγινώσκεται δὲ ὅτι τραχέα εἶναι, καὶ κατὰ δάκνει μικρὰ ἀπολύεται ἐμπορφύρεια τῷ χρώματι, μηδὲν

μηδὲν δὲ δηκτικὸν *ἐχούσας ἐν τῇ γεύσει, ἢ ἐν τῇ ὀσμάσει ἐνῶδες. Δώσαμεν δὲ ἔχει, σμηκτικὴν τῶν ὑπισχνουμένων τὰς κόρας, *ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ παλαιὰ ῥεύματα καὶ φλυκτίδας· εἰ δέ τις ποιήσας ἐξ αὐτῆς ἀκόνιον χρῶτο εἰς τὰ χολλύρια, βάψιον ἐνδήσει. καταπλάζει δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ τῶν τροχισμάτων τὰ ῥυπιμάτων, βρεχομένων ἐν οἴνῳ χλιῳ ἡμέραν καὶ νύκτα· εἶτ' ἀναμεμιγμένων ὑπιμελῶς καὶ εἰς χολλύρια ἀναπλασσομένων. ἔνιοι δὲ προτείναντες ἀνεδοῦσιν αὐτὰ, εἶθ' ὕστερον τὰ λοιπὰ ποιοῦσι. τινες δὲ αὐτὴ οἴνου ὕδατι χρῶνται. κάεται δὲ ἐν ὀστρακίνῃ κύτρᾳ ἕως ἂν ἀνθρακωθῇ. καὶ πλύνεται ὡς ὁ κεκαυμένος μόλιβδος, *ἁρμόζει δὲ τὸ τοιοῦτον πρὸς ξηροφθαλμίας.

nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres destillationes pustulasque mirum in modum pollet: Si quispiã facta ex eo coticula collyriis vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si sco bes ramentáve vino Chio die noctúque macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ipsa excolant, reliquáque eundem in modum peragunt. Alij pro vino aqua vtuntur. Vritur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi vsti modo, & ita siccis scabrísq; lippitudinibus conducit.

Περὶ Ῥόδων. Κεφ. ϛλά.

Ῥόδον ψύχει καὶ στύφει, τὰ δὲ ξηρὰ μᾶλλον. χυλίζειν δεῖ τὰ ἀπαλὰ ἀποφαλλίσαντας τὸν ὄνυχα καλούμενον, ὅπερ ἔστι τὸ λευκὸν τὸ ἐν τῷ φύλλῳ, τὸ δὲ λοιπὸν ἐκθλίβειν καὶ τρίβειν ἐν σκιᾷ, ἐν δυσὶ ἄγχεσι οὗ συσφαῇ, οὕτω τε ἀποτίθεσθαι εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς παρασκευάσεις. ξηραίνεται δὲ τὰ φύλλα ἐν σκιᾷ συνεχῶς στρεφόμενα ἵνα μὴ εὐρωπάσῃ. ποιεῖ δὲ τῶν ξηρῶν ἐνηθέντων ἐν οἴνῳ τὸ ἀπόθλιμμα, πρὸς ἄλγημα κεφαλῆς, ὀφθαλ-

Rosa. Cap. CXXXI.

Rosa refrigerat & astringit, sed sicca multò magis. Succus recétibus foliis exprimitur, desectis forfice vnguibus (sic appellantur candidę foliorũ partes) reliquum in pila premi & teri debet in vmbra donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones recundi. Siccãtur etiamnum folia rosarum, cõtinnuò versata, ne muceãt, néve situs in iis insideat. Aridis rosis & in vino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis,

aurium, oculorum, gingiuarũ, ſedis, recti inteſtini ac vuluæ, penna illitus aut infuſus. Eadẽ ſine expreſsione tuſa, præcordiorum inflammationibus, humidis ſtomachi vitiis, igni ſacro illini prodeſt: ſiccis ac tritis femina aſperguntur. Miſceri ſolent vulnerariis antidotis, atque compoſitionibus quas antheras vocant. Folia vruntur in calliblephara. Flos qui in mediis roſis inuenitur, ſiccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inſpergitur. Capita pota citam aluum, & cruentas reiectiones ſiſtunt.

ὀφθαλμῶν, ὤπων, οὐλων, δακτύλων, ἀπευθυσμένε ἐντέρου, μήτρας, πεσσῷ ἐγχριόμενον ϗ προσκυζόμενον. αὐτὰ δὲ δίχα τοῦ ἐκθλίβεσθαι, κοπέντα καὶ ἐπιπλαττόμενα, ποιεῖ πρὸς ὑπορρο- 5
ῆσίων φλεγμονάς, καὶ στόμαχου πλάδον ϗ ἐρισιπέλατα· ξηρὰ δὲ λεῖα παρὰ μητρῖς θεραπάσσει), ϗ αὐθηρεῶν ϗ τραυματικῶν ἀντιδότοις μίγνυται. κάπτεται δὲ καὶ εἰς καλλιβλέφαρα. τὸ δ' ἐν μέσοις 10
τοῖς ῥόδοις σύνεισκόμενον ἄνθος πρὸς οὖλων ῥευματισμοὺς ξηρὸν πεφαπάδειν ποιεῖ. αἱ κεφαλαὶ δὲ ποθεῖσαι, κοιλίαν ῥέουσαν καὶ αἵματος ἀναγωγὴν ἐπέχουσιν.

Roſei paſtilli. Cap. CXXXII.

Paſtilli quos rhodides vocãt, hac ratione conficiuntur: Roſarũ viridiũ, quæ nullo antea humore madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicę nardi drachmę decẽ, myrrhæ drachmæ ſex, tritę digerũtur in paſtillos, q triũ obolorũ pondus æquẽt: ſiccatíq; in vmbra, in fictili nõ picato, atq; obturato recõdũt. Alij adiiciũt coſti drachmas duas, iridis Illyricę totidẽ, & vinũ Chiũ cũ melle miſcẽt. Mulierib⁹ moniliũ vice collo circũdato vſui ſũt, ad retundendũ graue ſudoris virus. Tritis etiã vtuntur ad illitiones

Περὶ Ροδίδων. Κεφ. ρλϛ'. 15

Καὶ αἱ λεγόμεναι δὲ ῥοδίδες, σκευάζονται τὸν τρόπον τῶν τὸν ῥόδων χλωρῶν ἀζρόχων μεμαρασμένων < μ'. ναρδου ἰνδικῆς < ί. σμύρνης < δ'. λεῖα ἀναπλάσσεται εἰς τροχίσκους τετραδραχμαίους· 20
ϗ ἐν σκιᾷ ξηραίνεται, ϗ ἀποτίθεται εἰς κεραμεῖον ἀγγεῖον ἀκόνητον πεπισμωμένον. ἔνιοι δὲ πεφυτίθασι καὶ κόσου < β'. ἴρεως ἰλλυρικῆς τὸ αὐτὸ μίσγοντες καὶ οἶνον χῖον μετὰ μέλιτος. χρῆ- 25
σις δὲ αὐτῶν ἐστιν, ἐπὶ γυναικῶν πεπιεσμένων τῷ τραχήλῳ αὐτὶ ὁρμῶν, ἀμβλύνουσαι τὴν τῶν ἱδρότων δυσοδίαν. χρῶνται δ' ϗ ἐν λείοις ἐν διαπλάσμασι

ϗ

καὶ συγχρίσμασι μετὰ τὸ λουτρὸν, καὶ μετὰ τὸ ξυρᾶσθαι, ἀποκλύονται ψυχρῷ.

& diapasmata, quę fiunt ad sudores coërcendos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Περὶ Λυκίου.

Κεφ. ρλγ.

Λύκιον, ὃ ἔνιοι πυξάκανθαν καλοῦσι, δένδρον ἐστὶν ἀκανθῶδες, ῥάβδους ἔχον πεπήχεις ἢ καὶ μείζονας· φύλλα δὲ τὰ φύλλα πύξῳ ὅμοια σχεδόν· καρπὸν δὲ ἔχει ὡς πέπερι μέλανα, πικρὸν, σχιδὸν, λεῖον· καὶ τὸν χυλὸν δὲ ἀγρεῖον, ὅμοιον τῷ διεφθαρμένῳ λυκίῳ· ῥίζας δὲ πολλὰς, σκολιὰς, ξυλώδεις. φύεται δὲ πολλαχοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ λυκίᾳ, καὶ ἐν ἄλλοις τόποις πολλοῖς. τραχήλους δὲ φιλεῖ χωρία. χυλίζεται δ' ὅτ' φύλλων σὺν τοῖς θάμνοις θλασθέντων καὶ βραχέντων, ἐφ' ἡμέρας ἱκανὰς, εἶθ' ἑψηθέντων, καὶ τῶν μὲν ξύλων ἐκπομπῶν, τοῦ δὲ ὑγροῦ πάλιν ἑφθοῦ μέχρι μελιτώδους συστάσεως. δολοῦται δὲ ἀμόργῃ τῇ ἑψήσει ἅμα μιγνυμένῃ, ἢ ἀψινθίου χυλίσματι ἢ βοείᾳ χολῇ. καὶ τὸ μὲ ἐπινηχόμενον ἀφροὺς ἐν τῇ ἑψήσει ἀφαιρεῖν, ἀποδοῦναι εἰς τὰ ὀφθαλμικά· τῷδε λοιπῷ εἰς τὰ ἄλλα χρῶ. γίνεται δὲ καὶ ὃν τοῦ καρποῦ ὁμοίως χύλισμα ἐκπιεζομένου καὶ ἡλιαζομένου. ἔστι δὲ κάλλιστον τὸ χαμόμενον λύκιον, καὶ κατὰ πλὺ σβέσιν τὸν ἀφρὸν ὑπερυθῆ ἔχον, ἔξωθεν μέλαν, διαιρεθὲν δὲ κιρρὸν ἄβρεα-

Lycium. Cap. CXXXIII.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: foliis buxi, densis: fructu piperis, nigro, læui, amaro, densoque: cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lytia, & plerisque aliis locis. Aspera loca amat. Succi extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi & antè per multos dies macerati coquuntur, tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur: reliquo ad aliavtuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod vri potest, restinctúmque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus, cum fregeris, rufis odo-

re minimè viroſo, cum amaritudine adſtringés, crocino colore (cuiuſmodi indicum eſt) cæteris præſtantius atque efficacius. Lycium adſtringit, caliginem oculorum diſcutit, genarum ſcabiem, pruritus, veteréſque fluxiones ſanat: facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonſillas, labiorum fiſſuras, ſedis rimas, attritúsque illitum: cœliacis, dyſentericis, potum inditúmque conuenit: datur ſanguinem excreátibus & tuſsi, ex aqua: contra rabioſi canis morſus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos facit pilos: reduuiis: vlceribus quæ ſerpunt aut putrent, medetur: fœminarum profluuia appoſitum ſiſtit: rabioſorũ ictibus ex melle potum, aut vice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri lycium, ex frutice lóchitide appellato: ea ſpinarũ generi aſcribitur, ramos rectos habés ternûm cubitorũ longitudine, maiorésve, rubo craſsiores, à radice numeroſos. Fructus cortex rubeſcit, folia oleæ ſimilia. Herba ĩ aceto decocta proditur lienis inflãmationib⁹ & regio morbo mederi, & fœminarum purgationes elicere.

Aſſeue-

ἄβρωμον, σύφον μὴ πικρίας χρόμματι κροκώδες, οἷόν ὅτι τὸ ἰνδικὸν, διαφέρον τ λοιπῶ ϗ δυναμικώτερον. Δύναμιν δ' ἔχει συμπικνὴν, ϗ τὰ ἐπισκοτοῦντα τ κόρας, καθαίρει, ψωριάσεις δὲ τὰς ὀπὶ τ βλεφάρων, ϗ κνησμοὺς ϗ παλαιὰ ῥεύματα θεραπεύει· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ὦτα πυορροοῦντα, παρέφθμια, ἕλκα εἰλκωμένα, ϗ* διερρωγότα χείλη, ῥαγάδας ἐν δακτυλίοις, ϗ περιβίμματα ὀπηχιόμενον· αἱμύζει ϗ κοιλιακοῖς ϗ δυσεντερικοῖς, πινόμενον ϗ ἐγκλυζόμενον. δίδοῦ ϗ αἱμοπτοϊκοῖς, ϗ βάπτουσι σὺν ὕδατι ϗ τοῖς ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς δηχθεῖσιν, ἐν καταπότῳ ἢ σὺν ὕδατι ποτόν· ξαίνει τὲ καὶ τείχας· παρωνυχίας τὲ ϗ ἕρπητας, καὶ σπεδόνας ἰᾶται· ἵστησι ϗ ῥοῦν γυναικεῖον προσθέμενον· βοηθεῖ δὲ ϗ λυσσοδήκτοις ποθὲν μὴ γάλακτος, ἢ αὐτὸ καταπότου λαμβανόμενον. Λέγεται δ' τὸ ἰνδικὸν λύκιον γίνεσθαι ἐν θάμνῳ, τ λεγομένῃ λογχίτιδος. ἔστι δὲ εἶδος ἀκάνθης, ῥάβδους ἔχουσι ὀρθὰς βιπήχεις ἢ ϗ μείζους πολλὰς ἀπὸ τοῦ πυθμένος, παχυτέρας βάτου φλοιὸς ῥαγεὶς ἐνδεθείς. τὰ δὲ φύλλα ὅμοια ἐλαίᾳ, ἧς ἡ πόα ἐν ὄξει ἑψηθεῖσα ϗ ποτιζομένη. ἱστορεῖται φλεγμονὰς σπλήνων. καὶ ἕκτριψον ἰᾶται, καὶ καθάρσεις γυναικείας ἄγειν

ϗ

καὶ ὠμὴ δὲ λεῖα ποιεῖται, τὰ αὐτὰ ποιεῖν παραδίδοται· τοῦ δὲ σπέρματος μίσρα δύο ποιέντα, ὑδατώδη καθαίρει, καὶ διαπασίμους βουδεῖ.

Περὶ Ακακίας. Κεφ. ρλδ'.

Ακακία φύεται ἐν αἰγύπτῳ· ἄκανθα δὲ ὅση δενδρώδης, διακοειδὴς, οὐκ ὀρθοφυὴς, αὐθος ἔχουσα λευκὸν, ἧ ἡ καρπὸν ὥσπερ θέρμον ἐν λοβοῖς κείμενον, ἐξ ὧ ἡ ἐκθλίβεται τὸ ἐλίχμισμα ξηραινόμενον· ἐν σκιᾷ, μέλαν μὲν ἐν τῷ πεπείρῳ καρπῷ, ὑπόκιρρον ἡ ἐν τῷ ὠμῷ. ἐκλέγει δὲ τὸ ἀρίσιμα ἔσκιρρον, εὐῶδες, ὡς ἐν ἀκακίᾳ χυλίζουσι δὲ πίνες τὰ φύλλα σὺν τῷ καρπῷ. ἔχει δὲ ἐν τῇ ἀκάνθῃ γόμμι. Δύναμιν δὲ ἔχει συπτικὴν, ψυκτικὴν, ἀφίσησι δὲ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ ἡ ἐρυσιπέλατα, ἕρπητας, χίμωλα, πτερύγια, τὰ ἐν τῷ στόματι ἕλκη, διαπλώσεις ἡ ὀφθαλμῶν καθίσησιν, ἐπίσχει δὲ ἡ ῥοῦν γυναικεῖον, καὶ τὰς διαπλώσεις δὲ τῆς ὑστέρας σέλλει, κοιλίαν τε ῥέουσαν ἐπίσχει πυόμενος, ἡ ἐγκλυζόμενος· μιλαίνει δὲ ἡ τείχας. πλυίεται δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, τεθρυμμένου μὲν ὕδατος ἀποχυθέντος τὸ ὀπτάγον ἄχρις ἂν καθαρὸν ἐφιστῆται τὸ ὕδωρ, ἡ ὕστως ἀναλαμβάνεται εἰς πεσσίσκους. κράται δὲ ἐν ὠμῇ χόβῃ

Asseuerant etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare. Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurgare, venenis quoque auxilio esse.

Acacia. Cap. CXXXIIII.

Acacia in Ægypto nascitur spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attollens. Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccatur in vmbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, vt in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex foliis, & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandúmque efficax. Succus oculorum medicamentis vtilis: valet ad ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris vlcera: procidentes oculos reprimit, mensium abundátiam sistit, prociduam vuluam cohibet: citam supprimit, aut potus aut subter indutus: capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia,

καῖς δυνάμεσι καὶ ἐμπλαστικαῖς· παλαιουμένη τε βελτίων γίνεται· ἔστι κλυσμά τε ἕδρα καὶ αἰδοίῳ καὶ μήτραις εἱλκωμέναις ἐπιτήδειος. ἐκβάλλει δὲ καὶ τοὺς ἐφθαρμένους ὀδόντας σὺν ὀμφακίνῳ ἑψηθεῖσα ἄχρι μελιτώδους συστάσεως, καὶ περιπλασθεῖσα· ψώρας τε κτηνῶν σὺν θέρμων ἀφεψήματι καὶ χαμαιλέοντος καταχριομένη θεραπεύει. ἡ δὲ ἀνέψητος καὶ πρόσφατος ποδαγρικοὺς καὶ ἀρθριτικοὺς ὠφελεῖ, θερμὴ καταντληθεῖσα· ἐγχριομένη δὲ εἰς κώδιον καὶ ἐπιτεθειμένη ἐπὶ τῶν ὑδρωπικῶν στέλλει τὸν ὄγκον.

Περὶ Ἄγνου. Κεφ. ρλϛ'.

Ἄγνος ἢ λύγος θάμνος ἐστὶ δενδρώδης, παρὰ ποταμοῖς ῥαχέσι τε τόποις καὶ χαράδραις φυόμενος, ῥάβδους ἔχων δυσθραύστους, μακράς· φύλλα δὲ ὡς τὰ τῆς ἐλαίας, ἁπαλώτερα δέ. τὸ δ' ἄνθος ἡ μέν τις λευκὸν σὺν ὑποπορφυρίζοντι· ἡ δὲ, πορφυροῦν φέρει. σπέρμα δὲ ὡς πέπερι. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικήν, στυπτικήν. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ πινόμενος, βοηθεῖ θηριοδήκτοις, σπληνικοῖς, ὑδρωπικοῖς· κατασπᾷ δὲ καὶ γάλα, καὶ ἔμμηνα ἄγει πινόμενος ὅσον < α. πλῆθος σὺν οἴνῳ· ἐκλύει δὲ καὶ γονήν. ἅπτεται δὲ καὶ κεφαλῆς κάρον ἐπιφέρων. τὸ δὲ ἀφέψημα τῆς πόας καὶ τοῦ σπέρματος, εἰς ἐγκαθίσματα ταῖς περὶ ὑστέραν διαθέσεσι, καὶ

& meatus inductu suo obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si verò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiem cum decocto lupini, & chamęleõte illitu sanat. Cruda & recenti amurca podagras articulariósque dolores foueri, vtilissimum: peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimit.

Vitex. Cap. CXXXVI.

Vitex siue lygos frutex est in arborem assurgens, nascitur in fluminum ripis, asperisq; locis, ac torrentium alueis: ramos gerit lõgos, fractu peruicaces: folia oliuæ sed molliora. Duo genera eius, vna harum albũ florem mittit cum purpureo: altera tantũ purpureum, & semen, vt piper. Excalfactorias vires habet, & adstrictorias. Semen eius potum venenatis ictibus, aquæ quæ cutem subiit, lienosisque auxiliatur: lac euocat, menses ciet, drachmæ põdere in vino potum: geniturã exoluit, caput tentat, & soporé affert. Decoctũ herbę & seminis in desessione, mulierib⁹ vuluæ malo

malo opportunis opitulat, itē inflāmationibus: purgationes mouet semē cū pulegio potū, etiā suffitu vel appositu: capitis dolorem dissoluit illitū, instillatur cū aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant venenata: illita quoq; serpētium morsibus auxiliantur: testiū duritias cum butyro & foliis vitium emolliunt: rimas sedis semen cum aqua illitū mitigat, & cum foliis medetur luxatis, vulneribusq;. Virgā qui manu teneat dum iter facit, negat intertrigine sentire. Agnū, quasi dicas castū, vocāt Græci, quoniam matronæ in thesmophoriis Atheniēsium castitatē custodientes, foliis huius cubitus sibi sternūt, & lygon quasi vimen, propter inuictam ferè ramorum flexilitatem.

Salix. Cap. CXXXVII.

Salix vulgò nota est: cuius semen, folia, cortex & succus spissandi vim habent. Trita folia cum exiguo pipere & vino pota, ileosis subueniūt: sumpta per se & cum aqua præstant mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinem expuētibus prodest: cortex eosdem præbet effectus.

Corticis

καὶ φλεγμονὰς ἀρήγει· πεσὸν δὲ μετὰ γλήχωνος καὶ ὑποθυμιαθὲν τὸ σπέρμα καὶ προσχεθὲν, καθαρσιον κινεῖ· λύει δὲ καὶ κεφαλαλγίας καταπλασσόμενον, καὶ ἐπὶ ληθαργικῶν τε καὶ φρενιτικῶν ἐμβρέχεται σὺν ὄξει καὶ ἐλαίῳ. καὶ τὰ φύλλα ὑποθυμιώμενά τε καὶ ὑποστρωννύμενα, θηρία διώκει, καὶ καταπλασσόμενα ἐπὶ τῶν θηριοδήκτων βοηθεῖ, σκληρίας τε διδύμων μετὰ ὕδατος καὶ φύλλων ἀμπέλου μαλάττει, ῥαγάδας τε τὰς ὑδρακτυλίῳ σὺν ὕδατι ἐπιπλασθὲν τὸ σπέρμα θεραπεύει· σὺν δὲ τοῖς φύλλοις, τρέμματα, πταύματα ἰᾶται. δοκεῖ δὲ καὶ κωλυτήριον εἶναι ὑπὸ ὁδοιπορείας παρατεινομένων. εἴ τις ῥάβδον αὐτῆς παρὰ χεῖρα κρατοίη. ὠνόμασται δὲ ἄγνος, διὰ τὰς ὑπὸ τῶν θεσμοφορίοις ἁγνευούσας γυναῖκας, εἰς ὑπόστρωμα χρῆσθαι αὐτῇ, λύγος δὲ διὰ τὸ εὐκαμπὲς τὰς ῥάβδους αὐτῆς ἔντονον.

Περὶ Ἰτέας. Κεφ. ρλζ'.

Ἰτέα δένδρον ἐστὶ πᾶσι γνώριμον, ἧς ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ φλοιὸς καὶ ὁ χυλὸς, συσπαστικὴν ἔχει δύναμιν. ἁρμόζει δὲ τὰ φύλλα λεῖα μετὰ ὀλίγου πιπέρεως καὶ οἴνου πεσόντα εἰλεώδεσι, καθ' ἑαυτὰ δὲ σὺν ὕδατι λαφθέντα, ἀσυλληψίαν καταβράζει. ὁ δὲ καρπὸς πεσὼν, αἱμοπτοϊκοὺς ὠφελεῖ. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τὰ αὐτὰ δρᾷ, καθὼς

καθὼς

χαεὶς δὲ ἢ φυραθεὶς ὄξει, τύλως ἢ ἥλως αἴρει καταπλασθείς. ὁ δὲ ἐκ τῶν φύλλων ἢ τῶ φλοιῶ χυλὸς, ἐν κεκύφῳ ῥόας θερμανθεὶς μετὰ ῥοδίνου, ὠταλγίας ἀρήγει. ἢ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν, καταπότημα ποδάγρας ἄριστον· σμήχει δὲ ἢ πύρα. λαμβάνεται δὲ ἢ ὁπὸς ἐξ αὐτῆς ἐντιμομένου τῶ φλοιῶ χθ' πῶ αὔριον, ἕως γὰρ ἐυρίσκεται συνεχῶς. Δυώαμιν ἢ ἔχει σμηκτικὼ τῶν ὑποκοτούντων τοῖς κόραις.

Περὶ Αχιλαίας. Κεφ. ϛλέ.

Αχιλαία ὡ ἔνιοι κότινον καλοῦσιν, οἱ δὲ, αἰθιοπικὴν ἐλαίαν. ἔχει φύλλα συπικὰ, λεῖα δὲ καταπλαδέντα, ἑρπητικὰ ὅσιν ἕρυσιπελάτων, ἐρπήτων, ὀπινυκτίδων, ἀνθράκων, νομῶν, παρωνυχίων, θερμαντικὰ ἑλκῶν, σὺν μέλιτι καταπλασσόμενα, ἀνακαθαίρει δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ ἕλκη, διαφορεῖ καὶ φύγεθλα καὶ φλεγμονὰς, σὺν μέλιτι καταπλασθέντα, ἢ δέρμα κεφαλῆς ἀποσαθρὸν, παρακολλᾷ· ἰᾶται δὲ ἢ τὰ ἐν στόματι ἕλκη ἢ ἄφθας διὰ μασηθέντα, ἢ ὁ χυλὸς ἢ αὐτῆ ἢ τὸ ἀφέψημα, τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἐπέχει δὲ ἢ αἱμορραγίαν, ἢ ῥοῦν γυναικεῖον προσιθέμενος ὁ χυλὸς καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σταφυλώματα, ἢ φλυκταίνας. ἔτι ἢ ἕλκη καὶ παλαιὰ ῥύματα σήλλει. δὲ

Corticis cinis admisto aceto maceratus, illitu clauos & callos tollit. Ex foliis & cortice succus cum rosaceo in calyce punici calfactus, auriū doloribus auxiliatur. Decocto eorū podagras foueri vtilissimum: furfures purgat in corpore. Ex cipitur succus qui manat ex ea cū floret, excisō cortice: in plaga enim cōcretus humor inuenitur, qui ad purgāda, quæ obstant oculis, suā vim præbet.

Syuestris olea. Ca. CXXXVIII.

Sylueſtris oleæ, quam Latini oleastrū appellant, alij Æthiopicam oliuam, folia astringūt: trita autem & impoſita ignem ſacrum, vlcera quæ ſerpunt: epiny ctidas, carbunculos, reduuias nomásque cohibent: cruſtas emarginant cum melle illita. Quinetiam ſordida vlcera repurgant: inflammationes panósque cum melle impoſita diſcutiunt: cutem à capite vulſam conglutinãt: oris vlceribus, & priuatim infantium, cómanducata medentur. Succus & decoctum eoſdem habét effectꝰ: ſanguinis eruptiones, ac muliebre profluuium, admotꝰ ſuccus inhibet: vuæ oculorū, puſtulisq; prodeſt, vlcera & veteres defluxiones ſiſtit,

quapro-

(quapropter in collyria additur.) ad genarũ eroſiones perquàm vtilis. Exprimitur ſuccus tuſis folijs, affuſo vino aut aqua, ſiccatúsque ſole in paſtillos digeritur: ſed longè validior ad recondẽdum ſuccus habetur, qui cum vino quàm cũ aqua expreſſus eſt. Auribus ſubuenit, ſiue vlcerentur, ſiue pus effluat. Folia conueniẽter cœliacis cum farina hordeacea illinuntur: vruntur cũ floribus folia, vt ſpodij vicẽ cinis præſtet, in cruda olla, oblito ore luto, vſque dum figlinũ percoquatur: reſtinctáque vino & rurſus ſubacta, eodem modo vruntur, poſtremo ceruſæ modo elota coguntur in paſtillos. Huiuſcemodi cineré in medicamentis oculorũ conſtat ſpodio non cedere, ſed eiſdẽ viribus præditũ eſſe putandũ eſt.

διὸ καὶ μιγνύται κολλυρίοις πρὸς τὰς τῶν βλεφάρων διαβρώσεις συντείνει, χυλίζοντας δὲ δεῖ κόπτειν τὰ φύλλα. καὶ ἐπιχέοντας οἶνον ἢ ὕδωρ ἐκθλίβειν, καὶ ξηραίνοντας ἐν ἡλίῳ ἀναπλάττειν. ἔστι δὲ εὐτονώτερος, ὁ διὰ τοῦ οἴνου ἐκθλιβόμενος, καὶ εἰς ἀπόθεσιν μᾶλλον τοῦ δι' ὕδατος ἀρμόζει. πίνεται δὲ καὶ πρὸς ὦτα πυορροοῦντα καὶ εἱλκωμένα. τὰ δὲ φύλλα καὶ ἐπὶ κοιλιακοῖς ἐυστόμοις καταπλάσσεται μετὰ σικύου ὠμοῦ· κνᾶται δὲ τὰ φύλλα μετὰ τῶν ἀνθῶν, καὶ ἀντὶ σποδίου λαμβάνεται ἐν χύτρᾳ ὠμῇ πρωτοπλασθείσῃ πολλῷ τῷ σώματι μέχρις ὀπτήσεως τοῦ κεράμου. ἔπειτα κατασβέννυται οἴνῳ, καὶ φυραθέντα πάλιν οἴνῳ, ὁμοίως κνᾶται· εἶτα πολεῖται· ὡς τὸ ψιμμίθιον καὶ ἀναπλάσσεται. δοκεῖ δὲ ἡ τοιαύτη χεῦσις, μὴ λείπεσθαι τῆς ἀποθέσεως τὰ ὀφθαλμικὰ ἔθνη καὶ ἡ δυνάμιν ὁμοίως ὑγιεινόν.

Olea. Cap. CXXXIX.

Foliorum ſatiuæ oleæ eadẽ vis intelligitur, ſed aliquãto inferior: vnde ocularibus medicamentis ob ſuam mitiorem vim conuenientior eſt. Sudor ligno virenti accenſo manans, illitu ſanat lichenas, furfures et & ſcabiem. Oleaginum ſemen illitú medetur furfuribus, & vlceribus quæ depaſcũt vorátq;: quod

Περὶ Ἐλαίας. Κεφ. ρλθ'.

Δυνάμει δὲ τὰ αὐτὰ καὶ τὰ ἡμέρου ἐλαίας φύλλα, λείπεται δὲ τῇ δυνάμει· ὅθεν πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ μᾶλλον ἁρμόζει διὰ τὸ ἐπιεικέστερον. τὸ δὲ ἐκ χλωρᾶς τῆς ξύλου καιομένης ἐκπορευόμενον ὑγρὸν, πτυρὰ καὶ ψώρας καὶ λιχῆνας καταχριόμενον ἰᾶται· καὶ ὁ καρπὸς δὲ αὐτῶν καταπλασθείς, πτυρὰ καὶ νομὰς διαπαύει. τὸ δὲ

τὸ δὲ ἐντὸς τῆ πυρίνου μετὰ στέατος καὶ ἀλεύρου, λεπτοὺς ὄνυχας ἐκπυάσει.

Περὶ Κολυμβάδων ἐλαίων. Κεφ. ρμέ.

Ἐλαῖαι κολυμβάδες λεῖαι καταπλασθεῖσαι, πυρίκαυτα ἰᾶσι φλυκταινώδη, καὶ ῥυπαρὰ καὶ ἕλκη καθαίρουσιν. ὁ δὲ ἐκ τῶν ἄλμης χυλὸς αὐτῶν διακλυζόμενος, οὔλα στέλλει, καὶ ὀδόντας σειομένους κρατύνει. ἔστι δὲ ἡ μὲν ὑποκίρρος καὶ πεπόσματος ἐλαία, δυσκοίλιος, εὐστόμαχος· ἡ δὲ μέλαινα καὶ πίσσης, εὐδιάφθορος καὶ κακοστόμαχος, ὀφθαλμοῖς τε ἀνεπιτήδειος καὶ κεφαλαλγής, φρυγεῖσα δὲ καὶ καταπλασθεῖσα, νομὰς ἵστησι, καὶ ἄνθρακας ἀπελαύνει.

Περὶ Ἐλαίου ἀγρίας ἐλαίας. Κεφ. ρμά.

Τὸ δὲ ἐκ τῶν ἀγρίας ἐλαίας ἔλαιον, διάκλυσμα ὕλοις μυδῶσι καὶ σαλπικὸν ὑποσάλων ὀδόντων ἐστί, πυρία τε δι' αὐτοῦ θερμαινομένη καὶ διακλυζομένη ὀπτήδειος ὕλοις ῥευματιζομένοις. δεῖ δὲ ἔριον μιλωτῆ περιπλέκοντας ἀποβάπτειν εἰς τὸ ἔλαιον, καὶ πρόσαπτε ἕως τοῖς ὕλοις ἄχρις ἂν λευκὰ φανῇ.

Περὶ Δακρύου ἐλαίας αἰθιοπικῆς. Κεφ. ρμβ.

Τὸ δὲ δάκρυον τῆς αἰθιοπικῆς ἐλαίας, ἐοικέ πως σκαμμωνίᾳ. ἔγκιρρον, ἐν μικροῖς καρύοις συγκει-

quod autē intrà nucleum est, ex adipe & farina scabros vngues excutit.

Colymbades oleæ. Cap. CXL.

Colymbades tritæ & ambustis illitæ pustulas gigni prohibent, sordida vlcera purgāt, muriæ succus collutas gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua flaua & recens stomacho vtilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascentia vlcera sistit, & carbunculos emarginat.

Oleum syluestris oliuæ. Cap. CXLI.

Oleum syluestris oliuæ gingiuis putri vligine laborantibus colluitur, dētium mobilitates stabilit, calfacti fotus gingiuis fluxione laborātibus vtilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur.

Lachryma æthiopicæ oleæ. Cap. CXLII.

Lachryma quā æthiopica olea stillat, scāmonio similis qua dāten⁹ est, fulua stillis exilibus cōstās,

conſtãs, mordax: quæ autẽ ammoniaci aut gũmi ſimilitudinẽ refert, colore nigricãs, nec guſtu mordẽs, ſuperuacua eſt. Noſtrates oleæ, oleaſtriq;, ſimilem lachrymã ſudãt, quæ cõmodè ad oculorũ hebetudines illinitur: cicatrices albugineſq; illitu emẽdat, vrinã & mẽſes ciet, canis dentiũ impreſſa ad dolores efficax eſt: inter venena ſcribit: partus pellit, lepras & impetigines ſanat. Appellatur autẽ æthiopica & agreſtis olea.

συγκείμενον, δηκτικὸν· τὸ δὲ ὅμοιον κόμμι ἢ ἀμμωνιακῷ, μελανίζον ἢ οὐ δηκτικὸν, ἀχρεῖον. φέρει δὲ τὸ τοιοῦτον ἢ ἡ παρ' ἡμῖν ἐλαία, ἢ ἡ ἀγριελαία· πτιεῖ δὲ πρὸς ἀμβλυωπίαν καὶ οὐλὰς ἢ λευκώματα ἐγχριόμενον σμήχει, οὖρά τε ἢ ἔμμηνα κινεῖ, ἢ πρὸς ὀδόντων πόνους ἐνεργεῖ, ἐμπεμένον εἰς τὸ βρῶμα· ἀγαγχάφεται δὲ καὶ ἐν τοῖς φθαρτικοῖς· ἄγει δὲ ἢ ἔμβρυα καὶ λειχμῶσας θεραπεύει ἢ λέπρας. καλεῖται δὲ αἰθιοπικὴ ἐλαία ἢ ἀγριελαία.

Quercus. Cap. CXLIII.

Quercus omnis adſtrictoriam vim habet, præſertim liber qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis ſubiecta. Decoctum ex iis datur dyſentericis, cœliacis, ſanguinem excreantibus. Trita in peſſo, fœminis fluxione vuluę laborantibus ſubiicitur.

Πρὶ Δρυός. Κεφ. ριγ'.

Δρῦς πᾶσα συστελικὴ ἔχει δύναμιν, μάλιστα δὲ αὐτῆς σύφει τὸ μεταξὺ τοῦ φλοιοῦ καὶ τοῦ πρέμνου ὑμένος ἐδές· ὁμοίως καὶ τὸ ὑπὸ τὸ πέλυφος. δίδοται δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν, κοιλιακοῖς καὶ δυσεντερικοῖς, καὶ αἱμοπτοϊκοῖς· καὶ ἐν πτυσὶ λεῖον προσίδεται ῥοϊκαῖς γυναιξίν.

Glandes. Cap. CXLIIII.

Glandes eoſdem effectus exhibent: vrinam ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum ſumptæ pariunt, reſiſtunt eſitatæ venenatorum ictib⁹. Decoctum earũ & corticis cum lacte vaccino potum, prodeſt contra toxica: intritæ crudæ, inflammationes illitu leniunt: ad duritias

Πρὶ Βαλάνων. Κεφ. ριδ'.

Καὶ αἱ βάλανοι ἢ τὰ αὐτὰ ποιοῦσιν· εἰσὶ δὲ καὶ ὀρκτικαὶ, ἢ κεφαλαλγεῖς, βιβρωσκόμεναι, ἢ πνευματοῦσαι· αἱρμύζουσι δὲ πρὸς τὰ ἰοβόλα ἐσθιόμεναι, ἢ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν ἢ τὸ φλοιὸν, βοκδεῖ τυχικῷ μὴ γάλακτος βοείου πινόμενον, ὠμαὶ δὲ καταπλασθεῖσαι λεῖαι, φλεγμονὰς παρηγορεῖσι,

σιν

σὺν στέατι δὲ χοιρείῳ ταριχηρῷ, πρὸς κακοήθεις σκληρείας, καὶ πρὸς πονηρευόμενα ἕλκη ἁρμόζουσιν. ἰσχυρότεραι δὲ τῶν δρυΐνων αἱ πρίνιναι τῇ δυνάμει εἰσίν.

Περὶ Φηγοῦ καὶ πρίνου.
Κεφ. ρμέ.

*Καὶ ἡ φηγὸς καὶ ἡ πρίνος εἴδη ὄντα δρυὸς, ἐοικότα ἐνεργεῖ. τῆς ῥίζης δὲ τοῦ πρίνου ὁ φλοιὸς ἑψηθεὶς σὺν ὕδατι ἄχρις οὗ τακηρὸς γένηται, καὶ ἐπιπλασθεὶς νύκτα ὅλην, τρίχας μελαίνει προαποσμηχθείσας κιμωλίᾳ γῇ. ἁρμόζει δὲ τὰ φύλλα πάντων, κοπέντα λεῖα οἰδήμασι, καὶ τὰ ἄτονα δὲ μέρη κρατύνει.

Περὶ Καστάνων. Κεφ. ρμς´.

Αἱ δὲ σαρδιαναὶ βάλανοι, ἃς τινὲς λόπιμα ἢ κάστανα καλοῦσιν, ἢ μότα ἢ διὸς βαλάνους, στύφουσι καὶ αὐταὶ, τῶν ὁμοίων εἰσὶ δραστικαὶ, καὶ μάλιστα οἱ μεταξὺ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ λέπους φλοιοί. ἡ δὲ σὰρξ καὶ τοῖς ἐφήμερον πεπωκόσιν ἁρμόζει.

Περὶ Κηκίδων. Κεφ. ρμζ´.

Κηκὶς καρπός ἐστι δρυός. ἡ μέν τις ὀμφακῖτις καλεῖται μικρὰ καὶ κονδυλώδης, στιβαρὰ, ἀτρύπητος· ἡ δέ τις λεῖα, καὶ κούφη καὶ τετρημμένη. ἐκλέγεσθαι δὲ δεῖ τὴν ὀμφακῖτιν, ἐνεργεστέραν οὖσαν. ἀμφότεραι δὲ στύφουσιν ἱκανῶς,

καὶ

ad duritias quas coëthe vocant, & malefica vlcera cum salsa axungia conueniunt. Ilignæ glandes viribus quernas antecellunt.

Fagus & ilex.
Cap. CXLV.

Fagus & ilex quercus generi assignantur, & cósimile munus obeút. Iligneæ radicis cortex cum aqua coctus, dú mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillas mébrorum partes corroborant.

Castaneæ. Cap. CXLVI.

Sardianæ glādes, quas aliqui castaneas, aut lopima, aut glādes Iouis appellant, adstringunt, similésque effectus præbét: præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercursat. Caro his qui ephemerū biberunt, conueniens est.

Galla. Cap. CXLVII.

GALLA fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem sed tuberosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusque vis vehemẽter astringere.

Tritæ excreſcentia in carne, fluxiones gingiuarum & vuæ, atque oris vlcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem ſedat. Crematæ carbonibus donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acida muria extinctæ, ſanguinem ſupprimunt. Decoctum quibus inſidere expedit, efficax eſt, & contra vuluas procidentes, fluxionésque. Capillos denigrant, aceto aut aqua maceratę: dyſentericis cœliacíſque cum vino aut aqua tritæ conuenienter illinuntur, aut bibuntur: obſoniis addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum eſt, quod his aſfectibus conferat. In ſumma, his vtendum ad adſtringenda, aut ſiccanda quæ opus ſunt.

Rhus. Cap. CXLVIII.

RHus quæ obſoniis aſpergitur, ab aliquibus erithros appellata, ſemen eſt coriarij fruticis, ſic vocati, quoniam coriorum infectores eo vtunť, ad inſpiſſãdas pelles. Arbuſcula in petris naſcens, binûm ferè cubitorũ altitudine foliis oblõgis, ſubrubẽtib⁹, ĩ ambitu ſerratis, acino vuarũ graciliũ dẽſo,

magnitudine

καὶ στέλλουσι λεῖαι τὰς ὑπερσαρκώσεις, ῥευματισμούς τε οὔλων καὶ κιονίδος, καὶ τὰς ἐν στόματι ἄφθας. τὸ δὲ μέσον αὐτῶν, βρώματι ὀδόντων ἐντεθὲν, παύει τὰς ὀδύνας. γίνονταί τι καὶ ἴσχαιμοι καεῖσαι ἐπ' ἀνθράκων μέχρι πυρώσεως, καὶ κατασβεσθεῖσαι ἢ οἴνῳ ἢ ὄξει ἢ ὀξάλμῃ. τὸ δέ ἀπόζεμα αὐτῶν ποιεῖ καὶ πρὸς ἐγκαθίσματα, προπτώσεις ὑστέρας, τῆς ῥευματισμούς. μελαίνουσι δὲ καὶ τρίχας, ἀποβραχεῖσαι ὄξει ἢ ὕδατι. ἁρμόζουσι δὲ καὶ κοιλιακοῖς καὶ δυσεντερικοῖς ἐπιπλαττόμεναι οἴνῳ ἢ ὕδατι λεῖαι καὶ πινόμεναι· τοῖς τε προσοψήμασι μιγνύμεναι ἢ προαφεψόμεναι ὅλαι ἐν τῷ ὕδατι, εἰς ὃ μέλλει τι ἕψεσθαι τῶν ἁρμοζόντων πρὸς αὐτούς· καὶ καθόλου ὅπου δεῖ στύψαι ἢ στῆσαι ἢ ἀναξηρᾶναι, παραλαμβάνεσθαι δεῖ τὴν χρῆσιν αὐτῶν.

Περὶ Ῥοός. Κεφ. ρμή.

Ῥοῦς ἐπὶ τὰ ὄψα, ὃν ἔνιοι ἐρυθρὸν καλοῦσι, καρπός ἐστι τῆς καλουμένης βυρσοδεψικῆς ῥοός, ἣ τις ὠνομάσθη ἐκ τοῦ τοὺς βυρσοδέψας αὐτῇ χρῆσθαι, εἰς τὴν στύψιν τῶν δερμάτων. ἔστι δὲ δενδρύφιον * φυόμενον ἐν πέτραις ὡς δίπηχυ· ἔφ' οὗ φύλλα ἐπιμήκη, ὑπέρυθρα, τὴν περιφέρειαν ἐντετμημένα πριονοειδῶς. καρπὸς δὲ βοτρυδίοις ἐοικὼς, πυκνὸς,

κό

καὶ τὸ μέγεθος τερεβίνθου, ὑπόπλατυς, ᾧ τὸ ἐπικείμενον φλοιῶδες, ὃ ἐστὶν εὔληκτον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα, συστατικὴν, πιοῦσαν πρὸς ἃ καὶ ἡ ἀκακία· μελάνει δὲ πίσσης τὸ ἀφέψημα, δυσεντερείας τε ὄντων ἔγκλυσμα, καὶ πόμα, καὶ ἐγκάθισμα, καὶ ὤτων πυορροούντων ἔγκλυσμα, πτερύγια τε καὶ γαγγραίνας ἐπέχει καταπλασσόμενα τὰ φύλλα, μετ' ὄξους ἢ μέλιτος· καὶ τὸ χύλισμα δὲ τῶν φύλλων ξηρῶν ἐφθέντων σὺν ὕδατι ὥσπερ τὸ λύκιον ἄγει συστάσεως μελιτώδους, ἁρμόζει πρὸς ὅσα καὶ τὸ λύκιον· καὶ ὁ καρπὸς ὁμοίως τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ἁρμόζων ἐν προσφύσεσι κοιλιακοῖς, δυσεντερικοῖς, ἀφλέγματά τε πηρεῖ, σὺν ὕδατι καταπλασθείς, θλάσματα, ἀποῤῥήγματα, πελιώματα· χλώσης τε πραΰπικρος σμύχει σὺν μέλιτι καὶ λευκῷ ῥοῷ ἴσην, ἀμορροΐδας τε θεραπεύει μετ' ὀρύζης ἀνθρακος λείᾳ ἐπιπασθέν. μένος· καὶ τέτῳ δὲ τὸ ἀπόβρεγμα ἐφθὸν πιόντα, βέλτιόν πως τοῦ καρποῦ ποιεῖ. φέρει δὲ καὶ κόμμι ὅσον ἐντίθεται τοῖς βράγμασι τῶν ὀδόντων πρὸς ἀπονίαν.

magnitudine terebinthi, quadámtenus lato: cuius corticosa tunica perquàm vtilis est. Folia vim habent adstringédi, & acacię effectus præbent. Decoctũ capillos denigrat, dysentericis infunditur, & in potus eorum infessũsq; adiicitur, instillatur auribus purulentis. Gangrenas & pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis foliis, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, vt lycium, conueniens. Semen eosdem effectus exhibet: cœliacorum, dysentericorúmq; obsonij inspergitur: fracta, desquammata, liuidáque, illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit, cãdida, fœminarũ profluuia sistit, hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotũ. Aqua in quo semen maduit decocta, cogitur, coitq; efficacior ipso semine. Gummi defert, quod dentium cauis imprimitur ad doloresfiniendos.

Περὶ Φοίνικος. Κεφ. ρμθ'.

Φοινὶξ ἐν αἰγύπτῳ γίνεται. τρυγᾶται δὲ μεσοπορούσης τῆς κατὰ τὸ ὀπώραν ἀκμῆς, παρεμφέρων τῇ ἀραβικῇ μυροβαλάνῳ, πῶμα

Palma. Cap. CXLIX.

Palma in Ægypto gignitur. Ea medio maturitatis vigore, autumno decerpi solet. Arabici myrobalani similis,

pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei: quòd si ad maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerba est & adstringens: contra alui fœminarúmque profluuia, in vino austero bibitur: hæmorrhoidas sistit, vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recentes plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt, copiosiores in cibo inebriant, sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis vtiles in cibo: illinuntur cum cotoneo et cerato œnanthino vesicæ vitiis. Cariotæ, præsertim esu, faucium aspritati medentur.

Palmæ Thebaicæ.

Cap. CL.

Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat, vires recreat cum hydromelite veteri sumptum: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu & gargarizatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei palmarum, cæterorum more, cremati in crudo fictili, & vino restincti, cinere loto, spodij vicem efficiunt: miscentúrque in collyblephara.

πῶμα δὲ λέγεται, χλωρὸς τὸ κῶμα, ἐμφδὴς κυδωνίῳ κτ' ὀσμλω· εἰ δὲ ἀφεψηθὴ πεπανόμενος, γίνεται φοινικοβάλανος. ἔστι δὲ στυφὸς, συπτικὸς, πινόμενος σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ πρὸς διάρροιαν καὶ ῥοὴν γυναικεῖον· ἵστησι δὲ καὶ αἱμορροΐδας, καὶ τραύματα κολλᾷ καταπλασθείς. αἱ δὲ φοινικοβάλανοι, συπτικώτεραι τυγχάνουσι τῶν ξηρῶν, κεφαλαλγεῖς δὲ εἰσι καὶ πλείονες βρωθεῖσαι μεθύσκουσιν· αἱ δὲ ξηραὶ ὠφελοῦσι βιβρωσκόμεναι αἱμοπτοϊκοὺς, στομαχικοὺς, δυσεντερικοὺς, καὶ τοὺς ἐπὶ κύστιν, καταπλασσόμεναι λεῖαι μετὰ κυδωνίης καὶ κηρωτῆς οἰναν θίνης. μάλιστα δὲ αἱ καρυώτιδες ἐσθόμεναι, ἀρτηριῶν τραχύτητας ἰῶνται.

Περὶ Φοινίκων Θηβαϊκῶν. Κεφ. ρν'.

Τῶν δὲ Θηβαϊκῶν τὸ ἀφέψημα πρὸς πότον, παύει καύσωνα, καὶ τὰς δυνάμεις ἀνακτᾶται, μετ' ὑδρομέλιτος παλαιᾶς λαμβανόμενον· καὶ αὐταὶ βρωθεῖσαι, τὸ αὐτὸ ποιοῦσι, γίνεται δὲ καὶ οἶνος ἐξ αὐτῶν τὸ αὐτὸ δυνάμενος τῷ καρπῷ· καὶ καθ' ἑαυτὸ πρὸς τὸ ἀφέψημα αὐτῶν καὶ ἀναγαργαριζόμενον ἱκανῶς σύφει καὶ στέλλει. Οἱ δὲ πυρῆνες τῶν φοινίκων, καίονται ἐν ἀμφὶ χύτρᾳ, καὶ σβεσθέντες οἴνῳ πλύνονται, καὶ ὡς ἀλίσσονται εἰς τὰ κηλιδ-

λιδλέ-

λιβλέφαρα χρησιμεύουσι· κἂν μὴ ὀυτάρκως καῶσι, πάλιν τὸ αὐτὸ γίνεται. Δυώαμιν δὲ ἔχουσι συ-
πτικὴν, παρεμπλαστικὴν, ποιοῦσαν πρὸς τοὺς ἐν ὀφθαλμοῖς φλυ-
κτίδας, σταφυλώματα, μίλφας σὺν νάρδῳ· σὺν οἴνῳ δὲ τέλειοι σι καὶ ὑπερσαρκώματα, καὶ ἀπουλοῦσιν ἕλκη. ἐνδιατρῖβουσι δὲ μάλιστα οἱ ἀπ' αὐγύπτου, οἱ ἐκ τῶν χαμαιζήλων φοινίκων.

Περὶ φοίνικος ἐλάτης. Κεφ. ϟγ'. Φοινικὸς δὲ ἔνιοι ἐλάτην ἢ σπάθην καλοῦσι, σκεπάλυμμά ἐστι τοῦ καρποῦ τῶν φοινίκων ἀκμὴν ἀνθούντων. χρῶνται δὲ αὐτῷ οἱ μυροπῶλαι εἰς τοὺς τῶν μύρων σύνθεσιν ὄντι δὲ αὐ-
τῆς κρατίστη ἡ ὑγρά, σύφουσα, βαρεῖα, μεμυκυῖα, λιπαρὸν ἔχουσα τὸ ὑπόστασιν. Δυώαμιν δὲ ἔχει συπτικήν· ἐφικτᾶσαι τὰ ῥεύματα τῶν ἑλκῶν, χαλασμούς τε ἀρθρων σωμάτων, λεῖα μαλάσματα μιγεῖσα καὶ κα-
ταπλάσματα· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑποχόνδριον καὶ στόμαχον ἀτονοῦντα, καὶ ἀκρατίας διαθέσεις, μιγνυμένη τοῖς ἀμόζουσι τῶν καταπλασμάτων· μαλάσσει δὲ καὶ βίχας τὸ ἀφέλκωμα αὐτῆς, σμηχόμενον συνεχῶς· πολιζόμενον δὲ νεφριτικοῖς καὶ τοῖς πρὸς κύστιν καὶ σπλάγχνα ἀρμόζει, κοιλίαν τε καὶ ὑστέραν ῥευματιζομένοις ἴσχιον, ἀπαλὰ δὲ σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ ἐπιτιθεῖσα, καὶ ἐαθεῖσα ἡμέρας εἴκοσι, ὠφελεῖ. καὶ

blephara. Quòd si nõ iustã vsti onẽ acceperit, denuo cremãdi. Vim adstringendi habẽt, & spiracula cutis obductu suo claudũt: cõtra oculorũ vuã & pustulas, palpebrarũ defluuia, cũ nardo effectũ prębẽt: corporis excrescẽtias cũ vino reprimũt, vlcera ad cicatricẽ perducũt. Sed inter primas vtiles ex palmis humilibus Ægyptiæ.

Palma elate. Cap. CLI.

PALMA, quam aliqui elaten aut spathan appellant, fructus palmarum adhuc florentium, inuolucrum est calyxque, quo in spissamẽta vnguentarij vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, præclusa, iactus pinguis. Vis ei adstrictoria: sistit vlcera quæ depascunt, laxatos artus committit, trita miscetur cataplasmatis & malagmatis: prodest præcordiis, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista conferentibus cataplasmatis. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat: datur bibendum congruè, renum, vesicæ, & viscerum vitiis: vuluæ ac ventris fluxiones sistit: scabiem cum resina, & cera sanat, si viginti diebus recens apponatur.

Inuolutúsque in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathę effectus pręstat, non sic vnguentis expetit'. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadé facit, quæ borassus.

Malũ punicũ. Cap. CLII.

Malum punicũ omne boni succi est, stomacho vtile, perexiguum sufficiens alimétum. Dulcia stomacho vtiliora habétur, sed aliquantulũ in eo calorem gignunt, inflationes pariũt, vnde in febri abdicantur. Acida adstringũt, æstuanti stomacho auxiliant, & multò magis contrahunt, ac vrinã cient. Ora gingiuásq; lædũt. Vinosa verò mediã sortiuntur naturã. Nuclei acinorũ acidi punici ĩ sole siccati, & obsoniis ĩsparsi, cócoctíue, fluenté aluũ stomachũq; sistũt. Cœlesti aqua madescũt, bibũturq; cõmodè sanguiné excreãtibus: ad desessus dysentericorũ, fœminarũq; fluxione vuluæ laborantiũ vtiles sunt. Expressus nucleorũ succ' coquit cũ melle, ad oris, virilitatis, et sedis vlcera, nomas, reduuias, & ea q̃ ĩ corpore extuberãt, auriũ dolores, & nariũ vitia:

καὶ ὁ περιεχόμενος δὲ ὑπ' αὐτῆς καρπὸς, ἐλάτη καλεῖται, ὑπ' ἐνίων δὲ βόρασσος· καὶ αὐτὸς στυπτικὸς ὢν τὰ αὐτὰ δρᾷ τῇ σπάθῃ, χωρὶς τῆς ἐν τοῖς μύροις εὐχρηστίας, καὶ τὸ ἐγκάρδιον δὲ τοῦ πρέμνου λευκὸν καὶ αὐτὸ πρόσφατον βιβρωσκόμενον καὶ ἀφεψόμενον, ποιεῖ πρὸς ὅσα καὶ ὁ βόρασσος.

Περὶ Ῥοιᾶς. Κεφ. ρνβ'

Ῥόα πᾶσα εὔχυμος, εὐστόμαχος, ἄτροφος· τούτων μέν τοι ἡ γλυκεῖα εὐστομαχωτέρα, θερμασίαν ποσὴν γεννῶσα περὶ στόμαχον, καὶ πνευματοῦσα, ὅθεν ἐπὶ μὲν τῶν πυρεσσόντων ἐστὶν ἄθετος· ἡ δὲ ὀξεῖα καυσουμένῳ στομάχῳ βοηθεῖ καὶ ἔστι στυπτικωτέρα καὶ οὐρητικωτέρα· ἄστομος δὲ, καὶ στυπτική. ἡ δὲ οἰνώδης μέσην ἔχει δύναμιν· τῆς δὲ ὀξείας ὁ πυρὴν ξηρανθεὶς ἐν ἡλίῳ καὶ ἐπιπαττόμενος προσοψήμασι καὶ συνεψόμενος, κοιλίαν καὶ στομάχου ῥεῦμα ἵστησιν· ἀποβραχεὶς δὲ ἐν ὀμβρίῳ ὕδατι, αἱμοπτοϊκοὺς ὠφελεῖ πινόμενος, καὶ εἰς ἐγκαθίσματα δυσεντερικῶν καὶ ῥοϊκῶν ἁρμόζει. εὔχρηστον δὲ τὸ ἀπόθλιμμα τῶν πυρήνων ἑψηθὲν καὶ μιγὲν μέλιτι. πρός τε τὰ ἐν στόματι καὶ αἰδοίῳ καὶ ἕδρᾳ ἕλκη, καὶ πτερύγια τὰ ἐν δακτύλοις, νομάς τε καὶ ὑπεροχὰς καὶ ὠταλγίας καὶ τὰ ἐν μυκτῆρσι,

καὶ

καὶ μάλιστα τῆς ὀξείας.

Περὶ Κυτίνων. Κεφ. ρνγ'.

Τὰ δὲ ἄνθη αὐτῆ ἃ καὶ κύτινοι καλοῦνται, καὶ αὐτὰ συστατικὰ καὶ ξηραντικὰ καὶ καταστατικὰ εἰσὶ, καὶ αἱμάτων κολλητικὰ, ἁρμόζοντα πρὸς ἃ καὶ ἡ ῥοά. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν ὅλων πλαδώντων καὶ ὀδόντων σειομένων διάκλυσμα, ἀνακόλλημά τε ἐντερικλικοῖς ἐν καταπλάσματι· ἱστοροῦσι δέ τινες, μὴ ὀφθαλμίαν παρ' ὅλων τὸν ἔτος τὸν καταπόντας πρεῖς κυτίνους, ὡς ὅτι ἐλαχίστους· χυλίζονται δὲ ὡς ἡ ὑποκιστίς.

Περὶ Σιδίων. Κεφ. ρνδ'.

Καὶ τὰ λέπη δὲ τῆς ῥοᾶς ἃ πύρεσ σίδια καλοῦσι συστικὴν ἔχοντα καὶ αὐτὰ δυνάμεις, πρὸς ὅσα καὶ οἱ κύτινοι ἁρμόζουσι. τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν ῥιζῶν, ἕλμινθας πλατείας πιθὲν, ἐκπυάσαι καὶ ἀποκλείσαι.

Περὶ Βαλαυσίων. Κεφ. ρνε'.

Βαλαύσιον ἔστιν αὖθος ἀγρίας ῥοιᾶς, εἶδος δὲ ὅτιν αὐτῆ πλείονα· εὑρίσκεται γὰρ καὶ λευκὸν καὶ πυῤῥὸν καὶ ῥοδόχρουν· ἔοικε δὲ κυτίνῳ ῥοιᾶς, χυλίζεται δὲ ὡς ἡ ὑποκιστίς. Δύναμιν δὲ ἔχει συστικὴν, ποιοῦσαν πρὸς ἃ καὶ ἡ ὑποκιστὶς καὶ ὁ κύτινος.

Περὶ Μυρσίνης. Κεφ. ρνς'.

Μυρσίνη ἡ ἥμερος, πρὸς μὲν τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν, ἡ μέλαινα τῆς λευκῆς ἀμοιροτέρα, καὶ ταύτης μᾶλλον

tia: præsertim acidorum.

Cytinus. Cap. CLIII.

Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinãt, quas punicum, præstãt vtilitates: humida gingiuarum vitia mobilésq; dentes decocto colluũtur, herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt: memoriæ tradũt, qui tres, quã minimos cytinos deuorauerit, nullã eo anno lippitudinem passurum: eliquatur hypocistidis exemplo.

Malicoriũ. Cap. CLIIII.

Malicoriũ, asperũ est mali punici putamẽ, qđ aliqui fidiõ appellãt. Id spissãdi vim habet, & quos cytini, præbet vsus. Decocti radicis potu latas vẽtris tineas pellit, & easdẽ euocat.

Balaustiũ. Cap. CLV.

Balaustium syluestris punici flos est, cytino similis, cuiꝰ cõplura genera reperiuntur: cãdidũ, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimit, hypocistidis modo, cui adstricto ria vis inest, eadem faciẽs, quę hypocistis, & cytinus.

Myrtus. Cap. CLVI.

MYRTVS satiua nigra vtilior est medicinæ quàm candida, & in hoc genere

multò magis mõtana: semẽ tamen imbecillius parit. Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinẽ excreãtibus, & vesicæ erosionib⁹. Succus virẽtibus baccis expressus eosdẽ effectus exhibet: stomacho vtilis, vrinã cit: pdest cõtra phalãgij morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis decoctũ capillũ tingit, ius decocti in vino vlcera in extremis mẽbris nata sanat, oculorũ inflãmationes illitum cum polline polẽtæ lenit, cõtra ægilopas illinitur, crapulam arcet præsumptum vinum, quod feruefacto aliquantũ ei⁹ semine exprimatur: aliãs enim acorem cõtraheret. Præstat idẽ seminis effectus. Vtile procidẽtiæ vuluarum in desessionibus, sedis vitiis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus: purgat furfures, vlcera capitis manantia, atq; eruptiones papularũ: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamẽta, quæ liparas vocant, vti oleum quod ex foliis eius factum est. Decoctum foliorum ad desessiones balnearũ cõuenit, & cõtra laxatos artus, & malè solide fœtes. Eo fracta ferruminationi repugnãtia vtilissimè fouẽt, vitili-

μᾶλλον ἡ ὀρίγανη, ἡ μὴν καὶ καρπὸν ἀτονώτερον ἔχει. διύραμις ὃ αὐτὸ καὶ ἡ καρπὸς συπλική. δίδοται δὲ ὁ καρπὸς χλωρός τε καὶ ξηρὸς ἐδητὸ μῦος αἱμοπτοϊκοῖς καὶ τοῖς δακνομένοις κύσιν. καὶ ὁ ἐκ τῆς χλωρᾶς καὶ ὁ μύρτων ἐκθλιβέντων χυλὸς, τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ἐυστόμαχος ὢν καὶ ὠφελιμοῖς ἁρμύζων, φαλαγγιοδήκτοις καὶ σκορπιοπλήκτοις σὺν οἴνῳ. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ τῆς καρπὸς βάπτει τρίχας ἐψηθεὶς ὃ σὺν οἴνῳ, καὶ καταπλασθὲν, τὰ ἐν ἀκρωτηρίοις ἕλκη θεραπεύει· μετὰ πάλης δὲ ἀλφίτου καταπλασθεὶς, φλεγμονὰς ταῖς ἐν ὀφθαλμοῖς παιωνορεῖ, καὶ πρὸς αἰγίλωπα δὲ ὅπλάσσεται, καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς δὲ γινόμενος οἶνος ἐκθλιβέντος τοῦ καρποῦ, καὶ ὅπι πόσει ἀφεψηθέντος, ὀξίζει γὰρ ὁ μὴ οὕτω σκευασθεὶς, ἀκρατόπαλός ἐστι πρὸς πινόμενος, πιῶν πρὸς ὅσα καὶ ὁ καρπὸς, ἐγκαθίσματά τε, μύτρας, πρὸς πώσεις, καὶ δακτυλίῳ, καὶ ῥοικαῖς ἁρμύζει, σωμάχει δὲ καὶ πίτυρα. καὶ ἀχώρας, καὶ ἕξαν θήματα, τρίχας τηρεύσας ἐπέχει· μίγνυται δὲ καὶ λιπαρεσίν, ὥς φασι καὶ τὸ ἐκ τῶν φύλλων αὐτῆς σκευαζόμενον ἔλαιον. καὶ τὸ τῶν φύλλων δὲ ἀφέψημα, εἰς τε τὰ ἐγκαθίσματα ἁρμύζει, καὶ πρὸς τὰ χαλαρὰ, καὶ ἀσυμπώρωτα ἄρθρα καὶ πρὸς ἀσυμπώρωτα κατεαγότα,

ὠφελίμως

ὠφελίμως καταντλεῖται, σμήχει δὲ καὶ ἀλφοὺς, καὶ ᾠὰ ὄντα πυορροοῦντα ἐγχυματίζεται, καὶ μελασμοὺς περὶ χῶν, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ὁ χυλὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· αὐτὰ δὲ τὰ φύλλα λεῖα καταπλαστὰ μύα ἐν ὕδατι, ἀρμόζει τοῖς καθύγροις τῶν χῶν, καὶ ῥευματιζομένοις τόποις πᾶσι καὶ κοιλιακοῖς· ἅλας ὀμφακίνῳ καὶ ῥοδίνου ἐλαίου καὶ οἴνῳ μεμιγμένου, καὶ ἕρπησι, καὶ ἐρυσιπέλασι, διδύμων τὲ φλεγμονὰς καὶ ὀπυκτίσι καὶ κονδυλώμασι· ξηρὰ δὲ λεῖα παρωνυχίαις καὶ πτερυγίοις, χρησίμως καὶ ἀπλάπετται, καὶ καθύγροις μασάλαις καὶ μυρεψίοις, καὶ ὑπὸ καρδιακῶν τέλλει τὸν ἱδρῶτας· κεκαυμένα δὲ καὶ ὠμὰ μετὰ κηρωτῆς, πυείχωτα καὶ πτερύγια καὶ παρωνυχίας ἰᾶται. χυλίζεται δὲ τὰ φύλλα παρὰ χεομένου οἴνου παλαιοῦ, ἢ ὕδατος ὀμβρείου, καὶ ἐκθλίβεται. ἢ δὲ χρῆσις αὐτῆ πρόσφατα ὄντα, ξηρανθέντα γὰρ εὐρωτιᾷ καὶ ἀδυναλεῖ.

vitiligínem emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis vlceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, cœliacísque prosunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino, ad vlcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentium foliorum farina vtiliter inspargitur paronychiis, pterygiis, & contra alarum feminúmque perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychiis, pterygiisque medentur. Exprimitur foliis succus adfuso vetere vino aut aqua cæsti, cuius recentis vsus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & vires amittit.

Περὶ Μυρτιδάνου. Κεφ. ριζ'.

Τὸ δὲ μυρτίδανον λεγόμενον ἐπίφυσίς ἐστιν ἀνώμαλος καὶ ἀχθώδης καὶ ὁμόχροος· οἱονεὶ χεῖρες περὶ τὸ τῆ μυρσίνης φρέμνον· σύφει δὲ μᾶλλον τῆ μυρσίνης. ἀποτίθεται δὲ κοπὲν καὶ μικρὸν οἴνῳ αὐστηρῷ καὶ ἀπαλθεῖν τε εἰς τροχίσκους, ὡς σκιᾷ ξηραίνετε, φρασικώτερον δὲ ὅτι τε καρπῶ καὶ τῶ φύλλου, μιγνύ-

Myrtidanum. Cap. CLVII.

Myrtidanú dicitur, adnatum inæquabile verrucosum intumescensq;, & concolor: quod perinde quasi manꝰ myrti caudicé amplectitur. Magis q̃ myrtus adstringit: tusum addito austero vino reponi, coactúq; in pastillos siccatur in vmbra: multò efficaciꝰ, & folio & semine, cera-

cerato,pesſis,inſeſsionibus,cataplaſmatis admiſtum, vbi adſtringendum aliquid eſt.

Ceraſia. Cap. CLVIII.

Ceraſia aluo vtilia ſunt,ſi viridia ſumantur:eadem ſiccata, illá ſiſtunt.Gummi quod ceraſi reſudarunt, cum vino diluto tuſſi vetuſtę medetur:colorem cõmendat, viſum exacuit, appetentiã inuitat: idem ex vino potum calculoſis auxilio eſt.

Siliquæ. Cap. CLIX.

Siliquæ recentes ſtomacho aduerſantur, aluum ſoluunt: eædem ſiccatæ ſiſtunt, ſtomachóq; vtiliores fiunt. Vrinam ciunt, ſed præcipuè,quæ vinaceis condiuntur.

Mala. Cap. CLX.

Folia, flores, & germina cũ omnis mali, tum maximè cotoneæ adſtringunt. Pomis acerbis adſtringendi vis ineſt: maturis verò longè ſecus. Ex iis verna bilem gignunt, neruos omneis lædunt, inflationes pariunt.

Cotonea mala.

Cap. CLXI.

Cotonea ſtomachovtilia,vrinã cient: verùm toſta mitiora habẽtur.Proſunt cœliacis, dyſentericis,purulenta extuſsiẽtib⁹,cholericis,præſertim cruda. Mace-

μιγνύμενον κηρωτῇ καὶ πεσσοῖς, ἐγκαθίσμασί τε καὶ καταπλάσμασι τοῖς σύφεως δεομένοις.

Περὶ Κερασίων. Κεφ. ρνη'.

Κεράσια καὶ αὐτὰ μὲν χλωρὰ λαμβανόμενα, εὐκοίλια τυγχάνει. ξηρὰ δὲ ἵστησι κοιλίαν. τὸ δὲ κόμμι τῶν κερασίων, βῆχα χρονίαν ἰᾶται λαμβανόμενον μετὰ κράματος, εὔχροιάν τε καὶ ὀξυδορκίαν καὶ ὄρεξιν ποιεῖ· ὠφελεῖ δὲ καὶ λιθιῶντας μετ' οἴνου πινόμενον.

Περὶ Κερατίων. Κεφ. ρνθ'.

Κεράτια χλωρὰ μὲν λαμβανόμενα, κακοστόμαχα τυγχάνει, καὶ κοιλίας λυτικά, ξηρανθέντα δὲ ἵστησι κοιλίαν, εὐστομαχώτερα ὄντα καὶ διουρητικά· μάλιστα δὲ τὰ ἐκ τῶν στεμφύλλων συντιθέμενα.

Περὶ Μηλέας. Κεφ. ρξ'.

Μηλέας πάσης τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη καὶ οἱ βλαστοὶ, σύφουσι. μάλιστα δὲ τῆς κυδωνίας, καὶ ὁ καρπὸς ἔνωμος μὲν στυπτικὸς καθέστηκε· πεπανθεὶς δὲ οὐχ ὁμοίως. τὰ δὲ τοῦ ἔαρος ἀκμάζοντα μῆλα χολοποιά, ἄθετα τῷ νευρώδει παντὶ ἐμπνευματοῦντα.

Περὶ Κυδωνίων μήλων.

Κεφ. ρξα'.

Τὰ δὲ κυδώνια, εὐστόμαχα, οὐρητικά, ὀπτηθέντα δὲ πρᾳονέστερα γίνεται, χρήσιμα κοιλιακοῖς καὶ τοῖς δυσεντερικοῖς καὶ ἐμπυικοῖς καὶ χολερικοῖς μάλιστα ὠμά.

καὶ τὰ

καὶ τὸ ἀπόβρεγμα δὲ αὐτῶν ἁρμόζει τοῖς στόμαχον ἢ κοιλίαν ῥεύμασι ξηροῖς ἐν ποτῷ. ὁ ὀχλὸς ὠμῶν αὐ τῶν λαμβανόμενος, ἐρεθισμοῖς ὠφελεῖ. τὸ δὲ ἀφέψημα, πρόσπλυσια θλιπτικοῖς, καὶ ὑστέρας προπίπτει. τὰ δὲ ἐν τῷ μέλιτος, καὶ αὐτὰ μὴν οὐρητικά. τὸ δὲ μέλι τὴν αὐτῶν ἀναλαμβάνει δύναμιν στρωτικὸν γὰρ καὶ συπτικὸν γίνεται. τὰ δὲ συὶ τῷ μέλιτι ἐνόμενα, ἐυστόμαχα μᾶλλον καὶ εὔστομα, ἧττον δὲ στρωτικά. τὰ δὲ ὠμὰ καταπλάσματα μίγνυται πρὸς στέγνωσιν κοιλίας, στομάχου ἀπεψίαν, καὶ πύρωσιν, μαστοὺς φλεγμαίνοντας, σκληρίας ἐκπυρώσεις, κονδυλώματα. Γίνεται δὲ καὶ οἶνος ἐξ αὐτῶν κοπτομένων καὶ ἐνθλιβομένων, πρὸς δυσεντερίαν μιγνυμένου τοῖς ις'. ἑψέσεως τοῦ χυλοῦ μέλιτος ξέστου ἑνὸς ἐπεὶ ὀξίζει· ἁρμόζει δὲ πρὸς τὰ εἰρημένα πάντα, καὶ* χρίσμα δὲ ἐξ αὐτῶ σκευάζεται τὸ καλούμενον μύλινον, ᾧ χρώμεθα ὁπόταν συπτικοῦ ἐλαίου δεώμεθα. ἐκλέγεσθαι δὲ δεῖ τὰ ἀληθινὰ, μικρὰ δὲ ὄντα καὶ πυκνὰ καὶ εὐώδη ταῦτα. τὰ δὲ λεγόμενα στρουθία καὶ μεγάλα ἧττον ὄντα εὔχρηστα. τὰ δὲ ἄνθη αὐτῶν ξηρά τε καὶ χλωρὰ καταπλάσμασιν εὔθετα, πρὸς τὰ σύριγγας χρείαν ἔχοντα, καὶ

Maceratorũ liquor commodè in stomachi aut ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ, & sedes si procidant. Cotonea quę melle condiuntur, vrinam mouent: mel autem sibi constringentem illorum vim, & inspissantem adsciscit. Quæ cũ melle coquuntur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatis adiiciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinũ ex ipsis tusis expressísque: sed quò perduret, quindecim sextariis succi vnus mellis adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia, quę dicta sunt. Fit & oleum ex iis, quod melinum vocauimus, quo vtimur quoties adstringẽti oleo est opus. Eligi oportet vera, quæ sanè sunt rotunda, parua & odorata: quæ verò Struthia dicuntur, magna quidẽ sunt, sed mins vtilia. Flos & viridis & siccus cataplasmatis imponitur: iis cóueniẽs, quę adstrictionem desiderant, inflam-

inflammationibus oculorum, reiectionibúsq; sanguinis. Cótra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur.

καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, καὶ πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς, κοιλίας τε ῥεῦσιν καὶ ἐμμηνίων φορὰν ἁρμόζει μετ᾽ οἴνου πινόμενα.

Melimela. Cap. CLXII.

Περὶ Μελιμήλων. Κεφ. ρξβʹ.

Melimela ventré molliunt, & ab eo animalia expellũt, stomacho negotiũ exhibẽt, Æstuosa. Ea multis dulcia mala vocãtur.

Τὰ δὲ μελίμηλα κοιλίαν μαλάσσει, καὶ θηρία ἐκτινάσσει κακοστόμαχα, καῦσου ποιητικά. καλεῖται δὲ ὑπό τινων γλυκύμηλα.

Epirotica mala. Cap. CLXIII.

Περὶ Ἠπειρωτικῶν μήλων. Κεφ. ρξγʹ.

Epirotica mala, quæ Latinè orbiculata dicũtur, stomacho vtilia: sistunt aluum, vrinas euocant, malis tamen cotoneis inualidiora.

Τὰ δὲ ἠπειρωτικὰ λεγόμενα, ῥωμαϊστὶ δὲ ὀρβικουλάτα, εὐστόμαχα, κοιλίας σταλτικὰ, οὔρων προκλητικὰ, ἀτονώτερα μέντοι τῶν κυδωνίων ἐστίν.

Syluestria mala. Cap. CLXIIII.

Περὶ ἀγριομήλων. Κεφ. ρξδʹ.

Syluestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hunc vsum immatura omnia opus sunt.

Τὰ δὲ ἄγρια ἔοικε τοῖς ἐαρινοῖς στύφοντα· δεῖ δὲ πρὸς τὰ στύψεως χρήζοντα, ἀωροτέροις ἅπασι χρῆσθαι.

Persica mala. Cap. CLXV.

Περὶ Περσικῶν μήλων. Κεφ. ρξεʹ.

Persica poma matura tam stomacho, quàm ventri vtilia sunt. Acerba aluum cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum è siccis alui stomachíq; fluxiones sistit.

Τὰ δὲ περσικὰ μῆλα εὐστόμαχα, εὐκοίλια τὰ πέπειρα. τὰ δὲ ἔνωμα, σταλτικὰ κοιλίας, ξηρανθέντα δὲ, καὶ στεγνωτικώτερα γίνονται. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν ξηρῶν λαμβανόμενον, στόμαχον καὶ κοιλίαν ῥευματιζομένην ἵστησιν.

Armeniaca. Cap. CLXVI.

Περὶ Αρμενιακῶν. Κεφ. ρξςʹ.

Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho vtiliora.

Τὰ δὲ μικρότερα καλούμενα δὲ ἀρμενιακὰ, ῥωμαϊστὶ δὲ πραικόκκια, εὐστομαχώτερα τῶν προειρημένων εἰσίν.

Medica

Περὶ Μη.

Περὶ Μηδικῶν. Κεφ. ρξζ'.

Τὰ δὲ μηδικὰ λεγόμενα ἢ περσικὰ ἢ καδρόμηλα, ῥωμαϊστὶ δὲ κίτρεα, πᾶσι γνώριμα· φυτὸν γάρ ὄζει καρποφορεῖ δὲ ὅλου τοῦ ἔτους ἐπαλλήλως. αὐτὸ δὲ τὸ μῆλον ὀπίμηκες, ἐρρυπδωμένον, χρώζον τῇ χρόᾳ, εὐώδες μετὰ βάρους, σπέρμα ἔχον ἀπίῳ ἐοικός. Δύναμιν δὲ ἔχει ποδὴν ἐν οἴνῳ, αὐτὸν ῥηγεῖν θανασίμοις, κοιλίαν τε ὑπάγειν, διάκλυσμα τί ὄζει πρὸς εὐωδίαν σώματος τὸ ἀφέψημα καὶ ὁ χυλὸς αὐτῶν· βιβρώσκεται δὲ μάλιστα ὑπὸ γυναικῶν πρὸς τὴν κίσσιν· φυλάττειν δὲ καὶ ἱμάτια δοκεῖ, ἄβρωτα ἐπιπθέμενα κισσώδεσι.

De Medicis malis. Ca. CLXVII.

Medica mala Perſicáue aut cedromela, quæ Latini citria vocant, nemini non cognita. Arbor ipſa omnibus anni temporibus pomifera, aliis deciduis, aliis ſubnaſcentibus. Malum oblongum eſt, rugoſum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum, ſemen habet pyri. Id in vino potum venenis reſiſtit, aluum mouet, oris ſuauitatem commẽdat, decocto eius colluto, aut ſucco: eſtur in malacia mulieribus: veſtiariis impoſitum ab eroſionis vitio veſtes vindicare exiſtimatur.

Περὶ ἀπίου. Κεφ. ρξή.

Ἀπίου δὲ πολλὰ εἴδη, πᾶσι δὲ σύφοισιν· ὅθεν εἰς τὰ ἀποκριτικὰ καταπλάσματα ἁρμόζουσι. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν ξηραντικοῦ, καὶ αὐτὰ λαμβανόμενα ὠμά, κοιλίαν ἱστᾶσι· βλάπτουσι δὲ ἐπιπόμενα τὸν νήστεις.

De Pyra. Cap. CLXVIII.

Pyrorum multa genera, quæ tamẽ omnia adſtringunt: proinde adduntur conuenienter in repellẽtia cataplaſmata. Decoctum è ſiccis & cruda ipſa aluum ſiſtunt: ieiunos eſitata lædunt.

Περὶ Ἀχράδος. Κεφ. ρξθ'.

Ἡ δὲ ἀχράς εἶδός ὄζει ἀγρίου ἀπίου, βραδέως πεπαινομένη. Δύναμιν δὲ ἔχει, συστατικωτέραν ἀπίου· ὅθεν πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει. σύφει δὲ καὶ τὰ φύλλα αὐτῆς. ἡ δὲ ἐκ τοῦ ξύλου αὐτῶν τέφρα, βοηθεῖ ἐναργῶς τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγομένοις.

De Achras. Cap. CLXIX.

ACHRAS pyraſtri genus eſt, quod tardiſsimè matureſcit. Vim pyro adſtringentiorem habet, & ad eadem conuenit: ſtringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi ſtrangulant.

φασὶ

Aiunt

Aiunt fungos, si sylvestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus. Cap. CLXX.

Mespilus, quæ à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyxacanthæ: fert pomum suaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tarde matureſcit, esu adstringit, stomacho gratum est, aluumque supprimit.

Altera mespilus. Cap. CLXXI.

Alterū mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida vocant. Arbor foliis mali, sed minoribus: pomum fert rotundum esui aptum, vmbilico latiore: quod adstringit, seróque matureſcit.

Lotus arbor. Cap. CLXXII.

Lotus arbor est vastę magnitudinis, ferēs baccā pipere maiorē, dulcē, cibis gratā, stomacho facilē. Aluū sistit baccis. Ramētorū ligni decoctū siue potu, siue infusione dysentericis ac fœminis fluxione vuluæ laborātibus, auxilio est: rufat capillos, citam aluum cohibet.

Cornus.

φασὶ δέ τινες ὅτι καὶ σωφρόνησίν τις ἀχρεάδας μύκησιν, ἀζηλοτύπους αὐτοὺς γίνεσθαι.

Περὶ Μεσπίλων. Κεφ. ρό.

Μέσπιλον τὸ δένδρον, ὃ παρ' ἐνίοις ἀρωνία καλεῖται, ἀκανθώδες ὄν, ὅμοιον τοῖς φύλλοις πυξακάνθῃ, καρπὸν φέρον μικρῷ μήλῳ ὅμοιον ἦδιν, ἔχοντα τρία ὀστάρια ἔνδοθεν, ἀφ' ὧν καὶ τρικόκκον τινὲς αὐτὸ ὀνομάζουσι. βρωθὲν πεπαυόμενον, σύφει δὲ βιβρωσκόμενον, συστολόν τε ὄντα καὶ κοιλίας στυπτικόν.

Περὶ ἑτέρου μεσπίλου. Κεφ. ρόά.

Μεσπίλη δὲ καὶ ἑτέρου ὄντος εἴδους ἐν Ἰταλίᾳ γινόμενον. ὃ ἔνιοι ἐπιμηλίδα καλοῦσιν. οἱ δὲ, σιτάνιον ὀνομάζουσι. δένδρον ὂν μήλῳ ἐμφερὲς τοῖς φύλλοις ὅτι μικρότερον. ἔχει ὃ καρπὸν καὶ τοῦτο στρογγύλον, βρώσιμον, πλατὺν ἔχοντα τὸν θυμόν, στρυφνὸν, πεπαυόμενον βρωθέν.

Περὶ Λωτοῦ. Κεφ. ροϚ.

Λωτὸς τὸ δένδρον, φυτόν ὄντα εὐμεγέθες, καρπὸν δὲ φέρ. μείζονα πυπέρεως γλυκὺν, βρώσιμον, * συστόμαχον, κοιλίας στυπτικόν. τῶν δὲ ῥιζωμάτων τοῦ ξύλου τὸ ἀφέψημα πινόμενον καὶ ἐγκαθιζόμενον, βοηθεῖ δυσεντερικοῖς καὶ γυναιξὶ ῥοϊκαῖς. ξανθίζει δὲ καὶ τρίχας, καὶ ἐπέχει γαστέρα ῥεύσεως.

Περὶ

Περὶ κρανίας. Κεφ. ργ'.

Κρανία δένδρεον ὀξὺ ἀδρὸν, καρπὸν φέρον ὡς ἐλαίας, ὀπιμήκη, χλωρὸν τὸ πρῶτον, πεπαινόμενον δὲ ξανθὸν, ἢ κυανοειδῆ, εὐώδιμον, σύφοντα, ἁρμόζοντα πρὸς κοιλίας ῥῦσιν καὶ δυσεντερείας, σωτηριόμενον καὶ εἰς ἕψημα, καὶ εἰς βρῶσιν, καὶ ἁλυσιτελεῖται ὡς ἐλαία. ὁ δὲ τῶν χλωρῶν φύλλων ἰχὼς καυμένον, ἁρμόζει πρὸς λειχμῶας καταχριόμενος.

Περὶ Οὔων. Κεφ. ρδ'.

Οὖα τὰ μαλίζοντα καὶ μὴ πω πέπερα τμηθέντα καὶ ξηρανθέντα ἐν ἡλίῳ, σαλπικὰ γίνεται κοιλίας εὐπρόσφορα, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν δὲ ἄλευρον ἀλεσθέντων αὐτὰ ἀφίστων λαμβανόμενον, καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν πινόμενον, τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

Περὶ Κοκκυμηλέας. Κεφ. ρε'.

Κοκκυμηλέα δένδρον ὀξὺ γνώριμον, οὗ ὁ καρπὸς εὐώδιμος, κακοστόμαχος, κοιλίας μαλακτικός. τῶν δὲ συριακῶν καὶ μάλιστα τῶν ἐν δαμασκῷ γινομένων ὁ καρπὸς ξηρανθεὶς, εὐστόμαχος καὶ κοιλίας σαλπικός. τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν φύλλων ἐν οἴνῳ σκωλαζόμενον καὶ ἀναγαργαιζόμενον, κυνίδα καὶ ὕλα καὶ παρείσφρησιν ῥευματιζόμενα σέλινα. τὸ αὐτὸ δὲ παρέχει καὶ ὁ τῶν ἀγρικοκκυμήλων καρ-

Cornus. Cap. CLXXIII.

Cornus dura arbor eſt, baccas ferés oliuæ modo oblongas, quę primú virent, dein per maturitaté rubeſcunt, aut cerę colorem repræſentant. In cibo adſtringút, profluuio alui atq; dyſenteriæ ſalutares, ſiue in edulio, ſiue in defruto exhibeãtur. Muria, vt oliuæ, condiũtur. Sanies, quam virétia folia torrendo reſudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

Sorba. CAp. CLXXIIII.

Sorba colorem luteum referentia prius, quàm matureſcant, diſſecta & ſole ſiccata manduntur, aut aluum ſiſtant. Eadem eſt functio molitorum farinæ, ſi polentæ loco ſumatur: quod & decoctum eorum in potu præſtat.

Prunus. Cap. CLXXV.

Prunus arbor eſt nota, cuius pomum eſtur: ſed ſtomachum male habet, aluum mollit. Syriaca pruna, & præcipuè, quæ Damaſci gignuntur, exiccata ſtomacho vtilia ſunt, aluum adſtringunt. Folia pruni in vino decocta collutione, & gargarizatu vuam, gingiuas, & tonſillas fluxione laboranteis reprimunt. Præſtant idem ſyluestriũ

pruno

prunorum baccæ, poſt matu-
ritatem exiccatæ: cum ſapa ve-
rò decoctę, ſtomacho vtiliores
redduntur, aluúmq; magis ad-
ſtringunt. Gummi prunorũ ag
glutinat, potũ in vino calculos
cóminuit: ex aceto quoq; illi-
tum, lichenas infantiũ ſanat.

Arbutus. Cap. CLXXVI.

Arbut⁹ ſiue vnedo arbor eſt
cotoneæ malo non diſſimilis,
tenui folio: cuius fructus pruni
manitudinem implet, nullo in-
tus nucleo: huic menæcylo co
gnomẽ eſt: maturus aut flauet,
aut rubeſcit, in eſu aceroſus,
ſtomacho aduerſatur, capitiſq;
dolorem mouet.

Amygdalæ. Ca. CLXXVII.

Amyhdalæ amaræ radicum
tritarum decoctum vitia cutis
in facie corrigit: illitę nuces idé
munus præſtant, menſes admo
tæ ciunt, capitis dolori auxiliá-
tur, illitæ fronti aut tempori-
bus cum aceto vel roſaceo: epi-
pinyctidas ſanant ex vino, ité
putreſcentia vlcera, & quæ ſer
punt, & morſus canum cum
melle: earum autem eſu dolo-
res finiuntur, aluum emolliunt,
ſomnum faciunt, vrinam ciét,
cótra ſanguinis reiectiones cũ
amylo aſſumuntur, renũ vitiis,
& pulmonũ inflãmationibus

ex

καρπὸς, πέπειρος ξηραινθείς· ἐ-
φθισθεὶς δὲ μετὰ ἐφθήματος, ὑσ-
τερομαχοῦσι καὶ σαλπικοῦσι
κοιλίας γίνεται. τὸ δὲ κόμμι τῆς
κοκκυμηλέας, ὃ δὴ κολλητικὸν, λί-
θων θριπτικὸν πινόμενον σὺν οἴνῳ·
σὺν ὄξει δὲ ὀπτηχιόμενον, λειχῆ-
νας τοὺς ἐπὶ παιδίων θεραπεύει.

Περὶ Κομάρου. Κεφ. ρος'.

Κόμαρος δένδρον ὅ δή, παρόμοιον κυδωνίᾳ, λεπτόφυλλον, καρ-
πὸν ἔχον ὡς κοκκυμήλου μέγε-
θος, ἀπύρηνον· μεμάκυλα κα-
λούμενον· πεπανθέντα δὲ ὑπό-
κιρρον ἢ ἐρυθρὸν, ἐδώδιμον ἀ-
χρῶδες, χολοτόμαχον δὲ καὶ
κεφαλαλγές.

Περὶ Ἀμυγδαλῆς. Κεφ. ροζ'.

Ἀμυγδαλέας πικρᾶς ἡ ῥίζα
ἀφεφθεῖσα λεῖα, ἐφίλης τοὺς ἐν
προσώπῳ ἀπυκαθαίρει καὶ αὐτὰ ἅ
τὰ ἀμύγδαλα καταπλασθέντα,
τὰ αὐτὰ πιεῖ, προσιδέμενα ἅ ἄ-
γει καταμηνία, καὶ κεφαλαλγίαις
βοηθεῖ καταπλασθέντα μετώπῳ
ἢ κροτάφοις μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου,
καὶ πρὸς ὀφθαλμίας σὺν οἴνῳ·
πρὸς δὲ σπασθόνας καὶ ἕρπητας καὶ
κυτόδηκτα, σὺν μέλιτι ἐδώδιμα
δέ ἐστιν ἀνώδυνα, κοιλίας μαλα-
κτικὰ, ὑπνωτικὰ, οὐρητικὰ, καὶ
πρὸς αἵματος ἀναγωγὰ μετὰ
ἀμύλου· λαμβανόμενα· πρὸς ἅ
νεφριτικοῖς καὶ πλευμονικοῖς,

σὺν

σὺν ὕδατι πινόμενα ἢ ἐκλειχόμενα σὺν ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ· δυσουρικοῖς δὲ καὶ λιθιῶσι, σὺν γλυκεῖ βοηθεῖ, καὶ ἡπατικοῖς καὶ βηξὶ καὶ κώλου ἐμπνευματώσεσι, σὺν μέλιτι καὶ γάλακτι ἐκλειχόμενα, καρύου ποντικοῦ τὸ μέγεθος. ἔστι δὲ καὶ ἀμέθυστα περισλαμβανόμενα ὅσον ἑ. ἢ ζ. κτείνει δὲ καὶ δηλώπεκας βρωθέντα σὺν πιν. τὸ δὲ κόμμι αὐτῆς σύφει καὶ διαιρεῖ, καὶ βοηθεῖ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν πινόμενον· σὺν ὄξει δὲ ὀπιχριόμενα, λειχῆνας ὀπισθιαίους αἴρει· ἴαται καὶ βῆχα χρόνιον μετὰ κράματος πεθέν, λιθιῶντας δὲ ὠφελεῖ σὺν γλυκεῖ πινόμενον. ἡ δὲ γλυκεῖα καὶ ἐδώδιμος ἀμυγδαλὴ, καταπολὺ ἧσσον ὀδύνην ὡς πρὸς ἐνεργείαν τῆς πικρᾶς. καὶ αὐτὴ δὲ λεπτωτικὴ, οὐρητικὴ, βρωθέντα δὲ σὺν τῷ λέπει τὰ ἀμύγδαλα χλωρὰ, σομάχου πλάδον ἀποκαθαίρει.

ex aqua in potu aut eclegmate cũ resina terebinthina dantur: calculosis difficiliq; vrinæ in passo auxiliantur, & illinctu cum melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanæ magnitudine: quinis septenisve præsumptis ebrietatẽ non sentiunt potores: vulpes si cum quadam esca eas vorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reiicientibus sanguinẽ, potum auxilio est: impetigines quæ summũ corpus occuparunt illitum cũ aceto tollit: tussi vetustæ cũ diluto vino potũ medetur: calculosis cũ passo bibere prodest. E nucib⁹ græcis, dulces cibo idoneæ, sed multò minus valẽt in remediis, q̃ amarę: attamẽ extenuant, vrinã ciunt, recetiũ cum suo putamine, humida stomachi vitia emẽdant.

Περὶ Πιστακίων. Κεφ. ροή.

Πιστάκια τὰ μὲν γινόμενα ἐν συρίᾳ, ὅμοια τροβίλοις, εὐστόμαχα, ἐδιόμενα δὲ καὶ πινόμενα ἐν οἴνῳ λεῖα, ῥήγνυσι δύκτιος βοηθεῖ.

Pistacia. Cap. CLXXVIII.

Pistacia, quę cõstat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica: trita cũ vino cõtra serpẽtium ictus prosunt, siue edantur, siue bibãtur.

Περὶ Καρύων βασιλικῶν.

Κεφ. ροβ'.

Καρύα βασιλικὰ, ἃ ἔνιοι περσικὰ καλοῦσι, ἐδιόμενα, δύσπεπτα, κακοστόμαχα, χολοποιὰ, κεφαλαλγῆ, βάρεσιν ἐναντία. χρή-

Nux iuglans. Ca. CLXXIX.

Nuces iuglãdes, quas nõnulli Persicas vocant, sunt difficiles cõcoctu, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorẽ inferẽtes, i tussien-

tusientibus inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo aptę. Cum ruta verò & ficis præsumptæ, & à summo cibo, venenis resistunt: nec minus si à veneni hausti comedantur: largius esitatæ tineas latas pellunt, illinuntur mammarum inflammationi, abscesibus, luxatisque, cum mellis exiguo, & ruta: cum cepa autem, sale & melle, canis hominisque morsui proficiunt: tormina, cum calyce suo perustæ, & vmbilico admotæ, sedant. Putamen combustum tritúmque in oleo, & vino, infantium capite perunctо, nutrit capillum, alopecias replet. Sistúnt mẽses nuclei vsti, si triti ex vino admoueantur: iidem è veteribus, illiti carbunculis, gangrænis, & ægilopiis medentur: alopeciis commanducati, & impositi præsenti sunt remedio. Nucibus tusis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, vtpote suauiores: itaque allio mistæ eximunt acrimoniam. Liuores in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanæ.

Cap. CLXXX.

Nuces auellanæ, quas & leptocarya vocant, stomacho infestæ

χρήσιμα ὄβιβρωσκόμενα πρὸς ἐμέτους νήστ· καὶ θανασίμων φαρμάκων ἐστὶν αὐτοφάρμακα, * σεσηρωμένα καὶ ὀπηρωμένα, σὺν ἰσχάσι καὶ πηγανῷ· πλείονα ὄβρωθέντα, πλατεῖαν φλεγμονὴν ἐπιτείνασι, ἐπιπλάσει ὄξους καὶ μαστοῖς φλεγμαίνουσι, καὶ ἀποστήμασι καὶ σφύμασι σὺν ὀλίγῳ μέλιτι καὶ πηγανῷ· μύρῳ ὄξους καὶ ἁλὸς καὶ μέλιτος, πρὸς κυνόδηκτα καὶ ἀνθρωποδήκτα πυριᾶ· πυρωθέντα ὄξει σὺν τῷ κεκυφότι, καὶ ἐπιτεθέντα τῷ ὀμφαλῷ, σφόδρα παύει. τὸ δὲ λέπυρον καῖον καὶ τεφρωθὲν ἐν οἴνῳ καὶ ᾠδίῳ, παιδίοις ὀπιχριόν, καλλίστειχρόν ὄζει, καὶ ἀλωπεκίας διασύει. καὶ ἔμπλαστα ἴσησι τὸ ἐντὸς αὐτῆς λέπος καῖον καὶ σὺν οἴνῳ σεσηπότι μέλιτι. τῶν δὲ παλαιῶν καρύων τὰ ἐντὸς καταπλασθέντα, γαγγραίνας καὶ αἴθρας καὶ αἰγίλωπας καὶ ἀλωπεκίας μασησθέντα καὶ ὀπιτεθέντα ἰᾶται σωτόμως. * γίνεται δὲ καὶ ἔλαιον ἐξ αὐτῶν κοπτομένων, καὶ ἐκθλιβομένων. τὰ δὲ χλωρὰ, ἧττον κακοστόμαχα, γλυκύτερα ὄντα· διὸ καὶ τοῖς στομάχοις μίγνυται πρὸς τὸ τὴν δεινότητα σφειρᾶν. αἴρει δὲ καὶ πελιώματα καταπλασθέντα

Περὶ Καρύων ποντικῶν.

Κεφ. ρπ΄.

Τὰ δὲ ποντικὰ ἃ ἔνιοι λεπτοκάρυα καλοῦσιν, ἔστι κακοστόμα-

χα,

ξα, καὶ αὐτὰ δὲ λεῖα σὺν μελικράτῳ πινόμενα, βῆχα παλαιὰν ἰᾶται· φρυκτὰ δὲ ἐσθιόμενα σὺν πεπέρει ὀλίγῳ κατάρρουν πεπαίνει· ὅλα δὲ καέντα λεῖα μετὰ ἀξουγγίου ἢ στέατος ἀρκείου, ἀλωπεκίας ἐπιχρισθέντα δασύνει. φασὶ δὲ ἔνιοι ὅτι μετὰ ἐλαίου τὰ κελύφη κεκαυμένα καὶ λειοτριβηθέντα, γλαυκοφθάλμων παιδίων μελαίνει τὰς κόρας ἐπιβρεχομένου τοῦ βρέγματος.

Περὶ Μορέας. Κεφ. ρπά.

Μορέα ἡ συκαμινέα, δένδρον ἐστὶ γνώριμον, ἧς ὁ καρπὸς λυτικὸς κοιλίας, εὔφθαρτος, κακοστόμαχος. καὶ ὁ ἐξ* αὐτῆς δὲ χυλὸς τὰ αὐτὰ δρᾷ· ἑψηθεὶς δὲ ἐν χαλκώματι ἢ ἡλιασθεὶς, στυπτικώτερος γίνεται. μιγέντος δὲ αὐτῷ ὀλίγου μέλιτος, ποιεῖ πρὸς ῥεύματα καὶ νομὰς καὶ παρίσθμια φλεγμαίνοντα. ἐπιτείνεται δὲ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ παραμιγείσης στυπτηρίας σχιστῆς καὶ κηκίδος καὶ σμύρνης καὶ κρόκου· ἔτι δὲ καὶ μυρίκης καρποῦ καὶ ἴρεως, καὶ λιβανωτοῦ. τὰ δὲ ἄωρα μόρα ξηρὰ κοπέντα, ἀντὶ ῥοὸς τοῖς ὄψοις μίγνυται, καὶ κοιλιακοῖς ὀνίνησιν. ὁ τῆς ῥίζης δὲ φλοιὸς συνεψηθεὶς ὕδατι καὶ ποθεὶς κοιλίαν λύει, καὶ πλατεῖαν ἕλμινθα ἐκτινάσσει, καὶ τοῖς ἀκόνιτον πεπωκόσι βοηθεῖ. τὰ δὲ φύλλα λεῖα σὺν ἐλαίῳ καταπλασθέντα, πυρίκαυτα ἰᾶται,

ἑψη-

ſtæ ſunt: ipſæ tamen tritæ, & in aqua mulſa potæ, tuſsi veteri medentur: toſtæ & cũ exiguo piperis potę deſtillationẽ concoquunt, crematarũ cinis cum axungia aut adipe vrſi perunctus alopeciis capillum reddit: Aiunt nonnulli vſta earũ putamina, & in cineris ſpeciem redacta, cum oleo, cæſiorũ oculorũ pupillas infantibus denigrare, perfuſo ſincipite.

Morus. Cap. CLXXXI.

Morus arbor nota eſt; cuius fructus aluũ ſoluit, ſtomacho inutilis eſt, & facile corruptionẽ ſentit. Hoc idẽ præſtat mori ſuccus: decoctus autẽ æreo vaſe atque inſolatus, adſtringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonſillarum inflãmationes, addito mellis exiguo. Sed inoleſcit vis eius, adiecto ſciſsili alumine, galla, croco, & myrra: item myricæ ſemine, iri, & thure. Immatura mori poma ſiccãtur, tuſáq; acinorũ rhois vice obſoniis miſcẽtur, vt cœliacos iuuẽt. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum reſoluit, latas ventris tineas excutit, his quoque auxiliatur qui aconitum hauſerunt. Folia trita ex aceto illita, ambuſtis igni medentur,

tin-

tinguntque capillũ, vitiũ & fici nigræ frõdibus simul coctis in aqua cœlesti. Succus foliorum cyathi mẽsura potus cõtra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorũ iure dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie cõcretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

Sycomorus. Ca. CLXXXII.

Sycomorũ aliqui etiã sycaminũ, id est, morũ vocãt, cuius fructꝰ sycomorũ etiã propter inefficacem gustũ appellatur. Arbor est magna, fico similis, frõdosa, multo lacte abũdãs: foliis mori, pomũ ter aut quater anno fert, nõ ramis vt ficus, sed caudice ipso, caprifico nõ dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribꝰ: quod nõ matura scit, nisi vngue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimũ in Caria, Rhodo, Iocisq; nõ multi tritici feracibus: vbi prouẽtu fœcundo restibilisq; iuuamentum adfert, cũ annonæ caritas premit. Pomum aluo vtile est, sed per quàm exilem præbet alimoniã. Stomacho aduersatur.

Succus

ἐνδιδόντα δὲ ἐν ὀμβρίῳ ὕδατι, ζωὴ ἀμπέλου καὶ συκῆς μελαίνης φύλλοις, βάπτει τείχας. ὁ δὲ χυλὸς τῶν φύλλων, φθαγγιοδύκτοις ἀρήγει, πυθεὶς κυάθου πλῆθος. τ̃ φλοιοῦ δὲ καὶ τ̃ φύλλων τὸ ἀπόζεμα, διάκλυσμα ἐνδιτὸν ὄδονταλγίας. ὀπίζεται δὲ καὶ τῶν πυρεμιτῶν τ̃ ῥίζης πιεορυχθείσης καὶ ἐκποπείσης, εὐείσιτεῖ γὰρ τῇ ὑστεραίᾳ ὀπίπαρόν τις ὡς πρὸς τὸ ὀδοντάλγίας ποιεῖ· καὶ φύματα διαφορεῖ καὶ κοιλίαν καθαίρει.

Περὶ Συκομόρου. Κεφ. ρπϛ'.

Συκόμορον, ἔνιοι δὲ καὶ τοῦτο συκάμινον λέγουσι, καλεῖται δὲ καὶ ὁ ἀπ' αὐτῆς καρπὸς συκόμορον, διὰ τὸ ἄτονον τῆς γεύσεως. δένδρον δὲ ὄζει μέγα, ὅμοιον τῇ συκῇ, πολύκομον σφόδρα, τοῖς φύλλοις ἐοικὸς μορέᾳ, φέρει δὲ καρπὸν τρὶς καὶ τετράκις τοῦ ἔτους, οὐκ ἀπὸ τῶν ἀκρεμόνων ὡς ἐπὶ τῆς συκῆς, ἀπὸ δὲ τοῦ στελέχους ὅμοιον ἐερινεῷ. γλυκύτερον ὀλιγίστου, οὐκ ἔχοντα δὲ κεγχραμίδας· μὴ δὲ πεπαυμένον δύκα τοῦ ἐπικνισθῆναι ὄνυχι ἢ σιδήρῳ. φύεται δὲ πλεῖστον ἐν καρίᾳ καὶ ῥόδῳ, καὶ ἐν τοῖς οὐ πολυπύρεσι τόποις· βοηθεῖ δὲ ἐν ταῖς στομαχίαις, διὰ τὸ δύσπεπτον εἶναι τὸ καρποῦ. ἔστι δὲ εὐκοίλιος ὁ καρπὸς, ἄτροφος, κακοστόμαχος.

ὁπί-

ὀπίζεται ἢ τὸ δένδρον πρὶν καρποφορῆσαι νεαρὸν, τῷ φλοιῷ ἐξεμπελῆς λίθῳ θλασθὲν βαθύτερον· θλασθεὶς, οὐδὲν ἀνίησι. συλλέγεται δὲ πόγωνα ἢ ἐλάτινον τὸ δάκρυον, καὶ ξηρανθὲν καὶ ἀναπλασθὲν ἐν ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ, ἀποτίθεται. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς μαλακτικὴν, κολλητικὴν τραυμάτων, διαφορητικὴν τῶν δυσπέπτων, πίνεται ἢ καὶ συγχρίεται πρὸς ἑρπετῶν δήγματα καὶ ἐσκιρρωμένοις παλλῶσι, στομάχου τε δήγματα καὶ φυσικὰς. ταχέως δὲ πεπονίζεται ὁ ὀπός.

Succus primo vere tenera arbore, anteq; fructũ ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquammato: si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluet. Spógia aut vellere lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera cõglutinat, discutit collectiones coctioni repugnátes, bibitur etiã aut illinitur cõtra serpentiũ morsus, duratos lienes, stomachi dolores & pfrictiones. Celerrimè teredinẽ sentit.

Περὶ Σύκου ἐν κύπρῳ.

Κεφ. ρπγ.

Γίνεται δὲ καὶ ἐν κύπρῳ εἶδος διαφέρον, πλατέα γὰρ οὖσα, συκαμίνῳ τὰ φύλλα ἔοικε, τὸν δὲ καρπὸν κρ' τὸ μέγεθος κοκκυμήλων, καὶ γλυκύτερον, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ὅμοια τοῖς προειρημένοις.

Ficus Cyprea.

Cap. CLXXXIII.

Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita tamẽ est foliis sycomori, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Περὶ Σύκων. Κεφ. ρπδ'.

Σῦκα πέπεψα τὰ ἁπαλὰ, κακοστόμαχα, κοιλίας λυτικά· ῥᾳδίως ἢ ἐξ αὐτῶν ῥευματισμὸς ἴσταται. ἐξανθήματα καὶ ἱδρῶτα προκλητικὰ ἄδηλα ἢ καὶ σβεστικὰ δίψας. τὰ δὲ ξηρὰ πρόφιμα, θερμαντικὰ, διαλυτικώτερα, εὐκοίλια, ἄδετα ἢ ῥευματισμοῖς στομάχου καὶ κοιλίας· βέλτιον δὲ καὶ αἰδοίοις καὶ κύστει καὶ νεφροῖς σύδετα, καὶ τοῖς ἐν μακρογονίαις κακοχρόοις καὶ

Fici. Cap. CLXXXIIII.

Fici maturę recentes stomachum lædunt, aluũ soluunt: sed facile cõtracta ab eis fluxio sistitur. sudoré euocant papulásque, sitim sedant, caloré restinguunt. Siccis natura excalfaciendi, vires alunt, sed sitim magis stimulant, aluo vtiles, rheumatismis ventris & stomachi contraria: gutturi autem, arteriæ, renibus, vesicæ, & iis quos

lóga valetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissimæ: feruefactæ cũ hyssopo & potæ, thoracem purgãt: tussi veteri, diuturnísq; pulmonũ vitiis conueniunt, aluum molliunt tusæ cũ nitro & cnico, dein manducatæ. Decoctum arteriæ & tonsillarũ inflãmationib⁹ gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatis miscétur, & in muliebres fotus cum fœnogræco & ptisana. Cęterum cum ruta coctę torminibus infundũtur. Coctæ illitęque duritias discutiunt, parotidas & furunculos emolliunt, panos ad maturationem perducũt, maximè nitro, iri aut calce addita. Crudæ si cũ antedictis tundantur, eadem efficiunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atramento sutorio, deploratis ferè tibiarum fluxionibus, & cacoëthicis vlceribus medentur: quin & cum vino decoctę addito absinthio & hordeacea farina, vtilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant perniones, prurigines, sonitusque si crudæ terantur, & sinapi liquoréq; aliquo exceptæ auribus instillentur. Tã syluestris, quàm satiuæ fici

lacteus

καὶ ἀσθματικοῖς καὶ ἐπιληπτικοῖς καὶ ὑδρωπικοῖς· ἀνακαθαίρει δὲ καὶ τὰ ἐν θώρακι ἀποζεσθέντα σὺν ὑσσώπῳ καὶ ποθέντα· ἁρμόζει δὲ καὶ παλαιοῖς βηξὶ, καὶ τοῖς περὶ πνεύμονα χρονίοις πάθεσι, κοιλίαν τε μαλάσσει κοπέντα μετὰ νίτρου καὶ κνήκου ἐσθιόμενα. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν, τοὺς περὶ ἀρτηρίαν καὶ παρίσθμια φλεγμονὰς, ἁρμόζει εἰς ἀναγαργάρισμα, καὶ εἰς τὰς ὠμηλύσεις δὲ μίγνυται, καὶ εἰς γυναικείας πυρίας μετὰ τήλεως ἢ πτισάνης. σὺν πηγάνῳ δὲ ἀφεψημένα, στρόφων ἐστὶν ἔγκλυσμα. καταπλαττόμενα δὲ ἑφθὰ λεῖα, διαφορεῖ σκληρίας, παρωτίδας. δοθιῆνας μαλάσσει, φύγεθλα πεπαίνει, καὶ μᾶλλον σὺν ἴρει δὴ ἢ νίτρῳ ἢ ἀσβέστῳ. καὶ ὠμὰ δὲ κοπέντα σὺν οἷς εἴρηται, τὰ αὐτὰ δρᾷ· σὺν σιδίῳ δὲ ῥοιᾶς, πτερύγια ἀνακαθαίρει· μετὰ χαλκάνθου δὲ τὰ ἐν κνήμαις ῥευματικὰ, δυσαλθῆ καὶ κακοήθη ἰᾶται. ἑψηθέντα δὲ ἐν οἴνῳ καὶ μιγέντα ἀψινθίῳ καὶ κριθίνῳ ἀλεύρῳ, ὑδρωπικοῖς ὠφελεῖ καταπλασθέντα· κεκαυμένα δὲ μιγέντα κηρωτῇ, χιμέτλας ἰᾶται, λεῖα δὲ ὠμὰ σὺν νάπυϊ ὑγρῷ ἀναληφθέντα καὶ ἐντεθέντα ἐν ὠσὶν, ἤχους καὶ κνισμοὺς θεραπεύει. Ὁ δὲ ὀπὸς τῆς ἀγρίας καὶ τῆς ἡμέρου συκῆς,

στυπτι-

πικτικός ὅτι γάλακτος ὥσαυτως ἡ πτύα, λύει· ἢ καὶ τὸ πεπηγὸς ὡς αὐτῶ τὸ ὄξος· ἑλκτικόν τε σωμάτων καὶ ἀναστομωτικὸν, κοιλίας τε λυτικὸν, καὶ ὑστέρας ἀναχαλαστικὸν, μετὰ ἀμυγδάλου λείου πινόμενος, καὶ ἐμπλαττόμενον ἀγωγὸς ἐφεστεθεὶς σὺν ὠοῦ λευκῶ, ἢ κηρῶ τυρρίνικῶ· ποδαγρικοῖς τε καταπλάσμασι χρήσιμος μετὰ τηλίου ἀλεύρου καὶ ὄξους· σμήχει δὲ λέπρας καὶ λειχῆνας, ἐφήλεις, ἀλφοὺς, ψώρας, ἀλφῶρας σὺν ἀλφίτῳ· καὶ σκορπιοπλήκτοις, κυνοδήκτοις βοηθεῖ· καὶ ὀδοντιάσεις ὠφελεῖ ἐείω ἁλισθεὶς, καὶ εἰς τὸ βρῶμα ἐντιθέμενος. καὶ μυρμηκίαν αἴρει, στὰς ἐπιπλασθεὶς τῆς ἐν κύκλῳ σαρκός.

Περὶ Ἀγρίας συκῆς. Κεφ. ρπέ.

Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὁ χυλὸς ποιεῖ τῶν ἀπὸ τῆς ἀγρίας συκῆς ἁπαλῶν κλάδων, ἡνίκα αὖ ἔγγυοι ὦσι, μήπω τῶ ὀφθαλμοῦ βεβλασηκότος, κοπρόμυοι δ' ἐκθλίβονται, καὶ ὁ χυλὸς ξηραινόμενος ἐν σκιᾷ ἀποτίθεται. λαμβάνεται δὲ καὶ εἰς ὑγροτικὰς δυνάμεις ὅ, τε ὀπὸς καὶ ὁ χυλός. αἱ δὲ κράδαι βοείοις κρέασι καθεψόμεναι, εὐεψέστατα τῶν τοιούτων. καὶ τὸ γάλα δὲ λυτικώτερον ἐν τῇ ἑψόσει κινούμενον, αὐτὸ ἑαυτῆς ἀυτῶς παρασκευάζουσιν.

Περὶ Ὀλυ-

lacteus succus coaguli modo lac contrahit, cõcretúmq; dissoluit, vt acetũ: exulcerat corpora, meatus aperit, soluit aluum, vuluã recludit cum detrita nuce græca potus, menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorũ cataplasmatis cum farina fœnigræci & aceto vtilis: lepras, lichenas, vitiligines, vitia cutis in facie, psoras, vlcera in capite manantia, cum polenta expurgat. instillatus plagę, percussis à scorpione, venenatorũ ictibus & rabiosi canis morsibus auxiliatur: prodest dẽtium dolori lana exceptus, & cauis eorũ additus: verrucarũ informicationes tollit cũ adipe, circumlita in ambitu carne.

Ficus syluestris. Ca. CLXXXV.

Hoc idem præstat succus è teneris ramis syluestris fici, qui lacte prẽgnantes, silente adhuc oculo, tusi exprimuntur, & siccatus in vmbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratoriis medicamẽtis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spathæ loco moueatur.

Grosi. Cap. CLXXXVI.

Grosi, quæ erinei nonnullis vocantur, coctæ illitæ strumas nodósq; omneis emollíut: crudæ formicas, verrucas & thymos, nitro farináq; additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sale & aceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanãt: iis ficosæ extuberationes, & genarum scabritiæ perfricantur. Nigræ ficus foliis cauliculísque candidæ vitiligines perunguntur, faciunt ad canum morsus, & vlcera quæ ceria, id est fauos, vocant. Grosi cum sylvestris papaueris foliis ossa extrahunt, furunculos cum cera discutiunt, cõtra muris aranei morsus, & scolopendræ venena, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur.

Lixiuium ficus.

Cap. CLXXXVII.

Fit ex cinere fic⁹ tã sylvestris q̃ satiuæ lixiuiũ, crematis ramorũ cauliculis: quod subinde macerari op⁹ est & inueterascere, siquidé inter caustica intelligit. Gãgrenis ꝓdest: náq; expurgat & cõsumit, quę excrescũt: eóq; sic vtendũ est: Spongia assiduè hoc lixiuio imbuta superponitur. Interdum dysentericis, &

Περὶ Ολωΐδων. Κεφ. ρπϛ'.

Οἱ δὲ ὄλωδοι, ὑπὸ δέ τινων ἐρινεοὶ καλούμενοι, ἐφθοὶ καὶ ἀσπλαθέντες, πᾶσαν συρφόλν καὶ χοιράδας ἐκμαλάσσουσιν, ὁμοίως δὲ μυρμηκίας καὶ θύμους, σὺν νίτρῳ καταπλασθέντες καὶ ἀλεύρῳ αἴρουσι. καὶ τὰ φύλλα δὲ τὰ αὐτὰ σύνανται, σὺν ὄξει δὲ καὶ ἁλῒ καταπλασθέντες, ἀχῶρας, πίτυρα καὶ ὀπωπικτίδας ἰῶνται· παραιτεῖται δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ συκάμινα καὶ πραχέα τῶν βλεφάρων. καὶ λεῦκαι δὲ καταπλάσσουσι· τοῖς δὲ μελαίνης συκῆς φύλλοις ἢ τοῖς κλάδοις, πιεῖ καὶ πρὸς τὰ κυνόδηκτα σὺν μέλιτι, καὶ πρὸς τὰ κνεῖα. ἀνάλοισι δὲ οἱ ὄλωδοι καὶ ὀσᾶ, σὺν μίκανος ἀγρίας φύλλοις, δοθιῶσί τε σὺν κηρῷ δημόσιοι· σὺν ὀξέϊ δὲ καὶ οἴνῳ καταπλασθέντες, πρὸς μυγαλῆς δήγματα καὶ σκολοπένδρας ἀρμόζουσι.

Περὶ Κονίας τῆς συκῆς.

Κεφ. ρπζ'.

Γίνεται δὲ καὶ κονία ἀγρίας συκῆς καὶ ἡμέρας καίντων τῶν κλάδων ἐν τέφρᾳ· πολύβροχον δὲ αὐτὴν δεῖ ποιεῖ καὶ παλαιὸν ἀρμόζει δὲ καὶ πρὸς τὰ καυστικὰ, καὶ γαγγραινώδεα· ἀναπαθαίρει γὰρ καὶ ἀναλίσκει τὰ περιττά· χρῆσθαι δὲ αὐτῇ δεῖ· σπόγγον βρέχοντας συνεχῶς καὶ ἐπιτιθέντας. ἐφ' ὧν δὲ καὶ ἐγκλύζουσιν ὡς ἐπὶ δυσεντιρικῶν καὶ πα-

καὶ παλαιῶν ῥευμάτων, καὶ κόλπων ὑπογόμων καὶ μεγάλων· καθαίρει γὰρ καὶ κολλᾷ καὶ σαρκοῖ, καὶ συμφύει ἐοικότως πῖσι ἐναίμοις, καὶ ποτίζεται δὲ πρὸς αἵματος ἐκῤῥόμβωσιν καὶ πλώματα, ῥήγματα, ἀπάσματα, σὺν ὕδατος κυάθῳ πρόσφατος δυλισμένη· καὶ ἐλαίου μικροῦ ὀλίγου, κοιλιακοῖς τε καὶ δυσεντερικοῖς, καθ' ἑαυτὴν κυάθου πλῆθος βοηθεῖ δεδομένη· καὶ τοῖς νευρικοῖς δὲ καὶ ἀπάσμασι, σύγχισμα ἀμύδριον σὺν ἐλαίῳ, ἐρρῶτας κινοῦσα. καὶ πρὸς γύψου πόσιν καὶ φαλαγγίων δήγματα πίνεται· παρέχουσι δὲ τὰ αὐτὰ καὶ αἱ λοιπαὶ κονίαι, μάλιστα δὲ ἡ σφυΐνη· συμπικραὶ δὲ εἰσι πᾶσαι.

Περὶ Περσέας. Κεφ. ρπέ.

Περσέα δένδρεόν ἐστιν ἐναίμυπον, καρπὸν φέρον ἐδώδιμον, εὐστόμαχον· ἐφ' οὗ καὶ τὰ λεγόμενα χρανοκόλαπτα φαλάγγια εὑρίσκεται, μάλιστα δὲ ἐν Θηβαΐδι. Δυώδμων δὲ ἔχει τὰ φύλλα λεῖα ὀπισθαπόῤῥυμα ξηρά, αἱμορῥαγίαι ἰσᾶται. τοῦτο δὲ ἰσόῤῥιζον τινες ἐν Περσίδι, ἀναιρετικὸν εἶναι, μετατεθὲν δὲ εἰς Αἴγυπτον, ἀλλοιωθῆναι καὶ ἐδώδιμον γενέσθαι.

Περὶ Ἰβεριδος. Κεφ. ρπϑ'.

*Ἰβηρὶς ἤτοι καρδαμαντικὴ ἔχει τὰ

& in fluxiones vetuſtas, & ſinʳ cuniculatim exedétes, magnóſque, inſtillari cóueniet. Etenim purgat, cóglutinat, carne replet & oras cómittit, nó ſecus atq; emplaſtra q̃ cruẽtis vulneribus iniiciunt̃, ẽnema vocãt. Bibitur ad diſcutiendũ ſanguiné cõcretũ, & cótra præcipitationes, rupta, cóuulſa, cum cyatho aquę recenter colatum: addito olei exiguo, cœliacis dyſentericis p ſe cyathus datᵘ prodeſt: neruorũ vitiis, cóuulſionibus commodè illinitur ex oleo, vtpote quod ſudores moueat: aduerſus gypſi potum, & phalãgiorũ morſus bibit̃. Hæc eadẽ p̃ſtant reliqua lixiuia, præſertim quernum: omnia tamẽ adſtringunt.

Perſea. Cap. CLXXXVIII.

PErſea arbor eſt, in Ægypto, fructum ferens cibo idoneum, ſtomacho vtilẽ: in quo phalangia cranocolapta nomine inueniuntur, præſertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu ſanguinis eruptiones ſiſtunt. Arborem hanc prodiderũt aliqui in Perſide exitioſam eſſe, translatámque in Ægyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis. Cap. CLXXXIX.

Iberis ſiue cardamantica, folia

folia habet nasturtij, vere virentiora: caulem cubitalem, aut minorē: in incultis nascitur, æstate lacteum florē promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfaciētes & adurentes: ipsæ enim ischiadicis cum salsa axungia emplastri modò vules, quaternis horis alligatæ, vt dein in balneas descēdatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

τὰ φύλλα παρόμοια καρδάμῳ, ἐν ἔλαι δυσαλέστερα, μῆκος δὲ ὅσον πηχυαῖον ἢ ἔλαττον· φύεται δὲ ἐν ἀγεωργήτοις τόποις, θέρους δὲ γαλακτικὸν ἄνθος προβάλλει, ᾧ τότε δεῖ δρᾶσι κάτειον. ἔχει δὲ δύο ῥίζας παρομοίας καρδάμῳ θερμαντικὰς καὶ καυστικάς· αὗται γὰρ ἀγαθαὶ αἱ ῥίζαι πρὸς ἰσχιαδικούς, σὺν λίπους ὑείου πεπαιγυμένου, ὡς ἐμπλασθῆναι ἡμέρας κατάπλασμα μίσχις ὡσῶν πτάρνων, ἔπειτα ἐν βαλανείῳ ἐμβιβάζειν, καὶ ἐλαίῳ μετ' ἐείου τοῖς τόποις ἐπιχρίειν.

PRIMI LIBRI FINIS.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ἐν μὲν τῷ πρὸ τούτῳ βιβλίῳ φίλτατε Ἄρειε, ὄντι πρώτῳ τῶν περὶ ὕλης ἡμῖν συντεταγμένων, παρεδώκαμεν τὸν περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων, καὶ τῶν γινομένων ἐξ αὐτῶν ὀπῶν τε καὶ δακρύων καὶ καρπῶν λόγον· ἐν δὲ τούτῳ δευτέρῳ ὄντι, ἐπελευσόμεθα, περί τε ζώων καὶ μέλιτος καὶ γάλακτος καὶ στέατος καὶ τῶν λεγομένων σιτηρῶν, ἔτι δὲ λαχάνων ὑποτάξαντες αὐτοῖς ὅσα δριμέα τῶν βοτανικῶν κέκτηται δυνάμει διὰ τὸ συγγένειαν ἔχειν αὐτὰ ὥσπερ τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόμμυα, καὶ νᾶπυ· ἵνα μὴ διαζευχθῇ τῶν ὁμογενῶν ἡ δύναμις.

Περὶ Ἐχίνου θαλαττίου. Κεφ. α΄.

Ἐχῖνος θαλάττιος, εὐστόμαχος, εὐκοίλιος, οὐρητικός· οὗ τὸ ὄστρακον ὠμὸν, μίγνυται χρησίμως ὀπτηθὲν, τοῖς πρὸς τὰς ψώρας ἁρμόζουσι σμήγμασι· κεκαυμένον δὲ καθαίρει τὰ ῥυπαρὰ ἕλκη, καὶ καταστέλλει τὰ ὑπερσαρκοῦντα.

Περὶ

PEDANII DIOSCORIDIS Anazarbei de medicinali materia libri secũdi præfatio,

Io. Ruellio Sueßionẽsi interprete.

IN primo charißime Aree libro quem de medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, vnguẽtis, arboribus, & nascẽtib⁹ ex eis succis, lachrymis, seminibúsq; disseruimus. In hoc autem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis quæ acri prædita sunt facultate, vtpote quæ cũ ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi, intelliguntur. Idq́; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

Echin⁹ siue erinace⁹. Cap. I.

Marinus echinus stomacho ventriq; vtilis est: vrinã cit, huius testa cruda inassata, cómodè medicamentis admiscetur, q̃ psoras abstergũt: crematæ verò cinis sordida vlcera expurgat, luxuriantẽ carnẽ reprimit.

Eschinus

Echinus terrestris.

Cap. II.

Terrestris erinacei corium combustum alopecijs cum pice liquida aptissimè illinitur, assiccatum corpꝰ, & cum aceto mulso potum, renum vitiis auxilio est: item aquæ quæ cutem subiit, conuulsionibus, elephantiæ, & malè habitis, quos cachectos vocant: viscerũ fluxiones exiccat. Eiusdem iecur fictili solibus ex cocto arefactum, ad eosdem vsus vtilissimè reconditur.

Hippocampus.

Cap. III.

Hippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

Purpura. Cap. IIII.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, excrescentias in carne cohibet, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit.

Buccina. Cap. v.

Eadem præstant concremata buccina, sed vehementius vrunt: si quis salis plena fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt: ambustis vtiliter.

Περὶ τῆς χερσαίας ἐχίνου.

Κεφ. Ϛ'.

Καὶ τῆς χερσαίου δὲ ἐχίνου τὸ δέρμα καῖον, σὺν ἀλωπικίας μετὰ πίσσης ὑγρᾶς καταχριόμενον ἀμύζει· ἡ δὲ σὰρξ σκληρευθεῖσα καὶ πνιγμὸν μὴ ὀξυμέλιτος, βοηθεῖ νεφριτικοῖς, καὶ τοῖς ὑδρωπικοῖς σάρκα ὕδατι, καὶ ἀποσμώδεσιν ἐλεφαντιῶσι, καχέκτοις· ξηραίνει δὲ καὶ τὰ τοῦ σώματος ῥεύματισμούς, καὶ τὸ ἦπαρ δὲ αὐτῆς ξηρανθὲν ἐπ' ὀστράκου ἡλιοκαυθὲν, καὶ ἀποτεθὲν, σὺν τὰ αὐτὰ ὁμοίως ἀμύζει διδόμενον.

Περὶ Ἱπποκάμπου.

Κεφ. γ'.

Ἱππόκαμπος, θαλάσσιόν τι ζῷον μικρὸν, οὗ καέντος ἀναλιφθεῖσα ἡ τέφρα πίσσῃ ὑγρᾷ ἢ ὀξυγγίῳ ἢ ἀμαρακίνῳ μύρῳ καὶ καταχριθεῖσα, ἀλωπικίας διασύει.

Περὶ Πορφύρας. Κεφ. δ'.

Πορφύρα καῦσα δυσάμυγδαλον ἔχει ξηραντικὸν, σμηκτικὸν ὀδόντων, ὑπὲρ σαρκωμάτων δὲ καταπαλτικὸν, ἀνακαθαρτικὸν ἑλκῶν, ἀπουλωτικόν.

Περὶ Κηρύκων. Κεφ. ε.

Τὰ αὐτὰ δὲ ποιοῦσι καὶ οἱ κήρυκες καέντες· εἰσὶ δὲ μᾶλλον κωφοὶ καὶ ἰαυὴ δέ τις ἀλῶν αὐτοὺς πλυρώσας ἐν ὠμῇ χύτρᾳ καύσῃ, ἀμύζει σὺν πρὸς σμῆξιν ὀδόντων, καὶ κατα-

καυ-

ταχμάτα ὁπόταν λαθέντες, ἐᾶν δὲ δεῖ ἀποφρακοῦσθαι τὸ φάρμακον· μετὰ δὲ τὴν ἀπόυλωσιν τοῦ κατακμάτος αὐτόματον ἀποπίπτει. γίνεται δὲ ἄσβεστος ἐξ αὐτῶν ὡς κατοδείξομεν ἐν τῷ περὶ ἀσβέστου λόγῳ.

liter illinũtur: quibus solui medicamentum nó oportet: nam postea quàm vulnus cicatricẽ duxerit, ipsum in testæ modum induratú, ipóte sua decidet. Fit etiam calx è buccinis, vt in eiº mentione demonstrabimus.

Περὶ Ιονίων. Κεφ. ϛ'.

Ιόνια δὲ καλεῖται τὰ ὀπὶ τῶν κηρύκων καὶ πορφύρων μέσα, περὶ οἷς ἡ ἕλιξ ὀξὺ τὸ ὀσφάκου· καίεται δὲ ὁμοίως δυνάμιν ἔχοντα κωνσικωτέραν τῶν κηρύκων καὶ τῆς πορφύρας, διὰ τὸ πέζειν αὐτῶν τὴν φύσιν. αἱ δὲ σάρκες τῶν κηρύκων, εὔστομοι καὶ εὐστόμαχοι· κοιλίαν δὲ οὐ μαλάσσουσιν.

Cionia. Cap. VI.

Cionia vocátur purpurarum buccinorúq; mediæ partes, circa quas testæ volumé clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris buccinisq; facultaté vrẽdi cósequunt, quoniã apprimédi natura obtinét. Buccinorum carnes ori gratæ sũt, & stomacho vtiles: sed aliuum nó molliũt.

Περὶ Μυάκων. Κεφ. ζ'.

Μύακες διαφέρουσιν οἱ πεντικοί. καίοντες δὲ τὸ αὐτὸ δρῶσι τοῖς κήρυξιν. ἰδιάτερον δὲ πλυθέντες ὡς μόλιβδος, χρησιμεύουσιν εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ σὺν μέλιτι· ἐκτήκοντες παχύτητας βλεφάρων καὶ σμήχοντες λευκώματα, καὶ τὰ ἄλλως ὑποσκοτοῦντα τῆς κόρης· ἡ δὲ σὰρξ αὐτῶν κυνοδήκτοις ὑπιτίθεται ὠφελίμως.

Mituli. Cap. VII.

Mituli laudatissimi in Põto. Cremati eundé buccinis effectum præbent. Priuatim plúbi more eloti, oculorú medicamentis cum melle vtiles habẽtur: genarũ crassitudines absumunt, albugines purgãt, & cętera quæ oculis caliginem offundũt: carnes eorum ad canis morsus vtilissimè imponũtur.

Περὶ Τελλίνων. Κεφ. η'.

Τελλῖναι δὲ νεαραὶ εὐκοίλιαι· μάλιστα δὲ ὁ ἐξ αὐτῶν ζωμός· παρεγγραὶ δὲ καίεται καὶ βιβίεται λεῖαι καὶ μετὰ κεδρίας ὑπισταζόμεναι, τοὺς ἐκπλυθέντας τῆς ἐλεφάντων βίχας ὠ-

Tellinæ. Cap. VIII.

Recẽtes tellinæ aluo vtiles, sed maximè ius earũ: salitæ vrũtur, tritæq; in cineré, & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci

renasci non patiuntur.

Chamæ. Cap. IX.

Chamarum conchularúmque in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus. Cap. X.

Vnguis siue onyx cóchylij tegumentũ est, ei simile quo purpura integitur: quod in Indiæ nardiferis lacubꝰ inuenit. suauéque ideo spirãs odoré, ꝙ conchylia inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaq̃ stagnantes aquę æstiuis squalloribꝰ inarescũt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, cãdicãs, pinguis. Babylonicus nigrescit, atq; minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiunt, sed aliquátenus castoreum olent. Iidem suffitu excitant fœminas vuluę strangulatu oppressas, comitialésq;: poti vẽtrem molliunt. Crematum cõchylium eadem efficit, quæ purpura & buccinum.

Cochleæ. Cap. XI.

Terrestres cochleæ stomacho vtiles sunt, & non facilè corrumpuntur. Optimæ Sardonicæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quę in Sicilia, ac Chio gignuntur, & quæ in Liguriæ alpibus, pomatiæ, id est operculares cognominatæ. Marina stomacho

οὐκ ἐῶσιν αὖθις φυῆναι.

Περὶ Χηλῶν. Κεφ. θ'.

Καὶ ὁ ἐκ τῶν χηλῶν ὃ καὶ τῶν ἄλλων κογχυλείων ζωμὸς, κοιλίαν κινεῖ ἐφόλμως μετ' ὀλίγου ὕδατος· μετ' οἴνου δὲ λαμβάνεται.

Περὶ Ονυχος. Κεφ. ι'.

Ονυξ δὲ τοῦ πώματος κογχυλίου, ὅμοιον τῷ τῆς πορφύρας· εὑρισκόμενον ἐν τῇ Ἰνδίᾳ, ἐν ταῖς ναρδοφόροις λίμναις. διὸ καὶ ἀρωματίζει νεμομένων τῶν κογχυλίων τὴν ναρδον· συλλέγεται δὲ, ἐπειδὰν ὑπὸ τῶν αὐχμῶν αἱ λίμναι διαφέρει δὲ ὁ ἀπὸ τῆς ἐρυθρᾶς κομιζόμενος, ὑπόλευκος ὢν καὶ λιπαρός. μέλας δὲ ὁ βαβυλώνιος καὶ μικρότερος. ἀμφότεροι δὲ εὐώδεις, θυμιώμενοι, καθαρεί ζοντες ποσῶς τῇ ὀσμῇ· ἐγκείονται δὲ καὶ ὅτι ὑπὸ θυμιαθέντες ταῖς ὑστερικῶς πνιγομένοις καὶ ἐπιληπτικοῖς· πεθέντες δὲ κοιλίαν μαλάττουσιν· αὐτὸ δὲ τὸ κογχύλιον καίει, ποιεῖ ὅσα καὶ ὁ πορφύρεος καὶ ὁ κήρυξ.

Περὶ Κοχλίου χερσαίου. Κεφ. ια'.

Κοχλίας χερσαῖος ἐκτός μακρος, δύσφθαρτος· ἄειστος δὲ ὅ, τι ἐν σαρδόνι, καὶ λιβύῃ, καὶ ἀσυπαλία, καὶ σικελίᾳ καὶ χίῳ γινόμενος, καὶ ὁ ἐν ταῖς κατὰ λιγυείαν ἄλπεσι πωματίας καλούμενος· καὶ ὁ θαλάσσιος

δὲ ὑγρόμαχος καὶ εὐέκκριτος· ὁ δὲ ποτάμιος βρωμώδης. καὶ ὁ ταῖς ἀκανθαις καὶ τοῖς θαμνίσκοις* περικεκολλημένος ἄγκιος, ὃν τινες σέσιλον καλοῦσι, παρακτικός ἐστι κοιλίας καὶ στομάχου ἐμετοποιός. Δύναται δὲ πάντων τὰ ὄστρακα κεκαυμένα θερμαίνειν καὶ καίειν· σήπειν λέπρας, ἀλφούς, ὀδόντας· οὐλὰς δὲ ταῖς ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ λευκώματα καὶ ἐφίλιδας, καὶ ἀμβλυωπίας, μετὰ τῆς σαρκὸς ὅλοι καίοντες καὶ λειανθέντες καὶ ἐγχριόμενοι σὺν μέλιτι ἀποκαθαίρουσιν. ἀμοὶ δὲ σὺν τοῖς κελύφοις καταπλασθέντες, ἐξικμάζουσι τὰ ὑδρωπικὰ οἰδήματα· καὶ οὐκ ἀφίστανται φρίγη πᾶν ἀνικμασθῶσι τὸ ὑγρόν· καὶ πελαγικὰς δὲ φλεγμονὰς παύουσι. καὶ σκόλοπας ἕλκοισιν ὁμοίως καταπλασθέντες καὶ ἔμμικτα ἄρθροισι λέπουσι θερμαίνοντες. αἱ δὲ σάρκες αὐτῶν λείαι σὺν σμύρνῃ καὶ λιβανωτῷ καταπλασθεῖσι, πταύματα καὶ μάλιστα τὰ κατὰ τὰ νεῦρα κολλῶσι, καὶ ταῖς ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας σὺν ὄξει λειανθέντες ἐπέχουσι· ζώπα δὲ ἡ σαρξ* καταποθεῖσα τῷ λυσιχοῦ μάλιστα, ἀλγηδόνας στομάχου παύει· μετὰ δὲ τῆς ὀσράκης ὅλος πεπεὶς καὶ μετ' οἴνου καὶ σμύρνης πεπεὶς ὀλίγος, κωλικοὺς θεραπεύει καὶ κύστεως ἀλγήματα, ἀγακολλᾷ

stomacho idonea, & facilè aluo excernitur: fluuiatilis uirus olet. Quæ verò vepribus frutetísque glutinata cohærer, quam vocant nonnulli sesilon, ventrem & stomachum turbat, vomitiones excitat. Crematæ omnium teste excalfaciendi & vrendi naturâ sortiuntur: purgant lepras, vitiligines, dentésque: emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudines, si cum carne sua vstæ tritæque ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt: sed nõ ante soluantur, quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt, impactos corpori aculeos illitæ euocant, menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes earum cũ thure & myrrha illitę, cùm vulnera alia, tum maximè quæ nerui acceperunt, congluti-nant: tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrenãt: viuæ corpus, & præsertim Africanæ cum aceto deuoratũ, stomachi dolores mitigat: trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli vesicęque cruciatus sanat.

Terrestris

Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abraso acu lentore eius, pilum attingat.

Cancri. Cap. XII.

Cancrorum fluuiatiliũ exustorũ cinis qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gẽtianæ modo, triduo potus cũ vino, magnopere prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedum sedisq;, perniticulos, & carcinomata, cum decocto melle lenit: triti crudi, potiq; ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalãgiorumq; morsus, atq; scorpionum ictus: decocti autẽ & cũ iure esitati, iis prosunt, qui tabe conficiuntur, aut leporé marinum hauserunt: necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadẽ marini, verùm inefficacius omnia pstãt.

Terrestris scorpio.

Cap. XIII.

Terrestris scorpio tritus & impositus, suæ plagæ remedium est: quin estur assatus, ad eadem.

Marinus scorpio.

Cap. XIIII.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorũ, albugines, & hebetudines.

Draco.

ἀνακολλᾷ δὲ τείχας ὁ χερσαῖος, ἐὰν τις βιλόηλω κζ' τῆς σαρκὸς αὐτῆ φέγων τῷ σεῖσαμβύῳ γλοι ὡδὶ σεροσάπτηται τῆς τειχός.

Περὶ Καρκίνων, Κεφ. ιϛ'.

Καρκίνων ποταμίων καέντων, ἡ τέφρα κοχλυαρίων δυοῖν πλῆθος σὺν ῥιζης κοχλυαρίου ἑνὸς, κζ οἴνῳ ποθεῖσα ἐπὶ ἡμέρας γ'. βοηθεῖ λυσοδύκτοις ἐκαρ γῶς· σὺν δὲ μέλιτι ἐφθῷ, ῥαγάδας ταῖς ἐν ποσὶ κζ ταῖς ἐν δακτυλίῳ κζ χιμέθλας, κζ καρκινώματα παρηγορεῖ· λεῖοι δὲ ὠμοὶ σὺν γάλακτι ὀνείῳ ποθέντες, βοηθοῦσι δήγμασιν ἑρπετῶν, φαλαγγίων, σκορπίων σκηπῶς· ἑφθοὶ δὲ σὺν ζωμῷ ἐσθιόμενοι, φθισικοὺς ὠφελοῦσι, καὶ τὸν λαγὼν θαλάσσιον πεπωκότας· τειφθέντες δὲ μετ' ὠκίμου καὶ σεσταθέντες, σκορπίοις κτείνουσι. δύσαν) δὲ τὰ αὐτὰ κζ οἱ θαλάσσιοι, σκλὴ ὅπλον τῶν ἑρπετῶν.

Περὶ Σκορπίου χερσαίου.

Κεφ. ιγ'.

Σκορπίος χερσαῖος ὠμὸς, λεῖος ὀπισθεὶς, βοήθημα τῆς ἰδίας σκληπῆς γίνεται· εὐείσκεται δ' κζ ὀπηθεὶς σεὸς τὸ αὐτό.

Περὶ Σκορπίου θαλασσίου.

Κεφ. ιδ'.

Τοῦ δ' θαλασσίου σκορπίου ἡ χολὴ ἁρμόζει σεὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς ὑποχύσεις κζ λευκώματα κζ ἀμβλυωπίας.

Περὶ

Περὶ Δεράκοντος θαλαττίου. Κεφ. ιδ'.

Δράκων θαλάσσιος ἀναπυχθεὶς καὶ ἐπιτιθεὶς, ἴαμά ἐστι πρὸς τὴν ἀκαλήφην αὐτῶ πληγήν.

Περὶ Σκολοπένδρας. Κεφ. ιε'.

Σκολόπενδρα θαλαττία ἐφθεῖσα ἐν ἐλαίῳ καὶ καταχριωθεῖσα, ψιλοῖ τρίχας· φανθεῖσα δὲ κνησμοὺς ἐργάζεται.

Περὶ Νάρκης. Κεφ. ιϛ'.

Νάρκη θαλαττία ἐπιτιθεῖσα ἐπὶ χρονίων ἀλγημάτων τῆ κεφαλῆν, πραΰνει τὸ σφοδρὸν τῶν ἀλγημάτος· καὶ ἕδραν ἢ ἐκβεβηκυῖαν ἢ προπεπτωκυῖαν, στέλλει προσθεῖσα.

Περὶ Σαπρὸς ἐχίδνης. Κεφ. ιή.

Ἐχίδνης σαρξ ἐφθεῖσα καὶ ἐσθιομένη, ὀξυδορκεῖς ποιεῖ τοὺς ὄφεις, καὶ πρὸς τὰ γυναικεῖα ἁρμόζει, καὶ τοὺς αὐξομένους χοιράδας ἵστησι· δεῖ δὲ ἐκ δέκα ἡμερῶν αὐτὴν, ἀποκόπτειν κεφαλὴν καὶ ἕδραν, διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς ἄσαρκον. μυδᾷ γὰρ ἡ πρὸς τὸ μέτεσον ἀποκοπὴ τῶν ἄκρων. τὸ δὲ λοιπὸν πλύναντας καὶ τιμαχήσαντας, ἐφεῖν μὴ ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ καὶ ἁλῶν ὀλίγων καὶ ἀνήθου. φασὶ δὲ τὸν πρὸς φερομένους φθεῖρας γλυκὺν ὀπὸς ὅτι ψεῦδος· πρὸς ἰσορρῶσι δὲ ἔνιοι καὶ μακρογήρως γίνεσθαι τὸν ἐσθίοντας αὐτάς. κατασκευάζονται δὲ καὶ ἄλες ἐξ αὐτῶν πρὸς τὰ αὐτά, πλὴν οὐχ ὁμοίως ἐρρωμένοι.

Draco marinus. Cap. XV.

Draco marinus dissectus & apertus impositusq; ictus spinæ suæ qua ferit, medela est.

Scolopendra. Cap. XVI.

SCOLOPENDRA in oleo decocta si illinatur, auellit capillos: sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis. Cap. XVII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet: eadem apposita euersam sedem prociduámque coërcet.

Viperæ. Cap. XVIII.

Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritaté oculis afferũt, neruorũ vitiis auxiliantur, increscétes strumas reprimũt: detracta autẽ cute, caput caudaq;, quoniã carne vacãt, amputari debẽt. quippe cómétitiũ est qđ præcipiť, certã vtrinq; mensurã præcidi oportere. Reliquũ verò corpus exẽptis interaneis elotũ dissectũq; discoquiť cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiũt iis q viperas esitẽt, pediculos procreari: quod planè à veritate abhorret. Adiiciunt aliqui longã senectutẽ agere, q eo cibo vescũť. Sal ex eis ad eadẽ cõficiť, sed inefficacior est.

Viua aūt vipera in fictile nouū dimittitur, adiiciūtur salis caricarūq; tritarū, singulatim quūq; sextarij, mellis cyathi sex, mox fictilis operculū luto oblinit, & fornacib⁹ inassat, donec sal in carbones redigat: qui postea trit⁹ in pulueris faciē, recondit. Plerūq;, vt ori gratior fiat, immiscetur, nardi spica, aut foliū, aut malabathri momentum.

καθίεται δὲ ἔχιδνα ζῶσα εἰς καινὴν χύτραν, καὶ μετ' αὐτῆς ἁλῶν ἰσχάδων τετριμμένων ἀνὰ ξέστας α. μετὰ μέλιτος κυάθων ς'. περιχρίεται πηλῷ τὸ πῶμα τῆς χύτρας, καὶ ὀπτᾶται ἐν καμίνῳ, ἄχρις οὗ ἀνθρακωθῶσιν οἱ ἅλες· μετὰ δὲ τοῦτο λειοτριβηθέντες ἀποτίθενται ἐνίοτε μιγνυμένου πρὸς εὐστομαχίαν αὐτοῖς ναρδοστάχυος ἢ φύλλου ἢ μαλαβάθρου βραχέος.

Senecta anguiū. Ca. XIX.

Περὶ Ὄφεως γήρως. Κεφ. ιθ'.

Senectus anguium in vino decocta dolori aurium, infusu: & dentium collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed prçcipuè viperinam.

Γῆρας ὄφεως ἑψηθὲν ἐν οἴνῳ, βοήθημά ἐστιν ὠταλγίας ἐγχεόμενον, καὶ ὀδονταλγίας διακλυζόμενον. μίσγουσι δὲ αὐτὸ καὶ εἰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις μάλιστα δὲ τὸ τῆς ἔχεως.

Lepus marinus. Cap. XX.

Περὶ Λαγωοῦ θαλαττίου. Κεφ. κ'.

Lepus marinus loligini paruæ similis est, qui per sese trit⁹, aut cum vrtica marina illit⁹ capillos euellit.

Λαγωὸς θαλάσσιος ἔοικε μὲν μικρᾷ τευθίδι· δύναται δὲ λεῖος καταπλασθεὶς καθ' ἑαυτὸν καὶ μετὰ ἀκαλύφης τρίχας ψιλοῦν.

Lepus terrestris. Cap. XXI.

Περὶ Λαγωοῦ χερσαίου. Κεφ. κα'.

Terrestris leporis inassatum cerebrū māditur, iuuandis tremoribus qui valetudine cōtracti sunt: affrictu aut cibo facilē infantibus dētitionem præstat: exustū caput & cū adipe vrsino aut aceto illitū, alopeciarū inanitatib⁹ medetur. Leporinū coagulū post triduum à cōcubitu potū, cōceptum adimere,

Τοῦ δὲ χερσαίου λαγωοῦ ὁ ἐγκέφαλος, ὀπτὸς βιβρωσκόμενος ὠφελεῖ τρόμοις τοὺς κατὰ πάθος γινομένοις· καὶ ὀδοντιάσεις ἐπὶ παίδων παρατριβόμενος καὶ ἐσθιόμενος· ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καεῖσα καὶ καταχρισθεῖσα μετὰ στέατος ἀρκείου ἢ ὄξους ἀλωπεκίας θεραπεύει. ἡ δὲ πυτία ποθεῖσα μετὰ ἡμέρας τρεῖς, μετὰ τὴν ἄφεδρον,

ἀτόκιος εἶναι ἱστορεῖται· ἐπέχει δὲ καὶ τὰς ἐκ μήτρας ῥεύσεις, καὶ κοιλίας, ὠφελεῖ δὲ καὶ ἐπιληπτικοὺς, καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα μετ᾽ ὄξους πινομένη, μάλιστα δὲ πρὸς γάλακτος θρόμβωσιν καὶ ἐχιδνῶν δήγματα. τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ θερμὸν καταχριόμενον, ἐφήλιδας καὶ ἀλφοὺς καὶ φακοὺς θεραπεύει.

Περὶ Τρυγόνος θαλασσίας.
Κεφ. κβ΄.

Τρυγόνος θαλασσίας τὸ κέντρον, ὃ δὴ ἀπὸ τῆς οὐρᾶς αὐτῆς πέφυκεν ἀνεστραμμένον ταῖς φολίσιν, ὀδόντα πονοῦντα πραΰνει· θρύπτει γὰρ καὶ ἀποβάλλει.

Περὶ Σηπίας. Κεφ. κγ΄.

Σηπίας ἑψηθείσης τὸ μέλαν βιβρωσκόμενον δύσπεπτον, κοιλίας μαλακτικὸν, τὸ δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς ὄστρακον σμηγματῶδες εἰς κολλύρια ἁρμόζει πρὸς παράτριψιν τραχέων βλεφάρων· καὲν δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ ὀστράκῳ, ἄχρις οὗ τὸ πλακῶδες αὐτοῦ ἀποστῇ, σμήχει λεῖον ἀλφοὺς, πίτυρα, ὀδόντας, ἐφήλεις· μίγνυται δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικά. πλυθὲν ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς λευκώματα κτηνῶν ἐμφυσώμενον· καὶ πτερύγια τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς τήκει, σὺν ἁλσὶ λεῖον προσαγόμενον.

Περὶ Τρίγλης. Κεφ. κδ΄.

Τρίγλα συνεχῶς ἐσθιομένη ἀμβλυωπίας δοκεῖ καὶ κατασκευαστικὴ ὑπάρχειν

partúsq; spem intercipere ꝑditur: vuluæ & alui fluorem sistit, comitiales iuuat, contra venena ex aceto bibitur, præsertim aduersus cõcretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si callidus illinat, vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginésque sanat.

Pastinaca.
Cap. XXII.

Marinæ pastinacę radius, qui ei⁹ cauda enat⁹ aduersis squãmis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam eos frãgit, & euocat.

Sepia. Cap. XXIII.

Sepiæ coctæ dum ęstur atramentum ægrè concoquitur, aluum mollit, collyriis ẽ testa factis conuenienter genarum scabritiæ perfricantur: vstum in sua testa donec id qđ crustosum est abscedat, postea tritũ, expurgat vitiligines, furfures, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in medicamenta oculorum addi solet: cõtra albugines, oculis iumentorũ efficaciter inspirat: pterygia oculorũ absumit, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis. Cap. XXIIII.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorũ hebetari cõstat.

Is marini draconis, aranei, ac scorpionis morsibus medetur, si crudus atque dissectus admoueatur.

Hippopotamus. Cap. XXV.

Hippopotami testes exiccati ac triti cótra serpentiũ morsus bibuntur.

Fiber. Cap. XXVI.

FIBER ancipitis vitæ animal, plerunque cum piscibus & cancris ex aqua victum capessit. Huius testes serpentium venenis aduersantur: ster nutamenta mouent, & in vniuersum varios obtinent vsus: siquidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus secundásque eiiciunt: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiámque ex aceto bibuntur: lethargicos, & vtcunque veterno obdormiscentes excitant infusi: cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illiti prosunt tremulis, conuulsionibus, & omnib⁹ neruorum vitiis. In summa, calfactoriam vim habent. Eligi debent testes, qui ex vno ortu connexi sunt (fieri enim non potest, vt

χειν ὠμὰ δὲ ἀναχθέντα καὶ ἐπιτεθέντα θαλασσίᾳ δράκοντος καὶ σκορπίου καὶ ἀράχνης δήγματα ἰᾶται.

Περὶ Ὀχέως ἱπποποτάμου. Κεφ. κέ.

Ὀρχεις ἱπποποτάμου ξηρανθεὶς καὶ λειανθεὶς, πίνεται μετ' οἴνου πρὸς ἑρπετῶν δήγματα.

Περὶ τῶν τὸ κάστορος ὄρχεων. Κεφ. κϛ'.

Κάστορος ὄρχις· ζῷόν ἐστιν ἀμφίβιον, τὸ πλεῖστον ἐν ὕδασι, σπὰ ἰχθύσι, καὶ καρκίνοις τρεφόμενον. ποιεῖ μὴν καὶ πρὸς ἑρπετά. ἔστι δὲ ἡ παρμικὸς, καὶ καθόλου ποικίλως ἔχει ἡ χρῆσιν· πορθεὶς δὲ μετὰ γλήχωνος < πλῆθος δυοῖν, ἐμμηνα κινεῖ καὶ ἔμβρυα, καὶ δεύτερα ἐκβάλλει. πίνεται δὲ σὺν ὄξει καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις, τρόφους, λυγμοὺς, θανάσιμα φάρμακα, ἰξίαν· ἀναλαμβάνεται δὲ καὶ τοὺς ληθαργικοὺς, καὶ τὸν ὄπως δή ποτε καταφερομένους, ἐμβρεχόμενος· σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ καὶ ὀσφρανόμενος, καὶ ὑποθυμιώμενος δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ· ἁρμόζει δὲ καὶ τρόμοις καὶ ἀσπασμοῖς, καὶ παντὶ τῷ νευρώδει πονήματός τε καὶ συγχεομένος. καὶ καθόλου θερμαντικὴν ἔχει τὴν δύναμιν. ἐκλέγου δὲ ἀεὶ τοὺς συνεζευγμένους ὄρχεις ἐκ μιᾶς ἀρχῆς· (ἀδύνατον γὰρ δύο

δύο φύσεις ἐζευγμένας ἐν ἑνὶ ὑμένι εὑρεῖν) καὶ τὸ ἐντὸς ἔχον κηροειδὲς βαρύοσμον, βρομῶδες, δριμὺ, δηκτικὸν, εὔθρυπτον, διαφραττόμενον τε συνεχῶς φυσικοῖς ὑμέσι. δολοῦσι δέ τινες αὐτὸ, ἀμμωνιακὸν ἢ κόμμι συμπεφυρμένον αἵματι καὶ καστορείῳ, ἐγχέοντες εἰς φύσαν καὶ ξηραίνοντες. μάτην δὲ ἱστορεῖται ὅτι διωκόμενον τὸ ζῶον ἀποσπᾷ τοὺς διδύμους καὶ ῥίπτει· ἀδύνατον γάρ ἐστιν ἅψασθαι αὐτῶν προσεσφιγμένων ὄντων ὥσπερ ὑός. δεῖ δὲ διελόντας τὸ δέρμα κομίσασθαι σὺν τῷ περιέχοντι ὑμένι τὸ ὑγρὸν, ὂν μελιτῶδες, καὶ οὕτω ξηράναντας ποτίζειν.

Περὶ Γαλῆς κατοικιδίου.

Κεφ. κζ΄.

Γαλῆ κατοικίδιος περιφλεχθεῖσα, καὶ δίχα τῶν ἐντὸς σκελετευθεῖσα δι' ἁλὸς καὶ ξηρανθεῖσα ἐν σκιᾷ παντὸς ἑρπετοῦ ἐνεργέστερόν ἐστι βοήθημα ποθεῖσα, μετ' οἴνου ∋ β΄. πλῆθος, καὶ τοξικοῦ ἀντιφάρμακον ὁμοίως ληφθεῖσα. ἡ δὲ κοιλία αὐτῆς κορίῳ πλησθεῖσα καὶ σκελετευθεῖσα, θηριοδήκτοις καὶ ἐπιληπτικοῖς βοηθεῖ πινομένη. ὅλη δὲ καεῖσα ἐν χύτρᾳ, ποδαγρικοὺς ὠφελεῖ, τῆς τέφρας καταχριομένης μετ' ὄξους. τὸ δὲ αἷμα αὐτῆς καταχριόμενον, χοιράσι βοηθεῖ· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἐπιληπτικούς.

vt gemini folliculi in vna membrana cóiuncti reperiantur) liquore int⁹ veluti ceroſo, odore graui & virus redoléte, guſtu acri, mordéte, ac friabili, naturalibus, tunicis circũdato. Quẽ fraude aliqui corrũpũt, cõiicientes in follem gũmi, aut ammoniacũ cũ ſanguine & caſtorio ſubactũ, & ita exiccãtes. Vanũ eſt quod traditur teſtes ab ipſis euelli, & à ſeſe abiici, quũ venatu vrgentur: ſiquidem tangi nequeunt, ita, vt in ſue, ſubſtricti. Operæ autem pretium eſt, diuiſa pelle melleum liquorem cum eueſtiéte tunica aſſumere, & ſiccatum potui dare.

Muſtela vulgaris.

Cap. XXVII.

Muſtela quę in domibus noſtris oberrat, ambuſta exenteratur, & inueterata ſale, in vmbra ſiccatur. Ea binis drachmis cũ vino pota, aduerſus omnia ſerpentiũ venena pręſentaneo eſt remedio: toxico, ſimili ſumpta modo, reſiſtit. Eius vétriculus coriandro farctus inueteratusq;, percuſsis à ſerpéte, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis cõfert, cinere ex aceto illito. Sãguine perũctæ ſtrumæ, iuuantur: comitialibus etiã prodeſt.

Ranæ. Cap. XXVIII.

Contra omnium ſerpétium venena pro antidoto ſunt ranæ, ſi ex ſale & oleo decoctæ edantur, iúſq; earũ itidem ſorbeatur: cótra inueteratos tendinũ rigores pollent. Illitæ eorum cinis, profluétis ſanguinis impetus ſiſtit: explédis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium ranarũ cruor auulſos genis pilos rena ſci, phibet, in veſtigia euulſorũ inſtillatæ: decoctæ in aceto & aqua détiũ dolores collutione leniũt. Silurus. Cap. XXIX.

Silurus recés in cibo nutrit, & facilé præbet aluũ: ſale verò conditus, minimũ ſuppeditat alimentũ. Arteriã expurgat, & vocé expedit. Illita ſaliti caro, aculeos et infixa corpori ſpicula extrahit. Muria eiſ ícipiétibus dyſenteriis, pdeſt, ſi in deſidétiũ fotũ adiiciatur, fluxiones ſiquidem ad ſumma cutis elicit: iſchiadicis infuſa medetur.

Smarides. Cap. XXX.

Smaridis piſcis caput exuſtũ, excreſcentes vlcerum oras pulueriſatq; reprimit: nomas cohibet, thymos clauóſq; abſumit. Caro non ſecus atq; ſalſamẽtum prodeſt á ſcorpione percuſsis, aut à cane demorſis.

Mænæ.

Περὶ Βαβάχων. Κεφ. κέ.

Βάβαχοι ἀντιφάρμακόν εἰσιν ἑρπετῶν πάντων, ζωωυθέντες ἐν ἅλατι καὶ ἐλαίῳ, τῷ ζωμῷ λαμβανομένῳ ὁμοίως καὶ πρὸς χρονίους τῶν τενόντων ἀποτάσεις· καίοντες δὲ καὶ ἐπιπάττοντες, αἱμορραγίαν στέλλουσι. καὶ ἀλωπικίας θεραπεύουσι σὺν πίσσῃ ὑγρᾷ καταχριόμενοι. τῶν δὲ χλωρῶν βαβάχων τὸ αἷμα ἐπιστάζόμενον, κωλύει τὰς ἐκπλεθείσας ἀπὸ τῶν βλεφάρων τρίχας φύεσθαι· ὠφελοῦσι καὶ ὀδοντολγίας συνεφόμενοι· ὕδατι καὶ ὄξει καὶ διακλυζόμενοι.

Περὶ Αἰλύρου. Κεφ. κϑ.

Αἴλυρος ναρὸς βιβρωσκόμενος, τροφιμός ἐστι καὶ εὐκοίλιος· ταχυχωρεῖ δὲ ἄδροφος· ἀρτηρίας ᾗ καθαίρει καὶ εὔηχας παρασκευάζει. κατάπλασθεῖσα δὲ ἡ σὰρξ τὰ ἐγχρῶ, σκόλοπας ἀνάγει. καὶ ἡ ἐξ αὐτοῦ ἅλμη ἁρμόζει ἐν ἀρχῇ δυσεντερικοῖς εἰς ἐγκάθισμα, κατάγουσα τὰ ῥεύματα πισω εἰς τὴν ὀπφάνειαν, καὶ ἐγκλυζομένη δὲ ἰσχαδικοὺς θεραπεύει.

Περὶ Σμαρίδος. Κεφ. λ.

Σμαρὶς ταριχευθεῖσα ἡ κεφαλὴ καυθεῖσα, ἕλκη στέλλει ὑπερσαρκοῦντα, καὶ νομὰς ἵστησι, καὶ ἥλους, καὶ θύμους ἀναλίσκει· σκορποσπλήκτοις τε καὶ κυνοσπλήκτοις ἡ σὰρξ ἁρμόζει καθάπερ πᾶς τάριχος.

Περὶ

Περὶ Μαινίδος. Κεφ. λά.

Καὶ τὰ μαινίδος ἡ κεφαλὴ καῦσα λεῖα, ταῖς ἐν δακτύλῳ τετυλωμέναις ῥαγάδας καταπλασθεῖσα ἀφίστησι· τὸ δὲ γάρον αὐτῆς τοῖς ἐν τῷ στόματι σπιλάδας διακυζόμενον παύει.

Περὶ κωβίου. Κεφ. λβ'.

Κωβίου πρόσφαγον ἐὰν ἐμβαλὼν εἰς ὑείαν κοιλίαν καταῤῥάψῃς, καθεψήσεις τὲ μὲθ' ὕδατος ξεστῶν ιβ'. ἄχρι δυοῖν ξεστῶν, καὶ διηθήσας καὶ ἐξαυθριάσας πότισον, κοιλίαν ἀταράχως κάτω ὑπάξεις. καταπλασθεὶς δὲ καὶ τὸν ὑπὸ κυνῶν δηχθέντας ἢ ἑρπετῶν ὠφελεῖ.

Περὶ Ωμοταρίχου. Κεφ. λγ'.

Ὁ δὲ ὠμοτάριχος λεγόμενος, σαφὲς ὅτι σύνηθες τεταριχευμένον. βοηθεῖ δὲ λαμβανόμενος τοῖς ὑπὸ ἐχίδνης, τῆς καλουμένης φρυσῆρος, δηχθεῖσι· δεῖ δὲ ὡς ὀπωλεῖον τὸν προσφέροντας οἶνον ἀναλαμβάνειν πίνειν πολὺν καὶ ἐμεῖν. εἰς τε ταῖς δυσπνοίαις μάλιστα ἁρμόζει, καταπλάσσεται δὲ καὶ ὑπὸ κυνοδήκτων ὠφελίμως.

Περὶ Γάρου. Κεφ. λδ'.

Τάριχον δὲ παῦ τὰ ἐκπεπιεσμένων ἰχθύων καὶ κρεῶν καταπλαττόμενον, νομὰς ἑρπητὰς καὶ κυνοδήκτους ἵστησι· εἰσὶ δὲ καὶ ὑπὸ δυσεντερικοῖς καὶ ἰσχιαδικοῖς· ἐφ' ὧν μὲν ἵνα τὰ ἐλκώματα ὑπεχώσῃ, ἐφ' ὧν δὲ ἵνα τὰ ἀνέλκωτα ἐρεθίσῃ.

Περὶ

Mænæ. Cap. XXXI.

Mænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam garum oris putrilagines collutióe sedat.

Gobius. Cap. XXXII.

Gobius recens in suillū vētrē coniectus, si cōsuta rima in duodecim aquæ sextariis, donec duo supersint, decoquat, excolatus & sub diuo refrigeratꝰ potui det, aluus sine molestia deiicit. Illitꝰ cōtra serpentiū, canúq; morsus auxilio est.

Thunnus. Cap. XXXIII.

Conditanei thunni caro, quā omotarichon vocant, sumpta iis auxiliatur, quos vipera nomine prester momorderit: sed oportet vinū quamplurimum subinde cogantur haurire, ita vt vomitione reddatur. Contra acrimonias esitatorum maximè valet, canum morsibus vtilissimè illinitur.

Garum. Cap. XXXIIII.

Garū oē, qđ ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eoꝰ fotꝰ fiat, depascētia vlcera sistit: morsis à cane medet, dysēntericis atq; ischiadicis infunditur: nōnullis, vt exulcerata adurat: alijs autē ad lacessenda, q̄ vlcera non sentiunt.

Ius piſcium.
Cap. XXXV.

Recentiũ piſcium ius, modò per ſe, modò ex vino potum, aluũ ſubducit. Priuatim adhũc vſum cõficitur è phycidibus & ſcorpionib⁹, & iulide: è percis, & recẽtibus aliis ſaxatilib⁹, nec virus reſipientibus, ſimpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

Cimices lectularij. Ca. XXXVI.

Cimices qui in cubilibus enaſcuntur, cauis fabarum inclusi, ſi ante febrium ſignificationes ſepteni deuorẽtur, quartanis auxilio ſunt: & citra fabas ſumpti, percuſsis ab aſpide, p-ſunt: vuluarum exanimationes olfactu reuocant: poti cum vino aut aceto adhærentes ſanguiſugas abigunt: triti & vrinariæ fiſtulæ impoſiti, vrinę anguſtias leuant.

Millepeda. Cap. XXXVII.

Millepedæ, quæ ſub aquario vaſe ſtabulantur, animalia ſunt multis pedibus nitẽtia, quæ cõ tacta manu contrahunt in orbem: hæ ex vino potæ difficili vrinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis cum melle vtiliſsimũ. Tritę, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus auriũ, addito roſaceo, cõuenienter inſtillãtur.

Blatta

Περὶ Ζωμοῦ τῶν πεζῶν ἰχθύων. Κεφ. λέ.

Ζωμὸς ὁ ἐκ τ πεζῶν ἰχθύων κοιλίας ὑπαγωρός, ποτὲ μὲ καθ' ἑαυτ πινόμενος, ποτὲ ὁ μετ' οἴνου. ἰδίως ὁ σκυμάζει θερὸς ταῦτα ὁ ἀπὸ τ φωκίων καὶ σκορπίων καὶ ἰουλίδων καὶ τρικίδων καὶ τ ἄλλων πεζαίων ἀπαλῶν καὶ ἀβρώμων λεπῶς μὴ ὕδατος καὶ ἐλαίκ καὶ ἀνήθ. Περὶ κόρεων. Κεφ. λς'.

Κόρεις οἱ ἀπὸ κλίνης ἐνπιθέμενοι βρώμασι μετὰ κυάμων τὸν ἀριθμὸν ζ'. καὶ* καταπινόμενοι θερὸ τῆς ἐπισημασίας, ὠφελοῦσι τοὺς τεταρταίζοντας, καὶ ἀσπιδοδήκτους δὲ δίχα τ κυάμων καταποθέντες· ὑστερικῶς δὲ πιζομένους ἀνακαλοῦνται ὀσφρανόμενοι· σὺν οἴνῳ δὲ ἢ ὄξει ποθέντες βδέλλας ἐξάγουσι· δυσουρίαν τε παύουσιν ἐνπιθέμενοι τῷ ἐρυπικῷ πόρῳ λεῖοι.

Περὶ κουβαρίδων. Κεφ. λζ'.

Οἱ οἱ ὑπὸ ταῖς ὑδρίαις, ζῷά εἰσι πολύποδα, σφαιρούμενα κατὰ τὰς ἁπαφὰς τῶν χειρῶν· οὗτοι ποθέντες σὺν οἴνῳ βοηθοῦσι δυσουρίᾳ τε καὶ ἰκτέρῳ· διαχεόντες δὲ μετὰ μέλιτος σὺν ἀγκοὺς ὠφελοῦσι, καὶ θερὸς ὠταλγίαν δὲ λεῖοι σὺν ῥοδίνῳ θερμανθέντες ἐν καλύφῳ ῥοᾶς καὶ ἐκθλίψαντες, ἁρμόζουσιν.

Περὶ

Περὶ Σίλφης. Κεφ. λή.

Σίλφις τὸ ἐν τοῖς ἀφροκοπείοις εὑρισκόμενος, τὰ ἐντὸς πεπόμενα σὺν ἐλαίῳ ἢ ἐφόμενα καὶ ἐπιζαλόμενα ὠταλγίας παύει.

Περὶ πνεύμονος θαλασσίου. Κεφ. λθ'.

Πνεύμων θαλάσσιος ψησάμενος λεανθεὶς ποδαγρικοὺς καὶ χειμελιώντας, ἀφελεῖ καταπλασσόμενος.

Περὶ Χοιρείου πνεύμονος. Κεφ. μ'.

Ὁ δὲ χοίρειος καὶ ἀρνειος καὶ ἀρκτος πνεύμων, τὰ ἐκ τῶν ὑποδημάτων παραπείμματα ἐπιτιθέμενοι, ἀφελέγματα τηρεῖσιν.

Περὶ Πνεύμονος ἀλώπεκος. Κεφ. μά.

Καὶ ὁ τῆς ἀλώπεκος πνεύμων ζηρανθεὶς καὶ ποθεὶς, ἀδημαντικὰς ὀνίνησι. καὶ τὸ ἧπαρ ὁμοίως ταχὺ καὶ ἐγχυθὲν, ὠτὸς πόνον παύει.

Περὶ Ἥπατος ὄνειου. Κεφ. μβ'.

Ἧπαρ ὄνειον ἐσθιόμενον ὀπῶν, ἐπιληπτικοὺς ὠφελεῖ, νήστεις δὲ λαμβανέτωσαν.

Περὶ Αἰδοίου ἄρρενος ἀλάφου. Κεφ. μγ'.

Αἰδοῖον ἄρρενος ἄλφου σὺν οἴνῳ ποθὲν λεῖον τοῖς ὑπὸ ἐχιδνῶν δηχθεῖσι βοηθεῖ.

Περὶ Ονύχων ὄνων. Κεφ. μδ'.

Ονυχες ὄνων καέντες καὶ ποθέντες ἐπ' ἡμέρας ἑπτὰ πλῆθος κοχλιαρίων δυοῖν, ἰσοῤῥοῦσι ἐπιλη-

Blatta piſtrinaria.

Cap. XXXVIII.

Blattæ eius quæ in piſtrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores inſtillatu mitigant.

Pulmo marinꝰ. Cap. XXXIX.

Podagras pernionéſq; emendat pulmo marinus recens, tritus & illitus.

Pulmo ſuillus.

Cap. XL.

Suillus & agninus vrſinúſq; pulmo impoſitu attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur.

Pulmo vulpinus.

Cap. XLI.

Vulpinus verò ſi arefactus bibatur, ſuſpirioſos adiuuat. Adeps quoque liquefactus, infuſusque, auris dolorem finit.

Hepar aſini. Cap. XLII.

Aſini iecur inaſſatũ eſu comitialibus prodeſt, veruntamẽ ieiunis edendum præcipitur.

Genitale cerui.

Cap. XLIII.

Genitale cerui tritum & vino potum, à vipera demorſis auxiliatur.

Vngula aſini. Cap. XLIIII.

Vngularum aſini cinis per dies multos binis cochlearibus potus proditur comitiales adiu-

adiuuare, eædem oleo subactæ strumas discutiunt: & illitæ pernionibus medentur.

Lichenes equorum. Cap. XLV.

Lichenes sunt in equorum genibus, & super vngulas in flexu harum partium indurati calli: qui triti & in aceto poti, comitialibus mederi tradútur.

Vnguli caprinarum. Cap. XLVI.

Caprinarum cinere peruncta ex aceto alopeciæ sanantur.

Iecur caprinum. Cap. XLVII.

Capræ verò inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos halitu eius vaporari: prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales deprehendi.

Iecur aprinum. Cap. XLVIII.

Aprinum recens si arefactũ teratur, ex vino potum contra serpentium volucrúmque morsus auxilio est.

Iecur canis rabidi. Cap. XLIX.

Iecur canis, qui rabie exagitatur, tostú & in cibo ab emorsis

λυπικοὶς ὠφελεῖν, ἐλαίῳ δὲ φυραθέντες χειράδας διαφορεῦσιν· ἐπιπλασθέντες δὲ, χιόνιλας θεραπεύουσι.

Περὶ λειχήνων ἵππων.

Κεφ. μέ.

Λειχῆνες ἵππων, εἰσὶ δὲ πῶλοι κατ' ὀπισθαφὴν ἐντετυλωμένοι παρὰ τοῖς γόνασι καὶ παρὰ τοῖς ὁπλαῖς· πεθέντες λεῖοι μετ' ὄξους, ἐπιληψίας ἰσχυροῖς θεραπεύει.

Περὶ Αἰγῶν ὀνυχῶν.

Κεφ. μς'.

Οἱ δὲ τῶν αἰγῶν ὄνυχες καέντες, ἀλωπικίας καταχριόμενοι εὖ ὄξει θεραπεύουσι.

Περὶ Ἥπατος αἰγός. Κεφ. μζ'.

Τὸ δὲ ἧπατος τὸ αἰγὸς ὀπτωμένου, ὁ ἀπερρέων ἰχὼρ ἐγχριόμενος, νυκτάλωπα ἀμύζει· καὶ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐλαίδα δέ τις ἐφομένῳ αὐτῷ δέγκται αὐτοῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς ὠφελεῖται. ἀμύζει δὲ καὶ ἐδόμενον ὀπίσω τρεῖς τὰ αὐτά. φασὶ δὲ καὶ ἐπιληπτικοὶς ἁλίσκεσθαι. φαγόντας μάλιστα τὸ θεράσιον ἧπαρ.

Περὶ Ἥπατος κάπρου.

Κεφ. μή.

Τὸ δὲ κάπρου ἧπαρ νεαρὸν καὶ ξηρὸν λεῖον σὺν οἴνῳ πινόμενον, ἑρπετῶν καὶ κτηνῶν δήγματα ὠφελεῖ.

Περὶ κυνὸς λυσσῶντος.

Κεφ. μθ'.

Κυνὸς λυσσῶντος ἧπαρ βιβρωσκόμενον ὀπίσω τοῦ δηχθέντος

πων ὑπ' αὐτοῦ, ἀφελκτικώτερος ὑδροφοβίας τηρεῖν πιστεύεται. χρῶνται δὲ εἰς προφυλακὴν καὶ τῷ κυνόδοντι τῶν δακόντος ἐπιδουπτισις εἰς κυσίδα καὶ φελάπτοντες τῷ βραχίονι.

Περὶ Ἥπατος αἰθύας.

Κεφ. ν'.

Αἰθύας ὕπαρ σκληρυνθὲν καὶ τὸ ἔνδον ὑδρομέλιτος κοχλιαρίων δυοῖν πλῆθος, ἐκβάλλει δεύτερα.

Περὶ καπυμάτων.

Κεφ. νά.

Τὰ δὲ ἀπὸ τῶν καπυμάτων παλαιὰ δέρματα, κεχρισμένα καὶ λεῖα καταπλασσόμενα, πυρίκαυτα καὶ παραβλήματα καὶ τὰ ἐξ ὑποδημάτων ἐλίμματα, θεραπεύει.

Περὶ Ἀλεκτορίδων. Κεφ. νβ'.

Ἀλεκτορίδες αὐαχθεῖσαι καὶ ἐπιτεθεῖσαι ἔνθερμοι, τοῖς ἐρπετῶν δήγμασι βοηθοῦσι· δεῖ δὲ συνεχῶς μιᾶσαι.

Περὶ Ἐγκεφάλου ἀλεκτορίδος. Κεφ. νγ'.

Ὁ δὲ ἐγκέφαλος αὐτῶν ἐν πόματι θηριοδήκτοις συὼ οἴνῳ δίδοται, καὶ τὴν ἐκ μιλύγγος πάρρηξιν ἐπέχει. * τοῦ δὲ ἄρρενος τὸ κατὰ τὰ ὀστᾶ ὑποκείμενον τῇ κοιλίᾳ καθαίρει λίθους· ἀποδερόμενον δὲ ἐν ταῖς ἐφήσεσι ξηρανθὲν, ἀρμόζει στομαχικοῖς, λεῖον μετ' οἴνου πινόμενον.

* ὁ δὲ

sis sumptũ, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Vtitur autem ad arcendos aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur: hũc à cane, qui momordit exemptum, & folliculo inditũ, p amuleto brachio adnectũt.

Iecur mergi. Cap. L.

Inueteratũ autem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum secundas pellit.

Coria veteramentaria. Cap. LI.

Veteris corij cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calceamentorum attritus sanat.

Gallinæ. Cap. LII.

Dissectæ gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentiũ morsibus auxiliãtur: sed identidem alias sufficere oportet.

Gallinarum cerebrum. Cap. LIII.

Earũ cerebellum in vino bibendũ datur contra serpentiũ morsus, sanguinem à cerebri mẽbrana profluentẽ sistit. Quę iteriore vẽtriculi galli finu resi det mẽbrana, secti in laminas cornus specie similis (ea verò inter coquẽdũ abiici solet) siccaſ, tritáq; in vino cõueniẽtissimè stomachicis datur in potu.

Ius

Ius è vetere gallinaceo aluum deiicit. Abiectis itaque interaneis salem coniici oportet, & consuto ventre decoqui in viginti sextariis aquæ, donec ad treis heminas redigantur: totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, cnicum, aut filiculam. Crudos humores crassosque, atram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, suspiriis, articulariis morbis & inflationibus stomachi.

* ὁ δὲ ζωμὸς τ̃ γόνατικος μάλιστα δίδ) ἐπιπράσεως χάειν φαυλοτήτων ϗ ἐπὶ τ̃ στόμαχον πυρμιέων λιτῶς σκευασθείς. Ὁ δὲ τ̃ παλαιῶν μὴ ἐκζυόντων, δίδοται πρὸς κάθαρσιν κοιλίας. ἐξελόντας ὃ τὰ ἐντὸς, δεῖ αὐτὰ μεμῆναι ἅλας, ϗ καταῤῥάψαντας ἑφθῆν μετὰ ὕδατος ξεστῶν κ'. καταζόντας εἰς κοτύλας γ'. δίδο) ὃ πᾶ ἐξαυθριασθέν. ἔνιοι δὲ σωτ̃ ἰοισι κράμβῃ θαλασσίαν, ἢ λινόζωστν, ἢ κήκιον. ἢ πολυπόδιον. ἄγει δὲ πάχος ὠμὸν, γλοιῶδες, μέλαν· ἀμύζει δὲ πυρετοῖς χρονίοις, ἄθμασιν, ἀρθριτικοῖς, ἐμπνευματουμένοις στομάχοις.

Candidum oui. Cap. LV.

Candidum oui crudum refrigerat, spiramenta cutis occludit, inflammationes oculorum infusum lenit, ambusta, si sta-

Oui natura. Cap. LIIII.

Ouum molliculum plus alit sorbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores vtile est: inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco, & rosaceo: & condylomatis, cum meliloto: cum vua autem fructicis eius, quem rhoa dicũt, aut galla in patinis frigitur, vt cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet.

Περὶ Ωοῦ. Κεφ. νδ'.

Ωον τὸ ἁπαλὸν τροφιμώτερον τοῦ ῥοφητοῦ, καὶ τοῦ ἁπαλοῦ τὸ σκληρόν. ἡ λέκιθος αὐτοῦ χρησίμη, πρὸς ὀφθαλμῶν θερμασυνίας· ὀπτηθεῖσα σὺν κρόκῳ ϗ ῥοδίνῳ· πρός τε τὰς περὶ δακτύλων φλεγμονὰς ϗ κονδυλώματα, σὺν μελιλώτῳ· μὴ ῥοδὸς δὲ ἡ κηκίδος τηγανισθεῖσα, καὶ βρωθεῖσα ἧσιν κοιλίαν, καὶ καθ' ἑαυτὴν δὲ προσενεχθεῖσα.

Περὶ Λευκοῦ τ̃ ὠοῦ.

Κεφ. νε'.

* Τὸ δὲ λευκὸν αὐτ̃ ὠμὸν ὂν ψύχει, ἐμπλάττει, παρηγορεῖ ἐγχυματισθὲν ἐπ' ὀφθαλμῶν φλεγμαινόντων. καταχυμάτα τε

ὠμ

ὠὰ. ἐᾷ φλυκταινοῦσθαι παραχρῆμα ὀπιχρισθὲν· περόσωπά τε ἀνεπίκαυτα τηρεῖ, ἀνακόλλημα δὲ ὄζει ῥευματιζομένων σὺν λιβανωτῷ λ' τοῦ μετώπου* πιθέμενον· φλεγμονάς τε ὀφθαλμῶν θεραπεύει ἐείῳ αὐαλιφθὲν μηλώτος ἀυτῷ ῥοδίνου καὶ οἴνου καὶ μέλιτος· ὠμὸν δὲ ῥοφηθὲν, αἱμορροΐδος δύγμασι βοηθεῖ. ἀκροχολιασθὲν δὲ πρὸς κύστεως δυγμοὺς καὶ νεφρῶν, καὶ τραχυσμοὺς τραχείας ἀρτηρίας, καὶ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ καταῤῥοὰς καὶ θώρακος ῥευματισμοὺς ἀφέλει.

Περὶ Τεττίγων. Κεφ. νε'.

Τέττιγες ὀπτοὶ ἐσθιόμενοι, τοῖς περὶ πλεύσιν ἀλγήμασι βοηθοῦσιν.

Περὶ Ἀκρίδων. Κεφ. νζ'.

Ἀκρίδες ὠφελοῦσι μάλιστα ταῖς ὀπὶ γυναικῶν ὠφελοῦσι.* ἡ δὲ λεγομένη ἀκρὶς* ἀσύραξ ἢ ὄνος, ἄπεφός ἐστι καὶ μεγαλόκωλος, περόσφατος· ξηραινθεῖσα δὲ σφόδρα σκορπιοδήκτοις ὠφελεῖ πινομένη σὺν οἴνῳ. οἱ δὲ αὐτὴν καταλόρους οἱ κατὰ λέπτιν λίβυες.

Περὶ Φίνιδος. Κεφ. νή.

Φίνις τὸ ὄργανον ὃ γυναῖκες καλοῦσιν* ὀσυφραγον, τούτου ἡ κοιλία καθ' ὀλίγον ποτιζομένη, λίθους ἐξου-

statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à solis adustione tuetur, fronti impositum cum thure fluxiones arcet, auertítq;: inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & vino, mí tigat: vtiliter cótra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest vesicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

Cicadæ. Cap. LVI.

Cicadæ, quæ inassatæ manduntur, vesicæ doloribus prosunt.

Locustæ. Cap. LVII.

Locustæ odoris suffitu vrinæ difficultates adiuuant, præsertim quę fœminas malè habét: earũ carnes nullo sunt in vsu. Est & quoddá genus locustæ, quæ asiracos aut onos dicĩ, sine pénis, prelógis crurib⁹. Exic cata autẽ si ex vino bibatur, cõ tra scorpionis morsus magnopere ꝓderit. Hac abúdè vescú tur Aphri, qui Leptin incolunt.

Osifragus. Cap. LVIII.

VENTER eius auis, quam Latini osifragum appellant, particulatim potus, calculos cum

cum lotio pellere proditur.

Galerita. Cap. LIX.

Galerita auicula est parua, apicem in vertice, pauonis modo, gestans: quę assa, & in cibo sumpta, cœliacos adiuuat.

Hirundines. Cap. LX.

Dissectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, vnum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terrã attigerint in iuuẽcæ corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirũdines, vti ficedulę, in cibo, aciei visus medicamẽtum præbent. Tam pullorum, quàm matrũm in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginæ eo commodè perunguntur: vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuãt, qui anginę morbo conflictantur.

Ebur. Cap. LXI.

Eboris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Suillus

ἐξουρεῖσθαι ποιεῖν ἱστορεῖται.

Περὶ Κορυδαλλοῦ. Κεφ. νθ'.

Κορυδαλλὸς ὀρνίθιόν ἐστι μικρὸν, ἔχον κατὰ τῆς κορυφῆς ὑπεροχὴν ὥσπερ ταῶνος. οὗτος βρωθεὶς ὀπτὸς, κοιλιακοὺς ὠφελεῖ.

Περὶ Χελιδόνος. Κεφ. ξ'.

Χελιδόνος νεοσσοὺς τοὺς ἐκ τῆς πρώτης νεοσσοποιίας, αὐξομένης τῆς σελήνης ἀνατεμὼν, εὑρήσεις ἐν τῇ γαστρὶ λίθους, ἐξ ὧν δύο λαβὼν, ἕνα ποικοίλον καὶ τὸν ἕτερον καθαρὸν, πρὸ τοῦ ἐπιψαῦσαι τῆς γῆς ἐνδύσας εἰς δέρμα δαμάλεως ἢ ἐλάφου, καὶ περιάψας βραχίονι ἢ τραχήλῳ, ἐπιληπτικοὺς ὠφελήσεις. πολλάκις δὲ καὶ παντελῶς ἀποκαταστήσεις. βιβρωσκόμεναι δὲ ὥσπερ αἱ συκαλίδες, ὀξυωπίας εἰσὶ φάρμακον. καὶ ἡ ἀπ᾽ αὐτῶν δὲ τέφρα καὶ ἡ τῶν μητέρων καεισῶν ἐν χύτρᾳ μετὰ μέλιτος χρισθεῖσα, ὀξυδορκίαν ποιεῖ. ἁρμόζει δὲ καὶ συναγχικοῖς διαχριομένη, καὶ πρὸς σταφυλῆς καὶ παρισθμίων φλεγμονὰς. σκελετευθεῖσαι δὲ αὗται καὶ οἱ νεοσσοὶ, συναγχικοὺς ὠφελοῦσι πινόμεναι μεθ᾽ ὕδατος πλῆθος < ά.

Περὶ Ἐλέφαντος. Κεφ. ξα'.

Ἐλέφαντος ὀδόντος ῥίνισμα, παρωνυχίας καταπλασθὲν θεραπεύει. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικήν.

Περὶ Ἀστρα-

Περὶ Ασφαλάκος. Κεφ. ξϛ'.

Ασφάλακος ὗς καὶς μέχρις αὖ ἂν μέλανος χρῶται λευκὸς, ἢ λεῖος πεθεὶς, ἐμπνευματώσις κώλου ἢ φθοίσις χρονίους ἰᾶται.

Περὶ Ελάφου κέρατος.

Κεφ. ξζ'.

Ελάφου κέρας καυσαμμένον ἢ πεπλυμένον, ἀμύζει πυόμενον πλῆθος δυοῖν κοχλιαρίων αἱμοπτοϊκοῖς, δυσεντερικοῖς, κοιλιακοῖς, ἰκτερικοῖς, κύστεως δηγμασι μετὰ τραγακάνθης, ῥοϊκοῖς δὲ γυναιξὶ μὴ ὑγροῦ τοῦ περὶ τὸ πάθος ἀμύζοντος. κάεται δὲ ἐν καμίνῳ καταβληθὲν ἢ κοπὲν εἰς ὠμὸν χύτραν πεπλασμένην πηλῷ, ἄχρις αὖ λευκὸν χρῶται. πλύνεται δὲ ὡς καδμία· τὸ δὲ τοιοῦτον ἀμύζει πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ὄγκους καὶ ῥεύματα· καὶ ὀδόντας παρατριβόμενον σήπει· ὠμὸν δὲ θυμιαθὲν, ἑρπετὰ διώκει· ἀποζεσθὲν δὲ μετ' ὄξους ἢ διακλυζόμενον, παρηγορεῖ ὀμφιάσεις.

Περὶ Καμπῶν. ξθ'.

Κάμπαι αἱ ὑπὸ τῶν λαχάνων χρωνύμεναι, πεφυσιόμενοι σὺν ἔλαίῳ ἀδήκτους ἀπὸ τῶν ἰοβόλων φυλάττειν λέγονται.

Περὶ Κανθαρίδων.

Κεφ. ο'.

Κανθαρίδες εἰς ἀπόθεσιν σύνθετοι αἱ ἀπὸ τ' ὄτου, αἳ βληθὲν εἰς ἀχυ-

Suillus talus. Cap. LXII.

Suis talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus inflationibus coli, longisque torminibus medetur.

Ceruinum cornu.

Cap. LXIII.

Cerui in cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cœliacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha: fœminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fictili, luto circūlito, & in furnum indito, vritur donec albescat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorū, & defluxionibus salutare est: infrictū dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpētes fugantur: feruefactum in accto, si eo gingiuæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Eruca. Cap. LXIIII.

Erucis, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo perunctis, à venenatis bestiis feriri negantur.

Cantharides.

Cap. LXV.

E frumētis cōgestę cātharides ad recōdēdū idoneæ sunt, quæ fictili

cum lotio pellere proditur.

Galerita. Cap. LIX.

Galerita auicula est parua, apicem in vertice, pauonis modo, gestans: quę assa, & in cibo sumpta, cœliacos adiuuat.

Hirundines. Cap. LX.

Dissectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, vnum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terrã attigerint in iuuécæ corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirũdines, vti ficedulę, in cibo, aciei visus medicamẽtum præbent. Tam pullorum, quàm matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginæ eo commodè perunguntur: vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuãt, qui anginę morbo conflictantur.

Ebur. Cap. LXI.

Eboris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Suillus

ἐξουρεῖσθαι ποιεῖν ἱστορεῖται.

Περὶ Κορυδαλλοῦ. Κεφ. νθ'.

Κορυδαλλὸς ὀρνίθιόν ἐστι μικρὸν, ἔχον κατὰ τῆς κορυφῆς ὑπεροχὴν ὥσπερ ταῶνος. οὗτος βρωθεὶς ὀπτὸς, κοιλιακοὺς ὠφελεῖ.

Περὶ Χελιδόνος. Κεφ. ξ'.

Χελιδόνος νεοττοὺς τοὺς ἐκ τῆς πρώτης νεοσσοποιίας, αὐξομένης τῆς σελήνης ἀνατεμὼν, εὑρήσεις ἐν τῇ γαστρὶ λίθους, ἐξ ὧν δύο λαβὼν, ἕνα ποικίλον καὶ τὸν ἕτερον καθαρὸν, πρὸ τοῦ ἐπιψαῦσαι τῆς γῆς ἐνδύσας εἰς δέρμα δαμάλεως ἢ ἐλάφου, καὶ περιάψας βραχίονι ἢ τραχήλῳ, ἐπιληπτικοὺς ὠφελήσεις. πολλάκις δὲ καὶ παντελῶς ἀποκαταστήσεις· βιβρωσκόμεναι δὲ ὥσπερ αἱ συκαλίδες, ὀξυωπίας εἰσὶ φάρμακον. καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν δὲ τέφρα καὶ ἡ τῶν μητέρων καεισῶν ἐν χύτρᾳ μετὰ μέλιτος χρισθεῖσα, ὀξυδορκίαν ποιεῖ. ἁρμόζει δὲ καὶ συναγχικοῖς διαχριομένη, καὶ πρὸς σταφυλῆς καὶ παρισθμίων φλεγμονὰς, σκελετευθεῖσαι δὲ αὗται καὶ οἱ νεοσσοὶ, συναγχικοὺς ὠφελοῦσι πινόμεναι μεθ' ὕδατος πλῆθος < α'.

Περὶ Ἐλέφαντος. Κεφ. ξα'.

Ἐλέφαντος ὀδόντος ῥίνισμα, παρωνυχίας καταπλασθὲν θεραπεύει. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικήν.

Περὶ Ἀσπαι-

Περὶ Ἀστραγάλου ὑός. Κεφ. ξϐ.

Ἀστράγαλος ὑὸς καεὶς μέχρις ἂν ἐκ μέλανος γένηται λευκὸς, καὶ λεῖος ποθεὶς, ἐμπνευματώσεις κώλου καὶ στρόφοις χρονίοις ἰᾶται.

Περὶ Ἐλάφου κέρατος.
Κεφ. ξγ.

Ἐλάφου κέρας κεκαυμένον καὶ πεπλυμένον, ἁρμόζει πινόμενον πλῆθος δυοῖν κοχλιαρίων αἱμοπτοϊκοῖς, δυσεντερικοῖς, κοιλιακοῖς, ἰκτερικοῖς, κύστεως ἀλγήμασι μετὰ τραγακάνθης, ῥοϊκαῖς δὲ γυναιξὶ μετ' ὑγροῦ τοῦ πρὸς τὸ πάθος ἁρμόζοντος. καίεται δὲ ἐν καμίνῳ καταβληθὲν καὶ κοπὲν εἰς ὠμὴν χύτραν περιπεπλασμένην πηλῷ, ἄχρις ἂν λευκὸν γένηται. πλύνεται δὲ ὡς καδμία· τὸ δὲ τοιοῦτον ἁρμόζει πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ἕλκη καὶ ῥεύματα· καὶ ὀδόντας παρατριβόμενον σμήχει· ὠμὸν δὲ θυμιαθὲν, ἑρπετὰ διώκει· ἀποζεσθὲν δὲ μετ' ὄξους καὶ διακλυζόμενον, παρηγορεῖ γομφιάσεις.

Περὶ Καμπῶν. ξδ.

Κάμπαι αἱ ἐπὶ τῶν λαχάνων γινόμεναι, περιχριόμεναι σὺν ἐλαίῳ ἀδήκτους ἀπὸ τῶν ἰοβόλων φυλάττειν λέγονται.

Περὶ Κανθαρίδων.
Κεφ. ξε.

Κανθαρίδες εἰς ἀπόθεσιν εὔθετοι αἱ ἀπὸ τοῦ σίτου, ἃς βαλὼν εἰς ἀκι-

Suillus talus. Cap. LXII.

Suis talus comburitur, dum è nigro albeſcat: qui tritus & potus inflationibus coli, longiſque torminibus medetur.

Ceruinum cornu.
Cap. LXIII.

Cerui in cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodeſt dyſentericis, excreantibus ſanguinem, cœliacis, regio morbo, & veſicæ doloribus cum tragacantha: fœminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contuſum, crudo fictili, luto circũlito, & in furnum indito, vritur donec albeſcat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorũ, & defluxionibus ſalutare eſt: infrictũ dentes expurgat. Crudi cornu ſuffiti nidore ſerpẽtes fugantur: feruefactum in aceto, ſi eo gingiuæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Eruca. Cap. LXIIII.

Erucis, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis beſtiis feriri negantur.

Cantharides.
Cap. LXV.

E frumẽtis cõgeſtę cãtharides ad recõdẽdũ idoneæ ſunt, quæ fictili

fictili vase nõ picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum cõuerso suspendũtur super aceti feruẽtis, q̃ acerrimi halitũ, donec ẽstu examinẽtur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in pẽnis trãsuersas habẽt, promissóq; corpore crassæ ac blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Bupreſtes, & pinorum erucæ. Ca. LXVI.

Simili modo reconduntur bupreſtes, genera quædã cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere pauliſper intoſtæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, vlcerare, calorem elicere, qua de causa admiſcentur medicamentis quæ lepras, feráſque lichenas & carcinomata ſanant. Menſes ciunt peſsis emollientibus additæ, Aliqui cantharidas antidotis impoſitas, aquæ ſubter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quòd vrinam moueant. Alij pennas pedesque contra potarum veneficia, remedio eſſe tradiderunt.

ἀκόγκιτον ἀγγεῖον, ἢ τὸ σῶμα περιδήσας ὀθονίῳ ἁπαλῷ, καθαρῷ, φεικατάτριφον ἀτμῷ ζέοντος ὄξους ἀρτιωτάτου, καὶ ἕως ἂν πιγῶσι κράτει· εἶτα διαπείρας λίνῳ ἀποτίθεσο. ἐεργέσατοι δὲ εἰσὶν αἱ ποικίλαι, καὶ μηλίνας ἐπικαρσίοις ζώνας ἔχουσαι ἐν τοῖς πτερυξῖν, ὀπιμύκεις τὸ σῶμα, ἀδρᾶι, ἐμπίμελοι, ὡς αἱ σίλφαι· ἄτονοι δὲ εἰσὶν αἱ μονάχρωμοι.

Περὶ Βουπρήστου.

Κεφ. ξς'.

Ωσαύτως δὲ ἀποτίθενται καὶ αἱ βουπρῆστες, εἴδος οὖσαι κανθαρίδων, καὶ αἱ πιτυοκάμπαι· καὶ αὗται δὲ ἐπὶ κοσκίνου ἐπαωρευμένου, θερμοπαθεῖᾳ φωγυμένῳ, ἐπὶ βραχὺ ἀποτίθενται. δύναμις δὲ αὐτῶν κοινὴ, σηπτικὴ, ἑλκωτικὴ, θερμαντική· ὅθεν μίγνυται φαρμάκοις τοῖς τὰ καρκινώδη καὶ λέπρας καὶ λειχῆνας ἀγρίους θεραπεύουσιν. ἄρσεσι δὲ καὶ ἐμμήνια πεσσοῖς μαλακτικοῖς μιγεῖσαι. ἔνιοι δὲ ἰσόρροπον τὰς κανθαρίδας καὶ ὑδρωπικοῖς βοηθεῖν, μιγνυμένας αὐτιδότοις ὡς οὖρησιν κινούσας. οἱ δὲ, γ. τὰ πτερὰ αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας τοῖς πιοῦσιν αὐτὰς αὐτοφάρμακον ἀνέγραψαν.

Περὶ σα-

Sala-

Περὶ Σαλαμάνδρας. Κεφ. ξζ'.

Σαλαμάνδρα εἶδός ἐστι σαύρας· ἔστι δὲ νωχελὲς, ποικίλον, μάτην πιστευθὲν μὴ καίεσθαι. Δύναμιν δὲ ἔχει σηπτικὴν, ἑλκωτικὴν, θερμαντικήν. μίγνυται δὲ σηπταῖς καὶ λεπρικαῖς ὡς αἱ κανθαρίδες, καὶ ἀποτίθεται ὁμοίως. ψιλοῖ δὲ καὶ τρίχας τακεῖσα μετ' ἐλαίου. φυλάσσεται δὲ καὶ ἐν μέλιτι ἐξεντερισθεῖσα, τῶν ποδῶν καὶ τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεθέντων εἰς τὴν αὐτὴν χρῆσιν.

Περὶ Ἀράχνης. Κεφ. ξη'.

Ἀράχνη τὸ ζῶον, ὃ ὁλκὸν ἔνιοι ἢ λύκειον καλοῦσι, συμμαλαχθεῖσα σπληνίῳ, καὶ ἐμπλασθεῖσα εἰς * ὀθόνην, προστεθεῖσα μετώπῳ ἢ κροτάφοις, τριταϊκὰς περιόδους ὑγιάζει. τὸ δὲ ὕφος αὐτῆς ἐπιτιθέμενον αἷμα ἵστησι, καὶ ἀφλέγμαντα τηρεῖ τὰ ἐπιπόλαια τῶν ἑλκῶν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος ἀράχνης, κατασκευάζον τὸν ὑμένα λευκὸν, λεπτὸν, καὶ πυκνόν· ὃ ἱστορεῖται ἐνδεόμενον εἰς κυτίδα, καὶ περιαπτόμενον βραχίονι, τεταρταϊκὰς περιόδους θεραπεύειν. συνεψηθὲν δὲ ῥοδίνῳ ὠταλγίαις βοηθεῖ ἐγχεόμενον.

Περὶ Σαύρας. Κεφ. ξθ'.

Σαύρας ἡ κεφαλὴ λεία ἐπιτεθεῖσα, σκόλοπας ἐξάγει καὶ πάντα τὰ ἐμπεπηγότα.

αἴρει

Salamandra. Cap. LXVII.

Salamādra lacertę genus est, iners, varium: quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriā, exulcerantem. Additur, vt cantharis, in medicamenta, quorū vis est exesse, & lepras abolere: similique modo reconditur. liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem vsum.

Araneus. Cap. LXVIII.

Araneus quem holcum, alij lycon, id est lupū vocant, subactus cū splenio, & linteo illitus, prolatusque vtrisq; temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, dēsamq; telam orditur: quem in aluta ligatū, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrāt. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

Lacerta. Cap. LXIX.

Lacertæ caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixa extrahit:

varos, formicátes verrucas, & penſiles, quas acrochordonas vocát, tollit. Iecur exeſis dentibus cóiectũ dolores finit. Si diuulſa admoueatur, ictis à ſcorpione leuamentum præſtat.

Seps. Cap. LXX.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocarunt, in vino pota morſus ſuos ſanat.

Scincus. Cap. LXXI.

Scincus aut Ægypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritaniæ. Eſt autem terreſtris crocodilus, ſui generis, ſale inueteratus cum naſturtio. Aiunt carnes, quæ renes amplectantur, id ſibi virium vendicaſſe, vt ſi drachmæ ponderè bibantur, venerem accendant. Verum decocto lentis cum melle aut ſemine lactucæ cum aqua poto, veneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota.

Terreni vermes. Cap. LXXII.

Terreni vermes impoſiti, præciſos neruos glutinant, tertianas diſcutiunt: decocti cũ anſerino adipe, & infuſi, affectis auribus medétur: cum oleo autẽ decocti, ſi in contrariã auré inſtillentur, dentium doloribus præ-

ἄῤῥει δὲ καὶ μυρμηκίας, καὶ ἀκροχορδόνας, καὶ ἥλους.* τὸ δὲ ἧπαρ αὐτῆς ἐντεθὲν τοῖς τῶν ὀδόντων βρώμασιν, ἀπονίαν ποιεῖ. ὅλη δὲ αὐαχθεῖσα, καὶ ἐπιτεθεῖσα σκορποπλήκτοις κουφίζει. 5

Περὶ Σκίνκος. Κεφ. ὁ.

Σκίγκος, ὃν ἔνιοι σαύραν ἐκάλεσε χαλκιδικὴν, ἐν οἴνῳ ποθεῖσα, τοὺς ὑφ' αὐτῆς δηχθέντας ἰᾶται.

Περὶ Σκίγκου. Κεφ. οά.

Σκίγκος ὁ μὲν τίς ἐστιν αἰγύπτιος, ὁ δὲ ἰνδικὸς, ἄλλος ἐν τῇ ἐρυθρᾷ γεννώμενος· ἕτερος δὲ ἐν τῇ λυδίᾳ τῆς μαυρουσιάδος εὑρίσκεται. ἔστι δὲ κροκόδειλος χερσαῖος, ἰδιογενὴς, ταριχευόμενος ἐν καρδάμῳ. φασὶ δὲ δύναμιν ἔχειν πρὸς τὰ περὶ τοὺς νεφροὺς αὐτοῦ μέρεσι, ὅσον ⊲ πλῆθος μετ' οἴνου, ὀρμητικὰ πρὸς τὰ ἀφροδίσια· ἀποπαύεσθαι δὲ τὴν ἐπίτασιν τὴν προθυμίας, φασὶ, ἀφεψήματι μετὰ μέλιτος πινομένῳ ἢ θρίδακος σπέρματι μεθ' ὕδατος. μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις.

Περὶ τῶν τῆς γῆς ἐντέρων. Κεφ. οβ'.

Γῆς ἔντερα λεῖα ἐπιτεθέντα, νεύρων ἀποκοπὰς κολλᾷ, λύει δὲ καὶ τεταίους· ἐψηθέντα δὲ σὺν χλωρῷ στέατι, διαθύσῃς ὦτων ἐγχριόμενα θεραπεύει· συνεψηθέντα δὲ ἐλαίῳ καὶ ἐγχεόμενα εἰς τὸ αὐτικείμενον ὠφελεῖ ὀδοντολγίας βοηθεῖ·

βοηθεῖ· ἄγει δὲ καὶ οὖρα λεῖα πινόμενα ζαὼ γλυκεῖ.

Περὶ Μυογάλης. Κεφ. ογ'.

Μυογάλη αὐαχθεῖσα καὶ ὀπτηθεῖσα, ἄκος ἐστὶ τοῦ ἰδίου δήγματος.

Περὶ Μυῶν. Κεφ. οδ'.

Μύας τοὺς κατοικιδίους ἀναιρήθέντας, σκορπιοπλήκτοις ἀφελίμως ἐπιτίθεσθαι ὁμολογεῖται· βρωθέντας δὲ ὑπὸ παίδων ἀναιρεῖν τὸ ἐν τοῖς στόμασιν αὐτῶν σίελον.

Περὶ Γάλακτος. Κεφ. οε'.

Γάλα κοινῶς μὲν πᾶν, εὔχυμον, τρόφιμον, μαλακτικὸν κοιλίας, φυσητικὸν στομάχου καὶ ἑτέρων· ὑπαρίστερα μέντοι τὸ ἀραιὸν τοῦ θρεπτικοῦ, καὶ τὸ ἀπὸ χλωρᾶς νομῆς μᾶλλον ὂν μαλακτικὸν κοιλίας. ἔστι δὲ καλὸν γάλα, τὸ λευκὸν καὶ ὁμαλὸν τῇ παχύτητι, καὶ συστρεφόμενον ἐπειδὰν ὀπταλῇ ὄνυχι. τὸ δὲ αἴγειον ἧττον κοιλίας ἅπτεται διὰ τὸ τὰς αἶγας τὸ πλεῖον συφοῦσθαι νομῇ χηλαῖ· δρυὶ καὶ σχίνῳ, καὶ θαλίᾳ, καὶ τερμίνθῳ· ὅθεν καὶ εὐστόμαχον τυγχάνει. τὸ δὲ προβάτειον ὂν * παχύ τε καὶ γλυκὺ καὶ παχυλιπαρόν, οὐχ οὕτω δὲ εὐστόμαχον. τὸ μέντοι βόειον καὶ ὄνειον καὶ ἵππειον, εὐκοιλιώτερα καὶ ταραχτικά. πᾶν δὲ γάλα κοιλίας καὶ στομάχου αὐαξητικὸν, ὅπου

præstant auxilium: triti in potu ex passo vrinam ciunt.

Mus araneus. Cap. LXXIII.

Mus araneus dissectus, & impositus, sui morsus venefícia luit.

Mures. Cap. LXXIIII.

Mures, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis vtilissimè imponi, in cõfesso est: si inassatos infantes ederint, oris saliuam exiccari promittunt.

Lac. Cap. LXXV.

Lac generatim omne boni succi est: corpus alit, aluum emollit, stomachum & intestina inflatione vexat: vernum tamen dilutius æstiuo habetur, & è viridi pabulo aluum magis emollit. Probatur autè candidũ, equali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniá pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimũ reddi solet. Ouillum aũt dulce, crassum, & præpingue, non vsque adeò vtile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinũ, venturi magis idonea: sed ipsum turbant.

Quibus in locis pecora, ſcammoniam, veratrũ, clematidem, aut mercurialem paſcũtur, lac omne ventrem, & ſtomachum ſubuertit. quale in Iuſtinis mõtibus eſſe, à nobis proditũ eſt. Siquidem capræ, quibus candidũ veratrũ pabulo fuerit, primo foliorũ partu euomunt: & eorũ lac hauſtũ nauſeã creat, & ſtomachũ in vomitiones effundit. Ventrẽ adſtringit lac omne decoctũ, præcipuéq; candentibus calculis marinis exuſtũ: & in ſumma, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præſertim faucium, pulmonis, interaneorũ, veſicæ, & renum: foris verò contra pruritũ cutis, eruptiones papularũ, & vitiatos corporis ſuccos, recẽs cum melle crudo, addito ſale, datur exigua aqua dilutũ. Minus inflat quodcũq; ſemel feruefactũ. Decoctũ cum calculis marinis ad dimidias, vlceroſas ventris fluxiones adiuuat.

Serum lactis. Cap. LXXVI.

Lac quodcunq; ſerum continet implicitũ, quod vbi diſceſſit à lacte, multò potentiſimũ ad purgatiões redditur. Datur quibus ſine acrimonia volumẽ deiectionem moliri, vt melancholicis, comitialibꝰ, lepris, elephantiis

ὅπου ὄϊς γομὴν σκαμμωνίαν, ἢ ἑλλέβορος, ἢ λινόζωστις, ἢ κλῆματίς. ὡς καὶ ἐν τοῖς ἰουστίνοις ὄρεσιν ὑφ' ἡμῶν ἱστόρηται· αἱ γὰρ αἶγες ἐμούμεναι τοῦ λευκοῦ ἐλλεβόρου τὰ φύλλα, κατὰ τὴν πρώτην ἐκβλάστησιν αὐτῶν. αὗται ἐμοῦσι· καὶ τὸ γάλα ἀναπεπτικὸν σωμάχου καὶ ναυτίας γίνεται. ἐμπλαστὸν δὲ τῶν γάλακτος στυπτικὸν γίνεται κοιλίας καὶ μάλιστα τὸ διαπύοις κόχλαξιν ἐξικμαδὲν, κοινῶς δὲ καὶ τοῖς ἐντὸς ἐλκώσεσι βεβοηθεῖ, μάλιστα δὲ βρόγχου, πνεύμονος, ἐντέρων, νεφρῶν, κύστεως, καὶ πρὸς τοὺς τῆς ὀπισθίας ἕδρας μυσμοὺς, ἐξανθήματα, καὶ κακοχυμίας δίδοται πρωΐ μετὰ μέλιτος ὠμοῦ καὶ ὕδατος σωμμετρουμένου ὀλίγου, μιγνυμένων καὶ ἁλῶν. ἀφυστότερον δὲ γίνεται ἀποζεσθὲν ἅπαξ. τὰ δὲ τῆς κοιλίας μετ' ἐλκώσεως ῥεύματα, ἄχρις ἡμίσεως τοῖς κόχλαξιν ἐμπλασθὲν ὠφελεῖ.

Περὶ Ὀρροῦ γάλακτος.

Κεφ. ος'.

Ἔχει δὲ πᾶν γάλα περιπεπλεγμένον τὸν ὀρρὸν, ὃς χαλόμενος πρὸς κάθαρσιν ἐυτονώτερος γίνεται. διδόμενος ἐφ' ὧν δεῖ διαμύσσεως ἐκκρισιν βουλόμεθα ποιῆσαι, ὡς ἐπὶ μελαγχολικῶν, ἐπιληπτικῶν, λέπρας, ἐλεφαντιά-

πάσεως, καὶ ἐξανθημάτων τῶν ἐπὶ ὅλον τὸ σῶμα.

Περὶ Σχιστοῦ γάλακτος.

Κεφ. οζ'.

Σχίζεται δὲ πᾶν γάλα ζεννύμενον ἐν καινῇ χύτρᾳ καρφίᾳ ἢ κινήμυρον κλάδῳ συκίνῳ νεοτμήτῳ, καὶ μετὰ τὸ ζέσαι δὶς ἢ τρὶς ἐπῤῥαίνεται ὀξυμέλιτος κύαθος, ὡσὲ ἑκάστῃ κοτύλῃ τοῦ γάλακτος· οὕτω γὰρ διοείζεται ὁ ὀρρὸς τοῦ τυρώδους. δεῖσει δὲ ὡσὲ τὸ μὴ ὑπὸρ ζῶν τὸ γάλα, ἐν τῇ ἑψήσει πόγγῳ ἐν ψυχροῦ σωεχῶς ἀποψᾶν τὸ χεῖλος τῆς χύτρας, καὶ ἔξωθεν ἀρυσσῶν πλήρη ὕδατος ψυχροῦ καθιέναι. ποτίζεται δὲ ὁ ὀρρὸς ἐν διασήματος κοτύλην ἄχρι πέντε κοτυλῶν, ἐν δὲ τοῖς μεταξὺ διασήμασι πειπατείτωσαν οἱ πίνοντες. πιεῖ δὲ τὸ ὡσόφατον γάλα καὶ ὡσὸς τοὺς ἀπὸ τῶν ἰσχιάσμων φαμάκων ἐγχυμοῦ καὶ πυρώσεις, ὡς καντθαρίδος ἢ σιτυοκάμπης, ἢ σαλαμανδρας, ἢ βουπρήστεως ἢ ὑοσκιάμου, ἢ δορυκνίου, ἢ ἀκονίτου, ἢ ἐφημέρου· ὡσὸς δὲ τοῦτο μάλιστα τὸ βόειον συμφέρει ἰδίως ἀρμόζον. διακλύζεται δὲ ἡ ὡσὸς ἑλκώσεις σομάτων καὶ παρεισθμίων εἰς ἀναγαργάρισμα. ἰδίως δὲ τὸ ὄνειον διακλυζόμενον, οὖλα καὶ ὀδόντας κραπαιοῖ τόν τ' ἐν τῆς κοιλίας μὲν ἑλκώσεως ῥευματισμοὺς

phantiis, & crumpentibus toto corpore papulis.

Schistum lactis.

Ca. LXXVII.

Ex omni lacte fit, quod schistũ, id est scisile, appellant. Lac aũt fictili nouo feruet, ramóq; ficulneo recéti mouetur, inspar sis, postquã bis aut ter efferbue rit, totidé aceti mulsi cyathis, quot sunt heminæ lactis: ita enim sereſcés liquidũ ab eo diuiditur, quod in caseũ concreuit. Sed cũ feruet, ne superfundatur, cõueniet spongia ex frigida continuò fictilis labrum detergere, sextariũq; argenteũ frigidæ aquæ plenũ demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, vsque ad quinas, ita vt intercedentibus spatiis, potantes ambulent. Lac autẽ recens efficax est contra rosiones vstionésque, ab exitialibus medicamentis factas, vti à cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: præsertim bubulum ad id eximiè cõfert. Gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisque. Asininũ peculiariter collutos dentes gingiuasque stabilit. Fluxiones alui, si vlcera sentiãtur,

teneſmosq;, ouillum, bubulum aut caprinũ cũ marinis lapillis decoctũ, ſiſtit: per ſe autẽ & cũ hordeacea ptiſana aut halicaceo cremore infuſum magnopere inteſtinorũ roſiones mitigat: exulceratę vuluæ immittit.

Lac muliebre.
Cap. LXXVIII.

Humanum lac dulciſsimum eſt, & maximè alit: mammis autem exuctum, prodeſt tabi, & ſtomachi roſionibus: cõtra hauſtum leporem marinum præſidio eſt: oculis cruore ex ictu ſuffuſis, cum thuris polline inſtillatur: podagricis vtile eſt, cum meconio, & cerato illitum. Lac omne reſpuendum ſplenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginoſis, & neruorum vitio laborantibus, febriculoſis, & capite dolentibus: niſi ſi quis interdum purgationis gratia, vt oſtendimus, ſchiſtum præbeat. Primiparæ canis lacte peruncto narrant glabreſcere: potum contra venena antidoti vicem obtinet, abortus mortuos expellit.

Caſeus recens:
Cap. LXXIX.

Caſeus recens ſine ſale ſumptus alit, ſtomacho vtilis eſt, &

καὶ τεινεσμοὺς πρεβάτειον ἢ βόειον ἢ ἄγειον ἴσησιν ἐψηθὲν διὰ κοχλάκων ἐγκλύζεται δὲ ἡ καθ' ἑαυτὸ ἢ μετὰ πίσσης ἢ χόνδρου ξυλοῦ, ἱκανῶς πρεφύων τὴν τῶν ἑτέρων δύξιν· ἐγκλύζεται δὲ ἡ ς μήτρα εἰλχομβύῳ.

Περὶ Γυναικείου γάλακτος. Κεφ. οή.

Τὸ δὲ τῆς γυναικὸς γάλα γλυκύτατόν ἐστι καὶ πρυφιμώτατον· ὠφελεῖ δὲ θυλαζόμβυον, στομάχου δύξιν καὶ φθίσιν· ἀμύζει δὲ καὶ πρὸς λαγωοῦ θαλασσίου πόσιν· μιγὲν δὲ λιβανωτῷ, λείῳ, ἐνστάζεται τοῖς ἐκ πληγῆς αἱματηθεῖσιν ὀφθαλμοῖς· καὶ ποδαγικοὺς ὠφελεῖ, σὺν μηκωνείῳ καὶ κηρωτῇ καταχριόμβυον. ἄβρωτον δὲ παῖ γάλα ἀπλυσικοῖς, ἡπατικοῖς, σκοτωματικοῖς, ἐπιληπτικοῖς, τοῖς τὸ νευρῶδες πάθοισι, πυρέσσουσι, κεφαλαλγοῦσιν· εἰ μή ποτε καθάρσεως ἕνεκά τις πρυσφέρει τὸ χρεὼν ὡς ὑποδέδεικται. ἰσχεροῦσι δέ τινες τὸ τῆς πρωτοτόκου κύνος γάλα φιλοῦσι πείσας καταχρίειν, καὶ θανασίμων φαρμάκων ἀντιφάρμακον πεδὲν ἡ πεπωκότων ἐμβρύων ἐκβόλιον.

Περὶ Τυρῶν γλαρῶν.
Κεφ. οθ'.

Τυρὸς γλαρὸς δύσχα ἀλῶν ἐστὶ δίμβυος πρόφιμος, εὐσόμαχος, εὐγλά-

ἀναπάδοτος· σαρκῶν ποιητικὸς, κοιλίας μετρίως μαλακτικός· διαφέρων αὐτοῦ αὐτὸς παρὰ τὴν τοῦ γάλακτος φύσιν, ἀφ' οὗ συνεστάζεται. ἐψηθεὶς δὲ καὶ ἐνθλιβεὶς, εἶτα ἀποπηθεὶς, σαλτικὸς γίνεται κοιλίας· ὠφελεῖ δὲ καταπλασσόμενος ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ ὑπώπια. ὁ δὲ νεώτερος, εὐστροφώτερος ἐδιόμυος· καὶ πρὸς καθάρσεις* σαρκὸς ἐπιτήδειος, κακοστόμαχος, λυπῶν κοιλίαν· καὶ ἔντερα. ὁ δὲ παλαιότερος, κοιλίας σαλτικός. καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς ὀρρὸς, κυνῶν τροφιμώτατος.

coagulatur, & facilè in mẽbra delegatur: corpus auget, aluum modicè emollit: alius tamen alio præstãtior, pro natura lactis à quo conficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde inassat⁹, aluũ sistit: illitus, oculorũ inflammationibus, & fugillatis prodest. Qui verò recens salitus est, minus alimenti præbet: corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotiũ ventri interaneisq; exhibet: vetustiore sistitur aluus. Sero quod à caseo manauit, quàmoptimè canes alũtur.

Περὶ Ἱππάκης. Κεφ. π'.

Caseus equinus. Ca. LXXX.

Η δὲ* καλουμένη ἱππάκη, τυρός ἐστιν ἵππος, βρομώδης, καὶ πολύτροφος, ἀναλογῶν τῷ βοείῳ. ἔνιοι δὲ ἱππάκην ἐκάλεσαν τὴν ἵππειον πυάν.

Quod hippacen vocant, caseus est equinus: ea virus redolet, magnopere alit, bubulóq; proportione respondet. Nec desunt, qui hippacen, equinum coagulum appellarint.

Περὶ Βουτύρου καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ λιγνύος. Κεφ. πά.

Butyrum, & eius fuligo. Cap. LXXXI.

Βούτυρον σκευάζεται καλὸν ἐκ τοῦ λιπαρωτάτου γάλακτος, τοιοῦτον δὲ ὅτι τὸ πρόβατείον γίνεται· δὲ καὶ ἐκ τοῦ αἰγείου ἐν ἀγγείοις κινουμένου τοῦ γάλακτος, καὶ χωριζομένου τοῦ λίπους. ἔχει δὲ δυνάμεως μαλακτικῆς, καὶ αἰώδους· ὅθεν κοιλίας τὲ ἐκλύει πλέον ποθέν· καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα μὴ παρόντος καὶ ἄλλου χρησιμεύει. μιχθὲν δὲ μέλιτι καὶ παραπεισθὲν, ὀδοντιάσεις ὠφελεῖ, καὶ τὸν

E lacte pinguissimo probatum fit butyrum, quale ouillum est: fit & ex caprino, agitato in vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est & emolliens: vnde largius epotum, ventrem resoluit: prodest, vbi oleum non adfuerit, contra venena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuuat:

gingiuarũ pruritus, & oris vlcera infantibus emendat. Illitũ foris capaciora alimentorũ facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatẽtibus asserit. Cótra inflammationes & duritias vuluæ, quod nec virus resipit, nec vetustate sentit, butyrũ efficax est: dysentericis, & coli exulcerationib⁹ infundit: in medicamẽta addi solet, quæ pus mouẽt: vtile præsertim cum nerui, aut cerebri mẽbranę, vesicæ ceruix, vulnera acceperit. Id autẽ purgat, replet, carnem creat, ab aspide percussis vtilissimè imponitur. Recens obsoniis additũ olei vicem pẽsat, & adipis vice fũgitur in bellariis. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrũ in lucernã nouam ingestũ accenditur, fictiliq; operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quẽ facere institueris: penna post deraditur ad vsus. Eius effectus est in medicamẽtis oculorum, exiccare & adstringere: fluxiones cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem perdukit.

Medi-

καὶ τὸς τῶν οὔλων ὀδαξισμοὺς ἐπὶ παίδων καὶ ἄφθας. ἔξωθεν δὲ καταπλασσόμενον, σῦτροφον καὶ ἀψυδρακίωτον τηρεῖ τὸ σῶμα. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς φλεγμονὰς καὶ σκληρίας ὑστέρας τὸ μὲν δυσῶδες μὴ δὲ παλαιόν· πρός τε δυσεντερείας καὶ πρὸς κόλου ἕλκωσιν ἐγκλυζόμενον· πυοπτοϊκῶς τε μίγνυται χρησίμως· καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν κατὰ τὰ νεῦρα καὶ μυὸς καὶ νεύρων καὶ κύστιν καὶ τραχήλου τραυμάτων. τὸ δ' αὐτὸ πληροῖ καὶ καθαίρει καὶ σαρκοῖ, καὶ τοὺς ὑπὸ ἀσπίδος δηχθέντας ὀπτηθὲν ὠφελεῖ. μίγνυται δὲ καὶ πρὸς ψίμμυσιν αὐτὶ ἐλαίου τὸ νεαρὸν, καὶ ἐν τοῖς πέμμασιν αὐτὶ στέατος. Σωμάζεται δὲ καὶ λιγνὺς ἐκ τοῦ βουτύρου τὸν τρόπον τοῦτον· εἰς λύχνον καινὸν ἐγχέας τὸ βούτυρον ἄφλον, καὶ πωμάσας ἀγγείῳ κεραμεῷ σωληνοειδεῖ ἐνθῦ κατὰ τὰ αὐλωδες, τρήματα δὲ ἐκ τῶν ὑπὸ πόδας ἔχοντι ὥσπερ οἱ κλίβανοι, ἃ καπνοδόκας· ὅταν δὲ ἀναλωθῇ τὸ πρῶτον βούτυρον, ἄλλο ἐπίχει, καὶ ποίει τὸ αὐτὸ ἕως ἂν δόξῃ πλῆθος βούλει ἀναλώσης· εἶτα ἀπόσυρον πλεῖῳ καὶ ἧττον. Δύναμιν δὲ ἔχει εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ξηραίνειν καὶ ἀποσύφειν, ἐφίστησι δὲ τὰ ῥεύματα, καὶ τὰ ἕλκη ἀπουλοῖ ταχέως.

Περὶ Ἐείου

Περὶ Ἐρίων. Κεφ. πβ'.

Ἔρια οἰσυπηρὰ ἄριστα τὰ ἁπαλὰ, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ τραχήλου καὶ τῶν μηρῶν. ἁρμόζοντα ἐν ἀρχῇ πρὸς τραύματα, θλάσματα, ἀποσύρματα, πελιώματα, ὀστῶν κατάγματα, βρεχόμενα ὄξει καὶ ἐλαίῳ ἢ οἴνῳ· δεκτικὰ γάρ ἐστι τῶν ἐμβρεγμάτων καὶ μαλακτικὰ διὰ τὴν οἴσυπην· ποιεῖ καὶ πρὸς κεφαλαλγίας καὶ στομάχου πόνους καὶ παντὸς ἄλλου τόπου, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ ἐπιτιθέμενον.

Περὶ Ἐρίων κεκαυμένων.

Κεφ. πγ'.

Τὰ δὲ κεκαυμένα ἔρια, δύναμιν ἔχει ἐσχαρωτικὴν, ὑπερσαρκωμάτων σταλτικὴν, ἀπουλωτικὴν, ἑλκῶν. καίεται δὲ καθαρὰ διαξανθέντα ἐν ὠμῇ χύτρᾳ, ὥσπερ τὰ λοιπά. τὸν δ' αὐτὸν τρόπον καὶ κροκύδες καίονται θαλασσίας πορφύρας. τινὲς δὲ σὺν τῷ ῥύπῳ διαξάναντες τὰ ἔρια καὶ μέλιτι δεύσαντες, καίουσιν ὡσαύτως. ἄλλοι δὲ διαθέντες ὀβελίσκους ἐπὶ πλατυστόμου κεραμέου ἀγγείου διεστῶτας ἀπ' ἀλλήλων, καὶ ἐπιθέντες σχίδακας δᾳδίων ἰσχνάς, καὶ ἐπάνω θέντες τὰ ἔρια διεξασμένα καὶ βεβρεγμένα ἐλαίῳ οὕτως ὥστε μὴ ἀποστάζειν, καὶ πάλιν σχίδακας καὶ ἔρια ἐναλλὰξ ἐπιθέντες, ἐκ τῶν δᾳδίων κάτωθεν ὑφάπτουσι, καέντα δὲ αἴρουσι. καὶ

Medicina lanarũ. Ca.LXXXII.

Succidæ lanæ molles è collo feminibúsq; laudatiſsimæ habentur. Subueniũt inter initia vulnerib⁹, percuſsis, deſquammatis, liuidis, oſsib⁹ fractis, aceto, oleo aut vino imbutę: ſiquidem facilè ſuccos combibunt quibus immergũtur, & ob pecudum ſordem (ſic enim œſypum vocant) emolliũt: capitis, ſtomachi aliarũq; partium doloribus, cum aceto & roſaceo efficaciter imponuntur.

Crematarũ lanarũ cinis.

Cap. LXXXIII.

Crematarum lanarum cinis cruſtas obducit, excreſcẽtias in carne cohibet, & vlcera ad cicatricem perducit. Mundę autem & carptæ, in fictili crudo cęterorum more vtuntur. Nec ſecus fimbriati marinarũ purpurarum flocculi cremari ſolent. aliqui cum ſordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo vrunt. Alij in fictili oris patuli verucula inter ſe diſtãtia componũt, & concerptas carminatasq; lanas oleo ita ſuffuſas, vt ne ſtillare q.dem poſsint, aſſulis tedæ ſubiectis, & eiſdem lanisque permutatim interſtratis, leuiter ſuccendunt, & vſtas tollunt: quod

quod si è teda pix, pinguitudóve vlla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & cõsidere patiunt: idq; sæpius, mutãtes aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

OEsypũ. Cap. LXXXIIII.

OEsypũ vocãt Græci, succidarum lanarũ pinguedinẽ. Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles, radicula nõ curatæ, calida aqua lauãtur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnóq; impetu ligula, vti respumet, agitatur, aut lignea rude validiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & considẽte pingui quod supernatabat, collectóque in altero fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitatur: spuma iterũ mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum œsypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcitia, confestim demit: exclusaq;

καὶ εἴτι λίπος ἢ πίττα ἐκ τῆς δαδίου ἀπορρεῖ, συναναιρεῖται καὶ ἀποτίθεται. πλύνεται δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικά. ἐν κεραμέῳ κρατῆρι ὕδατος ἐπιχεομένου. καὶ καταρασσομένου εὐτόνως ταῖς χερσὶ, καὶ μετὰ τὸ ἀποκαταστῆναι ἀποχεομένου τοῦ ὑγροῦ, καὶ ἄλλου ἐπιχεομένου καὶ πάλιν ἀναταρασσομένου· καὶ τοῦτο γίνεται ἄχρις ἂν προσφερόμενον τῇ γλώττῃ μὴ δάκνῃ· ποσῶς δὲ στύφῃ.

Περὶ Οἰσύπου. Κεφ. πδ΄.

Οἴσυπος δὲ λέγεται τὸ ἐκ τῶν οἰσυπηρῶν ἐρίων λίπος. ὃ κατασκευάσεις οὕτως· λαβὼν ἔρια μαλακὰ οἰσυπηρὰ ἔκπλυνον, ἐστουθισμένα θερμῷ ὕδατι, ἅμα ἐκθλίβων πᾶσαν τὴν ῥυπαρίαν, καὶ βαλὼν εἰς κρατῆρα πλατύστομον καὶ ἐπιχέας ὕδωρ ἀνάχει ἀρυτῆρι ταράσσων ῥαγδαίως, ἕως ἂν ἀφρίσῃ, ἢ ξύλῳ ἀνατάρασσε εὐτόνως, μέχρις ἂν ὁ πολὺς ἀφρὸς καὶ ῥυπαρὸς συλλεγῇ, εἶτα κατάρραινε θαλάσσῃ· καὶ ὅτε καταστῇ τὸ ἐπινηχόμενον λίπος, ἀναλάμβανε εἰς ἕτερον κεραμεοῦν ἀγγεῖον, ἐπιχέας τε ὕδωρ εἰς τὸν κρατῆρα, πάλιν τάρασσε καὶ κατάρραινε τῇ θαλάσσῃ τὸν ἀφρὸν, καὶ ἀναλάμβανε· καὶ τὸ αὐτὸ ποίει ἄχρις ἂν μηκέτι ἀφρὸς ἐφίσηται δαπανηθέντος τοῦ λίπους. τὸν μέντοι ἀνῃρημένον οἴσυπον τῇ χειρὶ μαλάξας, παραχρῆμα ἀναίρου εἴ τινα ἔχει ἀκαθαρσίαν, στραγγίζων

σταλίζων τὸ περιττὸν ὕδωρ καὶ μὴ λο ἐπιχέων, καὶ κινῶν τῇ χειρὶ, ἄχρις ἂν περιτρόμωσι τὴν γλῶ τὴν καὶ ὑπίκην ποσῶς ἡ σύφη, λίπαρος καὶ καθαρὸς καὶ λευκὸς φανῇ· ἔπειτα δὲ ἀποτίθεσο εἰς ἀγγεῖον κραμεοῦν. ἐν ἡλίῳ ἢ θερμῷ γινέ δων παῖ α. ἔνιοι δὲ διηθήσαντες τὸ λίπος πλύουσιν ἐν ὕδατι· ψυχρῷ δὲ χρὸν ἀναπείσοντες, ὡς μὴ κηρῶδες αἱ γυναῖκες γίνε) ἢ ὁ τοι ἔπος λευκότερος. οἱ δὲ πλύαντες τὰ ἔρια καὶ ξυθλίψαντες ῥύπον, ἕψουσι μὲν ὕδατος ἐν λέβητι πυρὶ κάρφω, καὶ τὸ ἐφικτὰ μᾶλλον λίπος ἀφαιρεῦντες, πλύουσιν ὕδατι ὥσπερ εἴρηται· καὶ διϋλίζοντες εἰς λοπάδιον κεραμεοῦν ἔχον ὕδωρ θερμὸν, λινῷ τε ῥάκει περιπυμάζοντες, πιδίασιν ἐν ἡλίῳ, μέχρις ἂν αὐτάρκως παχὺς καὶ λευκὸς γλύφῃ). ἔνιοι δὲ διὰ δύο ἡμερῶν ἀποχέοντες τὸ περιττὸν ὕδωρ, ἄλλο ἐπιχέουσιν. ἔστι δὲ βελτίων ὁ ἀτρέμιστος καὶ λεῖος, ὅζων ἐρίων οἰσυπηρῶν, ἀναπεπλεόμενός τε μᾶλλ' ὕδατος ψυχροῦ ἐν μύαξι καὶ λευκαινόμενος, καὶ ὅταν ἔχων ἐν ἑαυτῷ σκληρὸν ἢ συμπεπηκὸς· ὥσπερ ὁ διαλιπόμενος κηρωτῆς ἢ στέατι. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, πληρωτικὴν ἑλκῶν, μαλακτικήν· μάλιστα τῶν ἕδρας καὶ δακτύλιον καὶ ὑστέρας σὺν μελιλώτῳ καὶ βουτύρῳ καὶ ἔμβρυα καὶ ἔμμηνα ἐν ἐρίῳ περιτιθέμενος ἄλγος

excussaque sensim omni aqua, recentique affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ œsypum adstringat leuiter, nec mordeat, atq; pingue candidúmque spectetur: tum in fictili vase conditur. Verùm omnia feruido sole fiant. Nónulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manib⁹, nõ secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & sordibus quibuscũq; exemptis, ac léto igni in æneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, vt diximꝰ, lauant: colatúmq; in fictilé patellam, quę calidam aquã contineat, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij biduí spatio aquã effundũt, nouámque adiiciunt. Melius est læue, radicula non curatũ, quod succidarum virus oleat, & si manu in conca fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens: veluti quod cerato aut adipe adulteratur. OEsypum excalfacit, explet vlcera, & emollit: præsertim sedis ac vuluæ, cũ melyloto & butyro: in vellere appositum, mẽses & partus euocat, vlcera

vlcera non auriũ modò ſanat, ſed et genitaliũ cũ ãſerino adipe: cõtra eroſos angulos oculorũ, ſcabioſoſq;, genas q̃ occa luerunt, & ciliorũ defluuia, efficax eſt. In teſta noua torreſ, donec redactũ in cineré pinguitudinem amittat. Ex eo etiã fuligo colligitur, vti demõſtrauimus: quæ in oculorũ medicamenta cõmodè addi ſolet.

Coagulum. Cap. LXXXV.

Leporis coagulũ tribus obolis ex vino, venenatorũ morſibus, cœliacis, dyſẽtericis, & fœminis fluxione vuluæ laborãtibus, ac reiectionib⁹ à pectore, auxiliatur. Sanguiné in grumos concretum diſcutit. Poſt menſtruas purgationes appoſitum vuluæ cũ butyro, præſtat mulieribus vt concipiant: potũ verò partus enecat, & à puerperio pariendi ſpem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocãt, priuatim cœliacis dyſentericisque conuenit. Hœdi, agni, hinnuli, capreæ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubaliſque coagula ſimiles naturas ſortiũtur: cõtra aconiti potum vino, & concretum lac in aceto cõuenienter aſſumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotũ, partus

θεός τι τὰ ἐν ὠσὶ καὶ ἐν αἰδοίῳ σὺν χλιαίνῳ σέπι. ποιεῖ δὲ καὶ εἰς ἐμβεβρωμένους καὶ ὀδόντας, καὶ ψωράδεις καὶ βλέφαρα τετυλωμένα καὶ τειχέρρωπα. κάεται δὲ ἐπ' ὀστράκου καινοῦ, μέχρις ἂν τεφρωθὲν ἀποβάλῃ τὸ λίπος· συνάγεται δὲ καὶ λιγνὺς ἐξ ἄμπωτος ὑποδείξαμεν ἁρμόζουσα πρὸς τὰ ὀφθαλμικά.

Περὶ πτύας λαγωῦ. Κεφ. πέ.

Πτύα λαγωοῦ ἁρμόζει σὺν οἴνῳ ὀλκὴ πεινώσῃ πρὸς δηριδύκτους καὶ κοιλιακοὺς καὶ δυσεντερικούς, καὶ πρὸς ῥοϊκὰς γυναῖκας, πρός τε αἵματος ῥόμβωσιν καὶ ἀναγωγὰς τοὺς ἐκ θώρακος. πρὸς σπασθεῖσάν τε μετὰ κάθαρσιν τῇ μήτρᾳ μετὰ βουτύρου σύλληψιν ποιεῖ· ποθεῖσα δὲ φθείρει ἔμβρυα, μετὰ δὲ τὸν ἄφεδρον ἀτόκιος ὄζει. ἡ δὲ τῆς ἵππου ἐφ' ἑνὶ ἱππάκη καλουμένη, ἰδίως ἁρμόζει ὑπὸ κοιλιακῶν καὶ δυσεντερικῶν. ἐφέλκει δὲ καὶ ἀγρὸς καὶ νεβρεῦ καὶ δορκάδος καὶ πλατυκέρατος καὶ δέρκης καὶ ἐλάφου καὶ μόσχου καὶ βουβάλου, ὁμοίαν ἕξιν δύναμιν ἁρμόζουσαι πρὸς ἀκονίτου πόσιν σὺν οἴνῳ λαμβανόμεναι, καὶ πρὸς γάλακτος ῥόμβωσιν μετ' ὄξους. ἡ δὲ τοῦ νεβρεῦ ἰδίως μετὰ τὰς καθάρσεις προτιθεῖσα ὑπὸ τρεῖς ἡμέρας, ἀτόκιον

ἀτόκιόν ἐστιν. ἡ δὲ τῆς φώκης ἔοικε κατὰ τὴν δύναμιν καστορίῳ· δοκεῖ δὲ ἀφροδισίων μάλιστα ἐπιλαμπάνεσθαι τοῖς ἐν ὑστερικαῖς πνιγμοῖς πονοῦσιν. δοκιμάζεται δὲ εἰ ἔστι φώκης, ἢ τρόπον τὸν λαβὼν πιτύαν ζώσης, μάλιστα ἢ ἀρνὸς, καὶ ὑπογέας ὕδωρ, ἔασον βραχὺν χρόνον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπίχεε τὸ ἀποζέγμα ἀπὸ τῆς πιτύας τῆς φώκης· ἡ γὰρ ἀληθινὴ ἐξυδατοῦται ταχέως· ἡ δὲ μὴ τοιαύτη, διαμένει ὁμοία. λαμβάνεται δὲ ἀπὸ τῆς φώκης πιτύα μήπω διαλυθέντων συννήχεσθαι τῷ σεύκιον. κοινῶς δὲ πᾶσα πιτύα πάσχει μὲν τὰ διαλελυμένα· λύει δὲ τὰ συνεστῶτα.

partus ſpem intercipit. Vituli marini, caſtorei vires repræſentat: comitialibus, ſtrangulatis vuluis, potu conferre exiſtimatur. Sed ſi ſit vituli marini, hoc experimentum eſt: aqua inſpergitur, qua pauliſper cum alterius animalis, tum præcipuè agni coagulum, maduerit: nam ſi erit ſyncerum, ſtatim liqueſcit in aquam: ſin minus, conſimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natare poſſunt. In ſumma, coagulum omne diſſipata cogit, & coacta diſſoluit.

Πρὶ Στέατος. Κεφ. πς'.

Στέαρ πρὸς μὲν τὰ θερμὰ μήτρας ἁρμόζει τὸ νεαρὸν, γήνειον ἢ ὀρνίθειον· καὶ δίχα ἁλῶν τεταριχευμένον, πολέμιον δὲ ὑστέρᾳ τὸ ἁλισμένον καὶ τὸ τῶν χρόνῳ μεταβεβληκὸς εἰς δριμύτητα, πρόσφατον δὲ λαβόντι τοῦτων καὶ ἐξυμβιώσας, ἔμβαλε εἰς λοπάδα χαλκῆν κεραμέαν, εἰς ποσότητα χωρεῖσαν ἢ ὅσαν δεῖ τὸ μέλλον θερμανθῆναι, εἶτα θεὶς εἰς ὀξύτατον ἅλιον τὸ ἀγγεῖον κεκαλυμμένον ὀπωρινῶς, τὸ ἀποτηκόμενον ἀπόθες εἰς ἕτερον ἀγγεῖον ὀστράκινον, ἕως ἂν πᾶν ἀναπαήσῃ, τοῦτο δὲ εἰς κατάψυχρον ἀποτίθεσο τόπον καὶ χρῶ.

Adeps. Cap. LXXXVI.

Adeps anſerinus aut gallinaceus recens, & ſine ſale conditus, ad vuluæ vitia proficit: ſale inueteratus, & qui temporis ſpatio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus eſt. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demiſſus, quæ altero tãtopere capacior ſit, quantus ſit modus adipis, quem curare inſtitueris, obſtructo diligéter vaſe, flagrantiſſimo ſoli exponitur: eliqueſcens inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis abſumatur, mox loco vehementer frigido reconditur, & ad vſus digeriſ.

Alij

Alij fictile fulciunt super aquã calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis vicem pensat. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, coniectúsque in ollã eliquatur, adiecto minuti salis momento: mox lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant.

πνὲς δὲ αὐτὸ ὑλίου ὑδατος θερμοῦ ἐπιρείδοντες τῷ λοπάδι, ἢ ὀπὶ λεπτῶς καὶ μαλακῶς ἀνθρακιᾶς. ὅδε δὲ ἄλλος τρόπος θεραπείας τοιοῦτος· μετὰ τὸ ἐξυμμιδῶσαι τὸ σέαρ λεαίνεται, καὶ εἰς λοπάδα ἐμβλη θὲν τήκεται, ἀλὸς ὀλίγου καὶ λιπαροῦ τεθρυμμαλαδέντος· εἶτα διὰ ῥάκους λινᾶ διυλισθὲν ἀποτίθεται. ἁρμόζει δὲ τὸ πιῶτον εἰς τὰ ἄκοπα.

Suillus adeps & vrsinus. Cap. LXXXVII.

Suillus adeps & vrsinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimũ detractus, in largiore aqua cœlesti & quã frigidissima, exẽptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimẽdo fermè siccatur, subindeq; noua aqua abluitur: cæterũ fictili capacitatis duplæ inditus, in aquã demergitur, & subditis leuibus prunis spatha mouetur: eliquatúsq;, colo transfunditur in aquam: vbi verò refrixit, & guttatim aquam omnẽ exclusit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quo facilius fæculentum virus pessum eat: postea in pilã spongia madefactam trãsfunditur.

Πρὶ Στέατος ὑείου καὶ ἀρνείου. Κεφ. πζ.

*Τειον δὲ καὶ ἀρνειον θεραπεύεται οὕτως· λαβὼν τὸ πρόσφατον καὶ κατάπιμελον, οἷόν ὅτι τὸ νεφριαῖον, εἰς ὕδωρ διαλὲς ὄμβριον ὡς ὅτι ψυχρώτατον ἐξυμένισον, καὶ τρίβε ἐ χερσὶν ὀπιμελῶς ἀναπείσων αὐτὸ καὶ οἱονεὶ * ἀναψύχων· εἶτα ἑτέρῳ ὕδατι πολλάκις ἀποκλύσας, ὃς εἰς χύτραν κεραμέαν τὸ διπλάσιον χωρῶν· ὀπιχέας τὸ ὕδωρ ὡς ἐπὶ ἑκτὸν τὸ σέατος, θὲς ὀπὶ κύφῳ ἀνθρακίας καὶ κίνει ἀπάθη. ὅταν δὲ τακὲν διηθήσας αὐτὸ δι' ὑθμοῦ εἰς ὕδωρ καὶ ἐάσας ψυχῶσαι, πάλιν ἑφαψιομένου ὀπιμελῶς, ἀπόδος εἰς τὴν χύτραν θερπιλυμένην, ὀπιχέας τὸ ὕδωρ τῆς σέατος. καὶ καθελὼν, μικρόν τι ἐάσας τὴν τρύγα ὑποστῆναι, κατάχεε εἰς δυΐαν νενοτισμένην ἀσπόγγου.

Vbi

ὅταν

ὅταν δὲ παγῇ, ἀνελόμενος καὶ τὸν ἐν τῷ πυθμένι πρὸς ἀκαθαρσίαν ἀφελών. τῆξον ἐκ τρίτου χωρὶς ὕδατος, καὶ κατεράσας εἰς θυίαν, καθαρείσας τε ἔμβαλε εἰς κεραμεοῦν ἀγγεῖον καὶ πωμάσας ἀπόθου, εἰς κατάψυχρον τόπον.

Περὶ Στέατος τραγείου καὶ προβατείου καὶ ἐλαφείου. Κεφ. πη΄.

*Τράγειον δὲ καὶ προβάτειον, ἔτι δὲ καὶ ἐλάφειον, θεραπευτέον οὕτω· λαβὼν οἷον προείρηται στέαρ ὁποιουτινοσοῦν αὐτῶν καὶ πλύνας, ἐξυμενίσας τε ὡς προείρηται ἐπὶ τοῦ ὑείου, δὸς εἰς θυίαν μαλάττειν, καὶ τρίβε κατ᾽ ὀλίγον ὕδωρ ἐπιχέων, ἄχρις ἂν μήτε αἱμάλωψ ἐκκρίνηται, μήτε λίπος ἐπιπλέῃ, λαμπρόν τε γένηται. λοιπὸν ἐμβαλὼν αὐτὸ εἰς κεραμέαν χύτραν, καὶ προσεπιδοὺς ὕδωρ ὥς τε ὑπερέχειν, θὲς ἐπὶ κούφης ἀνθρακιᾶς καὶ κίνει. ὅταν δὲ τακῇ ἅπαν, κατεράσας αὐτὸ εἰς ὕδωρ δὲ ψύξας, πλύνας τε τὴν χύτραν ἐκ δευτέρου τῆκε, καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς προειρημένοις ποίει. τὸ δὲ τρίτον χωρὶς ὕδατος τήξας, εἰς νενοτισμένην θυίαν ἀπήθησον, καὶ ψύξας ἀποτίθεσο ὡς ἐλέγετο, ἐπὶ τοῦ ὑείου.

Περὶ Στέατος βοείου. Κεφ. πθ΄.

*Καὶ τοῦ βοείου δὲ στέατος ἐξυμενιστέον τὸ νεφριαῖον καὶ θαλάττῃ πελαγίᾳ πλυτέον· εἶτα εἰς ὅλμον ἐμβλητέον καὶ κοπτέον ἐπιμελῶς,

Vbi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliquatur, repurgatúsque, fictili benè operculato, perquàm frigidis locis reponitur.

Hircinũ seuũ, ouilũ, & ceruinũ. Cap. LXXXVIII.

Hircinũ seuum, ouilũ, ceruinumq; ita curato: Elotũ ex his quodcunq;, tunicis, (vt in suilli mentione dictũ est) exéptis pilæ emolliendũ tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidẽ cruentũ virus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollã fictilé coniicito, & adiecta aqua vt superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atq; in aquã colato: cũq; refrixerit, iterũ in loto fictili eliquato, & quę antè dixim⁹ facito. Tertiò sine aqua liquefactũ, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratúmq;, vt in suilli ratione diximus, recondito.

Seuũ Bubulũ. Ca. LXXXIX.

Bubulum autem seuum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pila tundendum diligéter,

diligenter, affusa maris aqua. Cùm verò dissolutum fuerit, in fictilem ollam coniiciendum, & marina aqua, quæ nō minus dodrante superemineat, proluendum, decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatúmque, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum: opertúmque soli interdiu credēdum, vt ad candorem reducatur, & odoris virus euanescat.

Pinguia taurorum, pardorum & leonum.

Cap. XC.

Priuatim taurorū pingue sic curari debet: Renib⁹ cuulsum pingue profluente annis aqua abluito, detractisque tunicis, fictili nouo, postquam exiguū salem inspserseris, liquefacito: dein in nitentem aquam excolato, & vbi cōcrescere cœpit, manibus iterum confricando vehemēter lauato, aqua sæpiꝰ infusa refusáque, donec quamoptimè elotum videatur: rursus in olla cum pari modo vini odorati decoquito, & cū iterum efferbuerit, dēpto ab igni vase, ibidē sinito pernoctare: postridie

ὀπμιλῶς, ὀπῤῥαπομμύκης τῆς θαλάττης. ὅταν δὲ διαλυθῇ ἅπαν, ἐμβλητέον αὐτὸ εἰς χύτραν κεραμέαν, καὶ θάλασσαν ὀπιχυτέον ὅσον ὑπερέχειν μὴ ἧττον παντελῶς, ἑψητέον τε ἄχρις ἂν ἡ ἰδίαν ἰσμὴν ἀποβάλῃ. εἶτα πρὸς μίαν μνᾶν ἀπτικὴν ἡ τέταρας ἐμβλητέον κηροῦ τυῤῥηνικοῦ δραχμὰς τέτταρας ἐμβλητέον καὶ διηθητέον· ἀφαιρετέον δὲ τὴν προσπαθημμένην ἐν τῷ πυθμένι ἀκαθαρσίαν, καὶ εἰς λοπάδα χηνὶν ἀποθετέον. εἶτα εἰς ἥλιον καθ' ἡμέραν καμιστέον ἀφειστεπασμένον, ὅπως ἀπολευκανθῇ, καὶ δυσωδίαν ἀποβάλῃ.

Περὶ Στέατος ταυρείου, παρδαλείου, καὶ λεοντείου.

Κεφ. ϟ.

*Τὸ δὲ ταύρειον στεατοπυτέον οὕτω. λαβὼν καὶ τὰ δὲ τὸ περίσφαρον καὶ νεφρειαῖον ἔκπλυνον ποταμῷ ῥεύματι. ἐξυμμύησας τὸ δὲ εἰς χύτραν κεραμέαν χηνὶν, ἄλας ὀλίγον προσεμπάσας, καὶ πῆξε. εἶτα εἰς ὕδωρ διαυγὲς ἀποθήσας, ὅταν ἀρχὴν λαμβάνῃ πήξεως, καὶ χερσὶ πάλιν ἐκτείνων σφοδρῶς πλύνον, τῷ μὲν ἀποχεομμύου ὕδατος, τῷ δὲ ἐπιχεομμύου, ἄχρις ἂν πλυθῇ καλῶς· καὶ πάλιν εἰς χύτραν ἐμβάλλων ἕψε μετ' οἴνου ἡδυσμένου, ὡς δ' ἂν ζέσῃ δίς, ἆρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ χύτραν, ἔασον νυκτερεῦσαι τὸ στέαρ ἐνθάδε· τῇ

τῇ δ᾽ ἑξομένῃ ἐάν τι τῆς δυσωδίας ὑπολίπηται, ἀνελόμενος τὸ προειρημένον εἰς ἑτέραν χύτραν καινὴν, περιστέχεε οἶνον εὐώδη· καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς προειρημένοις ποίει, ἕως ἂν ἅπασαν τὴν δυσωδίαν ἀποβάλῃ. τήκεται δὲ καὶ χωρὶς ἁλῶν ἐπ᾽ ἐνίαις διαθέσεσιν ἐν αἷς οἱ ἅλες ἐναντιοῦνται· γίνεται μέν τοι τὸ οὕτω σκευασθὲν οὐκ ἄγαν λευκόν. ὡσαύτως δὲ καὶ παρδάλειον σκευαστέον καὶ λεόντειον, *συάγρειον τε καὶ καμήλιον καὶ ἵππειον καὶ τὰ ὅμοια.

Πῶς τὸ στέαρ ἀρωματιστέον. Κεφ. ϟα.

Ἀρωματιστέον δὲ στέαρ μόσχειον καὶ ταύρειον, ἔτι δὲ ἐλάφειον, καὶ μυελὸν τοῦδε τοῦ ζώου τὸν τρόπον τοῦτον· ἐξυμενίσας τὸ μέλλον εὐωδιάζεσθαι καὶ πλύνας ὡς προείπομεν καὶ ζέσας οἴνῳ ἀθαλάσσῳ τε καὶ εὐώδει, εἶτα ἀνελόμενος καὶ ἐννυκτερεῦσαι ἀφεὶς· ἕτερον οἶνον ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐπιχέων, τοσοῦτον τῷ πλήθει ὅσος ἦν ὁ ἔμπροσθεν δοθεὶς, καὶ τήξας ἀφυλίσας τε ἐπιμελῶς πρὸς κοτύλας ἐννέα τοῦ στέατος ἔμβαλε σχοίνου ἀραβικῆς ὁλκὰς ζ. ἐὰν δὲ εὐωδέστερον ποιῆσαι ἐθέλῃς, τοῦ ἄνθους ὁλκὰς μ. προσαπόδος δὲ καὶ φοίνικος καὶ κασσίας καὶ καλάμου τὰς ἴσας ὁλκὰς· ἀσπαλάθου τε καὶ ξυλοβαλσάμου ἀνὰ ὁλκὴν μίαν· μίξον δ᾽ καὶ κιννα-

postridie, si grauiter adhuc oleat, noua olla repetitum, vino odorato perfundatur: eadem quæ prius fiant, dum omne virus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionũ eorum causa, quibus sal aduersari solet, sed ita paratum non magnopere albescit. Eodẽ modo pardorũ ac leonũ pinguia curari oportet.

Q̃uo pingue odoramẽtis imbuendũ sit. Ca. XCI.

Taurinum autem & vitulinum pingue, necnon ceruinũ, atq; etiã huius animalis medulla, odoramentis imbuitur, hac ratione: Pingue quod odoratũ reddi debet, demptis, quę diximus modo, mẽbranis, elotũ & vino quàm odoratissimo, nulla maris aqua diluto, feruefactũ, pernoctare sinit: alterũ id gen⁹ vinũ eadẽ mẽsura infundit, colliquatur, & exquisitè collat, nouéq; eius heminis iũci. Arabici septem drachmæ adiiciuntur. Quòd si ipsum odoris fragrãtioris fieri voles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cũ paribus palmæ, calami, & casiæ modis adduntur: & xylobalsami, aspalathi singulę drachmę

in cinna

cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ vnciæ: omnia exactius tunduntur, & affuso vino odorato, in vase operto: quod supra carbones firmiter collocatum sit ter efferuescunt, & semoto ab igni vase inibi pernoctant: postridie vinū effunditur, aliudq; generis eiusdem adiicitur. Ter simili modo benè conferuescat. Deinde matutinis exépto adipe vinū effundat: & abluto vase, si quid imo subsidés hæsit, detergat. Postremo eliquatū pingue & excolatū, ad vsus recóditur. Hoc autē modo odoramentis imbuit, qđ antea curatū est. Verū antè dicta prius inspissari solét, quò facilius sibi odoramētorū vires adscisćat. Itaq; assumés qđcūq; horū voles, cúvino feruefacito ipositis vnà myrti ramulis, serpillo, cypero, itē aspalatho plenius tuso. Aliqui tamē ad hunc vsum, vno dútaxat horū cōtéti sunt. Cū autē ter efferbuit, exemptū leniter, & linteo colatum, aromatis, vti expositū est, imbuitur. Adipibus spissaméta sic fiūt (quēcunq; acceperis, oportet vt recés tūdat) Syncer⁹ & sanguinis expers adeps, reliquas habés notas quas sępe retulim⁹, in ollā nouā demittitur, infuso

κινναμώμου καὶ καρδαμώμου καὶ νάρδου ἀνὰ οὐγγίαν μίαν· πάντα δὲ ἔστω ὁλοχερέστερα κεκομμένα, εἶτα ἐπίχει οἶνον εὐώδη, καὶ ὑπέρειδε ἐπ' ἀνθράκων πεπωματισμένον τὸ ἀγγεῖον, καὶ σύζεσον τρὶς, ἄρας τὸ ἀπὸ τῆς πυρᾶς ἕασον ἐννυκτερεῦσαι αὐτό· τῇ δὲ ἐχομένῃ ἀπόχει τὸν οἶνον καὶ ἄλλον ἐπιβὰς τῷ αὐτῷ ἤθους, σύζευξον ὁμοίως ἕως τρὶς, καὶ ἄφες. περὶ δὲ ἀγελόμενος τὸ στέαρ, ἀπόχει τὸν οἶνον· ἐκπλυνάς τε τὸ ἀγγεῖον καὶ καθάρας τὸ πρὸς τῷ πυθμένι καὶ πίξας, διϋλίσας τε αὐτὸ ἀπόδου καὶ χρῶ. ἀρωματίζεται δὲ καὶ τὸ πιθεραπευμένον τὸν αὐτὸν τρόπον. προσύφεται δ' τὰ προειρημένα στέατα πρὸς τὸ ῥᾳδίως δέξασθαι τὰ τῶν ἀρωμάτων δυνάμεις οὕτω· λαβὼν αὐτῶν ὅπερ ἂν βούλοιο, ζέσον ἅμα οἴνῳ, συγκαθεὶς μυρσίνης κλάδον, ἔρπυλλόν τε καὶ κύπειρον, ἔπειτα δὲ ἀσπάλαθον ὁλοχερέστερον κοπέντα. τινὲς δὲ ἐνί τῶν ἀρκοῦνται τῇ χρήσει. ὅταν δ' εἰς βίτον ἀγαγέσῃ, ἀνελόμενος προφὼς καὶ δι' ὀθόνης ὑλίσας, ἀρωμάτιζε ὡς δεδήλωται. ἔπειτα δὲ καὶ οὕτω προσύφε τὰ στέατα· κόψας ὅ, τι ἂν αὐτῶν ἐθέλῃς, πρόσφατον δὲ καὶ ἀμιγὲς αἵματος, τά τε ἄλλα ἔχον ἃ πολλάκις εἴρηται, ἔμβαλε εἰς λοπάδα χαλκῆν.

ἐπιχέας

ἐπιχέας τὸ οἶνον λευκὸν ἐυώδη παλαιὸν, ὡς ἂν δύνῃ πλακτύλης ὀκτὼ, σύζεσον ἐλαφρῷ πυρὶ ἕως τὸ σύμμετρον ὀσμὴν ἀποβάλῃ καὶ μᾶλλον οἰνίζῃ. εἶτα καθελὼν τὸ ἀγγεῖον καὶ ψύξας, ἀνελοῦ στέατος μνᾶς β'. καὶ βαλὼν εἰς λοπάδα τρυσπεδοῦς τε τῷ αὐτῷ οἴνου κοτύλας δ'. καὶ λωτίνου καρποῦ, οὗ τοῖς ξύλοις οἱ αὐλοποιοὶ χρῶνται, κακομμένου, μνᾶς δ'. ἕλξ πυρὶ κούφῳ διλυκῶς κινῶν. ὅταν δὲ τὴν στεατώδη ἀποφορὰν ἀποβάλῃ πᾶσαν, διύλισας αὐτὸ ψύχε, καὶ λαβὼν ἀσπαλάθου κακομμένου μνᾶν μίαν, ἀμαρακίνου δὲ ἄνθους μνᾶς τέτταρας, οὕτω φύρασον παλαιῷ, καὶ ἔασον μίαν νύκτα πεῖν. τῇ δὲ ἐχομένῃ εἰς χύτραν κεραμέαν βιχωμιαίαν καινὴν κάθες αὐτὰ καὶ τὸ στέαρ, προσαποδοὺς ἢ καὶ χοᾶς ἥμισυ οἴνου, καὶ σύζεσον ἅπαντα ὁμοῦ· ὅταν δὲ πάντων τὸ συμμάτων τὴν ὑγρὰν μὲν καὶ τὴν ὀσμὴν ἀπολάβῃ τὸ στέαρ, καθελὼν αὐτὸ καὶ διύλισας, τῆξον καὶ ἀπόθου. ἐὰν δὲ ἐυωδέστερον ποιῆσαι θέλῃς, μίσγε σμύρνης τῆς λιπαρωτάτης ὀλκὰς ἡ. οἴνῳ διειμένας πολυετεῖ. τὸ δὲ ὀρνίθειον καὶ χήνειον στέαρ ὅπως ἂν ἐυωδιαθῇ λαβὼν οἷόν τινος αὐτῶν τιθεσαπυιμένου κοτύλας δ'. καὶ καθεὶς εἰς ὀστρακίνην χύτραν, προσμιξον

infuso vino albo, vetere, odorato, quod ſemipedis altitudinem ſuperet: lento igni feruescat, dum vernaculus odor aboleatur, planéq; vinũ redoleat. At vbi depoſito vaſe refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo vini eiuſdem ſextarij, & ſeminis loti, eiꝰ inquã cuius è ligno ludicræ tibiæ fãctitanť, tuſi minæ quatuor adiiciunť: lento igni ſubinde miſcendo decoquũtur: cũq; odoris virus euanuerit, excolatúsq; adeps refrixerit, vna contuſi aſpalathi mina, cum amaricini floris minis quatuor, & vetere vino ſubigitur. Nocte vna hæc odoré rapiunt, combibuntúe. Poſtridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis ſextariis tribus vini, vnà feruescunt, quouſque & vim & odorem ſpiſſamentorum adeps ipſe contraxerit: qui eliqueſcens colatur, & reponitur. Quòd ſi maiorẽ odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quàmpinguiſſimæ myrrhæ vino maceratæ, quod multos in annos aſſeruatũ eſt. miſceto. Gallinaceꝰ anſerinúsq; ſic odoribus imbui ſolét. Cuiuſuis eorũ pcurati ſextarij duo fictili olla excipiunť:

erysisceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami planè cõtusi, singulorum sescuncia admiscetur: vini Lesbij veteris cyathus vnus adiicitur: ea ter efferuescunt prunis, mox vase sublato ab igne, die noctúque refrigerantur: postridie liquata per linteum crassum, mundum in vas excolantur. Vbi verò adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo densius operto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: æstate siquidem pinguia non coguntur. Nec desunt qui Tyrrenicæ ceræ momentum adiiciant, quo facilius in vnum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & vrsinus cæteríque id genus, odoramentis imbuuntur.

Quomodo adeps sampsuchi odore imbuitur.

Cap. XCII.

Verùm sampsuchi odorem adeps ipse repræsentabit hoc modo: Curati quá optimè adipis, pʃertim taurini, mina vna, tépestiuiq; sampsuchi exquisitè cõfracti sesquimina miscétur, & insperso largiore vino digerunt ĩ offas, q̃ in vase cooperto nocte q̃escũt: matutinis ĩ fictili olla. πεφσμιξον ἐρυσισκήπτρῳ καὶ ξυλοβαλσάμῳ, ἔτι δὲ φοίνικος ἐλάτης καὶ καλάμου ὁλοχρῶς κεκομμένου ἀνὰ < ιβ'. ἐπιδὲς τε οἴνου λεσβίου παλαιοῦ κύαθον ἑ. θὲς ἐπ' ἀνθρακιᾶς· καὶ σύζεσον τρὶς, εἶτα ἀνελόμενος ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὸ ἀγγεῖον, καὶ ἐάσας ψυχῶσαι τὰ ἐν αὐτῷ ἡμέραν μίαν καὶ νύκτα· τῇ ἐχομένῃ πῆξον αὐτὰ, καὶ διὰ ῥάκους λινοῦ καὶ καθαροῦ χύλισον εἰς καθαρὸν ἀγγεῖον. ὅταν δὲ πα γῇ ἀνελόμενος κόγχῃ τὸ περιειλημμένον εἰς κεραμιοῦν ἀγγεῖον βάλε χωνὸν, καὶ πωμάσας σεγανῶς, ἀπόδου ἐν καταψύχῳ τόπῳ. χειμῶνος δ' ταῦτα δρασέον· ἐν γὰρ θέρει οὐ πήγνυται. πνὲς δὲ περὶς τὴν σύσασιν αὐλῶν καὶ τὴν πῆξιν, βραχὺ κηρὸν τυῤῥηνικὸν μίσγοισι. τῷ δὲ ἀυτῷ τρόπῳ ἀρωματιστέον καὶ τὸ ὕειον, ἀρκεῖόν τε καὶ τὰ ὅμοια.

Πῶς σαμψυχίζεται τὸ στέαρ. Κεφ. ϛβ'.

*Σαμψυχίζει δ' στέαρ ὅτων λαβὼν τὸ καλῶς πεπεφυσμένον ὅσον μναῦν μίαν, ἐγὼ δὲ μᾶλλον ταύρειον, καὶ σαμψύχου ὠμοῦ πεθλασμένα ὁπιμελῶς μνᾶν. μίαν ὕμισυ, μίξον καὶ μαγίδας ἀνέπλασον, ὁππρέπουσαν δαψιλέστερον οἴνου, εἶτα ἀποθέμενος αὐτὰς εἰς ἀγγεῖον καὶ σκεπάσας, ἔασον νυκτερεῦσαι. περὶ δὲ εἰς κεραμέαν χύτραν

χύβαν ἐμβαλὼν, καὶ ὕδωρ ἐπιχέας, ἕψε κύφως. ὅταν δὲ ἡδέως ὀσμὴν ἀποβάλῃ τὸ στέαρ, διύλισας αὐτὸ καὶ ἔασας μεῖναι ὅλην τὴν νύκτα πεπωμασμένον χαλκῷ, τῇ ἐπιούσῃ ἀνελόμενος τὸ πρόσκον, καὶ πεσσοποιήσας ἐν τῷ πυθμένι ῥυπαρείαν, μίξον πάλιν σαμψύχῳ κεκομμένῳ, ὡς εἴρηται μνᾶν μίαν ἥμισυ, καὶ ὡσαύτως ἀνάπλασσε μαγίδας. τοιοῦτον καὶ τὸ μνᾶ ἀποχέηται, ἐπὶ πᾶσι δὲ ἐψήσας καὶ διύλισας, ἀφελὼν τὸ ἴζημα. ἀπόθου ἐν κατεψυγμένῳ τόπῳ.

Περὶ στέατος χηνείου καὶ ὀρνιθείου. Κεφ. ϛγ΄.

*Εἰ δὲ ἀθεράπευτον στέαρ ἢ χήνειον ἢ ὀρνίθειον ἢ μόσχειον θέλῃ τις ἄσηπτον διατηρῆσαι, ὕπω ποιητέον αὐτό· λαβὼν πρόσφατον ὁποῖον ἂν βέλτιον, ἔκπλυνον ἐπιμελῶς, καὶ διαψύξας ἐπὶ κοσκίνου ἐν σκιᾷ μέχρι τὸ ξηρανθῆναι, ἔμβαλε εἰς ὀθόνιον καθαρὸν, καὶ τὰ χεροὶν ἐκπίεσον *βιαίως, εἶτα λίνῳ διέρας κρέμασον ἐν τόπῳ σκιερῷ· μετὰ δὲ ἡμέρας τὰ πολλὰς καινῷ ἀποδύσας χάρτῃ, ἀποτίθου ἐν καταψύχῳ τόπῳ· ἄσηπτα διαμενεῖ καὶ ἐν μέλιτι ἀποτιθέμενα.

Στεάτων δυνάμεις.

Κεφ. ϛδ΄.

*Δυνάμιν ἔχει τὰ στέατα παντὸς θρεπτικὴν, μαλακτικὴν, ἀραιωτικὴν·

olla leuiusculo igni, affusa aqua, leuiter coquuntur: dúmque suum adeps edorem exuerit, defæcatus ac bene opertus, nocte tota permanet: postero die detersa sorde quæ pessum ierat sampsuchi, vt dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adiicitur, eodémque modo in offas cogitur: alijs quæ diximus peractis, decoquitur & colatur: & si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur.

Adeps anserinus & gallinaceus. Cap. XCIII.

Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceũ, aut vitulinum à putredine tueri velit, ita faciundum est: Quemuis adipem diligéter elotum & siccatum in vmbra super cribrum, per lintea munda manibus vehementer exprimat, linóque consutũ vmbroso in loco suspédat, & post multos dies noua charta inuolutum frigido loco recondat. Pinguia autẽ indito melle vindicantur ad putredinis vitio.

Adipum vis.

Cap. XCIIII.

VIS OMNIVM est excalfacere, mollire, rarefacem iij re,

re. Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquantum adstringunt: earūdem virium compos leoninus: nam resistere eū aiūt iis qui insidias moliuntur. Cervino, elephātinóq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstringētior est caprinus: qua ex causa decoct⁹ cum polenta, rhoë, & caseo, dysentericis datur, & cū ptisanæ succo infūditur. Ius decocti phthisicis in sorbitionib⁹ pdest. Datur quoq; vtiliter iis qui cantharidū venena hauserūt hircinus, vt qui validissimè discutiat: podagricis auxiliaſ, cū fimo capræ & croco impositus: huic ꝓportione respōdet ouillus. Suillus verò cōtra vuluæ & sedis vitia idone⁹ est: am bustis igni medetur. E sue vetustissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflāmationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus gallinaceúsque conueniunt muliebribus malis, et ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum cōstat raptos vitio alopecię capillos restituere pernionibus

ωπικήν. τὸ μὲν τοι ταύρειον ξύφει ποσῶς, καὶ τὸ βόειον, καὶ τὸ μόσχειον· καὶ τὸ λεόντειον δὲ ἀναλογεῖ τούτοις· φασὶ δὲ αὐτὸ καὶ ἀποφάσμα κον τοῖς ἐπιβουλεύουσιν εἶναι. τὸ δὲ ἐλεφάντειον καὶ ἐλάφειον, ἑρπετὰ διώκει καταχριόμενον. τὸ δὲ αἴγειον συντικώτερον· ὅθεν δυσεντερικοῖς δίδοῦ σὺν ἀλφίτῳ καὶ ῥοῒ καὶ τυρῷ καθεφθὲν, ἐγκλύζεταί τι μὴ πιεστέως χυλός. εὐθετεῖ δὲ καὶ φθισικοῖς ἐν ἑφθήμασιν ὀξὲξ αὐτῶν ζωμὸς, καὶ τοῖς καυθεῖσι πεπωκόσιν ὠφελίμως δίδοται· τὸ δὲ τράγειον διαλυτικώτατον ὂν βοηθεῖ πο- δαγρικοῖς, φυραθὲν σὺν αὐγὸς σπαράγοις καὶ χρόκῳ καὶ ὀπιθέ- μῳ· καὶ τὸ σφαγιάτειον ἢ ἀναλογεῖ τούτῳ. ὕειον δὲ ἀναλογεῖ τοῖς ἀμφὶ ὑστέραν, καὶ ἕδραν· ὃ καὶ πυρικαύτοις ἁρμόζει. τὸ δὲ παιγνεῖον ὕειον ὡς ὅτι πα- λαιότατον, διαμαίνει καὶ μα- λάττει, οἴνῳ δὲ πλυθὲν ἁρμό- ζει φλεγμονικοῖς, σὺν τέφρᾳ δ' ἀσβέστῳ ἀναληφθὲν, καὶ πρὸς οἰ- δήματα καὶ φλεγμονὰς καὶ σύ- εγγας. τὸ δὲ ὄνειον φασιν ὀλὰς ὁμόχρους ποιεῖν. χήνειον δὲ καὶ ὀρνίθειον πρὸς τὰ γυναικεῖα, καὶ ὅτι ῥήξεις χειλῶν καὶ *προσώ- πων ὠφέλειαν, καὶ ὠταλγί- ας ἁρμόζει. τὸ δὲ ἄρκειον δο- κεῖ τειχοφυὲς εἶναι ἀλωπικῶν, καὶ

καὶ χιμετλιῶσιν ἁρμόζει. τὸ δὲ τῆς ἀλώπεκος στέαρ πρὸς ὠταλγίας. τὸ δὲ τῶν ποταμίων ἰχθύων ὀξυδερκὲς ἐγχριόμενον, ἀποτακὲν ἐν ἡλίῳ, καὶ μέλιτι μιγνύ. τὸ δὲ τῆς ἐχίδνης πρὸς ἀμβλυωπίας, ἔτι δὲ ὑποχύσεις ἐνεργεῖ, μιγνὺ κεδρίᾳ καὶ μέλιτι ἀττικῷ, καὶ ἐλαίῳ παλαιῷ ἴσον· ἐκτιλθείσας δὲ τὰς ἐν μασχάλῃ τρίχας, πρὸς τὰς ῥίζας καταχρισθὲν καθ' ἑαυτὸ πρόσφατον, ἐξιτήλους ποιεῖ.

Περὶ Μυελῶν. Κεφ. ϛί.

Μυελῶν δὲ κράτιστος ἐστὶν ἐλάφειος, εἶτα μόσχειος, καὶ μετὰ τοῦτον ταύρειος, εἶτα αἴγειος καὶ προβάτειος. συνίσταται δὲ θέρους τοῦ συνεγγίζοντος τῷ φθινοπώρῳ. ἐν γὰρ τοῖς ἄλλοις καιροῖς, αἱμαλωπὶς καὶ οἱονεὶ σὰρξ εὔθρυπτος ἐν τοῖς ὀστέοις εὑρίσκεται· ἔστι δὲ δύσγνωστος ἐὰν μή τις, αὐτὸν * ἐξοστείσας εἴδῃ, καὶ ἀπόθηται· ἅπαντες δὲ εἰσὶ μαλακτικοί, ἀραιωτικοί, θεραπευτικοί· πληρωτικοὶ ἑλκῶν, ὁ δὲ ἐλάφειος περιχρισθεὶς καὶ θηρία διώκει. θεραπεύεται ὁ πρόσφατος μαλαχθεὶς ὡς στέαρ παραχεόμενον ὕδατι ἐκλεγομένων τῶν ὀστέων, εἶτα δι' ὀθόνης ὑλισθεὶς καὶ ὡσαύτως πλυνθεὶς, ἄχρις ἂν τὸ ὕδωρ καθαρὸν γένηται. ἔπειτα ἐν διπλώματι τακεὶς, ἐπαφαιρουμένης πτερῷ τῆς ἐπινηχομένης ῥυπαρίας, καὶ διϋλισθεὶς εἰς θυίαν μετὰ τὸ παγῆναι ἀπο-

pernionib⁹ ſubuenire. Vulpin⁹ medeť auriũ dolorib⁹. Fluuiatiliũ piſciũ pinguia punctis oculis claritaté afferũt, ſi in ſole liqueſcãt, & melli admiſceãtur. Viperæ adeps cõtra oculorum hebetudines ſuffuſionesq; efficax eſt. addita cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alis euulſos perũctis radicibus recés & per ſe illitus obliterat, atque renaſci non patitur.

Medulla. Cap. XCV.

Laudatiſsima eſt ceruina, mox vitulina, poſt hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur æſtatis exitu, cùm appetit autumnus: quippe cum aliis anni temporibus concrementum ſanguinis, & veluti caro friabilis, in oſsibus inueniatur, nec facile cognoſci poteſt, ni quis eam oſsibus extrahat & recõdat. Omnes medullæ molliunt, calfaciunt, rarefaciunt: vlcera explent, ceruina perunctos venenata fugiunt. Curantur recentes, adipis modo, aquę reſperſu ſubactę, ſelectisq; oſsibus tãtiſper elotæ, & in linteũ expreſſæ, donec aqua ſyncera emanet: & deterſa ſorde péna, ſiqua innatet, liquatę in duplicato vaſe in pilã exprimunť: & vbi coire omni fæce,

quæ ad ima ſidit, deraſa, fictili nouo reponuntur. Quod ſi libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anſerum & gallinarum adipe demonſtrauimus.

Fel. Cap. XCVI.

Fel omne curatur hoc modo: Recens præligato ore folliculi lino tandiu demiſſum in feruentẽ aquam, dum quis ſpatium trium ſtadiorum percurſaret, mox exemptum ſiccatur vmbroſo loco, aſperginem nõ redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adiici ſolet, ligatum lino in vitreũ vas, quod mel habeat, immittitur: circumuoluto ad os vaſis lini principio, & operto vaſe recõditur. Eſt enim vis omnium acris & excalfaciens: intenſis tamen & remiſſis viribus differũt: ſiquidem præſtantius in effectu eſſe videtur fel marini ſcorpionis, & piſcis qui callionymus appellatur, marinæ teſtudinis, hyænæq; item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & ſylueſtris caprę: quod priuatim prodeſt cõtra ſuffuſiones incipiẽtes, & oculorum caligines, argemas, & genarũ ſcabritias. Ouillo, ſuillo, hircino, atq; vrſino, taurinũ multo efficacius.

Felle

ἀποπίθεται ἐν ὀστρακίνῳ ἀγγείῳ καινῷ, ἀπεξυσμένης ὑπιμελῶς τ ὑποσαθμης. εἰ δ' ἀθεράπευτον ἀποτίθεσθαι βέλει, πολει παντα ὡς ἐπὶ τῆ ὀργιδείᾳ καὶ χηνείᾳ σέαπος ὑποδεδέξαμθ.

Πρὶ Χολῆς πάσης. Κεφ. νε'.

Χολὴ πᾶσα ἀποπίθεται τούτῳ τῷ τρόπῳ· λαβὼν τ' ωεόσφατον καὶ ἀποδήσας τὸ στόμα αὐτ λίνῳ, κάθες εἰς ὕδως ζέον, διαλιπὼν, χρόνον τοσοῦτον, ὅσον αὖτις τειῶν σταδίων δρόμον* ἀνύσειεν, εἶτα ἐξελὼν, ξήραινε ἐν τύπῳ σκιρῷ καὶ ἀνοπτίῳ. ταὶ δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ λίνῳ, ἀποδήσας, βάλε εἰς βυκίον ὑελοῦν ἔχον μέλι· καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ λίνου ωεριδήσας τῷ στόματι τοῦ βυκίου πωμάσας ἀπόθου. εἰσὶ δὲ πᾶσαι αἱ χολαὶ δριμεῖαι, θερμαντικαὶ τὸ μᾶλλόν τ καὶ ἧσσον κατὰ δύναμιν ἀλλήλων διαφέρουσι· δοκοῦσι δὲ ὑπερτετᾶσθαι ἥ, τε τῆ θαλασσίου σκορπίου καὶ ἰχθύος τῆ λεγομένης καλλιονύμου, χελόνης τε θαλασσίας καὶ ὑαίνης· ἔτι δὲ πέρδικος καὶ ἀετοῦ, καὶ ἀλεκτορίδος λευκῆς, καὶ αἰγὸς ἀγρίας· ἰδίως ἀρμόζουσι ωρὸς ἀκρομύνας ὑποχύσεις καὶ ἀχλύς, ἄργεμά τε καὶ τραχέα βλεφάρων, τῆς δὲ τῆ ωρεβάτου καὶ τῆ τράγου καὶ τῆ συὸς, ἔτι δὲ ἄρκτου ἐμωεφακτικωτάτη ὀξὴ ἡ ταυρεία

πᾶσαι

πᾶσαι δὲ προθυμίαν πρὸς διαχώρησιν ὀρέγονται, καὶ μᾶλλον παιδίων, εἴ τις κρομύδια βάλλας προσθείη τῷ δακτύλῳ. ἡ δὲ ταυρεία ἰδίως ὅτι ζωαγχικῶν διακρίνεται ζωὴ μέλιτι· ἀποθεραπεύει τε τὰ ἐν δακτύλῳ μέχρις οὐλῆς. πυορροοῦντά τε ὦτα, καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν ῥήξεις συὸ γάλακτι αἰγείῳ ἢ γυναικείῳ ἐναζομένη· πρὸς δὲ συριγμοὺς συὸ προσφυ χυλῷ· εἰς τε τὰς βαυμαπικὰς ἐμπλάστρους μιγνυμένη, καὶ θηριακὰς θεριχίσεις. καὶ πρὸς φαγεδαινικὰ ἕλκη καὶ ὀδυώσας αἰδοίου, καὶ ὀχέου συὸ μέλιτι· πρὸς δὲ λέπρας καὶ φύπυρα, ζωὸ νίτρῳ ἢ γῇ κιμωλίᾳ σμῆγμα κράτιστον. καὶ ἡ προβατεία δὲ πρὸς αὐτὰ καὶ ἡ αἰγεία, ἐνδεέστεραι δὲ τυραίοισιν. ἐκλειχομένη δὲ ἡ αἰγεία ὀπληπικοὺς ὠφελεῖ. ἡ δὲ τῆς χελώνης πρὸς συναγχὰς καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν παίδων νομαῖς ἐν στόματι. καὶ ὀπληπικοῖς ἐντεθεῖσα τοῖς ῥισὶν· αἶγος δὲ αἰγείας ἰδίως νυκτάλωπας θεραπεύει ἐγχριωθεῖσα. καὶ ἡ τῶν τράγου δὲ τὸ αὐτὸ τοιεῖ δύμιά τε αἴρει, καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν ἐλεφαντιώντων ὑποχὰς καταχριομένη, καταστέλλει. ἡ δὲ ὑαία πρὸς τὰ ἐν ὠσὶν ἕλκη καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ πάντα ὠφελίμως παραλαμβάνεται.

Περὶ

Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum aut fimbriam sedi subiiciat. Priuatim taurino anginæ cum melle perunguntur: sedis vlcera sanat, & ad cicatricem vsq; perducit. Idem auribus fractis, & purulétis cum muliebri lacte aut caprino instillatum, medetur: & sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insueuit vulnerariis emplastris & circúlinitionib⁹, quę cõtra venenata parantur. Phagedænicis vlceribus, colis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quàm optimè purgat. Ouillum & vrsinum contra eadem pollent, verum inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantiũ nomis, prodest: naribus inditum comitiales erigit. Sylueſtriũ caprarum felle peculiariter perũcti luscioſi sanãtur. Hircinum idẽ obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephanticorum extuberationes illitu reprimit. Suillum autem contra aurium vlcera, reliquáq; omnia, magno vsu assumitur.

San-

Sanguis. Cap. XCVII.

Sãguis anſeris, anatis & hœdi vtiliſsimè in antidota miſcent. Palũbi aũt, turturis & colũbæ, nec nõ perdicis, oculis cruore ſuffuſis, & recẽtibus eorũ vulneribus, luſcioſisq; illinũtur. Peculiariter colũbę ſanguis, cruore mẽbranis cerebri erũpenté inhibet. Hirci, capræ, cerui & leporis ſanguinis inaſſatus ſartagine, dyſenterias & cœliacorũ profluuia ſiſtit: in vino potus cõtra toxica efficax eſt. Leporin[9] ſanguis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lentiginesq; emaculat. Caninus cõmodè ab his bibitur quos efferata in rabié beſtia momorderit: contra epotũ toxicũ auxilio eſt. Teſtudinis terreſtris ſanguiné epotũ tradũt, deſſe comitialib[9]. Marinę aute teſtudinis cũ vino & leporis coagulo cuminóq; cõtra ſerpentiũ morſus, & hauſta rubetæ venena cõueniéter bibi. Taurin[9] cũ poléta illit[9], duritias diſcutit, emollitq;. Sãguis equarũ quę admiſſurã expertę ſunt, in medicaméta addi quæ erodũt, ſeptica vocãt. Sãguine chamæleõis genarũ palpebras quelli creditũ eſt. Hoc enim viridiũ ranarũ ſanguine præſtatur. Méſtru[9] ſanguis fœminarũ, cir-

Περὶ Αἱμάτων. Κεφ. ϛζ'.

Αἷμα χοιρὸς καὶ ἐρίφου καὶ νήσσης, ἀντιδότοις χρησίμως μίγνυται. φάσσης δὲ καὶ τρυγόνος καὶ περιστερᾶς καὶ περδίκος, εἰς θερμοφάτους ὀφθαλμῶν πρόσεις καὶ ὑποδρομὰς αἵματος ϗ νυκτάλωπας ἐγχρίεται. ἰδίως δὲ τὸ τῆς περιστερᾶς, αἱμορραγίας τὰς ἐν μυίγγοις ἐπέχει. τὸ δὲ τοῦ τράγου καὶ αἰγὸς καὶ ἐλάφου καὶ λαγωοῦ, ὀπὸν ἀπὸ πηγάνου λαμβανόμενον, δυσεντερείας καὶ κοιλιακὰς ῥύσεις ἐφίσησι· μετ' οἴνου δὲ πεθὲν πρὸς τοξικὰ πιεῖ. τὸ δὲ τῶν λαγωῶν θερμὸν καταχριόμενον, ἐφηλίδας καὶ φακοὺς διαχρίει. ϗ τὸ ἀπὸ τῶν κυνῶν δὲ πεθὲν, λυσσώδη κτοις ϗ τοξικὸν πεπωκόσιν ἀμύζει. τὸ δὲ τῆς χελώνης χελώνης πεθὲν, ἐπιληπτικοῖς ἱστορεῖται ἀμύζειν. θαλασσίας δὲ χελώνης σὺν οἴνῳ καὶ πιτύᾳ λαγωοῦ καὶ κυμίνῳ πινόμενον, ἀμύζει πρὸς θηριοδήγματα καὶ φρύνου πόσιν. πυέου δὲ αἷμα διαφορεῖ καὶ μαλάσσει σκληρίας καταπλασσόμενον μετὰ ἀλφίτων. τὸ δὲ τῶν ὀχευτῶν ἵππων σπαστοῖς μίγνυται. τὸ δὲ τοῦ χαμαιλέοντος, τείχας ὑλοῦ ἐπὶ τῶν βλεφάρων πεπίστευται. καὶ τὸ τῶν χλωρῶν βατράχων ὁμοίως. γυναικὸς δὲ τὸ ὀπομήνιον

περιαλεί-

περιαλειφόμενον καὶ ἐπιβαπτόμενον, ἀσυλλήπτοις δοκεῖ ποιεῖν γυναῖκας· ποδαγρικὰς δὲ ὀδύνας καὶ ἐρυσιπέλατα κηρίζει καταχριόμενον.

Περὶ Ἀποπάτου. Κεφ. ριθ'.

Ἀπόπατος βοὸς γομάδος πρόσφατος ἐπιτεθεὶς, φλεγμονὰς τὰς ἐκ βαυμάτων περαύνει· ἐγκλείεται δὲ φύλλοις καὶ θερμαίνει· ἐπὶ θερμοποδάγρᾳ, καὶ ὅπως ἐπιτίθεται. καὶ ἰγμάδος δὲ πυρία περαύντικὴ ποιαύτη ἐπίθεσις· σὺν ὄξει δὲ καταπλασθεῖσα, σκληρίας καὶ χειράδας διαλύει καὶ φύγεθλα. ἰδίως δὲ ἄρρενος βοὸς βόλβιτον ὑστέρων περιπλωκῆαν ὑποθυμιώμενον, ἀποκαθίστησι· διώκει δὲ καὶ κώνωπας θυμιαθέν· αὐτῶν δὲ καὶ σύραθοι μάλιστα ἐρεθῶν πυθόμενοι σὺν οἴνῳ, ἴκτερον ἀποκαθαίρουσι· σὺν ἀρώμασι δὲ ποθεῖσι ἔμμηνα κινοῦσι, καὶ ἔμβρυα ἐκβάλλουσι· ἔτι καὶ λεῖαι σὺν λιβανωτῷ περιτεθεῖσαι ἐν ἐείῳ, γυναικεῖον ῥοῦν ἐπέχουσι, καὶ τὰς ἄλλας αἱμορραγίας σὺν ὄξει στέλλουσι· καὶ εἶσαι δὲ ἀλωπεκίας θεραπεύουσι, μετ' ὄξους ἢ ὀξυμέλιτος καταχριόμεναι· σὺν ὀξυγγίῳ δὲ καταπλασθεῖσαι, ποδαγρικοὺς ὠφελοῦσιν. ἐφθεῖσαι δὲ μετ' ὄξους ἢ οἴνου, ἐπιτίθενται θερὶ ἑρπητῶν ἐλκήματα καὶ ἕρπητας, καὶ ἐρυσιπέλατα, καὶ παρωτίδας.

circumlitu conceptũ inhibere existimatur, aut si omnno mulier mẽstrua supergrediatur: leuat podagrę dolores & ignem sacrum illitus.

Fimum. Cap. XCVIII.

Armentariæ bouis fimum si recẽs admoueatur, vulnerum inflammationes mitigat: foliis autẽ inuoluitur, & calfactũ cinere feruẽti superponitur. Coxendicis cruciatus fotu compescit: illitũ ex aceto duritias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod à masculo boue redditum est, procidentes vuluæ reprimũtur: accensi nidore culices abigũtur. Fimum caprarum, prẽsertim in montibus degentium, potum in vino, regium morbum emẽdat: mẽses cit cum odoramentis hausturn, & partus euocat: tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, fœminarum profluuia sistit, cęterósque sanguinis impetus ex aceto cohibet: medetur alopeciis exustũ, & cum aceto aut oxymelite illitum: cum axungia verò impositum, his qui podagra tẽtãtur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctũ imponitur serpẽtiũ morsib⁹, vlcerib⁹ quę serpunt, igni sacro, & parotidibus

Vtilem

Vtilem iſchiadici vſtioné hunc in modum accipiunt: In eo interſtitio vbi pollex brachiali committitur, caua veluti lacuna ſubſidet, in qua lana oleo imbuta ſubſternitur, deinde ſigillatim feruentes ſtercoris caprini pilulæ imponũtur, dũ vapor per brachium ad coxã ſentiatur peruenire, & coxendicis dolorẽ mitigare: aduſtio id genus Arabica appellatur. Ouillum ex aceto illitum ſanat epinyctidas, clauos, péſiles verrucas, thymos & ambuſta igni, roſaceo cerato exceptũ. Fimũ ſuis ſylueſtris aridum, in aqua aut vino potũ, reiectiones ſanguinis ſiſtit: vetuſtũ lateris dolorẽ mulcet, ad rupta & cóuulſa ex aceto bibitur: laxatis cũ cerato roſaceo medetur. Tá aſinorũ quàm equorũ fimũ ſiue crudũ ſiue crematũ, addito aceto, ſanguinis eruptiones cohibet. Armétarij, qui herba paſcitur, ſiccũ fimũ liquatũ in vino, mox potum, cótra ſcorpionũ ictus magnopere auxiliat. Colũbinũ vehemétius & excalfacit & vrit, cũ hordeacea farina mixtũ ſtrumas ex aceto diſcutit: carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini ſemine & oleo: ambuſtis igni medetur.

Galli-

καὶ ὑπὸ ἰσχιαδικῶν δὲ ἡ δι' αὐτῶν καῦσις ὠφελίμως παραλαμβάνεται τοῦτον τὸν τρόπον· ὑπὸ τὸ μεταξὺ μέρος τοῦ ἀντίχειρος, συνεγγίζον δὲ τῷ καρπῷ κοῖλον, ἐσοῦπροθεὶς ἔριον ἐλαίῳ βεβρεγμένον, ὑποτίθεται κατὰ μίαν σπύραθον πυρίων, ἄχρις οὗ ἡ αἴσθησις διὰ τοῦ βραχίονος ὑπὸ τὸ ἰσχίον ἔλθῃ καὶ πάυῃ. καλεῖται δὲ ἡ τοιαύτη καῦσις ἀραβική. ἡ ἐσχάτων δὲ ἄφοδος σὺν ὄξει καταπλασθεῖσα, ὀπυνκτίδας, ἥλους, θύμους ἀκροκορδόνας ἰᾶται· πυρίγματα δὲ κηρωτῇ ῥοδίνῃ λειφθεῖσα, ὗς δὲ ἀγρίου ξηρὰ μετ' ὕδατος ἢ οἴνου ποθεῖσα, αἵματος ἀναγωγὸν ἴσχει καὶ χρόνιον ἄλγημα πλευρᾶς ἐσχύνει, ῥήγματα δὲ καὶ σπάσματα μετ' ὄξους πινομένη· τρέμματα δὲ θεραπεύει ἀναλφθεῖσα κηρωτῇ ῥοδίνῃ. ὄνων δὲ καὶ ἡ τῶν ἵππων, αἱμορραγίας ἴσχυσι, ὠμή τε καὶ κεκαυμένη ὄξει μιγεῖσα. ἡ δὲ ἐξ ἀλόης ὄντος ποφάγου, ξηρὰ χυλισθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ ποθεῖσα σκορπιοπλήκτοις σφόδρα βοηθεῖ. ἐσχυρὰς δὲ, θερμαντικωτέρα καὶ καυστικωτέρα χρῆται μᾶλλον ὠμὴ λύσει μυρμῆκας· σὺν ὄξει δὲ χειράδας διαφορεῖ· ἀθρανῆς τε ἐσχαρίζει σὺν μέλιτι καὶ ὑοστέρμῳ καὶ ἐλαίῳ λειανθεῖσα. πυρίγματά τε θεραπεύει.

καὶ

καὶ ἡ τῶν ἀλεκτρυόνων δὲ ταῦτα ποιεῖ, ἐνδεέστερον μέντοι· πολλὰ ἰδίως πρὸς μύκητας θανασίμους καὶ κώνεια ἀλεξήματα ἀμύζει μετ' ὄξους ἢ οἴνου πινομένη. πελαργοῦ δὲ σὺν ὕδατι πεσσεύεται ὀπληπικοῖς ἀμύζειν πιστεύεται. γυπὸς ὑποθυμιαθεῖσα, ἔμβρυα ἐκπιάσειν παραδέδοται. μυῶν, λεῖα σὺν ὄξει ἀλωπεκίας καταχριομένη θεραπεύει· σὺν λιβανωτῷ δὲ καὶ οἰνομέλιτι πινομένη λίθους ἐκκρίνει· πρὸς τὰ δήγματα δὲ παιδίοις τὰ μυόχοδα κοιλίαν πρὸς ἔκκρισιν ἐφεδίζει. κυνὸς δὲ ἡ ἐν τοῖς κυνοκτόνοις ληφθεῖσα, ξηρὰ πινομένη μετ' ὕδατος ἢ οἴνου, κοιλίαν ἐφίστησιν. ἡ δὲ τῶν ἀνθρώπων πρόσφατος καταπλασθεῖσα, ἀφλέγματα μετὰ τοῦ παρακολλᾶν φυλάττει τὰ τραύματα· ξηρὰ δὲ μετὰ μέλιτος διαχριομένη ὀπὶ συναγχικῶν, βοηθεῖν παραδίδοται. ἡ δὲ τοῦ χερσαίου κροκοδείλου, ἀμύζει ἐπὶ τῶν γυναικῶν, πρὸς εὐχροιαν καὶ σίλωσιν· ἔστι δὲ λεπτοτάτη καὶ εὐθρυπτος, κούφη τε ὥσπερ ἄμυλον, ταχέως τε χυλουμένη· διατηκεῖσά τε ὑπόξυς καὶ ζυμίζουσα πλὴν ὀσμῆς. δολίζουσι δὲ αὐτὴν, φάρμακα ὀφύζη τρέφοντες, καὶ πλὴν ἄφορον ὁμοίαν οὖσαν πωλοῦντες. οἱ δὲ, ἄμυλον ἢ κιμωλίαν φυρῶντες, καὶ

Gallinaceum verò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen contra venena fungorum, & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. Ciconiæ fimũ, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinũ detritũ cum aceto, & illitũ, alopeciis medetur: cũ thure & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionẽ promouent. Caninum quod flagrátissimo canis sydere fuerit exceptum, cũ vino aut aqua potũ, sistit aluum. Humanum stercus illitum, vulnera ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat: sicco ex melle anginæ perungi cõmodissimè tradũtur. Terrestris crocodili fimũ, crocodileã vocant, quæ mulieribus coloré nutrit in facie, nitoréq; seruat. Optima est cãdidissima & fria bilis, amyli modo, minimè ponderosa, in humore statim eliquescés: quæ cũ teritur, fermẽti acoré quadátenus refert. Adulterãt eam sturnorũ fimo quos captos oryza pascunt, ipsúmque nõ dissimile vendunt. Alij amylum aut cimoliam miscẽt, & ad-

& adſcito anchuſæ colore per rarũ cribrum paulatim exprimũt, vt ſe cõtrahat in vermiculorũ ſpeciẽ: qui ſiccati pro crocodilea væneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum ſtercus caninúmq; gutturi impoſitum, anginis auxiliari.

Vrina. Cap. XCIX.

Humanam vrinã ſuã cuiq; bibere, contra viperæ morſus, ac venena, incipiẽtemq; aquã inter cuté proderit: ſcorpionis, viperæ marinorũ, draconiſque morſus ea cõuenientiſsimè fo uentur. Canina ad perfunden dos canis morſus idonea eſt: pruritus & lepras nitro addito expurgat, ſed vetus vlcera capitis manãtia, furfures, pſoras, & feruidas eruptiones, multò magis abſtergit: nomas, & præcipuè genitaliũ, cohibet: auribus infuſa manãs pus ſupprimit: de coctáq; in calyce mali punici, earũ vermiculos abigit. Pueri impubis reſorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo vaſe cũ melle emẽdat cicatrices, argema, caliginéſq;: ex ea & cupro idoneũ auri ferrumen cõficiunt. Quod in vrina ſubſidit, illitu ignem ſacrũ mitigat: feruefactũ cũ cyprino, inditúq;, vuluæ dolores mulcet: ſtran-

καὶ χεοΐζοντες* ἀλχουσι δι' ἀραιᾶς κοσκίνου, εἰς ὀλίγον ἀποθεσι· καὶ ξηράναντες ὡς σκωλήκια πωλοῦσιν αὐτὰ ταύτης.*

Περὶ Οὔρων.
Κεφ. ϟθ'.

Οὖρον ἀνθρώπου τὸ ἴδιον πο-
τὸν, πρὸς ἐχίδνης δήγματα ἀρ-
μόζει, καὶ πρὸς θανάσιμα καὶ ἀρ-
χομένους ὕδρωπας, καὶ πρὸς δῆξιν
τῶν θαλασσίων ἐχιδνῶν, καὶ σκορ-
πίου θαλασσίου καὶ δράκοντος
ἐπιπλούμενον. τὸ δὲ κυνῶν ἐπὶ
πλημα, κυνοδήκτοις. καὶ πρὸς
λέπρας καὶ κνησμοὺς σμῆγμα
σὺν νίτρῳ, τὸ παλαιὸν σμηκτι-
κώτερον ἀχώρων, πτύρων, ψω-
ρῶν, ἐκζεσμάτων· νομάς τε ἐπέ-
χει, καὶ τὰς ἐν αἰδοίοις ἐγκλυ-
ζόμενον· καὶ ὧτα πυορροοῦντα θε-
ραπεῖ· ἐκβάλλει δὲ καὶ τοὺς ἐν αὐ-
τοῖς σκώληκας ἐφόμενον ἐν σι-
δίοις ῥοᾶς. τὸ δὲ τοῦ ἀφόρου
παιδὸς καταῤῥοφούμενον, ὀρθο-
πνοϊκοῖς ἀρμόζει· ἑψηθὲν δὲ
ἐν χαλκῷ σὺν μέλιτι, οὐλὰς καὶ
ἄγμα καὶ ἀχλῦς ἀποσμήχει·
κατασκευάζεται δὲ δι' αὐτοῦ καὶ
τοῦ κυπρίου χαλκοῦ ἀρμόζουσα
ἐπὶ τοῦ χρυσίου κόλλα. ἡ δὲ ὑ-
ποσάθημα τῆς οὔρου καταχεισθεῖσα*
ἐρυσιπέλατα παύει· ἀναλειφθεῖσα
δὲ σὺν κυπρίνῳ καὶ περιτεθεῖ-
σα, ὀδυνῶν ὑστέρας παρηγορεῖ.

ὑστερι-

ὑστερικῶς πιγομένοις κουφίζει, βλέφαρά τε ἀποσμήχει καὶ οὐλὰς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς ἀποκαθαίρει. τὸ δὲ ταύρειον σὺν σμύρνῃ λεανθὲν καὶ ἐναλφὶ, ὠταλγίας παρηγορεῖ. καὶ τὸ συάγριον δὲ τῆς αὐτῆς ἔχει δυνάμεως· διαίτερον δὲ τὸν ἐν κύστει λίθους θρύπτει καὶ ἐκκρίνει πινόμενον. αἰγὸς δὲ ὕδρωπα καὶ κατὰ σάρκα πινόμενον μετὰ ναρδοστάχυος καθ' ἑκάστην ἡμέραν σὺν ὕδατι κυάθων πλῆθος β'. ἄγειν οὖρα καὶ κοιλίαν, ἰᾶται δὲ καὶ ὠταλγίας ἐνστάζομενον. ὄνου δὲ πεφθέντα νεφριτικοὺς ὑγιάζειν.

Περὶ Λυγγουρίου. Κεφ. ρ'.

*Τὸ δὲ τῆς λυγγὸς, ὃ δὴ λυγγούριον καλεῖται, ἅμα τῷ ἐξουρηθῆναι λιθοῦσθαι πεπίστευται· διὸ καὶ ματαίαν ἔχει τὴν ἰσοτέλειαν. ἔστι γὰρ τὸ καλούμενον ὑπ' οἰῶν ἥλκηθρον πτερυγοφόρον. ὅπερ ποθὲν σὺν ὕδατι, στομάχῳ καὶ ῥευματιζομένῃ κοιλίᾳ ἀρμόζει.

Περὶ μέλιτος.

Κεφ. ρά.

Μέλι πεφοτεύει τὸ ἀττικὸν, καὶ τούτου τὸ ὑμήττιον καλούμενον, εἶτα τὸ ἀπὸ τῶν κυκλάδων νήσων, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς σικελίας σίμελον καλούμενον. ἔστι δὲ δοκιμώτερον τὸ γλυκύτερον καὶ λεῖον, εὐωδέστερον, κατόξαυστον, οὐχ ὑγρὸν, ὅλυμον δὲ καὶ εὔτονον, καὶ ὃν

strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subijt, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, vrinámque per aluum extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum vitiis mederi.

Vrina lyncis. Cap. C.

Lyncis vriná, q̃ lyncuriũ appellãt, simulac excerni, glaciari coiréve in calculi duritiá, vulgo creditũ est: quare quod de ea ꝓditũ est, vanũ esse cõuincitur. Est enim quod à nonnullis vocaſ succinũ pterygophorõ, ideo dictũ ꝙ pennas ad se alliciat. Id potũ ex aqua, stomacho aluóq; fluxiõe laborãti cõuẽit.

Mel. Cap. CI.

Principem locũ obtinet mel, quod Atticę regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibꝰ insulis, & è Sicilia, cognomine hybleũ. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, subflauum, nec humectum, graue, & minimè fluxũ, qđ ob sequacẽ len-

lentitiam non facilè abrumpitur, tractúmq; resilit in digitos. Mel abstergẽdi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida vlcera sinusque, commodissimè infunditur. Decoctum atq; impositũ, abscendenté carnẽ glutinat, medetur impetigini coctum cum liquido alumine & illitũ, item auriũ sonitui & dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes & fœda capitis animalia illitum necat, nudam glãdem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta nõ est, simile præputium à balineo triginta diebus emolliatur: oculorũ caliginem discutit, faucibus, tonsillis, anginæ collutum gargarizatúmve medetur: vrinã ciet, auxiliatur tussi, & à serpẽte percussis, cõtra haustũ meconium, cũ rosaceo calidum assumitur: aduersus venena fungorũ, & rabiosi canis morsus linctũ aut potum proficit: crudũ tamen aluũ inflat, tussim lacessit, & ea de re despumati vsus aptior est. Primatum tenet in mellis genere vernũ, deinde æstiuũ, hybernũ verò, vtpote quod crassius cõstet, deterrimum reputatur ceraginis halitum expirat.

καὶ ἐν τῷ ἐλκυσθῆναι αὐαπέλεγον ὡς ἐπὶ τὸν δάκτυλον. Δώσαμεν δὲ ἔχει σμηκτικὴν, αὐαστομωτικὴν, ὑγρῶν προσκλητικὴν, ὅθεν ἁρμόζει ἕλκεσι ῥυπαροῖς καὶ κόλποις ἐγκυλιζόμενον. ἐμβρεχὲν δὲ καὶ ὀπτηθὲν, παρακολλᾷ τὰ ἀφεστῶτα σώματα, λειχῆνάς τε θεραπεύει ἐφόμενον μετ' εὐπλοκείας ὑγρᾶς καὶ καταχριόμενον· ἦχος τε τῶν ἐν ὠσὶ καὶ ἀλγήματα σὺν ἀλσὶ ὀρυκτοῖς λείοις ἐνταζόμενον χλιαρὸν· καὶ φθεῖρας καὶ κόνιδας φθείρει καταχριόμενον, λειποδέρμοις τε τῶν μὴ ἐκ προτομῆς, ἀποκαθίστησι μαλαττομένης τῆς πόσθης τῷ μέλιτι, μάλιστα ἀπὸ βαλανείου ἐφ' ἡμέρας λ'. ἀποκαθαίρει δὲ καὶ τὰ ὀπισθοτονῶντα τῆς κόρης, καὶ τὰ πρὸ βρόγχου καὶ παρίσθμια καὶ σπογγυὰς διαχριόμενον καὶ ἀναγαργαριζόμενον θεραπεύει· κινεῖ δὲ καὶ οὖρα, καὶ βηξὶν ἀφόμοιον, καὶ τοῖς ὑπὸ ἑρπετῶν δηχθεῖσι· καὶ πρὸς μύκητος πόσιν μετὰ ῥοδίνου θερμὸν λαμβανόμενον· καὶ πρὸς μύκητας καὶ λυσσοδήκτους ἐπιλεχόμενον ἢ πινόμενον· ἔστι μὲν τὸ ὠμὸν, φυσώδες κοιλίας, καὶ βηχὸς ἐρεθιστικὸν, ὅθεν ἐξηφρισμένῳ δεῖ χρῆσθαι. πρωτεύει δὲ τὸ ἐαρινὸν, εἶτα τὸ θερινόν· τὸ δὲ χειμερινὸν παχύτερον ὂν χεῖρον, καὶ ἐξαυθησμοὺς ποιοῦν.

Mel

Περὶ Μέλι-

Περὶ Μέλιτος ἐν σαρδωνίᾳ.

Κεφ. ρβ΄.

*Τὸ δὲ ἐν σαρδωνίᾳ γεννώμενον μέλι, πικρὸν διὰ τὴν τοῦ ἀψινθίου νομήν· ἁρμόζει δὲ πρὸς ἐφήλιδας καὶ σπίλους τοὺς ἐν προσώπῳ καταχριθέν.

Περὶ Μέλιτος ποντικοῦ.

Κεφ. ργ΄.

†Γεννᾶται δὲ καὶ ἐν ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ κατά τινας καιροὺς διά τινων ἀνθῶν ἰδιότητα μέλι· ὃ τοὺς φαγόντας ἐξίστησι μετὰ ἐφιδρώσεως. βοηθοῦνται δὲ πήγανον ἐσθίοντες καὶ τάριχος, καὶ οἰνόμελι πίνοντες, ὁσάκις ἂν ἐμέσωσι τὰ αὐτὰ προσφερόμενοι. ἔστι δὲ δριμὺ, καὶ πταρμοὺς κατὰ τὴν ὄσφρησιν κινοῦν. θεραπεῦον ἔφηλιν, καταχριθὲν μετὰ κόστου, μετὰ δὲ ἁλὸς, πελιώματα αἶρον.

Περὶ Σακχάρου μέλιτος. Κεφ. ρδ΄.

*Καλεῖται δέ τι καὶ σάκχαρον εἶδος ὂν μέλιτος ἐν ἰνδίᾳ πεπηγότος καὶ τῇ εὐδαίμονι ἀραβίᾳ, εὑρισκόμενον ἐπὶ τῶν καλάμων, ὅμοιον τῇ συστάσει ἁλσὶ, καὶ θραυόμενον ὑπὸ τοῖς ὀδοῦσι καθάπερ οἱ ἅλες, ἔστι δὲ εὐκοίλιον, εὐστόμαχον διεθὲν ὕδατι καὶ ποθέν· ὠφελοῦν κύστιν κεκακωμένην καὶ νεφρούς· καθαίρει δὲ καὶ τὰ τὰς κόρας ἐπισκοτοῦντα ἐπιχριόμενον.

Περὶ Κηροῦ.

Mel Sardoum.

Cap. CII.

Quod in Sardinia gignitur mel, amarum eſt: quoniam apes inibi abſinthio veſcantur: quo vitia cutis in facie & maculæ aptiſsimè perunguntur.

Mel Ponticum.

Cap. CIII.

Heracliæ in ponto quibuſdam anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel conflatur: quod qui edêre, mẽte abalienantur, ac ſudore diffluunt. Remedio ſunt, eſitata ruta, & ſalſaméta, aut epotũ mulſum, reſumpta, quoties vomitione reii ciũtur. acre autẽ eſt, & olfactu ſternutamenta mouet. Quod cum coſto illitum, fœminarum cutem emendat, & cum ſale ſugillationes rapit.

Mel Saccharum.

Cap. CIIII.

Eſt & aliud concreti mellis genus, quod ſaccharon nominatur. In India verò, & felici Arabia in arundinibus inuenitur: ſalis modo coactum eſt, dẽtibus, vt ſal, fragile, aluo idoneũ, & ſtomacho vtile, ſi aqua dilutum bibatur: vexatæ veſicę renibúſque auxiliatur, illitũ ea diſcutit, quæ tenebras oculorũ pupillis offundunt.

n Cera.

Cera. Cap. CV.

Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & hali-
tú quadamtenus melleú referés, natione Pontica, aut Cre-
tica. Secundum locum obtinet candicãs, & suapte natura pin-
guis. Cãdida fit hoc modo: Ex ea radũt album syncerúmque,
atq; transfundunt in vas, quod satis habeat marinæ ex alto pe-
titæ, insperſoque nitri momẽto, decoquunt: cúmque iterum
tertióve inferbuit, separatum vas refrigerant, ac ceræ pastil-
lum eximunt, detersa sorde, si qua fortè adhæsit: tum denuo
indita noua maris aqua feruet, vti retulimus: & vase dempto
ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madefactũ, in ce-
ram summam suspensa manu intingunt, quò celerius cõcre-
scat, & quáminima portio ex-
trahatur. Suscepto primo ceræ
orbiculo, iterum vasis imum a-
qua refrigeratum, tantisper in
ceram immitti debet, dum to-
ta excipiatur. Orbiculi lino cõ-
suti, interuacante spatio, su-
spenduntur, & interdiu, contin-
uò sub sole noctu sub luna
asperguntur, vsque dum per-
fectè albescant. Verum si exi-
mius ille candor desideretur
eadem

Περὶ Κηροῦ. Κεφ. ρε.

Κηρὸς ἄριστος ὄζειν ὁ νεόκηρος
καὶ νεοπλίπαγες, εὐώδης τε καὶ πο-
σὸν μελιτώδη ἀποφορὰν ἔχων, ἔτι δὲ καθαρὸς καὶ ἡδύς πεντικὸς ἢ
κρητικός. ὁ δ' ἔκλευκος, τῇ φύσῃ δ' λιπαρὴς, δευτερεύει. λευκαίνεσθαι
δὲ κηρὸν ὅτω κατακύσας αὐτῷ τὸ
λευκὸν καὶ καθαρὸν, ἔμβαλε εἰς χύ-
βαν καινὴν, καὶ ἐπιχέας θαλάσσης
πελαγίας τὸ αὐτάρκες, ἕλε βρα-
χὺ νίτρου προσεμπάσας· ὅ τε δὴ
ἀναζέσει δὶς ἢ τρὶς, καθελὼν τὴν
χύβαν καὶ ἐάσας ψυχθῆναι, αὖθις
τὸν προχόσκον, καὶ ἀποξύσας εἴ τις
περὶ αὐτῷ ὑπαρχει ῥυπαρία, ἕλε
ἐκ δευτέρου ὡῷ θαλάσσιον ὕδωρ
ὁμοίως, ἀναζέσαντος δ' πάλιν τῷ
κηρῷ ὡς δεδήλωται, ἀνελοῦ τὸ ἀγ-
γεῖον ἀπὸ τοῦ πυρὸς, καὶ λαβὼν καινὴν χυτρείδιον τὸν πυθμένα, σφογ-
γοποιημένον ὕδατι ψυχρῷ. κάθες
πρᾴως εἰς τὸ κηρὸν, ἀκροθιγῶς ἐμ-
βάπτων, πρὸς τὸ ψάχνον τι αὐτῷ
ἀφῇ κἀκ, καθ' ἑαυτὸ πήγνυται.
ἀναγόμενος δὲ τὸ πρῶτον κυκλί-
σκον ἀφαιροῦ καὶ ἐκ δευτέρου κάθες
τὸν πυθμένα ψύχων ὕδατι καὶ τὸ
αὐτὸ ποίει, ἕως αὖ ἅπαντα αὐ-
θήσῃς. λοιπὸν λίνῳ διαφὰς τὰ κυκλί-
σκια διεξῆτε ἀπ' ἀλλήλων κρέμα-
σον. ἡμέραν μὲν εἰς ἥλιον συνεχῶς ἐ-
πιποτίζων αὐτὰ νυκτὸς δ' ὑπὸ τὴν
σελήνην πάθε, ἕως αὖ λευκὰ γένῃ.
εἰ δ' ἄγαν τις θέλῃ λευκὸν ποιῆσαι,
τὰ μὲ

τὰ μὲ λοιπὰ ὡσαύτως ἐνῆρεῖσθω, ἑψέτω δὲ πλεονάκις. πνὲς ἢ αὐτὴ πελαγίας θαλάσσης, ἐν ὀλίγῃ δραμυτάτῃ ἕψοισι τὸν προειρημένον τρόπον ἄπαξ ἢ δίς· εἶτα ἀναιρῶνται λαγυνίῳ λεπτῷ, καὶ ἀφαιρεῖ, λαβὼν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντι· εἶτα κυκλίσκια ἐπὶ πόας πυκνῆς ἐπιθέντες ἡλιάζουσιν, ἕως ἂν λευκώτατος γένηται. παραινοῦσι δὲ ἕως ἐπὶ τοῦτο ἔρχεσθαι, ὅτε μὴ ὁ ἥλιος τῇ σφοδρότητι αὐξάνηται, καὶ ποτίδηλα παρέχει, ἀφὸς τὸ μὴ πήκεσθαι. Δύναμιν δὲ ἔχει πᾶς κηρὸς θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, πληρωτικήν τε μετρίως· μύγας δὲ καὶ σφῆκας ἐπὶ τὸ δυσεντερικῶν, καὶ ἀπινόμους ἐν μεγέθει κεγχρίαις δέκα, οὐκ ἐᾶ τρέφεσθαι ἐπὶ τῶν πιθωυσῶν τὸ γάλα.

Περὶ Προπόλεως. Κεφ. ρς'.

Πρόπολιν παραλαμβάνειν δεῖ ξανθὴν καὶ εὐώδη καὶ συναγείρουσαν. μαλακτικόν τε ἐν τῷ ἰσχίῳ, καὶ μασίχης τρόπον ἑλκωμάτων. ἔστι δὲ θερμαντικὴ ἄγαν καὶ σπασματικὴ, καὶ σκολόπων ἑλκυστική. ἀφαιρεῖ δὲ καὶ βηξὶ παλαιᾶς ἐμφυσωμένῳ, αἴρει δὲ καὶ λειχῆνας ἐπιπεφυκότα· εὐείσκεται δὲ ἐν τοῖς τόμοις τῶν σμηνίων φύσει γεγενημένη.

Περὶ Πυρῶν.

Κεφ. ρζ'.

Πυροὶ πρὸς ὑγείας χρῆσιν ἄριστοι, οἱ

eadem factitari, & identidem recoqui operæpretiũ est. Nec desunt, qui pro marina, in muria, quàm acerrima semel aut iterum excoquant: dein lagunc ula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt: postea orbiculos, substrato affatim cespite herboso, insolant, donec candorem summum contraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus vere, cum sol remissa vehementia humorem pariat, vt non facilè liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, mo dicè explet corpora: datur in sorbitione dysentericis, ac milij magnitudine decem grana ceræ hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Propolis. Cap. CVI.

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracẽ referens, in veheméti ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat: aculeos, & omnia infixa corpori extrahit, in vetere tussi suffita proficit, impetigines admota tollit: ea in alueariorum foribus, ceroſæ naturæ inuenitur.

Triticum. Cap. CVII.

Optima è tritici generibus ad secundę valetudinis vsus ha

bentur, quæ recentia, & iá perfectè adulta, colorem luteũ referunt: dein ſequuntur trimeſtria, quæ nonnullis ſitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt, canum morſibus proſunt, manſa & impoſita: confectus eorum ſimilagine panis, plus alit, quàm cibarius: è trimeſtrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in mẽbra demandetur. Farina eorũ cum hyoſcyami ſucco illinitur aduerſus neruorũ fluxiones, quas Græci rheumatiſmos vocãt. Ité contra interaneorum inflationes, lentigines ex aceto mulſo tollit. Furfures auté in acri aceto decocti, turgentes mammas ſedant: viperarum ictibus auxiliantur, & torminoſis proſunt. Farinaceũ fermentũ calfacien di, extrahẽdíq; vim habet: priuatim callos pedũ, clauosq; extenuat, & cætera tubercula furunculóſq; ex ſale cõcoquit, & aperit. Sitaniorũ farina, contra venenatos ictus cũ aceto aut vino, cõmodiſsimè illinitur: eadẽ ſi decocta in glutini modũ delingatur, cruẽtis excreationibus, pderit: cõtra tuſsim, & exaſperatas arterias, cum mẽtha & butyro decocta, efficax eſt.

οἱ τρόφατοι καὶ τελείως ἀδρωκότες, τῇ χρόᾳ μικλίζουσιν· εἶτα μὴ τούτους οἱ βιμηνιαῖοι, λεγόμενοι ὑπὸ τινων σιταῖοι· ὠμοὶ μὲν βρωθέντες, ἕλμινθας τροχόλας ἀφυῶσι, μασηθέντες δὲ καὶ καταπλασθέντες, ὠφελοῦσι κυνοδήκτους· ὁ δὲ ἐκ τῆς σεμιδάλεως αὐτῶν γινόμενος ἄρτος, εὐτροφώτερές ἐστι τοῦ συγκομιστοῦ· ὁ δὲ ἐκ τῶν σιταίων ἀλεύρων, κουφότερος καὶ εὐαπόδοτος. τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἄλευρον σὺν ὑοσκυάμου χυλῷ, καταπλάσσεται πρὸς νεύρων ῥευματισμοὺς, καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις ἐντέρων, ζυὶ ὀξυμέλιτι δὲ φακοὺς αἴρει. τὸ δὲ πίτυρον σὺν ὄξει ἀριμεῖ λέπρας ἀφίσησι καταπλασσόμενον θερμὸν, καὶ πάσης φλεγμονῆς ἐν ἀρχῇ καταπλασμα σύμφορον, μετὰ δὲ πηλοῦ ἀφεψήματος ἐνθὲν, μαστοὺς ἀπορῥῶντας παύει, καὶ ἐχινοδήκτοις ἀρμόζει, καὶ τροφιμώδεσιν. ἡ δὲ ἐκ τῶν ἀλεύρων ζύμη θερμαντικὴ ἔσα καὶ ἐπασαστικὴ ἰδίως τὰ ἐν πέλμασι λεπύνει, καὶ τὰ σκλα φύματα, καὶ δοθιῆνας σὺν ὄξει ἐκπάτει καὶ ἀναστομοῖ. τὸ δὲ σιταίον πυρῶν ἄλευρον, ἰοβόλοις ἀρμόζει καὶ ἁπλαῖ τύμμον ἐν ὄξει ἢ οἴνῳ ἐνθὲν δὲ δόπην κόλλης καὶ ἐκλιχμώμενον, αἱμοπτοϊκοὺς ὠφελεῖ καὶ πρὸς βῆχας καὶ ἀρτηρίας τραχυσμοὺς, σὺν ὑδρομὶ καὶ βουτύρῳ ἐνθὲν ποιεῖ.

Tritici

καὶ ἡ ἐξ

καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πυρῶν γῦρις ἑψηθεῖσα σὺν μελικράτῳ, ἢ ὑδρελαίῳ, πᾶσαν διαφορεῖ φλεγμονήν. καὶ ὁ ἄρτος σὺν μελικράτῳ ἑφθὸς καὶ ὠμὸς καταπλασσόμενος, πᾶσαν φλεγμονὴν παραμυθεῖται μαλακτικώτατος ὑπάρχων, καὶ παρυποψύχων· μιγεὶς πόαις ἢ χυλοῖς ποσίν. ὁ δὲ παλαιὸς καὶ ξηρὸς καθ᾽ ἑαυτὸν μιγεὶς ποσὶν, ἵστησι κοιλίαν ῥέουσαν. ἅλμῃ δὲ βραχεὶς ὁ πρόσφατος καὶ καταπλασθεὶς, παλαιοὺς λειχῆνας ἰᾶται. * κόλλα δὲ ἡ γινομένη ἐκ τῆς σεμιδάλεως καὶ γύρεως πρὸς τὴν τῶν βιβλίων κόλλησιν, ἁρμόζει ἐπὶ αἱμοπτοϊκῶν ὑγροτέρα καὶ χλιαρὰ καταῤῥοφουμένη, κοχλιαρίου πλῆθος.

Περὶ Κριθῆς. Κεφ. ρή.

Κριθὴ δὲ ἀρίστη ἡ λευκὴ καὶ καθαρά, ἀτροφωτέρα δὲ πυροῦ. τοῦ μέντοι γινομένου ἐξ αὐτῆς ἀλφίτου ἡ πτισάνη τροφιμωτέρα, διὰ τὴν ἐν τῇ ἑψήσει χύλωσιν. ποιοῦσα δὲ πρὸς τὰς δριμύτητας καὶ τὰς περὶ ἀρτηρίαν τραχύτητας καὶ ἑλκώσεις πρὸς ἃς καὶ ἡ πυρίνη πτισάνη ἁρμόζει τροφιμωτέρα καὶ οὐρητικωτέρα οὖσα. κατασπᾷ δὲ καὶ γάλα συνεψηθεῖσα μαράθρου σπέρματι, καὶ ῥοφουμένη. ἔστι δὲ οὐρητικὴ σμηκτικὴ, φυσώδης, κακοστόμαχος, συμπεπτικὴ οἰδημάτων. δια-

Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & crudus, & coctus cum aqua mulsa inflammationes omneis illitu mulcet: cum emolliat, & quadamtenus refrigeret: sed herbis succísve huic rei accommodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine, & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreātibus prodest, si liquidus ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

Hordeum. Cap. CVIII.

Hordeū optimū est candidū purúmq;, id minus q̃ triticum alit. Ptisana tamē ob cremorē in decoctione redditū, plus alimēti præbet, q̃ polēta ex hordeo facta, Contra acrimonias atq; gutturis scrabritias, exulcerationésq; pollet: quibus etiam triticea ptisana præsidio est: sed plus alit, magisq; vrinā mouet. Lac abūdè suppeditat, si cū fœniculi semine decocta sorbeatur. Hordeū absterget, vrinam ciet, inflationē parit, stomacho aduersatur, tumores cōcoquit.

n iij Farina

Farina hordeacea decoquitur in mulsa aqua cum fico, vt inflammationes collectionesque discutiat: duritias cum resina, & fimo columbarum concoquit: cum meliloto autem, & papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorum inflationes cum lini semine, fœnogræco, & ruta, illini iuuat: strumas cũ pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad cõcoctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut malicorio, aut sylvestribus pyris, aut rubo, alui profluuia sistit: podagricis inflãmationibus, cum cotoneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor verò farinæ ex aqua, atq; cũ pice, & oleo decoctus, puri mouẽdo est: cũ aceto subactus itidem, & cum pice, contra articulorũ fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

διαφορεῖ δὲ τὸ ἄλευρον αὐτῆς μετὰ σύκων καὶ μελικράτου ἐψηθὲν οἰδήματα καὶ φλεγμονάς· συμπέπτει δὲ καὶ ταῖς σκληρίαις μετὰ πίσσης καὶ ῥητίνης καὶ φοινικείων κόπρου· σὺν μελιλώτῳ δὲ καὶ κωδίαις ἀνωδυνίαν παρέχει τοῖς πλευρᾶν ἀλγοῦσι· καταπλάσσεται δὲ καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις ἐντέρων μετὰ λινοσπέρμου καὶ τήλεως καὶ πηγάνου· μετὰ δὲ πίσσης ὑγρᾶς καὶ κηροῦ καὶ οὔρου παιδὸς ἀφθόρου καὶ ἐλαίου, χοιράδας ἐκπέπτει. ζωὰ μυρσίνη δὲ ἢ οἴνῳ ἢ ἀχράδαις ἢ βάτῳ ἢ σιδίοις, κοιλίας ῥεύματα ἵστησι· σὺν κωδωνίῳ δὲ ἢ ὄξει, ποδαγρικὰς φλεγμονὰς ὠφελεῖ· ἐψηθὲν δὲ μετὰ ὄξους δριμέως ὃν τρόπον ὠμὴ λύσις, καὶ θερμὸν ἐπιτίθεμενον, λέπρας ὑγιάζει. χυλωθὲν δὲ τὸ ἄλευρον σὺν ὕδατι καὶ ἐψηθὲν σὺν πίσσῃ καὶ ἐλαίῳ, πυοποιόν ἐστι· ζωὸν ὄξει ὃ χυλωθὲν καὶ ἐψηθὲν μετὰ πίσσης, πρὸς τὰ τῶν ἄρθρων ῥεύματα ἀρμόζει· τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἄλευρον κοιλίας σταλτικόν, καὶ φλεγμονῶν πρωϊνικόν.

Zythum. Cap. CIX.

Ex hordeo potꝰ fit, cui Zytho nomẽ est. Is vrinã cit, renes & neruos tentat, mẽbranis, præsertim cerebrũ vestiẽtibus, officit: inflationẽ parit, vitiosum suc-

Περὶ Σύθου. Κεφ. ρθ΄.

Σύθος σκευάζεται ἐκ τῆς κριθῆς. ἔστι δὲ διουρητικὸς, καὶ νεφρῶν καὶ νεύρων ἁπτικὸς, καὶ μάλιστα μηνίγγων κακωτικὸς· πνευματωτικός τε καὶ γλυκυτικὸς κακοχυμιῶν,

χυμῶν, καὶ φλεγματώδεως ποιητικός. εὐδιὰν δὲ καὶ ὁ ζῦθος γίνεται βραχὺ μᾶλλον αὐτῶν.

Περὶ Κούρμιδος. Κεφ. ρί.

Καὶ τὸ κριθόμελιν δὲ κοῦρμι, σκευαζόμενον δὲ ἐκ τῆς κριθῆς, ᾧ καὶ αὐτὴ οἶνον πόματι πολλάκις χρῶνται, κεφαλαλγές ἐστι καὶ χαλεπὸν χυμὸν καὶ τὸ νεῦρον βλαπτικόν. σκευάζεται δὲ καὶ ἐκ πυρῶν τοιαῦτα πόματα, ὡς ἐν τῇ πρὸς ἑσπέραν ἰβηρίᾳ καὶ βρεταννίᾳ.

Περὶ Ζειᾶς. Κεφ. ριά.

Ζειὰ δίτυπός ἐστι· καὶ μὲν γὰρ ἁπλῆ, ἡ δὲ δίκοκκος καλεῖται, ἐν δυσὶν ἑλύτροις ἔχουσα συνεζευγμένον τὸ σπέρμα. ἔστι δὲ προφιμωτέρα μὲν κριθῆς, εὔστομος· ἀπεφορωτέρα δὲ πυρῶν ἀφθονιουμένων.

Περὶ Κείμνου.

Κεφ. ριβ'.

Κείμνον ἀδρότερόν ἐστι τῆς καθαρσίας τοῦ ἀλεύρου γινόμενον ἐκ τε ζειᾶς καὶ πυροῦ, ἐξ οὗ ὁ πολὺς γίνεται. ἔστι δὲ ἱκανῶς πρόφιμον καὶ δυσκατέργαστον, καλλικώτερον δὲ κοιλίας τὸ ἀπὸ τῆς ζειᾶς μάλιστα πεφωχθέντος.

Περὶ Ὀλύρας. Κεφ. ριγ'.

Καὶ ἡ ὄλυρα δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐστὶ τῆς ζειᾶς, ἀπεφορωτέρα δὲ κατὰ πολὺν ἐκείνης· ἀρτοποιεῖται δὲ καὶ αὐτή. καὶ κρίμνον ἐξ αὐτῆς ὠφελιμώτατον γίνεται.

Περὶ Ἀθή-

succũ creat, elephãtiasin gignit: perfusũ Zytho ebur, obsequiosũ & operi tractabile redditur.

Curmi. Cap. C X.

Fit & ex hordeo potus, quẽ curmi nominãt, cóq; sæpe potu, pro vino vtũtur: verùm dolorem capitis mouet, malum succũ gignit, neruis nocet. Cósimilia etiã potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quæ occidentẽ spectat, & Britãnia.

Zea, seu semen. Cap. C XI.

Zea duorum generum est: vna simplex, altera in geminis putaminibus grana bina iũcta gerit, ob id dicoccos appellat. Plus quàm hordeũ alit, ori grata: digeritur in panificia, minus quàm triticum alens.

Crassior farina.

Cap. CXII.

Crimnon crassior est ex Zea triticóque farina, ex qua pultem faciunt. Abundè alit, facilè conficitur, aluum vehementius adstringit, si Zea, ex qua fit, prius torreatur.

Siligo. Cap. C XIII.

Eidem generi sigillo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit: in panes, vt Zea, cogitur. Fit quoq; è siligine crassior farina, quam Græci crimnon vocitãt.

Athera. Cap. CXIIII.

Athera ex Zea fit tenuissimè molita: est autē forbitio, quasi liquida pultícula, infantibus conueniens, & cataplasmatis efficax.

Tragos. Cap. CXV.

Tragos quandam halicæ frugis figuram gerit: multò minus, quàm Zea nutrit, quòd multum aceris habeat: quare ægrius conficitur, aluúmq; magis emollit.

Auena. Cap. CXVI.

Auena genicula quædam habet, folio & stipula triticū imitatur, & in cacuminibus depēdentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplasmata, vti hordeum. Pulte huius aluus sistitur, prodest tussiētibus in forbitione succus.

Oryza. Cap. CXVII.

Oryza frugum generis est, in palustribus riguíq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum supprimit.

Halica. Cap. CXVIII.

Halica fit ex Zea, quā dicoccon appellauimus: plus alit, q̄ oryza: aluú magis cohibet, stomacho longè vtilior. decocta in aceto illitáque lepras tollit, vnguium

Περὶ Ἀθήρας. Κεφ. ριδ'.

Ἀθήρα δὲ ἐκ τῆς ἀληθεσμένης εἰς λεπτὸν ζειᾶς σκευάζεται· ἔστι δὲ ἐδώδιμα ὥσπερ πλατύσειον ὑγρὸν, παιδίοις ἁρμόδιον· πιεῖ δὲ καὶ εἰς τὰ καταπλάσματα.

Περὶ Τράγου. Κεφ. ριέ.

Τράγος τὸ σῶμα μὲν παραπλησίως τῷ χόνδρῳ ἔσικεν· ἀζοφώτερος δὲ παραπολὺ ζειᾶς, διὰ τὸ πολὺ ἔχειν τὸ ἀχυρῶδες. διὸ καὶ δυσκατέργαστός ὅτι, καὶ κοιλίας μαλακτικός.

Περὶ Βρώμου. Κεφ. ριϛ'.

Βρῶμος κάλαμός ὅτι, σπυρὸς ὅμοιος καὶ τοῖς φύλλοις, γόνασι δὲ διειλημμένος. καρπὸν δὲ ἔχει ἐπ' ἄκρῳ ὥσπερ ἀκεῖδια δίκωλα, ἐν οἷς τὸ σπέρμα χρήσιμον εἰς καταπλάσματα ὡς ἡ κριθή. καὶ πέλτος δὲ ἐξ αὐτοῦ γίνεται σαλτικὸς κοιλίας. ὁ δὲ ἐξ αὐτοῦ χυλὸς ῥοφούμενος βάσταιον ἁρμόζει.

Περὶ Ὀρύζης. Κεφ. ριζ'.

Ὀρυζα τῶν σπερμῶν ὅτιν εἶδος, φυομένη ἐν ἑλώδεσι τόποις καὶ ὑγροῖς. τρόφιμος δὲ μετρίως καὶ κοιλίας σαλτική.

Περὶ Χόνδρου. Κεφ. ριή.

Ὁ δὲ χόνδρος γίνε῀ται ἐκ τῆς καλουμένης ὀλύρας ζειᾶς· τροφιμώτερος δὲ ὀρύζης στυγνοτικώτερος κοιλίας. εὐστομαχώτερος δὲ μᾶλλον. αἴρει δὲ καὶ λέπρας σὺν ὄξει

ἐφ-

ἐψηθεὶς καὶ καταχριθεὶς, καὶ λεπρὰς ὄνυχας ἀφίσησι, καὶ αἰγυλώπια ἀρχόμενα θεραπεύῃ. ἕλκυσμά τε τὸ ἀφέψημα αὐτῆ τοῖς μὴ ἀλγήμασι δυσεντερικοῖς εὔδετον. Περὶ Κέγχρου. Κεφ. ριθ'.

Κέγχρος ἀσθενεστέρα τῶν λοιπῶν σιτηρῶν, ἀφ' ὅτου ἐκθεῖσα δὲ ἢ ὡς τὸ πολὺ σκευασθεῖσα κοιλίαν ἵστησιν, ἧσσα δὲ κινεῖ. φωχθεῖσα δὲ καὶ βραχθεῖσα εἰς πάχνας πυελωθῆναι, σφίγγει καὶ τῶν ἀνὼ ἀλγημάτων ὀξὺ βοήθημα.

Περὶ Ἐλύμου. Κεφ. ρκ'.

Ἔλυμος, οἱ μὲν μελίνῃ, τῶν σιτηρῶν ὀλίγα σπερμάτων, κέγχρῳ ὁμοία· ὠσαύτως σιτοποιουμένη καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ ἁρμόζουσα, ἀσθενεστέρα μὲν τοι τῆς κέγχρου καὶ ἧττον συστατική.

Περὶ Σησάμου. Κεφ. ρκα'.

Σήσαμον κακοστόμαχον, καὶ δυσωδίας στόματος ποιητικὸν, ὑπόταν βιβρωσκόμενον ἐμμείνῃ μετὰ ξυλῶν ὀδόντων· καταπλασθὲν δὲ διαφορεῖ τὰς ἐν νεύροις παχύτητας, καὶ τὰ ἐν ὠσὶ θλάσματα, καὶ φλεγμονὰς καὶ πυρίκαυτα, καὶ κάλων ἀλγήματα, καὶ κεφάλαιον δῶσμα θεραπεύῃ· σὺν ῥοδίνῳ δὲ καὶ φακῆς ἀγήματα ἐξ ἐγκαύσεως γινόμενα παραμυθεῖται· ἡ δὲ πόα καταφυθεῖσα ἐν οἴνῳ τὰ αὐτὰ ποιεῖ μάλιστα δὲ φλεγμονὰς ὀφθαλμῶν καὶ σκληρωθυίας ἁρμόζει.

vnguium scabritias extricat, incipientibus ægilopiis medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium. Cap. CXIX.

Mlium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum, vrinam cit. Torretur milium, feruénsque in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, si foueatur, auxilio sit.

Panicum. Cap. CXX.

PANICVM frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile, eodémque modo in panes subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

Cesama. Cap. CXXI.

SESAMA stomacho inutilis cibus, halitus, grauitatem facit, quoties inter manendum commissuris dentium inhæsit: neruorum crasitiem illitu discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & ceraſtæ morsibus: capitis dolores, qui æstuatione concitantur, ex rosacea lenit: eadem efficit harba decocta in vino, præsertim inflammationib⁹ oculorum doloribúsq; prodest.

Ex ea

Ex ea fit oleum quo Ægiptij vtuntur.

Lolium. Cap. CXXII.

Lolium quod inter segetes nascitur, molitũ, illitu nomas, putrescentia vlcera, gangrænásque emarginat: sanat cum raphanis, sale & aceto feros lichenas: & ex aceto, & sulphure viuo, lepras: strumas quoq; discutit, cum fimo columbino, et lini semine decoctum in vino: rumpit, quæ ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa, vtilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, cõceptioné adiuuat.

Amylum. Cap. CXXIII.

Amylum ex eo appellatum est, quòd sine mola fiat. Optimũ ex trimestri, natione Creticum aut Ægyptium. Ratio faciundi amyli hæc est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, &, si fieri potest, nocte: cùm emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor vtilis vnà excludatur. vbi molissimum esse videtur mutata aqua pedib⁹ calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximẽdi, reliquúmq;

γίνεται δὲ καὶ ἔλαιον ἐξ αὐτῆς ᾧ οἱ αἰγύπτιοι χρῶνται.

Περὶ Αἴρεως. Κεφ. ρκβ'.

Αἶρος, οἱ δὲ ὄαρος, ἆρα ἡ γλυκεῖα ἐν τοῖς πυροῖς ἀλεσθεῖσα. ὀδύνην ἔχει θερμαρακτικὴν νομῶν καὶ σπιλάδων καὶ γαγγραίνης· μετὰ ῥαφανίδων καὶ ἁλῶν καταπλασσομένη καὶ λιχῆνας ἀγρίους καὶ λέπρας συὸς θείῳ ἀπύρῳ καὶ ὄξει θεραπεύει· σὺν κόπρῳ δὲ περιστερᾶς καὶ λινοσπέρμῳ ἐφαρμόζει ἐν οἰνῳ χειράδας διαλύει· καὶ τὰ δύσπαρα ῥήγνυσι. ἰσχιαδικοὺς τε σὺν μελικράτῳ ἐφιδεῖσα καὶ καταπλασσομένη ὠφελεῖ· σὺν ἁλφίτῳ δὲ ἢ σμύρνῃ ἢ κρόκῳ ἢ λιβανωτῷ τὸν θυμωμένον σωρεῖ καὶ συλλήψιν. Περὶ Ἀμύλου. Κεφ. ρκγ'.

Ἄμυλον ἀνόμασαι, διὰ τὸ χωρὶς μύλου κατασκευάζεσθαι. ἄριστον δὲ ὅτι τὸ σκευαζόμενον ἐκ πυροῦ σταιτίου, χρηστικὸν δὲ ἢ αἰγύπτιον. σκευάζεται δὲ ἐκ πυροῦ σταιτίου καθαροῦ, βρεχόμενος πεντάκις τ' ἡμέρας, εἰ δυνατὸν δὲ καὶ τῆς νυκτός· ὅταν δὲ μαλακὸς γένηται, δεῖ θερμαίνειν τὸ ὕδωρ ἐν ᾧ χωρὶς τοῦ κινεῖν, ἵνα μὴ συνεκκλύζηται τὸ νόστιμον. ἐπὰν δὲ παραλῇ μαλακώτατος γενόμενος, ἀπὸ τοῦ ὕδατος τρίβειν τοῖς ποσίν, εἶτα ὕδωρ ἐπιχέοντας τρίβειν· εἶτα ἀναιρεῖσθαι τὸ ὑφισάμενον πίτυρον ἁδρομῶς καὶ

καὶ τὸ λοιπὸν διαθήσαντας ἐμβαλεῖν εἰς ὑλισθήρα, διυλίσαντάς τε εὐθέως φύγειν ἐπὶ κεραμίδων καινῶν ἐν ἡλίῳ ὀξυτάτῳ· ἔνικμον γὰρ κἂν ἐπ' ὀλίγον μείνῃ ὀξίζει. ποιεῖ δὲ πρὸς ὀφθαλμῶν ῥεύματα καὶ κοιλότητας καὶ φλυκταίνας· στέλλει δὲ καὶ αἵματος ἀναγωγὰς πινόμενον, καὶ τὰς περὶ ἀρτηρίαν πραΰνει· μίγνυται δὲ καὶ γάλακτι καὶ προσφήμασι. σκευάζεται δὲ καὶ ἐν ζειᾶς βρασχέσεις καὶ πολυθείσης πρὸς μᾶζαν ἢ δευτέραν ἡμέραν, καὶ σαπὸν τρόπον ἀποθλιβείσης διὰ τῶν χειρῶν καὶ ξηρανθείσης ἐν ὀξυτάτῳ ἡλίῳ ὡς προείρηται· τὸ δὲ τοιοῦτον ἄδετον μὲν πρὸς ἰατρικὴν χρῆσιν, πρὸς ὃ τὰ λοιπὰ εὔθετον.

reliquúmq; quallo ſportíſque ſiccatum tegulis nouis confeſtim torreatur flagrantiſsimo in ſole: nanque ſi pauliſper vdum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, puſtulas, cauáque vlcera efficax eſt: ſanguinis reiectiones potu cohibet, exaſperatas fauces lenit, lacti atque obſoniis admiſcetur. Fit etiam amylum ex Zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & ſubactæ farinæ modo manibus ſubigitur: preſſáque feruentiſsimo in ſole, vt antè retulimus, exiccatur: nullius in medicina vſus, ad alia tamen conueniens.

Περὶ Τήλεως ἀλεύρου. Κεφ. ρκδ'

Τῆλις, ἡ τὸ ἐκ τῆς τήλεως ἄλευρον μαλακτικὴν καὶ διαχυτικὴν ἔχει δύναμιν· καταπλασσόμενον δὲ λεῖον σὺν μελικράτῳ ἐφθῷ, ποιεῖ πρὸς φλεγμονὰς τὰς ἐντὸς, καὶ ἐκτὸς· σὺν νίτρῳ δὲ καὶ ὄξει λεῖον καταπλασθέν, σπιλοῦα μηδὲ. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς ἐγκάθισμα εἰς τὰ γυναικεῖα· ὅσα κατὰ φλεγμονὰς ἢ μύσιν συνίστησι. σμήχει δὲ καὶ πέτρας καὶ πύτυρα, καὶ ἀχώρας τὸ ἀπόθλιμμα αὐτῆς ἐν ὕδατι ἐφθείσης· σὺν σέσαμι δὲ χυμείῳ προσθεὶς αὐτὴ πᾶσι μᾶλλον καὶ ἀνευρυῶν τοὺς περὶ τὴν ὑστέραν τόπους.

Fœnú græcũ. Cap. CXXIIII.

Fœnigræci farina vim habet emolliendi diſcutiendiq;: in aqua mulſa decocta aduerſus tam internas, q̃ externas inflãmationes, efficaciter illinitur: lienem cũ aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis ſubuenit: & ſiue tumor, ſiue præcluſio ſit vuluæ foueẽ, & inſidét. Fenigręci in aqua decocti cremor expreſſ⁹, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, et emollit, ſi cũ anſerino adipe peſsi vice ſubiiciaſ,

Viride

Viride cum aceto vtilissimum imbecillib⁹ locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tenesmos, fœtidámque dysentericorũ proluuiem: Oleũ quod ex eo exprimit, & myrtho, capillos & genitalium cicatrices absterget.

Linum. Cap. CXXV.

Linum vulgò notum est, cuius semẽ easdem quas fœnumgræcum vires habet. Discutit & emollit omnem intus forísque inflammationẽ, cum melle, oleo, exiguáque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: vitia cutis in facie varósque crudum tollit, illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiásque discutit: vlcera quæ serpunt, fauósque, cum vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cũ pari modo nasturtij & mellis: vitia pectoris extrahit si ex melle in eclegmatis vicem subsituatur: tussim lenit, venerem stimulat, si farina piperis, & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huiꝰ decoctum interaneorum vuluæque erosionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vuluæ iuflammationes in desessionibus perquàm vtile.

Cicer

χλωσῆ δὲ μετ' ὄξους ἀπογεῦσι τύποις καὶ εἰλκωμένοις ἁρμόζει. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς πρὸς τεινεσμοὺς καὶ δυσεντερικὰ ὑποχωρήματα δυσεντερικά. τὸ δὲ ἀπ' αὐτῆς ἔλαιον μυρσίνης σμήχει τρίχας, οὐλάς τε ταῖς ἐν αἰδοίοις.

Περὶ Λίνου. Κεφ. ρκέ.

Λίνου γλάεσμον, δυώδυνον δὲ ἔχει τὸ σπέρμα πλὴν ἀντίλυ τῆς τήλεως. διαφορεῖ καὶ μαλάσσει πᾶσαν φλεγμονὴν ἐντός τε καὶ ἐκτὸς, σὺν μέλιτι καὶ ἐλαίῳ καὶ ὕδατι ὀλίγῳ ἐφεψηθέν, ἢ ἐφθῷ μέλιτι ἀναλημφθέν· αἴρει δ' καὶ ἐφήλεις ὠμῶν καὶ ἰόγδοις σὺν νίτρῳ καταπλασθὲν καὶ σύκοις· σὺν κονίᾳ δὲ, παρωτίδας καὶ σκληρίας διαφορεῖ· ἑρπητάς τε σὺν οἴνῳ ἐφεψηθὲν καὶ κνησμοὺς ἐκκαθαίρει· ὄνυχάς τε λεπροὺς ἀφίησι σὺν καρδάμῳ ὕσῳ καὶ μέλιτι· ἀνάγει δὲ καὶ τὰ ἐν θώρακος σὺν μέλιτι αὐτὴ ἐκλειχτὴ λειφθέν· καὶ βῆχας παρηγορεῖ, παρορμᾷ δὲ καὶ πρὸς ἀφροδίσια μιχθὲν μέλιτι καὶ πεπέρει αὐτὴ κοπίδος πλὴν λαμβανόμενον. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς ἐνίεται πρὸς ἐντέρων καὶ ὑστέρας ἑλκυσμοὺς, καὶ ἐν κοιλίᾳ περιτομάτων καὶ φλεγμονὰς ταῖς ἐν μήτρᾳ εἰς ἐξκάθισμα, ὥσπερ τὸ τῆς τήλεως ἐνχρηστεῖ.

Περὶ

Περὶ Ερεβίνθου. Κεφ. ρκς'.

Ερέβινθος ὁ ἥμερος, ἐυκοίλιος οὐρητικος, πνευμάτων ῥηγνητικὸς, ἐυχροΐας ἀποπεπτικὸς, καταμηνίων ἀγωγὸς καὶ ἐμ-
5 βρύων, καὶ γάλακτος ῥηγνητικὸς, καταπλάσσεται δὲ μάλιστα σὺν ὀρόβοις ἑφθὸς, πρὸς ὄγκων φλεγμονὰς καὶ μυρμηκίας, πρός τε ψώρας καὶ ἀχώρας καὶ λειχῆνας καὶ τὰ καρκινώδη ἕλκη καὶ
10 καχοήθη σὺν κριθῇ καὶ μέλιτι.

Καλεῖται δὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν εἶδος, κριός. ἀμφότερα δὲ εἰσὶ διουρητικοὶ, διδρωτικοὶ πρὸς ἴκτερον καὶ ὕδρωπα τῷ ἀφεψήματος αὐτῶν σὺν λιβανωτίδι.
15 βλάπτουσι δὲ καὶ κύστιν εἰλκωμένην καὶ νεφρούς. πρὸς δὲ μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας νεοσυνίας οὔσης, ἔνιοι ἐκάστης ἐρυθρᾶς ἐρεθίσαντες ψαύσαντες ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ, εἴς τι ὀθόνιον ἀποδήσαντες
20 αὐτὸν, ῥίπτειν εἰς τὸ ὕπαιθρον κελεύουσιν, ὡς ἀποπιπτουσῶν τῶν ἀκροχορδόνων. Γίνεται δὲ καὶ ἄγριος, ἐρέβινθος ὅμοιος τοῖς φύλλοις τῷ ἡμέρῳ, ὀσμὴν δριμὺν, τῷ καρπῷ διαφέρων· πικρὸν πρὸς ὄ-
25 σα καὶ ὁ ἥμερος.

Περὶ Κυάμου ἑλληνικοῦ. Κεφ. ρκζ'.

Κύαμος ἑλληνικὸς πνευματώδης, φυσώδης, δύσπεπτος, δυσόνειρος, βηχὶ δὲ σύμφορος καὶ σαρκῶν ῥηγνητικὸς, * μέσος θερμοῦ καὶ

Cicer. Cap. CXXVI.

CICER satiuum aluo idoneum est, vrinam ciet, inflationem parit, colorem commendat, menses ac partus expellit, lac auget, cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, verrucosas informicationes, ad scabiem vlcera capitis manantia, impetiginésque: contra carcinomata, & vlcera, quę cachoëthe vocantur, cum melle & hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur: vtrunque cit vrinas, dato cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea exulceratam vesicam, & renes. In verrucarum formicantium pensiliúmque genere, prima luna singulis granis singulas tangũt, eáque grana linteolo deligata abiici post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrãtur. Syluestre cicer, foliis satiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat: idem quod satiuum præstat.

Faba. Cap. CXXVII.

Faba inflationem excitat, ægrè concoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi, frigidiq;

gidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & cœliacorũ profluuia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur. si aqua prior inter coquendũ abiiciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatũ parit. Lomẽtum eius, & per se, & cum poléta illitum, inflammationes quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices cõcolores facit, turgentes grumoso lacte mammas, etiam si inflãmatione tentẽtur, adiuuat: lac restinguit, furũculos, sugillata, parotidásq; cũ fœnigræci farina & melle discutit: cum rosa autem, thure, & oui candido, ꝓcidẽtes oculos, tumores, vuásque, reprimit: subactũ vino, suffusiones & ict⁹ oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in vino testium collectiones sanat: quo tardius pubes erũpat, pueris imo ventri illinitur, vitiligi-
nem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascũtur, gracilescunt, & minus alimenti capessunt, cũ polenta, sciſſo alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas

κὴ ψυχρῶ. ἐψηθεὶς δὲ σὺν ὄξει κράτῳ κὴ σὺν τῷ λέπει ἐδιόμενος, δυσεντερίας κὴ κοιλιακὰς ῥύσεις ἐπέχει κὴ πρὸς ἐμέτους δὲ εὔθετος βρωθεὶς. γίνεται δὲ ἀφυσσώτερος τὸ πρόσθεν ὕδατος κτ᾽ ἕψησιν ἀποχεομένου. ὁ δὲ χλωρὸς κὴ κακοσμα χώτερος κὴ φυσωδέστερος. τὸ δὲ λεῖον τῆς κνάμου καταπλασθὲν καθ᾽ ἑαυτό τε καὶ σὺν λιφίτῳ, ταῖς ἐκ πληγῆς φλεγμονὰς παύει· κὴ οὐλὰς ὁμοχρόους ποιεῖ, κὴ μασὸς χονδριῶντας κὴ φλεγμαίνοντας ὠφελεῖ· γάλα τε σβέννυσι. σὺν μέλιτι δὲ κὴ πλίνῳ ἀλεύρῳ δοθῖνας κὴ παρωτίδας κὴ ὑπόπια διαφορεῖ. σὺν ῥόδῳ τε κὴ λιβάνῳ κὴ τῷ τοῦ ὠοῦ λευκῷ, ὀφθαλμῶν πρόπτώσεις κὴ σταφυλώματα κὴ οἰδήματα στέλλει· φυρασθὲν δὲ σὺν οἴνῳ, συγχύσεις καὶ πληγὰς ὀφθαλμῶν καθίστησιν· εἴς τε ἀνακόλλημα ῥεύματος χρεὼν τὸ λέπος μασσηθὲν, ὀπτίζεται κατὰ τὸ μετώπου, καὶ δι᾽ ὄμμων φλεγμονὰς ἐψηθὲν ἐν οἴνῳ θεραπεύει· καὶ τοῖς ἐφηβαίοις δὲ τῶν παίδων καταπλασσόμενος, ἀνήβους ὀπτὸν τρεῖ· σμήχει δὲ κὴ λιφός. τὰ δὲ λέπη καταπλασσόμενα, ταῖς ἐκπιθήσας τείχας ἀτρόφους κὴ ἰσχνὰς κατασκευάζει. μετὰ δὲ ἀλφίτου καὶ ὄξους καὶ ἐλαίου καταπλασθέντα παλαιοῦ,

χειρόδας

χοιεσθαι διαφορεῖ καὶ ἕρια βάπτει τὸ ἀφέλημα αὐτῶν. ὀπτᾶται δὲ καὶ πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν βδελλῶν αἱμορραγίας λελεπισμένος εἰς δύο διαιρεθεὶς καθ' ὃ πρόσφυκεν, ἐπέχει πρόστυπούμενος κατὰ τὸ ἡμιτόμιον.

fstrumas discutiũt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dẽpto cortice in illas parteis diuisa, in quas suapte natura scindi tur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirundine con citatis: nanque eas supprimit, si semisecta apprimatur.

Περὶ Κυάμου αἰγυπτίου.

Κεφ. ρκϛ.

Faba Ægyptia.

Cap. CXXVIII.

Ὁ δὲ αἰγύπτιος κύαμος ὁν ἔνιοι ποντικὸν καλοῦσι, πλεῖστος μὲ γίνεται ἐν αἰγύπτῳ, καὶ ἐν ἀσίᾳ δὲ καὶ ἐν κιλικίᾳ ἐν ταῖς λίμναις εὐείσκεται. ἔχει ὃ φύλλον μέγα ὡς πέτασον, καυλὸν δὲ πηχυαῖον, πάχει δάκτυλον τὸ πάχος· αὐθος δὲ ῥοδόχρουν, διπλάσιον μήκωνος· ὅταν ἀποθῆται φέρει φυσικὰ περιπλήσια θυλακίσκοις, ἐν οἷς κύαμος μικρὸς ὑπερφαίνων τὸ πῶμα ὡς πομφόλυξ. καλεῖται δὲ καὶ ὠάριον καὶ κιβώτιον, διὰ τὸ τὴν φυτείαν καὶ κυάμου γίνεσθαι αὐτῆς ἐντεθειμένου ἐν ἰκμαζόλῳ. ὅπου τὲ εἰς τὸ ὕδωρ ἀφιεμένου. ῥίζα δὲ ὑπερσκληροτέρα καλάμου βιβρωσκομένη ἐφθή τε καὶ ὠμὴ· κολοκασία καλουμένη. ὁ δὲ κύαμος βιβρώσκεται μὲν καὶ χλωρός. ξηρανθεὶς δὲ γίνεται μέλας, καὶ μείζων τοῦ ἑλληνικοῦ· ἔχων δύναμιν συμπικλὴ καὶ ὑποστρεπτικὴν· ἁρμόζει δὲ δυσεντερικοῖς, καὶ κοιλιακοῖς τὸ ἐξ αὐτῶν ἄλευρον ὀπτὸν.

Ægyptia faba, quã aliqui Póticam vocant, in Ægypto plerũque prouenit: in Asiæ etiam Ciliciæq; lacubus, inuenit. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassi tudine: floré roseum dupla papaueris amplitudine: & vbi flore exuitur, fert folliculos vespa rum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullę modo, pminet. Ciborion aut Cibotion ideo nominant, id est arculã, quoniã sera tur ipsa, humenti glebæ mãdata, & ita in aquã demissa. Radice firmã harundine crassiore, quæ cruda coctáve estur: ei colocasiæ nomen est. Faba virens mãditur, & exiccata nigrescit, vulgarẽ magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho vtilem: dysentericis, cœliacisq; prodest, insparso,

insparso, polentæ vice, lomẽto: datur quoq; in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibãtur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens. Cap. CXXIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, ægrè cõcoquitur, stomachum malè habet, eúmq; & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facil limè coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi: qua ex causa aluum cohibet, si detracto anteà cortice discoquatur accuratè, primáque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventré resoluit) Somnia tumultuosa excitat, capiti, neruis, ac pulmoni inutilis: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbísve, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plãtagine, aut gallis ítegris: quæ

ἐπιπαχύνομον ἀπὸ ἀλφίτου, καὶ πολτοποιούμενον δὲ δίδοται. τὰ δὲ λέπη μᾶλλον πιεῖ ἐφόμενα ἐν οἰνομέλιτι, καὶ ποτιζόμενα πλῆθος κυάθων τριῶν, καὶ πρὸς ὠταλγίαν δὲ πιεῖ τὸ ἐν μέσῳ χλωρὸν αὐτοῦ, πικρὸν δὲ κατὰ τὴν γεῦσιν, λεῖον συὸς ῥύγει συμφόμενον τε καὶ ἐπιζόμενον.

Περὶ Φακοῦ. Κεφ. ϙκθ'.

*Φακὸς βιβρωσκόμενος συνεχῶς, ἀμβλυωπὸς, δύσπεπτος, καὶ κοσόμαχος, πνευματικὸς τοῦ μάχου καὶ ἐντέρων, κοιλίας δὲ σταλτικὸς σὺν τῷ λέπει ἐδόμενος· διαφέρει δὲ αὐτῆ ὁ ἐλαφρὸς καὶ μηδὲν ἀνιεὶς ἐν τῇ διαζεσχῇ μέλαν. Δύναμιν δὲ ἔχει συστελλικὴν· ὅθεν κοιλίαν ἵστησι, περιαπολεπισθεὶς καὶ ἐψηθεὶς ἐπιμελῶς, τῷ πρώτῳ ἐν τῷ ἀφέψεσθαι ὕδατος ἀποχεομένου, λυπεῖ γὰρ κοιλίας τὸ πρῶτον ἀφέψημα αὐτῆ, ἔστι δὲ δυσόνειρος, ἄθετος πρὸς τὰ νευρώδη καὶ πνεύματα καὶ κεφαλήν. βέλτιον δὲ τὸ ἴδιον ἔργον ἀποτελεῖ πρὸς τὰ ῥεύματα τῆς κοιλίας, μιγῆσης αὐτῷ μεθ' ὄξους, σέρεως ἢ αὐδράχνης, ἢ σεύτλου μέλανος, ἢ μύρτων, ἢ σιδίων, ἢ ῥοιδίων ξηρῶν, ἢ μεσπίλων, ἢ ὄων, ἢ ἀπίων θηβαϊκῶν, ἢ κυδωνίων μήλων, ἢ κιχωρείου, ἢ ἀργεγλώσσου, ἢ κυνάδων ὁλοκλήρων, αἳ τυγ-

αἱ πνες μετὰ τλῶ ἕψησιν βίπτον-
ται, ἢ ῥοὸς τῶ ὀπὶ τὰ ὄψα. δεῖ δὲ
τὸ ὄξος ὀπμελῶς συγκαθεψεῖν
αὐτῷ· εἰ δὲ μὴ, ταράτει τλῶ
κοιλίαν, καὶ ἀναπροσαλῶ δὲ σο-
μάχου θελιπιδώντες τειάκον
τα φακοὶ καὶ καταπθέντες ὠ-
φελοῦσι· παρηρεῖ δὲ καὶ ποδάγρας συὶ ἀλφίτῳ ἑφθὸς κατε-
ψηθεὶς καὶ καταπλασθεὶς· μετὰ
δὲ μέλιτος κόλποις κολλᾶ, ἑχά-
ρας θεῤῥήπει καὶ ἕλκη ἀνα-
καθαίρει· συὶ ὄξει δὲ ἑφθεὶς
σκληρώματα καὶ χοιράδας δια-
φορεῖ· συὶ μελιλώτῳ δὲ ἢ κυ-
δωνίᾳ, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς ϗ
δακτυλίᾳ θεραπεύῃ, ῥοδίνου μι-
γνυμένου· ὀπὶ δὲ τῶν μειζόνων
ἐν δακτύλῳ φλεγμονῶν ϗ κόλ-
πων μεγάλων, συὶ σιδίοις ἢ ῥό-
δοις ξηροῖς ἀφεψόμνος μιγνυ-
μένου καὶ μέλιτος· θερὸς νομὰς
δὲ γαγγραινικὰς ὁμοίως, ἢ καὶ
θαλάσσης μιγνυμένης· θερὸς δὲ
φλυκτίναις καὶ ἕρπησι καὶ ἐ-
ρυσιπέλατα καὶ χαμέτλα ὡς
θερείρηται· θερὸς δὲ χονδριῶν-
τας μασοὺς καὶ ἀπαργανώσεις ἑ-
φόμνος ἐν θαλάττῃ ἀσμίζει κα-
ταπλασθείς.

quæ post decoctionem abiiciuntur, vel vuarum rhois quæ obsoniis insparguntur: verùm acetum cum eo diligéter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari prodesse: decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat, decocta in aceto duritias & strumas discutit, cũ cotoneo aut melilolo medetur inflammationibus oculorum, sedisque, addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangrænam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernionibusq;, vt anteà dictum est: contra mammas in quibus lac in grumos coiit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

Πρὶ Φασόλω. Κεφ. ρκ΄.

Φασόλος φυσώδης, πνευμάτων κινητικὸς, δύσπεπτος. ἑφθεὶς δὲ χλωρὸς ϗ ἐδιόμνος, κοιλίας μα λακτικός· θερὸς ϗ ἐμέλυς εὔθετος.

Phasioli. Cap. CXXX.

Phasioli inflant, spiritus cient, ægrè coquũtur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

Πρὶ

Eruum. Cap. CXXXI.

Eruum paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valuulis habés, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluum esu turbat, sanguinẽ per vrinam extrahit, elixo boues saginantur. Parandæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana cãdidáque deliguntur, permiscendóque aqua respergũt, donec sufficienter combibãt: postea torrẽtur, vsque dum hians cortex disrumpatur: molitáque, farinario cribro incernuntur, postremò farina recõditur. Hæc aluo vtilis est. Vrinam ciet, meliorem colorem efficit, sanguinem per vesicam aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera cum melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie, & maculas totúmq; corpus emẽdat: nomas, gãgrænas, duritiásq;, serpere nõ patiť mámarũ duritias emollit, atra vlcera quæ theriomata vocãt, fauósque emarginat, carbũculos rũpit: cũ vino subacta illitu morsib⁹ viperarũ, canũ, hominúq; medẽ: vrinę difficultates, tenesmósq;, ex aceto mitigat.

Eruum

Περὶ Ὀρόβου. Κεφ. ρλά.

Ὄροβος γνώριμος θαμνίσκος, τενόφυλλος, λεπτὸς, ἔλαιον σπερμάτια ἐν λοβοῖς, ἐξ ὧν γίνεται τὸ καλούμενον ὀρόβινον ἄλευρον, ὁ ὠφελεῖ τὴν ἰσχιακὴν χεῖσιν ἁρμόζει. ἔστι δὲ καρηβαρικὸς, κοιλίας ταράττικὸς εἰ βρωθείη, αἷμα τε δι' οὔρων ἄγει· βοῦς δὲ λιπαίνει ἐφθὸς παραπιθήμενος. σκευάζεται δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ ὀρόβινον οὕτω· ἐκλέξας τοὺς εὐτρόφους, καὶ λευκοὺς βαΐνε ὕδατι ἀναφυσῶν, ἑάσας τε ἐφ' ἱκανὸν συμπεῖν, φρίξῃ ἄχρις ἂν περιῤῥαγῇ ὁ φλοιός. εἶτα ἀλέσας καὶ διασείσας κοσκίνῳ, λεπτῷ ἀπόθες. ἔστι δὲ εὐκοίλιον, οὐρητικὸν, εὐχροίας ποιητικὸν· φλεγματώδη δὲ ἐν βρωτῷ ἢ ἐν ποτῷ, μετὰ τροφῶν αἷμα ἄγει διὰ κοιλίας καὶ κύστεως· καθαίρει δὲ ἕλκη σὺν μέλιτι, καὶ φακοὺς καὶ ἐφήλεις καὶ αὐλούς, καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα· νομάς τε ἵστησι καὶ σκληρώματα, καὶ γαγγραίνας· καὶ σκληρίας μαλάσσει τὰς ἐν μαζοῖς, καὶ θηριώδη καὶ ἀνθρακας καὶ κηλίδα θεραπεύει· φυραθεὶς δὲ σὺν οἴνῳ κυνόδηκτα καὶ ἀνθρωπόδηκτα καὶ ἐχιόδηκτα θεραπεύει καταπλαστόμενος· σὺν ὄξει δὲ δυσουρίας, καὶ τροφοὺς καὶ τεινεσμοὺς παύει. ἁρμόζῃ

μόζει δὲ καὶ τοῖς ἀτροφοῦσι, καρύου μέγεθος φρυκτὸν ληφθὲν σὺν μέλιτι. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτοῦ καταντλούμενον, χιμέτλα καὶ κνησμοὺς τοὺς ἐν σώματι θεραπεύει.

Περὶ Θέρμου. Κεφ. ρλβʹ.

Θέρμος ἥμερος γνώριμος, οὗ τὸ ἄλευρον σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον, ἕλμινθας ἐκτεινάσσει, καὶ αὐτοὶ δὲ ἀποβρεχέντες, καὶ ἔμπικροι ἐσθιόμενοι, τὰ αὐτὰ δρῶσι. καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν τὰ αὐτὰ ποιεῖ μετὰ πηγάνου καὶ πεπέρεως ποθέν· ὅθεν καὶ σπληνικοὺς ὠφελεῖ. ἐπάντλημά τε γαγγραίνης ἐστὶ χρήσιμον, καὶ θηριωμάτων, ψώρας ἀρχομένης, ἀλφῶν, σπίλων ἐξανθημάτων τε καὶ ἀχώρων. τὸ δ' αὐτὸ καὶ καταμηνίων, καὶ ἐμβρύων ἐπισπαστικὸν, μετὰ σμύρνης καὶ μέλιτος ἐν προσθέτῳ. καθαίρει δὲ τὸ ἄλευρον χρῶτα καὶ πελιώματα, καὶ φλεγμονὰς πραΰνει σὺν ἀλφίτῳ καὶ ὕδατι· σὺν ὄξει δὲ ἰσχιάδας παρηγορεῖ καὶ φύματα, χοιράδας δὲ μεταβάλλει ἐν ὄξει ἑψηθεὶς καὶ καταπλασθεὶς, καὶ ἄνθρακας περιρρήσσει. μεθ' ὕδατος δὲ ὀμβρίου ἑψηθέντες οἱ θέρμοι ἄχρι χυλώσεως, σμήχουσι πρόσωπον· μετὰ δὲ χαμαιλέοντος ῥίζης τοῦ μέλανος ἑψηθέντες, προβάτων ψώρας ἰῶνται,

ἐν

Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostũ, & ad vncis magnitudiné melle exceptum, sumptumq́; conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

Lupini. Cap. CXXXII.

Satiuus lupinus notus est, cuius farina cum melle delinctu, aut potu vẽtris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati & cum sua amaritudine esiti, eadẽ efficiũt. Decoctũ eorũ idem munus pręstat, cum ruta & piperé potum: quare lienosis prodest. Eodẽ vlcera tetra, quæ theriomata vocant, gangrænas, incipientẽ scabiem, eruptiones pustularũ, vlcera in capite manãtia, vitiligines, maculásque fouere vtilissimũ. Menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liuorésque corrigit, inflammationes cum polenta & aqua mitigat, tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit; strumas in aceto cocta illitáque dissipat, carbunculos rumpit. Decocti cœlesti aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorũ scabiei, cum radice nigri chamæleontis, ita vt tepente decocto abluantur.

Cit vrinam radix cum aqua cocta. Lupini triti, vbi maceratu dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatem faciunt.

Lupinus sylvestris.

Cap. CXXXIII.

Gignuntur & sylvestres lupini, satiuis similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satiui possunt.

Rapum. Cap. CXXXIIII.

Decocta rapi radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, venerem stimulat: decocto podagræ, pernionésque fouentur, contritóque rapo atque imposito iuuantur: si excauatæ radidici rosaceum ceratum adigatur, & feruenti cinere elique scat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & vrinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est: potum contra venena salutare est, venerem cõcitat. Rapum muria cõditum, minus aliméti sufficit: sed multo magis appetentiam recreat.

Sylvestre rapũ. Ca. CXXXV.

Sylvestre rapum in aruis nascitur,

* ἐκλελυμένων τῷ ἀφεψήματι χλιαρῷ. ἡ δὲ ῥίζα ἐνηδεῖσα σὺν ὕδατι καὶ πεδεῖσα, ἕρπην κινεῖ. οἱ δὲ ἀπογλυκανθέντες λεῖοι σὺν ὄξει πεδήντες σκληρὸν ἄσιλον θεραπεύουσι, καὶ ἀνορεξίαν ἰῶνται.

Περὶ Θέρμου ἀγρίου.

Κεφ. ρλγ΄.

Γίνεται δὲ καὶ θέρμος ἄγριος, ἐμφερὴς τῷ ἡμέρῳ, κατὰ πάντα δὲ μικρότερος, πυιῶν ὅσα καὶ ὁ ἥμερος.

Περὶ Γογγύλης. Κεφ. ρλδ΄.

Γογγύλης ἡ ῥίζα ἐφθὴ πρόφιμος, πνευματωτική, σαρκὸς πλαδαρᾶς γυμνητική, ἀφροδισίων παρορμητική. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς, ποδάγρας καὶ χειμέτλων ἐπὶ καταπλασσόμενον ὠφελεῖ· εἰ δέ τις ἐγκλύσας τὴν ῥίζαν, καρφαλῷ ῥοδίνῳ ἐν αὐτῇ ὀπὴ θερμοπαρὰ τάξει, πυιεῖ πρὸς τὰ εἱλκωμένα χείμετλα. ὁ δὲ ἐξ αὐτῆς ἀπόζεσμος βιβρώσκεται ἐφθὸς, ἔστι δὲ διουρητικός. τὸ δὲ σπέρμα εἰς ἀντιδότους καὶ θηριακὰς ἀγωνιώδεις εὔθετον· βοηθεῖ δὲ καὶ τοῖς θηριασμοῖς πεδὲν, παρορμᾷ καὶ πρὸς ἀφροδίσια. ἀλμυθεῖσα δὲ ἀπροφορητέρα γίνεται βιβρωσκομένη· ταῖς μύσι τοι ὀρέξεις ἀναλαμβάνει.

Περὶ Γογγύλης ἀγρίας. Κεφ. ρλε΄.

Ἡ μὲν τοι ἀγρία γογγύλη φύεται ἐν ἀγροῖς,

ἀρούραις, θάμνος πηχυαῖος τὸ ὕψος, πολύκλαδος, ἐξ ἄκρου λεῖος, φύλλα ἔχουσα λεῖα, δακτύλου τὸ πάχος, ἢ καὶ μείζονα· καρπὸν δὲ ἐν λοβοῖς καλυκώδεσιν· ἀνοιχθέντων δὲ τῶν περικαρπίων, ἔσωθεν ἄλλος κεφαλοειδὴς ἐστι * λοβὸς, ἐν ᾧ σπερμάτια μέλανα, θραυσθέντα δὲ λευκὰ ἔνδοθεν. μίγνυται δὲ σμήγμασι προσώπου καὶ τοῦ ἄλλου χρωτός· ὅσα δι' ἀλεύρων γίνεται θερμίνων, ἢ πυρίνων ἢ αἰρίνων ἢ ὀροβίνων.

Περὶ Βουνιάδος. Κεφ. ρλϛ΄.

Βουνιὰς, καὶ ταύτης ἡ ῥίζα ἑφθὴ φυσώδης ἐστὶν, ἧττον δὲ τρόφιμος· ποιεῖ γὰρ τὸ σπέρμα αὐτῆς ἀνενεργῆ τὰ θανάσιμα προπινόμενον, μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις, ἁλμεύεται καὶ ταύτης ἡ ῥίζα.

Περὶ Ῥαφανίδος. Κεφ. ρλζ΄.

*Ῥαφανὶς, καὶ αὕτη πνευμάτων γεννητικὴ καὶ θερμαντικὴ, εὔστομος· ἀλλ' ἀστόμαχος, ἐρευκτικὴ δέ ἐστι καὶ οὐρητική, εὐκοίλιος εἴ τις αὐτὴν ἐπιλαμβάνει μᾶλλον συνεργοῦσαν τῇ ἀναδόσει. προεσθιομένη δὲ μετεωρίζει τὴν τροφήν· ἁρμόζει δὲ καὶ τοῖς ἐμεῖν μέλλουσι προεσθιομένη. ἀκριβοῖ δὲ καὶ τὰς αἰσθήσεις· ἑφθὴ δὲ ποιεῖ λαμβανομένη βήσσουσι χρονίως, καὶ τοῖς πάχος γεννῶσιν ἐν θώρακι. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτῆς μετ' ὀξυμέλιτος λαμβανό-

ſcitur, fruticoſum in cubiti altitudinē aſſurgēs, ramoſū, læue in cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora & fructum in ſiliquis calyculatis: cúmq; eorū inuolucra aperiūtur, alia intus ſiliqua ſpectatur, quæ quandā capitis ſpeciē prębet, in qua ſemina paruula cōcipiūtur, foris nigra intus alba. Additur in medicaméta quibꝰ ad detergendā cutē in facie, totóq; corpore, vtimur: præſertim quæ ex lupini aut arui, tritici aut lolij farina, fieri ſolent.

Napus. Cap. CXXXVI.

Cocta napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiſcetur, conditur ſale radix.

Radix Cap. CXXXVII.

Radix (q̄ græcis raphanꝰ dicit̄) excalfacit, flatus gignit, ori ſuauis eſt: ſed ſtomacho aduerſat̄, ructꝰ ciet, vrinā pellit, aluo aptior: ſummo tamē cibo ſumi debet, quo magis eiꝰ diſtributionē adiuuet. quū aūt p̄ſumit̄, cibū ſuſpendit: quare vomituris cōmodiſsimè datur ante cibū. Sēſuum aciē excitat: decocta cōtra veterē tuſsim, & pituitæ craſsitiē in pectore, efficax eſt. Cortex ex aceto mulſo

celerius

celerius vomitiones mouet: hydropicis commodissimè illinitur, lienosis vtilis, sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur: cótra viperarum ictus auxiliatur, alopecias ad pilum reducit, lentigines cum loliacea farina emendat, his qui fungis strangulantur, tam cibo quàm potu salutaris est. Semen vomitiones facit, vrinam mouet, menses cit, lienem extenuat, cum aceto illitum gangrænas validissimè emarginat, : coctum cum aceto mulso anginis perquàm vtiliter gargarizatur, contra cerastis morsus, potũ ex vino auxilio est.

Rhaphanus syluestris. Cap. CXXXVIII.

Syluestri rhaphani, quã Romani armoraciã vocãt, folia satiuo similia, sed magis lãpsanã imitãtur: radix gracilis, tenera, subacris. Tam foliũ q̃ radix in olera recipitur: sed hæc excalfacit, vrinã concitat, ęstuosa est.

Siser. Cap. CXXXIX.

Siser vulgò cognitum, cuius radix decocta ori grata est, & stomacho, vtilis, vrinam ciet, & appetentiam inuitat.

Lapathũ siue rumex. Ca. CXL.

Ex generib⁹ rumicis, oxylapathum

λαμβανόμενος, ἐμετικώτερος· ἁρμόζων ὑδρωπικοῖς, καταπλασθεὶς δὲ εὐθετεῖ καὶ σπληνικοῖς· σὺν μέλιτι δὲ νομὰς ἐφίστησι καὶ ὑπώπια αἴρει. βοηθεῖ καὶ ἐχιοδήκτοις, καὶ ἀλωπεκίας δασύνει· φακοὺς ἀποσμήχει σὺν αἰρίνῳ ἀλεύρῳ, βοηθεῖ καὶ τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγομένοις βεβρωσκόμενος ἢ πινόμενος καὶ ἔμετον ἄγει. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῆς ἐμετικὸν, οὐρητικὸν, σπληνὸς καθαιρετικὸν πινόμενον μετ᾽ ὄξους· συναγχικοῖς τε βοηθεῖ ἀφεψηθὲν σὺν ὀξυμέλιτι θερμῷ εἰς ἀναγαργάρισμα, καὶ πρὸς κεράστου δῆγμα σὺν οἴνῳ πινόμενον βοηθεῖ, *ἐπιπλασθὲν δὲ μετ᾽ ὄξους καὶ γαγγραίνας εὐτόνως περιχαράσσει.

Περὶ Ῥαφανίδος ἀγρίας. Κεφ. ρλη΄.

Ῥαφανὶς ἀγρία φύλλα ἔχει ὅμοια τῇ ἡμέρῳ, πρὸς τὰ τῆς λαμψάνης μᾶλλον· ῥίζα δὲ ἰσχνὴ, μαλακὴ, ὑπόδριμυς. λαχανεύεται δὲ τὰ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα *ἑφθά· ἔστι δὲ θερμαντικὴ, οὐρητικὴ, καυματώδης.

Περὶ Σισάρου. Κεφ. ρλθ΄.

Σίσαρον γνώριμον, οὗ ἡ ῥίζα ἑφθὴ εὔστομος, εὐστόμαχος, οὐρητικὴ, ὀρέξεως προσκλητική.

Περὶ Λαπάθου. Κεφ. ρμ΄.

Λάπαθον, τὸ μὲν αὐτοῦ ὀξυλάπαθον

παθον λέγεται. φυόμενον δὲ ἔλεσι, σκληρὸν κατὰ ἄκρα, ὄπτεξυ. τὸ δὲ πὶ κηπευτὸν οὐχ ὅμοιον τῷ φυτῷ. τείτον δ' ὄξιον, μικρὸν, παρόμοιον ἀγνογλώσσῳ, μαλακὸν, ταπεινόν. ἔστι δὲ καὶ τέταρτον εἶδος ἀυτῶ, ὃ ἔνιοι ὀξαλίδα ἢ ἀναξυρίδα ἢ λάπαθον καλοῦσιν, ᾧ φύλλα ὅμοια τῷ ἀγρίῳ καὶ μικρῷ λαπάθῳ, καυλὸς ὑ μίγας, καρπὸς ὠοειδὴς, ἐρυθρὸς, σπερμὴς, ὁπὶ τῷ καυλῷ, * καὶ ὁπὶ τῶν φαεσφυάδων. πάντων δὲ τὸ λάχανον μαλάττει κοιλίαν ἐμπᾶν. ὠμὸν δὲ καταπλαττόμενον, μελικηρίδας * σὺν ῥοδίνῳ ἢ κρόκῳ διαφορεῖ. τὸ δ' ἀπέρμα τῶ ἀγρίυ καὶ τῶ ὀξυλαπάθου καὶ τῆς ὀξαλίδος, πίνεται ὠφελίμως μὲθ' ὕδατος ἢ οἴνου, πρὸς δυσεντερίας καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις, καὶ ἄσθμα στομάχου, καὶ πρὸς σκορπίυ πληγήν. καὶ εἰ περιπίοι δέ τις οὐδὲν πείσεται πληγείς. αἱ δὲ ῥίζαι ἀυτῶν ἑφθαὶ σὺν ὄξει καὶ ὠμαὶ καταπλασθεῖσαι, θεραπεύουσι λέπρας, λειχῆνας, ὄνυχας λεπρούς· δεῖ δ' προαρρίζειν ἢ τὸ πον ἐν ἥλιφ νίτρῳ καὶ ὄξει. πρὸς δὲ καὶ κνησμοὺς τὸ ἀφέψημα ἀυτῶν θερμὸν τρύβωμον. παχύνουσι δ' ὠταλγίαν καὶ ὀδοντα λγίαν ἐμπεῖται ἐν οἴνῳ καὶ διαχλυζόμενοι, διαφορούσι καὶ χιρεδάς καὶ παρωτίδας ἑφθαὶ σὺν

pathum vocant, quod in acutũ tendit, dura habẽs extrema, in paluſtribus naſcẽs. Alius eſt ſatiuus, illi diſsimilis. Tertiũ genꝰ ſylueſtre, paruũ, plantagini ,proximũ, humile & molle. Quartum eſt quod alij oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon vocãt. Folia ei⁹ ſylueſtri ac exiguo rumici ſimilia, caule nõ magno, ſemine ſubacuto, rubẽte, acri, in caude & agnatis appẽdicibus, emicante. Omnium decocto olere aluus emollit. Crudi illitu, melicerides, roſaceo aut croco adiecto, diſcutiunt. Sylueſtris & oxylapathi, & eius quam oxalida nominãt, ſemen ex aqua aut vino vtiliter bibitur, contra dyſenterias, & cœliacorum affectus, ſtomachi faſtidia, ſcorpionum ictus. Quod ſi quis in potu præſumat, nihil moleſti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & ſcabroſos vngues perſanãt: ſed antea locus aceto & nitro in ſole perfricandus eſt. Pruritus corporis, decoctum earum fedat, ſi foueatur, aut in ſoliis balnearum confricetur. Coctę in vino & inſtillatę, auriũ dentiúmq; dolorem mulcent, ſtrumas parotidásque diſcutiunt,

lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicum gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tritæ & admotæ fœminarum profluuia sistunt, cum vino autem potæ regio morbo medentur, calculos vesicę comminuunt, menses ciét, scorpionum ictibus auxiliátur.

Hippolapathon. Ca. CXLI.

Hippolapathon olus est magnū, in paludibus nascens: easdem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

Lampsana. Cap. CXLII.

Lampsana syluestre olus est: plus alit q̃ rumex, & stomacho vtilius. Cuius folia caulésq; coquuntur in cibo.

Blitum. Cap. CXLIII.

Blitum estur oleris modo, aluo vtile est: nullius in medicina vsus.

Malua. Cap. CXLIIII.

MALVA satiua esui longè aptior syluestri: stomacho aduersatur, aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis & vesicæ vtilis. Cruda folia cum salis exiguo mãducata, ægilopas ex melle sanant: verùm cùm cicatricem trahere cœperint, ea demum citra

σὺν οἴνῳ καταπλασθεῖσαι, σπλῆνα δὲ σὺν ὄξει. καὶ ἐν δέσματι δέ τινες χρῶνται ταῖς ῥίζαις πρὸς χοιράδας, περιάπτοντες τῷ τραχήλῳ. ἱστᾶσι καὶ ῥοῦν γυναικεῖον προστεθεῖσαι λεῖαι, ἀφεψηθεῖσαι δὲ σὺν οἴνῳ καὶ πινόμεναι, ἰκτερικοὺς ἀποθεραπεύουσι, καὶ λίθους τοὺς ἐν κύστει θρύπτουσιν, ἔμμηνά τε ἄγουσι, καὶ σκορπιοπλήκτοις βοηθοῦσιν.

Περὶ Ἱππολαπάθου. Κεφ. ρμα΄.

Ἱππολάπαθον λάχανόν ἐστι μέγα ἐν ἕλεσι γινόμενον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τοῖς προειρημένοις.

Περὶ Λαμψάνης. Κεφ. ρμβ΄.

Λαμψάνη λάχανόν ἐστιν ἄγριον, τροφιμώτερον καὶ εὐστομαχώτερον τοῦ λαπάθου, οὗ τὰ φύλλα καὶ ὁ καυλὸς ἐσθίεται ἑφθά.

*Περὶ Βλίτου. Κεφ. ρμγ΄.

* Βλῖτον λαχανεύεται καὶ τοῦτο· ἔστι δὲ εὐκοίλιον, οὐδεμίαν ἔχον φαρμακώδη δύναμιν.

Περὶ Μαλάχης. Κεφ. ρμδ΄.

Μαλάχη ἐδωδιμωτέρα μᾶλλον ἡ κηπευτὴ τῆς χερσαίας· κακοστόμαχος δὲ καὶ εὐκοίλιος, καὶ μᾶλλον οἱ καυλοί· ἐντέροις δὲ καὶ κύστει ὠφέλιμοι. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ὠμὰ καταπλασθέντα καὶ μετὰ ὀλίγων ἁλῶν μασηθέντα αἰγίλωπα ἀνασκευάζειν σὺν μέλιτι· πρὸς μέντοι τῇ ἀπουλώσει δίχα

δίχα τῶν ἁλῶν χρηστέον αὐτῇ. ποιεῖ καὶ πρὸς μελισσῶν καὶ σφηκῶν πληγὰς καταπλασσομένη· κἂν προχρίσηταί τις αὐτὴν ὠμὴν λείαν σὺν ἐλαίῳ, ἄπληκτος διαμένει. μετὰ δὲ οὔρου καταπλασθεῖσα, ἰχῶρας καὶ πίτυρα ἰᾶται. ἑφθὰ δὲ λεῖα τὰ φύλλα καὶ σὺν ἐλαίῳ ἐπιτιθέμενα, πυρίκαυτα καὶ ἐρυσιπέλατα ὠφελεῖ. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς μαλακτικὸν ἐγκάθισμα ὑστέρας, εἴς τε ἐνέματα πρὸς δηγμοὺς ἐντέρων καὶ μήτρας καὶ δακτυλίου ἁρμόδιον. ὁ δὲ ζωμὸς σὺν ταῖς ῥίζαις βοηθεῖ ἑψόμενος πᾶσι τοῖς θανασίμοις, ξηρὰν δὲ δεῖ συνεχῶς πίνοντας. ὠφελεῖ δὲ καὶ φαλαγγιοδήκτοις καὶ γάλα κατασπᾷ. ὁ δὲ καρπὸς μιγνύμενος αὐτῷ λωτοῦ ἀγρίου σπέρματος, πινόμενος μετὰ οἴνου, τὰ περὶ κύστιν ἀλγήματα πραΰνει.

Περὶ Ἀτραφάξυος. Κεφ. ρμέ.

Ἀτράφαξις οἱ δὲ, χρυσολάχανον, λάχανον γνώριμον. διττὸν, τὸ μὲν ἄγριον, τὸ δὲ κηπευτόν. λαχανεύεται δὲ ἑφθόν. ἔστι δὲ κοιλίας μαλακτικὸν, καταπλασσόμενον δὲ ὠμόν τε καὶ ἑφθὸν, φύγεθλα διαφορεῖ. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ πινόμενος μετὰ μελικράτου, ἴκτερον θεραπεύει.

Περὶ Κράμβης.

Κεφ. ρμϛ'.

Κράμβη ἡ ἥμερος εὐκοίλιος, ἀπερίζεστος ἐσθιομένη, καθεψηθεῖσα

citra ſalem vtendum eſt. Contra aculeatos apium veſparúmque ictus, illita efficax eſt: eadem cruda cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcera manãtia in capite, furfuréſque cum vrina ſanat. Sacris ignibus & ambuſtis decocta folia, tritáque, vtiliſsimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas inſeſsione mollit: prodeſt eroſionibus veſicæ, & inteſtinorum, vuluæ, ſedíſque, clyſtere infuſum. Ius decoctæ cũ radice ſua, contra omnia venena auxiliatur, ſi continuò à bibentibus reuomatur. Cõtra phalangiorum morſus remedio eſt, lac euocat. Semen in vino potũ addito loti ſylueſtris ſemine, veſicæ cruciatus lenit:

Atriplex. Cap. CXLV.

Atriplicẽ aliqui chryſolachanon vocãt, cognitum olus eſt. Duo eius genera, ſylueſtre & ſatiuum. Coctum eſtur, vt olus. Aluum mollit, panos diſcutit, ſiue crudum, ſiue coctum illinatur. Semẽ cum aqua mulſa potum, regium morbum ſanat.

Braſsica. Cap. CXLVI.

Braſſica ſatiua aluo eſt idonea, ſi modo leuiter ferueſacta edatur (nam percocta aluum

uum sistit, sed multò magis bis cocta, aut quę in lixiuio coquitur) stomachum autem malè habet. acrior est æstiua. In Ægypto propter amaritudinem non estur. Cæcutiétibus, & tremulis esse prodest: summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condita stomacho inimica est, aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus aluum emollit: cum vino quoque epotus viperarum morsibus auxiliatur: cum fœnigræci farina podagris & articulorum vitiis illinitur: prodest & sordidis vlceribus & vetustis illitus: caput purgat naribus infusus: mẽses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribúsque: epiny ctidas, ignem sacrum, lepráque sanant: carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent: cocta, addito melle, aduersus depascentia vlcera, gangrænásq; valent: lienosis q; ex aceto cruda prosunt. Mãsa, deuorato succo, retusam vocem instaurant.

Deco-

θεῖσα δὲ κοιλίαν ἵστησι, καὶ μᾶλλον ἡ δίσφθος καὶ ἐν κονίᾳ ἑφθεῖσα, κακοσόμαχος ὑπ' ἀριμυτέρα ἡ ἑψεινή. ἡ δὲ ἐν αἰγύπτῳ διὰ πικρίαν ἄβρωτος. ἀμβλυωπεῖ σι δ' βοηθεῖ καὶ βομώδεσιν ἐσθιομένη, καὶ ταῖς ἐκ κραιπάλης καὶ οἴνης κακίας σβέννυσιν ἐπλαμβανομένη. τὸ δὲ ἐξ αὐτῆ χύμα ἐυστομα χάτερον μέν, ἀριμύτερον δὲ καὶ ἀρτηριακώτερον. παρεχθὲν δ' κακοσόμαχον, καὶ κοιλίας παρεκτικόν. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς ὠμὸς μετ' ἴριδος καὶ νίτρου καταπινόμενος, κοιλίαν μαλάττει· μετ' οἴνου δὲ πεθεὶς ἐχιοδήκτοις βοηθεῖ. ζωὴ πιλίνη δὲ ἀλεύρῳ καὶ ὄξει, ποδαγρικοῖς καὶ ἀρθριτικοῖς ὑγιάσει. ῥιπαροῖς ἐπιπλασθεῖσα τύλμοις καὶ παλαιοῖς ἀμύζει· ἐγχρόμενός τε καθ' ἑαυτὴν ὑπὸ ῥινὸς κεφαλὴν καθαίρει· μετὰ δὲ αἰείνου ἀλεύρου ἐφεστεθεῖς, καταμήνια ἄγει. τὰ δὲ φύλλα καὶ απλαούμενα καθ' ἑαυτὰ ἢ μετ' ἀλφίτων λεῖα, ποιεῖ πρὸς πᾶσαν φλεγμονὴν καὶ οἰδήματα, καὶ ἐρυσιπέλατα δὲ καὶ ὀπυκτίδας καὶ λέπρας ἰᾶται· μεθ' ἁλῶν δὲ ἀνθρακας διαῤῥήττει· ἴσχει δὲ καὶ ῥῦσιν τῶν ἐν κεφαλῇ βιχῶν ἐπόμενα δὲ καὶ μυκώμενα μέλιτι, πρὸς νομὰς γαγγραινῶν ποιῆσι. ὠμὰ δ' ἐδώδιμα μεθ' ὄξους ἁπλωτικοὺς ὠφελεῖ. διαμασώμενα δὲ, φωνῆς ἀπεκοπὴν καθίστησι τοῦ χυλοῦ καταπινομένου.

τὸ δὲ

τὸ ἢ ἀφέλημα ἢ αὐτὴ, κολίαν ἢ ἔμμηνα κινεῖ πινόμενον. τὸ ἢ ἄνθος ἀτόκιον μετ' ὀπὸς ἀποκύησιν ἀφίστησιν ἐν πότῳ. τὸ ἢ σπέρμα μάλιστα τὸ ἐν αὐγύπτῳ γινόμενον πινόμενον, ἢ μύθους ἐκπιάνει· μίσγεται ἢ ἢ εἰς ἀντιδότους κοχλιακάς. πρόσωπον τ' ἀποκαθαίρει ἢ φακούς. οἱ δὲ καυλοὶ χλωροὶ καίντες σὺν ὀπὸς ῥίζαις ἢ ἀναληφθέντες σέπι χρείῳ πολιαῖῳ, πλευραῖς χρόνια ἀλγήματα ἐπιτείνοντες παύουσιν.

Περὶ Κράμβης ἀγρίας.

Κεφ. ρμζ'.

Κράμβη ἀγρία φύεται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν παραθαλασσίοις ἢ χρημνώδεσι τόποις, ὁμοία τῇ ἡμέρᾳ, λευκοτέρα δὲ ὅτι καὶ δασυτέρα ἢ πικρά. τὸ δὲ κύμα αὐτῆς ἐν κονίᾳ ἑφθὲν ἐκ ἄσημον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, κολλητικὴν τραυμάτων, ἢ διαφορητικὴν οἰδημάτων τε ἢ φλεγμονῶν.

Περὶ Κράμβης θαλασσίας.

Κεφ. ρμή.

Ἡ ἢ θαλασσία λεγομένη κράμβη, ἐξήλλακται τῷ πεπτὶ τὴν ἡμέρᾳ, ἔχουσα φύλλα εὐμήκη τῇ τραγύῃ λὴ ἀγριολοχίᾳ ὅμοια· ἐκπίφυκε ἢ ἕκαστον αὐτῆς ἀπὸ κλονίων ὑπερύθρων ἐξ ἑνὸς μόρου ὥσπερ κοτύλης· ἔχει ἢ ὀπὴν λευκὴν, ἁπαλήν. ἔστι ἢ τῇ γεύσει ὑφαλμυρὸς, ἢ πόσως ἔμπικρος, λιπαρὸς τῷ σύστασιν. ὅλη

Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pessō subditus, partum abortu vitiat. Semen eius, præsertim quæ in Ægypto nascitur, potum tineas repellit: in antidota theriaca additur, faciei cutem lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cū radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

Brassica syluestris.

Cap. CXLVII.

Syuestris brassica, maritimis præruptisque locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiórque, amara. Cuius cyma in lixiuia cocta, ori non insuauis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflāmationes tumoresque discutiunt.

Brassica marina.

Cap. CXLVIII.

Marina brassica à satiua prorsus abhorret, quòd folia ferat rotūdæ aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, vt hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed pauco, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu.

Herba

Herba in totum ſtomacho inimica, acris: vehementiſsimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniã cũ pingui carne.

Beta. Cap. CXLIX.

Beta duorum generũ eſt, è quibus nigra coquitur cũ lenticula, vt ventrẽ ſiſtat: quod magis radice eius præſtatur. Cãdida aluo vtilis eſt. Vtraq; tamen propter nitroſum humorẽ: quẽ habet in ſe, noxij ſucci eſt. Vnde ſuccus earũ cũ melle naribus inditꝰ, caput purgat, auriũ doloribus auxiliatur. Decoctũ radicis & foliorũ, furfures lendéſq; deterget, perniones fotu mitigat. Crudis foliis vitiligines, nitro antea perfrictas: alopeciarũ inanitates, ſcapello prius exaſperatas: atq; depaſcétia vlcera, illini prodeſt. Eruptionibus papularũ, igni ſacro, ambuſtiſque, cocta medetur.

Portulaca. Cap. CL.

Portulacæ vis adſtringit: capitis doloribus, inflammationibus oculorũ, cæteriſq;, cũ polenta imponitur: ardoribus ſtomachi, ſacro igni, veſicæ doloribus, auxilio eſt: commanducata, dentiũ ſtupores ſedat: ſtomachi & inteſtinorum æſtuationem, fluxionéſque mulcet: renes

ὅλῳ δὲ ἧττον, κακοχύμους, δυσεντερίας, κοιλίας λυπικωτάτη ἐφθὴ βρωθεῖσα. σωφέλιοι δὲ αὐτῇ ἔνιοι διὰ τὴν δριμύτητα τὰ λίπη ἐπὶ τῶν κριῶν.

Περὶ Τεύτλου. Κεφ. ρμθ'.

Τεῦτλον διττόν ἐστιν, ὧν τὸ μὲν μέλαν σταλτικώτερον κοιλίας σὺν φακῇ ἐψηθὲν· καὶ μᾶλλον ἡ ῥίζα. τὸ δὲ λευκὸν εὐκοίλιον. ἀμφότερα δὲ κακόχυμα διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς νίτρωδες. ὅθεν ὁ χυλὸς αὐτῶν καθαίρει κεφαλὴν ῥινὶ ἐγχεόμενος μετὰ μέλιτος, καὶ ὠταλγίας ὠφελεῖ. τὸ δὲ τῶν ῥιζῶν καὶ τῶν φύλλων ἀφέψημα, πτύρων καὶ κονίδων σμηκτικόν, καὶ χειμάτης περιεσπικὸν καταντλούμενον. ὠμοῖς δὲ τοῖς φύλλοις καταπλάσσειν δεῖ ἀλφοὺς περιεσπεσθέντας· καὶ ἀλωπεκίας κατακνηθέισας, καὶ τὰ νεμόμενα ἕλκη. ἐφθὴ δὲ ἐξανθήμασι καὶ πυείκτοις καὶ ἐρυσιπέλασι ἰᾶται.

Περὶ Ἀνδράχης.

Κεφ. ρν'.

Ἀνδράχη διώδημον ἔχει συστολήν· καταπλασσομένη δὲ μετ' ἀφίτου κιφλοῖς ἀλγήμασι καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς καὶ τοῖς ὄλοις. καὶ στόμαχον πυρώσεσι καὶ ἐρυσιπέλασι, καὶ κύστεως ἀλγήμασι βοηθεῖ· βρωθεῖσα δὲ αἱμωδίαν καὶ στόμαχον καὶ ἐντέρων πύρωσιν καὶ ῥευματισμὸν περιεσπᾷ· πεφεύς τι

νεφροὺς τε δακνομένοις καὶ κύσιν ἐυδιατίθησι· καὶ τὰς ἔξω συνοισίας ὀρμὰς ἐκλύει· παρεμπλησίως δὲ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνεργεῖ σινόμυρος καὶ ἐν πυρετοῖς πινόμενος. καὶ ἔξω ἕλκωσιν δας γογγύλας, αἵματός τε πύου καὶ δυσεντερείας, καὶ ἔξω αἱμορροΐδας καὶ αἱμορραγίας, πολυέφθης γινομένη. καὶ ἔξω σηπεδόνα δήγματα, καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ δὲ χρησίμως μίγνυται, ἔγκλυσμά τε ὀξὺ ἐντέρων ῥευματιζομένων. ἢ * δακνομένης ὑπύης· καὶ ἔξω τὰς ἐξ ἐγκαύσεως κεφαλαλγίας σὺν ῥοδίνῳ ἢ ἐλαίῳ ἔμβρεγμα. ἔξω τε τὰ ἐν κεφαλῇ ἐξανθήματα, σὺν οἴνῳ σμῆγμα· ἔξω τραύματα ὑφ' σφακελίζοντα, σὺν ἀλφίτῳ καταπλασσομένη.

*Περὶ Ανδράχνης ἀγρίας.

Κεφ. φιά.

Ανδράχνη ἀγρία ἔχει αὔτη πλατύτερα φύλλα πρὸς τὴν ἀνδράχνης καὶ δασέα. φύεται ἐν πεζώδεσι τόποις. ἔστιν ὅτε καὶ ἐν κήποις, φύλλα ἔχει ὅμοια ἡμέρᾳ, μικρότερα δὲ πολλῷ, πλείονα δὲ καὶ ἁπαλά, καμπύλα ἐρυθρὰ, ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πολλὰ ἐπὶ γῆν κεκλιμένα. μαστώμενα εὔχυμα καὶ γλίσχρα καὶ ὑφάλμυρα. δύναμιν δὲ ἔχει θρομπτικὴν, ἀφεμετικὴν, ἕλκωτικὴν, χειράδων διαφορητικὴν σὺν ἀλεύρῳ καταπλασσομένη.

Περὶ

renes & vesicam adiuuat, etiã si erosioné sentiant: veneris impetus exoluit: succus epotus simili effectu prodest, in febribꝰ valés. Contra teretes vétris tineas, cruenté excreationé, dysenteriã, hęmorrhidas, & profluuia sanguinis, percocta efficax est. Item contra sepis morsus. Ocularibus medicamentis vtilissimè commiscetur, interaneis fluxione laborãtibus, atque vuluarum erosionibus, infunditur: contra dolores, quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite, cum vino emendat: vulneribus quæ ad syderationé spectant ex polenta illinitur.

Andrachne syluestris.

Cap. CLI.

Andrachne Syluestris paruis est foliis & latioribꝰ q̃ portulacę hirsutis. Nascitur ĩ petrosis, est qñ & in hortis, folia oleæ, sed minora multo. Verũ plura, tenuioráq; cauliculis rubricãtibus ab radice vna frequẽti bꝰ, inclinãtibꝰ in terrã. Hi mãsi in succũfacile soluũt tenacé liquore cũ quodã salis gustu. Facultas eius calfacere acré vim obtinés, & exulcerãs strumis illinitur cũ axungia vt discutiat.

Aspa-

Asparagi. Cap. CLII.

Corruda siue syluestris asparagus vulgaris est notitiæ. Hui⁹ cauliculi in cibo cocti ventré emolliunt, vrinã cient. Radicis decoctũ contra vrinę difficultaté, regium morbũ, renũ vitia, & coxendicũ cruciatus, in potu proficit: cũ vino autẽ, phalãgiorum morsibus auxiliatur. Si decocti succus super dente cõ tineatur, eius dolori medetur. Semen potũ ad eadẽ valet. Canes, vt aiunt, si decoctũ bibãt, emoriuntur. Asparagũ etiã nasci prodiderũt, arietis cornibus contusis, atque defossis: quod, quãtum equidẽ sentio, planè à veritate abhorret. Altilis autẽ asparag⁹ multis ramis fruticat, foliis fœniculi, lõgis, numerosis: radice rotũda, grandi, spongiã habente. Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. Assus autẽ coctúsve, vrinę stillicidiũ, difficultatẽq;, ac dysenterias, mitigat. Radix cum vino aut aceto cocta, luxatos art⁹ mulcet. Decocta cũ ficis aut ciceribus sumpta, regiũ morbũ sanat: coxendicis cruciatus strãguriámque leuat. Alligata radix, aut hausti eius decoctũ, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Περὶ ἀσπαράγου. Κεφ. ργϛ.

Ἀσπάραγος πτερὸς ἢ μυάκανθα γνώριμος, οὗ τὸ καυλίον ἑψηθὲν, καὶ βρωθὲν, κοιλίαν μεγάσει καὶ οὖρα κινεῖ. τῶν δὲ ῥιζῶν τὸ ἀφέψημα πινόμενον βοηθεῖ δυσουρίαις, ἰκτερικοῖς, νεφριτικοῖς, ἰσχιαδικοῖς· φαλαγγιοδήκτοις δὲ μετ' οἴνου ἀφεψόμενον. καὶ ὀδοντολογοῦσι δὲ κρατυνομένῳ τῷ ἀφεψήματος ἐπὶ τοῦ πονοῦντι ὀδόντι. πιεῖ δὲ πρὸς τὰ αὐτὰ καὶ τὸ σπέρμα πινόμενον. φασὶ δὲ καὶ τοὺς κύνας πίοντας τὸ ἀφέψημα αὐτῶν ἀποθνήσκειν. ἔνιοι δὲ ἱστόρησαν ὅτι ἐάν τις κριοῦ κέρατα συγκόψας κατορύξῃ, φύεται ἀσπάραγος· ἐμοὶ δὲ ἀπίθανον.

Ὁ μήτι ἀσπάραγος οὗτος, θάμνος ὀξὺ πολύκλαδος, φύλλα ἔχων πολλὰ, μακρὰ, ὅμοια μαραθρῳ· ῥίζα τροχύλη μεγάλη, ἔχουσα κόνδυλον. οὗ πινος τὸ καυλίον λειούμενον μετὰ οἴνου λευκοῦ, παύει φρενίτιδας. ἐφθὸς δὲ ἢ ὀπτὸς λαμβανόμενος, παύει τραγγουείας καὶ δυσουρίας, καὶ δυσεντερίας. ἡ δὲ ῥίζα αὐτὴ ἑψηθεῖσα ἐν ὄξει ἢ οἴνῳ, παύει τρέμματα. ἐφθὴ δὲ μετὰ σύκων καὶ ἐρεβίνθων λαμβανομένη, ἰᾶται ἴκτερον. καὶ παύει ἰσχιάδα καὶ τραγγουείαν. θεριαπομένη δὲ καὶ τὸ ἀπόζεμα αὐτὴ πινόμενοι, ποιεῖ ἀτόκιον καὶ ἄγονον.

Plan-

Περὶ Αρτε-

Περὶ Ἀργογλώσσου. Κεφ. ργ'.

Ἀργόγλωσσον διττόν· τὸ μὲν μικρόν· τὸ δὲ, μεῖζον· ἔχει δὲ τὸ μὲν μικρὸν φύλλα στενώτερα καὶ μικρότερα, καὶ μαλακώτερα καὶ λειότερα καὶ λεπτότερα· καυλίῳ δὲ γωνιοειδεῖ κεκλιμένα ὡς ὀπὶ πλεῖστον, αὐτὰ ὀχεά· τὸ δὲ σπέρμα ἐπ' ἄκρων τῶν καυλῶν. Τὸ δὲ μεῖζον εὐρύτερον, πλατύφυλλον, λαχανῶδες· καυλὸς δὲ ὁπὶ πούτε γωνιώδης, ὑπόυθρος, ὕψος πήχεως, ἐκ μέσου μέχρι κορυφῆς σπέρματι περιχόμενος λεπτῷ. ῥίζαι δὲ ὕπεισιν ἄπαλαὶ, δασεῖαι, λευκαὶ, πάχος δακτύλου. ἡνυᾶται δὲ πρὸς τοῖς τέλμασι καὶ φαλμοῖς καὶ ἐνίκμοις τόποις. εὐχρηστότερον δὲ τὸ μεῖζον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ξηραντικὴν, συπτικήν· ὅθεν καὶ καταπλασύματα πρὸς παντα τὰ χαλεπὰ καὶ θερμαντικῶντα ῥευματικὰ καὶ ἀκάθαρτα ἕλκη αἱμόζει· ἔχει δὲ καὶ αἱμορραγίαν, τομὰς, αὐθράκας, ἕρπητας, ὀπυκτίδας· ἀπουλοῖ καὶ ἕλκη χρόνια καὶ αὐώμαλα, καὶ τὰ χειρώνια ἰᾶται, καὶ κόλπους παρακολλᾷ· καὶ τὰ κυνόδηκτα καὶ πυείκωτα φλεγμονὰς, παρωτίδας, φύγεθλα, χοιράδας δὲ καὶ αἰγίλωπα σὺν ἁλσὶν ὀπιπλασύμενα ὠφελεῖ. ἐφθὸν δὲ τὸ λάχανον μετ' ἀλῶν καὶ ὄξους λαμβανόμενον, δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς ἁρμόζει.

Δίδο-

Plantago. Cap. CLIII.

Duo plantaginis genera: minor folia habet anguſtiora, minora, molliora, læuiora, & tenuiora: cauliculo anguloſo in terram inclinato: floribus pallidis: ſemine ſummis caulibus emicante. Altera maior, lætior, virentiorque, latis conſtans foliis, oleracei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit, anguloſus, ſubruber, à medio ad verticem tenui ſemine circundatus: radicibus nititur teneris, hirſutis, candidis, digitum craſsitudine æquantibus. Naſcitur in lacunoſis, ſepibus, & locis humidis. Multò vtilior magna eſt. Vim habent folia exiccatoriã, conſtringentem: quare omnib⁹ malignis vlceribus, & fluxioni opportunis atque elephanticis, ſordidiſq; illita proſunt: profluuia ſanguinis, vlcera quæ ſerpunt, epinyctidas, carbunculos, nomáſque cohibét: vetera vlcera & inæqualia cicatrice obducuut, chironia ſanant, ſinus conglutinant: morſibus canis, ambuſtis igni, inflãmationibus, panis, parotidibus, ſtrumis, ægilopiis, illita cum ſale proſunt. Coctum cum aceto & ſale olus, dyſentericis, cœliacisque ſumptum ſubuenit.

Datur

Datur & in locum betæ cum lenticula coctum. Et ad aquam inter cutē cui leucophlegmatiæ nomen est, datur & herba decocta post aridas epulas, sic vt media antecedat: comitialibus & suspirioſis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris vlcera, purgat: cum cimolia aut ceruſa igni ſacro medetur: fiſtulis infuſus prodeſt, lippitudinibus & aurium doloribus idem ſuccus inſtillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis cruore ſuffuſis, & ſanguinis reiectionibus, potu confert: clyſtere dyſentericis infunditur, contra tabem datur in potu, aduerſus ſtrangulationes vuluæ in vellere ſubiicitur, etiam ſi vulua fluxione laboret. Semen ex vino potum, alui fluxiones & ſanguinis excreationes ſiſtit. Decocta radix & manducatu, & collutione, dentium dolores ſedat: eadē cum foliis, vlceribus renum & veſicę in paſſo datur. Ferunt treis radices cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radicis geſtamine, diſcutiendis ſtrumis vtantur.

δίδοται δὲ καὶ μετὰ φακῆς αὐτὴ σὺτλων σωεφθόμενον, καὶ πρὸς λευκοφλεγματίαν μετὰ τὸ ξηροφαγῆσαι, μέση δίδοται ἡ πόα ἐφθή· πιεῖ δὲ καὶ ὀπτικοῖς, καὶ ἀθματικοῖς δι δομένη. ὁ δὲ χυλὸς τῶν φύλλων, τὰ ἐν στόματι ἕλκη αὐχαθαίρει σωεχῶς διακλυζόμενος· ζωὸ δὲ κιμωλίᾳ ἢ ψιμιθίῳ, ἐᾶται τὰ ἐρυσιπέλατα· σύεγγαί τε ἐγκλυζόμενος ὠφελεῖ, καὶ πρὸς ὠταλγίας καὶ ὀφθαλμίας ἐσταζόμενος ὁ χυλός. καὶ κολλυρίοις μιγνύμενος. ἢ πρὸς οὖλα αἱμασσόμενα, καὶ πρὸς αἷμα ἀναγόντας πινόμενος· καὶ πρὸς δυσεντερικοὺς ἐγκλυζόμενος, πίνεται δὲ καὶ πρὸς φθίσιν καὶ πρὸς ὑστερικὰς πνίγας προσίδεται ἐν ἐρίῳ, καὶ ὑστέρᾳ ῥευματιζομένη. καὶ ὁ καρπὸς δὲ πινόμενος μετ' οἴνου, τὸν τῆς κοιλίας ῥευματισμοὺς καὶ πτύσεις αἵματος ἐπέχει. ἡ δὲ ῥίζα ἀφεψηθεῖσα καὶ διακλυζομένη ἢ διαμασσομένη, ὀδοντα λγίας παύει· πρὸς δὲ τὰ ἐν κύστει ἕλκη ἢ νεφρῶς δίδοῦ ἡ ῥίζα ἢ τὰ φύλλα μὴ γλυκέος. φασὶ δὲ ῥίζας τρεῖς ποθεῖσας μετ' οἴνης κυάθων τριῶν ἢ ὕδατος ἴσου, τριταίῳ βοηθεῖν· τεταρταίῳ δὲ τέσσαρας ῥίζας. ἔνιοι δὲ ἢ ἐν δέσματι χρῶν τῇ ῥίζῃ πρὸς χειράδας ἢ διαφορεῦσιν.

Lauer ſeu

Πιεῖ Σίλ.

Περὶ Σίου. Κεφ. ρπδ'.

Σίον τὸ ἐν ὕδασιν εὑρίσκεται ἐν τοῖς ὕδασι θαμείον ὀρθὸν, λιπαρὸν, φύλλα ἔχον πλατέα ἱπποσελίνῳ ὁμοιότατα, μικρότερα δὲ καὶ ἁρωματίζοντα. ἅπερ ἐσθιόμενα ἐφθά τε, καὶ ὠμὰ λίθους θρύπτει καὶ συντήκει· οὖρά τε κινεῖ, καὶ ἔμβρυα καὶ ἔμμηνα ἄγει, δυσεντερικοῖς τε χρήσιμα βρωθέντα. Κρατεύας δὲ ἱστορεῖ περὶ αὐτοῦ οὕτω· πόα θαμνοειδὴς ὀλίγη ἔχουσα φύλλα σεσηρῶτα μείζονα ἡδυόσμου, μέλανα, παρεγγύζοντα ἐυζώμῳ.

Περὶ Σισυμβρείου. Κεφ. ρνέ.

Σισύμβρειον (οἱ δὲ ἕρπυλλον ἄγριον καλοῦσιν) ἐν χέρσοις φύεται, ἔοικε δὲ ἡδυόσμῳ κυπαίῳ, πλατυφυλλότερον δὲ καὶ εὐωδέστερον, στεφανωματικόν. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν· ἁρμόζει δὲ πρὸς φαρμακείας καὶ λιθιάσεις τὸ σπέρμα σὺν οἴνῳ πινόμενον· καὶ τρόφους καὶ λυσμοὺς παύει. τὰ δὲ φύλλα ἐπιπλαστὰ πρὸς κεφαλαλγίαν καὶ τὰ κροτάφων καὶ τῶν μετώπων· πρός τε ὀφρυῶν πληγὰς καὶ μελιττῶν. ἴσχει δὲ καὶ ἐμέτους ποδέν.

Περὶ Ἑτέρου σισυμβρείου. Κεφ. ρνς'.

Σισύμβρειον ἕτερον, οἱ δὲ, καρδαμίνην, οἱ δὲ, καὶ τοῦτο σίον καλοῦσιν. ἔνυδρός ἐστι πόα, κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ σίῳ γινομένη. ἥρε-

Lauer seu sium.

Cap. CLIIII.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recta, foliis latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quę cruda cocta que esu, calculos rumpunt, atque excernunt: vrinas cient, mẽses & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliatur. De sio Crateuas tradit, herbã esse fruticis speciẽ, pauca folia ferentẽ, rotũda, maiora quàm menthæ, nigra, & ad erucam accedentia.

Sisymbrium. Cap. CLV.

Sisymbrium (alij serpillum syluestre vocant) in solo inculto nascitur, menthæ hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inseritur coronis: Calfaciendi vim habet: contra stillicidia, vrinæ, calculósque, semen ex vino bibitur, tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut tẽporibus illinuntur: item contra vesparum apiúmque ictus: Vomitiones potu cohibet.

Alterum Sisymbrium.

Cap. CLVI.

Alterũ sisymbrij genus, quod alij cardaminã, alij sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdẽ in locis, quibus sion pro-

uenit: quæ ideò nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est nasturtiũ, repræsentet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo finduntur. Id excalfacit, vrinas mouet, crudũ est, purgat lentigines, cutísq; vitia in facie, noctibus impositũ, matutiníque detractum.

Crithmum. Cap. CLVII.

Crithmum, seu potius, vt aliqui, crithamon, fruticosa & vndique foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petẽs. Nascitur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, salso gustu, flores candidi sunt, & semen, ceu rorismarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta vino, potu vrinæ difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient, estur crudum coctúmve in olere, seruatur etiam in muria.

Coronopus. Cap. CLVIII.

Coronopus oblóga herbula est, per

καρδαμίνλιν δ' ἔνιοι λέγουσι, διὰ τὸ ἐοικέναι καρδάμῳ τὴν γεῦσιν. φύλλα ἔχει τὸ μὲν πρῶτον περιφερῆ, αὐξόμενα δὲ σχίζεται ὡς τὸ πῦ ἐυζώμου. ἔστι δὲ θερμαντικὸν, οὐρητικὸν, βηξιώδεσι δὲ καὶ ὠμὸν, ἀποκαθαίρει ὄξη φακοὺς, καὶ ἔφηλιν καταπλασθέντα δ' ὅλης τῆς νυκτὸς, ἑωθεν δὲ ἀποκλυσθέν.

Περὶ Κεἰθμου. Κεφ. ργζ.

Κείθμον οἱ δὲ, κρίταμον, θαμνώδες ὂν βοτάνιον, ἀμφιλαφὲς, πῆχυν τὸ ὕψος. φυόμενον ἐν πετρώδεσιν ἢ παραθαλασσίοις τόποις, φύλλοις σκίπλεον λιπαροῖς καὶ ὑπολεύκοις, τοῖς τῆς ἀνδράχνης παρεοικόσι, πλατυτέροις μὲν τοι καὶ ὀπιμηκεστέροις, ἁλμυείζουσι δὲ πρὸς τὴν γεῦσιν, ἄνθη λευκὰ, τὸν δὲ καρπὸν ὥσπερ λιβανωτίδος μελανὸν, εὐώδη, τρογύλον, ὃς ξηραινθεὶς διίσταται· ἢ ἔνδον ὡς πυρῶν ἔχει τὸ σπέρμα· ῥίζας δὲ δακτύλου τὸ πάχος, τρεῖς ἢ τέσσαρας, εὐώδεις, ἡδείας. δύναται δὲ ὁ καρπὸς καὶ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα ἐναφεψηθέντα οἴνῳ ἢ πινόμενα, βοηθεῖν δυσουρικοῖς ἢ ἰκτερικοῖς· κινεῖ καὶ ἃ καταμήνια, λαχανώδεσι ἐφθόν τε καὶ ὠμὸν ἐσθιόμενον, καὶ παρεχόμενον ἐν ἅλμῃ.

Περὶ Κορωνόποδος. Κεφ. ρπ.

Κορωνόπους πρόμηκες βοτάνιον

χῦ Ϝ

κατὰ τῆς ἐδάφους ἐστρωμένον, κατεσχισμένον τὰ φύλλα· λαχανεύεται δὲ καὶ τοῦτο ἑφθόν· ῥίζαν λεπτὴν ἔχον, στυπτικὴν, ἐσθιομένην πρὸς κοιλιακοὺς ποιοῦσαν. γίνεται δὲ ἐν χέρσοις τόποις, καὶ ἐν δώμασι καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς.

Περὶ Σόγχου. Κεφ. ρνθ΄.

Σόγχου δύο εἴδη· τὸ μὲν, γάρ ἐστιν ἀγριωδέστερον καὶ ἀκανθωδέστερον· τὸ δὲ, τρυφερώτερον καὶ ἐδώδιμον, καυλὸς δὲ γωνιοειδὴς ἐνίοτε καὶ ὑπέρυθρος· φύλλα ἔχει ἐκ διαστημάτων ἐσχισμένα τὴν περιφέρειαν. δύναμις δὲ αὐτῶν ἐστι ψυκτική, μετρίως ὑποστύφουσα· ὅθεν στομάχῳ καυσουμένῳ, καὶ φλεγμοναῖς, καταπλασσόμενοι ἁρμόζουσιν. ὁ δὲ χυλὸς καταῤῥοφούμενος, δηγμὸν στομάχου καταπραΰνει, καὶ γάλα κατασπᾷ· προστεθεὶς δὲ ἐν ἐρίῳ,* δακτύλων καὶ μήτρας φλεγμοναῖς βοηθεῖ. ἡ δὲ πόα καὶ ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα σκορπιοπλήκτοις ἀρήγει. Ὁ δὲ ἕτερος σόγχος ὁ καὶ τρυφερὸς, δενδρώδης ἐστὶ, καὶ πλατύφυλλος· τὰ δὲ φύλλα διεῖλε τὸν καυλόν· καὶ οὗτος δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ.

Περὶ Σέρεως. Κεφ. ρξ΄.

Σέρεις διτταί· ὧν ἡ μὲν ἀγρία, πικρὶς ἡ καὶ κιχώριον καλουμένη· ἡ δέ τις ἐστὶ καὶ πλατυφυλλοτέρα, καὶ εὐστομαχωτέρα τῆς κηπευτῆς. καὶ ταύτης

est, per terram repens, fissis folliis: coquitur in olere: radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo cœliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus vias.

Sonchus. Cap. CLIX.

Sonchi duo genera: syluestrior quidā est, & magis spinis horret: alter teneritate quadā mollescit, cibis expetitus, anguloso caule, inani, interdū rubēte: foliis in ambitu per interualla dissectis. Vtriusq; vis refrigerat, modicè adstringit: vnde æstuanti stomacho & inflāmationibus illiti prosunt. Succus eorū stomachi rosiones sorbitione mitigat, lac elicit, in vellere appositus sedis ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tā herba q̄ radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latis cōstans foliis: caulē in ramos exeuntē folia distinguunt: sed ad eadem pollet.

Seris siue intybus. Cap. CLX.

Seris duūm generum est: altera syluestris, quæ picris & cichorion vocatur: altera satiua, latioribus foliis constat, stomacho quàm hortensis vtilior.

Quæ iterum in duas ſpecies dividitur: vna folio latiore prodit, lactucarum ſimillima: altera anguſtiore eſt folio, & guſtu amara. Vtraque refrigerat, & adſtringit, ſtomacho vtiliſſima: aluũ ſiſtit cocta, ſi cum aceto adſumatur. Sylueſtres ſtomacho meliores: quandoquidem æſtuantem ipſum, & quę imbecillitas vexet, cibo leniũt. Cardiacis per ſe, aut cum polenta, vtiliter illinuntur: podagris, & oculorũ inflammationibus auxilio ſunt. Herba cum radice illita, percuſsis à ſcorpione ſubuenit, igni ſacro cũ polenta medetur. Succus cum ceruſa, & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem deſiderant.

Chondrilla. Cap. C L X I.

Chondrilla, quã aliqui cichorion, alij ſerin appellant, caulę, flores, & folia habet cichorio ſimilia: qua ex cauſa nõnulli ſylueſtris intubi ſpeciẽ eſſe pnũtiarũt, verùm tenuior tota eſt: in cuius ramulis, gũmi maſtiches ſimillimũ tuberculo fabæ inueniri ſolet: quod cũ myrrha tritũ & linteo appoſitũ, inſtar oliuæ, fœminarum menſes trahit. Tuſa cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in paſtillos,

καὶ ταύτης δὲ ἄλλον εἶδος· ἡ μὲν γάρ τις ὀξὺ θριδακωδέσερα καὶ πλατύφυλλος· ἡ δὲ, στενόφυλλος καὶ* ἔμπικρος. * πάσαι δὲ συμπλικαὶ, ψυκτικαὶ καὶ εὐστόμαχοι· ἰσᾶσι δὲ καὶ κοιλίαν ἐφθαὶ, μετ' ὄξους λαμβανόμεναι. καὶ μάλιστα αἱ ἄγριαι εὐστομαχώτεραι· βρωθεῖσαι γὰρ ἀπονωτοῦσι τὸ στόμαχον παρηρεθισμένον καὶ κατασταλτικώτερον. καταπλασσόμεναι δὲ σὺν ἀλφίτῳ καὶ καθ' ἑαυτὰς καρδιακοῖς εἰσὶ χρήσιμοι· ποδάγραις καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς βοηθοῦσιν. ἡ δὲ τέα καὶ ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα, σκορπιοπλήκτοις ἀρήγει· καὶ ἐρισιπέλατα σὺν ἀλφίτῳ ἰᾶται. σὺν ψιμιθίῳ δὲ καὶ ὄξει ἔστιν ὁ χυλὸς αὐτῶν ἐπίχρυσος τῶν φύξεως δεομένων.

Περὶ Κονδρίλλης. Κεφ. ρξά.

Κονδρίλλη, ἣν δὲ, καὶ τοῦτο κιχώριον καλοῦσιν ἢ σέριδα, τὰ μὲν φύλλα καὶ τὸν χυλὸν, καὶ τὰ ἄνθη ἔχει καὶ χωρὶς ὅμοια· ὅθεν καὶ εἶδός αὐτὸ τινὲς εἶπον σέριδος ἀγρίας λεπτότερον δὲ τὸ ὅλον· φέρει δὲ τοῖς κλωναρίοις αὐτοῖς σύριγξ κέμμι ὅμοιον μαστίχῃ, μελίδει κυαμιαῖα· ἃ πινα περιτεθέντα μετὰ σμύρνης λεῖα, ἐν ὀθονίῳ, μέγεθος φακίας, ἔμμηνα ἄγει. ἡ ὃ πόα σὺν τῇ ῥίζῃ κοπεῖσα, εἰς προχύσεις ἀναπλάσσεται μιγνυμένου μέλιτος,

τος, οἵ πνεῦ διεξέντες καὶ νίζῳ μιγνύτις, ἀφροὺς ἀποσμήχουσιν. ἀνακολλᾷ δὲ καὶ πείχας τὸ κόμμι· καὶ ἡ ῥίζα ἡ πρόσφατος ποιεῖ εἰς τὰ αὐτὰ, βαπτομένη εἰς αὐτὸν βελόνης, καὶ προσταχομένης τοῖς θριξίν. ἀρμόζει δὲ καὶ πρὸς ἕξεις συῶν οἴνῳ πινομένη. καὶ κοιλίαν ἴσχιον ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐμπεδεῖς συῶν οἴνῳ καὶ πεδεῖς, καὶ καθ' αὐτόν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος κονδυλίλλης, φύλλον δὲ ἔχει πεπλατυφυλλωμένον, πρόμηκες, ἐπὶ γῆς ἑρπυλλωμένον. χυλὸν δὲ ὀπτοῦ μεσίου· ῥίζαν δὲ λεπτήν, ἕτερον μον, κούφην, στρογγύλην, ὑπόξανθον, ὀπτοῦ μεσίου. δύναμιν δὲ ἔχει ὁ χυλὸς καὶ τὰ φύλλα, πεπτικήν. ὁ δὲ ὀπὸς τειχῶν τῶν ἐν βλεφάρεσιν ἀνακολλητικός. φύεται δὲ ἐν γεώδεσι καὶ ἐργασίμοις χωρίοις.

Περὶ Κολοκύνθας. Κεφ. ρξϛ'.

Κολόκυνθα ἰδιώδυμος· ὠμὴ καταπλαθεῖσα λεῖα, οἰδήματα καὶ ἀποσήματα πραΰνει. τὸ δὲ ἔξεσμα αὐτῆ παιδίοις σιρῶσιν, ἀφελίμως πρὸς βρέγματος καταπλάσσει· καὶ πρὸς ὀφθαλμοῦ φλεγμονὰς καὶ πεδαγικὰς ὁμοίως. ὁ δὲ χυλὸς τῶν ξυσμάτων θλιβέντων, πρὸς αὐταλγίας καθ' ἑαυτὸν καὶ μετὰ ῥοδίνου ἐγχυματιζόμενος ὠφελεῖ· καὶ πρὸς καυσουμένου ὀπωφάνειαν ἐγχριόμενος ὠφελεῖ· ὅλης δὲ αὐτῆς ἀποζεσθείσης καὶ σκυθλισθείσης ὁ χυλὸς

stillos, qui nitro admisti vitilligines emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoueatur. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decoctæ, in vino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur chondrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caulem succo madentem lacteo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescente, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis & cultis.

Cucurbita. Cap. CLXII.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syriasin vocant, in sincipite illinuntur: oculorum inflammationes podagrásque refrigerant. Succus è ramentis tusis per se, aut cùm rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat: totius feruefactæ, & expressæ

succus, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excauatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

Cucumer satiuus.

Cap. CLXIII.

Satiuus cucumis aluo, & stomacho per q̃ vtilis habetur, refrigerat, corruptioné nõ sentit, vesicæ prodest, olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semé modicè vrinã mouet: cum lacte aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canú sanãt: & epinyctidas, cum melle.

Pepones. Cap. CLXIIII.

Peponis caro in cibis, vrinã cit: inflammationes oculorum illita sedat. Raméta eius cõtra aduſtionem infantium, quam syriasin vocant, sincipiti imponuntur: fronti admota, oculorum fluxiones auertũt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgãt, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelyte pota, drachmæ pondere, vomitionẽ mouet. Si quisquam moderatè secundum cœnam vomere cupiat, geminis obolis sit cõtẽtus.

Sanat

ὁ χυλὸς πινόμενος μετὰ μέλιτος βραχέος καὶ νίτρου, κοιλίαν λύει κούφως. καὶ εἴ τις κοιλάνας αὐτὴν ὠμὴν, ἐγχέας τὸ οἶνον καὶ ἐξανδριάσας, καθέσας τε πίνῃ γνῶσις, μαλάττει κοιλίαν κούφως. ς

Περὶ Ἡμέρου σίκυος.

Κεφ. ϙξγ'.

Σίκυος ἥμερος εὐκοίλιος, εὐστόμαχος, ψυκτικὸς, οὐ φθειρόμενος, κύστει ἀρμόδιος, αὐακτητικὸς λειποθυμιῶν ὀσφραινόμενος. καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ μεθ' ὕδατος ὑρητικὸν ἁρμόζον σὺν γάλακτι ἢ γλυκεῖ πρὸς τὰ ἐν κύστει ἕλκωσεις. τὰ δὲ φύλλα αὐτοῦ σὺν οἴνῳ καταπλασθέντα, κυνόδηκτα ἰᾶται σὺν μέλιτι δὲ ἐπινυκτίδας.

Περὶ πέπονος. Κεφ. ϙξδ'.

Ἡ δὲ τοῦ πέπονος σαρξ καὶ αὐτὴ οὐρητικὴ ἐστιν· καταπλασθεῖσα δ' ὀφθαλμοῦ φλεγμονὰς πραΰνει. τὸ δὲ βρέγμα αὐτοῦ σειρωθὲν παιδίοις χ' τὸ βρέγμα τοῦ ἐπιτίθεται, καὶ ῥευματιζομένοις ὀφθαλμοῖς αὐτὸ αὐαχαλλήματος κατὰ τοῦ μετώπου. ὁ δὲ χυλὸς σὺν τῷ σπέρματι μιγεὶς ἀλείφῳ καὶ ξηρανθεὶς ἐν ἁλίῳ, σμῆγμα γίνεται ῥυπτικὸν καὶ λαμπρωτικὸν προσώπου. ἡ δὲ ῥίζα ξηρὰ πεθεῖσα σὺν ὕδρομέλιτι ⊀ ὁλκῇ, ἐμέτους κινεῖ. εἰ δέ τις πραΐου ἀπὸ δείπνου ἐμέσαι βουληθείη, ἀφ' χάσεσιν ὀβολοὶ β'.

ὑγιάζει

ὑγιάζει δὲ καὶ ἕλκεα κατάπλασθεῖσα μετὰ τοῦ μέλιτος.

Περὶ σρίδακος ὑμέρου.

Κεφ. ρξʹ.

Θεί δαξ ἥμερος ὑγρὸν μάχος, ὑποψύχουσα, ὑπνωτικὴ, κοιλίας μαλακτικὴ, γάλακτος κατασυσικὴ. ἐμψθεῖσα δὲ γίνεται σροφιμωτέρα. ἄπλυτος δὲ ἐσθιομένη, σομαχικοῖς ἁρμόζει. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῆς σπόμενον, τοῖς σωμαχῶς ἀγειρώττουσι βοηθεῖ. καὶ σωμασίαν ἀποσρέφει. αὐταὶ δὲ σωμαχῶς ἐδιόμβυαι. ἀμβλυωσίας εἰσὶ σοιητικαί· ταραχύνονται δὲ ὑπ' ἄλμης, ἐκχαυνίσασαι δὲ, ἔχουσί τι σαρεμφερὲς τῇ τοῦ χυλοῦ καὶ ὀποῦ δυνάμει τῆς ἀγελαίας σριδάκος.

Sanat quoque illita cum melle vlcera concreta in modum faui, quæ ceria vocant.

Lactucæ. Cap. CLXV.

Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigatrix ineſt, ſtomachograte habentur: ſomnũ conciliãt, aluũ emolliunt, lac euocãt: verùm decoctæ magis alũt, ſtomachicis illotas eſſe prodeſt. Epotũ ſemen, aſſiduas libidinum imaginationes in ſomno, cõpeſcit, & veneri refragatur. Ipſæ verò frequentiores in cibo, claritati oculorũ officiunt: inflãmationibus, & ignibꝰ ſacris opitulãtur, muria condiuntur. Cũ in caulẽ exierunt, vim quãdã nanciſcũtur, ſucco aut lacti ſylueſtris lactucæ ſimilem.

Περὶ Ἀγελαίας σριδάκος.

Κεφ. ρξʹ.

Ἡ δὲ ἀγελαία σριδὰξ ἔοικε τῇ ἡμέρῳ, χαυλωδεσέρα δὲ καὶ τοῖς φύλλοις λευκοτέρα, καὶ ἐρρωτέρα καὶ σραχυτέρα ὑσαρχουσα· πικρὰ δ' σρὸς τὴν γεῦσιν, ὁμοίωται δὲ κατὰ * σᾶσαν τὴν δυνάμιν μήκωνι· ὅθεν καὶ ἡ ὀπὸν αὐτῆς ἔνιοι μάσσουσι τῷ μηκωνίῳ. καθαίρει δὲ μελ' * ὀξυκράτου πεθεὶς ὁ ὀπὸς δυοῖν ὀβολοῖν ὁλκὴν, ὑδατώδη κατὰ κοιλίαν, ἀποκαθαίρει δ' καὶ ἄγγεμα καὶ ἀχλύν, ποιεῖ καὶ σρὸς ὀπιγμώσεις ἐγχριόμενον σὺν γυναικείῳ

Lactucæ ſylueſtris. Cap. CLXVI.

Sylueſtris lactuca ſatiuæ ſimilis eſt, ſed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & aſperiora: amaro guſtu eſt, & viribus aliquantum papaueri ſimilis: vnde lacteum eius ſuccũ aliqui meconio permiſcuerũt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulſo ſuccus ad duos obolos: argema caliginemq; repurgat, cõtra aduſtiones efficaciter illinitur, cũ

lacte mulierũ. In ſumma, ſomnum allicit: doloris leuamentũ præſtat, menſes trahit, contra ſcorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen, nõ aliter, quàm ſatiuæ, libidinũ imaginationes in ſomno amolitur, ac veneré arcet. Succus ad eadé valet, ſed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius antea, vt in aliis liquaminibus moris eſt, inſolatum.

Gingidium. Cap. CLXVII.

Gingidiũ, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia plerũque naſcitur; herbula ſyluestri paſtinacæ ſimilis, tenuior, & amarior: radice parua cãdicãte ſubamara. Olus hoc crudum, coctum, cõditúmve eſtur magna ſtomachi vtilitate: vrinam cit. Decoctum ex vino potum veſicæ prodeſt.

Scandix. Cap. CLXVIII.

Scandix, ſyluestre olus eſt, amarum, ſubacre: quod crudũ coctúmve manditur, ſtomacho & ventri vtile. Decoctum in potu, veſicæ, renibus, & iocineri confert.

Caucalis. Cap. CLXIX.

Caucalis, quam alij ſyluestre daucum vocant, cauliculo eſt dodrantali, aut maiore, ſubhirſuto: foliis apio ſimilibus, fœni-

γωικείῳ γάλακτι. ἔστι δὲ καθόλου ὑστερωτικὴ καὶ ἀγώδυνος, ἄγει δὲ ἔμμηνα, πτίζεται δὲ ὑπὸ σκορπιοπλήκτου καὶ φαλαγγιοδήκτου. τὸ δὲ σπέρμα ὥσαυτως τοῖς ἡμέρου πόθον, ὀνειρογμοὺς καὶ συνουσίαν ἀποτρέφει. δύναται δὲ καὶ ὁ χυλὸς ποιεῖν τὰ αὐτά, ἀσθενέστερος μέντοι. ἀποτίθεται δὲ ὁ ὀπὸς ἐν κεραμίοις ἀγγείοις ἐσκυλιαζόμενος ὥσαυτως καὶ τὰ λοιπὰ χυλίσματα.

Περὶ Γιγγιδίου. Κεφ. ρξζ'.

Γιγγίδιον, οἱ δὲ, λεπίδιον, φύεται πλεῖστον ἐν χιλικίᾳ τε καὶ συρίᾳ· βοτάνιον σφιλίνῳ μὲν ἐοικὸς ἀγρίῳ, λεπτότερον δὲ καὶ πυκνότερον· ῥίζιον ὑπόλευκον, πικρίζον. λαχανεύεται δὲ ὠμόν τε καὶ ἑφθὸν, καὶ ταριχευθὲν ἐδίεται. ἔστι δὲ εὐστόμαχον· οὐρητικόν. καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ πινόμενον μετὰ οἴνου κύστει χρήσιμον.

Περὶ Σκάνδυκος. Κεφ. ρξή.

Σκάνδυξ, καὶ τοῦτο ἄγριον λάχανον, ὑπόπρικον, καὶ ἔμπικρον, εὐδύσμον· ἑφθὸν καὶ ὠμὸν ἐσθιόμενον, εὐκοίλιον καὶ εὐστόμαχον. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτοῦ κύστει χρήσιμον καὶ νεφροῖς πινόμενον καὶ ὕπαπ.

Περὶ Καυκαλίδος. Κεφ. ρξθ'.

Καυκαλὶς, ἔνιοι δὲ δαῦκον ἄγριον καλοῦσι, καυλίον ἔχει σπιθαμιαῖον ἢ καὶ μεῖζον, ὑπόδασυ. φύλλα ἔχον μαράθρῳ ὅμοια· πολυ-

πολυμιξῶν, δασέα· καὶ ἐπ' ἄκρου σκιάδιον λευκὸν, εὐῶδες. λαχανεύεται δὲ καὶ τοῦτο ὠμόν τε καὶ ἑφθὸν ἐδώδιμον· ἔστι δὲ διουρητικόν.

Πρὶ Εὐζώμου. Κεφ. ρό'.

Εὔζωμον, τοῦτο ὠμὸν πλεῖον βρωθὲν σωφρονίσαι παρορμᾷ. καὶ τὸ σπέρμα ὃ αὐτὸ τὸ αὐτὸ ποιεῖ· ἐρωτικὸν ὕπαρχον καὶ πεπτικὸν καὶ εὐκοίλιον. χρῶνται δὲ τῷ σπέρματι καὶ εἰς τὰς αἰτύσεις· ἀποτίθενται δὲ αὐτὸ πρὸς τὸ πλείονα διαμένειν χρόνον, ὄξει φυρῶντες καὶ γάλακτι, καὶ ἀναπλάττοντες τροχίσκους. Γίνεται δὲ καὶ ἄγριον εὔζωμον, μάλιστα ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ· ἕτερον ἰδιότροπον· ὃ τῷ σπέρματι καὶ ἀντὶ σινάπεως οἱ τῇδε ἄνθρωποι χρῶνται. ἔστι δὲ διουρητικώτερον καὶ δριμύτερον πολλῷ τοῦ ἡμέρου.

Πρὶ Ὠκίμου. Κεφ. ροᾶ'.

Ὠκιμον γνώριμον βιβρωσκόμενον πολὺ, ἀμβλυωπίας ὄζειν, ὄζει δὲ κοιλίας μαλακτικὸν, πνευμάτων κινητικὸν, οὐρητικὸν, γάλακτος πρὸς κλητικὸν· δυσμετάβλητον, καταπλασσόμενον δὲ σὺν ἀφίτῳ πανάλῃ, καὶ ῥοδίνῳ καὶ ὄξει, φλεγμοναῖς βοηθεῖ, καὶ δράκοντος θαλασσίου καὶ σκορπίου πληγαῖς· καθ' ἑαυτὸ δὲ σὺν οἴνῳ χίῳ, πρὸς ὀφθαλμῶν ὀδυνώδεις. ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ ἀποκαθαίρει ἀχλῦς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς, καὶ τὰ ῥεύματα ξηραίνει. τὸ

fœniculi modo per extrema multifidis, hiſpidisq; candida in cacumine vmbella, ſuauiter olente. Crudum coctúmve olerum modo eſtur, vrinã mouet.

Eruca. Cap. CLXX.

Cruda eruca venerem largiore cibo concitat. Semé eodem effectu prodeſt: vrinam cit, concoctioni prodeſt, aluo perquàm commodata. Semine ad cõdiméta vtútur: quod, vti in longum tempus aſſeruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in paſtillos. Gignitur etiamnum ſylueſtris eruca, maximè in Iberia, quæ occidentem ſpectat: cuius ſemine pro ſinapi incolæ vtuntur. Vrinam vehementius pellit, multò ſatiua acrior.

Ocimum. Cap. CLXXI.

Ocimum vulgò cognitum. Id copioſiore cibo oculorum aciẽ hebetat, aluum mollit, ſpiritum mouet, vrinam pellit, lac euocat: ægrè tamen cõficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & roſaceo, pulmonum inflammationibus auxilio eſt: draconis marini, & ſcorpionis ictibus per ſe prodeſt: & cum vino Chio oculorum doloribus. Succus viſus caliginem abſtergit, deſtillatiões exiccat.

Semen

Semen potum conuenit atram bilé gignentibus, difficili vrinę, inflatisq; naribus hauſtú, ſubinde mouet ſternutaméta: quod idem herba efficit, ſed oculos premi neceſſum eſt, cú ſternutamentú vrget. Sunt qui in cibis abdicandú cenſeant: quandoquidem manducatum, & in ſole poſitum, vermiculos creat. Aphri autem adiiciunt, ſi feriantur à ſcorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

Orobanche. Cap. CLXXII.

Orobãche cauliculus eſt, ſeſquipedalis, & interdú maior, ſubruber, hirſutus, tener, ſine folio, pinguis: flore ſubalbido, aut in luteum vergente: radice digiti craſsitudine, &, cum ariditate flacceſcit caulis, fiſtuloſa. Hanc inter quædam legumina naſci conſtat, & ea ſtrangulare: vnde orobanche ſibi cognomẽtum vſurpauit. Eſtur, vt olus, cruda, & in patinis, aſparagi modo, decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

Barbula hirci. Ca. CLXXIII.

Barbula hirci, q̃ ab aliis come vocatur, breui eſt caule: foliis croci: radice longa, dulci, ſupina: magno ſuper caulem calyce,

τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον, ἀφεδρῳ τοῖς* μέλαιναν χολὴν γινομένοις καὶ δυσουρεῦσι καὶ πνευματώδεσι· ποιεῖ δὲ καὶ σπαρμοὺς πλείονας ὑπισσώδυμον δι' ὀσφρήσεως· καὶ ἡ πόα δὲ τὸ αὐτὸ ποιεῖ, συμπίζειν δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς δεῖ ὑπόντος τοῦ σπέρματος. φυλάσσονται δέ τινες αὐτὸ καὶ οὐκ ἐδίοισι, ἀλλὰ τὸ μασησθὲν καὶ πιθὲν ἐν ὀλίγῳ, σκωλήκια γινᾶν λέγουσι δὲ θερσιτηλόφασιν ὅτι οἱ φαγόντες αὐτὸ καὶ πληχθέντες ὑπὸ σκορπίου, ἄπονοι διαμένουσιν.

Περὶ Ὀροβάγχης. Κεφ. ροβ'.

Ὀροβάγχη καυλίον ἔχουν ὑπέρυθρον ὡς διπηχαμαῖον, ἐνίοτε δὲ καὶ μεῖζον, φύλλοις ὑπολίπαρον, ἔνδασυ, πευφέρεον· ἄνθεσιν ὑπολεύκοις ἢ μιλτίζουσι χαροπωδες. ῥίζα δὲ ὕπεισι δακτύλου τὸ πάχος καταπεπεπωμένη πρὸς πῶ τὸ καυλὸ ξηραθέν. δοκεῖ δὲ φυόμενον ἐν ὀπωρείοις πρὸ πνίγειν αὐτά· ὅθεν καὶ πῶ θερσιτηλόφασιν ἔσχηκε. λαχανεύεται δὲ καὶ ὠμὸν καὶ ἑφθὸν, ἐν λοπάδος ὡς ἀσπάραγος ἐπιπόμενον· καὶ ὀπωρείοις συνεψηθὲν, τάχιον αὐτὸ δοκεῖ ἑψεῖν.

Περὶ Τραγοπώγωνος. Κεφ. ρογ'.

Τραγοπώγων ἢ τεβαπώγων, οἱ δὲ, κόμιν καλοῦσι, καυλὸς βραχὺς· φύλλα κρόκῳ ὅμοια· ῥίζα μακρὰ, γλυκεῖα, *ἐπὶ δὲ τῷ καυλῷ κάλυξ

κάλυξ μίγας· ᾧ ἐξ ἄκρου καρπὸς μέλας, ἀφ' ᾧ καὶ τὸ ὄνομα ἔχειν. ἔστι δὲ ἡ πόα εὐδόκιμος.

Περὶ Ὀρνιθογάλω. Κεφ. ροδ'.

Ὀρνιθόγαλον χαμαίζον ἐστὶ πυφερὸν, λεπτὸν, ἀπόλευκον ὡς διαπαμαῖον, ἄνω παρηφυάδας ἔχον, τρεῖς ἢ τέσσαρας ἁπαλάς· ἀφ' ὧν αὐτὴ ἐξωθεῖ μικρὰ βοτανώδη, διανοιχθέντα δὲ γαλακτίζοντα· καὶ μεταξὺ αὐτῶν κεφάλιον ὡς κάγχρυ ἐν τετμημένον μετὰ ἄρτου συνοπτόμενον ὡς μηλάνθιον· ῥίζα δὲ βολβώδης· ἐδιομένη ὠμή τε καὶ ἑφθή.

Περὶ Τύλυ. Κεφ. ροέ.

Τύλυον ῥίζα ἐστὶ στρογγύλη, ἄφυλλος, ἄχλωρος, ὑπόξανθος· ἔστι δὲ ὀρυπτομένη, ἐδώδιμος δέ ἐστιν ὠμή τε καὶ ἑφθὴ ἐδιομένη.

Περὶ Σμίλακος.

Κεφ ροϛ'.

Σμίλαξ κηπαία, ἧς ὁ καρπὸς λόβια· ὃν δ' ἐνίων δὲ ἀπάρεχλος καλεῖται· φύλλα ἔχει κισσῷ ὅμοια, μαλακώτερα μέντοι· χλοηδὴς δὲ λεπτοὺς καὶ ἕλικας ἀμπεπλεγμένους τοῖς παρακειμένοις θαμνίοις· αὐξανομένη τε ἐφ' ἱκανὸν, ὥς τι καὶ σκιοποιεῖσθαι· καρπὸν δὲ φέρει ὅμοιον πίλει· μακρότερον δὲ καὶ ἐπιμηκέστερον ἐν οἷς σπέρματα ὅμοια πεφυκότα, οὐκ ἰσόχροα· ἐν μέσοις δὲ ὑποπυρίζοντα, λαχανεύεται

calyce, è cuius summo semen nigrum depédet, vnde nomen inditũ est. Herba esui apta est.

Ornithogalũ. Ca. CLXXIIII.

Ornithogalũ cauliculus est tener candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores ꝓdeũt, foris herbacei, & cum hiãtes se pãdũt, lactei visuntur, inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cũ pane, vt melanthiũ. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

Tubera. Cap. CLXXV.

Tubera rotũdæ radices sunt, sine caule, sine foliis flauescentes: vere fodiũtur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortensis.

Cap. CLXXVI.

Hortensis smilax, frutex, cuius semen à nõnullis lobia vocatur: folia habet hederæ, molliora tamẽ: tenues caules, & carpreolos vicinis fruticibus circumuolutos: qui tantum adolescunt, vt topiarias scenas repræsentare videant: siliquas fœnigræci ꝓfert longiores & torosiores, in quibus semina renum similia, sed inæquali colore recluduntur: quæ quadã ex parte fluescũt. Siliquas cocta, cum

cta, cum semine in oleribus, asparagi modo estur. Vrinam ciet, & tumultuosa somnia facit.

Medica. Cap. CLXXVII.

Medica cum recenter prodiit, foliis & caule trifolio prætensi similis est: procedés verò folia contrahit, caules edés trifolij, & siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine depédet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride, quibus refrigeratione op⁹ est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

Aphaca. Cap. CLXXVIII.

Aphaca in aruis nascitur, altior lente, tenuibus foliis: siliquas lenticulam maiores fert, in quibus terna quaternáve semina nigra, lente minora, continétur: quæ adstringendi vim habent: quare torrefacta, stomachi aluique fluxiones sistunt, si frefalentis more decoquantur.

Porrum capitatum. Cap. CLXXIX.

Capitatú porrú inflationé facit, noxiú succú creat, tumultuosum somnú parit, vriná ciet, aluo accómodat, extenuat, oculorum

λαχανεύε) δὲ εἰς βρῶσιν ὁ καρπὸς ἐψόμενος σὺν τῷ σπέρματι ὡς ἀσπάραγος. οὐρητικὸς ὢν καὶ δυσέντερος.

Περὶ Μηδικῆς. Κεφ. ροζ'.

*Μηδικὴ ἔοικε μὲν ἄκρῳ φυομένῃ τριφύλλῳ τῇ ἐν χερτοκοπίοις· τρεφομένη δὲ στενοφυλλοτέρα γίνεται, καὶ λοβοὺς ἀνιεῖσα τριφύλλῳ ὁμοίους, ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα περισπείρεται φακοῦ τὸ μέγεθος, ἐπιπεπλατυσμένον ὡς κεράπον. ὅταν ξηρανθὲν, μίγνυται πρὸς ὀδύσματος χάριν τοῖς ἀρτυτοῖς ἁλσί. χλωρὸν δὲ κατάπλασθὲν ὠφελεῖ τὰ ψύξεως πάθη. ὅλη δὲ τῇ πόᾳ χρῶνται οἱ κτηνοτρόφοι ἀντὶ ἀγρώστεως.

Περὶ Ἀφάκης. Κεφ. ροη'.

Ἀφάκη θαμινὸν ὀζῇ φυόμενον ἐν ἀρούραις, φακοῦ ὑψηλότερον, λεπτόφυλλον· τὰ δὲ ἐπ' αὐτῇ φύμενα μείζονα* θυλάκια τῷ φακοῦ ὅμοια τῶν σπερματίων πεπλατυσμένων καὶ μεγάλων καὶ μικροτέρων φακοῦ. Δυνάμεων δὲ ἔχει τὰ σπέρματα συστελλικὰ· ὅθεν ἵστησι καὶ ῥεύματα κοιλίας καὶ στομάχου φθορικὰ καὶ ἐρεθισμένα καὶ ἐψόμενα ὥσπερ φακός.

Περὶ Πράσου Κεφαλωτοῦ. Κεφ. ροθ'.

Πράσον κεφαλωτὸν φυσῶδες, χαλεπόχυμον, δυσέντερον, οὐρητικὸν, εὐκοίλιον, λεπτυντικὸν, ἀμ-

ζλυωπίας

Ελυωπίας ποιητικὸν, καταμηνίων ἀγωγὸν, βλαπτικὸν, κύστεως εἴλκω μῶν καὶ νεφρῶν· σωφθὲν δὲ πτισάνῃ ἢ βρωθὲν ἀνάγει τὰ ἐν θώρακος. ἡ δὲ κόμμι αὐτῆ ἐψηθεῖσα ἐν θαλάσσῃ ἢ ὄξει, εἰς ἕλκη διὰ σμα χρησιμεύει πρὸς μύσιν καὶ σκληρίαν ὑστέρας. ἀπογλυκαίνει δὲ ἢ ἀφυαντότερον γίνει δυσὶν ὕδασιν ἐψηθὲν, καὶ ἀποβραχὲν ἐν ὕδατι ψυχρῷ. ὁ δὲ καρπὸς δριμύτερος ἔχων τι ἢ σύψεως· ὅθεν αἷμα ὁ χυλὸς αὐτὸ ἵστησι σὺν ὄξει, ἢ μάλιστα τὸ ἐκ μυκτήρων φερόμενον, μάννης ἢ λιβανωτῆ μικρότος. ἀφροδισιά τε παρορμᾷ· ἢ πρὸς τὰ ἐν θώρακι πάντα σὺν μέλιτι ἀντὶ σκληκτῆ, ποιεῖ ἢ πρὸς φθίσεις βρωθὲν· καθαίρει δὲ ἢ τὴ ἀρτηρίαν ἐπιόμενον ἢ σωματικὸν ὄψεως γίνεται· κακοστόμαχον δὲ ἐστι. ἀρμόζει ἢ στηθοδήκτοις σὺν μέλιτι πινόμενος ὁ χυλὸς· ἢ αὐτὸ δὲ καταπλασσόμενον ὠφελεῖ. βαπτεῖ ἢ ὠταλγίαις ὁ χυλὸς ἢ ἤχοις, σὺν ὄξει ἢ λιβανωτῷ ἢ γάλακτι ἢ ῥοδίνῳ ἐνσταγείς. αὔξει δὲ καὶ ἰόγδους τὰ φύλλα μετὰ ῥοῦ ἢ ὅπι τὰ ὅλα καταπλασθέντα ἢ ὀπιγυκτίδας ἰᾶται, ἐκφύσεις τε ἀπερρήγνυσι σὺν ἁλσὶν ὀπτὰ καταπλασσόμενον, τὸ μύ τοι αἷματος < β'. μὴ μύστων ἴσων πο θεῖσαι, ταῖς χρονίοις ἀναγωγαῖς ἢ αἵματος ἐπιχρίσαι.

Περὶ

oculorum aciem hebetat, mẽses pellit, sed lędit exulceratam vesicam, renésque: cum ptisana verò coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & aceto cocta, in desessionibus, ad præclusiones vuluæ, & duritias, vtilis habet. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò min⁹ inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriã vim habet: quare succus cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profluuia sistit, maximè si narib⁹ erũpat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vitia tabémq;, ꝑ delinctu efficax est: arteriã esu purgat, sed si assiduè estur, visus obscuritaté inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illit⁹, cõtra bestiarũ morsus auxilio est: ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, lacte aut rosaceo, vtiliter aurium doloribus, & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum vua rhois, qua ad obsonia vtuntur: epinyctidi medentur, crustas ex sale illita rumpunt, veteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis drachmis, & æquali baccarum myrti pondere bibantur.

Ampelopra-

Ampelopraſum.
Cap. CLXXX.

Ampelopraſũ ſtomacho magis aduerſat,& plus porro excalfacit: vrinam & menſes vehementius ciet. Id contra ſerpentium morſus eſſe cõuenit.

Cepa. Cap. CLXXXI.

Cepa longa acrior eſt,quàm rotunda,item flaua quàm candida, & ſicca quàm viridis, & cruda quàm cocta,aut ſale cõdita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiã inuitant,ſitim mouẽt, & extenuãt: faſtidiũ pariunt, & expurgant: aluo vtiles ſunt. Ex detractis purgamẽtis in oleum cõiectæ, hæmorrhoidas, reliquoſq; excretionum exitus referãt, ſubditæ pro balanis. Succus cum melle illitus,oculorum hebetudinibus,argemis,nubeculis, & incipientibus ſuffuſionibus auxiliatur:anginę eodẽ perungũtur: ſuppreſſos menſes pellit,caput purgat naribus infuſus:canis morſibus cũ aceto,ruta, & melle illinitur:cũ aceto autem perunctas in ſole, vitiligines ſanat:& cũ pari ſpodio, ſcabras lippitudines ſedat: varos cũ ſale reprimit:contra calceamentorum attritus,cum gallinaceo adipe vtilis eſt:citę aluo ꝓdeſt: in

Περὶ Ἀμπελοπρέσου,
Κεφ. ρπ΄.

Ἀμπελόπρασον, χαλεπώτερον μὲν πρὸς ὄφεσι, θερμαντικώτερον δὲ καὶ ὑρητικώτερον· καταμηνίων ἀγωγόν. Θηριοδήκτοις δὲ βιβρωσκόμενον ἀμόλγῃ.

Περὶ Κεφαλῆς. Κεφ. ρπα΄.

Κρόμμυον δριμύτερον τὸ μακρὸν τῷ στρογγύλου, καὶ τὸ ξανθὸν τοῦ λευκοῦ, καὶ τὸ ἐηρὸν τοῦ χλωροῦ, καὶ τὸ ὠμὸν τοῦ ὀπτοῦ καὶ ταριχηροῦ. ἔστι δὲ ἅπαντα δηκτικὰ καὶ πνευματωτικὰ· ὀρέξεως ἐκκλητικὰ, λεπτυντικὰ, διουρητικὰ, διαστατικὰ, καθαρτικὰ, εὐκοιλια. ἀναξυμωτικὰ ἐκκρίσεων τῶν τε ἐν λῶν καὶ αἱμορροΐδων, ἀντὶ βαλάνου δὲ ὑποτιθέμενα λεπτύνοντα καὶ εἰς ἔλαιον ἐμβληθέντα. ὁ δὲ χυλὸς ἐγχριόμενος σὺν μέλιτι βοηθεῖ ἀμβλυωπίαις, ἀργέμοις, νεφελίοις, καὶ αἰχμυώδεσι φαινομένοις, καὶ συναγχικοῖς διαχεόμενος· κνηθὲ τε καταμηνία καὶ ἄγει, ἔγχυτός τε καθαρτικὸς διὰ ῥινὸς κεφαλῆς· κυνοδήκτοις δὲ κατάπλασμα μετ' ἁλὸς καὶ πηγάνου καὶ μέλιτος· σὺν ὄξει δὲ ἐν ἡλίῳ καταχριόμενος ἀλφοὺς ἰᾶται· μετ' ἴσου δὲ σποδοῦ φλυκταινώδεις παύει, καὶ ἰδρῶτας σὺν ἁλὶ στέλλει· σὺν ὀρνιθείῳ δὲ στέατι πρὸς ἐκπεπιεσμένα ὑποδημάτων χρήσιμος· καὶ πρὸς ῥεῦσιν κοιλίας καὶ

καὶ δυσκοίλους καὶ σκωληκοβρώτους ὠτα· * καὶ πρὸς τὰς ἀπολήψεις τῶν ὑδάτων τῶν ἐν τοῖς ὠσὶν ἁρμόζει· καὶ πρὸς ἀλωπεκίας παραπεισόμενος, τάχιον δὲ ἀλκυονίου προσκαλεῖται τείχας. ἔστι δὲ τὸ κρόμμυον κεφαλαλγὲς πλεῖον βρωθὲν, ἐμπνεῦσαι δὲ εὐρηπικώτερον γίνεται. πλέον δὲ ἐδόμενον ἐν νόσοις λιθάργοις ποιεῖ. τοῦτο τοίνυν ἐψηθὲν καὶ καταπλασθὲν σὺν σαφίδι ἢ σύκῳ, φύματα πήγη καὶ διαῤῥήσσει.

Περὶ Σκορόδου. Κεφ. ρπϛ'.

Σκόροδον τὸ μὲν, ἔστιν ἥμερον καὶ κηπευτὸν, καὶ τοῦτο ἐν αὐγύπλῳ μονοκέφαλόν ἐστιν, * καλοῦσι δὲ τοὺς ἐν αὐτῷ ῥᾶγας ἄλλιδας. * ἔστι δὲ καὶ ἀγρέιον ὀφιόσκορδον καλούμενον. Δυνάμιν δὲ ἔχει δριμεῖαν, θερμαντικὴν, ἐκκριτικὴν φυσώδη, καὶ κοιλίας παρακτικὴν, ξηραντικὴν σοφάγου, δίψης πειστικὴν, ἐμπνευματώσεως ἀφιστικὴν, καὶ ὀπφανείας ὀμμάτων ἀμβλυωπικὴν, βιβρωσκόμενον, * καὶ πρὸς τοὺς ξεσμοὺς τῶν ὑδάτων ἁρμόζει, ἀρτηρίας λαμφύνῃ, καὶ βῆχας χρονίας παρηγορεῖ, ὠμὸν τε καὶ ἑφθὸν ἐδόμενον· φθείρας δὲ καὶ κόνιδας φθείρει σὺν ἀφεψήματι δειγάνου πινόμενον· καὶ δὲ καὶ μέλιτι φυραθὲν, ὑπώπια καὶ ἀγωπικίας ἰᾶται καταχριόμενον· ἐπὶ δὲ τῶν ἀγωπικιῶν σὺν

in auribus sonitũ, ac grauitatẽ emendat: ad purulẽtas aureis, & eliciendã earũdem aquam, valet: alopeciæ earũ succo pfricantur, qui celerius, quàm alcionium pilos euocat: largioro cibo cepa capitis dolores ciet, coctaq; vehemẽtius vrinã pellit: eos lethargicos efficit, q valetudinib⁹ aduersis, vt etiã cocta, plus æquo vescanẽ: elixa, & cũ pasisvuis, et fico illita, tuberacula cõcoquit, & celerrimè rũpit. Alliũ. Cap. CLXXXII.

Allium quoddã satiuum atq; hortẽse habetur, quod in Ægypto, singulari, vt porrum, capite cõstat, cui⁹ nucleos aglitas, Græci nominant. Aliud est syluestre, quod Ophioscorodon, id est anguinũ, vocant. Vis allij acris est: excalfacit, mordet, exceruit, aluũ turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorũ esu hebetat, cõuenit & cõtra aquarum mutationes, vocem clarificat, veteré tussim crudum coctúve lenit: potũ autem cũ origani decocto, pediculos, & lẽdes enecat: cremati cinis illit⁹ fugillationib⁹ cũ melle, & alopeciis cũ nardino vnguine, medetur: eruptiones

eruptiones papularum cum oleo & sale sanat: vitiligines, lichenas, lentigines, vlcera capitis manátia, lepras, & furfures, cum melle eximit: cum thure, & teda decoctum, dētium dolorem leuat, si in ore conuincatur: contra venenatos muris aranei morsus, cú ficulneis frōdibus, & cumino illinitur. Feruefactæ comæ ius, fœminarū defessionibus additū, mēses & secundos partus extrahit. Alliū eiusdē gratia suffitur. Factū ex eo, & nigra oliua intritū, quod myttoton vocant, esu cit vrinam, ora venarum patefacit, hydropicis vtile.

Scorodoprasum: Cap. CLXXXIII

Scorodoprasum magnitudine porrum equat, qualitatum porri, & allij particeps: vnde p̄miscuas sibi vires ex vtroq; vē dicauit, effectus allij, & porri præbens: inefficacius tamē. Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum vicem transit.

Sinapi. Cap. CLXXXIIII.

Sinapi hortēse, aliqui napi vocāt. Eligi debet adultū, valde rufum, nō magnopere siccū, sed qđ fractū internè virescat, & veluti quodā succo madeat, cę siū colore: siqdē recēs id genus tēpestiuū

σωὺ ναρδίνῳ μύρῳ καὶ ἀλοὶ καὶ ἐλαίῳ, ἐξαγθήματα θεραπεύει· ἀφίστησι δὲ καὶ ἀλφοὺς καὶ λειχῆνας καὶ φακοὺς· ἀχῶρές τε καὶ πύρεια καὶ λέπρας σὺν μέλιτι· μετὰ δαδίου δὲ καὶ λιβανωτοῦ ἐφθὲν, ὀδονταλγίαν διαφορούμενον ἐν τῷ στόματι κουφίζει· μυγαλῆς τε ὄζει κατάπλασμα σὺν συκῆς φύλλοις καὶ κυμίνῳ. τῆς δὲ κόμης τὸ ἀπόζεμα ἐκκάθισμα ἐμμιλίων καὶ δυστέρων ἀγωγόν· θερὸς τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ὑποθυμιᾶται. τὸ δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ τῆς μελαίνης ἐλαίας γινόμενον πείμμα, καλέμενον δὲ μύστον, *οὔρησιν κινεῖ καὶ ἀναστομοῖ· χρήσιμον δὲ καὶ ὑδρωπικοῖς ὄζει.

Περὶ Σκορόδου θερσοῦ. Κεφ. ρπγ'.

Σκορόδοθερσον φύεται ὡς θερσον μέγα, μετέχον τῆς τῶ σκόρδου καὶ τῶ θερσοῦ ποιότητος· ὄθεν καὶ τὴν δύναμιν μικτὴν ἔχει ποιοῦσι ὅσα καὶ τὸ σκόροδον καὶ τὸ θερσον· ἀνεμιδώτους μᾶλλον ποιλαχανεύεται ἢ εἰς βρῶσιν ὡς τὸ θερσον ἐφόμενον καὶ ἀποχλυκαινόμενον.

Περὶ Σινήπεως. Κεφ. ρπδ'.

Σίνηπι ἢ νάπυ, ὀνόμαζον τὸ μὴ καταξηρὸν καὶ καταπύρρον, ἀδρὸν, ἀλλ' ὁ δὴ θλαδὲν, ἔνδοθεν χλωρὸν καὶ οἱονεὶ ἔγχυλον. γλαυκόν· θέρσος γὰρ καὶ ἀκμαῖον

ἀκμαῖον τὸ πιδῦτον. δύναται δὲ θερμαίνειν, λεπτύνειν, ἐπισπᾶσθαι, ἀποφλεγματίζειν διαμασηθέν. μιγεὶς δὲ ὁ χυλὸς αὐτοῦ ὑδρομέλιτι, πρὸς ἀντιάδας καὶ τὰς χρονίους τραχύτητας τῆς ἀρτηρίας καὶ τυλώδεις, ἀναγαργαριζόμενος ἁρμόζει· προσταχθὲν δὲ τοῖς μυκτῆρσι λεῖον, πταρμοὺς κινεῖ· ἐπιληπτικοῖς τε βοηθεῖ καὶ ὑστερικῶς πνιγομένας διεγείρει· καὶ ἐπὶ ληθαργικῶν καταπλάττεται ξυρηθείσης τῆς κεφαλῆς. μιγὲν δὲ σύκοις καὶ ἐπιτεθὲν ἄχρι φοινίξεως, ἁρμόζει πρὸς ἰσχιάδας καὶ σπλῆνας, καὶ καθόλου εἰς πᾶν χρόνιον ἄλγημα, ὅπου μετάγειν τι ἐκ τοῦ βάθους εἰς τὴν ἐπιφάνειαν βουλόμεθα τῷ τῆς ἑτεροπαθείας λόγῳ. θεραπεύει καὶ ἀλωπεκίας καταπλασθέν, πρόσωπον δὲ καθαίρει, καὶ ὑπώπια αἴρει σὺν μέλιτι ἢ στέατι ἢ κηρωτῇ. σὺν ὄξει δὲ πρὸς λέπρας καὶ λειχῆνας ἀγρίους περιχρίεται· πίνεται δὲ καὶ πρὸς περιόδους ξηρόν. ὡς ἄλφιτα ἐπιπασσόμενον τῷ ποτῷ, ἐπισπαστικοῖς τε ἐμπλάστροις καὶ ψωρικοῖς μίγνυται χρησίμως· δυσηκοΐαις τε καὶ ἤχοις λεῖον ἐπιτιθέμενον τῇ ἀκοῇ, μετὰ σύκου ὠφελεῖ. ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ σὺν μέλιτι ἁρμόζει, πρὸς τὰ ἀμβλυωπίας καὶ τραχέα βλέφαρα ἐγχριόμενος.

χυλίζεται

tempestiuum habetur. Ad calfaciendũ, extenuandũ, extrahẽdum, efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: cõtra præduros tonsillarũ tumores, ac veterem callosamq; arteriæ scabritiẽ, succus ex aqua, & melle, conueniẽter gargarizatur: sternutamenta ciet, tritũ & naribus admotũ: comitialibus quoque auxiliatur. Fœminas vuluæ strangulatu oppressas excitat: lethargicis, deraso capite, illinitur cum ficis admistum, donec rubescat locus, & ad coxendicum cruciatus impositum, ad lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ valetudinis causa, ex alto vitia extrahenda sunt. Alopecijs illitũ medetur, faciem purgat, sugillata cum melle, adipe aut cerato rapit. Ferę impetigines & lepræ, eo cum aceto perunguntur: contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui polentæ modo, inspargitur. extrahẽtibus emplastris, scabiemque extenuantibus, vtiliter admisceri solet: tritum, grauitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum & genarum scabritias magna vtilitate illinitur.

q Expres-

Expressus recenti semine succus, in sole siccatur.

Nasturtiũ. Cap. CLXXXV.

Nasturtium optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre: excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, venerem stimulat, sinapis & erucæ simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle, lienem extenuat, fauos expurgat, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentium venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorũ defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur, tumores collectionésq; discutit, emittit furunculos, illitum cum muria. Herbæ ad omnia eadem effectus, licet minor.

Thlaspi. Cap. CLXXXVI.

Thlaspi, herbula angustis foliis, digitali longitudine, in terram versis, suppinguibus, in cacumine diuisis · binûm dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo

χυλίζει) δὲ ἐπὶ χλωερὸν τὸ σπέρμα, καὶ τὸ ἀποθλιβὲν ξηραίνει) ἐν ἡλίῳ. Περὶ καρδάμου. Κεφ. ρπέ.

Καρδάμου κάλλιστον μὲν εἶναι δοκεῖ τὸ ἐν τῇ βαβυλωνίᾳ κάρδαμον. πάντες δὲ τὸ σπέρμα θερμαντικὸν δριμὺ, κακοστόμαχον, κοιλίαν ταράσσον, καὶ ἕλμινθας ἐκπνέον, σπλῆνα μειοῦν, ἔμβρυα φθεῖρον, ἔμμηνα κινοῦν, σωφροσύνην παροξύνων, ἔοικε δὲ σωπίῃ καὶ ὀνίζῃ. ἀποσμήχει λέπρας, λειχῆνας· σὺν μέλιτι δὲ σπλῆνα ταπεινοῖ καταπλασσόμενον, καὶ κνεῖα ἀποκαθαίρει, *καὶ τὰ ἐν θώρακος ἀνάγει ἐγκαθεψόμενον ῥοφήμασιν. ἐρπετῶν τε ὄφεων αὐτοφάρμακον πινόμενον, θυμιώμενον δὲ ἕρπετα διώκει· τείχας τε ῥεούσας ἐπέχει· καὶ ἀθρόκας περιῤῥήγνυσι πυοποιοῦν· σὺν ὄξει δὲ καὶ ἁλφίτοις καταπλασθὲν, ἰσχιαδικοὺς ὠφελεῖ καὶ οἰδήμασι καὶ φλεγμονὰς διαφορεῖ, ἀδενίλλας τε ἐκπυοῖ σὺν ἅλμῃ καταπλασθέν. καὶ ἡ πόα δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ἔλαττον μέντοι δύναται.

Περὶ Θλάσπεως. Κεφ. ρπϛ΄.

Θλάσπι βοτανίδιόν ἐστι στενὸν τοῖς φύλλοις ὡς δακτύλου μῆκος πεπλωκὸν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀκροχαδὲσον ὑποπαρείας, καυλὸν δὲ λεπτὸν ἀνίσπι διαπαμιαῖον· ἀποφυάδας ὀλίγας ἔχοντα, καὶ σὺν ὅλον αὐτὸν καρπὸς ὑποπλατυς

ὑποπλατυς ἐξ ἄκρης ἐν ᾧ σπερμάτιον ἐμφερὲς καρδάμῳ, δισκοειδὲς, οἱονεὶ ὑποπλασμένον (ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔσχηκεν) αὖθος δὲ ὑπόλευκον. ἐν* ὀδοῖς καὶ ἐπὶ τοιχῶν ἢ ἐπὶ θριγκῶν φυόμενον· σπέρμα δριμὺ, θερμαντικὸν· χολὴν ἄνω τε ἢ κάτω καθαῖρον, πυθὲν πλῆθος ὄξυβάφου· ἐγκλύζεται δὲ ἢ πρὸς ἰσχιαδικούς· ἄγει δὲ ἢ αἷμα πυθὲν, καὶ τὰ ἐντὸς ἀποστάσεις ῥήγνυσι· κινεῖ δὲ καὶ καταμηνία, καὶ ἔμβρυα φθείρει. Ἰσχρεῖ δὲ κρατεύας καὶ ἕτερον θλάσπι, ὅ τινες πρασκὸν σίνηπι καλοῦσι, πλατύφυλλον ἢ μεγαλόρριζον· καὶ τοῦτο δὲ μίγνυται τοῖς πρὸς ἰσχιάδα διακλυσμοῖς.

Περὶ Δράβης. Κεφ. ρπζ'.

Δράβη ἡ πόα πήχεως ἔχουσα ὕψος, ῥάβδους λεπτὰς, παχεῖς ἐκ τερα. δὲ τὰ φύλλα ὥσπερ λεπιδία, ἀπαλώτερα δὲ ἢ λευκότερα ἐπ' ἄκρῳ δὲ σκιάδιον καθάπερ ἀκτίς. ἔχον αὖθη* λεπτὰ, ταύτης ἡ πόα συνύφεται τῇ πίσσῃ μάλιστα ἐν καππαδοκίᾳ. ὁ δὲ καρπὸς ἐκτὸς ἀυτῆς ἔνεστι ἀντὶ πεπέρεως μίγνυται τοῖς πρόσω φήμασιν.

Περὶ Ερυσίμου Κεφ. .ρπή.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ φύεται πρὸς τὰς πόλεις, καὶ οἰκόπεδα, καὶ κήπους, φύλλα δὲ ὅμοια ἐυζώμῳ ἀγρίῳ ἔχει· καυλία ἰμαντώδη, αὖθη ὑπολίζοντα. ἐπ' ἄκρων

extremo in latius se pandente: semine nasturtij incluso léticulæ vasis effigie, nisi quod infringitur (vnde nomen accepit) flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossísque. Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem vtrinque extrahit, potum acetabuli mensura: ꝓdest ischiadicis infusum: sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat. Alterum thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui Persicō sinapi vocant, latis foliis, radicibus magnis: vtile ischiadicorum infusioni.

Draba. Cap. CLXXXVII.

Draba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex vtroque latere folia, ceu lepidij, sed molliora, & candidiora: in cacumine verò sambuci vmbellā gerit, cādidos flores habentē. Herba hæc cū ptisana coquitur, in Cappadocia maximè. Semen aridū ꝓ pipere obsoniis admiscet. Irio Ca. CLXXXVIII.

Erysimon, Latini irionē vocāt, iuxta vrbes, rudera hortósque nascit, foliis erucæ sylvestris: cauliculis in lori modū lētis et obsequiosis: florib⁹ luteis,

siliquis in cacumine gracilib⁹, vt fœnogræco, corniculatis: semine nasturtij, exiguo vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extussiuntur: regio morbo, & coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cũ melle datur: illinitur ex aqua aut melle vtiliter cæcis carcinomatis, parotidibus, duritiis mammarum, & testium inflãmationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua madescat atque torreatur, vel linteo illigatũ, pinsita farina oblitum perassetur.

Piper. Cap. CLXXXIX.

Piper in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, prælongum fructum, veluti siliquam promit, quod longũ piper est: habet int⁹ aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectũ piper euadit. Id autem suis tẽporibus dehiscens, pandensq; sese racemos emittit, grana ferẽtes qualia videmus. Ea acerba cãdidum piper faciũt, aptũ ocularibus remediis, antidotis, & medicaminibus, quæ cõtra venenata parantur: theriaca vocant. Longum verò vehemẽtius mordet, &

ἄκρων δὲ λοβοὶ καρατοειδεῖς, ἰσχνοὶ ὡς πίλιδος· ἐν οἷς σπερμάτια μικρὰ καρδάμῳ παραπλήσια, πυρώδη κατὰ τὴν γεῦσιν. πτισσῶντα θερῶ θώρακος ῥευματισμὸν, ἐμπύους, βῆχας· ἴκτερον, ἰλιγγάδας, σπληνικὸν μῦθον σὺν μέλιτι. πίνε⁹ δὲ καὶ θερὸς τὰ θανάσιμα φαρμακα. καταπλασσόμενον δὲ μὲθ' ὕδατος ἢ μέλιτος, ὠφελεῖ καρκινώματα χρυσπὰ, σκληρίας, παρωτίδας, διδύμων καὶ μαστῶν φλεγμονάς. λεπτύνει τε καὶ καθόλου θερμαίνει· ὅπερ ἐπὶ πλέον δὲ γίνεται εἰς τὰ ἐγκλύσματα, ἀποβραχὲν ὕδατι καὶ φωχθὲν, ἢ ἐνδεθὲν εἰς ὀθόνιον καὶ ὀπτηθὲν στέατος θερμαλδέντος.

Περὶ Πεπέρεως. Κεφ. ρπθ'.

Πέπερι δένδρον ἰσορρέπτου φυόμενον ἐν ἰνδίᾳ, βραχὺ, καρπὸν δὲ ἀνίησι, καταχὰς μῦ θερμίκιν καθάπερ λοβοὺς, ὃν ὃ μὲν μακρὸν πίπερι· ἔχον τὸ ἐντὸς *κέγχρῳ παραπλήσιον, τὸ μέλλον ἔσεσθαι τέλειον πίπερι. ὅπερ κατὰ τοὺς οἰκείους καιροὺς ἀναπολύμενον. βότρυς ἀνίησι, κόκκους φέροντας οἵοις ἴσμεν· τοῦ δὲ, καὶ ὁμφακώδης, οἱ πυρὲς εἰσὶ τὸ λευκὸν πίπερι, ὠφελοῦσι μάλιστα εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ καὶ ἀνθρώπους καὶ θηριακὰς δυνάμεις· *ἔστι δὲ τὸ μὲν μακρὸν ὀπτεταμένον τῇ δύξει,

ᾧ

καὶ ὑπόπυρον, ἀλλὰ τὸ ἄωρον, καὶ ὀπτήδιον εἰς ταὶς ἀντιδότους καὶ θηριακὰς δυνάμεις. τὸ δὲ μέλαν ἥδιον καὶ δριμύτερον τοῦ λευκοῦ, καὶ εὐσταμώτερον, καὶ μᾶλλον διὰ τὸ εἶναι ὥριμον ἀρωματίζον, εὐχροώτερόν τε εἰς ταὶς ἀρτύσεις. τὸ δὲ λευκὸν καὶ ὀμφακίζον, ἀδυνέστερον τῶν θερμῶν. ἐκλέγου δὲ τὸ βαρύτατον καὶ πλῆρες, μέλαν, μὴ σφόδρα ῥυπῶν, πεφθότατον δὲ καὶ μὴ πτυρῶδες. εὐείσκεται δέ τι ἐν τῷ μέλανι ἄτερφον, κενὸν καὶ κοῦφον, ὃ καλεῖ βράσμα. Δυνάμιν δὲ ἔχει κοινῶς θερμαντικὴν, οὐρητικὴν, πεπτικὴν, ὀπτασιτικὴν, διαφορητικὴν, σμηκτικὴν, τῶν ταῖς κόραις ἐπισκοτούντων. ἀρμόζει καὶ ῥίγεσι φθειριῶσι πυόμενόν τε καὶ συγχριόμενον. καὶ θηριοδήκτοις ἀράγει, ἄγει καὶ ἔμβρυα· δοκεῖ δὲ καὶ ἀτόκιον εἶναι μετὰ σιωσιπάν πεφθέν· βηξί τε καὶ πᾶσι τοῖς περὶ θώρηκα πάθεσιν ἁρμόζει, ἔντε ἐκλειπτοῖς καὶ ποτήμασι λαμβανόμενον· καὶ συνάγχαις ἁρμόζει διαχριόμενον σὺν μέλιτι· καὶ στόφους λύει πυόμενον μετὰ δέφυος φύλλων ἀπαλῶν· ἀποφλεγματίζει δὲ σὺν σαφίδι διαμασηθέν· ἀνώδυνόν τε ὄζει καὶ ὑγιεινόν· καὶ ὄρεξιν κινεῖ. πίνει

& quoniam prius q̄ ematurescat decerptū est, subamarum relinquitur, antidotis & theriacis medicaminib⁹ expetitū. Nigrum verò, vtpote quod tēpestiua maturitate collectum sit, odoratum esse cōstat, candido suauius, acrius, & ori gratius necnon ad condimēta vtilius. Sed candidū, & adhuc in acerbū vergēs antè dictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenū, nigrū, sine multis rugis, recēs ac minimè furfuroſum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania, minimíque pōderis quod vocāt brasma. Vis omniū excalfacit, vrinā ciet, cōcoquit, extrahit, discutit, absterget caliginē q̄ oculis obuersaī. Piper, febriū horrorib⁹ circuitu repetētibus, siue potu, siue illitu, subuenit: serpentiū morsibus auxiliaī, part⁹ extrahit, cōceptū adimere creditur, statim à cōcubitu suppositū: tussi, oībusq; pectoris vitiis, siue eclegmate, siue potu, succurrit: anginę eo & melle cōuenienter pungunt: potū cū recēti b⁹ lauri foliis, tormina discutit: cū vua passa māducatū, pituitā à capite elicit: valetudinē tueī, dolores finit, appetētiā mouet:

concoctioné adiuuat, ad intinctus esculentorum additũ: strumas cũ pice discutit: vitiligines ex nitro emaculat. Fictili nouo, vt lenticula, motũ torretur. Nõ est huius arboris radix gingiber, vt aliqui existimauêre, sicuti paulò pòst ostẽdem⁹. Nãque piperis radix costo similis est, ora gustantiũ accendit, saliuam ciet. Hęc lienẽ reprimit, cũ aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum semine pedicularis herbæ, quã staphidem agriam vocant.

Gingiberis. Cap. CXC.

Gingiberis sui generis plãta est, ĩ Troglodytica Arabia magna ex parte nascẽs: qua virẽte, ad multa, perindè atq; nos ruta, vtũtur, & primis potibus & eduliis admiscent. Huius radices, cyperi modo, paruæ sunt, candicãtes & odoratæ, atq; piper sapore imitantur. Eligi debẽt quę teredines nõ nouerũt. A multis tamen ob id cõdiuntur, quòd celeriter cariẽ sentiãt, ac fictilibus in Italiam asportãtur. Gingiberis cibo cõueniẽs est, & cũ cõdimẽto assumitur. Excalfactoriã vim & excoquentem habet: aluũ leniter emollit, stomacho vtilis est, efficax aduersus ea quę oculis caliginẽ offundũt. In

πέψει τε συνεργεῖ μιγνύμενον ἐν βάμμασιν. ἀναληφθὲν δὲ πίσσῃ χοιράδας διαφορεῖ. σμήχει δὲ ἀλφοὺς σὺν νίτρῳ· φώγνυται δὲ ἐπ' ὀστράκου καινοῦ ἐπ' ἀνθράκων, κινούμενον ὡς φακή. ἡ δὲ ῥίζα αὐτοῦ, οὐκ ἔστι ζιγγίβερ, καθάπερ ἔνιοι ὑπέλαβον, ὡς αὐτίκα δηλώσομεν. ἔοικε μέν τοι κόστῳ ἡ τοῦ πεπέρεως ῥίζα, θερμαίνουσα τὴν γεῦσιν καὶ ὑγρὰ προσκαλουμένη. ταπεινοῖ δὲ σπλῆνα σὺν ὄξει καταπλασσομένη καὶ πινομένη· ἀποφλεγματίζει δὲ μετὰ σταφίδος ἀγρίας μασηθεῖσα.

Περὶ Ζιγγιβέρεως. Κεφ. ρϟ'.

Ζιγγίβερις ἴδιον ἐστὶ φυτὸν, γεννώμενον ἐν τῇ τρωγλοδυτικῇ ἀραβίᾳ πλεῖστον· οὗ χρῶνται τῇ χλόῃ εἰς πολλὰ καθάπερ ἡμεῖς τῷ πηγάνῳ ἕψοντες εἰς προποτισμοὺς καὶ ἑψήματα μιγνῦντες. ἔχει δὲ ῥίζια μικρὰ ὥσπερ κυπείρου, ὑπόλευκα, πιπερίζοντα τῇ γεύσει, καὶ εὐώδη. ἐκλέγου δὲ τὰ ἀτερηδόνιστα. ὑπ' ἐνίων μέν τοι ταριχεύεται διὰ τὸ εὔσηπτον, καὶ διακομίζεται κεραμίοις εἰς ἰταλίαν. εὐχρηστοῦσι εἰς βρῶσιν, λαμβάνεται δὲ μετὰ ταρίχου. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, πεπτικὴν, μαλακτικὴν κοιλίας ἐπιεικῶς, εὐστόμαχον. ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐπισκοτοῦντα ταῖς κόραις· μίγνυται

μίγνυται καὶ αὐτιδότοις, καὶ καθόλου παρέοικέ πως τῇ πιπέρεως δυνάμει.

In antidota addi solet. In summa piperis viribus respondet

Περὶ Ὑδροπέπερεως. Κεφ. ρϙά.

Hydropiper.

Cap. CXCI.

Ὑδροπέπερι φύεται μὲν μάλιστα παρὰ στασίμοις ὕδασιν ἢ ὀπωρικέσι ῥείθροις· καυλὸν δὲ ἀνίησι γονατώδη, στερεὸν, ἕδει ὃν μαχάλαι καὶ φύλλα ἐοικότα ἡδυόσμῳ, μείζονα δὲ καὶ πευκεδανώτερα. καὶ λευκότερα, δριμέα ἐν τῇ γεύσει ὥσπερ τὸ πέπερι, οὐ μὴν ἄρωμα τίζοντα· καρπὸν δὲ ἔχει ὑπὸ κλωναρίοις μικροῖς ἐμφυόμενον παρὰ τὰ φύλλα, σπυκτὸν καὶ ζωζυώδη, δριμὺν καὶ αὐτόν. Δυώδεκα ἢ ἔχει τὰ φύλλα σὺν τῷ καρπῷ καταπλασσόμενα, οἰδήματα καὶ χρόνιας σκληρίας διαφορεῖ· ὑπωπιάς τε ἀποκαθαίρει, ξηραινθέντα ἢ καὶ κοπέντα, μίγνυται δὲ αὐτὰ πεπέρεως ἁλσὶ καὶ θερμοτήμασι, ῥίζαν δὲ ἔχει μικρὰν ἄχρηστον.

Hydropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt: caulem ædit geniculatum prædurum, multis alis concauum: folia menthæ, maiora, molliora, candidioráque, gustu piperis, acri, citra tamen vllam odoris gratiam: fructum acrem, in surculis paruis, prope folia racematim cohærenté. Folia cum semine illita tumores veterésque duritias discutiunt, fugillata delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro pipere in obsoniis admiscentur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

Περὶ Πταρμικῆς. Κεφ. ρϙβ.

Ptarmica. Cap. CXCII.

Πταρμικὴ θαμνίον ὀλίγον κλῶνας ἔχον μικροὺς πολλοὺς, στρογγύλους, ὁμοίους ἀβροτόνῳ· φύλλα ὀπωρικά, ἐοικότα τοῖς τῆς ἐλαίας, πολλὰ, ἐπ' ἄκρῳ δὲ ὥσπερ ἀνθεμίδος κεφάλιον μικρὸν. στρογγύλης, δριμὺ κατὰ τὸ ὀσμὴν, ἐρεθιστικὸν πταρμοῦ· ὅθεν καὶ ὀνόμασαν. δύνανται δὲ καταπλασσόμενα τὰ φύλλα μετὰ τῶν ἀνθῶν ὑπωπιάς αἴρειν. τὰ δὲ ἄνθη, πταρμοὺς, ἐναρχόμενα

Ptarmica exiguus frutex est, surculos habés paruos, multos, & rotundos, abrotono nõ dissimiles: & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine capitulum, vti anthemidis, paruum, rotundum, quod suo acri odore sternutamentú excitat, vnde nomen accepit. Folia cú floribus illita, fugillationes rapiũt. Flores sternutaméta

efficaciſsimè mouét. Naſcitur in montibus & petroſis.

Radicula ſeu lanaria herba. Cap. CXCIII.

Struthium herba vulgò nota, qua purgãdis lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix eſt acris: vrinam ciet: prodeſt tuſſi, iocineroſis, orthopnœæ ex melle ſumpta, cochlearis menſura, aluum ſoluit. Eadem cum panace & capparis radice calculos frangit, & cum vrina exturbat, duritiã lienis abſumit: menſes impoſita trahit, partus efficaciter enecat. Cum polenta autem & aceto illita, lepras tollit: tubercula diſcutit, cum farina hordeacea & vino decocta. Miſcetur & malagmatis, & ocularibus collyriis, claritatis cauſa. Sternutamenta mouet, per os purgat, trita cum melle, & naribus infuſa.

Cyclaminꝰ. Cap. CXCIIII.

Cyclaminꝰ folia habet hederæ, purpurea, varia, in quibꝰ ſuprà ſtraq; albicãt maculę: caule nudo, quaternos digitos ęquãtes floribꝰ in eo purpureis, roſarũ effigie: radice nigra, & ali quantum lata, vt rapum videri poſsit. Quæ cum hydromelite pota pituitã aquamq; detrahit: menſes

ἐναργέστατα κινεῖ. φύεται δὲ ἐν ὀρεινοῖς καὶ πετρώδεσι τόποις.

Περὶ Στρουθίου. Κεφ. ρξγ'.

Στρούθιον γινόμενόν ἐστι, ᾧ οἱ ἐριοπλύται χρῶνται πρὸς κάθαρσιν τῶν ἐρίων. οὗ ἡ ῥίζα δριμεῖα καὶ οὐρητική· βοηθεῖ δὲ πτισικοῖς βηχίν, ὀρθοπνοίαις σὺν μέλιτι, κοχλιαρίου πλῆθος λαμβανομένη· κοιλίαν τε ὑπάγει. σὺν δὲ πάνακι καὶ καπάρεως ῥίζῃ λιθίᾳ, λίθους θρύπτει, καὶ ἐξουρεῖν ποιεῖ· καὶ σπλῆνα ἐσκιῤῥωμμένον τήκει· σφυγμοὺς δὲ ἐμμένοντας ἄγει, καὶ ἔμβρυα φθείρει ἐναρχῶς. σὺν ἀλφίτῳ δὲ καὶ ὄξει καταπλασθὲν, λέπρας αἴρει· διαφορεῖ καὶ τὰ φύματα σὺν ἀλεύρῳ κριθίνῳ καὶ οἴνῳ ἐφθέν. μίγνυται δὲ καὶ κολλυρίοις ὀξυδερκάσι καὶ μαλάγμασι· κινεῖ δὲ καὶ πταρμούς. καὶ εἰς τὰς ῥῖνας δὲ ἐγχεόμενον λεῖον μετὰ μέλιτος, καθαίρει διὰ σώματος.

Περὶ Κυκλαμίνου. Κεφ. ρξδ'.

Κυκλάμινος φύλλα ἔχει ὅμοια κισσῷ, πορφυρᾶ, ποικίλα, κάτωθεν δὲ καὶ ἄνωθεν κυκλοτερῆ· ὑπολεύκοις· καυλὸν δὲ τετραδάκτυλον, γυμνὸν· ἐφ' οὗ ἄνθη ῥοδοειδῆ πορφυρίζοντα· ῥίζαν μέλαιναν ῥογγυλήν, παραπλησίαν, ὑπόπλατυν. ἥτις πεθεῖσα μετ' ὑδρομέλιτος, ἄγει φλέγμα καὶ ὕδωρ κάτω·

καὶ

καὶ ἔμμηνα δὲ κινεῖ πινομένη καὶ προστιθεμένη. φασὶ δὲ ὅτι ἂν ὑπερβῇ τὴν ῥίζαν ἔγκυμων γυνὴ, ἐξαμβλοῦτειν αὐτήν. ἔστι δὲ καὶ ὀξυτόκιον περιαπτομένη· πίνεται δὲ πρὸς τὰ θανάσιμα μετ' οἴνου, καὶ μάλιστα πρὸς λαγωὸν θαλάσσιον· καὶ ἑρπετῶν ἐστιν ἀντιφάρμακον καταπλασσομένη· μεθύσκει τε οἴνῳ μιχθεῖσα· καθίστησι δὲ καὶ ἴκτερον τριῶν δραχμῶν πλῆθος ποθεῖσα, μετὰ γλυκέος ἢ μελικράτου ὑδαρεστέρου. κατακλίνειν δὲ δεῖ ἐν οἴκῳ θερμῷ τὸν πίνοντα, καὶ πλείοσιν ἱματίοις περιβάλλειν ὅπως ἱδρώσῃ· ὁ δὲ ἀποκρινόμενος ἱδρὼς, χολώδης εὑρίσκεται τῇ χροιᾷ. ἐγχυματίζεταί τε ὁ χυλὸς αὐτῆς μετὰ μέλιτος εἰς τὰς ῥῖνας πρὸς κάθαρσιν κεφαλῆς· καὶ τῷ δακτυλίῳ ἐν ἐρίῳ προστίθεται πρὸς κομιδὴν περιττωμάτων· καταχρισθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπ' ὀμφαλοῦ καὶ ὑπογαστρίου, καὶ ἰξύος, κοιλίαν μαλάσσει, καὶ ἐκβόλια ἐργάζεται· καὶ πρὸς τοὺς ὑποκεχυμένους καὶ ἀμβλυωποῦντας ὀφθαλμοὺς ἐγχριόμενος ὁ χυλὸς σὺν μέλιτι ἁρμόζει. μίγνυται καὶ εἰς τὰ φθόρια. ἕδραν δὲ* προπετοῦσαν σὺν ὄξει καταχριόμενος ὁ* χυλὸς καθίστησι. χυλίζεται δὲ ἡ ῥίζα κοπτομένη καὶ ἐκθλιβομένη, ἑψομένου τοῦ χυλοῦ ἄχρι μελιτώδους συστάσεως. ῥύπτει δὲ καὶ χρῶτα ἡ ῥίζα, καὶ ἐξανθήματα στέλλει καὶ τραύματα μετ' ὄξους καθ' ἑαυτὴν τε καὶ μετὰ μέλιτος ἰᾶται. κατα-

menſes potu appoſitúve ciet. Tradunt ſi prægnans radicem tranſgrediatur, abortum fieri. Partum appenſa accelerat:contra venena, præſertim leporis marini, ex vino bibitur: illita contra ſerpentium ictus,remedio eſt: immiſta vino inebriat: regium morbum diſcutit, tribus drachmis pota, cum paſſo aut diluto mulſo.Sed oportet eum qui ebibit, multis veſtibus contectum,loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiecti autem ſudores fellei colore inueniũtur.Succus eius ad purgandum caput,naribus infunditur: ad deiiciẽda quoque alui excrementa, in vellere ſedi ſubiicitur: illito vmbilico & imo ventre coxarum tenus,aluum emollit,& abortũ efficit: ſuffuſionibus, & retuſæ oculorũ aciei, oblitus cum melle ſuccus prodeſt. Medicamentis abortum inferentibus admiſcetur.Succus cum aceto illitus, prociduam ſedem reſtituit.Exprimitur tuſa radice ſuccus,& ad mellis craſsitudinem decoquitur. Radix cutem purgat,eruptiones papularum reprimit, vulneribus ex aceto per ſe aut cum melle medetur, lienem

lienem absumit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, pernionésque foueri congruum est: ipsáque in oleo veteri feruefacta, illito oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicæ ceræ momento, vt strigmenti crassitudinem vnguentum cótrahat, cũ primis vtile pernionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maximè sub arboribus.

Altera cyclaminus. Cap. CXCV.

EST & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophyllon vocant: foliis hederæ, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassisque, circa vicinas arbores, capreolorum modo, se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ vnius pódere poti, cum

ἰᾶται). καταπλασσομένη δὲ καὶ σπλῆνα τήκει· ἀπονκαθαίρει δὲ καὶ ἔφηλιν καὶ λιγωπικίας· ἐνδεῖται δὲ καὶ πρὸς τρέμματα καὶ ποδάγραν, καὶ τὰ ἐν κεφαλῇ ἕλκύδεια καὶ χάμετλα τὸ ἀφέλκωμα αὐτῆς καταπλούμενον· αὐτὴ δὲ ἐλαίᾳ παλαιῷ ἀναζεσθεῖσα, ἀπυλοῖ καταχριομένου ἐλαίου, ἐγκολαπτεῖται δὲ πληροῦται τὸ ἔλαιον, καὶ πίνεται ὑπὸ θρομβοποδιάς, προσεμβαλλομένη ἔνιοτε καὶ κηρῷ πυρρικῷ ὀλίγον, ὡς γλοιώδες γενέσθαι κατάχρισμα ἄριστον χειμελικῶσιν. ἀποτίθεται δὲ ἡ ῥίζα τμηθεῖσα ὥσπερ σίλλα. ἱστορεῖται δὲ καὶ πρὸς φίλτρα αὐτὴν λαμβάνεσθαι κοπεῖσαν καὶ παλαισθεῖσαν εἰς προλίσκους. φύεται δὲ ἐν συσκίοις τόποις. μάλιστα δὲ ὑπὸ τὰ δένδρα.

Περὶ Ἑτέρας κυκλαμίνου. Κεφ. ρέ.

Κυκλάμινος ἑτέρα, ᾗ ἔνιοι κισσάνθεμον ἢ κισσόφυλλον καλοῦσι· φύλλα ἔχει κισσῷ ἐοικότα, ἐλάσσονα δὲ· καυλοὺς παχεῖς γονατώδεις, σεσημασμένους τοῖς παρακειμένοις δένδρεσιν ἑλικοειδῶς· αὔξεται λευκὰ, εὐώδη. καρπὸς δὲ ὡς ῥάγες σταφυλῆς, ὅμοιος κισσῷ, μαλακὸς, δριμὺς ὀλίγον τῇ γεύσει ἡδέμα, καὶ γλίσχρος· ῥίζα ἄχρηστος· φύεται δὲ ἐν τραχέσι χωρίοις. ταύτης ὁ καρπὸς ὅσον ⊲ μία τὸ πλῆθος πυρῆνας

μετ'

μετ' οἴνου λευκοῦ κυάθων β' ἐπὶ ἡμέρας μ', σπλῆνα τήκει δι' οὔρων καὶ κοιλίας δαπανώμενον. πίνεται δὲ καὶ πρὸς ὀρθόπνοιαν. καὶ τὰς ἐν τοκετῶν καθαίρει ποθεῖσα.

cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienē per vrinam & aluum absumūt. Ad orthopnœā bibitur. reliquias à partu purgat.

Περὶ Δρακοντίου.
Κεφ. ρϟϛ'.

Dracunculus.
Cap. CXCVI.

Δρακόντιον ἔχει φύλλα κισσοειδῆ, μεγάλα, σπίλοις ἔχοντα λευκοῖς· καυλὸν δὲ ὀρθὸν, δίπηχυν, ποικίλον, ὀφιοειδῆ διαπόρφυρον τοῖς σπίλοις, βακτηρίας τὸ πάχος· καρπὸς δὲ ἐπ' ἄκρου βοτρυώδης, χρώματι τὸ μὲν πρῶτον* χλοώδης, πεπανθεὶς δὲ κροκίζων, ἐπιδάκνων τὴν γεῦσιν· ῥίζα ποσῶς στρογγύλη, βολβοειδὴς, ὁμοία ἄρῳ φλοιὸν ἔχουσα λεπτόν. φύεται ἐν συσκίοις περὶ φραγμοὺς καὶ αἱμασιάς. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς χυλισθεὶς καὶ ἐγχυματισθεὶς μετ' ἐλαίου εἰς τὸ οὖς, ὠταλγίαν παύειν· εἰς δὲ τὰς ῥῖνας προστιθέμενος ἐν ἐρίῳ πολύπους δαπανᾷν· καταχριόμενος δὲ στέλλειν καὶ καρκινώματα. ποθέντες δὲ ὅσον λ'. κόκκοι μετὰ ὀξυκράτου ἐξαμβλώσκουσι· καὶ τὴν ὀσμὴν δὲ φασὶ* μετὰ τὸν μαρασμὸν τῆς ἀνθήσεως, τῶν ἄρτι συνειλημμένων ἐμβρύων φθαρτικὸν εἶναι. ἡ δὲ ῥίζα θερμαντικὴ οὖσα, βοηθεῖ ὀρθοπνοίαις· ῥήγμασι, σπάσμασι, βηξὶ, καταῤῥῷ· καὶ τὰ ἐν θώρακι ὑγρὰ εὐανάγωγα ποιεῖ, ἑφθὴ

Dracunculus folio constat hederaceo, magno, cādidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis respersο purpureis, ita vt anguē planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim cohæret, colore primum herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordáxque: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus vmbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum absumit: carcinomata illitu sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerūt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit: orthopnœis, ruptis, vulsis, tussi, destillationibus, auxiliatur: humores pectoris excreatu faciles reddit, siue

siue cocta tostáque cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: vrinam pellit, venerem excitat, cum vino potato phagedenas vlcerum, & quæ cacoëthe vocantur, trita cum melle & bryonia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eiiciendos partus fieri solent. qui radice suas manus perfricuerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto, vitiligines emaculat. Folia recentibus vulneribus, linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernionibus appositi prodest: caseus foliis inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctáve, ad sanorum vsus, pro olere recipitur: in Gymnesiis insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuiis placentarum loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotáque frustatim concidi-

tur, & lino traiecta, siecatur in vmbra, & ita recon-

ditur.

Arum.

ἐφθή τε καὶ ὀπτὴ μετὰ μέλιτος καὶ καθ' ἑαυτὴν βιβρωσκομένη. ξηρὰ δὲ λεῖα σὺν μέλιτι ἐκλείχεται. ἔστι δὲ οὐρητική, ὀρμάς τε ποιεῖ συνουσίαν ἐγείρει πινομένη μετ' οἴνου· καὶ ἕλκη κακοήθη καὶ φαγεδαινικὰ μετὰ βρυωνίας λευκῆς σὺν μέλιτι λεανθεῖσα ἀνακαθαίρει καὶ ἀπουλοῖ. καὶ κολλύρια ἐξ αὐτῆς ἀναπλάττεται πρὸς σύριγγας, καὶ ἐμβρύων κομιδή. φασὶ δὲ ὅτι καὶ εἰ θλασείη τις ταῖς χεῖρας τῇ ῥίζῃ, ἀπὸ ἐχίδνης ἄδηκτος μένει· ἄποκαθαίρει δὲ καὶ ἀλφοὺς σὺν ὄξει κατακριθεῖσα. τὰ δὲ φύλλα λεῖα ἐπὶ τῶν νεοτρώτων αὐτὴ μόνων ἐπιτίθεμένα ἀφίλοζει· καὶ πρὸς χιμετλα ἐψηθέντα ἐν οἴνῳ καὶ ἐπιτιθέντα· τυρός τε ἐνειλούμενος τοῖς φύλλοις, ἄσηπτος διαμένει. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης ἀφίλοζει πρὸς νεφέλια, καὶ λευκώματα καὶ ἀχλύς. λαχανεύεται δὲ ἡ ῥίζα καὶ πρὸς τὴν ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν, ἐφθή τε καὶ ὠμὴ ἐσθιομένη· οἱ δὲ ἐν ταῖς γυμνήτοις νήσοις, καλυμένας δὲ καλλαείσιν, ἐφθὴν τὴν ῥίζαν μιγνύντες μέλιτι πολλῷ ἐν τοῖς συνδείπνοις, αὐτὴ πλακουῦντων παραπιθέασιν. ἀποπλύνεσθαι δὲ δεῖ τὴν ῥίζαν ἐν πυελομιπτῷ ὀρύξαντας καὶ πλύναντας καὶ κατατεμόντας. ἐπείραντάς τε λίνῳ καὶ ξηράναντας ἐν σκιᾷ.

Περὶ Ἄρου.

Περὶ Ἄρου. Κεφ. ρϛζ.

Ἄρον τὸ καλούμενον παρὰ σύροις λοῦφα, φύλλα ἀνίησιν ὅμοια τοῖς τοῦ δρακοντίου, μακρότερα δὲ καὶ* ἀσπιλότερα· καυλὸν σπιθαμιαῖον, ὑποπόρφυρον, ὑπεροειδῆ, ἐφ' οὗ ὁ καρπὸς κροκίζων· ῥίζα λευκὴ πρὸς τὴν τοῦ δρακοντίου, ἥτις καὶ ἐσθίεται ἑψομένη ἧττον οὖσα δριμεῖα. ταριχεύεται δὲ τὰ φύλλα εἰς βρῶσιν, καὶ καθ' ἑαυτὰ ξηρανθέντα ἑψόμενα ἐσθίεται. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὰ φύλλα τὴν αὐτὴν τῷ δρακοντίῳ. ποιεῖ δὲ ἡ ῥίζα καταπλασσομένη* σὺν βολβίτῳ ἐπὶ ποδαγρικῶν. ἀποτίθεται δὲ ὡς ἡ τοῦ δρακοντίου. καὶ καθόλου ἐστὶ διὰ τὸ μὴ λίαν δριμὺ ἐδώδιμος.

Περὶ Ἀρισάρου. Κεφ. ρϛη.

Ἀρίσαρον ἐστὶ μικρὸν βοτάνιον, ῥίζαν ἔχον ὡς ἐλαίας, ἔστι δὲ δριμυτέρα τοῦ ἄρου· ὅθεν νομὰς ἵστησι καταπλασσομένη. κολλύριά τε πρὸς σύριγγας ἐνεργῆ ἐξ αὐτῆς γίνεται. φθείρει δὲ καὶ αἰδοῖον παντὸς ζώου* ἐντιθεῖσα.

Περὶ Ἀσφοδέλου. Κεφ. ρϛθ'.

Ἀσφόδελος φυτὸν τοῖς πλείστοις γνώριμον, φύλλα ἔχον πράσῳ μεγάλῳ ὅμοια· καυλὸν δὲ λεῖον, ἔχοντα ἐπ' ἄκρου ἄνθος καλούμενον ἀνθέρικον. ῥίζαι δὲ ὕπεισιν ἐπιμήκεις, στρογγύλαι, βαλάνοις ὅμοιαι,

Arum. Cap. CXCVII.

Aron, apud Syros lupha vocitatum, folia emittit dracunculi, ſed longiora, & paucioribus diſtincta maculis: caulem ſuppurpureum, dodrantalem, piſtilli ſpecie, à quo croceum ſemen exit: radice dracunculi alba, quæ decocta eſtur, vtpote cum minus acris ſit. Folia ad eſum condiuntur, & arida per ſe, decocta manduntur. Radix, ſemen & folia, dracunculi vires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Ariſarum. Cap. CXCVIII.

Ariſarum exigua herbula eſt, cuius radix oleæ magnitudinē implet, longè maioris quàm aron acrimoniæ: vnde illitu nomas ſiſtit. Fiunt collyria ex ea, ad fiſtulas efficacia. Illitu radicis, genitale animalis cuiuſcūque in perniciem agitur.

Haſtula regia. Cap. CXCIX.

Haſtula regia vulgaris notitiæ eſt, foliis maioris porri: caule leui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices ſubiacent oblongæ, rotundæ, glandibus ſimiles,

miles, gustu acres, quæ excalfaciunt: vrinas & menses epotæ ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmæ pondere potæ ex vino, medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissimè, verum trium drachmarum pondere, foliisque floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera sordida & depascentia, mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculósque, decoctis in fæce vini bulbis, recentibus inflammationibus ex poléta auxiliatur. Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquitur, fitque perquàm vtile oculis medicamétum: ad purulentas aureis per se, & cũ thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus & ambustis igni, conducit: & surditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Candidam vitiliginem, linteo

ὅμοιαι, δριμεῖαι κατὰ τὴν γεῦσιν, καὶ τὴν δύναμιν θερμαντικαί, κινοῦσι δὲ καὶ οὔρησιν, καὶ ἔμμηνα ποθεῖσαι· ἰῶνται καὶ πλευρᾶς ἀλγήματα καὶ βῆχας, καὶ σπάσματα, καὶ ῥήγματα < ά πλῆθος τῆς ῥίζης ἐν οἴνῳ πινομένης. ποιεῖ δὲ καὶ εὐεμεστέρους ὅσον ἀστράγαλος βρωθείς· καὶ ἑρπετοδήκτοις δίδοται ὠφελίμως ὅσον < γ΄. τὸ πλῆθος, καταπλάττειν δὲ δεῖ τὰ δήγματα τοῖς τε φύλλοις καὶ τῇ ῥίζῃ καὶ τοῖς ἄνθεσι σὺν οἴνῳ καὶ τὰ ῥυπαρὰ καὶ νεμόμενα ἕλκη καὶ μαστῶν καὶ διδύμων φλεγμονὰς καὶ φύματα καὶ δοθιῆνας, συγκαθεψομένης τρυγὸς οἴνου τῇ ῥίζῃ, πρὸς δὲ τὰς προσφάτους φλεγμονὰς μετ᾽ ἀλφίτου. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης προσλαβὼν οἴνου παλαιοῦ γλυκέος, καὶ σμύρνης καὶ κρόκου, συνεψηθέντων ἐπὶ τὸ αὐτό, ἔξχιστον γίνεται ὀφθαλμοῖς φάρμακον· καὶ πρὸς ὦτα πυορροοῦντα καθ᾽ ἑαυτόν, καὶ σὺν λιβανωτοῦ καὶ μέλιτι καὶ οἴνῳ καὶ σμύρνῃ χλιανθεὶς ἁρμόζει· ὀδονταλγίαις τε καθ᾽ ἑαυτὸν ἐγχυθεὶς ὁ χυλὸς τῷ ἀντικειμένῳ ὠτίῳ, πραΰνει. καεῖσα δὲ ἡ ῥίζα τῇ τέφρᾳ ἐπιπλασσομένης, ἀλωπεκίας δασύνει. ἑψηθὲν δ᾽ ἔλαιον ἐν * κεκοιλωμέναις ταῖς ῥίζαις ἐπὶ πυρός, εἱλκωμένας χειμέτλας καὶ πυρίκαυστα ἐπαλειφόμενον ὠφελεῖ καὶ * ὠταλγιάσει βοηθεῖ ἐγχεόμενον εἰς τὸ οὖς. ἀλφόν τε λευκὸν προσανατριφέντα ἐν

ἐν ὀθονίῳ ἐν ἡλίῳ, κατοχριθεῖσα ἡ ῥίζα σμήχει. ὁ δὲ καρπὸς καὶ τὰ ἄνθη κατ᾽ ἐξοχὴν, σκολοπένδρων καὶ σκορπίων ἀντιφάρμακόν ἐστιν ἐν οἴνῳ ποθέντα· καταῤῥήττει δὲ καὶ τὴν κοιλίαν.

Περὶ Βόλβου ἐδωδίμου.

Κεφ. σ.

Βολβὸς ἐδώδιμος γνώριμος πᾶσιν ὃν ἐσθιόμεν· εὐστόμαχος, εὐκοίλιος, πυῤῥὸς, καὶ ἀπὸ λιβύης κομιζόμενος· ὁ δὲ πικρὸς, καὶ σκιλλώδης, εὐστομαχώτερος, πεπτικός. πάντες δὲ δριμεῖς καὶ θερμαντικοί· καὶ πρὸς συνουσίαν παρορμῶντες, τραχύνοντες γλῶσσαν καὶ παρίσθμια, πολύτροφοι, σαρκῶν γεννητικοὶ, ἐμπνευματοῦντες· ποιοῦσι δὲ καταπλασσόμενοι πρὸς στρέμματα, θλάσματα, σκόλοπας καὶ πρὸς τὰς τῶν ἄρθρων ὀδύνας· γαγγραίνας τε καὶ ποδάγρας σὺν μέλιτι καὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ὑδρωπικῶν οἰδήματα καὶ κυνόδηκτα, ὁμοίως σὺν μέλιτι καὶ πεπέρει λείῳ καταπλασθέντες· ἐπέχουσιν ὑδρῶτας· καὶ στομάχου ὀδύνας παύουσι· καὶ πίτυρα καὶ ἀχῶρας ἀποσμήχουσι σὺν ὀπτῷ νίτρῳ. καθαίρουσι δὲ καὶ ὑπώπια καὶ ἴονθους, καθ᾽ ἑαυτοὺς ἢ σὺν ὠοῦ λεκύθῳ, καὶ φακοὺς σὺν μέλιτι ἢ ὄξει. πρὸς δὲ ὤτων θλάσματα σὺν ἀλφίτῳ καὶ πρὸς θλάσεις ὀνύχων· ἀφαι-

linteo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen floresque in vino poti, scolopendræ & scorpionum venenis, mirum in modum resistũt: aluum purgant.

Bulbus esculentus.

Cap. CC.

Esculentus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur: stomacho & aluo vtilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarus verò & scillin⁹, stomacho aptior est, & concoctionẽ adiuuat. Bulbi omnes acrimoniã habent, excalfaciũt: venerẽ stimulant, linguã tonsillasq; exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflationẽ pariun tluxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrænas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorũ tumores, & canũ morsus cũ melle & piperis polline illiti cohibent: sudores compescunt: stomachi dolores mitigãt: furfures & vlcera quæ in capite manant, cũ tosto nitro abstergunt, sugillata varósque per se aut ex oui luteo, & lentigines cũ melle vel aceto, emendant: fractis auriculis vnguibúsq; ex polẽta medẽtur: iidẽ calidis cinerib⁹ torrefactis,

tollunt

tollunt ficus: item cum cinere è mænarum capitibus, impositi: cremati verò & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atráfque cicatrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinẽdum, quoniam nervos tentant.

Bulbus vomitorius.

Cap. CCI.

Bulbus quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus: radicem simile, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur: vomitiones mouet.

Scilla. Cap. CCII.

Scilla vim acrem atq; feruẽtem habet: assatã ad multa vtilioré esse cõstat. Polline ad crustã subacto, aut luto oblita, in clibanũ coniicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficiẽter intosta fuerit: qua exépta, si non emol lescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadẽ quę priusfiũt: nã quę ita nõ assatur, interaneis maximè noxia est. Torreẽ itẽ in olla, indito operculo, quæ in furnũ demittatur.

Sumi

ἀφαιροῦσι ὄφεις καὶ συκᾶς ὀπτωμένας ἐν θερμοπυλίᾳ, καὶ μετὰ μανιάδων κεφαλῶν κεκαυμμένων ὀπτηθέντες· χάσκοντες δὲ καὶ μυδῶντες ἀλκυονίῳ, ἔφηλιν καὶ οὐλὰς μελαίνας ἀποκαθαίρεσιν ἐν ὑλίῳ καταχριόμενοι. ζωὰ ὄξει δὲ ἑφθὰ βιβρωσκόμενοι πιοῦσι θεῖς ῥήγματα. φυλάσσεται δὲ αὐτῶν τὸ πλῆθος ἐν τῇ βρώσει δεῖ διὰ τὸ ἅπτεσθαι τῶν νευρώδεις.

Περὶ Βολβοῦ. Κεφ. σά.

Βολβὸς ὁ καλούμενος ἐμετικὸς, ἔχει τὰ φύλλα ἰματωδέστερα, καὶ πολλῷ μακρότερα τῶ ἐδωδίμου· ῥίζαν ἔοικυῖαν βολβῷ, μέλαν ὂν φλοιὸς μέλας. αὕτη ἐσθιομένη καθ' αὑτὴν καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον. τὰ μὲν κύστιν ἰᾶται καὶ ἔμετον κινεῖ.

Περὶ Σκίλλας. Κεφ. σϐ.

Σκίλλα δύναμιν ἔχει δριμεῖαν καὶ πυρωτικήν· πολύχρηστος δὲ γίνεται ὀπτηθεῖσα σφαῖρα δὲ ἡ πολῶ περιπλάσεται, καὶ δίδοται εἰς κλίβανον, ἢ αὐθραξὶν ἐγκρύπτει· μίξις αὖ ὀπτηθῇ ἱκανῶς τὸ περικείμενον σφῆς· ἢ περιαιρεθέντος, εἰ μὴ τακερὰ γένοιτο, ἕτερον σφῆς ἢ πολὺν περιπλάσαντες, τὰ αὐτὰ ποιοῦσι· ἢ γὰρ μὴ οὕτως ὀπτηθεῖσα, βλαβερὰ πολὺ δόσει, θεὸς τὰ ἐντόσια μάλιστα προσφερομένη. ὀπτᾶται δὲ καὶ ἐν χύτρᾳ πεπωμασμένῃ καὶ καπνιζομένῃ εἰς κλίβανον.

λαμ-

λαμβάνεται δὲ αὐτῆς τὸ μεσαίτατον, τῶν ἔξωθεν περιαιρουμένων, καὶ ἕψεται δὲ ἐντμηθεῖσα, ἀποχεομένου τοῦ προτέρου ὕδατος, ἑτέρου τε ἐπιχεομένου, ἄχρις ἂν μὴ πικρὸν ἢ δριμὺ γένηται τὸ ὕδωρ, καὶ ξηραίνεται δὲ ἐν σκιᾷ,* τμηθεῖσα, καὶ διαιρεθεῖσα λιναρίῳ, ὡς μὴ ἅπτεσθαι ἀλλήλων τοὺς τόμους. τῇ μὲν οὖν τμητῇ, εἰς ἔλαιον καὶ οἶνον καὶ ὄξος σκιλλητικὸν χρώμεθα. πρὸς δὲ ῥαγάδας τὰς ἐν ποσὶ, τὸ ἔνδον τῆς ὠμῆς σὺν ἐλαίῳ ζεσθὲν, ἢ σὺν τῇ ῥητίνῃ τηχθὲν, ἐπιτίθεται. ἐχιοδήκτοις δὲ κατάπλασμα ἑψηθεῖσα σὺν ὄξει. τῆς δὲ ὀπτῆς πρὸς ἓν μέρος τῆς σκίλλης, συνεκλεάναντες ἁλῶν ὀπτῶν μέρη ὀκτὼ, δίδομεν κοχλιάριον ἓν ἢ δύο νήστεσι πρὸς μάλαξιν κοιλίας· εἰς ποτήματά τε καὶ ἀρωματικὰς δυνάμεις, καὶ ἐφ' ὧν οὔρησιν κινῆσαι θέλομεν, καὶ ἐπὶ ὑδρωπικῶν καὶ στομαχικῶν, οἷς ἐπιπλάζει τὰ σιτία, καὶ ἐπὶ ἰκτέρου στροφουμένων, βηττόντων χρονίως, ἀσθματικῶν, ἀναφορικῶν, αὐτάρκης δὲ ὁλκὴ τριωβόλου σὺν μέλιτι ἐκλειχθεῖσα. καὶ συγκαθέψεται δὲ τῷ μέλιτι, καὶ βιβρώσκεται πρὸς τὰ αὐτὰ μάλιστα πέψει συνεργοῦσα. ἄγει δὲ, γλοιώδη κατὰ κοιλίαν. ἑφθὴ δὲ πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ ὁμοίως λαμβανομένη· φυλάττεσθαι δὲ καὶ αὐτῆς τὴν δόσιν δεῖ ἐφ' ὧν ἑλκωσίς τις ἐστὶν ἐντός. καὶ πρὸς

Sumi etiá solet quod maximè est mediú, direptis viuotenus tunicis, quod frustatim confectú coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudiné nec acrimoniá habeat: traiectáq; lino frusta siccantur in vmbra, ita vt ne vlla quidé parte se cótingát: his scillæ segminibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum vtimur. Ad rimas pedú, interna pars crudæ scillę in oleo feruefacta, aut cú resina liquefacta, imponitur: decocta in aceto demorsis à vipera, cataplasma est. Ad singulas assæ parteis adiectis octonis tosti salis, cochlear vnú aut alterú damus ieiunis, ad emolliendá aluum: in potu auté & odoratis medicaminibus, & quibus vrinam ciere volumus, hydropicisque & stomachicis, quibus innatat cib9, regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis, & ore reiicientibus tres obolos, ĩ delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur cú melle, & estur eorundé gratia, maximè vt cócoctioné adiuuet. Strigmenta per aluú extrahit. Cocta & simili sumpta modo, eosdem præbet effectus: sed cauédus scillæ vsus, his qui intestinum sentiunt vlcus:

Ad pensiles verrucas & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in carica aut melle deuoratum, aluum emollit. Scilla tota in limine ianuæ suspésa, mali medicamenti noxam arcet.

De Pancratio. Cap. CCIII.

Pancratiũ, quod aliqui scillam appellãt, radice est magni bulbi, subrufo colore aut suppurpureo, gustu amaro ac feruéte: foliis filij, sed longioribus. Scillæ vires & præparationem habet, eodémque pondere in morbis efficaciter assumitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas ineſt. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicísq; cum hydromelite, commodissimè dantur.

Capparis. Cap. CCIIII.

Capparis aculeat⁹ frutex est, qui in terra stratus, magis in orbé cuagatur: spinas, vt rub⁹, habet, in hami modũ adúcas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructũ oleę simílé, qui cũ dehiscés pãditur, floré candidũ promit: quo excusso, nónihil glãdis oblógę figura inuenitur, qđ apertũ grana acinis punicorũ simília, ostendit, parua, rubicunda: radi-

καὶ πρὸς ἀκροχορδόνας πιεῖ καὶ χμήτλα ἐγχριωθεῖσα ὀπῇ. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῆς λεῖον ἀναλφθὲν ἐν ἰσχάδι ἢ μέλιτι καὶ βρωθὲν, μαλάττει κοιλίαν. ἔστι δὲ καὶ ἀλεξιφάρμακον ὅλη πρὸ τῶν δυρῶν κρεμαμένη.

Περὶ Παγκρατίου. Κεφ. σχ'.

Παγκράτιον, οἱ δὲ καὶ τοῦτο σκίλλαν ὀνομάζουσι, ῥίζα ὑπὸ βολβῷ μεγάλῳ ὁμοία ὑποπυρος ἢ ὑποπερφυρος, πικρὰ καὶ πυρώδης τὴν γεῦσιν· φύλλα κρίνῳ ὅμοια, μακρότερα δέ. ἔχει δὲ δύναμιν τὴν αὐτὴν τῇ σκίλλῃ, καὶ σκευασίαν, καὶ δόσιν ποιοῦσαν ὅτι τῶν αὐτῶν παθῶν· ὀπεικασέρα μὴν τοῖς σκίλλης ἡ ταύτης δύναμις. ὄθεν καὶ χυλιζομένη ἡ ῥίζα ταύτης, μιγνυμένη τε ὀρόβῳ ἀλεύρῳ καὶ ἀναπλασσομένη εἰς ἀρτίσκους, δίδοται ζωὴ ὑδρομέλιτι σπλιτικοῖς καὶ ὑδρωπικοῖς ὠφελίμως.

Περὶ Κατσπάρεως. Κεφ. σᾱ'.

Κάτσπαρις θάμνος ὢν ἀκανθώδης, ὅτι γῆς γεωειδῶς ἑρπυζόμενος· ἀκανθας ἀγκιστροειδεῖς ἔχων ὡς βάτος· φύλλα στρογγύλα, μηλέᾳ κυδωνίᾳ ὅμοια· καρπὸν δὲ οἷον ἐλαίας ὡς αὐοιχθεὶς λευκὸν σπερμάτια αὖθις· οὗ σεσύντος, εὑρίσκεταί τι οἷον βάλανος σπυρίκης, ὅσῳ αὐοιχθὲν ἔχει κόκκοις ὥσπερ ροιᾶς, μικροῖς ὀρωδροιδέσι ῥίζας

βίξας ξυλώδεις καὶ μεγάλας πλείσας. φύεται δὲ τοῦτο πανταχοῦ ἐν τραχέσι καὶ λεπτογείοις τόποις, καὶ νήσοις καὶ οἰκοπέδοις. παρεχόμενος δὲ ὁ χυλὸς αὐτῆς καὶ ὁ καρπὸς εἰς βρῶσιν. παρέχει δὲ κοιλίαν, καὶ κοσμάχος τε ὄζει καὶ διαφλόγησι βοηθεῖσα ἢ ἐφθὴ, εὐστομαχωτέρα τῆ ὠμῆς. ὁ μὲν οὖν καρπὸς αὐτῆς ἀπολιῶσα τήκει, ὁλκὴν δυοῖν ⊰ μετ' οἴνου πινόμενος ἐπὶ ἡμέρας μ', ἄγει δὲ οὖρον καὶ διαχώρημα αἱματῶδες· ἰᾶται δὲ τὰ καὶ παρφλύσει βοηθεῖ πινόμενος ὁ καρπὸς, καὶ ἕδρης ῥήγματα καὶ ἀπόσματα· ἐμπλαστόμενός τε ἄγει καὶ ἀποφλεγματίζει. καὶ ὀδόντων πόνον παύει ὁ καρπὸς σὺν ὄξει ἐκπλυνόμενος καὶ διακλυζόμενος. ἡ δὲ ῥίζης ὁ φλοιὸς ξηρὸς, πρός τε τὰ προφρωδιάματα ἀφίζει, καὶ αὐχμὰ θεραπεύει παῖ χρόνιον καὶ ῥυπαρὸν καὶ τετυλωμένον ἕλκος. κατάπλασσε δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀπλητικῶν (ὡς ὠμὴ) λύσει· διακλυζόμενόν τε τῷ πονοῦντι ὀδόντι βοηθεῖ· λήφοις δὲ λευκὸς ἀποσμήχει σὺν ὄξει λεῖα. τὰ δὲ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα λειανθέντα, σκληρίας καὶ χειράδας διαφορεῖ. σκώληκας δὲ τοὺς ἐν ὠσὶν ὁ χυλὸς ἐγχυματισθεὶς κτείνει. Ἡ μὲν τοιγὰρ λυδικὴ κάππαρις, ψυκτικωτάτη δὲ κατὰ τοὺς μαργαρίτας λεγομένους, ἐμπνευματοῖ ἰσχυρῶς. ἐμετικὴ δὲ πυκνάζει ἡ ἐν ἀπουλίᾳ, ἡ δὲ ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσης καὶ λιβύκης, δριμυτάτη.

ra dices lignosas spargit, grandes numerosasque. Tenui plerunque solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis & fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho quàm cruda vtilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienē absumit, & vrinā cruentumq; excrementum emittit: bibitur vtilissimè in coxarūdoloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & cōuulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorē sedat semen ex aceto decoctū, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadē proficit: vlcera omnia vetera, & sordida, & quæ occaluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illilinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum aceto trita, vitiligines albas absterget. Radix foliáque intrita, strumas ac duritias discutiunt. Aurium vermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica capparis, vehementer inflat. Apula vomitus facit. & quæ à Libyco, & quæ Rubro mari defertur, mirum in modum acris est:

 φλυκτί-

siquidem in ore pustulas excitat, gingiuasque osse tenus exest: quare in cibis non ab re damnatur.

Lepidium. Cap. CCV.

Lepidium aliqui gingidium vocant, herbula vulgo nota: muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris & exulcerans: quapropter ischiadicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis simili modo prodest. lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Ranunculum. Cap. CCVI.

Complura ranunculi genera. vis tamen omnibus vna, acris, & vehementer exulcerás. Nam vnũ coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amaráque, multis capillamentis, hellebori modo, fibrata: nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plerunque in Sardinia proueniens, quam acerrimum, quod syluestre apium appellant. Tertium minimum, odore

φλυκταίνουσι τὸ στόμα, καὶ κατεσθίουσα τὰ οὖλα ἄχρι γυμνώσεως· ὅθεν πρὸς βρῶσίν ἐστιν αὐτῆς ἐπιτήδειος.

Περὶ Λεπιδίου. Κεφ. σέ.

Λεπίδιον, ὃ ἔνιοι γιγίδιον καλοῦσι, γνώριμον βοτάνιον· ταριχευόμενον εἰς ἁλμαίας μετ' ἅλατος. Δύναμις δὲ ἐστι τῶν φύλλων δριμεῖα, ξηραντική· ὅθεν ἰσχιαδικὸν ἐστι σύμπλασμα, ἀμυντικώτατον· λεῖον σὺν ἐλενίου ῥίζῃ ἐπιπασσόμενον πρὸς τέταρτον ὥρας, καὶ ἐπὶ σπληνικῶν ὁμοίως· ἀφίστησι δὲ καὶ λέπρας. ἡ δὲ ῥίζα δοκεῖ ὀδόντων ἀλγήματα παραυτίκα, προσαποκλύζουσα τῷ τραχήλῳ.

Περὶ Βατραχίου. Κεφ. σέ.

Βατράχιον, οἱ δὲ, σέλινον ἄγριον καλοῦσι· τούτου πλείονα μέν ἐστιν εἴδη. Δύναμις δὲ μία δριμεῖα, καὶ ἄγαν ξηραντική. ἔχει δὲ τὸ μὲν αὐτῶν, φύλλα ὅμοια κορίῳ, πλατύτερα δὲ καὶ ὑπόλευκα καὶ λιπαρά· ἄνθος μήλινον, ἐνίοτε πορφυροῦν· καυλὸν δὲ ἔ πηχυν, ὕψος δὲ ὅσον πήχεως· ῥίζαν μικρὰν, λευκὴν, πικρὰν, ἔχουσαν ἀποφύσεις ὡς ἑλλεβόρου· φύεται δὲ παρὰ ῥείθροις. Ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερον εἶδος χωλώδεστερον, καὶ μακροκαυλότερον, ἐνλομὰς ἔχον πλείους τῶν φύλλων, πλεῖστον ἐν σπρδωνίᾳ γινόμενον, δριμύτατον, ὃ δὴ καὶ σέλινον ἄγριον καλοῦσι. καὶ τρίτον σφόδρα μικρὸν καὶ

καὶ δύσοσμον, τὸ ἄνθος χρυσῷ ὅμοιον. καὶ τέταρτον ἐοικὸς τούτῳ, ἄνθος γαλακτίζον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καὶ οἱ καυλοὶ, ἁπαλοὶ καταπλασσόμενοι, ἑλκωτικὴν καὶ ἐσχαρωτικὴν μετὰ πόνου· ὅθεν ὄνυχας λεπροὺς καὶ ψώρας ἀφίστησι, καὶ στίγματα ἐξαίρει, καὶ μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ ἀλωπεκίας πρὸς ὀλίγον καταπλασθέντα. ἑψόμενα δὲ καταίονημα χιμετλιόντων ἐστὶ χλιαρόν. ἡ δὲ ῥίζα πταρμὸν κινεῖ ξηρὰ λεία προσφερομένη τοῖς μυκτῆρσι· καὶ ὀδονταλγίας κουφίζει προσαπτομένη, θρύπτει μέντοι αὐτούς.

odore graui, flore aureo. Quartũ huic ſimile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & cruſtas nõ ſine dolore gignunt: quare vngues ſcabros extricant, ſcabiẽ eximunt, ſtigmata delent: formicantes verrucas, & penſiles, alopeciáſq; pauliſper illita, tollunt. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix, tritáque, ſternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem appenſa leuat, ipſos tamen frangit.

Περὶ Ἀνεμώνης. Κεφ. σζ'.

Ἀνεμώνη, διοσὴ, ἡ μὲν, ἀγρία, ἡ δὲ ἥμερος· καὶ τῆς ἡμέρου. ἡ μέν τις φοινικᾶ φέρει τὰ ἄνθη· ἡ δὲ, ὑπόλευκα ἢ γαλακτίζοντα, ἢ πορφυρᾶ. φύλλα δὲ κοριοειδῆ, λεπτοσχιδέστερα πρὸς τῇ γῇ· καυλία * χνοώδη λεπτὰ, ἐφ' ὧν τὰ ἄνθη ὥσπερ μήκωνος, καὶ μέσα κεφάλια μέλανα, ἢ κυανίζοντα· ῥίζα κατὰ μέγεθος ἐλαίας ἢ μείζων, οἱονεὶ γόνασι διειλημμένη. ἡ δὲ ἀγρία κατὰ πάντα μείζων τῆς ἡμέρου, καὶ τοῖς φύλλοις πλατυτέρα καὶ σκληροτέρα· τήν τε κεφαλὴν ἐπιμηκεστέραν ἔχει· ἄνθος φοινικοῦν, ῥίζια λεπτὰ καὶ πλείω. ἡ δέ τις ἔχει φύλλα μέλανα δριμυτέρα οὖσα. Δύνα-

Anemone. Cap. CCVII.

Duo anemones genera, vnũ ſylueſtre, alterum in cultis naſcens. Cuius multæ ſpecies: vna phœniceũ florẽ profert: altera candicantẽ, aut lacteũ, aut purpureũ. harũ folia coriãdro ſimilia cæterũ ſciſſa tenuius in terrã, inclinãtur: caules lanuginoſi, tenues, in quib9 flores aut papaueris, & in medio capitula nigra, aut cœrulea: radix oleæ magnitudine, aut ampli9 paulo grãdeſcit, ac veluti geniculis q-buſdã cingitur. Sylueſtri amplitudo prorſus maior, latioráq; folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus, & multis radicũ capillamẽtis. Acrior eſt, quę nigra habet folia.

Vis vtriusque acris: ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit: decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida vlcera abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua ciunt, vellere appositā. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonem nominari eupatorium putent: quoniam à sylvestri anemone, argemonem & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtráque tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acré, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. Insuper anemone & rhœadi capitula sylvestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculū, in rhœade subāgusti⁹. Anemonesgenera nec succū remittūt, nec

Δυώαμιν ἔχουσι δριμεῖαν ἀμφότεραι· ὅθεν ὁ χυλὸς τῆς ῥίζης αὐτῆς ῥινὶ ἐγχυθεὶς, σὺν κεφαλῆς κάθαρσιν ἀμύζει. μασηθεῖσα δὲ ἡ ῥίζα, φλέγμα ἄγει· ἐψηθεῖσα δὲ ἐν γλυκεῖ καὶ καταπλασσομένη, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς ἰᾶται· καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς καὶ ἀμβλυωπίας ἀποσμήχει, ἀναθαιρεῖ δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν· τὰ δὲ φύλλα καὶ οἱ χαυλοὶ συνεψηθέντες πλείονα καὶ ἐδώδιμα, γάλα κατασπῶ· ἐπὶ τοῖς δέτῳ δὲ ἔμμηνα ἄγει· καταπλασθέντα δὲ λέπρας ἀφίσησιν. Ἔνιοι δὲ μὴ διωριμένοι διοείζειν ἀπὸ τῆς ἀγελίας ἀνεμώνης, τὴν λεγομένην * ἀργεμώνην καὶ τὴν ῥοιάδα μήκωνα (ταύτης ἐν τοῖς μήκωσιν ἱστορήσομεν,) διὰ τὸ τὰ αὐτῶν ὁμόχροα φοινικοῦν ἔχειν ἄρχον, πλανῶνται τὴν ἀργεμώνην ὑπὸ πόαν ὀνομάζοντες. καλὴ δὲ ἀργεμώνης ἥπλον βαθὺ τὸ φοινικοῦν ἔχει καὶ τῆς ῥοιάδος, ὠχαίτερον * δὲ αὕτη καὶ ἡ ἀργεμώνη αὐθεῦσι. καὶ ἡ μὲν ἀργεμώνη ὀπὸν ἀνίησι χροιάζοντα καὶ δριμὺ σὺν γεύσιν ἰσχυρᾶς· ἡ δὲ ῥοιὰς λευκότερον καὶ δριμύ. ἀμφότεραι δὲ μεταξὺ κεφάλια μήκωνι ἀγρίᾳ παραπλήσια ἔχουσι, πλὴν τὸ μὲν * τῆς ἀνεμώνης ἀύωδον ὑποπαχύ, τὸ δὲ τῆς ῥοιάδος ὑπόστενον. αἱ δὲ ἀνεμῶναι ὅτε ὀπὸν ἀνίᾶσιν.

αὖτε

ὔτε καλύκας ἔχουσιν, ἀλλ' οἱονεὶ ἀσπαράγου ἄκρον. ἐν ἀρούραις τὲ τὸ πλεῖστον ἐκφύονται.

Περὶ Ἀργεμώνης. Κεφ. σή.

Ἀργεμώνη* ὅλον μὲν ἔστ ὅμοιον ἀγρίᾳ μήκωνι· τὸ δὲ φύλλον ἀνεμώνῃ ἔχει ὅμοιον· ἄνθος ἐχρυσέον· χαυλὸν φοινικοῦν, κεφαλὴν δ' ἐοικυῖαν μήκωνι ῥοιάδι, ὀπὴ μικρὰ ἐφ' ἑαυτῆς· σπέρμα δὲ ἐν πλατείαις κατὰ τὰ ἄνω μέρη ῥίζαις σφογγύλοις· ὀπὸς δ' ἀνίσπι χροιζόντα, δριμύ. καθαίρει δὲ ἄγμα καὶ νεφέλια. ἐν φλεγμοναῖς παρηγορεῖ τὰ φύλλα καταπλασσόμενα.

Περὶ Ἀναγαλλίδος. Κεφ. σθ'.

Τῆς ἀναγαλλίδος δύ εἴδη ἐστὶ, διαφέρον αὐθει. ἡ μὲν γὰρ κυάνεον ἔχουσα τὸ ἄνθος, θήλεια λέγεται· ἡ δὲ τὸ φοινικοῦν, ἄρρην. θαμνία δ' ἐστὶ κεχυμένα ἐπὶ γῆς, φύλλα ἔχοντα ἐπὶ τετραγώνων καυλίων μικρά, ἰσοστρόγγυλα πρὸς τὰ τῆς ἐλξίνης· καρπὸν φερεφρῆ. εἰσὶ δὲ ἀμφότεραι θερμαντικαί· ἀφλέγμαντοι, σκολόπων ὀπτασιτικαὶ, νομῶν ἐκτικαί. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῶν ἀναργαλιζόμενος, ἀποφλεγματίζει καθαλίῳ· καὶ ῥῖνὸν ἐγχόμενος, ὀδόντων πόνον παύει, ἐὰν εἰς τὸν ἀντικείμενον μυξωτῆρα τῷ ἀλγοῦντι ἐμβληθῇ· καθαίρει δὲ ἄγμα μετὰ μέλιτος ἀττικοῦ. καὶ ἀμβλυωπίας βοηθεῖ. ὠφε-

nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

Argemone. Cap. CCVIII.

Argemone in totú sylueſtri papaueri ſimilis eſt: folia habet anemones, diuiſa: florem puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & ſummis partibus latum: radicem rotundam: ſuccum croci colore, acrem, dimittit. Argema & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compeſcunt.

Anagallis. Cap. CCIX.

Duo anagallidis genera, quę tantú flore diſtãt. Nã quæ cœruleo flore eſt, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices ſunt parui, in terra iacẽtes, foliis in quadrangulo cauliculo puſillis, ſubrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: ſemine rotundo. Vtraque mitigandi vim habet: inflammationem arcet, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat: & naribus infuſus, dolorem dentium lenit, ſi in aduerſam narem iniiciatur: argema cum melle Attico emendat: retuſæ, oculorum aciei auxiliatur:

contra viperarum morsus, iocineris & renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam quæ cœruleum ædit florem, prociduam sedem reprimere: quæ verò phœniceum, illitu euocare.

ὠφελεῖ καὶ ἐχομένους μετ' οἴνου πινόμενος, καὶ νεφριτικοὺς, καὶ ἡπατικούς. φασὶ δέ τινες τὴν μὲν ἔχουσαν τὸ κυανέον ἄνθος, στρεπτώσεις δακτυλίου σβεννύειν. τὴν δὲ τὸ φοινικοῦν ἐρεθίζειν καὶ σπλαδεῖσαν.

Hedera. Cap. CCX.

Hedera differētias multas in specie sortitur, summas autem genere treis. Nam quædā candida est, altera nigra, tertia helix. Candida, fructum fert candidum: nigra, nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet viticulas, & folia parua, angulosa, & concinniora. Hedera omnis acris est, & adstringens: neruos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino vnguento, melle aut nitro, naribus infunditur, & contra veteres capitis dolores caput eo cum aceto, & rosaceo perfundi vtile est: purulentis auribus, aut dolētibus, cum oleo medetur.

Πεϱὶ κισσοῦ. Κεφ. σἰ.

Κισσὸς πολλὰς ἔχει διαφορὰς τὰς κατ' εἴδος, τὰς δὲ γνωϱιμωτάτας τϱεῖς. * λέγεται γὰϱ ὁ μὲν τις λευκὸς, ὁ δὲ, μέλας ὁ δὲ, ἕλιξ. ὁ μὲν οὖν λευκὸς, φέϱει τὸν καϱπὸν λευκόν· ὁ δὲ μέλας, μέλανα ἢ χϱοΐζοντα, ὃν δὴ καὶ ἰδίως τινὰ Διονύσιον καλοῦσιν· ὁ δὲ ἕλιξ ἄκαϱπός ἐστι, καὶ λευκὰ ἔχει τὰ κλήματα, καὶ τὰ φύλλα λεπτὰ καὶ γωνιώδη καὶ ἐϱυθϱά. πᾶς δὲ κισσὸς δϱιμύ ἐστι, συμπιπτικός· ἅπτεται νευϱώδους ἀπτικός. πίνεται δὲ αὐτοῦ τὰ μὲν ἄνθη τϱισὶ τοῖς δακτύλοις ληφθέντα καὶ πεφθέντα ἐν οἴνῳ, πϱὸς δυσεντεϱικούς, δὶς δὲ τῆς ἡμέϱας δεῖ πίνειν· καὶ πϱὸς πϱοπεπαϱμένα δὲ ἀμύζει σὺν κηϱωτῇ λελειωμένα. τὰ δὲ ἁπαλὰ τῶν φύλλων σὺν ὄξει ἐπίθεμα, ἢ ὠμὰ ἀπ' αὐτῶν συνλειαινόμενα, σπλῆνα ἰῶνται. ἐπιπλάττουσι δὲ ὁ χυλὸς τῶν φύλλων καὶ τῶν κοϱυμβίων σὺν ἐλαίῳ, ἢ μέλιτι, ἢ νίτϱῳ, καὶ πϱὸς τὰ χϱόνια τῆς κεφαλῆς ἀλγήματα ἀϱμόζει, καὶ ἐπιβϱέχεται σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ· ὠταλγίας δὲ καὶ πυοῤῥοούσας ὦτα σὺν ἐλαίῳ ἰᾶται.

Nigræ

τῆς δὲ

ϛῦ δὲ μέλανος χυσοῦ ὁ χυλὸς καὶ οἱ κόρυμβοι πεθέντες, ἀτονίαν ποιοῦσι, καὶ τα ῥάγοντα ἢ διάνοιαν πλεονασθέντες. λεῖα δὲ σφακελία πέντε τῶ κορύμβων θερμανθέντα σὺν ῥοδίνῳ ἐν σιδίῳ καὶ ἐν καχθέντα εἰς τὸ ἀντικείμενον ὦς ἐπὶ ὀδοντ[illegible]αλγίαι, τὸ ἄλγημα παῦ. μελαίνουσι δὲ καὶ τὰς τρίχας οἱ κόρυμβοι. καταπλάσσουσι δὲ τὰ φύλλα σὺν πῶ ἕλκος ἐψηθέντα σὺν οἴνῳ καὶ καταπλασσόμενα, καταχρώματα καχοήθη, καὶ ἐφήλιδας θεραπεύῃ ὡς προείρηται ἐφθά. κινοῦσι ὃ καὶ καταμήνια ὠσπεθέντες οἱ κόρυμβοι λεῖοι καὶ πεθέντες δὲ μετὰ μέλιτος χάθαρσιν < κάλιθος, ἀτόκιόν ὅτι. καὶ ὁ μόχος δὲ τῶ φύλλων μάλιτα δευθεὶς καὶ προστεθεὶς τῇ μήτρᾳ, ἔμμηνα ἄγει καὶ ἔμβρυα. ὁ δὲ χυλὸς ἐνταζόμενος ταῖς ἐν τοῖς ῥώθωσι δυσωδίας καὶ σκιρδόνας ἐκκαθαίρει. τὸ ὃ δάκρυον αὐτῶ ψιλοῖ τρίχας· καὶ κτείνει φθεῖρας ἐπαλειφόμενον. ὁ δὲ τῶν ῥιζῶν χυλὸς σὺν ὄξει πεθεὶς, φαλαγγιο δήκτοις βοηθεῖ.

Nigræ hederæ succus, aut epoti corymbi, corpus infirmant, mentémque turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactíque in punici mali cortice cum rosaceo, si instillentur à contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum, illiti corymbi. Folia in vino decocta, illinuntur omnium vlcerum generi, etiam si cacoëthe sint: vitia cutis in facie, & ambusta sanant, vti anteà diximus, decocta. Mouent menses triti & subditi corymbi: iidem poti, post purgationes fœminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculi foliorum melle irrigatus, ac vuluæ inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædia narium, graueolentiámque emendat, & sanitati restituit. Lachryma hederæ psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

Πρὶ Χελιδονίου τῶ μεγάλω. Κεφ. σιά.

Χελιδόνιον μέγα χαμαλὸν ἀγίνοι παχυαῖον, ἢ καὶ μείζονα, ἰχνῶδες, ἔχοντα παραφυάδας φύλλων μεγάλων. φύλλα ὅμοια βατραχίῳ, τρυφερώτερα μὴν τὰ

Chelidonium.

Cap. CCXI.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubitali aut altiore, agnatis foliosis: foliis ranunculi, mollioribus tamen, &

& colore cæsiis: flore violæ albæ, secundum singula folia prodeunte: in eo succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauiter olens: radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur: siliqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa, in qua semen papauere maius recluditur. Succus in æreo vase, cũ melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Foliis, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in vmbra digeritur in pastillos. Radix cum anisi & vino albo pota, medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpunt: imposita cum vino, aut manducata dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quòd aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres excæcatis pullis, admota herba visum restituere.

τὰ τῆς χελιδονίου καὶ ὑπόγλαυκα τῷ χρόᾳ, καὶ παρ' ἕκαστον φύλλον αὖθις ὥσπερ τὸ λευκόϊον. χυλὸς δὲ κροκώδης, ῥιμοὺς δηκτικὸς, ποσῶς ὑπόπικρος καὶ δυσώδης· ῥίζα αὐτῇ μόνη ἐστὶ μία, κάτωθεν δὲ πλείονες· καρπὸς δὲ ὥσπερ τῆς κερατίτιδος μήκωνος, λεπτὸς, μακρὸς ὡς κῶνος, ἐν ᾧ σπερμάτια μείζονα μήκωνος. ταύτης ὁ χυλὸς μιγεὶς μέλιτι καὶ ἐφηθεὶς ἐν χαλκῷ ἐπ' ἀνθράκων ἁρμόζει πρὸς ὀξυδερκίαν. χυλίζεται δὲ τὰ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς, ἀφ' ὑγροῦ θέρους, καὶ ξηραίνεται ἐν σκιᾷ καὶ ἀναπλάσσεται. ἡ δὲ ῥίζα πινομένη συὺ ἀνίσῳ καὶ οἴνῳ λευκῷ, ἰκτεριικοὺς θεραπεύει καὶ ἕρπητας· καὶ καταπλασσομένη συὺ οἴνῳ ὀδοντάλγιας τὰ παύει διαμασωμένη. δοκεῖ δὲ ὠνομάσθαι χελιδόνιον, ἐπειδὴ ἅμα τῇσι χελιδόσι φαινομένοις ἀναφύεται, καὶ λήγουσαις δὲ συμπεραιτμάζει. τινὲς δὲ ἱστόρησαν ὡς ἐάν τις τυφλωθῇ τῶν τ' χελιδόνος νεοττῶν, αἱ μητέρες προσφέρουσαι τῷ πάθει ἰῶνται τ' πήρωσιν αὐτῶν.

Chelidonium minus.

Cap. CCXII.

Chelidonium minus, quod triticum syluestre aliqui nuncuparũt, herbula pediculis ab radice pẽdens, sine caule: foliis hederæ,

Περὶ Χελιδονίου τοῦ μικροῦ.

Κεφ. σιϚ'.

Χελιδόνιον τὸ μικρὸν, οἱ δὲ πυρὸν ἄγριον ἐκάλεσαν, βότανίον ἐστὶν ἐν μόνοις ἀπορριπτομένοις, ἀχμάλοις, φύλλοις κισσοειδέσι,

σαρδέσι, ἀδιαφορεστέρεσις δὲ μᾶλλον καὶ μικροτέρεσις, καὶ τρυφερεῖς καὶ ὑπολιπάρεσις ἀδιεχόμενον· ῥίζας δ' ἔχει ὀλιγὰς τὸ αὐτὸ μικρὰς πολλὰς, ὥσπερ πυρῶσι σωρευμένας. τρίχες δέ εἰσιν ἢ τέσσαρες ἀπὸ τῶν μακρῶν πεφυκυῖαι. φύεται δὲ παρ' ὕδασι καὶ τέλμασιν. ἔχει δὲ τὴν δύναμιν δριμεῖαν, παραπλησίαν ἀνεμώνῃ ἕλκουσαν τῷ ἐπιφόρειαν· ψώρας τε καὶ ὄνυχας λευκοὺς ἀφίησιν. αἱ δὲ ῥίζαι χυλωθεῖσαι χρήσιμοι εἰς ῥινεγχυσίαν μετὰ μέλιτος πρὸς κάθαρσιν κεφαλῆς.

Περὶ Ὀθόννης. Κεφ. σιγ'.

Ὀθόννα οἱ μὲν φασι τὸ μεγάλα χελιδονίᾳ χυλὸν εἶναι· οἱ δὲ, γλαυκίου. οἱ δὲ, τῆς κεραΐτιδος μύκωνος* τῶν ἀνθέων χυλόν.* ἔνιοι δὲ μίγμα ἀναγαλλίδος τῆς κυανέας καὶ ὑοσκυάμου καὶ μήκωνος χυλόν. οἱ δὲ βοτάνης πρασίνου δυτικῆς πηδὸς, ἣν τις ὀθόννα καλεῖται, εἶναι χυλὸν· ἡρμῆσθαι δὲ αὐτὸ καὶ ἐν τῇ κατ' αἴγυπτον ἀφανίσει. ἔχει δὲ τὰ φύλλα ὑυζώμῳ ἐμφερῆ, πολύπτυκτα ὥσπερ σκόπα, ψαφαρὰ, ὀλιγόφυλλα, ἄνθος δὲ φέρει κρόκινον, πλατύφυλλον· ὅθεν ἔδοξεν ἀνεμώνης αὐτὸ πηδὸς εἶδος εἶναι. χυλίζεται δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ὅπου δεῖ ἀποκαθαίρειν δάκρυσι, καὶ πάντα

hederæ, multò rotundioribus, & minoribꝰ, teneris, & ſuppinguibus: radices habet ex eodẽ callo cõplures, puſillas, in granorũ tritici modũ aceruatĩ cõ geſtas: quarũ tres aut quatuor in longitudinẽ exeũt. Iuxta aquas & lacus naſcitur. Vis ei acris, & anemones modo, ſummã cutem exulcerat: pſoras & ſcabros vngues eximit. Succus radicibꝰ expreſſus ad purgandũ caput, naribꝰ ĩfunditur. Decoctũ eius cum melle gargarizatum, magnificè id præſtat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna. Cap. CCXIII.

Othõnã aliq maioris chelidoniæ ſuccũ eſſe aiũt, quidã glaucij, Alij ſuccũ floribꝰ cornicula ti papaueris expreſſũ. Alij permiſtos cœruleæ anagallidis, hyoſcyami, & papaueris ſuccos, eſſe cõtẽdũt. Alij troglodyticæ cuiuſdã herbę ſuccũ, q̃ othóna vocaſ: naſciq; eã in eo Arabiæ tractu, qui ad Ægyptũ ſpectat. Othonna foliis erucæ, pforatis cribri modo, & veluti à tinea derofis, ſqualore obſitis, paucis: flore croci, latifolio: quare q̃dã anemones ſpeciẽ eſſe putauerũt. Extractis ſuccꝰ oculorũ medicamẽtis adiiciẽ: vbi expurgare eſt opꝰ: mordet enĩ & abſterget:

absterget omnĕ caliginé, quæ oculis offunditur. Tradunt humoré quĕdã ex herba emanare q elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadĕ digerit. Aliq tamẽ affirmãt, lapidẽ esse Ægyptiũ, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodã & adstrictione mordaci.

Auricula muris. Ca. CCXIIII.

Muris auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubẽtibus, & concauis foliis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, vt anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui alsinẽn, muris auriculam vocitãt.

Glastum. Cap. CCXV.

Satiuũ glastũ, quo infectores lanarũ vtuntur, foliũ habet plãtagini simile, verũ pinguius nigriúsq;: cuius caulis duũ cubitorũ altitudinẽ excedit. Illita folia tumores omneis discutiunt, cruenta

παύτα τὰ ὀπισθοῦντα τ κόρεις ἀποσμήχουσα. φασὶ δέπειν ϗ ὑγιάσαι ἀποῤῥεῖν τῆς βοτάνης, ἣν πλυάντες ϗ χωείσαντες τ λίθον, ἀναπλάσσουσι βοχάσιν πρὸς τὰ αὐτά. ἔνιοι δέ φασιν αὐτ λίθον εἶναι αἰγύπτιον ἐν τῇ Θηβαΐδι γινόμενον, χαλκόχρων, μικρὸν τῷ μεγέθει, δάκνοντα τ γεῦσιν μ πυρώσεως ϗ σύψεως.

Περὶ Μυὸς ὠτων. Κεφ. σιδ'.

Μυὸς ὦτα· οἱ δὲ μυὸς ὠτίδα καλοῦσιν, ἀνίσοι χαμαὶ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πολέονας, ὑποῤῥύσας τὰ κάτωθεν ϗ κοίλους· φύλλα ὡς ὀπωπή καὶ σεναὶ, ῥᾴζαν ἐπιτεμνόμενα ἔχοντα, ἐλαφίζοντα, ἀνὰ δύο πυκνότατα ἐκ διαστημάτων. εἰς ὀξὺ ἀπολήγοντα. ἐκφύεται τε λεπτὰ καυλία ἐκ τ μακαλῶν· ἐφ' ὧν ἀνθία χαμαίζοντα μικρὰ ὡς τὰ τ ἀναγαλλίδος· ῥίζα ὡς δακτύλου τὸ πάχος, ἔχουσα πολλὰς ἀποβλαστήσεις. καθόλου δέ ἐστιν ὁμοία ἡ πόα τῷ σκολοπενδρίῳ. λοιπόν ὡς ϗ ἐλαίων ταύτης ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα αἰγιλώπια ἰᾶται. τινὲς ὡς ϗ ἐλξίνην μυὸς ὠτίδα καλοῦσιν.

Περὶ Ἰσάτιδος ἡμέρ. Κεφ. σιέ.

Ἰσάτις ἥμερος, ἣ οἱ βαφεῖς χρῶνται φύλλον ἔχει ἀρνογλώσσῳ ἐμφερὲς· λιπαρώτερον ὡς ϗ μελανώτερον, χαμαὶ ὡς ὑπτίπτον. δυώδη ὡς τὸ φύλλα καταπλασσόμενα πᾶν εἶδος διαφορεῖν, ϗ

καὶ φύματα καὶ ἔνδαιμα τραύματα κολλᾶν. αἱμοῤῥαγίας τε στέλλειν, καὶ φαγεδαινικὰ, καὶ ἕρπητας ἐρυσιπέλατά τε καὶ σηπεδόνας θεραπεύειν.

Περὶ Ἰσάτιδος ἀγρίας. Κεφ. σιϛ΄.

Ἰσάτις ἀγρία, παραπλήσια ἐστὶ τῇ περὶ αὐτῆς, φύλλα ἔχει μείζονα πρὸς τὰ τῆς θρίδακος, καυλοὺς δὲ λεπτοτέρους πολυσχιδεῖς ὑπερύθρους, ἔχοντας ἐξ ἄκρου ὥσπερ θυλάκια γλωσσοειδῆ πολλὰ ἀποκρεμάμενα, ἐν οἷς τὸ σπέρμα, ἄνθος μήλινον λεπτόν. δύναται δὲ τὰ αὐτὰ τῇ περὶ αὐτῆς, ὠφελοῦσα καὶ σπληνικοὺς πινομένη καὶ καταπλασσομένη.

*Περὶ Τηλεφίου. Κεφ. σιζ΄.

Τηλέφιον, τοῦτο καὶ τοῖς φύλλοις καὶ τῷ καυλῷ ἔοικεν ἀνδράχνῃ· μασχάλας ἔχον δύο παρ' ἕκαστον γόνυ τῶν φύλλων ἐμφυομένας. ἀφ' ὧν κλωνία ϛ΄. ἢ ζ΄. ἀπὸ τῆς ῥίζης πλήρη φύλλων κυανοειδῶν*, παχέων τε καὶ γλίσχρων καὶ σαρκωδῶν, ἄνθη* μήλινα ἢ λευκά. φύεται δὲ ἐν ἀμπελῶσι καὶ τόποις ἐργασίμοις ἔαρος. θεραπεύει δὲ καταπλασσόμενα τὰ φύλλα ἐπὶ ὥρας ἓξ λεύκην· δεῖ δὲ μετὰ ταῦτα ὠμῇ λύσει χρῆσθαι. αἴρει δὲ καὶ ἀλφοὺς ἐπιχρισθέντα σὺν ὄξει ἐν ἡλίῳ, δεῖ μέν τοι μετὰ τὸ ἀποξηρανθῆναι αὐτὰ ἀποψᾶν.

Τέλος τοῦ βιβλίου δευτέρου.

ΠΕΔΑ-

cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluuia sistunt, ignem sacrum, phagedænas, putrescentia vlcera, & quæ serpunt, sanant.

Glastũ syluestre. Ca. CCXVI.

Syluestre glastũ satiuo simile est: folia fert maiora, lactucaceis proxima: caules prętenues multifidos, quadátenus rubentes: in quorũ cacumine folliculi multi dependét, quandã linguarum effigiem referentes, in quibus semẽ flore tenui, luteo. Eadẽ q̃ & suprà dicta præstat: potu & illitu lienosis auxiliat.

Telephiũ. Cap. CCXVII.

Telephiũ herba portulacæ similis est, & caule, & foliis: alas binas in singulis foliorũ geniculis, annectit, ramuli à radice seni septénive prodeunt, foliis referti cœruleis, crassis, lẽtis, ac carnosis, flore luteo, aut cãdido. Nascitur inter vites, & locis cultis vere. Folia senis horis illita albam vitiliginẽ sanãt: sed postea hordeacea farina illini debet, perunctã ex aceto etiam in sole vitiliginẽ tollunt, sed vbi inaruerũt, abstegũtur,

Finis libri secundi.

PEDA-

PEDANII DIOSCORIDIS Anazarbei de medicinali materia Liber tertius.

Io. Ruellio Sueßionēſi interprete.

ΠΕΔΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

SVP Erioribus chariſsimè Aree commentariis, tradidimus de aromatibus, vnguentis, oleis, arboribus, earū fructibus & lachrymis, itē de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia præditis. In hoc autem tertio radices, ſuccos, ſemina, herbas, & quæ vernacula, & inter ſe cognata cēſentur, quæque pluribus ſcatent remediis, pſequemur.

ΕΝ μὲν τοῖς ἀνωτάτω βιβλίοις φίλτατε Ἀρεῖε περιεδώκαμεν περὶ ἀρωμάτων καὶ μύρων, καὶ ἐλαίων, καὶ δένδρων, καὶ τῶν ἀπ' αὐτῶν καρπῶν τε καὶ δακρύων, ἔτι τε ζώων καὶ σπερμάτων καὶ λαχάνων, καὶ τῶν δριμύτητα κεκτημένων βοτανῶν. ἐν δὲ τούτῳ τρίτῳ ὑπάρχοντι, περὶ ῥιζῶν καὶ χυλισμάτων καὶ βοτανῶν καὶ σπερμάτων, συμφύλλων τε καὶ φαρμακωδῶν ἐπιλευσόμεθα.

Agaricum. Cap. I.

Περὶ Ἀγαρικοῦ. Κεφ. α'.

Agaricum radix fertur laſerpitij ſimilis, ſed facie ſūma ſolutior, & rariore fungoſoq; tota contextu. Duo eius genera: fœmina, quæ præfertur, rectis intus venarum diſcurſibus cōſtat. mas rotundus eſt, & vndique compactior. Vtrique guſtus initio dulcis, mox ex diſtributione in amaritudinem tranſit: gignitur

Ἀγαρικὸν ῥίζα φέρει σπλῆνι ἐμφερής, οὐ πυκνὴ τὴν ὑπόφασιν ὥσπερ τὸ σίλφιον, ἀραιὰ δέ ἐστιν ὅλη. ἔστι δὲ τὸ μὲν, αὐτὸ ἄῤῥεν· τὸ δὲ, θῆλυ· τῶν διαφέρει τὸ θῆλυ ἔχον κτηδόνας εὐθείας ἐντός. τὸ δὲ ἄῤῥεν στρογγύλον ἐστὶ καὶ πανταχόθεν συμφυές. γεύσει δ' ἀμφότερα ὅμοια καὶ ἀρχὰς μὲν γλυκάζοντα, εἶτα ἐξ ἀναδόσεως ἐμπικραίνοντα

γίνεται δὲ ἐν τῇ ἀρχείᾳ τῆς Σαρματικῆς. λέγουσι δὲ οἱ μὲν φυτῶν ῥίζαν εἶναι· τινὲς δὲ ἐν τοῖς στελέχεσι τῶν δένδρων καὶ σῦμμιν γίνεσθαι ὥσπερ οἱ μύκητες, γίνεται δὲ καὶ ἐν τῇ καλουμένῃ Γαλατίᾳ καὶ Κιλικίᾳ ἐπὶ τῶν κέδρων, εὐθρυπτον μέν τοι καὶ ἀδενές. Πίνεται μὲν τοι δυσὶν ὀβολοῖν, θερμαντικὸν ποιοῦν πρὸς τροφὰς καὶ ὠμότητας, ῥήγματά τε καὶ πτώματα. ὀβολῶν δὲ δυοῖν πλῆθος διδόμενον μετ' οἰνομέλιτος ἀπυρέτοις· πυρέττουσι δὲ ἐν μιλικράτῳ. καὶ ἱπατικοῖς δὲ καὶ ἀθματικοῖς, καὶ ἰκτερικοῖς καὶ δυσεντερικοῖς, καὶ νεφριτικοῖς καὶ δυσουρεῦσι* καὶ ὑστερικοῖς πνιγὶ καὶ καχεξίαις < ά. δι δόμενον φθισικοῖς δὲ μετὰ γλυκέως· σπληνικοῖς δὲ μετ' ὀξυμέλιτος, καὶ σπασμωδικοῖς ὡς ἔστι διαμασώμενον καὶ καταπινόμενον, μηδενὸς ὑγροῦ ἐπιῤῥοφουμένου. ὁμοίως δὲ καὶ ὀξυρεγμίαν, ἴσπιν δὲ καὶ αἵματος ἀναγωγὰς, ἀλλὰ τεταγόλου ἓξ ὕδατος λαμβανόμενον. πτιεῖ καὶ πρὸς ἰχῶρας καὶ ἀῤῥαγήματα, καὶ ἐπιληψίας μετ' ὀξυμέλιτος λαμβανόμενον τὸ ἴσον σπλῆθος· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα, καὶ ταῖς ἐμπνευματουμέναις ὑστέραν γυναιξὶ ὠφελίμως τὸ ἴσον δίδοται· λύει δὲ καὶ βῆχας πρὸ τῆς ἐπισημασίας διδόμενον· χα-

gignitur in Sarmatiæ regione, quæ Agaria dicit. Sunt qui radicem esse plantæ affirmẽt: alij vt fungos nasci in arborũ caudicibus, quadã putredine. Gignitur in Galatia Asiæ, & Ciliciа, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringẽdi calfaciẽdiq; naturam habet: efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidẽ contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso, febrim non sentiẽtibus: febriculosis verò, i aqua mulsa. Arquatis quoq;, suspiriosis, iocineris, renumq; vitio laborãtibus, dysentericis. Itẽ si vrina ægrè red datur, si vuluæ strangulatus vrgeat, si pallor membra decolo ret, drachma vna dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotiũ exhibet, ex aceto mul so: si dissolutio stomachi est, ita vt cibi tenax nõ sit, mãditur, & sine vlla humoris sorbitiõe deuoratur. Simili modo acida ru ctãtibus, ppinat. Sãguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sũptũ. Facit ad coxẽdicũ, & articulorũ dolores, & comitiales morbos, si cũ aceto mulso pari põdere assumant: mẽses ciet: fœminis, quas iflatio vuluę vexat vtiliter æquali modo da-

tur,

tur. Horrores soluit datum ante febrium accessiones: aluum purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum: si serpētes ictum vibrarunt, morsúmque subsixerũt, tribus obolis ex vino potũ, mirè auxiliatur. In summa, internis omnibus vitiis cõuenit, pro viribus, & ætate datũ, nũc ex aqua, nũc ex vino, iis ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum. Cap. II.

Rha, alicui rheũ, Latini rhaponticum vocant, prouenit in iis, quæ supra Bosphorum sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantũ læuis, sine odore. Optimũ habetur, quod tere dines nõ sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, mãducatúmque colorē reddat pallidum, aut ad crocũ inclinã tem. Id epotũ facit ad inflationes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolores, ad cõuulsa, lienosos, hepaticos, tormina ad vnum, vesicę & pectoris vitia, aduersus intēta præcordia, & vuluæ mala, coxēdicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria,

καθαίρει δὲ καὶ κοιλίαν < α΄, ἢ β΄. μετὰ μελικράτου πινόμενον· ἔστι δὲ καὶ θανασίμων ἀντίδοτον μετὰ κράματος < μιᾶς ὁλκὴ λαμβανόμενον· καὶ πρὸς ἑρπετῶν δὲ πληγὰς καὶ δήγματα, ὁλκὴ τριωβόλου μετ᾽ οἴνου πινόμενον βοηθεῖ. καὶ καθόλου πρὸς τὰ ἐντὸς πάντα πάθη ἁρμόζει, πρὸς δύναμιν καὶ ἡλικίαν διδόμενον, οἷς μὲν μεθ᾽ ὕδατος, οἷς δὲ μετ᾽ οἴνου, οἷς δὲ μετ᾽ ὀξυμέλιτος ἢ μελικράτου.

*Περὶ Ῥᾶ. Κεφ. β΄.

Ῥᾶ, οἱ δὲ ῥῆον καλοῦσι, γεννᾶται ἐν τοῖς ὑπὲρ Βόσπορον τόποις, ὅθεν καὶ κομίζεται. ῥίζα μέλαινα, κενταυρείῳ τῷ μεγάλῳ ἐοικυῖα, μικροτέρα μέντοι καὶ ἐνερευθεστέρα ἄοσμος, χαύνη, ὑπόκουφος. ἔστι δὲ αὐτῆς κράτιστον τὸ ἀτερηδόνιστον, *ἐγγλισχρόν τε κατὰ τὴν γεῦσιν μετὰ ἀνειμένης στύψεως, διαμασηθέν τε ἔνωχρον καὶ κροκίζον πως τῷ χρώματι. Ποιεῖ δὲ πινόμενον πρὸς ἐμπνευματώσεις στομάχου, ἀτονίαν, ἄλγημα παντοῖον, σπάσματα, σπληνικούς, ἡπατικούς, νεφριτικούς, στροφουμένους, καὶ τὰ περὶ κύστιν καὶ θώρακα, καὶ ὑποχονδρίων ἐντάσεις, καὶ τὰ περὶ ὑστέραν πάθη, ἰσχιάδας, αἵματος πτύσεις, ἄσθματα,

ἄσθματα, λυγμοὺς, δυσεντερίας, κοιλιακὰς διαθέσεις, καὶ περιόδους, καὶ θηρίων δήγματα. δίδοται δὲ ὁμοίως τῷ ἀγαρικῷ πρὸς ἕκαστον πάθος, τῇ αὐτῇ ὁλκῇ, καὶ ὑγροῖς χρώμενος· μετ' οἰνομέλιτος μὲν ἀπυρέτοις· πυρέσσουσι δὲ μετὰ μελικράτου· φθισικοῖς μετὰ γλυκέος, σπληνικοῖς μετ' ὀξυμέλιτος· στομαχικοῖς ὡς ἔστι διαμασώμενον καὶ καταπινόμενον. μηδενὸς ὑγροῦ ἐπιῤῥοφουμένου. αἴρει δὲ, καὶ πελιώματα καὶ λειχῆνας μετ' ὄξους καταχρισθέν. καὶ φλεγμονὰς πάσας διαχεῖ χρονίας σὺν ὕδατι καταπλαττόμενον. ἡ δὲ ἀνωτάτω αὐτοῦ δύναμις, στυπτικὴ μετὰ ποσῆς θερμασίας.

Περὶ Γεντιανῆς. Κεφ. γ'.

Γεντιανὴ δοκεῖ μὲν ὑπὸ πρώτου εὑρῆσθαι Γέντιδος τοῦ Ἰλλυριῶν βασιλέως, ἀφ' οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχηκεν. ἧς τὰ φύλλα τὰ μὲν πρὸς τῇ ῥίζῃ καρύᾳ ἢ ἀρνογλώσσῳ ὅμοια ὑπέρυθρα, τὰ δὲ ἐν μέσῳ τῷ καυλῷ, καὶ μάλιστα τὰ κατ' ἄκρον ἐσχισμένα, μικρῶς· καυλὸς δὲ κενὸς, λεῖος τὸ πάχος δακτύλου, τὸ δὲ ὕψος δίπηχυς, γόνασι διειλημμένος, ἐκ διαστημάτων μειζόνων περικείμενος τὰ φύλλα· καρπὸν δὲ ἔχων ἐν κάλυξι πλατὺν, κοῦφον, ἀχυρώδη, πρὸς τὸν τοῦ σφονδύλου· ῥίζαν μακρὰν, ὁμοίαν ἀριστολοχίᾳ τῇ μακρᾷ,

suſpiria, ſingult⁹, dyſenterias, & cœliacorũ affectus, contra febrium circuitus, & venenatorũ morſus. Datus in ſingulis valetudinibus eodé, quo agaricum pondere, & cum eiſdem liquoribus: ſi febri careant, in mulſo: ſin aliter, ex aqua mulſa: ſi tabẽ experiuntur, ex paſſo: ſi lienis exercet, in aceto mulſo. ſi diſſolutio eſt ſtomachi, id eſt cũ cibi tenax non eſt, manditur, & ſine ſorbitione vlla deuoratur, liuentia lichenáſq; tollit, cũ aceto illitũ, inflãmationes omneis veteres ex aqua oblitum diſsipat. ſumma eius vis adſtringens, cum aliquanto calore.

Gentiana. Cap. III.

Gentianæ inuẽtio prima aſſignatur Gẽtio Illyriorum regi, à quo cognomentũ habuit. Folijs partim proximè radicẽ, iuglãdi plantaginíve ſimilibus, ſubrubris, partim à medio caule, & præſertim iuxta cacumen, paulum diſſectis: caule cauo, & læui, digiti craſsitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato, binûm ſæpe cubitorum: ſemine in calycibus lato ſine pondere, glumoſo, ſatis ad ſphondyli ſemen accedente, radice longæ ariſtolochiæ, craſſa, amara.

Nascitur in sublimibus montiũ iugis, vmbrosis locis, aquosisque. Vis radicis excalfactoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis cum pipere, ruta, & vino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis, prodest: hepaticis & stomachis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita, partus eijcit: imposita, vt lycium, vulneraria est, & vlcerum cuniculatim depascentium medela. Succus præcipuè eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyris acribus immiscetur. Radix vitiliginé absterget. Succi extrahendi ratio hæc est: Cõtusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & vbi refrixit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, ficti lique reconditur.

Aristolochia rotunda.

Cap. IIII.

Aristolochia nomen ex eo sibi adoptauit, quòd existimetur, optimè puerpis opitulari.

Tria

πα χεῖαν, πικραί. γίνεται δὲ ἐν ὑψηλοτάταις ἀκρωρείαις, καὶ συσκίοις τόποις καὶ εὐύδροις. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα θερμαντικὴν, συμπικλῶ· βοηθεῖ δὲ ἐπειοδήκτοις ποτιζομένη < β'. τὸ σπλῆνος, μετὰ πιπέρεως καὶ πηγανίου, καὶ οἴνου. τοῖς δὲ χυλίσμασι τοῦ ὄσου < ά. καὶ πρὸς ὀδύνας πλευρῶν, καὶ πτώματα, ῥήγματά τε καὶ *ἀπάσματα. ἐνδέτεῖ, καὶ ἡπατικοῖς, καὶ στομαχικοῖς πινομένη μεθ' ὕδατος. ἐκβάλλει δὲ ἔμβρυα ἡ ῥίζα ὡς κολλύριον προσιεμένη. ἔστι δὲ καὶ θαυματικὴ ἐπιτιθεμένη ὡς τὸ λύκιον, ὑπονόμων τε ἑλκῶν ἴαμα* καὶ μάλιστα τὸ χύλισμα, καὶ ὀφθαλμῶν ἐπίχρισμα φλεγμαινόντων. μίγνυται δὲ καὶ εἰς τὰ δριμέα τῶν κολλυρίων τὸ χύλισμα ἀντὶ μηκωνίου. ἔστι δὲ καὶ ἀλφῶν σμηκτικὴ ἡ ῥίζα. χυλίζεται δὲ θλασθεῖσα καὶ βραχεῖσα ἐν ὕδατι ἐπὶ ἡμέρας ε'. εἶτα ἑψηθεῖσα ἐν τῷ ὕδατι, ἄχρις ἂν ὑπὸ χωνὶ αἱ ῥίζαι, καὶ μετὰ τὸ ψυχῆναι τὸ ὕδωρ διυθεῖται δι' ὀθονίου· καὶ ἕψεται ἄχρις ἂν γένηται μελιτώδης τῇ συστάσει. καὶ ἀποτίθεται ἐν ὀστρακίνῳ ἀγγείῳ.

Περὶ Ἀριστολοχίας στρογγύλης. Κεφ. ξ'.

Ἀριστολοχία ὀνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ δοκεῖν ἄρισα βοηθεῖν τοῖς τοκετοῖς.

Τρία

ἔστι δὲ ἡ μὲν στρογγύλη, θήλεια καλουμένη, φύλλα δὲ ἔχει κισσοειδῆ, εὐώδη μετὰ δριμύτητος, ὑποστρόγγυλα ἁπαλά, πρὸς πολλοῖς βλαστοῖς ἐκ μιᾶς ῥίζης, τὰ δὲ κλήματα ἐπιμήκη. ἄνθη λευκὰ, οἱονεὶ πλίσκης, τὸ δὲ ἐν αὐτοῖς ἐρυθρὸν, δυσῶδες.

Περὶ Αειστολοχίας μακρᾶς. Κεφ. ε.

Ἡ δὲ μακρὰ αἰστολοχία ἄρρεν καλεῖται καὶ δακτυλίτης, φύλλα ἔχουσα ὀπιμηκέστερα τῆς στρογγύλης κλωνία λεπτὰ ὡς ἀσπάραγος τὸ μέγεθος, ἄνθος πορφυροῦν, δυσῶδες, ὃ περ ἐξανθεῖσαν ἀπίῳ παραπλήσιον γίνεται. ῥίζα δὲ τῆς μὲν στρογγύλης σφαιροειδὴς γογγυλίδι ὁμοία. ἡ δὲ τῆς μακρᾶς δακτύλου ἔχει τὸ πάχος ἀσπαραγιᾶς ἢ καὶ μείζων. ἀμφότεραι δὲ τὰ πολλὰ πυξοειδεῖς ἔνδοθεν. πικραὶ καὶ πρὸς γεῦσιν καὶ βρωμώδεις.

Περὶ Αειστολοχίας κληματίτιδος. Κεφ. ς'.

Ἔστι δέ τις καὶ τρίτη μακρὰ, ἣν τινες καὶ κληματῖτιν καλοῦσι, κλωνία ἔχουσα λεπτὰ, φύλλοις ὑποστρογγύλοις ἀλίζοις μικροῦ ἐοικόσι, σφόδρα εὐώδη, ἐοικότα πισάγῳ. ῥίζας μακροτέρας, λεπτὰς, φλοιὸν ἔχούσας παχὺ καὶ ἀρωματίζοντα, ἰδίως χρησιμευούσας μυροθήκαις εἰς τὰς τῶν μύρων σύνθεσιν. ποιεῖ δὲ σφόδρα τὰ δηλα φαρμακα ἡ στρογγύλη σφόδρα

Tria eius genera tradunt. Rotũda, q̃ fœmina vocat̃, foliis hederaceis p̃stãti odore cũ acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab vna radice germinibus, p̃lõgisq; palmitib⁹: florib⁹ cãdidis, pilei similitudine, ĩ qb⁹ quod rubrũ est, grauiter olet.

Aristolochia longa. Cap. V.

Longa, mascula appellatur, nonnullis dactylitis, longiore quàm rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrãtalib⁹: flore pur pureo, grauiter olẽte, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix rotundæ, in orbẽ conglobata, rapi modo. Longæ verò radix digiti crassitudinem, & dodrãtis lõgitudinem implet, nõnunquã paulò maiorẽ. Ambæ colore int⁹ buxeo, gustu amaro, & graui.

Aristolochia clematitis. Cap. VI.

Est etiamnum tertia longa, quæ clematitis vocatur, ramulos habens tenues, refertos foliis subrotundis, minori semper viuo similibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, crasso cortice odoratóque vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris venenis resistit.

Longa verò aduersus angues, & venena, drachmæ pondere ex vino bibitur, & illinitur: pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, & omnia vuluarum onera eiicit: eadem efficit subdita in pessо. Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus, suspiriis, horroribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula extrahit, ossiú squamas illitu adimit, vlcera putrida exest, & sordida expurgat: caua cum iri, & melle explet, gingiuas, & dẽtes extergit. Clematitis ad eadem pollere credit, viribus tamẽ inferior est.

Dulcis radix. Cap. VII.

Dulcis radix pluririma gignitur in Cappadocia, & Ponto: fruticosa est, ramis binûm cubitorum altitudine assurgẽtibus: foliis lentisci densis, pinguibus, tactúq; gummosis: flore hyacinthi, fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet, rufas & paruas: radicibus longis, vt gentianæ, coloris

πρὸς δὲ τὰ ἐχπιτὰ καὶ θανάσιμα ἡ μακρά. < ά. ὁλκὴ πινομένη μετ' οἴνου καὶ καταπλασθεῖσα· καὶ τὰ ὑπ' μίσματα σωτηρίως παύει τὰ λόχια καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα ἐκβάλλει· ποθεῖται μετὰ πεπέρεως καὶ σμύρνης, καὶ ὑπὸ πεσσὸν δὲ προσφερεῖται τὰ αὐτὰ δρῶντα. ἡ δὲ στρογγύλη πιεῖ μὲν πρὸς ἃ καὶ ἡ προειρημένη· ἐπὶ πλεῖστον δὲ βοηθεῖ ἄθυμίαι, λυγμῷ, ῥίγει, ἀπλῶς ῥήγμασι, ἀποσμασιν, ἀλγήμασι πλευρᾶς· ποθεῖσα μὲν ὕδατος. ἀνάγει δὲ, καὶ σκόλοπας, ἀκίδας, λεπίδας ὀστῶν καταπλασσομένη ἀφίστησι· καὶ σπιλάδας προσαφαιρεῖται καὶ τὰ ῥυπαρὰ προσκαθαίρει ἕλκη· καὶ τὰ κοῖλα πληροῖ σὺν ἰῷ δὲ καὶ μέλιτι, σμήχει δὲ καὶ οὖλα καὶ ὀδόντας. δοκεῖ δὲ καὶ ἡ κλη-
ματῖτις πρὸς τὰ αὐτὰ πιεῖν· ἐλαττοῦται μὲν τοι τῇ δυνάμει τῶν προειρημένων.

Περὶ Γλυκυῤῥίζης. Κεφ. ζ.

Γλυκύῤῥιζα γίνεται πλείστη ἐν Καππαδοκίᾳ, καὶ πόντῳ· ἔστι δὲ θαμνίσκος, ῥάβδους ἔχων διπήχεις, πρὸς οὓς τὰ φύλλα πυκνὰ ἐοικότα σχίνῳ, λιπαρὰ καὶ κολλώδη ἁλαμυρῷ. τὸ δὲ ἄνθος ὑακίνθῳ ὅμοιον· καρπὸς δὲ πλατάνου σφαιρείων μέγεθος τραχύτερος, λοβοὺς ἔχων ὡς φακοῦ, πυρρούς, μικρούς. ῥίζαι μακραὶ, πυξοειδεῖς ὡς γλυπάνης ὑπὸ-

φυφοι,

ὑπόστρυφνοι, γλυκεῖαι· χυλιζόμεναι ὥσπερ τὸ λύκιον. ποιεῖ δὲ τὸ χύλισμα πρὸς τραχύτητας ἀρτηρίας· δεῖ δὲ ὑποτιθέντας τῇ γλώττῃ ὑποχυλίζειν· ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς καῦσον στομάχου, καὶ πρὸς τὰ ἐν θώρακι καὶ ἥπατι· ψωριάσεις τε κύστεως καὶ νεφρίτιδας πινόμενον μετὰ γλυκέως· ἄδιψόν τέ ἐστιν ἀποχυλιζόμενον, καὶ τραυματικὸν ἐγχριόμενον, καὶ στοματικὸν διαμασσώμενον. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ τῶν ῥιζῶν προσφάτως πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει. ἡ δὲ ῥίζα ξηρὰ λειοτριβηθεῖσα, πτερυγίοις καταπλαστός ἐστιν ἐπιτήδειος.

Περὶ Κενταυρίου τοῦ μεγάλου. Κεφ. η΄.

Κενταύρειον τὸ μέγα, οἱ δὲ ναρκὴν καλοῦσι, φύλλα ἔχει καρύᾳ βασιλικῇ ὅμοια, περιμήκη, χρώματι χλωρὰ ὡς κράμβης, τὸ δὲ περιφερὲς αὐτοῦ ἐντέτμηται ὥσπερ πρίων· καυλὸν δὲ ἔχει ὡς λαπάθου διπήχυν, ἢ καὶ τριπήχυν, παραφυάδας ἀπὸ τῆς ῥίζης ἔχοντα πολλάς, ἐφ' ὧν κεφαλαὶ ὅμοιαι μήκωνι, ὑπομήκεις ἐν τῷ περιφερεῖ· ἄνθος κυανίζον· καρπὸς δὲ ὅμοιος κνίκῳ, ἐγκείμενος ὥσπερ ἐν ἐριώδεσι τοῖς ἄνθεσι· ῥίζα παχεῖα, στερρὰ, βαρεῖα, περὶ πήχεις δύο, μεστὴ χυλοῦ δριμεῖα μετὰ ποσῆς στύψεως καὶ γλυκύτητος, ὑπέρυθρος*. φιλεῖ δὲ λιπαρὰν γῆν, εὐήλιον, καὶ δρυμοὺς καὶ γεώλοφα.

coloris buxei, ſubacerbis & dulcibus: quæ denſantur in ſuccum, lycij exemplo. Is in arteriæ ſcabritia efficax habetur: verum oportet vt linguæ ſubditus eliqueſcat: æſtuanti ſtomacho, thoraci, ac iocineri conuenit: ſanat veſicæ ſcabiem, & renum dolores, cum paſſo potus: idem eliquatus ſitim ſedat, vulnerib⁹ illitus accommodatur, commãducatus ori prodeſt: recẽtis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiuſdem farina pterygiis commodiſsimè inſpargitur.

Centaurium magnum. Cap. VIII.

Centaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi braſsicarum colore, ſerrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binûm aut ternûm cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerũ, in rotunditate oblonga: flos cœruleus: ſemen cnico ſimile, ceu laneis floccis quibuſdam inuolutũ: radix craſſa, grauis, ſolida, tripedalis, ſucco prægnans, cum adſtrictione aliqua & dulcedine acris, & rubeſcens. Amat ſolũ pingue & apricũ, ac ſyluas & colles. Co-

pioſiſsima eſt in Lycia & Pelo ponneſo, in Arcadia, Helide & Meſſenia, pluribúsq; locis circa Pholoën, Lyciã & Smyrnam. Radix cõuenit ruptis, cõuulſis, pleuriticis, ſpirãdi difficultati, veteri tuſsi: ſanguinẽ expuentibus, drachmis duab⁹ trita datur, ſi febris ſit, in aqua: cæteris, in vino. Item ad tormina, & vuluæ dolores. Raméta eius in collyrij formam vuluæ ſubdita, mẽſes atque partus extrahũt. ſuccus eadem præſtat: vulneribus prodeſt: nam recẽs tuſa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coaleſcũt, ſi tuſa ſimul decoquatur. In Lycia ſuccũ expri munt, quo pro Lycio vtuntur. Cognominata eſt & panacea, quoniã medeť oĩm morbis, vbi aliqua inflãmatio timeť, omninoq; multis modis opifera eſt. Illiſa vulnerũ labra cõſolidat, ſuſtillũ vrinæ calculósq; ſanat iniectione. legenda præcipitur cũ in eo ſol eſt, vt emergat hora pura: dum lucẽ ſyderis erũpẽtis vniuerſa complentur.

Centaurium minus.

Cap. IX.

Centauriũ, limneſion aliqui vocauere, qm̃ rigua amet loca. Herba origani aut hyperici ſimilis

λοφα· πλεονάζει δὲ ἐν λυκίᾳ καὶ πελοποννήσῳ, ἐν ὄρεσι καὶ ὑγροῖς τόποις καὶ μεσογείᾳ καὶ περὶ φολόην καὶ λυκίαν καὶ σμύρνῃ. Ἁρμόζει δὲ ῥίζα, ῥήγμασι, ἀποσπάσμασι, πλευριτικοῖς, δυσπνοίᾳ, βηχὶ παλαιᾷ· αἱμοπτοϊκοῖς ἀπυρέτοις μετ' οἴνου· πυρέσσουσι δὲ μὴ ὕδατος ⊲ β'. πλῆθος τῆς ῥίζης λείας δίδομένης· πρὸς φθόους ὁμοίως καὶ ὑστέρας ἀλγήματα. ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα εἰς χῆμα κολλυείᾳ ξυθεῖσα καὶ περιτεθεῖσα τῇ ὑστέρᾳ· ὅ, τι χυλὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· ἔστι δὲ καὶ βαυματικὴ· ὑγρὰ μὲν χοπεῖσα ξηρὰ δὲ περιβρεχεῖσα καὶ οὕτω χοπεῖσα. συνάγει γὰρ καὶ κολλᾷ καὶ τὰ ἐλκώματα δὲ κρέα συνάγει. ἐὰν τις αὐτῷ κόψας συνδήσῃ· οἱ δὲ ἐν λυκίᾳ αὐτῷ χυλίζοντες, χρῶνται αὐτῇ ἀντὶ λυκίου. ἐκλήθη δὲ παράκλησις, ἐπειδὴ πάντα τὰ φλεγμαίνοντα παύει, καὶ κρούσματα πληγῶν, γραγγουείας τε παύει ἐν ἡμέραις καὶ λιθιῶντας. συνάγεται δὲ τοῦτο ὑλίου μέλλοντος ἀνατέλλειν, ὥρᾳ ἀγρῇ ὅτε πλημμυροῦσι πάντα.

Περὶ Κενταυρείου τοῦ μικροῦ. Κεφ. θ'.

Κενταύριον τὸ μικρὸν, ὅ τινες λιμναῖον καλοῦσιν, ἐπιφυὲς ἐν ὑγροῖς φιλεῖ τόποις. πόα ὑφορικὴ ὁ ὁμοιο-

γαίῳ

γαίω παραπλήσιός ὅτι, χλωρὸν ἔχουσα τὸν στέλεχον γόνιον μέλαν· αὔξη δὲ τῷ φοινικῷ ὑποπέφυκε πρὸς τὰ τῆς λυχνίδος· φύλλα μικρά· * ὑπόμικκη ὥσπερ πηγάνου· καρπὸς ὅμοιος πύξῳ· ῥίζα μικρὰ ἄχρηστος λεία*. Αὕτη κοπεῖσα χλωρὰ καὶ καταπλασθεῖσα, τραύματα ὑγιῆ κολλητική, ἀναξηραντικὴ ἑλκῶν παλαιῶν καὶ ἀπουλωτική· ἀφεψηθεῖσα δὲ καὶ καταπιγομένη, ἄγει κατὰ κοιλίαν χολάδη καὶ παχέα. ἔγκλυσμά τε τὸ ἀφέψημα αὐτῆς ὀπὶ τῶν ἰσχιαδικῶν ἀρμόδιον· ἄγον αἷμα καὶ κουφίζον. ὁ δὲ χυλὸς πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ σύχρηστος· ἀποχαλάσας τὰ ὑπισχνούμενα τῆς κόρης συὸ μέλιτι· καὶ ὑπὸ πρόσθετον ἐμπλαθὲν ἀγωγὸς καὶ ἐμβρύων· πεθεὶς δὲ ἁρμόζει τοῖς πρὸ τὰ νεῦρα πάθεσιν ἰδίως. Χυλίζεται δὲ ἡ πόα συλλεγομένη ἐγκύμων ὅσα σπέρματος, καὶ ἀπὸ ἑξαχοῦ ἡμέρας ἑ. εἶτα ἕψε) ἕως ἂν ὑπερέχοι τὸ ὕδωρ. ἔπειτα τοῦτο ψυχθέντος, ὑλίζεται δ' ὀθονίῳ θλιβείσης τὸ πόας καὶ πάλιν ἕψεται μέχρι μελιτώδους συστάσεως. ἔνιοι δὲ χλωρὰν ἐγκύμονα αὐτὴν κόψαντες, ὑπθλίβουσι τὸν χυλὸν καὶ βαλόντες εἰς κεραμεοῦν ἀγγεῖον ἀκόνιτον, ὑπὸ ἡλίῳ συρίφοισι κινοῦντες ἀεὶ ξύλῳ.

similis, caule anguloso, palmũ excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuream vergẽtæ: foliis rutę, prælõgis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui & superuacua, quæ gustanti amaritudiné adfert. Herba recens tusa, suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrice obdũcit: bilem crassósque humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conueniẽtissimè infunditur: trahit enim sanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquàm vtilis: siquidem cũ melle caliginem oculorum expurgat: in vellere appositus, menses & partus extrahit: epotus peculiariter neruorum vitiis succurrit. Succi extrahendi ratio: Legitur herba semine prægnans, & diebus quinque madefacta decoquitur, donec superemineat aquæ: mox vbi refrixit, linteolo exprimitur, & iecta herba, iterum decoquitur, vsque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eã recentem grauidáq; cõtundunt, atq; succum fictili non picato exprimũt, & in sole, lignea rude assiduè mouẽtes, inspissant.

Quòd si quid cõcretũ faucib⁹ vasis adhæresçat, deradũt, reliquoq; humori pmiscét. Noctu diligẽter operiũt: nãq; ros nocturn⁹, liquores coalescere nõ sinit. Quæ aũt siccis radicibus aut herbis liquamẽta exprimũtur, decocta (vt in gẽtianæ mẽtione retulim⁹,) pparant: sed q̃ ex corticib⁹ humidis, aut cõtusis herbis factitãtur, in sole, vti antè dictũ est: coguntur. Sic è thapsia, sic è mãdragora, reliquisq; similibus succus: sic ex acerbis vuis melligo elicitur. Lyciũ tamen, & absinthiũ, hypocistis & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

καὶ τὸ ἀεὶ πεπιεσμένον ἀεὶ ξύοντες καὶ τῷ ὑγρῷ μίσγοντες. σκεπάζοντές τε νυκτὸς ἐπιμελῶς· ἡ γὰρ δρόσος καλυπτικὴ τῆς τῶν ὑγρῶν χυλῶν συμπάσεως κατέστηκεν. ὅσα μὲν οὖν ἐκ ξηρῶν τῶν ῥιζῶν ἢ τῶν βοτανῶν ἐγχυλίζεται, ἑφθὰ σκευάζεται, ὡς ἡ ὑπτιανή· ὅσα δὲ ἐκ φλοιῶν ὑγρῶν ἢ ῥιζῶν ἢ βοτανῶν ἐνθλιβόμενα ἐν ἡλίῳ, συμφέροντα ὡς πρόειρται. οὕτω καὶ ἡ θαψία καὶ μανδραγόρα καὶ ὄμφακες· καὶ τὰ ὅμοια τούτοις χυλίζεται. λύκιον μέν τοι καὶ ἀψίνθιον καὶ ὑποκιστὶς καὶ τὰ ὅμοια τούτοις ἑφθὰ, συμφέροντα ὃν τρόπον πρόειρται.

Chamæleon albus.

Cap. X.

Chamæleon albus, ixia ideo aliquibus vocatur, quòd quibusdam in locis viscum circa radicem eius inueniatur, quo pro masticbe vtuntur mulieres: folia habet silybo aut carduo similia, asperiora, acutiora, nigróque chamæleone validiora: caulé non promit, verũ ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit: flores purpureos, veluti papporũ lanugines emittit: semen cnici simile: radicẽ i lętis collib⁹ crassam, in mõtosis verò graciloré. in

Περὶ Χαμαιλέοντος λευκοῦ. Κεφ. ι'.

Χαμαιλέων λευκὸς, ἰξία διὰ τοῦτον καλεῖται, διὰ τὸ ἔν τισι τόποις ἰξὸν εὑρίσκεσθαι περὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ, ᾧ καὶ αὐτὴ μαστίχῃ χρῶνται αἱ γυναῖκες· ἔχει φύλλα ὅμοια σιλύβῳ ἢ σκολύμῳ, βραχύτερα δὲ καὶ ὀξύτερα καὶ ἰσχνότερα τοῦ μέλανος· καυλὸν δὲ οὐκ ἔχει, ἀλλ' ἀφίησιν ἐκ τοῦ μέσου ἀκανθαν, ὁμοίαν ἐχίνῳ θαλασσίῳ ἢ κινάρᾳ· αὔξεται δὲ περιφερὴς ὥσπερ τείχας ἐκπαππωμένας· καρπὸν δὲ κίκι παραπλήσιον· ῥίζαν ἐν μὲν τοῖς εὐγείοις χαλκόφοις παχεῖαν, ἐν δὲ τοῖς ἐρημοῖς ἰσχνοτέραν λευκὴν

λευκὴν διὰ βάθους, ὑπαρωματίζουσαν, βαρύοσμον, γλυκεῖαν. ἡ πιοθεῖσα * ὀξυδάφου φλοῦδος, ἄγει ἕλμινθα πλατεῖαν. λαμβάνεται δὲ σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ μετὰ ὀρεινοῦ ἀποζέματος, καὶ ὑδρωπικοῖς δὲ ἐπιτηδείως δίδοται ὀλκὴ σὺν οἴνῳ * ἰσχναίνει γὰρ αὐτούς· καὶ πρὸς δυσουρίαν τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πίνεται. ἔστι δὲ καὶ θηριακὴ σὺν οἴνῳ ποθεῖσα· ἀποκτείνει καὶ κύνας καὶ ὗς· καὶ μύας σὺν ἀλφίτῳ πεφυραμμένη, καὶ ὑδρωπιῶν διαθεῖσα.

Περὶ Χαμαιλέοντος μέλανος. Κεφ. ια.

Χαμαιλέων μέλας, καὶ αὐτὸς τοῖς φύλλοις σκολύμῳ ἔοικεν. ἐλάττονα μέντοι καὶ λεπτότερα· καὶ διέρυθρα ἔχει ταῦτα· χυλὸν δὲ αὐτοῦ δακτύλου τὸ πάχος, ἀποθαμιαῖον, ὑδρωπικὸν· ἔχον σιάλου καὶ αὖθις ἀκανθώδη λεπτὰ, ὑακινθίζοντα ποικίλα· ῥίζα ὃ πεχεῖα, μέλαινα, πυκνὴ, ἐνίοτε δὲ καὶ βεβρωμένη, ἐμπιοθεῖσα δὲ ὑποξάνθους, διαμαυοῖ θεῖσα δακτυλιόφυτα δὲ ἐν πεδίοις ξηροῖς καὶ βωνώδεσι τόποις καὶ παραθαλασσίοις. Δύναται δὲ ἡ ῥίζα λεία μιγνύτος αὐτῇ χαλκάνθου ὀλίγου καὶ κεδρίνου ἐλαίου καὶ ὀξυγγίου φῶρας ἐξάγειν· σημεῖον δὲ καὶ λευχεῖας θεῖον καὶ ἄσφαλτον περισταλεῖσα, καὶ σωθεῖσα ὄξει καὶ κατακριθεῖσα, διαλε-

in profundo albam: aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcẽ. Quæ pota acetabuli mẽsura, latas interaneorũ tineas pellit. Bibitur autẽ in vino austero, cũ origani feruefacti succo. Hydropicis cómodissimè drachma in vino datur, etenim eos extenuat: cótra difficultatẽ vrinę decoctũ ꝑpinat. Hausta in vino, serpentiũ venenis resistit: occídit canes & sues: mures item necat, subacta cũ poléta aut aqua, & oleo madefacta.

Chamæleon niger.

Cap. XI.

Chamæleon niger, foliis scolymo similis esset, nisi minora, tenuioráque, ac rubro distincta viderentur: caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in vmbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores: radice crassa, nigra, densa, interdũ excesa, quæ dissecta flauescit, & commãducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atraméti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axũgia, scabiẽ abigit: eadẽ, cũ sibi sulphur & bitumẽ asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget.

Deco-

Decoctum collutione détium dolorem mitigat: cum pari pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, détes fouentur: eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruens admoueatur: vitia cutis in facie vitiliginesque cum sulphure emendat: erodentibus medicamentis admiscetur: phagedænas, tetráq; vlcera illitu sanat. Quare chamæleo vocetur, à varietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hîc viridia, illic albicantia, aliubi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

διακλυζόμενον δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτὸ ὀδοντα λίας παύει· μεθ' ἴσου ᾧ πεπέρεως καὶ κηρῷ τριπλασιονμένη τοῖς λήγουσιν ὀδοῦσι βοηθεῖ. καὶ πυριῶν ᾧ δ' αὐτὸ οἱ ὀδόντες, καθυφιέμενοι σὺν ὄξει καὶ καταντλούμενοι θερμαινόμενόν τε διὰ χαλκείου θρυπτει τῷ λήγοντι ὀδόντι, θρύπτει αὐτόν· ἔφηλιν δὲ ἀποκαθαίρει καὶ λήψιος μετὰ θείου· μίγνυται ᾧ τοῖς δυνάμεσι τῶν σπλάγχνων. καὶ τὰ φαγαδαινικὰ ἕλκη καὶ τὰ τεθνεωμένα καταπλασθέντα, αὐασπεύαζοῦσα θεραπεύει. ὀνόμασται δὲ χαμαιλέων, διὰ τὸ ποικίλον τῶν φύλλων· εὐρίσκεται γὰρ ἡ λία χλωρὰ τὰ τοιαῦτα, ἡ μὲν ὑπόλευκα, ἡ κυανοειδῆ, ἡ ἐρυθρὰ, παρὰ τὰς τῶν τόπων διαφοράς.

Crocodilium. Cap. XII.

Crocodilion chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, læui, aliquantum lata, odore, vt nasturtij, acuto. Feruecta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex vti scutũ, quod suapte vi vrinam ciet.

Περὶ Κροκοδειλίου. Κεφ. ιε'.

Κροκοδείλιον ὅμοιόν ἐστι τῷ μέλανι χαμαιλέοντι. φύεται δὲ ἐν τόποις δρυμώδεσι, ῥίζαν ἔχον μακρὰν, εὐαφρὰν, * ὑποπλατυν, ὀσμὴν δριμεῖαν, ὁμοίως καρδάμῳ. Ἰσχύει ᾧ ἡ ῥίζα ζεσθεῖσα ἐν ὕδατι καὶ πινομένη, ἄγειν πολὺ αἷμα διὰ ῥωθώνων. δίδοται δὲ καὶ σπληνικοῖς ἐναργῶς ὠφελοῦσα. καὶ τὸ σπέρμα αὐτῆς, δλουρητικῆς, ὑπάρχει δυνάμεως. σπείρεται δὲ καὶ ἁπλοῦν ὡς ἀπὸ κήπου.

Dipsacum, siue labrum Veneris. Cap. XIII.

Dipsacum aculeatarum generis est: caulem habet altum, spinis,

Περὶ Διψάκου. Κεφ. ιγ'.

Δίψακος τῶν ἀκανθωδῶν ἐστι καὶ αὐτὸ· καυλὸν δὲ ἔχει ὑψηλόν. ἀκαν-

ἀκανθώδη, καὶ φύλλα περιειληφότα τὸν καυλὸν, ἐμφερῆ πρίσταχι, δύο καθ' ἕκαστον γόνυ, τεθραμμένη, ἀκανθώδη καὶ αὐτά. ὥσπερ πινὰς πομφόλυγας ἐπὶ μέσης τῆς ῥάχεως, ἔσωθέν τε καὶ ἔξωθεν ἔχοντα ἀκανθώδεις, * κοιλίδας δὲ περὶ τὰ δύο μέρη τῶν φύλλων ὥς τε ὕδατα ἀπὸ τῶν δρόσων καὶ τῶν ὄμβρων* συλλέγειν· ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα εἴληχεν. ἐπ' ἄκρου δὲ τῆς καυλοῦ καθηκάσης ἀπόφυσιν, κεφαλὴ μία ἐοικυῖα ἐλάφῳ, ὑποδύσκις ἀκανθώδεις· ξηρανθεῖσα δὲ λευκὴ φαίνεται. ἔχει δὲ καὶ σκωλήκια κατὰ μέσην τὴν ἐντεριώνην διαπεφυκότα ἡ κεφαλή. Ἡ ῥίζα ᾗ ταύτης ζωὴ οἴνῳ ἀφεψηθεῖσα, καὶ κοπεῖσα,* κηρωτῆς λαβοῦσα πάχος, τοὺς ἐν* δακτυλίῳ ῥαγάδας καὶ σύεργας ἐντιθεμένη θεραπεύει. ἀποπίνεται δὲ δεῖ τὸ φάρμακον εἰς χαλκῆν πυξίδα. φασὶ δὲ καὶ μυρμηκιῶν αὐτὸ καὶ ἀκροχορδόνων ἴαμα εἶναι. οἱ δὲ τῆς κεφαλῆς σκώληκες εἰς κυσίδα ἐνδεδόμενοι καὶ περιαπτόμενοι τεταρταίοις θεραπεύειν.

Περὶ Ἀκάνθας λευκῆς. Κεφ. ιδ'.

Ἀκανθα λευκὴ φύεται ἐν ὄρεσι καὶ ὑλώδεσι τόποις· φύλλα ἔχουσι χαμαιλέοντι λευκῷ ἐμφερῆ, στενώτερα δὲ καὶ λευκότερα, ὑποδύσεα, ἀκανθώδη· καυλὸν ὑπὲρ δύο πήχεις, spinis horridum, foliis lactucæ, spinosis, binis genicula singula complectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: vnde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectáque medulla tenus, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasque, si tusa & decocta in vino radix, vsque dú sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamẽtum ærea pyxide recondendum. Aiunt formicationibus, verrucísque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorũ in follicu lo alligati, collo aut brachio appẽsi, prodúntur quartanis febri bus reme dio esse.

Spina alba. Cap. XIIII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis angustiora, & cá didiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita

cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine: albicanté, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, stomachicis, & iis qui cruenta extussiunt, efficax est: vrinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen cóuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica. Cap. XV.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterásque fluxiones radix etiamnum valet. Prouenit in asperis.

Carduus. Cap. XVI.

Carduus, Græci scolymon vocant, folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora: caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso: radice nigra, & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiúsque corporis emendat: item

πάχεις, δακτύλου τὸ μεγάλου ἢ ἐλάσσονος πάχος, ὑπολευκὸν, κοῖλον ἔνδοθεν, ἐπ' ἄκρου δὲ αὐτῆς κεφαλὴ σφαιροειδὴς ἀκανθώδης, ἐλάχιστα θαλασσίῳ ἐμφερὴς, πλὴν ἐλάσσων καὶ ὑπομέλας· ἄνθη πορφυρᾶ, ἐν οἷς τὸ σπέρμα ὡς κνίκος, στρογγυλώτερον δέ. Ταύτης ἡ ῥίζα πινομένη, πιεῖ πρὸς ἀμυσποίκους, στομαχικοὺς, κοιλιακοὺς· οὖρά τε κινεῖ, καταπλάσσεται δ' πρὸς οἰδήματα. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς πρὸς ὀδοντάλγιαν ποιεῖ διακλυζόμενον. τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον, παιδίοις σπωμένοις βοηθεῖ, καὶ ἐρπετοδήκτοις. φασὶ δὲ ὅτι φεύγουσιν ἐξ αὐτῆς θηρία διώκει.

Περὶ Ἀκάνθης ἀραβικῆς. Κεφ. ιέ.

Ἀκανθα ἀραβικὴ ἐοικυῖα τῇ φύσει εἶναι δοκεῖ τῇ λευκῇ ἀκάνθῃ· στύφουσα. καὶ πρὸς ῥοῦν γυναικεῖον καὶ πρὸς ἀναγωγὰς αἱμάτος καὶ πρὸς τοὺς ἀνίους ῥευματισμούς ἡ ῥίζα, περιπλασσόμενα εὐθετεῖ.

Περὶ Σκολύμου. Κεφ. ις'.

Σκόλυμος φύλλα ἔχει χαμαιλέοντος καὶ τὰ λευκῆς ἀκάνθης λεγομένης, μελανώτερα δὲ καὶ παχύτερα· καυλὸν ἀνίησι μακρόν. φύλλων φύλλαν, ἐφ' ἧς κεφαλὴ ἀκανθώδης· ῥίζα δ' ὕπεισι μεγάλη παχεῖα, ἧς δύναμις ποιεῖ πρὸς τοὺς ἔχοντας ταῖς μαλάξαις, καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα λυσῶδες καταπλασσομένη. καὶ ἀ-

καὶ ἀφεψηθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ πινομένη. ἄγει δὲ οὖρα πολλὰ καὶ δυσώδη. ἡ δὲ πόα ἁρπαγὴς οὖσα, λαχανεύεται ἐφθὴ ὥσπερ ἀσπάραγος.

Περὶ Ποτηρίου.

Κεφ. ιζ'.

Ποτήριον, ἴωνες δὲ νευράδα καλοῦσι, θάμνος ὑπὲρ μέγας, πλόκους ἔχων μαλακοὺς, μαλακοὺς, ἰμαντώδεις, λεπτοὺς, ἐμφερεῖς τραγακάνθῃ, φύλλα μικρὰ, ὠφελιμα, ὄλος δὲ ὁ θάμνος περίκειται λεπτῷ χνοῦ ἐειδόν, καὶ ἔστιν ἀκανθώδης, ἄνθη μικρὰ, λευκὰ, καρπὸν δὲ καὶ σπερμὰ, ἄχρηστον. φύεται ἐν ἑλώδεσι καὶ χειμάρροις χωρίοις. ῥίζαι δὲ ὑπέρεισι πήχεων δύο ἢ τριῶν, ἰσχυραὶ, νευρώδεις· αἱ πρὸς τῇ γῇ ἀποτμηθεῖσαι, αἱμάσσουσι δάκρυον κόμμει ὅμοιον. κοπεῖσαι δὲ καὶ ἐπιπλασθεῖσαι νεύροις διακοπὰς καὶ τραύματα κολλῶσι· καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς πινόμενον, ταῖς περὶ νῶτα διαθέσεσιν ἁρμόζει.

Περὶ Ἀκανθίου. Κεφ. ιη'.

Ἀκάνθιον ἐμφερὲς τὰ φύλλα ἔχει τῇ λευκῇ ἀκανθῃ, ἐπ' ἄκρῳ δὲ ἀκανθώδεις ἔχοντας, οὗ συλλεγομένου καὶ ὑφ' ἓν πτυσσομένου, βαμβακοειδὴς γίνεται. ταύτης ἡ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα, ὀπισθοτονικοῖς βοηθεῖ πινόμενα.

Περὶ

item si decocta, in vino bibatur. Copiosam autem vrinam fœtidámque expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium. Cap. XVII.

Poterium, Iones neurada vocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridũ, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: foliis paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binûm ternúmve cubitorum, neruosas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tusæ, præcisis neruis & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

Acanthium. Cap. XVIII.

Acanthium albæ spinæ simile, foliis aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis) ex qua collecta & neta, vestes bombicinis similes texunt. Folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

Acan-

Acanthus. Cap. XIX.

Acanthus, Romani pæderotam vocant. nascitur in hortis, petrosis, & riguis: folia habet multo lactucaceis latiora, & lõgiora, erucæ diuisura, nigricantia, pinguia, læuia: caulem binûm cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope verticẽ ex interuallis circundatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ vstis igni & luxatis artubus illitæ subueniũt: potæ vrinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè prosunt.

Acanthus sylvestris. Cap. XX.

Nascitur & sylvestris acanthus, scolymo similis, aculeat⁹, breuior quàm satiuus, & is qui in hortis, puenit: cuius radix ad eadẽ ad quę superior efficax.

Anonis. Cap. XXI.

Anonis, quam aliqui anonida appellant, ramos habet fruticosos, dodrantales, aut paulò maiores, frequẽtibus geniculis cinctos, cauis alarũ multis capiti-

Περὶ Ἀκάνθης. Κεφ. ιθ'.

Ἀκανθα, ἢ ἑρπάκανθα.* φύεται ἐν παραδείσοις, καὶ ἐν πεδιάδεσι, καὶ παρύγρειος χωρίοις· ἔχει δὲ φλατύτερα φύλλα πολλῷ καὶ μακρότερα θριδακος, ἐλαιώδη ὡς τὰ τῆ εὐζώμου ὑπομέλανα, λιπαρὰ, λεῖα· καυλὸν λεῖον, δίπηχυν, πάχος δακτύλου, ἐκ διαστημάτων περὶ τὴ κορυφὴ περιειλημμένον φυλλαρίοις οἷον κισσαρίοις κατωμίκεσιν, ἀκανθώδεσιν, ἐξ ὧν τὸ ἄνθος περίεστι λευκόν· σπέρμα κατόμικες, μήλινον· ῥιζοειδὴς δὲ ἡ κεφαλή. ῥίζαι δὲ ὕπεισι γλίσχραι, μυξώδεις, ἔμπυροι, μακραί· αἱ πινες πυευκώσεις καὶ ῥήγμασιν αἱμόῤῥοις καταπλασσόμεναι· πινόμεναι δὲ οὔρεσι ἄγουσι, καὶ κοιλίαν ἱστᾶσι.* φθίσικοῖς τε καὶ ῥήγμασι καὶ σπάσμασιν ἐυθετοῦσιν.

Περὶ Ἀγρίας ἀκάνθης. Κεφ. κ'.

*Γίνεται δὲ καὶ ἀγρία ἄκανθα, ὁμοία σκολύμῳ, ἀκανθώδης, βραχυτέρα τῆς ἐν παραδείσοις καὶ ἡμίσεος· διώκεται δὲ καὶ ἡ ταύτης ῥίζα ὅσα καὶ ἡ τοῦ ἀνθοῦς.

Περὶ Ἀγανίδος. Κεφ. κά.

Ἀγανὶς, οἱ δὲ, ὀνωνίδαν καλοῦσι, κλῶνες ἀπὸ μέσου καὶ μείζονες, θαμινοειδεῖς, πολυγόνατοι, μαχόλας ἔχοντες πολλὰς, κεφά-

λαι

λια περιφερῆ, φυλλάρια μικρὰ, λεπτὰ, ὥσπερ φακοῦ, πρὸς τὰ τοῦ πηγάνου ἢ λωτοῦ τοῦ ἐν χορτοκοπείοις, ὑπόδασεα, εὐώδη, οὐκ ἀηδῶς ὄζοντα. ἁλμεύεται δὲ πρὸ τοῦ ἀκανθοφυῆσαι· καὶ ἔστιν ἡδίστη. ἔχουσι δὲ οἱ κλάδοι ἀκάνθας ὀξείας, σκολοποειδεῖς, στερεάς· * ῥίζαν δὲ λευκὴν, θερμαντικὴν, *λεπτυντικήν· ἧς ὁ φλοιὸς πινόμενος σὺν οἴνῳ, οὖρα ἄγει καὶ λίθους θρύπτει, ἐσχάρας περιρρήπτει. ἀφεψηθεῖσα δὲ ἐν ὀξυκράτῳ καὶ διακλυζομένη, πόνον ὀδόντων πραΰνει.*

Περὶ Λευκακάνθης. Κεφ. κβ.

*Λευκάκανθα, ταύτης ἡ ῥίζα ὁμοία κυπείρῳ, πικρὰ, ἰσχυρὰ, ἥτις μασηθεῖσα, ὀδονταλγίας παραμυθεῖται. τὸ δὲ ἀπόζεμα αὐτῆς σὺν οἴνῳ κυάθων τριῶν ποθὲν, βοηθεῖ πλευριτικοῖς χρονίοις, καὶ ἰσχιαδικοῖς, ῥήγμασι, σπωμένοις, καὶ τὸ χυλῶδες δὲ τῆς ῥίζης, τὰ αὐτὰ ποιεῖ πινόμενον.

Περὶ Τραγακάνθας. Κεφ. κγ.

Τραγάκανθα· ῥίζα ἐστὶ πλατεῖα καὶ ξυλώδης, φαινομένη δὲ καὶ ὑπὲρ γῆς, ἀφ' ἧς κλάδοι ταπεινοὶ, ἰσχυροὶ, χεόμενοι δὲ ἐπιπολὺ, καὶ ἐπ' αὐτῶν φυλλάρια πολλὰ μεταξὺ λεπτὰ ἀκάνθας ἔχοντα ἐγκρυπτομένας τοῖς φύλλοις, * λευκὰς, ἰσχυ-

pitibus rotundis, foliis lenticulæ, tenuibus, pusillis, ad rutę aut pratẽsis loti folia accedẽtibus, subhirsutis, odoratis, nõ iniucundè olentibus. Muria cõditur, antequã spinosa fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrẽt: radicẽ mittit candidam, quæ excalfacit, & extenuat: huius cortex ex vino potus, vrinã ciet: calculos cõminuit, margines vlcerum erodit. Radix cũ decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu hęmorrhoidas sanare creditur.

Leucacantha. Cap. XXII.

Leucacantha prædita est radice cyperi, valida & amara quæ mãducata dolorem dentium sedat: veteri laterũ dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino poto. Eadẽ ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdẽ præbet effectus.

Tragacantha. Cap. XXIII.

Tragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, vnde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spinas albas, rectas;

rectas & firmas occulunt. Est etiamnum tragacantha, lachryma: quæ, vulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, læuis, syncera & subdul[illegible]. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. Huius increbuit vsus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, cæterásque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque linguę liquescit, & in passo madefacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, mixto cornu cerui vsto & eloto, aut scissi aluminis momento.

ἰσχυρὰς, ὀρθάς. ἔστι δὲ ἡ τραγάκανθα, δάκρυον τῆς ῥίζης ἀποτμηθείσης ἐπισυνιστάμενον, ἧς διαφέρει ἡ διαυγὴς καὶ λεία καὶ ἰσχνὴ καὶ καθαρὰ καὶ ὑπόγλυκυς. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁμοίαν κόμμει παρεμπλαστικήν. χρῆσις δ' αὐτῆς εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, καὶ πρὸς βῆχας, καὶ πρὸς τὰς περὶ ἀρτηρίαν τραχύτητας, καὶ φωνῆς ἀποκοπὰς, καὶ ἐπισταγμοὺς ἐν ἐκλεικτῷ σὺν μέλιτι· ἀποχυλίζεται δὲ ὑποτεθεῖσα τῇ γλώσσῃ, καὶ πίνεται δὲ ἀποβραχεῖσα ἐν γλυκεῖ < ά. πλῆθος, πρὸς νεφρῶν ὀδύνην καὶ κύστεως δῆξιν, μιγνύντος αὐτῇ κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου, ἢ στυπτηρίας σχιστῆς ὀλίγης.

Eryngium. Cap. XXIIII.

Eryngium aculeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale condita, in cibos recipiuntur. lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica. Sed vbi adoleuerũt circa cõplures cauliũ eminentias in spinas aculeãtur. in quorũ summitatibus globosa capitula, durarũ acutissimarúmque spinarũ ambitu stellatim circũuallantur, quorũ colos aliâs viridis, aliâs albus: interdũ cœruleꝰ inuenitur. Radix oblõga, lata, foris nigra, internè cãdida, pollicis crassitudine, odorata.

Nasci-

Περὶ Ἠρυγγίου. Κεφ. κδ'.

Ἠρύγγιον τῶν ἀκανθωδῶν ἐστιν, ἧς ἐν ἀρχῇ τὰ φύλλα λαχανεύεται εἰς δὲ ἁλίας συντιθέμενα. ἔστι δὲ πλατέα, *τραχέα τοῖς πέριξ, ἀρωματίζοντα τῇ γεύσει, αὐξανόμενα δὲ ἀκανθοῦνται κατὰ πλείονας ἐξοχὰς καυλῶν, ἐφ' ὧν κατὰ τὰ ἄκρα κεφάλια ἐστὶ σφαιροειδῆ, ἀκάνθας περικείμενα ὥσπερ ἀστὴρ ὀξυτάτας κύκλῳ, σκληρὰς, ὧν τὸ χρῶμα χλωρὸν ἢ λευκὸν, ἐνίοτε δὲ καὶ κυανοῦν εὑρίσκεται. ῥίζα δὲ ὑπομήκης, πλατεῖα, μέλαινα κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἔνδοθεν λευκὴ, δακτύλου μεγάλου τὸ πάχος, καὶ αὐτὴ εὐώδης καὶ ἀρωματίζουσα.

φύεται

φύεται δὲ ἐν πεδίοις καὶ τραχέσι τόποις. Δύναμιν δ' ἔχει θερμαντικήν· * πινομένη ἄγει καὶ οὖρα καὶ ἔμμηνα, στρόφοις τε καὶ ἐμπνευματώσεις λύει· ἡπατικοῖς δὲ καὶ θηριοδήκτοις, καὶ θανάσιμον εἰληφόσιν, ἁρμόζει σὺν οἴνῳ. πίνεται δὲ πρὸς τὰ πλεῖστα σὺν σταφυλίνου σπέρματι, < ά. τὸ πλῆθος. ἱστορεῖται δὲ ὅτι περιαπτομένη καὶ καταπλασσομένη, φύματα διαφορεῖ. ῥίζα δὲ αὐτῆς πινομένη μεθ' ὑδρομέλιτος, ὀπισθοτονικοὺς ἰᾶται καὶ ἐπιληπτικούς.

Περὶ Ἀλόης. Κεφ. κέ.

Ἀλόη φύλλον ἔχει σκύλλῃ παραπλήσιον, παχὺ λιπαρὸν, ὑπόπλατυ, περιφερὲς, εἰς τοὐπίσω* κλώμενον, παρ' ἑκάτερα δὲ τὰ μέρη ἔχει τὰ φύλλα ἐκ πλαγίων ἀκανθώδη, ἀραιῶς ἐξέχοντα, κολοβά, καυλὸν δὲ ἀνίησιν ἀνθερικῷ ὅμοιον· ἄνθος δὲ λευκόν· καὶ καρπὸν ἀσφοδέλῳ ἐοικότα, βαρύοσμος δὲ ὅλη, καὶ ἀπογευομένῳ πικροτάτη· ἔστι δὲ μονόρριζος ὥσπερ πάσσαλον ἔχουσα τὴν ῥίζαν. γεννᾶται δὲ ἐν τῇ Ἰνδίᾳ πλείστη λιπαρά, ἐξ ἧς καὶ τὸ ὄπισμα κομίζεται. φύεται δὲ καὶ ἐν Ἀραβίᾳ καὶ Ἀσίᾳ, καὶ ἔν τισι παραθαλασσίοις τόποις καὶ νήσοις, ὡς ἐν Ἄνδρῳ οὐκ εὔχρηστος εἰς ὀπισμὸν, πρὸς δὲ κόλλησιν τραυμάτων ἐπιτήδειος, λεία καταπλασσομένη.

διπλῆ

Nascitur in asperis & campestribus. Vim habet calfactoriam: pota menses & vrinas pellit, tormina inflationésque discutit: contra iocinerum vitia, serpentiũ morsus, & hausta venena, cũ vino prodest. Bibitur aduersus plurima cũ seminis pastinacæ drachma vna: appensa illitáve, tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus medetur.

Aloë. Cap. XXV.

Aloës folium scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latũ, rotũdũ, retrorsus pandũ: folia vtrinq; ex obliquo longioribus interuallis striantur, & in spinulas desinunt retusas truncásq;. Caulis emittitur nõ dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regiæ cognatus: graui tota est odore, & gustu amarissima: radice vna, ceu palo, in terrã depacta. Plurima præpinguísq; in India gignitur, ex qua coact⁹ succ⁹ adfertur. Nascit̃ etiã in Asia & Arabia, ĩ locis q̃busdã maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè, q̃ vtilis, si detrita illinatur.

t Duo

Duo ſuo ſucci genera: quoddã arenoſum, quod ſedimentũ puriſsimæ eſſe videtur. Alterũ ad iocineris imaginẽ vergit. Eligi debet, ſyncera, quæ nihil doli ſenſit, nitida, calculorũ expers, rufi coloris, friabilis, ac iocineris modo coacta, facile liqueſcens, eximię amaritudinis: improbatur nigra & fractu cõtutumax. Gummi eam adulterãt: quod deprehenditur guſtu, amaritudine, & valido odore: eóq; argumento, quòd digitis friata non ad minima vſq; fruſta reſoluitur. Nec deſunt qui acaciã immiſceant. Natura eius eſt ſpiſſare, exiccare, ſomnũ allicere, & corpora denſare, aluum reſoluere. Stomachũ repurgat binûm cochleariũ mẽſura, in aqua frigida aut egelida pota: ſanguinis reiectiones ſiſtit: regiũ morbũ purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmę põdere in potu: deuorata cum reſina, aut cũ aqua, vel melle cocto ſumpta, aluũ ſoluit: purgationis perfectę cauſa, tribus drachmis ſumif: aliis purgatoriis medicaminibus admiſta præſtat vt minus ſtomachũ infeſtent: ſicca glutinãdis vulneribus inſpargitur, vlcera ad cicatricẽ perducit, cohibetque: eadem

διπλῆν δέ ἐστι τὸ εἶδος τοῦ χυλίσματος· τὸ μὲν τοι ψαμμῶδες, ὃ πρὸς ὑποσάθμην τῆς καθαρωτάτης ἔοικεν εἶναι· τὸ δὲ, ἡπατίζον. ἐκλέγου δὲ τὸν καθαρὸν καὶ * ἄβδελον καὶ ἄλιθον, σίλλουσαν, ὑποξάνθου, εὐθρυπτον, ἡπατίζουσαν, ῥᾳδίως ὑγρανομένην, ἐπιτεταμένῳ τῇ πικρίᾳ· τὸν μέντοι μέλανα καὶ δυσκάτακτον ἀπεκλέγου. δολίζουσι δὲ αὐτὸν κόμμει· ὃ πρὸς ἐλέγχεται γεύσει καὶ πικρίᾳ καὶ ὀσμῆς ἐπιτάσει· καὶ τῷ μὴ διαλύεσθαι μέχρις ἐλαχίστου ῥήγματος θλιβόμενον ὑπὸ τῶν δακτύλων. ἔνιοι δὲ καὶ ἀκακίαν μίσγουσι. Δύναμιν δ' ἔχει συστατικὴν, ὑπνωτικὴν, ξηραντικὴν, πυκνωτικὴν τῶν σωμάτων, κοιλίας τε λυτικὴν, καὶ στομάχου ἀποκαθαρτικὴν, κοχλιαρίαν ζ'. πλῆθος, μεθ' ὕδατος ψυχροῦ, ἢ γαλακτόδοις πεπομένη· αἵματός τε ἀναγωγὰς ἐπέχει. καὶ ἴκτιρον ἀποκαθαίρει, μεθ' ὕδατος πεπωκόλου, ἢ < ἀ. ὀλκῆς ἐν ποτῷ, καὶ μετὰ ῥητίνης δὲ καταπινομένη ἢ ὕδατος ἢ μέλιτος ἑφθοῦ αὐαλγηφθεῖσα κοιλίαν λύει· δραχμῶν δὲ πεπῶν πλῆθος πολείους καθαίρει· μιγὲν δὲ τοῖς ἄλλοις καθαρτικοῖς, ἧσσον αὐτὰ κακοστόμαχα ποιεῖ, ξηρὸν δὲ ἐπιπλαθὲν, τραύματα κολλᾷ, καὶ ἐπουλοῖ ἕλκη καὶ καταστέλλ-

αἱδῖα

παιδία δὲ εἰλκωμένα ἰδίως θεραπεύει, καὶ ἐπαγώγια παίδων ῥηχθέντα παρακολλᾷ. θεραπεύει δὲ καὶ καυδυλώματα καὶ ῥαγάδας χειρωνῶν σὺν γλυκεῖ οἴνῳ· αἱμορραγίας τε ἴσχει τὰς ἐξ αἱμορροΐδων, καὶ πτερύγια ἀπουλοῖ, αἴρει τὰ φλυκτίδια καὶ ὑπώπια σὺν μέλιτι· φλεγμονὰς ἀφθαλμίας τε καὶ ἀκανθῶν κνησμοὺς παρηγορεῖ· καὶ καφαλγίαν μεθ' ὄξους καὶ ῥοδίνου, μετώπῳ καὶ κροτάφοις ἐπιχριόμενον· ἐπέχει καὶ ῥεύσεις τείχας ζωὺ οἴνῳ· καὶ οὖλα παιδία δὲ καὶ οὖλα, καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ στόματι ἁρμόζει σὺν μέλιτι καὶ οἴνῳ· φάγεντα ὑπὸ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ἐπὶ καθαρεῦ καὶ διαπύρου ὀρόκου, μεταβαλλόμενον ὑγρῷ, μέχρις ἂν ὁμαλῶς πυρωθῇ. σλωύεται δὲ χωνευομένου τῷ ψαμμώδους ὡς ἀχρήστου, * λαμβανομένου δὲ τῷ λεπαρωτάτου, καὶ λείου.

eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimásque sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita ex melle tollit: priuatim scabras lippitudines, prurigínesq; angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cũ melle & vino proficit: oculorum medicamentis torretur, in munda & cádenti testa, pennáque subinde versatur, vt possit æqualiter torreri. Lauatur, vt quod sit arenosissimũ, tanquã inutile subsidat, & leue ac pinguissimũ assumatur.

Περὶ Ἀψινθίου. Κεφ. κϛ'.

Ἀψίνθιον, βαθύπικρον, γνώριμος ἡ πόα. ἔστι δὲ αὐτῆς βρῶπιον τὸ ἐν Πόντῳ καὶ Καππαδοκίᾳ, ἐν ὄρει τῷ καλουμένῳ ταύρῳ γινόμενον. Δύναμιν δὲ ἔχει θρυπτικὴν, συμπιλητικὴν, καὶ ἀποκαθαρτικὴν τῶν ἐμπεκτόντων στομάχου καὶ κοιλίας χολωδῶν. ἔστι δὲ καὶ ἀρτηριῶν καὶ ἀκραίπαλον, ὑποπτυόμενον. καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις δὲ ἁρμόζει, καὶ κοιλίας καὶ στο-

Abſinthium. Cap. XXVI.

Abſinthium, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita: Præſtantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro naſcitur. Vim habet calfaciẽdi & adſtringendi: bilem expurgat, quæ & ſtomacho & ventri inhæſit: vrinam cit, & crapulam præſumptum arcet. Ad inflationes ventris, & ſtoma-

chi dolores prodest, cum seseli & nardo gallico potum: fastidia discutit, & arquatos sanat madefacti dilutum, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cum vino, item cicutæ, & muris aranei morsibus, & draconi marino. Anginæ eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorum caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriúmque dolores decoctum vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordiis & iocineris, tritum cum cerato cyprino stomacho quoque longa valetudine laboranti, cum rosaceo: cum ficis autē, aceto & loliacea farina, aquæ intercutē lienosisq; subuenit. Vinú ex eo fit, quod absinthen vocāt, præsertim in Propontide & Thracia, quoad ante dicta vtú tur, cū febri carent: alioquin in æstate, ppinãt, & acceptã huic vino incolumitatem referunt.

Inspar-

καὶ στομάχου ἀγήματα, πινόμενον μὲν στεάλεως ἢ ναρδου κελτικῆς· καὶ ἀνορεξίας καὶ ἰκτερικοὶς θεραπεύει, τὸ ἀπόβρεγμα αὐτῆς ἢ τὸ ἀφέψημα, καθ' ἑκάστην ἡμέραν λαμβανόμενον εἰς πλῆθος κυάθων βι- 5
ῶν· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα, πινόμενόν τε καὶ προσθέμενον μετὰ μέλιτος. πρὸς δὲ τὸν ἀπὸ μυκήτων πνιγμὸν, ἁρμόζει σὺν ὄξει πινόμενον, ζωῇ οἴνῳ δὲ πρὸς ἰξίαν καὶ κώνειον καὶ μυγαλῆς δήγματα, καὶ δράκοντα θα- 10
λάσσιον. σὺν ἁλὶ χλιοῖς δὲ διάχρισμα ζωῇ μέλιτι καὶ νίτρῳ καὶ πρὸς ἐπινυκτίδας σὺν ὕδατι. πρὸς δὲ ὑπώπια ζωὸν μέλι, καὶ πρὸς ἀμβλυωπίας, καὶ πρὸς ἐκχεῦντα ὅτα ὁμοίως. καὶ ὁ ὑπὲρ μισμὸς δ' αὐτῆς 15
δὲ ἀφέψημα πρὸς ὀδοντάλγιαν καὶ ὀδονταλγίαν. ἀφεψόμενόν τε σὺν γλυκεῖ, κατάπλασμα ὀφθαλμῶν θερμοδυνώντων ὠφελεῖ· καὶ ἁπλάστους δὲ καὶ πρὸς ὕσπορόδρια, καὶ ὕπαρ 20
καὶ στόμαχον ἐπιζυῶ καὶ χρονίως πάσχοντα, συνεκλειαινόμενον κηρωτῇ κυπρίνῃ· πρὸς δὲ στόμαχον ῥοδίνῃ· ἁρμόζει καὶ ὑδρωπικοῖς, καὶ σπληνικοῖς. μετὰ τῶν αὐτῷ σύκων, καὶ νίτρου, καὶ αἰρίνης ἀλεύρου. Σκευάζεται δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ οἶνος ὁ λεγόμενος ἀψίν- 25
θιτης, μάλιστα μὲν πρὸ τῆς Προποντίδα καὶ Θράκην, ᾧ πρὸς τὰ προγεγραμμένα χρῶνται ἐν ἀπυρεξίᾳ· καὶ δηλῶσαι δὲ, προπίνουσι ἐξ αὐτοῦ θέρους ὑγείας ποιητικὸν εἶναι νομίζοντες.

δοκεῖ

δοκεῖ δὲ καὶ ἐκπλαπόμενον εἰς τὰς κιβωτοὺς ἄβρωτα τηρεῖν τὰ ἱμάτια. διεφθορόμενόν τε μὴ ἐλαίῳ, κώνωπας κωλύειν ἀπέχεσθαι τοῦ σώματος· τὸ δὲ μέλαν ᾧ χράφουσιν, ἄβρωτα μισεῖ τηρεῖ τὰ γράμματα. ἔοικε δὲ καὶ τὸ τῆς χυλίσματος σῆγα τηρεῖν τὰ αὐτά. πλὴν εἰς τὰς πόσεις οὐ δοκιμάζομεν αὐτὸ, καχοστόμαχον καὶ κεφαλαλγὲς ὄν. τὸ δὲ χύλισμα ἀμύσῃ ἐψηθεῖσα καὶ μιγνυμένη δολοῦσί τινες.

Inſparſum arcis abſinthiũ, veſtes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium eroſione tuetur. Exiſtimatur liquamẽtum eoſdem præſtare effectus. Attamen potionibus improbatur, quoniã ſtomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui decocta amurca, liquamentum adulterant.

Περὶ Ἀψινθίου θαλασσίου.

Κεφ. κζ'.

Marinum abſinthium.

Cap. XXVII.

Ἀψίνθιον θαλάσσιον τινὲς δὲ καὶ σεύφιον καλοῦσι, ἔφυ πλεῖστον ἐν τῷ περὶ καππαδοκίαν τιμήεντι ὄρει γίνεται, καὶ ἐν ταφοσίρει τῆς αἰγύπτου· ᾧ αὐτὶ θαλλῷ οἱ ἰσιακοὶ χρῶνται. ἔστι δὲ ἡ πόα λεπτόκαρφος, ἐοικυῖα ἀβροτόνῳ μικρῷ, σπερμαπλοΐς σπερματίων, ὑποπικρος, καχοστόμαχος, βαρύοσμος, σύφουσα μετὰ ποσῆς θερμασίας· ἥ τις ἐψηθεῖσα καθ' ἑαυτὴν, ἢ μετὰ ὀρύζης καὶ λαφθεῖσα μετὰ μέλιτος, ἀσκαρίδας καὶ ἕλμινθας τροχύλας κτείνει, ὑπάγουσα κοιλίαν κούφως· δυνάται δὲ καὶ ζωὴ ἐψήματι, ἢ φακῇ καθεψηθεῖσα τὰ αὐτὰ ποιεῖν. λιπαίνεται δὲ μάλιστα τὰ σεσηπότα νεμόμενα.

Inſparſum arcis abſinthiũ, veſtes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium eroſione tuetur. Exiſtimatur liquamẽtum eoſdem præſtare effectus. Attamen potionibus improbatur, quoniã ſtomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui decocta amurca, liquamentum adulterant.

Περὶ Ἀψινθίου θαλασσίου.

Marinum abſinthium.

Κεφ. κζ'.

Cap. XXVII.

Ἀψίνθιον θαλάσσιον τινὲς δὲ καὶ σεύφιον καλοῦσι, ἔφυ πλεῖστον ἐν τῷ περὶ καππαδοκίαν τιμήεντι ὄρει γίνεται, καὶ ἐν ταφοσίρει τῆς αἰγύπτου· ᾧ αὐτὶ θαλλῷ οἱ ἰσιακοὶ χρῶνται. ἔστι δὲ ἡ πόα λεπτόκαρφος, ἐοικυῖα ἀβροτόνῳ μικρῷ, σπερματίων, ὑποπικρος, καχοστόμαχος, βαρύοσμος, σύφουσα μετὰ ποσῆς θερμασίας· ἥ τις ἐψηθεῖσα καθ' ἑαυτὴν, ἢ μετὰ ὀρύζης καὶ λαφθεῖσα μετὰ μέλιτος, ἀσκαρίδας καὶ ἕλμινθας τροχύλας κτείνει, ὑπάγουσα κοιλίαν κούφως· δυνάται δὲ καὶ ζωὴ ἐψήματι, ἢ φακῇ καθεψηθεῖσα τὰ αὐτὰ ποιεῖν. λιπαίνεται δὲ μάλιστα τὰ σεσηπότα νεμόμενα.

Abſinthium marinum, quod aliqui ſeriphum vocant, copioſiſsimum in Tauro monte iuxta Cappadociam & in Taphoriſi Ægypti gignitur: quo Iſiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba eſt tenuis, abrotoni parui ſimilitudine, referta minutulis ſeminibus, ſubamara, ſtomacho inimica. Ea grauiter olet, & cum quadam calfactione adſtringit: per ſeſe aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretéſque tineas, adiecto melle, enecat, aluum leuigat: cum edulio autẽ vel lenticula decocta, eadem præſtare poteſt. Pecora maximè pinguescunt hoc pabulo.

Decoctum collutione détium dolorem mitigat: cum pari pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, détes fouentur: eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruens admoueatur: vitia cutis in facie vitiliginesque cum sulphure emendat: erodentibus medicamentis admiscetur: phagedænas, tetráq; vlcera illitu sanat. Quare chamæleo vocetur, à varietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hîc viridia, illic albicantia, aliubi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

διακλυζόμενον δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆ ὀδοντα λίας παύῃ· μετ' ἴσου δ' πεπέρεως καὶ κηροῦ τεθλασμένη τοῖς μιγῆσιν ὀδοῦσι βοηθεῖ. καὶ πυριῶν δ' δ' αὐτῆ αἱ ὀδόντες, καθιμηθείσης σὺν ὄξει καὶ καταπλησθείσης θερμαινομένη τὲ διὰ χαφείου θλασθεῖσα τῷ μιγῆντι ὀδόντι, θρύπτει αὐτόν· ἔφηλιν δὲ ἀποκαθαίρει καὶ λήψεις μετὰ θείου· μίγνυ δ' τοῖς δυνάμεσι τὸ σπόδιον. καὶ τὰ φαγαδαινικὰ ἕλκη καὶ τὰ τεθηπειωμένα καταπλασθεῖσα, ἀναπεκάζουσα θεραπεύει. ὀνόμασται δὲ χαμαιλέων, διὰ τὸ ποικίλον τῶν φύλλων· εὑρίσκεται γὰρ ἔν λίαν χλωρὰ τὰ τοιαῦτα, ἔν ὑπόλευκα, ἔν κυανοειδῆ, ἔν ἐρυθρὰ, παρὰ τὰς τῶν τόπων διαφοράς.

Crocodilium. Cap. XII.

Crocodilion chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, læui, aliquantum lata, odore, vt nasturtij, acuto. Feruecta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex vti scutũ, quod suapte vi vrinam ciet.

Περὶ Κροκοδειλίου. Κεφ. ιϛ'.

Κροκοδείλιον ὅμοιόν ἐστι τῷ μέλανι χαμαιλέοντι. φύεται δὲ ἐν τόποις δρυμώδεσι, ῥίζαν ἔχον μακρὰν, ἁπαλὴν, *ὑποπλατυ, ὀσμὴν δριμεῖαν, ὁμοίως καρδάμῳ. Ἰσχύει δ' ἡ ῥίζα ζεσθεῖσα ἐν ὕδατι καὶ πινομένη, ἄγειν πολὺ αἷμα διὰ ῥωθώνων. δίδοται δὲ καὶ σπληνικοῖς εὐαρίστως ὠφελοῦσα. καὶ τὸ σπέρμα αὐτῆς, διουρητικῆς, ὑπάρχει δυνάμεως. τεθραμμένος δ' καὶ ἁπλοῦς ὡς ἀπό.

Dipsacum, siue labrum Veneris. Cap. XIII.

Dipsacum aculeatarum generis est: caulem habet altum, spinis,

Περὶ Διψάκου. Κεφ. ιγ'.

Δίψακος τῶν ἀκανθωδῶν ἐστι καὶ αὐτὴ· καυλὸν δὲ ἔχει ὑψηλόν.

ἀκαν-

ἀκανθώδη, καὶ φύλλα περιληφότα τὸν καυλὸν, ἐμφερῆ πρίδακι, δύο καθ' ἕκαστον γόνυ, περιμήκη, ἀκανθώδη καὶ αὐτά. ὥσπερ πινὰς πτεμφόλυγας ὑπὸ μέσης τῆς ῥάχεως, ἔσωθέν τε καὶ ἔξωθεν ἔχοντα ἀκανθώδεις, * κοιλίδας δὲ ποιεῖ τὰ δύο μέρη τῶν φύλλων ὥς τε ὕδατα ἀπὸ τῶν δρόσων καὶ τῶν ὄμβρων* συλλέγειν· ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα εἴληχεν. ἐπ' ἄκρου δὲ τῶ καυλοῦ καθέκάστην ἀπόφυσιν, κεφαλὴ μία ἐοικυῖα ἐχίνῳ, ὑπομήκης ἀκανθώδεις· ξηραινθεῖσα δὲ λευκὴ φαίνεται. ἔχει δὲ καὶ σχιζὰς κατὰ μέσην τὴν ἐντειώνην διαιρεθεῖσα ἡ κεφαλή. Ἡ ῥίζα ᾗ ταύτης ζωὸ οἴνῳ ἀφεψηθεῖσα, καὶ κοπεῖσα,* κηρωτῆς λαβοῦσα πάχος, τοὺς ὑπ* ἀκτυλίῳ ῥαγάδας καὶ σύεγγας ἐπιθεμένη θεραπεύει. ἀποπήγνυται δὲ δεῖ τὸ φάρμακον εἰς χαλκῆν πυξίδα. φασὶ δὲ καὶ μυρμηκιῶν αὐτὸ καὶ ἀκροχορδόνων ἴαμα εἶναι. οἱ δὲ τῆς κεφαλῆς σκώληκες εἰς κυνίδα ἐνδεδόμενοι καὶ περιαπτόμενοι τραχήλῳ ἢ βραχίονι, ἰσχυρῶς τιτραπαίοις θεραπεύειν.

Περὶ Ἀκανθας λευκῆς. Κεφ. ιδ'.

Ἀκανθα λευκὴ φύεται ἐν ὄρεσι καὶ ὑλώδεσι τόποις· φύλλα ἔχουσα χαμαιλέοντι λευκῷ ἐμφερῆ, στενώτερα δὲ καὶ λευκότερα, ὑποδάσεα, ἀκανθώδη· καυλὸν ὑπὲρ δύο πήχεις, spinis horridum, foliis lactucæ, spinosis, binis genicula singula complectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: vnde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula sur culis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectáque medulla tenus, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasque, si tusa & decocta in vino radix, vsque dū sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamētum ærea pyxide recondendum. Aiunt formicationibus, verrucísque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorū in follicu lo alligati, collo aut brachio appēsi, produntur quartanis febri bus remedio esse.

Spina alba. Cap. XIIII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis angustiora, & cā didiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita

cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine: albicanté, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, stomachicis, & iis qui cruenta extussiunt, efficax est: vrinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen cõuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica.

Cap. XV.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterásque fluxiones radix etiamnum valet. Prouenit in asperis.

Carduus. Cap. XVI.

Carduus, Græci scolymon vocant, folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora: caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso: radice nigra, & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiúsque corporis emendat: item

πήχεις, δακτύλου τὸ μεγάλε ἢ κὴ μείζονος πάχος, κοίλευκὸν, κωὸν ἔνδοθεν, ἐπ' ἄκρου δὲ αὐτῦ κεφαλὴ φέρεται ἀκανθώδης, ἐχίνῳ θαλασσίῳ ἐμφερὴς, πολὺ ἐλάσσων κὴ κοσμιώτερος· αὐθη πορφυρᾶ, ἐν οἷς τὸ σπέρμα ὡς κνίκος, στρογγυλώτερον δέ. Ταύτης ἡ ῥίζα πινομένη, ποιεῖ πρὸς αἱμοπτοϊκοὺς, στομαχικοὺς, κοιλιακοὺς· οὖρά τε κινεῖ, καταπλάσσεται † πρὸς οἰδήματα. κὴ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς πρὸς ὀδοντα λγίαν ποιεῖ διακλυζόμενον. τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον, παιδίοις σπωμένοις βοηθεῖ, κὴ ἐρπετοδήκτοις. φασὶ δὲ ὅτι φυλακτὸν ἐξ αὐτῆς θηρία φεύγει.

Περὶ Ἀκάνθης ἀραβικῆς. Κεφ. ις.

Ἀκανθα ἀραβικὴ ἐοικυῖα τὴν φύσιν εἶναι δοκεῖ τῇ λευκῇ ἀκάνθῃ· σύφουσα. κὴ πρὸς ῥοῦν γυναικεῖον κὴ πρὸς ἀναγωγὴν ἁμάλος κὴ πρὸς τοὺς μῆνας ῥευματισμοὺς ἡ ῥίζα, παραπλησίως ἐνδοτέα.

Περὶ Σκολύμου. Κεφ. ιζ.

Σκόλυμος φύλλα ἔχει χαμαιλέοντος κὴ τὰ λευκῆς ἀκάνθης λεγομένης, μελανώτερα ὄ κὴ παχύτερα· καυλὸν ἀγίνοτ' μακρόν. σέλινλε ων φύλλων, ἐφ' ᾧ κεφαλὴ ἀκανθώδης· ῥίζα ὄ ὕπεστι μέγαινα παχεῖα, ἧς δύναμις ποιεῖ πρὸς τοὺς ἔχοντας τὰς μασχάλας, καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα δυσώδεις καταπλασσομένη.

κὴ ἀ-

καὶ ἀφεψηθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ πινομένη. ἄγει δὲ οὖρα πολλὰ καὶ δυσώδη. ἡ δὲ πόα ἀρπφυὴς οὖσα, λαχανεύεται ἐφθὴ ὥσπερ ἀσπάραγος.

Περὶ Ποτηρίου.

Κεφ. ιζ'.

Ποτήριον, ἴωνες δὲ νευράδα καλοῦσι, θάμνος ὑπὲρ μέγας, κλῶνας ἔχων μαλακοὺς, μαλακοὺς, ἱμαντώδεις, λεπτοὺς, ἐμφερεῖς τραγακάνθῃ, φύλλα * μικρὰ, σπαρτῷ. ὅλος δὲ ὁ θάμνος σπείκεται * λεπτὸν χροιῶ ἐειδὴ, καὶ ἔστιν ἀκανθώδης, αὐτὴ μικρὰ, λευκὴ, καρπὸν δὲ * καὶ σπερμιὸν, ἄχρηστον. φύεται ἐν ἑλώδεσι καὶ χεμαλόφοις χαμαίοις. ῥίζαι δὲ ὑπεστι πήχεων δύο ἢ τριῶν, ἰσχυραὶ, νευρώδης· αἱ πᾶσαι πρὸς τῇ γῇ ἀποπεπηθεῖσαι, αὐτίκα δάκρυον κόμμει ὅμοιον. κοπεῖσαι δὲ καὶ ἐπιπλασθεῖσαι νεύροις διακοπὰς καὶ τραύματα κολλῶσι· καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς πινόμενον, ταῖς περὶ νεῦρα διαθέσεσιν ἀμύζει.

Περὶ Ακανθίου. Κεφ. ιη'.

Ακάνθιον ἐμφερὲς τὰ φύλλα ἔχει τῇ λευκῇ ἀκανθῃ, ἐπ' ἄκρῳ δὲ ἀκανθώδεις ἐξοχὰς, * οὗ συλλεχθέντος καὶ ὑφ' ἓν πεπτωμένου, βαμβακοειδὴς * γίνεται. τούτου ἡ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα, ὀπισθοτονικοῖς βοηθεῖ πινόμενα.

Περὶ

item si decocta, in vino bibatur. Copiosam autem vrinam fœtidámque expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium. Cap. XVII.

Poterium, Ioues neurada vocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridú, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: foliis paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binûm ternúmve cubitorum, neruosas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tusæ, præcisis neruis & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

Acanthium. Cap. XVIII.

Acanthium albæ spinæ simile, foliis aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis) ex qua collecta & neta, vestes bombicinis similes texunt, folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

Acan-

Acanthus. Cap. XIX.

Acanthus, Romani pæderotam vocant. nascitur in hortis, petrosis, & riguis: folia habet multo lactucaceis latiora, & lõgiora, erucæ diuisura, nigricantia, pinguia, læuia: caulem binûm cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope verticẽ ex interuallis circundatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ vstis igni & luxatis artubus illitæ subueniũt: potæ vrinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè prosunt.

Περὶ Ακάνθης. Κεφ. ιθ'.

Ακανθα, ἣ ἑρπάκανθα.* φύεται ἐν παρεδρείοις, καὶ ἐν πετρώδεσι, καὶ παρύχροις χωρίοις· ἔχει δὲ πλατύτερα φύλλα πολλῷ καὶ μακρότερα θριδακος, ἐχινώδη ὡς τὰ τοῦ ἐυζώμου ὑπομέλανα, λισπαδῆ, λεῖα· κωλὸν λεῖον, δίπηχυν, πάχος δακτύλου, ἐν διαστήμασι πρὸς τῇ κορυφῇ περιειλημμένον φυλλαρίοις ποὶν, οἱονεὶ κισσαρίοις ὑπομήκεσιν, ἀκανθώδεσιν, ἐξ ὧν τὸ ἄνθος περίεται λευκόν· σπέρμα ὑπόμηκες, μήλινον· δυσοσμὸς δὲ ἡ κεφαλή. ῥίζαι δὲ ὕπεισι γλίσχραι, μυξώδεις, ἔμπυροι, μακραί· αἱ τῶν πνευμώδεις καὶ τρέμμασιν αἱ μίζουσι καταπλασσόμεναι· πινόμεναι δὲ οὖρα ἄγουσι, καὶ κοιλίαν ἱστᾶσι.* φθισικοῖς τε καὶ ῥήγμασι καὶ ἀποσπάσμασιν ὠφελοῦσιν.

Acanthus sylvestris. Cap. XX.

Nascitur & sylvestris acanthus, scolymo similis, aculeatæ, breuior quàm satiuus, & is qui in hortis, puenit: cuius radix ad eadẽ ad quę superior efficax.

Περὶ Ἀγρίας ἀκάνθης. Κεφ. κ'.

*Γίνεται δὲ καὶ ἀγρία ἄκανθα, ὁμοία σκολύμῳ, ἀκανθώδης, βραχυτέρα τῆς ἐν παρεδρείοις καὶ ἡμέρου· διώσατι δὲ καὶ ἡ ταύτης ῥίζα ὅσα καὶ ἡ παρὰ αὐτῆς.

Anonis. Cap. XXI.

Anonis, quam aliqui anonida appellant, ramos habet fruticosos, dodrantales, aut paulò maiores, frequẽtibus geniculis cinctos, cauis alarũ multis capiti-

Περὶ Ανωνίδος. Κεφ. κά.

Ανωνις, οἱ δὲ, ὠνωνίδα καλοῦσι, κλῶνες ἀπὸ ῥιζαίου καὶ μείζονες, θαμνοειδεῖς, πολυγόνατοι, μασχάλας ἔχοντες πολλὰς, κεφά-

λια

λια περιφερῆ, φυλλάρια μικρὰ, λεπτὰ, ὥσπερ φακοῦ, περὶ τὰ τοῦ πηγάνου ἢ λωτοῦ τοῦ ἐν χερρονήσῳ, ὑποδάσεα, ἐυώδη, οὐκ ἀηδῆ ὄζοντα. ἁλμεύεται δὲ περὶ τοῦ ἀνατροφῆσαι· καὶ ἔστιν ἡδύσμα. ἔχουσι δὲ οἱ κλάδοι ἀκάνθας ὀξείας, σκολοπειδεῖς, τετραγώνους· * ῥίζαν δὲ λευκὴν, θερμαντικὴν, *λεπτομερικὴν· ἧς ὁ φλοιὸς πινόμενος συὶ οἴνῳ, οὖρα ἄγει καὶ λίθους θρύπτει, ἐμμήνους περιῤῥήγνυσι. ἀφεψηθεῖσα δὲ ἐν ὀξυκράτῳ καὶ διακλυζομένη, πόνον ὀδόντων παύει.*

Περὶ Λευκακάνθης. Κεφ. κβ΄.

*Λευκάκανθα, ταύτης ἡ ῥίζα ὁμοία κυπείρῳ, πικρὰ, ἰσχνὴ, ἥτις μασηθεῖσα, ὀδοντιλγίας παραμυθεῖται. τὸ δὲ ἀπόζεμα αὐτῆς οἴνῳ κυάθων τριῶν πόθεν, βοηθεῖ πλευριτικοῖς χρονίοις, καὶ ἰσχιαδικοῖς, ῥήγμασι, κατωθρόοις, καὶ τὸ χυλῶδες δὲ τῆς ῥίζης, τὰ αὐτὰ ποιεῖ πινόμενον.

Περὶ Τραγακάνθης. Κεφ. κγ΄.

Τραγάκανθα· ῥίζα ἔστι πλατεῖα καὶ ξυλώδης, φαινομένη δὲ καὶ ὑπὲρ γῆς, ἀφ' ἧς κλάδοι ταπεινοί, ἰσχνοὶ, χόμβωσι δὲ ἐπιπολὺ, καὶ ἐπ' αὐτῶν φυλλάρια πολλὰ μεταξὺ λεπτὰ ἀκάνθας ἔχοντα ἐγκεκομβωμένας τοῖς φύλλοις, * λευκὰς, ἰσχνὰς

pitibus rotundis, foliis lenticulæ, tenuibus, pusillis, ad rutę aut pratēsis loti folia accedētibus, subhirsutis, odoratis, nō iniucundè olentibus. Muria cōditur, antequā spinosa fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrēt: radicē mittit candidam, quæ excalfacit, & extenuat: huius cortex ex vino potus, vrinā ciet: calculos cōminuit, margines vlcerum erodit. Radix cū decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu hęmorrhoidas sanare creditur.

Leucacantha. Cap. XXII.

Leucacantha prædita est radice cyperi, valida & amara quæ māducata dolorem dentium sedat: veteri laterū dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino poto. Eadē ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdē præbet effectus.

Tragacantha. Cap. XXIII.

Tragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, vnde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spinas albas, rectas,

rectas & firmas occulunt. Eſt etiamnum tragacantha, lachryma: quæ, vulnerata radice manans, concreuit. Præſtat pellucens, gracilis, læuis, ſyncera & ſubdulcis. Cutis ſpiracula, vt gummi, obſtruit. Huius increbuit vſus ad oculorum medicamenta, ad tuſsim, exaſperatas fauces, retuſas voces, cæteráſque deſtillationes, cum melle in delinctu: ſubdita quoque linguę liqueſcit, & in paſſo madefacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & veſicæ roſiones, mixto cornu cerui vſto & eloto, aut ſciſſi aluminis momento.

Eryngium. Cap. XXIIII.

Eryngium aculeatarum generis eſt. Cuius folia in principio, ſale condita, in cibos recipiuntur. lata autem ſunt, & extremo ambitu aſpera, guſtu aromatica. Sed vbi adoleuerũt circa cõplures cauliũ eminentias in ſpinas aculeãtur. in quorũ ſummitatibus globoſa capitula, durarũ acutiſsimarúmque ſpinarũ ambitu ſtellatim circũuallantur, quorũ colos aliâs viridis, aliâs albus: interdũ cœrule⁹ inuenitur. Radix oblõga, lata, foris nigra, internè cãdida, pollicis craſsitudine, odorata. Naſci-

ἰσχυράς, ὀρθάς. ἔστι δὲ ἡ τραγάκανθα, δάκρυον τῆς ῥίζης ἀποτμηθείσης ἐπισυνιστάμενον, ἧς διαφέρει ἡ διαυγὴς καὶ λεία καὶ ἰσχνὴ καὶ καθαρὰ καὶ ὑπόγλυκυς. δύναμιν δὲ ἔχει ὁμοίαν κόμμει πόρων ἐμπλαστικήν. χρῆσις δ' αὐτῆς εἰς τὰ ὀφθαλμικά, καὶ πρὸς βῆχας, καὶ πρὸς τὰς περὶ ἀρτηρίαν τραχύτητας, καὶ φωνῆς ἀποκοπάς, καὶ ἐπισταγμοῖς ἐν ἐκλεικτῷ σὺν μέλιτι· ἀποχυλίζεται δὲ ὑποτεθεῖσα τῇ γλώσσῃ, καὶ πίνεται δὲ ἀποβραχεῖσα ἐν γλυκεῖ < α. πλῆθος, πρὸς νεφρῶν ὀδύνην καὶ κύστεως δῆξιν, μιγνύντος αὐτῇ κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου, ἢ στυπτηρίας σχιστῆς ὀλίγης.

Περὶ Ἠρυγγίου. Κεφ. κδ'.

Ἠρύγγιον τῶν ἀκανθωδῶν ἐστιν, ἧς ἐν ἀρχῇ τὰ φύλλα λαχανεύεται εἰς δὲ ἅλας συντιθέμενα. ἔστι δὲ πλατέα, *τραχέα τοῖς πέριξ, ἀρωματίζοντα τῇ γεύσει, αὐξανόμενα δὲ ἀκανθοῦνται κατὰ πλείονας ἐξοχὰς καυλῶν, ἐφ' ὧν κατὰ τὰ ἄκρα κεφάλια ἐπὶ σφαιροειδῆ, ἀκάνθας περιεχόμενα ὥσπερ ἀστὴρ ὀξυτάτας κύκλῳ, σκληράς, ὧν τὸ χρῶμα χλωρὸν ἢ λευκόν, ἐνίοτε δὲ καὶ κυανοῦν εὑρίσκεται. ῥίζα δὲ ἐπιμήκης, πλατεῖα, μέλαινα κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἔνδοθεν λευκή, δακτύλου μεγάλου τὸ πάχος, καὶ αὐτὴ εὐώδης καὶ ἀρωματίζουσα. φύεται

φύεται δὲ ἐν πεδίοις καὶ τραχέσι τόποις. Δυνάμεως ἔχει θερμαντικῆς.* πτορμῶν ἄγει καὶ οὖρα καὶ ἔμμηνα, γρόφους τε καὶ ἐμπνευματώσεις λύει· ὑπατικοῖς δὲ καὶ σπειροδήκτοις, καὶ θανάσιμον εἰληφόσιν, ἀφ' ὑδρει ζωὸ οἴνῳ. πίνεται δὲ πρὸς τὰ πλεῖστα ζωὸ σταφυλίνου σπέρματι, < ἀ. τὸ πλῆθος. ἱστορεῖται δὲ ὅτι θεριακοποιῶν καὶ καταπλασσόμενον, φύματα διαφορεῖ. ῥίζα δὲ ἀυτῆς πινομένη μετὰ ὑδρομέλιτος, ὀπισθοτονικοῖς ἴαται καὶ ἐπιληπτικοῖς.

Περὶ Αλόης. Κεφ. κέ.

Αλόη φύλλον ἔχει σύλληπαρεμπλήσιον, πλὴν λεπαρὸν, στόματα, θεμφερῆς, εἰς τὸ ὑπίσω* κλώμενον, παρ' ἑκάτερα δὲ τὰ μέρη ἔχει τὰ φύλλα ὐκ πλαγίων ἀκανθώδη, ἀραιῶς ἐξέχοντα, κολοβὰ, χωλὸν δὲ ἀνίσου αὐθεικῷ ὅμοιον· αὐθος δὲ λευκόν· καὶ καρπὸν ἀσφοδέλῳ ἐοικότα, βαρύοσμος δὲ ὅλη, καὶ ἀπογευομένῳ πικροτάτη· ἔστι δὲ μονόῤῥιζος ὥσπερ πάστιλον ἔχουσα τὴν ῥίζαν. γινᾶται δὲ ἐν τῇ Ινδίᾳ πλείστη λιπαρὰ, ἐξ ἧς καὶ τὸ ὄπισμα κομίζεται. φύεται δὲ καὶ ἐν ἀραβίᾳ, καὶ ἔν τισι παραθαλασσίοις τόποις καὶ νήσοις, ὡς ἐν αὐδρῷ οὐκ εὔχρηστος εἰς ὄπισμον, πρὸς δὲ κόλλησιν βαμμάτων ἐπιτήδειος, λείαι καταπλασσόμενον.

Nascitur in asperis & campestribus. Vim habet calfactoriam: pota menses & vrinas pellit, tormina inflationésque discutit: contra iocinerum vitia, serpentiũ morsus, & hausta venena, cũ vino prodest. Bibitur aduersus plurima cũ seminis pastinacæ drachma vna: appensa illitáve, tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus medetur.

Aloë. Cap. XXV.

Aloës folium scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latũ, rotũdũ, retrorsus pandũ: folia vtrinq; ex obliquo longioribus interuallis striantur, & in spinulas desinunt retusas truncásq;. Caulis emittitur nõ dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regiæ cognatus: graui tota est odore, & gustu amarissima: radice vna, ceu palo, in terrã depacta. Plurima præpinguísq; in India gignitur, ex qua coacta succo adfertur. Nascit etiã in Asia & Arabia, ĩ locis q̃busdã maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè, q̃ vtilis, si detrita illinatur:

Duo ſuo ſucci genera: quoddã arenoſum, quod ſedimentũ puriſsimæ eſſe videtur. Alterũ ad iocineris imaginẽ vergit. Eligi debet, ſyncera, quæ nihil doli ſenſit, nitida, calculorũ expers, rufi coloris, friabilis, ac iocineris modo coacta, facile liqueſcens, eximię amaritudinis: improbatur nigra & fractu cõtutumax. Gummi eam adulterãt: quod deprehenditur guſtu, amaritudine, & valido odore: eóq; argumento, quòd digitis friata non ad minima vſq; fruſta reſoluitur. Nec deſunt qui acaciã immiſceant. Natura eius eſt ſpiſſare, exiccare, ſomnũ allicere, & corpora denſare, aluum reſoluere. Stomachũ repurgat binûm cochleariũ mẽſura, in aqua frigida aut egelida pota: ſanguinis reiectiones ſiſtit: regiũ morbũ purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmę põdere in potu: deuorata cum reſina, aut cũ aqua, vel melle cocto ſumpta, aluũ ſoluit: purgationis perfectę cauſa, tribus drachmis ſumit: aliis purgatoriis medicaminibus admiſta præſtat vt minus ſtomachũ infeſtent: ſicca glutinãdis vulneribus inſpargitur, vlcera ad cicatricé perducit, cohibetque: eadem

δηλὸν δὲ ὅτι τὸ εἶδος τοῦ χυλίσματος· τὸ μὲν τοι ψαμμῶδες, ὃ δὴ ὑποσάθμην τῆς καθαρωτάτης ἔοικεν εἶναι· τὸ δὲ, ἠπατίζον. ἐκλέγου δὲ τὴν καθαρὰν καὶ * ἄβολον καὶ ἄλιθον, σίλλουσαν, ὑπόξανθον, εὔθρυπτον, ἠπατίζουσαν, ῥᾳδίως ὑγραινομένην, ὑπιστάμενην τῇ πικρίᾳ· τὴν μέντοι μέλαιναν καὶ δυσκάτακτον ἀπεκλέγου. δολίζουσι δὲ αὐτὴν κόμμει· ὃ δὴ ἐλέγχεται γεύσει καὶ πικρίᾳ καὶ ὀσμῇ ὑπιστάσει· καὶ τῷ μὴ δι' ὅλου τρίβεσθαι μέχρις ἐλαχίστου ψήγματος θλιβομένην ὑπὸ τῶν δακτύλων. ἔνιοι δὲ καὶ ἀκακίαν μίσγουσι. Δύναμιν δ' ἔχει συστολικὴν, ὑπνωτικὴν, ξηραντικὴν, πυκνωτικὴν τῶν σωμάτων, κοιλίας τε λυτικὴν, καὶ στομάχου ἀποκαθαρτικὴν, κοχλιαρίου ϛ'. πλῆθος, μεθ' ὕδατος ψυχροῦ, ἢ γαλακτώδους πινομένη· αἵματός τε ἀναγωγὰς ἐπέχει. καὶ ἴκτιρον ἀποκαθαίρει, μεθ' ὕδατος πιεωθόλου, ἢ < ά. ὀλυρῆς σὺν ποτῷ, καὶ μετὰ ῥητίνης δὲ καταπινομένη ἢ ὕδατος ἢ μέλιτος ἑφθοῦ αὐαλιφθεῖσα κοιλίαν λύει· δραχμῶν δὲ πιεῶν πλῆθος πελέως καθαίρει· μηχὴ δὲ τοῖς ἄλλοις καθαρτικοῖς, ἧσσον αὐτὰ κακοσόμαχα ποιεῖ, ξηρὰν δὲ ὑπιπλαθὲν, τραύματα κολλᾷ, καὶ ἐπουλοῖ ἕλκη καὶ καταστέλλει.

αἱδοῖα

τὰ δὲ εἰλκωμένα ἰδίως θεραπεύει, καὶ ἐπαγώγια παίδων ἐγχθέντα παρεγκολλᾷ. θεραπεύει δὲ καὶ κονδυλώματα καὶ ῥαγάδας κυρσωθῶν σὺν γλυκεῖ οἴνῳ· αἱμορραγίας τε ἴσχει τὰς ἐξ αἱμορροΐδων, καὶ πτερύγια ἀπαυλοῖ, αἴρει τὰ σπιλώματα καὶ ὑπώπια σὺν μέλιτι· ψωρόφθαλμίας τε καὶ ἀκμῶν κνησμοὺς παρηγορεῖ· καὶ καφυγγλίαν μεθ' ὄξους καὶ ῥοδίνου, μετώπου καὶ κροτάφοις ἐπιχριομένη· ἐπέχει καὶ ῥεούσας τείχας ζωὺ οἴνῳ· καὶ στόμα παιδίων δὲ καὶ οὖλα, καὶ πύτα τὰ ἐν τῷ στόματι ἁρμόζει σὺν μέλιτι καὶ οἴνῳ· φώγυται ὑγιὲς τὸ ὀφθαλμικὸν ἐπὶ καθαροῦ καὶ διαπύρου ὀστράκου, μεταξυομένου μύρῳ, μέχρις αὖ ὁμαλῶς πυρωθῇ. πλύεται δὲ χωνευομένου τῷ ψαμμώδους ὡς ἀχρήστου, * λαμβανομένου δὲ τοῦ λιπαρωτάτου, καὶ λείου.

Περὶ Ἀψινθίου. Κεφ. κϛ'.

Ἀψίνθιον, βαθύπικρον, γνώριμος ἡ πόα. ἔστι δὲ αὐτῆς βελτίων τὸ ἐν Πόντῳ καὶ Καππαδοκίᾳ, ἐν ὄρει τῷ καλουμένῳ Ταύρῳ γινομένου. Δύναμιν δὲ ἔχει θρομβαντικὴν, συμπιλητικὴν, καὶ ἀποκαθαρτικὴν τῶν ἐμπικτόντων στομάχῳ καὶ κοιλίᾳ χολωδῶν. ἔστι δὲ καὶ ἀκρατόπλουν, σωφρονοῦν. καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις δὲ ἁρμόζει, καὶ κοιλίας καὶ στο-

eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimásque sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita ex melle tollit: priuatim scabras lippitudines, pririginésq; angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cũ melle & vino proficit: oculorum medicamentis torretur, in munda & cãdenti testa, pennáque subinde versatur, vt possit æqualiter torreri. Lauatur, vt quod sit arenosissimũ, tanquã inutile subsidat, & leue ac pinguissimũ assumatur.

Absinthium. Cap. XXVI.

Absinthium, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita: Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciẽdi & adstringendi: bilem expurgat, quæ & stomacho & ventri inhæsit: vrinam cit, & crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes ventris, & stoma-

chi dolores prodest, cum seseli & nardo gallico potum: fastidia discutit, & arquatos sanat madefacti dilutum, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cum vino, item cicutæ, & muris aranei morsibus, & draconi marino. Anginæ eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad fugillata & oculorum caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriúmque dolores decoctum vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordiis & iocineris, tritum cum cerato cyprino stomacho quoque longa valetudine laboranti, cum rosaceo: cum ficis autē, aceto & loliacea farina, aquæ intercutē lienosisq; subuenit. Vinū ex eo fit, quod absinthen vocāt, præsertim in Propontide & Thracia, quoad ante dicta vtūtur, cū febri carent: alioquin in æstate ppināt, & acceptā huic vino incolumitatem referunt.

Inspar-

καὶ στομάχου ἀλγήματα, πινόμενον μετὰ στάλεως ἢ ναρδου κελτικῆς· καὶ ἀνορεξίας καὶ ἰκτερικοῖς θεραπεύει, τὸ ἀπόβρεγμα αὐτῆς ἢ τὸ ἀφέψημα, καθ' ἑκάστην ἡμέραν λαμβανόμενον εἰς πλῆθος κυάθων βιῶν· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα, πινόμενόν τε καὶ προσιζάνομον μετὰ μέλιτος. πρός τε τῶν ἀπὸ μυκήτων πνιγμὰς, ἁρμόζει σὺν ὄξει πινόμενον, ζωῇ οἴνῳ δὲ θεὸς ἴξιαν καὶ κώνειον καὶ μυγαλῆς δήγματα, καὶ δράκοντα θαλάσσιον. συναγχικοῖς τε διάχρισμα ζωῇ μέλιτι καὶ νίτρῳ καὶ θεὸς ὀπωπικάσι σὺν ὕδατι. πρὸς δὲ ὑπώπια ζωὸ μέλιτι, καὶ θεὸς ἀμβλυωπίας, καὶ πρὸς ἰχωρῶντα ὦτα ὁμοίως. καὶ ὁ ὑπ' αὐτῆς μισμὸς δι' αὐτῆς τε ἀφεψήματος πρὸς ὀταλγίαν καὶ ὀδονταλγίαν. ἀφεψόμενόν τε σὺν γλυκεῖ, κατάπλασμα ὀφθαλμῶν θεὶς δυνώντων ὅτι καὶ ἀπλάστους δὲ καὶ πρὸς ὑποχόνδρια, καὶ ἧπαρ καὶ στόμαχον ἐπάλγη καὶ χρονίως πάσχοντα, συνεκλειαινόμενον κηρωτῇ κυπρίνῃ· πρὸς δὲ στόμαχον ῥοδίνῃ· ἁρμόζει καὶ ὑδρωπικοῖς, καὶ σπληνικοῖς. μεμιγμένων αὐτῷ σύκων, καὶ νίτρου, καὶ ἀλίνης ἀλεύρου. σκευάζεται δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ οἶνος ὁ λεγόμενος ἀψίνθιτης, μάλιστα μὲν τῷ Προποντίδα καὶ Θρᾴκην, ᾧ πρὸς τὰ προῃρημένα χρῶνται ἐν ἀπυρεξίᾳ· καὶ δηλῶσι δὲ, προπίνοντες ἐξ αὐτοῦ θέρους ὑγείας ποιητικὸν εἶναι νομίζοντες.

δοκεῖ

δοκεῖ δ' καὶ περιπλαπόμενον εἰς ταὲ κιβωτοὺς ἄβρωτα τηρεῖν τὰ ἱματια, μὴ φθειρόμενόν τε μὴ ἐλαίῳ, κώνωπας κωλύειν ἀπέχεσθαι τοῦ σώματος· τὸ δὲ μέλαν ᾧ γράφομεν τῷ ἀπορρέγματι αὐτοῦ * γραφὲν, ἄβρωτα μισεῖ τηρεῖ τὰ γράμματα. ἔοικε δὲ καὶ τὸ τῶ χυλίσματος σῆψα ποιεῖν τὰ αὐτά. πλὴν εἰς ταὲ πόσεις οὐ δοκιμάζομεν αὐτὸ, κακοστόμαχον καὶ κεφαλαλγὲς ὄν. τὸ δὲ χύλισμα ἀμόργῃ ἐφθεῖσῃ καὶ μιγνυμένῃ δολοῦσί τινες.

Inſparſum arcis abſinthiũ, veſtes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo peruncto abigit, & à corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium eroſione tuetur. Exiſtimatur liquamẽtum eoſdem præſtare effectus. Attamen potionibus improbatur, quoniã ſtomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui decocta amurca, liquamentum adulterant.

Περὶ Ἀψινθίου θαλασσίου.

Κεφ. κζ'.

Ἀψίνθιον θαλάσσιον τινὲς δὲ καὶ σεϊφιον καλοῦσι, ἔφυ πολλοῦ ἐν τῷ περὶ καππαδοκίαν ταύρῳ ὄρει γινόμενον, καὶ ἐν ταφοισίρει τῆς αἰγύπτου· ᾧ αὐτὶ θαλλοῦ οἱ ἰσιακοὶ χρῶνται. ἔστι δὲ ἡ πόα λεπτόκαρφος, ἐοικυῖα ἀβροτόνῳ μικρῷ, περιπλεῖ σπερματίων, ὑποπικρος, κακοστόμαχος, βαρύοσμος, σύρουσα μετὰ ποσῆς θερμασίας· ἡ τις ἐφθεῖσα καθ' ἑαυτὴν, ἢ μετὰ ὀρύζης καὶ λαφθεῖσα μετὰ μέλιτος, ἀσκαρίδας καὶ ἕλμινθας τροχύλας κτείνει, ὑπάγουσα κοιλίαν κούφως· δύναται δὲ καὶ ζωὴ * ἐφύματι, ἢ φακῇ καθεφθεῖσα τὰ αὐτὰ ποιεῖν. λιπαίνεται δὲ μάλιστα τὰ προβατα νεμόμενα.

Περὶ Ἀψιν-

Abſinthium marinum, quod aliqui ſeriphum vocant, copioſiſſimum in Tauro monte iuxta Cappadociam & in Taphoriſi Ægypti gignitur: quo Iſiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba eſt tenuis, abrotoni parui ſimilitudine, referta minutulis ſeminibus, ſubamara, ſtomacho inimica. Ea grauiter olet, & cum quadam calfactione adſtringit: per ſeſe aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretéſque tineas, adiecto melle, enecat, aluum leuigat: cum edulio autẽ vel lenticula decocta, eadem præſtare poteſt. Pecora maximè pinguescunt hoc pabulo.

Absinthium Santonicũ. Cap. XXVIII.

Tertiũ genus absinthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomẽto, absinthio non dissimile, verùm subamarum est, nõ adeò seminis fœcundum. Eadẽ quæ seriphium potest.

Abrotonum. Cap. XXIX.

Abrotonum duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos foliis, seriphi modo, minutim incisis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatẽ prodiit, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu: id genus siculum esse constat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis vti absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syriæ Herapoli. Crudum semen tritum & feruefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, cõuulsis, ruptis, coxendicibus, vrinæ angustiis, mensibus suppressis, aut remorantibus.

In vino

Περὶ Ἀψινθίου σαντονίου. Κεφ. κή.

Ἔστι δὲ καὶ τέταρτον εἶδος ἀψινθίου, γλυκάμυρον ἐν τῇ κατὰ ταὶ ἄλπεις γαλατίᾳ φυόμενον· ὁ ὁπὸ τῶν ἐγχωρίων σαντόνιον καλούμενον ἐπωνύμως τῇ γλυκάσῃ αὐτὸ σαρδονίδι χώρᾳ. ἐοικὸς ἀψινθίῳ, οὐ μὴν οὕτω γε ἔναυρμον, ὑποπικρον δὲ, καὶ γλυκάμυρον τὰ αὐτὰ τῷ σεριφίῳ.

Περὶ Ἀβροτόνου. Κεφ. κθ'.

Ἀβρότονον, ἔστι δὲ αὐτῆς τὸ μὲν θῆλυ θάμνος δενδρεώδης, ὑποπόλευκος φύλλοις λεπτομερέσιν ὡς ὁ σεριφίου φύλλα τὰ κλωνία πλήρες αὐθυς, * ἐπ' ἄκρων ἔχον κορυμβώδες χρυσοειδὲς θρύον γλυκάμυρον ἐυώδες μὴ πόσῳ βάρει ὀσμῆς, πικρὸν τῇ γεύσει, δοκεῖ δὲ τὸ σικελιωτικὸν εἶναι τοῦτο. τὸ δὲ ἕτερον ἄρρεν καλεῖται, κλήμασι τοῖς λεπτοῖς καρπὸν ὡς ἀψίνθιον. πλεῖστον δὲ ἐν καππαδοκίᾳ γινᾶ) καὶ γαλατίᾳ τῇ κατὰ τὴν ἀσίαν, καὶ ἐν ἱεραπόλει τῇ κατὰ τὴν συρίαν. τοῦτων ὁ καρπὸς ἀποζεννύμενος καὶ ὠμοβρεχὴς μεθ' ὕδατος πινόμενος, βοηθεῖ ὀρθοπνοϊκοῖς, ῥηγμασι, κατασμασιν, ἰσχιάσι, δυσουρίαις, ἐμμιλύων ἐπιρρόῃσει. καὶ θανασίμων φαρμάκων ἐστὶν ἀντίδοτος· ποθὲν σὺν οἴνῳ σύγχισμά τε ῥιγωτῶν μετ' ἐλαίου ὄξει. δοκεῖ δὲ καὶ ἕρπητα ἐπιζαλευόμενον καὶ ξυμιώμενον.

καὶ τα-

καὶ πινόμενον δὲ σὺν οἴνῳ ὠφελεῖ τὸν δηχθέντας, ἰδίως δὲ ἁρμόζει ὀπὶ φαλαγγίοις καὶ σκορπίοις· βοηθεῖ δὲ καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς σὺν ἐφθῷ κυδωνίῳ ἢ μετὰ ἄφου καταπλασθέν. διαφορεῖ καὶ φύματα μετὰ ὠμῆς λύσεως λεῖον ἐμπλασθέν. μίγνυται δὲ καὶ εἰς τὰ τῆ ἰείνη ἐλκώσεις σκωλακίαν.

In vino potũ exitialiũ venenorũ antidotũ est: horroribus ex oleo illinit: serpétes & substratu & nidore fugat: cõtra ictus eorũ cũ vino potũ prodest, priuatim efficax cõtra scorpionũ & phalãgiorũ venena: oculorũ inflãmationib⁹ cõmodè illinit, cum cotoneo cocto, aut pane: tritũ cũ farina hordeacea, decoctũq;, tubercula discutit: irini cõpositionibus admiscetur.

Περὶ Υσσώπου. Κεφ. λ'.

Hyssopum. Cap. XXX.

Υσσωπος πόα γνώεμος, διττὴ, ἡ μὲν γὰρ τίς ἐστιν ὀρεινὴ, ἡ δὲ κηπευτή. ἀείζυι δὲ ἔστιν ἡ ἐν χιλιάφ γωνωμῶν. Δύναμιν δὲ ἔχει λεπτυντικὴν, θρμαντικὴν· ἀφεψηθεῖσα ὑπὸ μὲν σύκων, καὶ ὕδατος, μᾶλλόν τε καὶ πιγαίᾳ καὶ πνευμόνι, ἀρήγει περιπνευμονικοῖς, διαθματικοῖς, βηχὶ χρονίᾳ, κατάῤῥοῃ, ὀρθοπνοίᾳ· κλείνει δὲ καὶ φθινθας. σὺν μέλιτι δὲ ἐκλειχθὲν τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἄγει δὲ καὶ πάχος κατ' κοιλίαν τὸ ἀφέψημα αὐτῆς σὺν ὀξυμέλιτι πινόμενον· βιβρώσκει δὲ καὶ μετὰ χλωρῶν σύκων λείων πρὸς ὑπαλγηνὴν κοιλίας, σφοδρότερον δὲ καθαίρει μιγνύμενος αὐτῷ καρδαμώμου, ἢ ἴριδος ἢ ἐρεσίμου· περιποιεῖ δὲ καὶ εὐχροιαν. καὶ καταπλασθὲν δὲ μετὰ σύκου καὶ νίτρου πρὸς αὐλῶνα καὶ ὕδρωπα, σὺν οἴνῳ δὲ πρὸς φλεγμονάς. διαφορεῖ δὲ καὶ ὑπώπια σὺν ὕδατι ζεστῷ καταπλασθέν.

Hyssopum, herba nulli non cognita, duûm generũ est, mõtanum & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuãdi & calfaciẽdi · decoctũ cum ficis, aqua, melle, & ruta, potúmque, peripneumonicis, diuturnę tussi, spirios is, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. Idẽ facit, si cũ melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctũ ex aceto mulso epotũ: & ad subducendam aluum cũ ficis viridibus detritis manditur, vehemẽtiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deiicit: coloré in corpore fouet: lieni, & aquę inter cutem, cũ fico nitróq;, inflãmationibus quoq; ex vino illinitur: cũ feruẽte aqua impositũ, fugillata discutit:

cum decocto ficorum, optimè anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentiũ dolorem in collutione sedat: inflationes auricularum vaporis suffitu discutit.

Stœchas. Cap. XXXI.

Stœchas, iuxta Galliã in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur, vnde cognomentũ accepit. Herba tenuibus surculis, coma thymi, lõgiore folio subamara gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Viscera omnia & vniuersum animantis habitum extenuat, ab obstructionibus & farctu liberat.

Origanum. Cap. XXXII.

Origanum Heracleoticum, quod & cuniculã vocant, foliũ habet hyssopo non dissimile: vmbellam autem non in rotæ specié orbiculatam, sed veluti multifidã, semine in summis virgis haudquaquã denso. Excalfacit: vnde decoctum cum vino potũ, demorsis à serpente conuenit. Si cicutã aut meconion hauserunt, ex passo: si gypsum aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, cõuulsis, hydropicis, cũ fico esui datur.

συνάγχοις δὲ αὐ ἀγαργαρίσμα μὴ σύκων ἀφεψήματος ἄριστον. ὀδόντων τὸ πόνον παραύτικα σὺν ὄξει ἐψηθεῖσα καὶ διακλυζομένη λύει ἢ καὶ ταῖς περὶ τὰ ὦτα ἐμπνεύμασι τῶσεις ὑπατμισθεῖσα.

Περὶ Στιχάδος. Κεφ. λά.

Στίχας, γίνεται μὲν ἐν ταῖς κατ' Γαλατίαν νήσοις αὐτόθι μασσαλίας, καλουμένους δὲ στοιχάσπι, ὄθεν καὶ τῷ ἐπωνυμίαν ἔσχηκε. πέα λεπτόκαρπος ὤν, ὁμοίαν ἔχουσα κόμῃ θύμῳ, μακροφυλλοτέρᾳ μέντοι γε καὶ δριμείᾳ ἐν τῇ γεύσει, καὶ ὑποπίκρος πως. ποιεῖ δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς καθὼς ὁ ὕσσωπος πρὸς τὰ ἐν θώραξι. μίγνυται δὲ καὶ αὐτὸ τοῖς χρηστοῖς.*

Περὶ Οριγάνου.

Κεφ. λϚ.

Ορίγανος ἡ μὲν κλεωτική, οἱ δὲ κοτύλιον καλοῦσι, φύλλον ἔχει ἐμφερὲς ὑσσώπῳ· σκιάδιον δὲ οὐ προσχοινδὲς, ἀλλ' ὥσπερ διηρημένον, καὶ ἐπ' ἄκρων τῶν ῥάβδων τὸ σπέρμα οὐ πυκνόν. Ἐστι δὲ θερμαντική· ὄθεν τὸ ἀφέψημα αὐτῆς σὺν οἴνῳ πεθὲν, ἁρμόζει θηριοδήκτοις. σὺν γλυκεῖ δὲ τοῖς κώνειον ἢ μηκώνειον πεπωκόσι. σὺν ὀξυμέλιτι δὲ τοῖς πεπωκόσι γύψον ἢ ἐφήμερον. πρὸς ἃ τε ἀπάσματα, καὶ ῥήγματα καὶ ὕδρωπας μετὰ σύκου βιβρωσκομένη.

ξηρὰ

ξηρὰ δὲ ποθεῖσα ὀξυβάφου πλῆθος, σὺν μελικράτῳ μέλανα χυλίαν ἄγει· ἐμπλυτά τε κηεῖ καὶ βῆχας θεραπεύει σὺν μέλιτι ἐκλειχομένη· κτησιοὺς δὲ καὶ φώκης καὶ ἴκτερον τὸ ἀφέψημα ἀνῆς ἐν λουτρῷ ὠφελεῖ. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς χλωρᾶς οὔσης, καὶ παιδιὰ καὶ κονίδας καὶ ἄφθας θεραπεύει, καὶ διὰ ῥινὸς ἄγει σὺν ἐλαίῳ ἰείνῳ ἐγχυματιζόμενος· σὺν γάλακτι δὲ καὶ ὠταλγίας παρηγορεῖ. ἐμετικόν τε φάρμακον σκευάζει δ' αὐτῆς καὶ χρομμύων, καὶ ῥοὸς ἢ ὄπὸ τὰ ὄφα, πάντων ἐν χαλκῷ κωφείῳ, ἐν τοῖς ὑπὸ κυνὸς καὶ μασιν ἡλιαδέντων, ἐπὶ ἡμέρας μ'. ὑποσφογγυμένη δὲ ἡ πόα, ἕρπετα διώκει.

Περὶ Ονήπιδος. Κεφ. λγ'.

Ἡ δὲ ὀνῆπις καλουμένη, λευκοτέρα τοῖς φύλλοις ὄζει, καὶ μᾶλλον ἐοικυῖα ὑοσκύαμῳ. καὶ τὸ σπέρμα ὥσ περ κορύμβους συνεχεῖς ἐπικαμένους ἔχει. δύναται δὲ καὶ τὰ αὐτὰ τῇ ἡρακλειωτικῇ, οὐ μέντοι δραστικὴ καθέστηκεν.

Περὶ Αγριοεριγάνου. Κεφ. λδ'.

Ἡ δὲ ἀγριοερίγανος καλουμένη πάσσυακες ἡρακλειον, οἱ δὲ κονύλλιον καλοῦσιν, ὧν ὄζει καὶ Νίκανδρος ὁ κολοφώνιος, ἔχει τὰ μὲν φύλλα ὅμοια ὀρεινάῳ, ῥαδία δὲ σπιδαμιαῖα λεπτὰ, ἐφ' ὧν σκιάδια ὅμοια ἀνήθῳ, αὐξη δὲ λευκὰ, ῥίζα

Aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit: mēses ciet, & tussi cum melle linctum medetur: ad pruriginem, psoras, regiúmque morbū, decocti ius in balneis ꝓdest. Succus virentis tonsillas, vuam, & oris vlcera sanat, & per nares, ex oleo irino infusum, trahit: auriū dolores cum lacte mulcet, Cōficitur ex eo, & cepis & rhois frutice quo ad obsonia vtuntur: vomitorium medicamētum, his omnibus in cupreo vase per dies bis vicenos insolatis, dum caniculæ sydus flagrat. Herbæ autē substratu serpentes fugantur.

Ouitis. Cap. XXXIII.

QVÆ ouitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei origani Heraclei, sed multò inefficacior.

Origanum syluestre. Cap. XXXIIII.

Syluestre origanum, aliqui panaces Heraclion,, alij cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Foliis est origani, ramis tenuibus, dodrā tem altis, in quibus vmbellæ anethi insunt, flores candidi: radix

radix tenuis, ſuperuacua. Peculiariter pcuſsis à ſerpente, folia & flores ex vino poti auxiliãt.

Tragoriganum.
Cap. XXXV.

Tragoriganũ tenuis frutex, eſt, ſylueſtri ſerpillo aut origano ſimilis, folio & ramulis. Qui buſdam in locis lætius virentiúsque inuenitur, & latioribꝰ foliis, ſatis glutinoſum. Alterũ exilibus ſurculis, ac tenuibꝰ foliis, qđ aliqui praſiũ vocauere. Optimũ eſt Cilicium, & Cretẽſe, & Smyrneum, & in Chio Chooq; ꝓueniens. Omnia excalfaciũt, vrinã cient, aluo accõmodantur, decocto poto bilem deiiciũt, lienoſis ex aceto bibere prodeſt, cõtra pota ixię venena in vino bibuntur, menſes trahunt: peripneumonicis, tuſsiẽtibꝰ, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorũ potio eſt: quare cibum faſtidientibus & ſtomacho acida ructãti, imbecillóque traditur. Item ſi à maritima iactatione nauſea, & æſtus præcordiorũ excitetur: tumores verò cum polenta illita diſcutiunt.

Pulegium. Cap. XXXVI.

Pulegiũ herba vulgaris notitię. Extenuat, calfacit, decoquit: menſtrua, ſecundas ac partus eũcit:

βίζα λεπτὴ ἄχρηστος. ἰδίως δὲ βοηθεῖ θηριοδήκτοις τὸ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη σὺν οἴνῳ πινόμενα.

Περὶ Τραγοριγάνου.
Κεφ. λε΄.

Τραγορίγανος θαμνίσκος ἐστὶν, ὀριγάνῳ ἢ ἑρπύλλῳ ἀγρίῳ ὅμοιος, τὰ φύλλα καὶ τὰ κλωνία· ἡ μέν τις εὐείσκεται κατὰ τόπους εὐερνεστέρα, καὶ πλατύφυλλος. κολλώδης ἱκανῶς. ἡ δέ τις λεπτόκαρφος καὶ λεπτόφυλλος, ὃν καὶ τραγάσιον ἔνιοι καλοῦσιν. ἀρίστη δὲ ἡ κιλίκιος, καὶ ἡ ἐν κῷ καὶ χίῳ καὶ σμύρνῃ καὶ κρήτῃ. θερμαντικαὶ δὲ πᾶσαι καὶ οὐρητικαὶ καὶ εὐκοίλιοι, πινομένου τοῦ ἀφεψήματος. ὑποδιαζουσι γὰρ τὰ χολώδη, εὔδετοι καὶ ἀπλυτικοῖς πινόμεναι μετ' ὄξους, καὶ τοῖς ἰξίαν πεπωκόσι μετ' οἴνου, καὶ ἔμμηνα δὲ ἄγουσι· βηξί τε καὶ πνευμονίαις, σὺν μέλιτι ἐν ἐκλείκτῳ δίδοται. ὀξεῖ δὲ καὶ τὸ πέπτικόν· ὅθεν τοῖς ἀνωρέκτοις καὶ κακοσμάχοις καὶ ὀξυορεγμιῶσι δίδοται· καὶ ἐφ' ὧν ἁλισμὸς καὶ ναυτία καὶ θέρμη ὑποχονδρίων παρακολουθεῖ· διαφορεῖ δὲ καὶ οἰδήματα καταπλασθέντα μετὰ ἀλφίτων.

Περὶ Γλήχωνος. Κεφ. λϛ΄.

Γλήχων πόα γνώριμος, λεπτομερὴς, θρυμαντική, πεπτική· πεθεῖσα ὀξυμέλιτι καὶ ὑδρομέλιτι καὶ ἔμμηνα ἄγει·

ἄγει· ἀνάγει δὲ καὶ τὰ ἐκ πνεύμονος μετὰ ἁλόης καὶ μέλιτος ποθεῖσα, καὶ στομάχοις βοηθεῖ· ναυτίας τε καὶ δυσπνοὰς στομάχου μετὰ ὄξους κράτος ποθεῖσα παραμυθεῖται· ἄγει δὲ καὶ κατ' κοιλίαν μέλαινα. βοηθεῖ δὲ καὶ θηριοδήκτοις πνιγομένῳ μετ' οἴνου. λιποθυμιωμένας τε ἀνακτᾶται σὺν ὄξει τε βιβόμενον· κραπίᾳ δὲ καὶ ἕλα ξηρὰ λεῖα καταχυμένη, ἐπιπλασθεῖσα ἢ σταφυλῇ πᾶσαν φλεγμονὴν σὺν ἀλφίτῳ, καθ' ἑαυτὴν δὲ ποδαγρικοῖς ἀρμόζει, ἄγει φοινίξεως τῆς ἐπιφανείας· σὺν κηρωτῇ δὲ ἰσχάδοις σβέννυσιν, ὠφελεῖ δὲ καὶ σπληνικοὺς μεθ' ἁλὸς καταπλασσόμενα. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς κενοῖ μὺς λιόμβυον παχύ, καὶ εἰς ἐγκάθισμα, καὶ σταγὸς ἐμπυεμάτοσεις καὶ σκληρίας καὶ ὑστεροφθορὰς ὑστέρας ἀρμόζει. καλοῦσι δέ τινες αὐτὴν βλήχωνα, ἐπειδὴ τὰ γευσάμενα κατὰ τὴν αὔξησιν τῶν προβάτων, βλαχῇς ὑποπίμπλανται.

Περὶ Δικτάμνου. Κεφ. λζ'.

Δίκταμνος ἣν καλοῦσί τινες γλήχωνα ἀγρίαν. πέφυκε δὲ κρητικὴ, δρυμεία, λεῖα, ὁμοία γλήχωνι, μείζω δὲ καὶ γναφαλώδη τὰ φύλλα ἔχει, καὶ ἐρυθρὰ πηνὰ ὑπέρυθρον. οὔτε δὲ ἄνθος οὔτε καρπὸν φέρει. ποιεῖ δὲ πάντα ὅσα καὶ ἡ ἥμερος γλήχων, ἐνδρύτερον

eiicit: pulmonis vitia ex melle & aloë potum extrahit, & conuulsis auxiliatur: nauseas stomachique intercisiones, ex posca permulcet: atram bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtilissimè contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingiuas arefacti cinere corroborat, illitum cum polenta inflammationes omneis sedat, podagris per se subuenit, impositum vsq; dum rubescat locus: cum cærato varos extinguit, lienosis cum sale vtiliter illinitur: decoctum eius ablutas prurigines mitigat, conuersas vuluas corrigit, contra inflationes duriásque vuluæ, in desessione couuenienter adiicitur. Vocãt aliqui blechona, quoniam dum floret gustatum à pecoribus, balatum cõcitat.

Dictamnũ. Cap. XXXVII.

Dictamnum aliquibus sylue stre pulegiũ vocatur. Cretensis herba est, acris, leuis, pulegio similis, sed maiorib⁹ foliis, quæ tomento quodam spissáque la nugine pubescunt. Floré nullũ aut semen profert. Præstat omnia quæ satiuum pulegium, sed

sed efficacius multò: nam non potum modò, sed appositum quoque aut suffitum, defunctos partus eiicit. Produnt in Creta capras sagittis percussas, huius herbæ pastu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Herba impactos pedibus reliquóve corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis dolorem efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit, partus accelerat. Succus cum vino potus, cótra serpentium morsus præsidio est. Tanta herbæ facultas est, vt olfacta abigat bestias, quæ venenato ictu sæuiant, appensáque contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis morsibus, infusus succus præsentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

ἐνεργέστερον δὲ πολλῷ· οὐ μόνον γὰρ πινόμενόν ἀλλὰ καὶ προσπιθέμενόν καὶ ὑποθυμιώμενόν, τὰ τεθνηκότα ἔμβρυα ἐκπίπτειν. φασὶ δὲ καὶ ταὶς αἶγας ἐν κρήτῃ τοξευθείσας καὶ γεμισθείσας πάλιν πᾶσαν ἐκβάλλειν τὰ τοξεύματα. ἔχει δὲ καὶ καθαρτικὴν δύναμιν ὁ χυλὸς αὐτῆς, καταχριόμενος ἢ πεισόμενος μετ' ἀλφίτων. καταπλασσομένη δὲ ἡ βοτάνη τὸν ὑποκάτω ἢ τὸ δῶν ἢ τὸ λοιπὸν σῶμα τοῦ πάσχοντος σπλῆνα σκόλοπας. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τόνον ἀπλῶς, μειοῖ γὰρ αὐτόν. καρπίζουσι δὲ αὐτὴν ἐν ἦρι καὶ φθινοπώρῳ. ἡ δὲ ῥίζα αὐτῆς γευομένοις θερμαίνει, ἔστι δὲ καὶ ὀξυτόκιον. βοηθεῖ δὲ καὶ θηριοδήκτοις ὁ χυλὸς αὐτῆς μετ' οἴνου πινόμενος. τοιαύτη δὲ τῆς βοτάνης ἡ δύναμις, ὡς καὶ ὀσφραινομένη δλώκειν, καὶ προσαπομένη ἀναιρεῖν τὰ ἰοβόλα θηρία. τὸ δὲ αὐτῆς χύλισμα ἐπιχεόμενον πληγῇ σὺν ἡδέρου ἢ ἰοβόλου δήγματι, καὶ πρὸς τῷ ἐπιχυθῆναι καὶ λαμβανόμενον πόσει, εὐθέως ὑγιάζει.

Pseudodictamnum. Cap. XXXVIII.

Quod pseudodictamnum vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile, sed minus quàm illud acre. Eosdem effectus præbet, sed inefficacius multò.

Περὶ Ψευδοδικτάμνου. Κεφ. λή.

Τὸ δὲ ψευδοδίκταμνον καλούμενον, φύεται ἐν πολλοῖς τόποις, ἐμφερὲς δὲ τῷ πρὸ αὐτοῦ, ἔλαττον δὲ δριμύ. ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ τῷ δικτάμνῳ οὐχ ὁμοίως ἐνεργοῦν.

Dictamnum

Περὶ

Περὶ τοῦ ἀπὸ κρήτης δικτάμνου. Κεφ. λθ.

Φέρεται δὲ καὶ ἀπὸ κρήτης ἕτερον εἶδος δικτάμνου, φύλλοις ἐοικὸς σισυμβρείου, κλωσὶ δὲ μείζον· ἐφ' ὧν αὖθος ὀρειγαίῳ ἀγρίῳ ἐοικὸς, μέλαν, μελαχὸν· ὀσμὴ δὲ τῶν φύλλων μετὰ ξὺ σισυμβρείου, καὶ ἐλελισφάκου, ἡδίστη. πιεῖ δὲ πρὸς ὅσα καὶ ἡ πρὸ αὐτῆς, ἧσσον φλεκτικὴ ὑπάρχουσα. μίγνυται δὲ καὶ ἐμπλάστροις καὶ θηριακοῖς.

Περὶ Ελελισφάκου. Κεφ. μ'.

Ελελίσφακος, οἱ δὲ ἐλαφόβοσκον, οἱ δὲ σφαγὸν, δάμνος ὅτι ὀπιμήκης, πολύκλωνος, ῥάβδους τετραγώνους καὶ ὑπολεύκους ἔχων, φύλλα δὲ μηλέᾳ κυδωνίᾳ ἐοικότα, ὀπιμηκέστερα μέντοι καὶ τραχύτερα. καὶ τραχύτερα λευκοτέρως ὥσπερ τὰ ἀνάβιττα τῆς ἰμαλίσκου δασέα, ὑπόλευκα, σφόδρα εὐώδη, βρεμώδη· καρπὸν δὲ ἐπ' ἄκροις τοῖς κλωσὶν ὥσπερ ὀρμίνου ἀγρίου ἔχει. φύεται δὲ ἐν τραχέσι χωρίοις. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ ἀφέψημα τῶν φύλλων καὶ τῶν κλάδων ὕδρα ἄγειν πνεύμονας, καὶ ἔμπυα καὶ ἔμβρυα καθαίρειν, καὶ βυσσόνους πλευρᾶς ἀρίστην. μελαίνῃ δὲ καὶ βίχας, καὶ θαυμασικὰ, καὶ ἰχαιμους, καὶ ἀποκαθαρτικὴν τῶν θηριοδήκτων ἐστὶν ἑλκῶν. παύει δὲ σὺν οἴνῳ τὸ ἀφέψημα τῶν φύλλων καὶ τῶν κλάδων αὐτῶν προσκλυζόμενον, τοὺς περὶ τὰ αἰδοῖα κνησμούς.

Περὶ

Dictamuum creticum. Cap. XXXIX.

Defertur á Creta alterum dictamni genus, foliis siſymbrij, ramis maioribꝰ: in qbus flores ſylueſtris origani, nigri, molles: odor foliorũ inter siſymbrium & ſaluiam iucundiſsimus. Efficax ad eadem, ſed minus nares ferit. Miſcef emplaſtris & medicaminibus quæ aduerſus ſerpentium iniurias configuntur, theriaca vocant.

Saluia. Cap. XL.

Saluia ſiue elelisphacon, frutex eſt ramoſus, longus, virgas habens quadrangulas, & cauas: folia mali cotonei effigie, ſed longiora, aſperiora, craſſiora, & quę ſenſim attritarum quaſi veſtium ſcabritiem referant, hirſuta, ſubalbida, perquàm iucundo odore, ſed grauis: ſemen ſummis in caulibus ſylueſtri hormino ſimile gerit. In aſperis naſcitur. Menſes cit & vrinas, decoctum foliorum ramorúmque potus, & partus extrahit, & paſtinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnerum ſanguinem cohibet, tetra vlcera purgat: teſtium pruritus ſedãt rami foliáque, ſi decocto eorum foueantur.

Métha.

Mentha. Cap. XLI.

Mentha, cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi vim habet. Sistit sanguinem, poto ex aceto succo: tineas in ventre teretes enecat, venerem stimulat, singultus, vomitiones, colerásque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cũ polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet: mãmas si tendantur, aut lacte turgeant, cõpescit: cum sale canum morsibus illinitur: aurium doloribꝰ cum aqua mulsa subuenit: vulvæ ante coitum admota, conceptioni resistit: linguæ scabritiẽ confricta læuigat: coire lac, densariq; in caseũ nõ patitur, si folia potionibꝰ lactis immergãtur. In summa, stomacho vtilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet.

Πρὶ Ἡδύοσμου ἤτοι μέντης. Κεφ. μά.

Ἡδύοσμος, οἱ δὲ, μίνθη, γνώσεως βοτάνιον. δύναμιν ἔχον θερμαντικὴν, συντηκτικὴν, ξηραντικήν· ὅθεν αἷμα ἵστησι πινόμενος ὁ χυλὸς αὐτῆς μετ' ὄξους· καὶ ἕλμινθας κτείνει στρογγύλας, ἀφροδίσια τε ἐρεθίζει, καὶ λυγμοὺς, καὶ ἐμέτους, καὶ χολέραν παύει δύο ἢ τρία κλῶναρία σὺν ῥοᾶς ὀξείας χυλῷ πινόμενα. διαφορεῖ δὲ καὶ ἀποσήματα μετὰ ἀλφίτου καταπλασθέν. καὶ κεφαλαλγίας παρηγορεῖ ὀπτηθὲν τῷ μετώπῳ· μασῶν τε φύλλα σὺν ἀλῒ δὲ τοῖς κυνοδήκτοις κατὰ πλασμα ὠλαλγίας ἢ ὁ χυλὸς σὺν μελικράτῳ ἀρήγει· γυναιξὶ δὲ πρὸ τῆς πλησιάζειν προσδέμενον. ἀσυλλήψιας ἐργάζεται· γλῶσσάν τε τραχεῖαν παρηρεθισμένην λειαίνει· καὶ γάλα ἀπύρετον φυλάσσει ἐν ἀποκλυσθέντων αὐτῷ τῶν φύλλων. καὶ καθόλου ἐστὶν εὐστόμαχον καὶ ἀρτυματῶδες.

Mentha sastrum. Cap. XLII.

Sylvestris mẽtha, Latini mẽthastrũ vocãt, hirsutiore est folio, & prorsus maiore, q̃ sisymbrij, odore magis viroso. quare minus ad sanorũ vsus expetit.

Πρὶ Ἡδύοσμου ἀγρίου. Κεφ. μβ'.

*Τὸ δὲ ἄγριον ἡδύοσμον γίνεται δασύτερον τοῖς φύλλοις, καὶ πάντη μεῖζον σὺν μυρίῃ, ἐν ὀσμῇ δὲ βρωμωδέστερον, καὶ ἧττον εἰς τὰ ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν εὔθετον.

Calamintha. Cap. XLIII.

EX calaminthæ generibus quædam montibus familiaris, folia

Πρὶ Καλαμίνθης. Κεφ. μγ'.

Καλαμίνθη, ἡ μὲν τις ὀρεινοτέρα ἐστὶν, ἔχει δὲ φύλλα ὅμοια ὠκιμῳ ἡμέρῳ

ὑσσώπου λευκὰ, πλατύτερα δὲ καὶ κάρφη μεγαλομερῆ, ἄνθος πορφυροῦν. Ἡ δὲ τρίτη γλήχωνι ἔοικε, μείζονα δὲ ὄζον τινες ἀγρίαν αὐτὴν γλήχωνα ἐκάλεσαν, διότι τῇ ὀσμῇ παρέοικε, ταύτην ῥωμαῖοι νεπέταν καλοῦσιν. Ἡ δὲ τετάρτη ἔοικεν ἡδυόσμῳ ἀγρίῳ. ὀπωρικωτέρα τοῖς φύλλοις, καυλῷ καὶ κλάδῳ μείζονι τῶν προειρημένων, καὶ ἧττον ἐνεργής. Πασῶν δὲ τὰ φύλλα ψευδῆ μύρῳ, πυρωτικὰ ἰσχυρῶς καὶ δριμέα· ῥίζα ἄχρηστος. φύεται δὲ ἐν πεδίοις καὶ ἐν τραχέσι τόποις καὶ καθύγροις. πινομένη δὲ καὶ καταπλασσομένη, ἀφίησι ἔρπητα δύκτιος. ἄγει δὲ καὶ οὖρα τὸ ἀφέψημα πινόμενον· βοηθεῖ δὲ καὶ ῥίγωσι, σπάσμασιν, ὀρθοπνοίαις, στρόφοις, χολέρᾳ, καὶ ῥήγνυται· καὶ πρὸς τὰ θηριάσιμα προπινομένη ποιεῖ συῶ οἴνῳ, καὶ ἕκτειναν ἀποκαθαίρει· ἕλμινθάς τε κτείνει καὶ ἀσκαρίδας συῶ ἁλσὶ καὶ μέλιτι πινομένη· ἕψεσίν τε καὶ ὠμὴ τεθειμένη. ὠφελεῖ καὶ ἐλεφαντιῶντας βρωθεῖσα, σπεπινομένου ὀρροῦ γάλακτος. φθείρει δὲ καὶ ἔμβρυα, καὶ ἔμμηνα ἄγει τὰ φύλλα λεῖα ἐν προσθέτῳ. θυμιαθέντα δὲ ἕρπητα διώκει καὶ καταῤῥυπαίνει· λευκαίνει τε τὰς μελαίνας οὐλὰς ἐνθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ καταπλασθεῖσα, καθαίρει καὶ ὑπώπια. ἰχθυδικοῖς τε ὀπτὴ

folia ocimi habés, incana, furculos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera pulegio similis est, sed maior: quam syluestre pulegium ideo appellarũt, quòd odore ipsum æmuletur: nepetam Latini vocitãt. Tertia méthastro cognata est, foliis oblongioribus, caule & ramis maioribus, quàm superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impense feruentia, & acria: radix supernacua. Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis. Potu aut illito demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu menses, & vrinas expellit: ruptis, cõuulsis, orthopnœa, torminibus, choleris, horroribúsque auxiliatur: regium morbum expurgat: præsumpta in vino venenis resistit: tineas cæteráque interaneorũ animalia, cum sale & melle pota, enecat: nec secus cocta crudáve, si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serũ lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiiciãtur, mẽses extrahunt, & partus enecãt. Accensa aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt: in vino cocta, & illita, & fugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur,

imponitur, vt ex alto humores euocet, summam cutem exurens. Vermes necat, succus auribus instillatus.

Thymum. Cap. XLIIII.

Thymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus foliis multis & angustis circundatus: capitulis in cacumine, flore purpurascente refertis. Gracili solo, & petroso puenit. Vim habet hãc, vt cum sale, & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit: vrinas ciet: cum melle in eclegmate, faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissoluit: verrucas thymi colorem reddentes, pensilésque tollit, ischiadicis cum vino, & polenta impositũ subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquàm vtile pro condimento, duntaxat ad vsus eorum, qui rectè valent.

ὀπτιδέται εἰς μετασύγκρισιν, ἐπικαίουσα τὴν ἐπιφάνειαν. καὶ σκώληκας τοὺς ἐν ὠσὶ κτείνει ὁ χυλὸς ἐνταζόμενος.

Περὶ Θύμου. Κεφ. μδ'.

Θύμος γινώσκεται ὑπὸ παντὸς θαμνίσκιον φρυγανοειδὲς, φυλλαρίοις πολλοῖς καὶ στενοῖς πεπυκνωμένον· ἔχον ἐπ' ἄκρου κεφάλια αὐθησὶ πορφυρίζοντα. μάλιστα δὲ φύεται ἐν πετρώδεσι καὶ λεπτογείοις τόποις. Δώσειν δὲ ἔχει πινόμενον μετὰ ἁλῶν καὶ ὄξους, ἄγειν φλέγματα τῶνδε κατὰ κοιλίαν. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτοῦ μετὰ μέλιτος ὀρθοπνοϊκοῖς καὶ ἀσθματικοῖς βοηθεῖ· ἕλμινθάς τε ἐξάγει καὶ ἔμμηνα, καὶ ἕμβρυα, καὶ ὕστερα· ἔστι δὲ καὶ οὐρητικόν· μιγὲν δὲ μέλιτι καὶ σπληνιῶσιν, ὠφελεῖ· ἀναγωγὰ τὰ ἐν θώρακος ποιεῖ· διαφορεῖ δὲ οἰδήματα πεπόσθια καταπλασθὲν μετ' ὄξους· αἵματος δρόμους διαλύει, καὶ θύμους καὶ ἀκροχορδόνας αἴρει· καὶ ἰχθυικοῖς μετ' οἴνου καὶ ἀλφίτων ὀπτεδὸν ἁρμόζει· ἀμβλυωποῦντας ἐδώδιμον σὺν τροφῇ ὠφελεῖ· εὔχρηστον δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν ἀντὶ ἀρτύματος.

Satureia. Cap. XLV.

SATVREIA triuialis notitiæ est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamen, & tenerior: defert

Περὶ Θύμβρας. Κεφ. με'.

Θύμβρα, καὶ αὐτὴ γινώσκεται μοσχυνομένη ἐν λεπτογείοις, καὶ τραχέσι τόποις, ὁμοία θύμῳ, ἐλάσσων μέν τοι καὶ ἁπαλωτέρα, φύεσθαι

ἔρυθρα στάχυν ἄνθους μεστὸν, ἔγχλωρον. δύναται δὲ τὰ αὐτὰ τῷ θύμῳ ὁμοίως λαμβανόμενον. καὶ πρὸς τὴν ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν ἐπιτήδειον. γίνεται δὲ καὶ σπαρτὴ θύμβρα, κατὰ πάντα τῆς ἀγρίας ἐλάσσων, ἐν χρηστοτέρα δὲ πρὸς βρῶσιν διὰ τὸ μὴ ἐπιτετάσθαι τὴν δριμύτητα.

Περὶ Ἑρπύλλου. Κεφ. μϛʹ.

Ἕρπυλλος ὁ μέν τίς ἐστι κηπευτὸς, σαμψυχίζων τῇ ὀσμῇ, καὶ στεφανωματικὸς, ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ ἕρπειν τε καὶ ὅ, τι ἂν αὐτοῦ μέρος θίγῃ τῆς γῆς ῥιζοβολεῖν. ἔχει δὲ φύλλα καὶ κλωνία ὀριγάνῳ ἐμφερῆ, πλὴν λευκότερα· ἀπὸ δὲ αἱμασιῶν καθιέμενος, εὐαυξέστερος γίνεται. Ὁ δέ τίς ἐστιν ἄγριος, ὃς καὶ ζυγὶς καλεῖται. οὐχ ἕρπων, ἀλλ' ὀρθὸς κλωνία ἀνιεὶς λεπτὰ φρυγανώδη, φύλλων πλέα ὁμοίων πηγάνῳ, στενότερα δέ ἐστι καὶ ἐπιμηκέστερα, καὶ σκληρότερα· ἄνθη γευομένῳ δριμέα, ὀσμὴ ἡδεῖα· ῥίζα ἄχρηστος. φύεται ἐν πέτραις ἐνεργέστερος καὶ θερμαντικώτερος τοῦ κηπευτοῦ ὑπάρχων, καὶ πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν ἐπιτηδειότερος. ἔμμηνα γὰρ ἄγει καὶ οὖρα κινεῖ πινόμενος· ὠφελεῖ στρόφους, ῥήγματα, σπάσματα, ἥπατος φλεγμονάς· καὶ πρὸς ἑρπετὰ πινόμενός τε καὶ καταπλασσόμενος· κεφαλῆς τε ὀδύνην παραμυθεῖται ἑψηθεὶς

ῥοδίνῳ

defert ſpicam florum plenam, coloris herbacei. Eadē poteſt quæ thymum, ſi modo cōſimili ſumptitetur. Aptus ſanis vſus. Eſt etiamnum quædam ſatiua, ſylueſtri prorſus minor, q̄ propter mitiorem acrimoniā, cōmodius in cibos recepta eſt.

Serpillum. Cap. XLVI.

Serpillum duorum generum eſt: Hortenſe odore ſampſuchum imitatur, atque in coronas addi ſolet, cui à ſerpendo nomē inditum eſt: quoniam ſi qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos origani habet, ſed candidiores: in maceriis multò procerius aſſurgit. Sylueſtre, zygis appellatū, non ſerpit, ſed in altitudinem increſcit, ramulos ædēs tenues, ſurculoſos, foliis refertos lōgioribus quàm rutæ, & durioribus, anguſtis: flores iucundè olent, guſtāti acres: radicis nullus vſus. Naſcit̃ in petris, ſatiuo efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medēdi vſum apti⁹. Mēſes trahit, vrinam potu ciet torminibus, ruptis, vulſis, & iocineris inflāmationibus, auxiliatur, & aduerſus ſerpētes potu illitúve: capitis dolores mulcet coctum, abiecto roſaceo,

& madefactú in aceto: maximè vero phreniticis,& lethargicis conuenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchú. Cap. XLVII.

Sampsuchum in Cypro, & Cyziceno laudatissimum: secundum sibi locum vendicauit Ægyptium. Amaracú gens Sicula, & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, foliis eius calaminthe, quæ tenui folio constat, hirsutis,& rotundis,suauissimú odorem spirat,ideo coronis inseritur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, cõuenit incipientibus hydropicis, & iis quos vrinæ difficultas,aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia,fugillata tollunt: menses subdita in pessο trahũt: contra scorpionis ictum ex aceto, & sale illinuntur: luxatis tumoribúsque,cerato excepta imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tumorésque cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmatisque, calfaciendi gratia, commiscetur.

Melilotos,siue sertula Cãpana. Cap. XLVIII.

Sertula Cãpana laudatissima in

ροδίνῳ μιγνύντες αὐτῷ, σὺν ὄξει καταβραχεῖς μάλιστα δὲ ὅτι λιθάργῳ καὶ φρενιτικοῖς ἀρμόζει. πιεῖς δὲ καὶ ἕμετον αἵματος < δί. σὺν θυμῷ μιᾷ· ὄξος πιθεὶς ὁ χυλὸς αὐτῷ

*Περὶ Σαμψύχου. Κεφ. μζ.

Σάμψυχον κράπτιν τὸ κυζικηνὸν καὶ κύπριον· δευτερεύει δὲ τούτῳ τὸ αἰγύπτιον. καλεῖται δὲ ὑπὸ κυζικηνῶν καὶ τῶν ἐν σικελίᾳ ἀμάρακον. φύα δέ ἐστι πολύκλονος, ἕρπουσα ἐπὶ τῆς γῆς. φύλλα δασέα καὶ στιφερὰ ἔχουσα, ὅμοια τῆς λεπτοφύλλου καλαμίνθης, σφόδρα εὐώδης, καὶ θερμαντική, πλεκομένη καὶ εἰς στεφάνους. ἁρμόζει δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον ἐπὶ αἰχμῶν ὑδρωπικῶν, καὶ δυσουρεώντων καὶ δυσεντερικῶν. ξηρὰ δὲ τὰ φύλλα ἐπιπλασθέντα μετὰ μέλιτος, αἴρει ὑπώπια· καὶ ἔμπλαστα ἄγει ἐν ἡμέρᾳ δέκατῃ· στρὸς δὲ σκορπίου πληγὴν μετὰ ἁλῶν καὶ ὄξους καταπλάσσεται· στρὸς δὲ στρέμματα μετὰ κηρωτῆς ἀναλημφθέντα ἐπιτίθεται· καὶ στρὸς οἰδήματα ὁμοίως ἀναλημφθέντα κηρωτῇ, καὶ στρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καταπλάσσεται μετὰ παιπάλης λήθυτος. μίγνυται δὲ καὶ ἀκόπτοις καὶ μαλάγμασι στρὸς τὸ θερμαίνειν.

Περὶ Μελιλώτου. Κεφ. μη.

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ κράπτος, ὁ ἀπὸ

ὁ ἀπλῶς καὶ ὁ ἐν κυζίκῳ, καὶ ὁ ἐν χαλκηδόνι γιγνόμενος· κροκίζων καὶ εὐώδης. φύεται δὲ καὶ ἐν καμπανίᾳ περὶ νώλαν, ωχρίζων. καὶ ἄτονος καὶ πρὸς εὐωδίαν. Δυνάμην δὲ ἔχει συστηπτικὴν, μαλακτικὴν, πάσης φλεγμονῆς, μάλιστα δὲ τῆς περὶ ὀφθαλμοὺς καὶ μήτραν καὶ σκληρύνειν καὶ διαφύμοις μετὰ γλυκέος ἐμπλασθεὶς καὶ καταπλασθεὶς· ἐλίστε δὲ καὶ ὠὸν λευκοῦ ὀπῆς παραμιγείσης, ἢ ταλίνου ἀμύδρου, ἢ λινοσπέρμου, ἢ γύρεως ἢ κονδιᾶν, ἢ σέρεως. Θεραπεύει καὶ μελικηρίδας περισπάτως καθ' ἑαυτὸν ἐν ὕδατι, καὶ ἀχώρεστα σὺν γῇ χλὰ καὶ οἴνῳ ἢ κυκεῶνι καταχριόμενος. ἄλγημά τι στομάχου μετ' οἴνου ἐφθὸς καὶ ὠμὸς σὺν τινὶ τῶν προειρημένων· καὶ ὀπαλγίας παύει σὺν γλυκεῖ ὠμὸς χυλισθεὶς καὶ ἐπαζόμενος· καὶ κεφαλαλγίαν περαίνει ἐμβρεχόμενος μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου.

Περὶ Μάρου. Κεφ. μθ'.

Μάρον, ἢ ὑσσόβριον, πόα γνώριμος, φρυγανώδης, ὁμοία τῷ ἀνέτῳ ὀριγανίῳ, τὰ μὲν φύλλα τέτταρα κότερα πολλῷ καὶ τὸ ἄνθος εὐωδέστερον. Ἔχει δὲ δύναμιν ὁμοίαν συμβρίῳ. ὑποσφύγων καὶ θρομαῖον ῥῆμα· ὅθεν νομάς τι ἴσχει καὶ ἀπαλαυσόμενον, καὶ εἰς τὰ θρομβώδη τῶν συγχυσμάτων μίγνυται· γλυκᾶ δὲ καὶ μαγνησίαν καὶ βάλης ἀλείφει.

Περὶ

in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Cāpania circa Nolam, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam, inflāmationem omnē emollit, præsertim: quæ in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdū autē addito oui luteo assato, aut fœnigræci farina, līni semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intybóue. Recētes meliceridas per se cū aqua, & vlcera manantia in capite; illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda, & cocta cū aliquo ex antè dictis leuat: dolorib⁹ auriū mitigādis cruda ex passo instillata: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum. Cap. XLIX.

Marum herba cognita vulgò, furculosa, flore origani, foliis multò candidioribus, flore odoratiore. Vim habet, sisymbrio cōsimilē. Substringit enī, & modicè calfacit: qua de causa illitu serpētia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta magnesiam, & Tralleis copiosissima gignitur.

Acinos. Cap. L.

Acinos aut aconos à Græcis dicit, tenui siccoq; ramulo herba, ocimo similis, odorata, sed hirsutior: qua coronæ factitãt, à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluũ pota sistit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis. Cap. LI.

Baccharis herba fructicosa, q̃ in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media violę & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petẽs, aliquantulũ asper, nõ sine appẽdicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicib⁹ veratro nigro similibus, quib⁹ odor ineſt cinnamomo proximus. Asperũ squalidũq; solũ amat. Radix ĩ aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto p̃cipitatis, spirãdi difficultati, salutaris. Itẽ diuturnæ tussi, & vrinæ difficili: mẽses pellit: cõtra serpentiũ morsus vtilissimè daẽ in vino. Recẽs radix appositа, partũ ex trahit: puerperis eius decoctũ in desessionib⁹, pdest: in diapasmata vtiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, vtpote quę adstringãt, capitis doloribꝰ illitu prosunt: oculorum imflãmationibus, mammis tumẽtibus à partu, ægilopiis incipientibus, ignibúsq;

Περὶ Ακίνου. Κεφ. ϛ'.

Ακινος, ἢ ἄκονος, πόα ἣν λεπτόκαρφος, στεφανωματικὴ, παρεμπλησία ὠχίμῳ, δασυτέρα δὲ καὶ εὐώδης. παρ' ἐνίοις δὲ οὐ κνπεύεται. ἴσχει δὲ κοιλίαν καὶ ἔμμηνα πνομβύη· φύλλα τε καὶ ἐρυσιπέλατα καταπλασσόμενα ἰᾶται.

Περὶ Βακχάρεως. Κεφ. ρέ.

Βάκχαρις βοτάνη ἣν* εὐώδης καὶ στεφανωματικὴ· ἧς τὰ φύλλα τραχέα, μέγεθος ἔχοντα μετρίου ἴου καὶ φλόμου· κανλὸς δὲ γωνιώδης, πῆχυς τὸ ὕψος, ὑπότραχυς ἔχων παρεφυάδας· ἄνθη δὲ ἀμπόρφυρα, ὑπόλευκα, εὐώδη· ῥίζαι δὲ ὅμοιαι ταῖς τοῦ μέλανος ἐλλεβόρου, ἐοικυῖαι τῇ ὀσμῇ κιναμώμῳ. φιλεῖ δὲ τραχέα χωρία καὶ ἔνικμα. Ταύτης ἡ ῥίζα ἐψηθεῖσα ἐν ὕδατι, βοηθεῖ ἀσθμασι, ῥῆγμασι, πάθεσι, δυσπνοίαις, βηχὶ χρονίᾳ, δυσουρίᾳ· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα· καὶ θηλάζοντος χρῆμως συὸς οἶνῳ δίδοται. σφενδεῖσα δὲ μίαν ἀπαλῶν ῥιζῶν, ἕλκει ἔμβρυα· ταῖς* τελεχοῖς εἰς ἐγκάθισμα τὸ ἀφέψημα αὐτῆς ἁρμόζει· καὶ εἰς διαπάσματα χρησιμεύει, ἰκανὴν ἔχουσα τιὴν εὐωδίαν. τὰ δὲ φύλλα συμπικὰ ὄντα καταπλασσόμενα ὠφελεῖ κεφαλαλγίας, ὀφθαλμῶν φλεγμονὴ, καὶ αἰγίλωπα ἀρχόμενον, καὶ μαστοὺς ἐκ τόκων φλεγμαίνοντας,

καὶ ἐρυσιπέλατα. ἔστι δὲ καὶ ὑπνοποιὸς ἡ ἐσμή.

Περὶ Πηγάνου. Κεφ. νβ'

Πήγανον ὄρεινον καὶ ἄγριον, τὸ ἡμέρου κνησπτῶδες δριμύτερον καὶ ἄδηκτον πρὸς βρῶσιν· τὸ δὲ κνησπτῶδες ἐδωδιμώτερον τὸ παρὰ τοῖς συκαῖς φυόμενον. Ἀμφότερα δὲ χωρητικά, θερμαντικά, ἑλκωτικά, οὐρητικά, ἐμμήνων ἀγωγά, ἐδητόμενα τε, καὶ πινόμενα, κοιλίαν ἰστῶσι. καὶ τῶν φαρμακωδῶν φαρμάκων ἔστιν ἀντίδοτος, ὅσον ἑξυδάφου τὸ σπέρματος πεθὲν ἐν οἴνῳ. καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα δὲ τὰ φύλλα καθ' ἑαυτὰ, καὶ μετὰ καρύων βασιλικῶν καὶ σύκων ξηρῶν, ἄριστα καθίσησι τὰ σαπρὰ σώματα. καὶ πρὸς ἕρπητα ἁρμόζει ὁμοίως λαμβανόμενα· χολῇ τε σθένος ἐδιδόμενον, καὶ πινόμενον· ἐφθὸν δὲ σὺν ἀνήθῳ ξηρῷ καὶ πεθὲν, σφόφους παύει. πεπὶ δὲ καὶ πρὸς πλευρῶν πόνον καὶ θώρακος, δύσπνοιαν, βῆχας, φθειρομονίαν, δι' ἡμάτων ἰχῶρας, ἄρθρων, ῥίγη περιοδικὰ πινόμενον ὡς πρόειρηται. καὶ πρὸς ἐμπυεματώσεις δὲ κώλου καὶ ὑστέρας καὶ ἀπυοῦσθαι μέλλοντος σὺν ἐλαίῳ ἐφθὸν καὶ ἐνεθέν. πίνας τὸ ὑστερικὸν λεῖον μετὰ μέλιτος κατὰ τὴν αἰδοῖα ἄχει. δακτυλίου ὀπτοῦ ἐνθὲν παραυτίκα. ἀναζεσθὲν δὲ σὺν ἐλαίῳ καὶ πεθὲν, ἐλμινθας

ignibúsque sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta. Cap. LII.

Ruta montana syluestrísque satiua, & hortensi acrior est, & in cibis damnata: satiua verò quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraque vrit, calfacit, exulcerat: vrinam ciet, mẽstrua pellit, aluum sistit potu cibóve: lætaliú medicamentorum antidotum est, si semen ex vino, acetabuli mensura, ebibatur. Folia per se præsumpta, aut cũ nuce iuglande, aridísque ficis, inefficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere conuenit: genituram cibo potúve extinguit: cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris laterúmque dolores, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicum articulorúmque cruciatus, & horrores febrium circuitu repetentes, pota vt antè dictum est. Ité ad inflationes coli, vuluæ, rectíque intestini, cũ oleo decocta, & infusa. Fœminas vuluæ strangulatu liberat, si à genitali, sedétenus cum melle subiiciat. Feruefacta ex oleo, & pota, ventris tineas excutit:

articulariis doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias parteis, & oblita.

Cruda conditáque cibo, visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cum rosaceo, & aceto illita auxiliatur: profluentem naribus sanguinem sistit trita & indita: testium inflammationibus cum laureis foliis imposita, & eruptionibus pabularũ cum myrto, & cerato prodest. Cum pipere autem vino, & nitro affricta, albæ vitiligini medetur. Cum eisdem illita formicationes tollit, & verrucas quæ thymi florem repræsentant: contra impetigines cum alumine, & melle vtilissimè imponitur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum fœniculi succo ac melle peruncti iuuantur: ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & ceruſa persanat: manſa, alliorum cepa rũq; acrimoniã domat. Mõtana si copiosius estur, interficit.

Dum

ἐλμινθας ἐκπινόσει· καταπλάσσεται δὲ καὶ πρὸς ἀρθρων ἀλγήματα σὺν μέλιτι· σὺν δὲ σύκῳ πρὸς ὕδρωπας ὑποσαρκίους. καὶ πινόμενον δὲ βοηθεῖ τούτοις, καὶ κατεμπλασθὲν ἐν οἴνῳ ἄλγεσι μέσοις καὶ θεσπιλχόμενον. ἔστι δὲ καὶ ὄξυωπὲς ἐδιόμενον ἀμὸν καὶ τραχυτόν· καὶ ταῖς ἐν ὀφθαλμοῖς θεσιωδυίαις σὺν ἀλφίτῳ καταπλασθὲν πρασύνει· σὺν ῥοδίνῳ δὲ καὶ ὄξει κεφαλαλγοῦσι βοηθεῖ, καὶ αἱμορῤῥαγίας ταῖς ἐκ τῶν μυκτήρων λεῖον ὀπτεθὲν ἴσησι, ταῖς δὲ τῶν διδύμων φλεγμοναῖς σὺν ἀλφίτοις φύλλοις καταπλασθὲν ὠφελεῖ, καὶ τὰ ἐξανθήματα σὺν μυρσίνῃ καὶ κυρωτῇ. σὺν οἴνῳ δὲ καὶ πεπέρει καὶ νίτρῳ θεσμώμενον, λευκὸν ἀλφὸν ἰᾶται. καὶ καταπλασθὲν δὲ μετὰ τῶν αὐτῶν, θύμους καὶ μυρμηκίας αἴρει. ὠφελεῖ καὶ λειχμῶδες σὺν μέλιτι καὶ συπήνῃ ὀπτηθέμενον. ὁ δὲ χυλὸς ποιεῖ πρὸς ὠταλγίας ἐν σιδίῳ θερμαινόμενος καὶ ἐγχεόμενος· καὶ ἀμβλυωπίας βοηθεῖ μετὰ μαράθρου χυλοῦ καὶ μέλιτος ἐγχεόμενος· ἐρυσιπέλατά τε καὶ ἕρπητας καὶ ἀχώρας σὺν ὄξει καὶ ψιμυθίῳ καὶ ῥοδίνῳ καταχριόμενος ἰᾶται· ταῖς τε ἀπὸ σπορέδων καὶ χρομμύων δριμύτητας, παύει ὀπμασσόμενον. τὸ δὲ ὀρεινὸν πολὺ βρωθὲν κτείνει.

ὑσκὴ

κωδὲ δὲ πλῦ αὔξησιν εἰς ταὲ ἀλμυύσεις συλλεγόμωον, φοινίσσει, ἢ φυσᾶ τὸν χρῶτα σὺν κνησμῷ ἢ φλεγμονῇ σφοδρᾷ. δεῖ δ' περαλειψαμένους τὸ πρόσωπον καὶ ταὲ χεῖρας, οὕτω συλλέγειν. φασὶ δὲ τὸν χυλὸν ἐμβραδύνοντα* ὀρνιθίοις, ἀπαρύκειν τὰς αἰλούρους. τὸ δὲ ἐν μακεδονίᾳ φυόμωον περὶ τὸν *ὅλκιμον ποταμὸν ἀναιρεῖν φασὶ βρωθὲν. ὀφεώδης δὲ ὁ τόπος ὑπάρχει ἢ ἐχιδνῶν πλήρης. τὸ δ' σπέρμα αὐτῆ πινόμωον, πρὸς τὰ ἐντὸς ποιεῖ· ἢ ἀντιδότοις μίγνυ) χρησίμως· ἢ φρίξας δὲ τὸ σπέρμα αὐτῆ, δὸς πίνειν ἐπὶ ἡμέρας ζ'. τῷ ἐπουρουμένῳ καὶ παύσεται. ἡ δὲ ῥίζα αὐτῆς λεγομένου ὀρεινόν. τὸ οὖν ἄγριον πόαγανον ὁμοιοῖ τῷ ἡμέρῳ. πινόμωον δὲ ὠφελεῖ ἐπιληπτικοῖς ἢ ἰσχιαδικοῖς· κινεῖ δὲ, καὶ καταμηνία, τὰ δὲ ἔμβρυα φθείρει. δριμύτερον δέ ἐστι τῶ ἡμέρῳ, καὶ τῇ ἐνεργείᾳ δυνατώτερον. ὑ δεῖ δὲ ἢ ἀγρίαν ἐσθίειν, διότι ἐπιζηλαβής ἐστι.

Περὶ πηγάνου ἀγρίου. Κεφ. ργ'.

Καλοῦσι δέ τινες πόαγανον ἄγριον, ἢ τὸ ἐν τῇ καππαδοκίᾳ. καὶ τὸ ἐν τῇ κῇ τῶν ἀσίαν γαλατίᾳ λεγόμωον μῶλυ. ἔστι δὲ θάμνος ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πλείονας ῥάβδους ἀναφίεσι· ἔχει φύλλα μακρότερα πολλῷ τῶ ἄλλου πηγάνου καὶ ψυχρόστερα, βαρύοσμα, αὐδος λευκὸν,

Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cū pruritu ac vehementi inflāmatione. Oportet itaque eam vnctis antea manib⁹, & facie colligere. Tradūt ſuccum gallinaceis pullis inſparſum feles arcere. Adiiciūt eam quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedētes interimere. Montoſus autem his locus, viperis ſcatet. Semen eius potum contra inteſtina vitia efficax eſt: in antidota commodè additur: contra incontinentiam vrinæ toſtum, ſemen ſeptenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly vocatur. Sylueſtris ruta ſatiuæ ſimilis eſt. Prodeſt comitialib⁹, & coxendicum doloribus: mēſtrua mouet, partus enecat. Acrior eſt viribus, q̄ hortēſis, & validior. Sylueſtris, vtpote noxia, cibis abdicatur.

Sylueſtris ruta. Cap. LIII.

Vocant etiamnum ſylueſtrē rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Aſiæ finitima moly dicitur. Frutex eſt, qui ab vna radice multos emittit cauliculos: foliis multò, quàm alterius rutæ longioribus, tenerioribúsque, odore graui, flore

candido, capitulis in cacumine paulò maioribꝰ q̃ fatiuæ rutæ, quæ tribꝰ maximè partibus cõ stat: in quibus triangulũ semẽ, subrufum, gustu amarum reclu ditur, cuius est vsus. Semen autumno matureſcit, quod cum melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sũt qui eam harmalam vocẽt, Syri besasan. Qui Cappadociam incolũt, moly, quoniam quandam cum moly seruet similitudiné: radice nigra, flore candido. In collibus, & læto solo prouenit.

Moly. Cap. LIIII.

Moly folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ violę simílẽ, sed minorẽ, ac magnitudine violæ purpureæ respondentẽ lactei coloris: caulẽ candidum, quaternũm cubitorum, in cuius cacumine inest aliq̃d quod allij speciẽ referat. Radix parua bulbosa, quæ mirum in modũ valet ad aperiẽdas vuluas, si trita cũ irino vnguento, in pesso subiiciatur.

Panaces. Cap. LV.

Panaces nõnullis heracleum dicit: ex quo opopanax colligi solet. Plurimum in Bœotia, & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq̃

λευκὸν, ἐπ' ἄκρῳ τὴ κεφάλια ὀλίγῳ μείζονα τῶ ὑμέρῳ πηγάνῳ, ὀπτειῶν μάλιστα μερῶν συγκείμενα· ἐν οἷς σπέρμα τείγωνον, ὑπόπικρον, σμικρὸν μάλιστα πρὸς τὴν γεῦσιν, ᾧ ἡ χρῆσις. Φυτινοπώρου δ' ὀπὸ πιάνει τὸ σπέρμα· ἀρμόζον πρὸς ἀμβλυωπίας, μετὰ μέλιτος λειαινόμενον ἢ οἴνου καὶ χολῆς ἀλεκτοριείδων, κρόκου τε ἢ μαράθρῳ χυλῷ. καλοῦσι δέ τινες αὐτὸ ἄρμαλα, σύροι βισπασῦ. καὶ παδόκαι δὲ μῶλυ ἐστὶ καταπονὸν σώζῃ τὴν πρὸς τὸ μῶλυ ἐμφέρειαν· τῇ ῥίζῃ μέλαν ἢ τῷ ἄνθει λευκὸν ὑπάρχον. φύεται δὲ ἐν γαιλόφοις ἢ εὐγείοις χωρίοις.

Περὶ Μώλεως. Κεφ. νδ'.

Μῶλυ τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὀχρώδη ὅμοια, πλατύτερα δὲ ἐπὶ γλῶ ὄντα ἄνθη· λευκοῖοις ὅμοια, γαλακτόχροα, ἡδυόσμου δὲ πρὸς τὰ τῶ ἴου· χυλὸν δὲ λευκὸν, πόχων τετάρων, ἐπ' ἄκρου δὲ ἔπισιν ὡς σκορδοειδές. ἡ ῥίζα δὲ μικρὰ βολβοειδὴς, αὐτὴ σφόδρα ἀγαθὴ πρὸς ὑστερικὰς ἀναστομώσεις τετριμμένη μετὰ ἰρίνου μύρου καὶ προσπεφυρμένη ἐν πεσσῷ.

Περὶ Πανάκους. Κεφ. νε'.

ΠΑΝΑΚΕΣ * ἐξάκλειον, ἐξ οὗ ὁ ὀποπάναξ συλλέγεται. πλεῖστον γινόμενον ἐν Βοιωτίᾳ ἢ ἐν * Φωκίδι τῆς Ἀρκαδίας,

ἔνθ

ῶς τε, καὶ ἐπιτηδὲς κηπεύεσθαι διὰ τὴν ἐκ τοῦ ὀποῦ πρόσοδον. φύλλα δὲ ἔχει τραχέα, χαμαιπετῆ, χλωρὰ σφόδρα πρὸς τὰ τῆς συκῆς, ἐν τῷ περιφερεῖ ἐπισχισμένα πενταμερῶς· καυλὸν δὲ ὥσπερ νάρθηκος ὑψηλότατον, ἔχοντα χνοῦν λευκὸν καὶ φύλλα περὶ αὐτὸν* μικρότερα, σκιάδιον δὲ ἐπ᾽ ἄκρου ὡς ἀνήθου μακρόν· ἄνθος δὲ μήλινον, σπέρμα εὐῶδες καὶ πυρωτικὸν· ῥίζας πλείονας ἐκ μιᾶς ἀρχῆς, λευκὰς, βαρυόσμους, παχὺν ἐχούσας τὸν φλοιὸν, ὑπόπικρον τῇ γεύσει. φύεται δὲ ἐν κυρήνῃ τῆς λιβύης καὶ ἐν μακεδονίᾳ. Ὀπίζεται δὲ ἡ ῥίζα, ἐπιτεμνομένη ἀρτιβλαστῶν ὄντων τῶν καυλῶν. ἀνίησι δὲ λευκὸν ὀπὸν, ὃς ξηρανθεὶς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν κροκίζει. δέχονται δὲ τὸ ῥέον εἰς φύλλα περιυποτιθέντες εἰς* κεκοιλωμένον ἔδαφος, ἀναιροῦνται δὲ ξηρανθέντα. ὀπίζουσι δὲ καὶ τὸν καυλὸν ἐπιτέμνοντες εἰς τὸν πυραμητὸν, ὁμοίως δεχόμενοι τὸ ἀπορρέον. εἰσὶ δὲ τῶν ῥιζῶν βελτίοις αἱ τεταναὶ, καὶ λευκαὶ, καὶ ξηραὶ, ἄβρωτοί τε καὶ πυρώδεις ἐν τῇ γεύσει, καὶ ἀρωματίζουσαι. καρπὸς δὲ εὔθετος ὁ ἐκ μέσου τοῦ νάρθηκος, ὁ γὰρ ἐκ τῶν παραφυάδων ἐστὶν ἀτροφώτερος. τοῦ δὲ ὀποῦ διαφέρει ὁ πικρότατος τῇ γεύσει, ἔνδοθεν μὲν λευκὸς καὶ ὑπόκιρρος, ὁ ἔξωθεν

ibíq; cõpendij, & quæstus, qui ex eo liquore factitatur, gratia studiose colitur. Foliis est asperis, in terra iacétibus, herbacei coloris, multũ ad ficulnea accedétibus, in ambitu quinquepartitò diuisis: caule, vt ferulæ, altissimo, qui lanugine quadã incanescit, foliis etiã minutiori bus obsitus, muscariis, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato feruentéq;: ra dices habet multas ab origine vna: cãdidas, graueolétes, crassi corticis, & subamari gustus. Na scitur in Cyrene Lybiæ, & Ma cedonia. Excipitur succus incisa radice, recẽti cauliũ pullulatu. Ea cãdidũ succũ emittit, qui siccat*, in summa cute croceũ coloré contrahit. Effluenté autem succũ excipiunt, foliis excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluété succũ eximũt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distétæque: siccæ, quæ cariem non sentiãt, aromaticæ, feruétes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab vsu cibario abhorret. Maximè in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfuluus, foris

foris ad croci colorem inclinans, læuis, pinguis, friabilis, tener, ſtatim in aqua eliqueſcens, graui odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut cera: ſed ſynceri experimentum eſt, ſi digitis in aqua friatus reſoluatur, & lacteſcat. Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus febrium circuitibusque, vulſis, ruptis, laterum dolori, torminibus, ſtillicidio vrinæ conuenit. Contra veſicæ ſcabiem ex aqua mulſa aut vino bibitur: menſes trahit, fœtum enecat, inflationes quæ vuluá malè habent, duritiasque, ex melle dilutus, diſcutit: iſchiadicis illinitur, acopis & capitis medicaminibus admiſcetur, carbunculos rumpit, podagricis cum vua paſſa illitus ſubuenit: dolore dentium liberat, cauis inditus: oculorum aciem illitu excitat. Ex eo & pice optimũ fit emplaſtrum contra beſtiarum morſus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta conſciſſa, vuluæ admota, partus extrahit: ad vetera vlcera efficax eſt, nudata oſſa corpore operit, ſi trita cum melle illinatur. Semẽ cum abſinthio ſumptum, mẽſes pellit, cum

ὁ ἔξωθεν ᾗ χροιζων, λεῖος, λιπαρὸς, εὔθρυπτος, εὔθετος, ταχέως ᾗ διϊέμενος, βαρύοσμος. ὁ ᾗ μὴ καθαρὸς καὶ μελανός. δολοῦται γὰρ ἀμμωνιακῷ, ἢ κηρῷ· δοκιμάζεται ᾗ ὕδατι διατειθόμενος τοῖς δακτύλοις, ὁ γὰρ ἄδολος ἀνίεται καὶ γαλακτοῦται. Δύναμις ᾗ αὐτῆς ὅτι θερμαντικὴ, μαλακτικὴ, λεπτυντικὴ· ὅθεν αἱμόζει πρὸς θερμοδυσεντερίην, ἀποσήματα, ῥήγματα, πλευρέων ἀγκύματα, βῆχας, φθόους, φραγγωδίας. ψώρας τὰς ἐν κύστει σὺν μελικράτῳ, ἢ οἴνῳ πινόμενος· ἐμμηνά τε ἄγει, καὶ ἔμβρυα φθείρει, καὶ ἐμπνευματώσεις τὰς ἐν ὑστέρᾳ, καὶ σκληρίας διαφορεῖ σὺν μέλιτι αὐθεῖς· ἔστι ᾗ καὶ σύγχυσιγμα ἰχμάδος, μίγνυται δὲ καὶ ἀκόποις καὶ κεφαλικοῖς δυνάμεσι, περιῤῥήγνυσι δὲ καὶ ἀνθρακας, αἱμόζει καὶ ποδαγρικοῖς μετὰ σαφίδος ἡμέρου καταπλασσόμενος· παρεγγίνεται δὲ καὶ τὰ τῶν ὀδόντων ἀγκύματα, ἐντιθέμενος τοῖς βεβιμασιν· ὀφθαλμῶν τε ὄξει δριμεῖ εὐχρηστον. μηλὶς ᾗ πίσσῃ ἔμπλαστρός ἐστι πρὸς τὰς λυσσοδήκτους αἰσιν. καὶ ῥίζα ᾗ ξυσθεῖσα καὶ περιτεθεῖσα μήτρᾳ, ἄγει ἔμβρυα· πρός τι ἕλκη ποιεῖ παλαιὰ, καὶ τὰ ἐψιλωμένα τῶν ὀστέων σαρκοῖ, λεῖα καταπλασσομένη καὶ σὺν μέλιτι ἐγχριομένη. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς σὺν ἀψινθίῳ ληφθεὶς ἄγει ἔμμηνα.

σὺν

σὺν ἀειστολοχίᾳ· δὲ πρὸς τὰ ἰοβόλα ἁρμόζει, καὶ πρὸς ταῖς ὑστερικαῖς πνίγας, σὺν οἴνῳ ποτιζόμενος.

Περὶ Πάνακος ἀσκληπιοῦ.

Κεφ. νε'.

Πάνακες* ἀσκληπιοῦ ἀφίησιν ἀπὸ γῆς καυλὸν λεπτὸν, σπιθαμαῖον, γόνασι διειλημμένον, περὶ ὃν τὰ φύλλα ὅμοια μαράθρῳ, μείζονα δὲ, καὶ δασύτερα,* εὐώδη· καὶ ἐπ' ἄκρου σκιάδιον, ἐφ' οὗ τὰ ἄνθη χρυσοειδῆ, δριμέα, εὐώδη· ῥίζα δὲ μικρά. Δύναμιν δὲ ἔχει σύνθετον τὸ ἄνθος καὶ ὁ καρπὸς πρὸς ἕλκη καὶ φύματα καὶ φαγέδαινας, λεῖος σὺν μέλιτι ἐπιτιθέμενος· καὶ πρὸς σφῆτα σπόμενος σὺν οἴνῳ, καὶ συμπλεκόμενος σὺν ἐλαίῳ. καλοῦσι δέ τινες πάνακας καὶ τὴν ἀγρίαν δρίγανον, οἱ δὲ, κονίλιν περὶ ἧς εἴρηται ἐν τοῖς περὶ δριγάνου.

Περὶ Πάνακος χειρωνίου.

Κεφ. νς'.

Πάνακες χειρώνιον φύεται μάλιστα ἐν τῷ πηλείῳ ὄρει· φύλλα δὲ ἔχει ἁμαράκῳ ἐμφερῆ· ἄνθη χρυσοειδῆ· ῥίζαν λεπτὴν, καὶ οὐ βαθεῖαν, χυμὸν δὲ δεομένην. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα πρὸς ἕρπητα σπομένη. καὶ ἡ κόμη δὲ ὁμοπλαθομένη πρὸς τὰ ὠτα ποιεῖ.

Περὶ Λι-

cum aristolochia, prodest aduersus animalia quæ venenum eiaculantur & contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

Panaces Asclepij.

Cap. LVI.

Panaces Asclepij caulem à solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, circa quem folia fœniculi funduntur, sed maiora tamẽ hirsutioraque odorata: in cacumine vmbella, vbi flores emicant aurei, odorati & acris gustus: radix parua est & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, contra vlcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur: aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocãt, alij cunilã, de qua in origani mentione diximus.

Panaces chironium.

Cap. LVII.

Panaces Chironium in Pelio monte maximè prouenit: foliũ eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris.

Pota radix serpetiũ veneno resistit. Illitã coma eadẽ præstat.

Ligu-

Ligusticum. Cap. LVIII.

Ligusticum, quod alij panaceã, alij panaces vocant, plurimũ in Liguria nascitur, in mõte Apennino, Alpibus contermino: vnde nomẽ traxit. Panaces incolæ nõ ab re appellant: quoniã & radice & caule, heracleotico panaci simile sit, & viribus eisdem præditũ. Gignitur in altissimis asperisq; mõtibus, ac vmbrosis, maximè verò iuxta fluenta. Cauliculũ fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia sertulæ cãpanæ, molliora, odorata, prope verticẽ graciliora, & longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrũ, solidum & oblongũ, fœniculo proximũ, gustanti acre, & aroma olens: radix candida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis seminisque vis excalfactoria, cõcoquens: prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat: & cõtra serpentium ictus: vrinas & menses potu trahit. Eosdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur: ori perquàm vtile: quare

Περὶ Λιγυστικοῦ. Κεφ. νθ.

Λιγυστικὸν φύεται μὲ πλεῖστον ἐν Λιγυείᾳ· ὅθεν καὶ τὴν προσωνυμίαν ἔσχηκεν ἐν τῷ καλουμένῳ Ἀπεννίνῳ, ὅρει δέ ἐστιν ὁμορῶν τοῖς Ἄλπεσι. πάνακες δὲ αὐτὸ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι οὐ ἀλόγως· ἐπεὶ καὶ ῥίζα καὶ ὁ καυλὸς ἔοικε τῷ τῆς ἡρακλειωτικοῦ πάνακος, καὶ ἡ δύναμις ὁμοία κεκτῆσθαι φύεται δὲ ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις καὶ βαθυτέροις καὶ συσκίοις ὄρεσι, μάλιστα δὲ παρὰ τοῖς διὰ ῥυμῶν καυλὸν δὲ φέρει λεπτὸν, ὅμοιον ἀνήθῳ, γονατοειδῆ, οὗ ὁ φύλλα ἔοικότα τοῖς τῆς μελιλώτου, περιφερέστερα δὲ καὶ εὐώδη, ἐρρωγότερα δὲ τὰ πρὸς ἄκρῳ τῷ καυλῷ, καὶ μᾶλλον ἐπορεγόμενα. ἐπ' ἄκρου δὲ σκιάδιον, ἐφ' ᾧ καὶ τὸ σπέρμα μέλαν, νᾶσον, τοῦ μύκητος πρὸς τὸ μαράθρου, γευσαμένῳ δὲ πρίμα καὶ ἀρωματίζον· ῥίζα λευκὴ, ὁμοία τῇ τῆς ἡρακλειωτικῆς πάνακος εὐώδης. Δύναμις δὲ τοῦ σπέρματος καὶ τῆς ῥίζης θερμαντικὴ, πεπτικὴ ἀφύζουσα πρὸς τὰ ἐντὸς πλήματα καὶ πίψεις καὶ οἰδήματα, καὶ ἐμπνευματώσεις καὶ μάλιστα ταῖς περὶ στόμαχον, καὶ πρὸς δηκέων πλήγας· ἄγει δὲ καὶ οὖρα, καὶ ἐμμηνα τὰ ποιεῖ. μίγνυται δὲ ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα χρησίμως καὶ τοῖς ὀξυπόροις καὶ ταῖς πεπτικαῖς δυνάμεσιν. ἰκανῶς δὲ εὐστόμαχόν ἐστιν.

ὅθεν

ὅθεν καὶ αὐτὸ πιπέρεως ἀντὶ χρῶν τινὲς τοῖς ἐπιχωρίοις, μίσγοντες τοῖς ὄψοις ἁλμασι. δολοῦται δὲ σπέρματί τινι παρομοίῳ ὁ διακρινεῖς τῇ γεύσει· πικρὸν γάρ ἐστιν. ἔνιοι δὲ καὶ σπέρμα μαράθρου ἢ σισύμβρεως συμμίσγοντες, δολοῦσιν αὐτό.

quare pro pipere vtuntur eo indigenæ, ad obſonia. Adulteratur ſemine quodam ſimili, quod facilè guſtu diſcernitur: amarum enim eſt. Alij ſemen fœniculi aut ſeſelis admiſcentes, liguſticum dolo vitiant.

Περὶ Σταφυλίνου. Κεφ. νθ'.

Σταφυλῖνος ἄγριος φύλλα ἔχει ὅμοια γογγυλίῳ, πλατύτερα δὲ καὶ ὑποπικρα· καυλὸν δὲ ὄρθιον, τραχῶδη, σκιάδιον ἔχοντα αὐξήσιμον παραπλήσιον, ἐφ' οὗ σπέρμα λευκὸν, ἐν μέσῳ δὲ πεφυκὸς δένδρεόν τι μικρὸν, καὶ οἱονεὶ κρομμύζον· ῥίζα δὲ δακτύλου τὸ πάχος, εὐθαμμάδα, εὐώδης, ἐδώδιμος, ἐφθή. Τούτου ὁ καρπὸς πιόεις ἢ πεφυσημένος, ἐμμηνα κινεῖ. ἀφόδιζει καὶ δυσουρίαν καὶ ὑδρωπικοῖς, καὶ πλευριτικοῖς ἐν πόμασι, καὶ πρὸς θηρίων δὲ δήγματα καὶ πλήγας· τοὺς δὲ πεπλακότας φασὶ μὴ ἀδικεῖσθαι ὑπὸ θηρίων· σωτηρεῖ δὲ καὶ συλλήψει. ἡ δὲ ῥίζα καὶ αὐτὴ οὐρητικὴ οὖσα σωφρονίσαι τε παρομᾶ καὶ ἥμερα ἐκβάλλει προσπεφυκότα. τὰ δὲ φύλλα λεῖα μετὰ μέλιτος ἐπιτιθέμενα, τὰ φαγεδαινικὰ ἕλκη ἀναιρεῖ. Ὁ δὲ κληθεὶς σταφυλῖνος ἐδώδιμώτερος ὢν ἀφόδιζει πρὸς τὰ αὐτὰ εὐδιέστερον ὀργῶν.

Paſtinaca. Cap. LIX.

Paſtinaca ſylueſtris folia gingidij habet, latiora, ſubamara: caulem rectum, ſcabrum: vmbellam ſimilem anethi, in qua flores inſunt candidi, & in medio exiguú quiddam cernitur colore purpureo, ferè ad croceũ accedẽte: radix digiti craſſitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta máditur. Semen potum vel impoſitũ, méſtrua mouet. Is cõuenit in potione, quos vrinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut ſi aqua cutem ſubiit: ſerpentium morſibus ictibusque prodeſt: præſumentes id nulla affici iniuria à ſerpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit, venerem ſtimulat, partus appoſita eiicit. Folia trita, & cum melle impoſita, phagedænas vlcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, ineffacacior tamen, & cibo aptior.

Περὶ Σισέ-

Seſeli Maſsilienſe.

Cap. LX.

Seſeli Maſsilienſe folia fœniculi habet, craſsiora: caulem vegetiorem: vmbellam anethi, in qua ſemen oblongum, anguloſum, deguſtanti ſtatim acre: radix longa eſt, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habẽt: potu ſtranguriæ & orthopnœæ medentur, ſuffocationibus mulierum comitialibusque proſunt, menſes & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent, tuſſim veteré ſanant. Semen cum vino potũ, cõcoquit, & tormina diſcutit: epialis febribus vtile, & cõtra perfrictiones in itineribus, cum pipere & vino bibitur: capris, cæteriſque pecudibus, datur in potu, quò facilius ſuos fœtus enitantur.

Seſeli Æthiopicum.

Cap. LXI.

Æthiopicum ſeſeli, folia habet hederæ, minora, & ad periclimeni modũ oblonga: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extenſis, ramis ſeſquipedalibus, capitulo anethi: ſemine in tritici morem déſo, nigro, amaro, Maſsilienſi odoratiore, & acriore, multum ſuaui.

Seſeli Pelo-

Περὶ Σεσέλεως μασσαλεωτικοῦ. Κεφ. ξ'.

Σέσελι τὸ μασσαλεωτικὸν φύλλα ἔχει ἐοικότα μαράθρῳ, παχύτερα δὲ καὶ τὸν χυλὸν εὐδηκέστερον ἔχει· ἔχει δὲ σκίαδιον ἀνήθῳ ὅμοιον, ἐφ' οὗ ὁ καρπὸς ἐπιμήκεις γεγωνιωμένους, θριμὺς βιζοειδὲς μύελος τὴν χόαν· ῥίζα μακρὰ εὐώδης. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα θερμαντικήν, πεπόμφυκα δὲ φραγγουείαν ἰᾶται, καὶ ὀρθόπνοιαν· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑστερικὰς πίγας καὶ ἐπιληπτικούς, ἐμμηνά τε ἄγει καὶ ἔμβρυα, καὶ πρὸς τὰ ἐντὸς πάντα πιεῖ, καὶ βῆχας ἰᾶται παλαιὰς, πνεύμονός τε μετ' οἴνου ὁ καρπὸς, πεπτικός ὅτι, καὶ τρόφων λυτικός· ἀποδύτοις τε χρήσιμος καὶ πρὸς τοὺς ἐν ὁδοῖς κρυμοὺς σὺν πιπέρει καὶ οἴνῳ πίνεται. δίδοται δὲ καὶ αἰγὶ καὶ τοῖς λοιποῖς κτήνεσι πρὸς εὐτοκίαν ποτόν.

Περὶ Σεσέλεως αἰθιοπικοῦ. Κεφ. ξα'.

Τὸ δὲ αἰθιοπικὸν λεγόμενον σέσελι, φύλλα μὲν ἔχει ὅμοια κισσοῦ, κλάσσονα δὲ καὶ ἐπιμήκη πρὸς τὰ τῆς πετροκλυμένου, θάμνος ὀργυιαῖος· μέλας ὅτι, κλήματα ὡς δίπηχυ ἔχων, ἐφ' ἕ κλάδοι δισπιθαμιαῖοι, κεφαλὰς δὲ ὡς ἀνήθου. σπέρμα ὑμέλαν πυκνὸν ὡς πυρὸς, θριμύτερον δὲ, καὶ εὐωδέστερον τοῦ μασσαλεωτικοῦ. ἡδὺ ἰσχυρῶς.*

Περὶ

Περὶ Σεσέλεως πελοποννησιακοῦ. Κεφ. ξϚ'.

Τὸ δὲ ἐν πελοποννήσῳ γινόμενον, φύλλα ἔχει κονείῳ παραπλήσια, πλατύτερα δὲ καὶ παχύτερα, καυλὸν μείζονα τῶ μασσαλεωτικοῦ, παραπλησιωδῆ, ἐπ' ἄκρῳ δὲ τούτῳ σκιάδιον πλατύ. ἐν δὲ τούτῳ καρπὸς πλατύτερος καὶ εὐώδης * καὶ σαρκωδέστερος. δύναται δὲ τὰ αὐτὰ ἔχει. φύεται ἐν τόποις τραχέσι καὶ ἐφύγροις καὶ χαλόφοις. φύεται δὲ καὶ ἐν ἴδῃ.*

Περὶ Τορδυλίου. Κεφ. ξγ'.

Τορδύλιον, ἔνιοι δὲ σέσελι κρητικὸν καλοῦσι. φύεται ἐν τῇ κατ' κιλικίαν* ἀμανῷ. ἔστι δὲ βοτανίον φυγαῶδες, ἔχον σπερμάτιον περιφερὲς, δισπίδι, ὅμοιον ἀσπιδίσκοις ὑπόδριμυ, καὶ ἀρωματίζον· πινόμενον πρὸς δυσουρείαν, καὶ ἐμμήνων ἀγωγόν. ὁ δὲ χυλὸς τῆς καυλοῦ καὶ τοῦ σπέρματος ἔτι χλόου ὄντος, ὅσον τριώβολον πιθεῖς σὺν γλυκεῖ ἐν ἡμέραις δέκα, νεφριτικὸς ὑγιάζει. ἡ δὲ ῥίζα θερμαντική. ἀνάλουσα καὶ τὰ ἐν θώρακος ἐκκενοῦσα μετὰ μέλιτος.*

Περὶ Σίσωνος. Κεφ. ξδ'.

Σίσων σπερμάτιόν ἐστιν ἐν συρίᾳ γινόμενον, παρεμοιάζον σηΐνῳ, ἐπίμηκες, μέλαν, πυρωτικόν. πινόμενον πρὸς πλευρῖτα καὶ δυσουρείαν, καὶ ἐμμηνίων ἐπιλύ. χρῶνται δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιχώριοι ἀντὶ σπέρματος

Seseli Peloponnense. Cap. LXII.

Peloponnésе folia habet cicutæ, latiora, & crasiora: caulē supra Masilienſis magnitudinem, ferulaceū, & latam in cacumine vmbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem viribus præditum est: nascitur in asperis, riguis & collibus. inuenitur & in insulis.

Creticum Seseli. Cap. LXIII.

Tordyliū, quod aliqui Creticum seseli vocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula furculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra vrinæ difficultatem bibitur, potu cit menses. Succo seminis caulisque virentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanātur. Efficax est radix ad cien das pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

Sison. Cap. LXIIII.

Sison exiguum semen est, in Syria natū, apio simile, nigrū, ferués, oblongum. Contra lienis vitia bibitur, vrinæ difficultatē potu emendat, remoratos mēses citat. Quo in cōdimētis cū cu-

cum cucurbita, & aceto, indigenæ vtũtur. In cacumine granula multa gerit.

Anisum. Cap. LXV.

Anisum in summa excalfacit, exiccat: oris halitum iucundiorem facit, doloris leuamẽtum præstat, vrinam ciet, aquam quæ subiit cutem dissipat, potum sitim cohibet, animalium venenis aduersatur: valet ad inflationes, aluum & alba fœminarum profluuia sistit, lac ad mammas elicit, venerem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instillatumque, fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenũ non furfurosum, odore præstans.

Inter prima laudatũ est Creticum, proximo loco Ægyptium.

Carum. Cap. LXVI.

Carum, semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit, vrinam cõcitat, stomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis & oxyporis: anisi vicem præbet. Radix cocta, pastinacę modo, manditur.

Anethum.

μετὰ κολοκύνθης ἑφθῆς σὺν ὄξει λαμβάνοντες. ἔχει δὲ ὡς κοκκία πολλὰ ἐπ' ἄκρων.

Περὶ Ἀνίσου. Κεφ. ξε΄.

Ἄνισον* σπερμάτιόν ἐστιν ἐν συρίᾳ γινόμενον, ἐοικὸς σελίνῳ περίμηκες, μέγα, πυρωτικόν. πινόμενον δὲ πρὸς σπλῆνα, καὶ δυσουρίαν ἢ ἐμμήνων ἐποχήν. χρῶνται δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιχώριοι ἀρτύματι μετὰ κολοκύνθης ἑφθῆς σὺν ὄξει λαμβάνοντες. τοῦτο δὴ τὸ ἄνισον, τὴν μὲν καθόλου δύναμιν ἔχει θερμαντικήν, ξηραντικὴν, εὔπνουν, ἀνώδυνον, διαφορητικὴν, οὐρητικὴν, διαχυτικὴν, ὑδρωπικοῖς ἄδιψον πινόμενον· ἁρμόζει δὲ πρός τε τὰ ἰοβόλα τῶν ζώων καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις, κοιλίαν τε ἵστησι. καὶ λευκὸν ῥοῦν, καὶ γάλα κατασπᾷ, καὶ συνουσίας παρορμᾷ· ὑποθυμιώμενον δὲ τῇ ῥινὶ κεφαλαλγίαν παύει· καὶ τὰς ῥήξεις δὲ τῶν ὤτων, λεῖον σὺν ῥοδίνῳ ἐνσταζόμενον ἰᾶται. ἔστι δὲ αὐτοῦ κρεῖσσον τὸ νέον καὶ ἁδρὸν, καὶ μὴ πιτυρῶδες, εὔτονον τῇ ὀσμῇ. πρωτεύει δὲ τὸ κρητικὸν, ἔπειτα δὲ καὶ τὸ αἰγύπτιον.

Περὶ Κάρου. Κεφ. ξς΄.

Κάρος* σπερμάτιόν ἐστι γνώριμον οὐρητικὸν, θερμαντικὸν, εὐστόμαχον, εὔστομον, πεπτικὸν, μιγνύμενον ἐν τοῖς ἀντιδότοις καὶ ὀξυπόροις χρησίμως· ἀναλογοῦν ἀνίσῳ. ἡ δὲ ῥίζα ἑφθὴ ἐδώδιμος ὥσπερ σταφυλῖνος.

Περὶ Ἀνήθου.

Περὶ Ἀνήθου. Κεφ. ξζ'.

Ἄνηθος* ξηρᾶς τ' κόμης ϗ τ̃ καρποῦ τὸ ἀφέψημα πινόμενον, γάλα κατασπᾷ, ῥόφους τε ϗ ἐμπνευματώσεις παύῃ, κοιλίαν τε ϗ τὰς ἐπιπολαίους ἐμέτοις ἴσησι, οὖρά τε κινεῖ, λυγμοὺς παρηγορεῖ, ἀμβλύνει τε τὰς ὄψεις, ϗ γονὴν σβέννυσι συνεχῶς πινόμενον. χρήσιμον δ' τὸ ἀφέψημα καὶ τ̃ ϗ γυναιξὶν ὑστερικαῖς εἰς ἐγκάθισμα. τὸ δ' αὐτὸ μὰ καὶ ϗ καταπλασθὲν, κονδυλώματα αἴρει.

Anethum. Cap. LXVII.

Aridi anethi comæ feminísque decoctum, potu lac euocat, inflationes & tormina sedat, aluum vomitionésque sistit, vrinas ciet, singultus lenit, oculorũ aciem hebetat & genituræ restinguit assiduè potũ. Fœminis vuluę malo opportunis, ad defessiones vtile. cõdylomata illitus eius cinis tollit.

Περὶ Κυμίνου ἡμέρου. Κεφ. ξη'.

Κύμινον τὸ ἥμερον σῦσμον· ϗ τούτῳ μᾶλλον τὸ αἰθιοπικὸν, ὅπερ ἱπποκράτης βασιλικὸν ἐκάλεσεν. δεύτερον τὸ αἰγύπτιον· εἶτα τὸ λοιπόν. φύεται δ' ἐν γαλατίᾳ ϗ ἐν ἀσίᾳ ϗ κιλικίᾳ ϗ τερεντίᾳ, ϗ ἐν ἄλλοις πλείοσι τόποις. ἔστι δὲ θερμαντικὸν, συπτικὸν, ξηραντικόν· ἁρμόζον πρὸς ῥόφους, ϗ ἐμπνευματώσεις. ἐγκλυζόμενον ἐφθὸν σὺν ἐλαίῳ ϗ καταπλασσόμενον σὺν ὠμῇ λύσει. δὲ δ' δὲ ὀρθοποϊκοῖς σὺν ὀξυκράτῳ· θηριοδήκτοις δὲ σὺν οἴνῳ. δὲ δύμων τὸ φλεγμονὰς ἀρήγει σαφῶς καὶ αἰείνῳ ἀλεύρῳ, ἢ κηρωτῇ ὀπιτεθέν. ἐπέχει δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον, ϗ τὰς ἐν μυκτῆρσιν αἱμορραγίας. σὺν ὄξει λεῖον προσενεχθὲν, τρέπει δὲ ϗ χρῶτα ἐπὶ τὸ ὠχρότερον πινόμενόν τε ϗ συγχριόμενον.

Cuminum satiuum. Cap. LXVIII.

Cuminũ satiuũ ori gratũ est: sed multò magis Æthiopicum, quod Hippocrates regiũ appellauit. Secundũ locũ tenet Ægyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisq; aliis tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationésq; conuenit, coctum & cũ oleo inditum, aut cũ hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum vua passa, aut lolij farina cæratóve. Mensium abundantiam inhibet. Contritũ autẽ in aceto, & narib' obiectũ, sanguinis profluuia sistit. Colorem bibentiũ aut peructorum mutat in pallorem.

Περὶ

x Syluestre

Sylueſtre cuminum. Cap. LXIX.

Sylueſtre cuminum, plurimum efficaciúſq; in Lycia & Galatiæ Aſia, atq; Carthagine Hiſpaniæ gignitur: frutice paruo: dodrantali caule, ac tenui, quaternis, aut quinis foliis tenuibus, veluti ferratis, & gingidij diuiſura. In cacumine capitula quina, aut ſena habet, mollia, rotunda: in quibus eſt ſemẽ aceroſum, guſtu ſatiuo acriore. naſcitur in collibus. Bibitur ſemen ex aqua, aduerſus tormina inflationéſq;: itẽ contra venenatas beſtias, ex vino: ſingultus ex aceto ſedat: ſtomacho vtile, quẽ humor vexat. ſugillata tollit, ſi manducatũ cũ melle & vua paſſa illinatur: teſtiũ inflammationibus, adiectis eiſdem illitum medetur. Eſt & aliud ſylueſtris cumini genus, ſatiuo non diſsimile, quod à ſingulis floribus promit corniculla in ſublime exerta, in quibus ſemẽ eſt meláthio ſimile: quod potũ omnium ſerpentiũ morſibus præſidio eſt. Calculoſis & iis qui vrinæ ſtillicidio vexantur, aut concretum ſanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur: ſed apij ſemen feruefactum poſtea bibendum eſt.

Περὶ Κυμίνου ἀγρίου. Κεφ. ξθ'.

Κύμινον ἄγριον, φύεται μᾶλλον πλεῖον καὶ ἐπεργέτερον ἐν λυκίᾳ καὶ ἀσίᾳ τῆς γαλατίας, καὶ ἐν καρχηδόνι τῆς ἱσπανίας· ἔστι δὲ θαμνίον ἔχον καυλὸν τετραμερῆ, λεπτὸν, ἐφ' οὗ φυλλάρια δ'. ἢ ε'. λεπτὰ, οἱονεὶ πεπερισμένα, πρὸς κατάχρισιν ὡς γογγύλιον. καφάλια δὲ ἔχει ἐπ' ἄκρου ε'. ἢ ς'. τρογγύλα, μαλακὰ· ἐν οἷς ὁ καρπὸς ἀχυρώδης, γευομένῳ δὲ δριμύτερος τοῦ ἤμέρου. φύεται δὲ ἐν γεωλόφοις. πίνεται δὲ τὸ σπέρμα πρὸς τροφοὺς καὶ ἐμπυεμματώσεις σὺν ὕδατι· σὺν οἴνῳ δὲ λυγμοὺς παύει. πρὸς δὲ τὰ ἰοβόλα καὶ πλάδον τομάχου σὺν οἴνῳ· αἴρει δὲ καὶ ὑπόπια μασσηθὲν καὶ καταπλασθὲν σὺν μέλιτι καὶ σαφίδι. φλεγμονάς τε διδύμων ἰᾶται μετὰ τῶν αὐτῶν καταπλασσόμενον. Ἔστι δὲ ἕτερον γένος ἀγρίου κυμίνου ἐμφερὲς τῷ ἡμέρῳ, ἐξ ἑκάστου δ' ἄνθους * ἀφίησι κεράτια μετέωρα, ἐν οἷς ἔστι σπέρμα ὅμοιον μελανθίῳ· τοῦτο πινόμενον, πρὸς ἐρπετοδήκτους ἄριστον ἀλέξημα. βοηθεῖ δὲ σταγγουριῶσι καὶ λιθιῶσι καὶ αἵματος ῥόμβοις σὺν ὄξυσῳ. ὀπτηθὲν δὲ σιλίνου σπέρμα ἀπεψιάν.

Ammi

Περὶ Αμ-

Περὶ Ἀμμιος. Κεφ. ο'.

Ἀμμι, ἔνιοι δὲ τοῦτο αἰθιοπικὸν, οἱ δὲ, βασιλικὸν κύμινον καλοῦσιν. ἔνιοι δὲ ἑτέρας φύσεως τὸ αἰθιοπικὸν κύμινον ἔφασαν εἶναι, καὶ ἑτέρας τὸ ἄμμι. γνώσιμον δὲ τὸ σπέρμα τοῦτο, μικρότερον πολλῷ τοῦ κυμίνου, καὶ ὀριγανίζον τῇ γεύσει. ἐκλέγειν δὲ τὸ καθαρὸν καὶ μὴ πυρῶδες. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ τοῦτο θερμαντικὴν, πυρωτικὴν καὶ ξηραντικήν· ποιοῦσι δὲ πρὸς φθόους, δυσουρίας, καὶ θηριοδήκτοις ποτόμενον σὺν οἴνῳ· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα. μίγνυται καὶ τοῖς διὰ καυθαρίδος ἐκβριοῦσι πρὸς τὸ αὐτὰ πάσχειν τοὺς ὀπιγονιθήρας δυσουρίαις. καὶ ὑπόπια καταπλασθὲν σὺν μέλιτι αἴρει· τρίπτει δὲ καὶ χόαν ποτόμενον καὶ συγχριόμενον ἐπὶ τὸ χλωρότερον. καὶ μετὰ σταφίδος ἢ ῥητίνης ἐκτοδυμιώμενον, ὑστέραν ἀποκαθαίρει.

Περὶ κοείου. Κεφ. οα'.

Κόειον ἢ κοείαινον γνώσιμον, δυνάμιν ἔχον ψυκτικὴν. ὅθεν καταπλασσόμενον μετὰ ἄρτου ἢ ἀλφίτων, ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας ἰᾶται· σὺν μέλιτι δὲ καὶ σταφίδι σπυκτίδας, καὶ διδύμων φλεγμονὰς καὶ ἀνθρακας θεραπεύει· μετὰ ἐρεγμοῦ δὲ χειράδας καὶ φύματα διαλύει. τὸ δὲ σπέρμα ὀλίγον μὲν ποθὲν μετὰ γλυκέος ἑλμινθας ἐκβάλλει, καὶ

Ammi. Cap. LXX.

Ammi Æthiopicum cuminum appellant. plerique hoc natura diuersum esse ab illo existimant. Vulgo notum est: semen exile, multò minus cumino, origanum resipiens. Eligendum est purum, minimè furfurosum. Vis ei excalfactoria, feruens, & exiccans: facit ad tormina, vrinæ difficultatem, serpentium ictus, cum vino potum: menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ ecdoria vocant: vt inde exortis vrinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit, colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum vua passa aut resina, vuluas purgat.

Coriandrum. Cap. LXXI.

Corindrũ aut corianũ vulgaris est notitiæ, vim refrigeratoriã habẽs. Quare illitũ cũ pane aut poléta, ignibus sacris: & vlceribus quæ serpunt, medetur; epinyctidas cũ melle vel vua passa, testiũ inflãmationes, carbunculósq; sanat: cũ faba fresa, strumas & tuberculas discutit: tineas interaneorum expellit semen cum passo potum,

& genituram adauget. largius autem sumptum, mentem non sine periculo mouet: quare cõtinuo, & copiosiore vsu abstinendum. Succus cum cerussa, spumáve argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

Hieracium maguum.

Cap. LXXII.

Hieracium magnum, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi: vnde illitum stomacho æstuanti, inflammationibúsq; prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibratis à scorpione ictibus auxiliatur.

Hieracium paruum.

Cap. LXXIII

Hieracium paruum, folia eodem modo obtinet ex interuallis diuisa per ambitum: cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicant. Vim suã ad eadem ad quæ superior impendit.

Apium.

κὴ σπέρματος ἐστὶ ψυκτικόν. πλεῖον δὲ λιφθὲν κινεῖ τὴν διάνοιαν ὀπικινδύνως· ὅθεν δεῖ φυλάττεσθαι τὴν πλείονα κὴ συνεχῆ χρῆσιν αὐτῶ. ὁ δὲ χυλὸς σὺν μέλιτι ἢ λιθαργύρῳ κὴ ὄξει κὴ ῥοδίνῳ καταχριόμενος, ὠφελεῖ παὶ κὴ τὴν ὀπφάνειαν φλεγμονὰς παὶ πυρώδεις.

Περὶ Ἱερακίου τοῦ μεγάλου.

Κεφ. οϛ'.

Ἱεράκιον τὸ μέγα, καυλὸν ἀνίησι τραχὺν, ὑπέρυθρον, ἀκανθώδη, ὑπόκιον· φύλλα ἔχει ἐν διαστημάτων ἐστιχισμένα ἀραιῶς, στρογγύλα ἐμφερῆ τὴν πευφερείαν· αὐθη μήλινα ἐν κεφαλίοις ὑποπήκοις. δύναμιν ἔχει ψυκτικὴν, μετρίως ὑποσύφουσαν· ὅθεν στομάχῳ καυσουμένῳ καὶ φλεγμονὰς καταπλασσόμενον ἀρμόζει. ὁ δὲ χυλὸς καταῤῥοφούμενος, δυσεντερίαν* πραΰνει. ἡ δὲ ῥίζα σὺν τῇ ῥίζῃ καταπλασθεῖσα, σκορπιοπλήκτοις ἀρήγει.

Περὶ Ἱερακίου τοῦ μικροῦ. Κεφ. οζ'.

Ἱεράκιον τὸ μικρὸν, φύλλα ἔχει καὶ αὐτὸ ἐν διαστημάτων ἐστιχισμένα τὴν πευφερείαν· καυλία δὲ ἀνίησι πυφερὰ καὶ χλωρὰ, ἐν οἷς αὐθη μήλινα, κύκλον πειεχόφοντα. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ αὐτὸ τὴν αὐτὴν τῷ πρειεημένῳ.

Περὶ Σελί-

Περὶ Σελίνου. Κεφ. οδ'.

Σέλινον κηπαῖον, ἁρμόζει ἡ ποία πρὸς ἃ καὶ τὸ κόριον· καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς μετὰ ἄρτου, ἢ παιπάλης ἀλφίτου καταπλασσόμενον, καὶ καῦσον στομάχου παρηγορεῖ· μαστούς τε χονδριῶντας ἀνίησι· κινεῖ τε οὖρα ἑφθόν τε καὶ ὠμὸν ἐσθιόμενον. καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ τε καὶ τῶν ῥιζῶν πινόμενα. ἀντιπάσχει θανασίμοις φαρμάκοις· ἐμέτους κινοῦν· κοιλίαν τε ἐπέχει. τὸ δὲ σπέρμα ἐστὶν οὐρητικώτερον, βοηθοῦν καὶ θηριοδήκτοις, καὶ τοῖς λιθάργυρον πεπωκόσι. πνευμάτων τε ἐστὶ διαλυτικόν. μίγνυται δὲ καὶ ἀνωδύνοις καὶ θηριακαῖς καὶ βηχικαῖς χρησίμως.

Περὶ Ἐλαιοσελίνου.

Κεφ. οε.

Ἐλαιοσέλινον γινόμενον ἐν τοῖς ἐφύδροις τόποις, μεῖζον τοῦ ἡμέρου σελίνου· ποιεῖ δὲ ὅσα καὶ τὸ κηπευτόν.

Περὶ Ὀρεοσελίνου. Κεφ. ος'.

Ὀρεοσέλινον καυλός ἐστι σπιθαμιαῖος ἐκ ῥίζης λεπτῆς, περὶ δὲ αὐτὸν κλωνάρια καὶ κεφάλια κωνείῳ παρεμφερῆ, λεπτότερα μέντοι ἱκανῶς, ἐφ' ὧν ὁ καρπὸς ἐπιμήκης, δριμὺς, λεπτὸς, εὐώδης, ἐοικὼς κυμίνῳ· φύεται δὲ ἐν τόποις πετρώδεσι καὶ ὀρεινοῖς.

Δαύκ-

Apium. Cap. LXXIIII.

Hortenſis apij herba ad eadem ad quæ corianum conuenit: inflammationibus oculorum, cũ pane aut polenta illinitur: æſtuantem ſtomachum mulcet: mammarũ duritiá ex lacte concreto contractá reprimit: vriná ciet, ſiue crudum ſiue coctum edatur. Decoctũ eius radicíſque potum, venenorum noxæ reſiſtit, quum vomitiones excitet: aluum cohibet. Semen vehementius vriná pellit: cótra ſerpentiũ venena, aut epotá argenti ſpumá auxiliatur: inflationes diſcutit. Admiſcetur medicamétis quæ dolorũ leuamenta prȩſtát: theriacis quoq;, ac tuſsis remediis.

Eleoſelinum.

Cap. LXXV.

Eleoſelinum in humidis naſcitur, ſatiuo grãdius, & ad eadem efficax.

Oreoſelinum.

Cap. LXXVI.

Oreoſelinum, caule eſt dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum ramuli, & capitula cicutæ, multò tamen tenuiora: ſemine cumini oblongo, acri, & odorato, tenui: naſcitur in petroſis & montibus.

Vrinam ciet, ſemine ac radice in vino potis: menſes trahit. Antidotis, nec nō medicamētis vrinam cientibus, & excalfactoriis, inſeritur. Nec hallucinari nos oportet, exiſtimantes oreoſelinum eſſe, quod in ſaxis prouenit: aliud enim eſt petroſelinum.

Petroſelinum.
Cap. LXXVII.

Petroſelinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis: ſemine ammij, odoratiore, ſapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menſtrua: contra ſtomachi & coli inflationes, & tormina prodeſt: laterū, renum, & veſicæ doloribus in potu ſubuenit. Admiſcetur antidotis vrinam cientibus.

Hippoſelinum.
Cap. LXXVIII.

Hippoſelinū, Latini oluſatrū appellāt, aliqui ſmyrnion, quāuis aliud ſit, quod propriè ſmyrnion dicitur, vt paulò poſt referemus. Eſt autē maius & ſatiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habēte veluti lineas: foliis latioribus, in puniceū vergentibus: coma roriſmarini, florū plena, depēdētibus in cacumine corymbis, antè q̄ defloreſcat: ea ſemine turget nigro, oblon

Δυύαμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα οὐρητικὴν, ποθέντες ἐν οἴνῳ. ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα. μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις καὶ τοῖς διουρητικοῖς καὶ θερμαντικοῖς φυμάμεσιν. οὐ δεῖ δὲ πλανᾶσθαι νομίζοντας τὸ ὀρεοσέλινον εἶναι τὸ ἐν πέτραις φυόμενον· ἄλλο γάρ ἐστι τὸ πετροσέλινον.

Περὶ Πετροσελίνου.
Κεφ. οζ.

Σέλινον τὸ καὶ πετροσέλινον, τοῦτο φύεται ἐν μακεδονίᾳ, ἐν ἀποκρήμνοις τόποις· σπέρμα ἔχον ἐοικὸς ἄμμει, εὐωδέστερον δὲ καὶ θριμὺ καὶ ἀρωματίζον. οὐρητικὸν, ἐμμηνών ἀγωγόν· ἁρμόζει δὲ καὶ θώραξι στομάχου καὶ κώλοις ἐμπνευματώσεσι καὶ στρόφοις· θώραξί τε πλευρᾶς πόνοις καὶ νεφροῖς καὶ κύστεσι ἐν ποτῷ λαμβανόμενον. μίγνυται δὲ καὶ τοῖς οὐρητικοῖς ἀντιδότοις.

Περὶ Ἱπποσελίνου. Κεφ. οη.

Ἱπποσέλινον, οἱ μὲν, σέλινον, οἱ δὲ, ἀγριοσέλινον, οἱ δὲ, σμύρνιον καλοῦσι, ἕτερον τὸ κυρίως λεγόμενον σμυρνίου ὑπάρχοντος ὡς αὐτίκα ἱστορήσομεν. ἔστι μεῖζον καὶ λευκότερον τοῦ κηπευτοῦ σελίνου· χαυλὸς κοῖλος, ὑψηλὸς, τερφερὲς, οἱονεὶ γραμμὰς ἔχων· φύλλα πλατύτερα, ὑποφοινικόμενα, ἐν οἷς ὅταν ὡς λιβανωτίδος κόμη μεσὴ ἀνθοις, καὶ κορύμβοις φρὴν ἐξανθῆσαι σωρεῦσα· σπέρμα δὲ μέλαν, ὅπα-

ὀπυέχες, νασὸν, δριμὺ ἀρωματίζον· ῥίζα εὐώδης, λευκὴ, εὔστομος, οὐ παχεῖα φύεται ἐν συσκίοις καὶ παρ' ἕλεσι. λαχανεύεται δὲ ὡς καὶ τὸ σέλινον. καὶ ἡ ῥίζα δὲ ἐφθὴ καὶ ὠμὴ ἐσθίεται. τά τε φύλλα καὶ οἱ καυλοὶ ἐσθίονται ἐφθὰ, καθ' ἑαυτά τε καὶ μετ' ἰχθύων σκευάζεται καὶ ὠμὰ δὲ παρεσκεύασται εἰς ἡμέρας. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς πεπόνθασιν ἐν οἰνομέλιτι, ἐμμιλύων ἀγωγόν· θερμαίνει τε τὸν ῥιγοῦντας πυρέσσοντας καὶ συγχριόμενος· στραγγουρείας τε βοηθεῖ. καὶ ἡ ῥίζα δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ.

Περὶ Σμυρνίου. Κεφ. οθ'.

Σμύρνιον ὅσον ἐν κιλικίᾳ πετροσέλινον καλοῦσι γονάσιμον πλεῖστον ἐν τῷ λεγομένῳ ἀμανῷ ὄρει. καὶ τοῦτο καυλὸν μὲν ἔχει ὅμοιον σελίνῳ, πολυφυάδας ἔχοντα πολλὰς· φύλλα δὲ πλατύτερα πρὸς τὴν γῆν, καὶ ὑποδεικλᾶ), ὑπολίπαρα, ῥωμαλέα καὶ εὐώδη σὺν δριμύτητι, φαρμακώδη τε καὶ ὑπομιλίζοντα τὴν χρόα· σκιάδιον δὲ ἐπὶ τῷ καυλῷ ἀνηθοειδές· σπέρμα τροχοειδὲς, ὅμοιον τῷ τῆς κράμβης, μέλαν, δριμὺ, γευομένῳ ὡς σμύρνα, ἐν αὐτῷ ἑνός ποιῶ· ἡ δὲ ῥίζα δριμεῖα, εὐώδης, ἁπαλὴ, πολύχυλος, δάκνουσα τὴν φάρυγγα· φλοιὸν ἔχουσα, ἔξωθεν μὲν μέλαιναν, ἔνδοθεν δὲ χλωρὸν ἢ ὑπόλευκον. φύεται δὲ ἐν πετρώδεσι τόποις καὶ χωλόφοις, καὶ

oblongo, acri, solido, aromatico: radix dimittitur odorata, candida nec crassa, quæ os cómendat. In vmbrosis & palustribus nascitur. olerum generis, vt apium. radix cruda coctáue estur. Folia cum caulibus decocta mánduntur, & per se aut cú piscibus præparátur, crudáq; muria códiuntur. Vim hanc habet, vt poto semine ex mulso vino méses cieat: algentes calfacit potu aut illitu: vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Smyrnium. Cap. LXXIX.

Smyrnion, quod in Cilicia petroselinum vocant, plurimũ in amano móte gignitur. Caulé habet apij, & stolones multos: folia latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, colore subluteum languescente: capitibus caulium orbiculatis, vt anethi: semine brassicæ, rotundo, nigro, sapore aspero, sicut myrrha, ita vt alterum alterius loco cadat. radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis: cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, at-

que ſqualidis, & limitibus terrenis. Vis radicis, herbæ, & ſeminis excalfacere. Foliis muria maceratis ad obſonia vtuntur, aluum ſiſtunt, radicem contra ſerpentiũ ictus bibere conuenit, tuſſes & orthopnœas mitigat, vrinæ difficultati medetur: recentes tumores, collectiones, duritiasque diſcutit, illita, & vulnera ad cicatricem perducit: partus abortu vitiat, ſi feruefacta ſubiiciatur. Semen, lienis, renum & veſicæ vitiis prodeſt: menſes & ſecundas pellit: commodè datur iſchiadicis in vino, inflationes ſtomachi lenit, ſudores ciet, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

Elaphoboſcum.

Cap. LXXX.

Elaphoboſco fœniculaceus caulis eſt, aut rorimarino ſimilis, geniculatus: foliis duũm digitorum latitudine, vt terebinthi, prælongis, aliquantum aſperis, circumfractis: adnata multa habet, ferentia vmbellas anethi ſimiles, & ſemina eiuſdem: florem ſubluteum: radice ternũm digitorum longitudinis, & craſſitudinis vnius, candida, dulci, eſui apta.

Caulis

καὶ ἀνίκμοις καὶ γωνίαις χερσευούσαις. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα καὶ ἡ πόα καὶ ὁ καρπὸς θερμαντικήν. λαχανεύεται δὲ καὶ εἰς ταὶ δημαίας τὰ φύλλα, κοιλίαν τε ἵστησιν· ἡ δὲ ῥίζα πινομένη ἑρπετοδήκτοις αἱμόζει, θεραπεύει δὲ καὶ βῆχας καὶ ὀρθοπνοίας, καὶ δυσουρίας ἰᾶται· καταπλασσομένη δὲ τὰ θέρματα οἰδήματα, καὶ φλεγμονὰς καὶ σκληρίας διαφορεῖ, τραύματά τε ἄχρις ἐπουλώσεως ἄγει· ζεθεῖσα δὲ καὶ προσθεῖσα ἐξαμβλώσκει· καὶ τὸ σπέρμα δὲ αὐτῆς, θερμὸν νεφροῖς καὶ πλεύμονα καὶ κύστιν αἱμόζει· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα καὶ δεύτερα· θερμὸν δὲ ἰχθάδας μετ' οἴνου πινόμενον αἱμόζει, καὶ στομάχου ἐμπνευματώσεις θεραπεύει, ἔστι δὲ καὶ ἱδρωτικὸν, ἐρευκτικόν. ἐδέσι πινόμενον θερμὸν ὕδρωπας καὶ θερμὸν δύσεις.

Περὶ Ελαφοβόσκου.

Κεφ. π'.

Ελαφόβοσκον καυλὸς ὅτι λιβανωτίδι ἢ μαραθρῳ ἐμφερὴς γονιωμένος· φύλλα δὲ δάκτυλα τὸ πλάτος, ἰκμάδα σπερμώδη ὡς τερέβινθον, θερμοκλασμένα τραχέα πόσει. ἔχει δὲ παραφυάδας ἰκμὰς ὁ καυλὸς, σκιάδια ἐχούσας ὅμοια ἀνήθῳ, ἀνθη ὑποκίτρινα, καὶ τὸ σπέρμα ἀνήθῳ ἐμφερές· ῥίζα ὡς πεδάκτυλος τὸ μῆκος, πάχος δακτύλου, λευκὴ, γλυκεῖα, ἐδώδιμος.

καὶ

καὶ ὁ χυλὸς ἢ λαχανεύῃ ἀρτιφυὴς ὢν. ταύτην φασὶ τὴν πόαν ταῖς ἐλάφοις γευμωθείσας, ἀντέχειν τοῖς τῆ ἑρπετῶν δήγμασι. ὅθεν καὶ τὸ σπέρμα δίδοῦ τοῖς ἑρπετοδήκτοις σὺν οἴνῳ. Περὶ Μαράθρου. Κεφ. ϛά.

Μάραθρον, αὕτη ἐδωμόλυνη πόα, δύναται γάλα κατασπᾶν. καὶ τὸ σπέρμα δὲ πινόμενον ἢ συνεψόμενον πίσασάνῃ. τὸ δὲ ἀφέψημα τῆς κόμης ὑποτιθὲν, νεφριτικοῖς τοῖς περὶ κύστιν χρήσιμον, διυρητικὸν ὑπάρχον. ἁρμόζει δ' ἑρπετοδήκτοις σὺν οἴνῳ πινόμενον. καὶ καταμήνια ἄγει. ἐν πυρετοῖς δ' ναυτίαν καὶ κοῦσον στομάχου παραιρεῖται μετὰ ψυχροῦ ὕδατος πινόμενον. αἱ δὲ ῥίζαι λεῖαι σὺν μέλιτι καταπλασθεῖσαι, κυνόδηκτα θεραπεύουσιν. ὁ δὲ χυλὸς ἐκθλιβέντων τῶν χλωρῶν καὶ τῶν φύλλων ἐν ἡλίῳ ξηρανθεὶς, εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ὅσα πρὸς ὀξυδορκίαν σκευάζεται χρησίμως. χυλίζεται δὲ καὶ τὸ σπέρμα πρὸς τὰ αὐτὰ χλωρὸν, ἔτι σὺν τοῖς φύλλοις καὶ τοῖς ἀκρέμοσι, καὶ ἡ ῥίζα κατὰ πλῶ πρόπλυσιν ἐκθλάσηση. Ἐν δὲ τῇ πρὸς ἑσπέραν ἰσημερίᾳ, καὶ ὁπόταν ἀνίσην ὁμοίου κόμμι ἀποθυειζόντων ἐν τῇ ἀνθούσῃ μίσην τὴν χυλὸν τῶν ὀπῶν, καὶ πυρὶ παραπιθέντων, ἵνα ὑπὸ τὴν θυμασίας οἱονεὶ ἀφιδρῶσι ἐκκάλῃ τὸ κόμμι. ἔστι δὲ ἐνεργέστερον τὸ χυλὸ πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ τοῦτο.

Περὶ

Caulis tener pro olere mandi tur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium morsibus resistere.

Fœniculum. Cap. LXXXI.

Fœniculum si herba edatur, aut semen cũ ptisana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum in renum dolorib⁹ subditũ proficit, quippe quòd vrinam excitet: contra serpentium ictus in vino conuenienter bibitur, mẽses ciet: in febribus nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Cótritæ radices & cum melle illitæ, morsib⁹ canũ medentur. Succus caule & foliis exprimitur, & in sole siccatus, in medicaméta adiicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadẽ valens, etiam semine viridi, ramulísque & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia quæ ad occidentem spectat, succum reddit gũmi simile. Caulem medium, dum herba floret rustici demetunt, igniq; admouent, quò facilius vi coloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculũ

Fœniculũ erraticũ, siue hippomarathrũ. Cap. LXXXII.

Est & sylueſtre fœniculum, magnũ: fert autẽ semẽ cachryi simile, cuius radix iucũdè olet, potaq; ſtranguriæ medet: mẽſes impoſita ciet: ventrẽ ſiſtit, radice aut ſemine poto, & cõtra ſerpentium morſus auxilia tur, calculósque cõminuit, & regium morbum expurgat: lactis abundantiã facit decoctũ foliorũ hauſtũ & fœminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & anguſto folio: ſemine coriádri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturã habet, & viribus fœniculo reſpõdet, ſed ad omnia infirmius.

Περὶ Ἱππομαράθρου. Κεφ. πβ΄.

Ἱππομάραθρον μάραθρόν ἐστιν ἄγριον μέγα· φέρει δὲ σπέρμα κάγχρυϊ ὅμοιον, ῥίζαν ὑπόλευκον εὐώδη, ἣν πίνουσιν κρατοῦσαι στραγγουρίας ἰᾶται· ἔμμηνα κινεῖ· πρόσιθι μύρῳ· τὸ δὲ σπέρμα καὶ ἡ ῥίζα κοιλίαν ἵστησι· πινόμενα θηριοδήκτοις τὸ βοηθεῖ, καὶ λίθους θρύπτει καὶ ἴκτερον ἀποκαθαίρει. Τὸ δὲ φύλλον τὸ ἀφέψημα πινόμενον γάλα ἄγει, καὶ τὰς ἐκ τοκετῶν γυναῖκας ἀποκαθαίρει. καλεῖται καὶ ἕτερον ἱππομάραθρον. φύλλα ἔχον σινὰ, μικρὰ, θρυμμικὸν· καρπὸν δὲ στρογγύλον ὅμοιον τῷ τοῦ κοείου, σπερμώδη, εὐώδη, θερμαντικόν· ἀναλογεῖ δὲ αὐτῷ ἡ δύναμις τῷ θερμοτέρῳ, ἀσθενέστερον ἐνδοῦσα.

Περὶ Δαύκου. Κεφ. πγ΄.

Δαῦκος, οἱ δ' ἄγριον καλοῦσιν. ὁ μὲν τις ὀρθὸς κρητικὸς, μαράθρου ἔχων τὰ φύλλα ὅμοια, μικρότερα δὲ καὶ λεπτότερα· καυλὸν σπιθαμιαῖον, σκιάδιον ὅμοιον κοειάνῳ, αὐθη λευκά· ἐν δὲ τούτοις ὁ καρπὸς σπερμοὺς, λευκοὺς, θαμοὺς ἐν τῷ διαμασᾶσθαι εὐώδης· ῥίζα δακτύλη τὸ πάχος· τὸ δὲ μῆκος σπιθαμῆς· γυμνᾶται δὲ ἐν πεδιάδεσι τόποις, καὶ ἐυηλίοις. Ὁ δέ τις αὖτ ἐστι σελίνῳ ἀγρίῳ παραπλήσιος ἀρωματώδης σπερμοὺς καὶ εὐώδης γευσμάτων καὶ πυρώδης διαφέρει δὲ ὁ κρητικός.

Fœniculũ erraticũ, ſiue hippomarathrũ. Cap. LXXXII.

Eſt & ſylueſtre fœniculum, magnũ: fert autẽ ſemẽ cachryi ſimile, cuius radix iucũdè olet, potaq; ſtranguriæ medet: mẽſes impoſita ciet: ventrẽ ſiſtit, radice aut ſemine poto, & cõtra ſerpentium morſus auxilia tur, calculósque cõminuit, & regium morbum expurgat: lactis abundantiã facit decoctũ foliorũ hauſtũ & fœminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & anguſto folio: ſemine coriádri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturã habet, & viribus fœniculo reſpõdet, ſed ad omnia infirmius.

Daucum. Cap. LXXXIII.

Daucum aliqui Dauciũ vocant. Creticum foliis fœniculo ſimile, minoribus & tenuioribus: caule dodrantali, vmbella coriandri, flore albo: ſemine acri, cãdido, hirſuto, ſuauiſſimi odoris in mandendo: radix digitali craſsitudine, & dodrãtis longitudine adoleſcit: in ſaxoſis naſcitur, & locis ſole illuſtratis. Aliud eius genus, ſylueſtri apio ſimile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis guſtus. Probatiſsimum Creticum.

Tertium

Τὸ δὲ τρίτον εἶδος κορίῳ φύλλα ἔοικε. καὶ τὰ ἄνθη λευκά, κεφαλὴν δὲ ἔχει καὶ καρπὸν ὅμοια ἀνήθῳ, ἐφ' ᾗ σκιάδιον ἐμφερὲς σταφυλίνῳ· σπέρματος ἐπιμήκους πλήρεις ὡς κυμίνου δριμέως. Τὸ δὲ σπέρμα πάντων δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν πινόμενον ἐμμήνων, ἐμβρύων, καὶ οὔρων ἀγωγόν, καὶ στρόφων ἀπαλλακτικόν, βηχῶν χρονίων πραΰντικόν· ἀρήγει δὲ καὶ φαλαγγιοδήκτοις ποθὲν σὺν οἴνῳ· διαφορεῖ δὲ καὶ οἰδήματα καταπλασθέν· ἡ δὲ χρῆσις τῶν μὲν ἄλλων τοῦ σπέρματος μόνον. τοῦ δὲ κρητικοῦ καὶ τῆς ῥίζης, ἥτις μάλιστα πρὸς τὰ θηρία πίνεται μετ' οἴνου.

Περὶ Δελφινίου. Κεφ. πδ'.

Δελφίνιον κλῶνας ἀνίησι διπιθάμους ἢ καὶ μείζονας ἀπὸ μιᾶς ῥίζης περὶ οὓς φυλλάρια ἐπεσχισμένα λεπτά, ἐπιμήκη, δελφινοειδῆ· ὅθεν καὶ ὠνόμασται. ἄνθος δὲ ὅμοιον λευκοΐῳ, ἐμπόρφυρον· σπέρμα ἐν λοβοῖς κέγχρῳ ἐμφερές, ὃ βοηθεῖ ποθὲν ἐπὶ οἴνῳ σκορπιοπλήκτοις, ὡς οὐδὲν ἕτερον. φασὶ δὲ καὶ τοὺς σκορπίους παρατεθείσης τῆς πόας παραλύεσθαι· ἀπράκτους τε καὶ ναρκώδεις γίνεσθαι, ὑφαιρεθείσης δὲ εἰς τὸ αὐτὸ καθίστασθαι. φύεται δὲ ἐν τραχέσι καὶ εὐηλίοις τόποις.

Περὶ Δελφινίου ἑτέρου.

Κεφ. πε'.

Δελφίνιον ἕτερον, οἱ δὲ ὑάκινθον, ῥωμαῖοι

Tertium aſsignatur genus foliis coriandri, floribus albis, capite & ſemine anethi, muſcario paſtinacæ: ſemine oblógo, ceu cumini, acri. Omnium ſemen excalfacit: potũ vrinam, menſes, & partus extrahit, torminibus liberat, veterem tuſſim mitigat: phalangiorũ morſibus potum in vino auxiliatur: tumores illitu diſcutit. Seminis duntaxat in aliis generibus inualuit vſus: in Cretico, etiam radicis, quæ maximè contra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

Delphiniũ. Cap. LXXXIIII.

Delphinium, ſurculos emittit à radice vna ſeſquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuiſa, prælonga, quæ delphinorũ effigiẽ repræſentant: vnde tractũ nomen eſt. Flos violæ albæ non diſsimilis, purpureus: & ſemen in ſiliquis, milio proximũ, quo nõ aliud vtilius bibi poteſt, ab ſcorpione percuſsis. Aiũt enim obiecta herba, ſcorpiões reſolui, atq; ignauos torpeſcere: ſemota verò ea, ſeſe recolligere. Prouenit in aſperis & apricis.

Delphinium alterum.

Cap. LXXXV.

ALTErum eſt delphinium, quod

quod Romani bucinũ vocãt, ſuperiori ſimile, ſed foliis & ramis longè gracilius. Viribus eiſdem pollet, ſed non ita efficacibus.

Pyrethrũ. Cap. LXXXVI.

Pyrethrum Romani ſalinarem vocant, folia caulémque emittit vt daucum ſylueſtre & fœniculũ: vmbellámq; anethi, circinatæ rotunditatis. Radix longa eſt, pollicis craſſitudine, guſtu feruidiſſimo. Pituitatem elicit: ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: manſa pituitam extrahit: ſudores ciet, perunctо ex oleo corpore: diuturnis horribꝰ efficax eſt & cõtra perfrictiones membrorum, reſolutionésque eximiè conducit.

Roſmarinꝰ. Cap. LXXXVII.

Duo roſmarini genera: vnũ fœcundum frugiferúmque, cuius ſemẽ canchrys vocatur: folia fœniculi habet, craſſiora & latiora, in rotæ ſpeciem, humi ſparſa, iucundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concauum alis: in cacumine vmbellã, in qua ſemen copioſum, candidũ, ſphõdylo ſimile, rotundum, anguloſum, acre, reſinaceũ, quod in mandendo linguam exurit: radix

ρωμαῖοι βικκίνας, ᾗ αὐτὸ ἐμφερὲς τῷ περὶ αὐτῆς, τοῖς δὲ φύλλοις ᾗ τοῖς κλωνίοις ἰσχνότερον πολλῷ. δύναμιν ἔχον ᾗ αὐτὸ ἧττον τῷ θερμῷ οὐχ ὅτου δὲ ἐνεργές.

Περὶ Πυρέθρου. Κεφ. ϙϛ'.

Πύρεθρον πᾶς ὀζὴ χαμαὶ ἀνιεῖσα καὶ φύλλα ὥσπερ δαῦκος ἄγριος καὶ μάραθρον· σπέρμα δὲ ὡς ἀνήθου τετραεδές. ῥίζα δακτύλου μεγάλου τὸ πάχος μακρὰ, γευσαμένῳ, πυρωτικωτάτη. φλέγματός ἐστιν ὅπασα τική, διὸ ᾗ τοῖς ὀδοντολγίαις βοηθεῖ μεθ' ὄξους ἐψηθεῖσα ᾗ διακλυζομένη· ἄγει δὲ ᾗ φλέγμα διαμασσηθεῖσα· συγχριομένη δὲ μετ' ἐλαίου, ἰδρῶτας κινεῖ ποιοῦσα πρὸς τὰ χρόνια ῥίγη, καὶ πρὸς ἐψυγμένα δὲ ἢ παρειμένα μέρη τοῦ σώματος, ἄκρως ἁρμόζει.

Περὶ Λιβανωτίδος. Κεφ. ϙζ'.

Λιβανωτὶς διττή, ἡ μὲν τις κάρπιμος, ἣν οἰνίαν δὲ ζέα, ἡ καμψάνεμα καλουμένη, ἧς ὁ καρπὸς κάγχρυς καλεῖται· φύλλα ᾗ ἔχει μαράθρῳ ὅμοια, παχύτερα δὲ ᾗ πλατύτερα πρόχειρα δῶς, ὅτι ἧττον ἐστρωμένα, ἐνώδη· χαμαὶ ᾗ ὅσον πήχεως ᾗ μείζονα, μασχάλας ἔχοντα πολλὰς, ᾗ ἐπ' ἄκρῳ σπέρμα ἐφ' ᾧ καρπὸς πολὺς, λευκὸς ἐοικὼς σφονδύλῳ, θερμὸς δριμὺς, γονίας ἔχων, δριμὺς, ῥητινίζων, ὃν ᾗ τῷ διαμασᾶσθαι ἐπιχάων ἧττον γεύσιν.

ῥίζα

ρίζα δὲ λευκὴ εὐμεγέθης, ὀζουσα λιβανώτῳ. Ἡ δὲ ἑτέρα κατὰ πάντα ὁμοιοῦται τῇ περὶ αὐτῆς σπέρμα φέρ πλατύ, μέλαν, ὡς σφονδύλιον, εὐῶδες, ἂ πυρωτικὸν, ῥίζαν ἐκ μὲν τῶν ἐκτὸς, μέλαιναν, θλασθεῖσαν δὲ λευκήν. Ἡ δὲ λεγομένη ἄκαρπος κλῆ πάντα ὁμοία ὅσα τῇ προειρημένῃ, ἔστε χαμαὶ ἀγίνουσι ἔτι αὐθος ἔτι σπέρμα. φύεται ἐν πετρώδεσι καὶ τραχέσι τόποις. πασῶν δὲ κοινῶς ἡ πόα καταπλασθεῖσα λεῖα αἱμορροΐδας στέλλει, φλεγμονάς τε ταῖς καταδακτύλιον περαύνει, καὶ κονδυλώματα καὶ χοιράδας, καὶ τὰ δύσπεπτα τῶν ἀποσημάτων συμπίπτει. αἱ δὲ ῥίζαι ξηραὶ σὺν μέλιτι ἕλκη ἀναπαθαίρουσι, καὶ τρόφιμα ἰῶντα· καὶ θηριοδήκτοις ἁρμόζουσι σὺν οἴνῳ πινόμεναι· ἔμμηνά τ ἄγουσι καὶ οὖρα, διαφορεῖσι δὲ καὶ οἰδήματα παλαιὰ καταπλασσόμενα. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πόας ὀξυδερκεῖς, μιγνύμενος μέλιτι καὶ ἐγχριόμενος. ὁ δὲ καρπὸς πινόμενος, τὰ αὐτὰ ποιεῖ. βοηθεῖ καὶ ὀπληφίαις καὶ ταῖς ἐν θώραξι παλαιαῖς διαθέσεσιν· ἰκτερικοῖς τε μὴ πεπέρεως καὶ οἴνου διδόμενος· ἔστι δὲ καὶ ἰδρωτικὸς σὺν ἐλαίῳ ἀλειφόμενος· ἁρμόζει καὶ ῥύγμασι, καὶ ἀπόσμασι· ποδάγραις τὸ καταπλασσόμενος λεῖος σὺν αἰείνῳ ἀλεύρῳ καὶ ὄξει δριμεῖ

radix thus redolet, candida, grandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum vti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frágatur, alba. Verùm id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinē refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis & aspe ris. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluuia sistit, sedis inflammationes & condylomata mitigat, cōcoquit strumas & absessus, qui ad maturationē ægrè perducuntur. Siccæ radices cum melle vlcera purgant: torminibus medentur cum vino potæ, & contra serpentium morsus conueniunt: menses & vrinas cient, ueteres tumores illitu discutiunt. Tam radicis quàm herbæ succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet: si comitiale malum sentiatur, aut vetus pectoris vitium, auxilio est: regio morbo laborantibus cū vino & pipere datur: sudores mouet, cum oleo perūctum: ruptis & conuulsis prodest: podagris, cū loliacea farina, & aceto tritū illinitur,

purgat

purgat vitiligines, addito aceto quàm acerrimo, Semine in potionibus vtendum, eius quidem quod Canchryn non ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, foliis lactucæ sylvestris amaræ asperioribus, candidioribúsque, radice breui, Theophrastus author est: potúq; idipsũ alterutra parte purgare.

Căchrys. Cap. LXXXVIII.

Canchrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exiccandi: quare abstergentibus medicamẽtis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur: ita vt tertio die soluatur.

Rosmarinú coronarium. Cap. LXXXIX.

Rosmarinum quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè virentia, graui odore. Excalfactoria vi præditum est: regium sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur: & vbi laborãs exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinóq; vnguẽto admisceri solet.

Sphondyliũ.

ἀλφούς τε σμήχει, μιγνύμενός ὄξει δριμυτάτῳ. τῷ σπέρματι δὲ εἰς τὰ ἀποσήματα χρῶνται δεῖ δὲ μὴ τὸ κάγχρυ φερούσης λιβανωτίδος, δριμὺ γὰρ ὂν ἐκεῖνο καὶ βαρυτικὸν τῆς ἀρτηρίας. Θεόφραστος δὲ ἱστορεῖ μετὰ τῆς ἐρείκης λιβανωτίδα θρίδακι ἀγρίᾳ τὴν πικρὰν ὁμοίαν φύλλα ἔχουσαν φύεσθαι, ῥίζαν δὲ βραχεῖαν· καθαίρειν δὲ ἄνω καὶ κάτω τοῦτο ποθεῖσαν λευκότερα μέν τοι καὶ τραχύτερα τὰ φύλλα τῶν τῆς θριδακος.

Περὶ Κάγχρυος. Κεφ. πή.

Τὸ μὲν κάγχρυ δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν, ἀναξηραντικὴν σφόδρα· ὅθεν ἁρμόζει σμήγμασι μιγνύμενον πρὸς ῥευματιζομένους ὀφθαλμοὺς, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιπλαστόμενον, καὶ ἀποσμώμενον μιᾷ ἡμέρᾳ τρεῖς.*

Περὶ Λιβανωτίδος. Κεφ. πθ'.

Λιβανωτὶς ἣν ῥωμαῖοι καλοῦσιν ῥοσμαρείνην, καὶ οἱ στεφανοπλόκοι χρῶνται, ῥάβδοι εἰσὶ λεπταὶ, πολλὰς τὰ φύλλα λεπτὰ, πυκνὰ, σπιμύκνα καὶ ἰσχνὰ, ἔνδοθεν λευκὰ, ἐκτὸς δὲ τοῦ ἐκτὸς χλωρὰ βαφύοσμα. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν· ἱκτέρου ἰατικὴν, ἐάν τις αὐτὴν ἑψήσας ἐν ὕδατι δῷ πρὸ τῶν γυμνασίων ποιεῖν. εἶτα γυμνάζων λούῃ καὶ οἶνῳ πότιζε, μίγνυται δὲ καὶ ἀκόπιος καὶ τῷ γλευκίνῳ χρίσματι.

Περὶ

Περὶ Σφονδυλίς. Κεφ. ϟ'.

Σφονδύλιον φύλλα μὴν ἔχει κτὶ πάσσον ἐοικότα πλατάνῳ * πρὸς τὰ τῶ παίακος· καυλοὺς δ' πηχυαίους ἢ καὶ μείζονας, ἐοικότας μαράθρῳ, σπέρμα δ' ἐπ' ἄκρῳ ὅμοιον σταφυλῇ, διπλοῦν, πλατύτερον δὲ καὶ λευκότερον καὶ ἀχυρωδέστερον, βαρύοσμον· αἱ δὲ ῥιζαι λευκαί· ῥίζαν λευκὴν, ῥαφάνῳ ἐμφερῆ. φύεται δ' ἐν ἑλώδεσι καὶ ὑδρηροῖς χωρίοις. Ὁ δὲ καρπὸς αὐτῶ πότιμος, ἐκκρίνει κτὶ κοιλίαν φλεγματώδεις· ἰᾶται δὲ πνιγμένην ἡπατικὴν, ἰκτερικὴν, ὀρθοπνοϊκὴν, σπληνικὴν, καὶ ὑστερικὴν πνίγα. σὺν θυμιάματι δὲ ἀναλαμβανόμενος τὸν καταφερόμενον. σὺν ἐλαίῳ δὲ ἐμβρεχόμενος ἐπὶ κεφαλῆς, ἁρμόζει φρενητικοῖς, λιθαργικοῖς, κεφαλαλγοῦσι· ἐπέχει δὲ καὶ ἕρπητας σὺν πηγάνῳ καταπλασθείς. ἡ δὲ ῥίζα δίδοται ἰκτερικοῖσι καὶ ἡπατικοῖς. θεραπεύσασα δὲ καὶ ἐντεθεῖσα θεραπεύει τύλους τοὺς ἐν σύριγξι. ὁ δὲ αὐτὸς χλωρὸς ὁ χυλὸς πρὸς εἰλκωμένα ὦτα καὶ πυορροοῦντα ἁρμόζει· ἀποτίθεται δὲ ὑλαζόμενος ὡς τὰ λοιπὰ χυλίσματα.

Shpondylium. Cap. XC.

Sphondyliũ folia quadãmten⁹ platani & panacis habet: caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgẽtes, in quorum cacumine semẽ duplex, sesel similẽ, sed latius, cãdidius, & magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per alnum extrahit: medetur iocineris vitiis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vuluarum strangulationi. Veternosos suffitu renocat: cum oleo commodè infunditur capitibus phrenetico rum, & lethargicorum, item capitis dolorib⁹: cum ruta illitũ, serpentia vlcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrasa eadem & iniecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulẽtisque accommodatur: qui cæterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Περὶ Νάρθηκος. Κεφ. ϟα'.

Νάρθηξ, τότε χλωροῦ ὄντος ἢ ἐντεινάνη πνιγμὸν αἱμοπτοϊκοὺς καὶ κοιλιακοὺς ἀφελεῖ, καὶ ἐχοδύκτοις δίδοται σὺν οἴνῳ, καὶ

Ferula. Cap. XCI.

E viridi ferula medulla potu vtilis est ad cruentas excreationes, cœliacosq;, & cõtra viperarũ morsus in vino datur, erũpentéq;

erumpentémque naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosis auxiliatur: sudores ciet, vncto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: muria conduntur. Ferula itaque caulem profert ternûm sæpe cubitorum: folia fœniculi, longè asperiora, & latiora. qua ab imo caule vulnerata sagapenum efficitur.

καὶ ταῖς ἐκ ῥινῶν αἱμορραγίας ἐπίσχει ἐντιθεῖσα. τὸ δὲ σπέρμα σροφιμώτερον πηγάνου ὠφελεῖ. καὶ ἰδρῶτας κινεῖ χρίσμενον μετ' ἐλαίου. οἱ δὲ χυλοὶ βρωθέντες κεφαλαλγεῖς εἰσί· τακείχεται δὲ ἡ εἰς ταῖς ἁλμυρίσι. ὁ γὰρ ναρθηξ χυλὸν ἀναφέρει βίπτυχυν πολλάκις. φύλλα δ' ἔχει μαράθρῳ ἐμφερῆ, παχύτερα δὲ πολύ καὶ μείζονα. ἐξ ὧν καὶ τὸ σαγάπηνον γίνεται, κολαπτομένου σερὶ τὴν ῥίζαν.

Peucedanũ. Cap. XCII.

Peucedanum, caulem mittit tenuem, gracilétum, fœniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq́; flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa, gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensque è plaga succus vmbræ mandatur: in sole siquidé confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiatur. Assatione radix inutilis fit. Tam lac q̃ succus radice & caulib⁹ extrahi solet, sicuti è mãdragora: verũ inefficacior succo lachryma habet, & velocius expirat. Interdũ etiã cõcreta inuenitur lachryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq́; adhærés.

Præfertur

Πεκεδάνου. Κεφ. ϟβ'.

Πευκέδανος χαυλὸν ἀγίνει λεπτὸν, ἰσχνὸν, μαράθρῳ ὅμοιον· κόμμι δ' ἔχει σερὶ σὶν ῥίζαν ἱκανὴν ἡ πυκνὴ· ἄνθος μέλινον, ῥίζαν μέλαιναν, παχύοσμον, ἀδρὰν μετρίην ὀπῶν, φύεται ἐν ὄρεσι συσκίοις. Ὀπίζεται δὲ ἡ ῥίζης ἀπαλῆς ἀποτεμνομένης μαχαίρᾳ, καὶ τὸ ἀπορρέον εὐθὺς ἐν σκιᾷ πήγνυται· τάχος γὰρ τῷ ἡλίῳ ἀνίεται, ἐν ᾧ τῶν συλλέγεται κεφαλαλγίαν ποιεῖ ἡ σκοτώματα. ἐὰν μή τις σερόθηται χρίσει αὐτὴ ταῖς ῥῖναις ῥοδίνῳ ἡ τὴν κεφαλὴν σερικαταβρέξῃ, ἄχρηστος δὲ γίνεται ὀπωθεῖσα ἡ ῥίζα. ὀπίζονται δὲ ἡ οἱ χυλοὶ ἡ χυλίζουσι, ἡ ἡ ῥίζα ὡς μανδραγόρας· ἧττον δὲ ἐνεργεῖ τοῦ χυλοῦ, ὁ ὀπὸς ἡ τάχιον ἐκπνεῖ. εὑίοτε δὲ εὑρίσκεται σερικρὸς δάκρυον, ὅμοιον λιβανωτῷ τοῖς χυλοῖς ἡ ταῖς ῥίζαις σερισταλαγμένον.

Τῆς

Τὸ δὲ ὑπῶ διαφερῆ ὁ ἐν σαρδονίᾳ καὶ σαμοθράκῃ γινόμενος, βαρύοσμος, ἐξ ἐρύθρος, θερμαίνων τὴν γεῦσιν· ἁρμόζει δὲ σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ καταχριόμενος, λιθαργικοῖς, φρενιτικοῖς, σκοτωματικοῖς, ἐπιληπτικοῖς, κεφαλαλγέσι χρονίοις, παραλυτικοῖς, ἰσχιαδικοῖς. ὅσωμυόσις. καὶ καθόλου τοῖς ἐκ νεύρα πάθεσι συγχριόμενος μετ' ἐλαίου καὶ ὄξους. ἔστι δὲ καὶ ὑπορραντικὸς πρὸς ὑστερικάς, καὶ τὴν καταφερομένων ἀναλυτικός· διώκει δὲ θηρία θυμιώμενος· ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς ὠταλγίαν ἐνταζόμενος σὺν ῥοδίνῳ καὶ πρὸς ὀδοντα λγίαν ἐπιθεμενος βρώμασι. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς βῆχας μετ' ὠοῦ λαμβανόμενος δυσπνοίαις τε καὶ φθόροις καὶ πνευματικαῖς διαθέσεσιν ἁρμόζει, κοιλίαν τε ἁπαλῶς μαλάττει, καὶ σπληνὸς τήκει, καὶ δυσκρασίας ἐξέχως ἀρήγει· πρὸς τε πόνους καὶ διατάσεις κύστεως καὶ νεφρῶν πινόμενος ποιεῖ· ἀναστομοῖ δὲ καὶ ὑστέραν. χρησίμη δὲ καὶ ἡ ῥίζα πρὸς τὰ αὐτα, ἔλαττον ἐνεργοῦσα. πίνεται δὲ αὐτῆς τὸ ἀφέψημα, καθαίρει δὲ λεία ξηρὰ τὰ ῥυπαρὰ ἕλκη, καὶ λεπίδας ἀπὸ ὀστέων ἀφίστησι, καὶ ἐπουλοῖ τὰ παλαιά· μίγνυται δὲ καὶ κηρωτῇς καὶ μαλάγμασι θερμαντικοῖς. ἐκλέγειν δὲ τὸ πρόσφατον, ἄβρωτον, στερεὸν, πλῆρη ὀσμῆς.

Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum peucedanum prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus, in vniuersum, vitiis neruorum, ex oleo & aceto illitum, prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veternosi reuocantur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur, cauernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissimè ex ouo assumitur, suspiriisque, & torminibus, & inflationibus subuenit: ventrem leuiter emollit, lienem absumit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distétiones potum & vuluam aperit. Radix ad eadẽ vtilis est, sed inefficacior: eius decoctũ bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossiũ extrahit. In cerata, & calfacientia malagmata addit. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena.

λύεται

Succus ad potiones amaris nucib⁹, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

Gith, seu Melanthium. Cap. XCIII.

Gith exilibus surculis fruticat, sæpe binos dodrantes excedens: foliis vt senecionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo ceu papaueris, oblongo, intercursantibus intus mẽbranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresque vetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum vetere vrina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit, perunctо ex aqua vmbilico: destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum: vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino potum leuat. Phalangiorũ

λύεται δὲ ὁ ὀπὸς εἰς τὰ ποτήματα ἀμυγδάλοις πικροῖς, ἢ πηγάνῳ, ἢ ἀρτῷ θερμῷ, ἢ ἀνήθῳ.

Περὶ Μελανθίου. Κεφ. ϟγ'.

Μελάνθιον θαμνίσκος ὀζῶ λεπτόκαρφος διακόσιμος ἢ ὀλίγω μείζων φύλλα ἔχων μικρὰ ὥσπερ ἡνεμένεντος, λεπτότερα ὄντα πολλῷ. ὀλίγω κεφάλιον ἐπ' ἄκρυ ἔχων, μικρὸν, ὡς μήκωνος, σπερμικὲς, ἔχον καὶ τὰ ἐντὸς διαφράσματα, ἐν οἷς ὀλίγω τὸ σπέρμα μέλαν, δριμὺ, εὐῶδες, καταπαλαιούμενον εἰς ἄρτους. Ἁρμόζει δὲ ὀλίγω κεφαλαχρῶσι καταπαλαιούμενον τῷ μετώπῳ, ὀλίγοις ἀχρόμυσις ὑποχεῖσθαι ἐψηθέν εἰς τὰς ῥῖνας μετ' ἐλίνου λεῖον· αἴρει δὲ ὀλίγω φακὸν, ὀλίγω λέπρας ὀλίγω οἰδήματα παλαιὰ καὶ σκληρίας, σὺν ὄξει καταπλασθέν· ὀλίγω ἕλκη ἐρεθιζόμενα χθέντας σκηνάσει, σὺν οἴνῳ παλαιῷ ὑπτιάσει· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὀδοντα λγίαν μετὰ ὄξους καὶ θαλίου ἐψηθὲν καὶ διακλυζόμενον· σκηνάσει δὲ ὀλίγω ἕλμινθας στρογγύλας καταπλασσόμενον τὸ ὀμφαλῷ μεθ' ὕδατος, λεανθὲν δὲ ὀλίγω ἐν ἀποδέσμῳ δεθὲν ὀσφραινόμενον, τὸν καταῤῥοιζομένους ὠφελεῖ· πινόμενον δὲ πλείους ἡμέρας, ἔμμηνα ὀλίγω οὖρα ὀλίγω γάλα ἄγει: παύει καὶ δύσπνοιαν μετὰ οἴνου ποθέν· βοηθεῖ

βοηθεῖ δὲ ἡ φαλαγγιοδήκτοις ὅσον ⊲ ά. μεθ' ὕδατος ποθέν· διὸ καὶ ἡ ἐρπετὰ θυμιώμενον. φασὶ δ' ἡ ἀναιρεῖν αὐτὸ πλεῖον ποθέν.

Περὶ Σιλφίου. Κεφ. ϛϟ'.

Σίλφιον γλυφᾶται ἐν τοῖς κατὰ συρίαν καὶ ἀρμενίαν τόποις καὶ λιβύνη, ὃ ὁ κωλὸς μάσπετον* καλεῖ· ἔμφυλις ναρθηκι, φύλλα δ' ἔχει σελίνῳ ὅμοια σπέρμα πλατύ· ῥίζα δὲ θερμαντικὴ* δύσπνοος, κύστεως κακωτική· ἴαται δὲ χοιράδας καὶ φύματα ἀναλωθεῖσα κηρωτῇ, ἢ καὶ ὑπώπια σὺν ἐλαίῳ καταπλασθεῖσα· σὺν ἡδίνῃ δὲ κνησωτῇ ἢ κυφίνῃ ἰσχαδικοῖς ἀμύζει· τοὺς θὲι δακτύλιόν τε ἐξοχάς, αἴρει σελίνῳ σὺν ὄξει ἐπιθεῖσα καὶ καταπλασθεῖσα· θανασίμων τέ ἐστιν αὐτοφάρμακον πινομένῳ· εὔοσμός τε ἐστὶ μασυμένῳ καὶ εἰς βάμματα καὶ ἅλας συλλέγεται· δὲ ὀπὸς* ἐγχαραττομένων τ' ῥίζης καὶ τὸ χωλῶ. διαφέρει δὲ αὐτῶ ὁ ἐρυθρὸς καὶ διαυγὴς, σμυρνίζων καὶ ἐν τῇ ὀσμῇ εὔτονος, μὴ πεφαίζων, μὴ δὲ ἀπηνὴς πρὸς τ' γεῦσιν τῇ γεύσει ευχερῶς τε διειμένος ὅτι τὸ λευκὸν χρῶμα. ὁ μέν τοι κυρηναϊκὸς κἂν ἐπ' ὀλίγον τις αὐτῶ γεύσηται, ἐκμάδα κινεῖ καθ' ὅλον τὸ σῶμα. τῇ δ' ὀσμῇ πρόσφατος. ὅς τε γευσαμένῳ τὸ στόμα, μὴ δὲ πιεῖν εἰ μὴ ἐπ' ὀλίγον,

ἔπειτα

langiorum morsibus ex aqua, drachmæ pondere, hausti auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

Laserpitium, & Laser. Cap. XCIIII.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum vocant: foliis apio similibus: lato semine. Radix excalfacit, in cibis ægrè concoquitur, vesicæ noxia: fugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat, cibis aut sali permista. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur: præfertur autem rufum, transluccns, myrrhæ æmulum non porraceum, odore valens, suaui gustu: quod dilutum facilè albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeò vt ne os quidem gustanti nisi paululum spiret.

Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam ficcescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod maleficium deprehenditur, gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarim, & folia maspeton vocauere. Efficacissimum laser, mox folia, postremò caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, ficis coctis in posca, os colluitur: iis prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, vulneribus immissum: valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quæ virus eiaculantur, potum aut illitum: scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur: gangrænis præcoërcitis immittitur: & cum ruta, nitro & melle, vel per se, carbunculis: clauos callósq; prius circumrasos vellit: cerato

ὁ δὲ μανδικὸς καὶ συριακὸς ἧττον δυνάμεις εἰσὶν ἀδυνέστεροι, καὶ βρωμωδέστερον ἔχουσι τὸν ὀσμόν. δολοῦται δὲ πᾶς ὁπὸς σαγαπηνῷ μιγνυμένου, ἢ ἄλευρου ἐρεγμίνης· ὅ τε γὰρ διακρινεῖς τῇ γεύσει καὶ τῇ ὀσμῇ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ διέσει ἔνιοι δὲ καὶ τὸ μὴ χωλὸν σίλφιον ἐκάλεσαν. τὴν δὲ ῥίζαν μαγούδαριν, τὰ δὲ φύλλα μάσπετα. θεραπευτικώτατος δέ ἐστιν ὁ ὁπός, εἶτα τὰ φύλλα, εἶτα ὁ χωλός. ἔστι δὲ φυσώδης, καὶ δριμὺς, ἀλωπικίας διαπεύων, σὺν οἴνῳ καὶ πεπέρει, καὶ ὄξει καταχριόμενος· ὀξυδερκίας τὸ πεπτικός, καὶ ἀρχομένης ὑποχύσεως διασκεδαστικὸς σὺν μέλιτι ἐγχριόμενος· πρὸς ὀδοντολγίας τε ἐντίθεται εἰς τὰ βεβρωμένα, καὶ περιτίθεται σὺν λιναρῷ ἐγχριθεὶς εἰς ὀδόνιον, καὶ διακλύζεται σὺν ὑσσώπῳ, καὶ σύκοις ἀφεψημένοις σὺν ὄξει κράτῳ, καὶ ὑπὸ λυσσώντων ἢ ὠφελεῖ ὑπτιδόμενος τοῖς τραύμασι, καὶ ὑπὸ τῶν ἰοβόλων ζώων πάντων καὶ τῶν φαρμακωδῶν τοξευμάτων, ἐγχριόμενος καὶ πινόμενος· ὑπὸ δὲ σκορπιοπλήκτων ἐλαίῳ διεθεὶς περιαλείφεται, καὶ ὑπὸ γαγγραινουμένων προκαταχριόντων ἐγίνετο· πρός τε αὐθρακας μετὰ πηγάνου καὶ νίτρου καὶ μέλιτος, ἢ καθ' ἑαυτὸν, ἕλους τε καὶ τύλους αὖρῃ προπεριχαραχθέντας.

περὶ μαλα-

προμαλαχθεὶς κηρωτῇ, ἢ σύκων ξηρῶν τῷ ἐντὸς, θεραπεύει καὶ λειχῆνας προσφάτους σὺν ὄξει, σαρκώματα δὲ πολύποδας μετὰ χαλκάνθης ἢ ἰοῦ διαχριόμενος ἐπὶ ἡμέρας τινὰς, ἐκσπᾶται τὰς ἐξοχὰς σὺν σαρκολαβίδι. ἀρήγει δὲ καὶ βρόγχων χρονίαις βραχύτησι· φωνὴν τὴν αἰφνιδίως δασυνθεῖσαν ὕδατι διεθεὶς καὶ ἐκρροφηθεὶς, αὐτίκα ἀποκαθαίρει· κονίδας τε στέλλει σὺν μέλιτι διαχριόμενος· συναγχικοῖς τε ἀναγαργάρισμα μετὰ μελικράτου ὠφέλιμον· εὐχρουστέρους ποιεῖ λαμβανόμενος ἐν διαίτῃ· βηχί τε ἁρμόζει ἐν ᾠῷ ῥοφητῷ διδόμενος· πλευριτικοῖς τε ἐν ῥοφήμασιν ἰκτερικοῖς τε καὶ ὑδρωπικοῖς ὠφελίμως δίδοται μετὰ σύκων ξηρῶν. λύει καὶ ῥίγη σὺν πεπέρει καὶ λιβάνῳ ποθεὶς καὶ οἴνῳ· τετανικοῖς τε καὶ ὀπισθοτονικοῖς ὀβολοῦ ὁλκὴν περιπλάσας, δίδου καταπίνειν. βδέλλας δὲ τὰς προσισχομένας τῇ καταπόσει, ἀναγαργαριζόμενος μετ' ὄξους ἀποβάλλει· καὶ τοῖς γάλα τεθρομβωμένον ἔνδον ποιοῦσι καὶ ἐπιληπτικοῖς μετ' ὀξυμέλιτος ληφθεὶς βοηθεῖ· ποθεὶς δὲ σὺν πεπέρει καὶ σμύρνῃ καταμήνια ἄγει· κοιλιακοὺς τ' ἐν ῥαγὶ λαμβανόμενος σταφυλῆς ὠφελεῖ· μετὰ δὲ κονίας ποθεὶς, ὠφελεῖ τὰ αἰφνίδια σπάσματα, ῥήγματα.

διαλύεται

cerato aut aridorum ficuum carne præmollitum, recentes lichenas ex aceto ſanat. Et excreſcentia in carne, polipóſque, ſi aliquot diebus cum atramento ſutorio, aut ærugine illinatur: extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium ſcabritiis opitulatur: grauem, ſubitóque irrauceſcentem vocem, dilutum aqua, ſorbitione confeſtim expedit: vuam illitum cum melle reprimit: anginis ex aqua mulſa vtiliſsimè gargarizatur: veſcentes lætiore colore mangonizat: tuſsi commodè in ſorbili ouo datur, & pleuriticis, in ſorbitionibus: in fellis ſuffuſione, & aqua inter cutem, cum aridis ficis: horrores diſcutit cum vino, pipere, & thure potum: neruorum contractionibus, opiſthotonicíſque datur oboli pondere deuorandum: hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulſo proficit: menſes ciet, cum pipere & myrrha potum: cœliacos adiuuat, in acino vuæ ſumptum: cum lixiuio autem potui datum, repétè cõuulſis ruptíſque prodeſt,

ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut ruta aut calido pane. Foliorũ succo ad eadem proficitur, sed multò inefficacius: cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maximè cum vox retunditur: eo cum lactucis vtuntur, exítque in vicem erucæ. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix lasérpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasere facultatis.

διαλύεται δὲ εἰς τὰ ποτήματα ἀμυγδάλοις πικροῖς, ἢ πηγάνῳ, ἢ ἄρτῳ θερμῷ. ὁ δὲ ὀπὸς τῶν φύλλων τὰ αὐτὰ μὲν ποιεῖ, παραπολὺ δὲ ἔλασσον· ἐδίδεται δὲ μετ' ὀξυμέλιτος ἀρμίζων πρὸς ἀρτηρίαν, μάλιστα δὲ ἀποκοπεῖσιν ἤχοις· χρῶνται δὲ αὐτῷ καὶ μετὰ θριδάκων ἐσθίοντες αὐτὸ συζώμου. Λέγεται δὲ καὶ ἑτέρα μαγύδαρις γίνεσθαι ἐν λιβύῃ, ῥίζα παρομοία σιλφίῳ ἵππου δὲ πεχεῖα, θριμεῖα καὶ χαύνη καὶ ὀπὴν μὴ ἔχουσα· ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ τῷ σιλφίῳ.

Sagapenum. Cap. XCV.

Sagapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser, & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum, & pectoris doloribꝰ, tussibus vetustis, conuulsis, & ruptis. Crassam pulmonis pituitã expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: itẽ contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu: in vnguenta pbè admittitur: mẽses pellit, sed fœtum exanimat, cum hydromelite potum: prodest ex vino hausturn, serpentium ictibus:

Περὶ Σαγαπήνου. Κεφ. ϛέ.

Σαγάπηνον ὀπός ἐστι πόας ναρθηκοειδοῦς γινομένης ἐν μηδείᾳ. διαφέρει δὲ αὐτῶν τὸ διαυγὲς, ἔξωθεν μὲν κίρρον, ἐν δὲ τοῖς ἐντὸς λευκὸν, ὄζον μεταξὺ ὀποῦ σιλφίου καὶ χαλβάνης δριμὺ ἐν τῇ γεύσει. ποιεῖ δὲ πρὸς πλευρᾶς πόνον, ῥήγματα, ἀσάσματα, βῆχας χρονίους, πάχη τὰ ἐν πεύμονι αὐανθαίρει. δίδοται δὲ καὶ ἐπιληπτικοῖς, ὀπισθοτονικοῖς, σπληνικοῖς παραλυτικοῖς, κατεψυγμένοις, περιόδοις πυρετοῖς ἐν ποτήμασι, καὶ ἐν συγχρίσμασι δ' ὠφελίμως πρασσόμενα· ἄγει καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα φθείρει πινόμενον μετ' ὑδρομέλιτος ἀρήγει καὶ θηριοδήκτοις μετ' οἴνου λαμβανόμενον.

olfactum

διαχείρ

ἀνελκύει καὶ ὑστερικῶς πνιγομένας μετ' ὄζους ὀσφραινόμενον. οὐλάς τε ἀποσμήχει τὰς ἐν ὀφθαλμῷ καὶ ἀμβλυωπίας καὶ τὰ ὀπισθοτονώντα τοῖς κόραις καὶ ὑπογλαύματα. διαλύει δὲ ὥσπερ ὀπός, πηγάνῳ καὶ ὕδατι καὶ πικροῖς ἀμυγδάλοις ἢ μέλιτι ἢ ἄρτῳ θερμῷ.

olfactum ex aceto vuluarum strangulatus excitat, oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionésque detergit. Resoluitur vt laser, ruta, aqua, & amaris nucib', aut melle, aut callido pane.

Περὶ Εὐφορβίου. Κεφ. ϛϛ'.

Euphorbium. Cap. XCVI.

Εὐφόρβιον δένδρον ἐστὶ παφλιοκοιδὲς λιβυκὸν, γλυκάμωμον ἐν τῷ χῶρῳ μαυρουσιάδι τριώλῳ. ὅπου μεσὸν δριμυτάτου δεδοκότες οἱ τῆδε ἄνθρωποι συλλέγουσι διὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς πυρώσεως, κοιλίας χοίρων περιβαλόντες πλησμόνας περιδήσαντες τὸ δένδρον, μακρόθεν ἀκοντίοις διαιρεῦσιν αὐτοῦ τὸν κορμόν. εὐθέως δὲ ὡς ἔκ τινος ἀγγείου πολὺς ἀποχεῖται ὁ ὀπὸς εἰς τὰς κοιλίας καὶ ἀπερράγη δὲ καὶ εἰς τὸν γλουτὸν ἐξακοντιζόμενος. ἔστι δὲ δύο χυμοῦ τὸ ὀπωροῦ· τὸ μὲν, διαυγὲς ὡς σαρκοκόλλα, κατὰ μεγέθος ὀβόλου· τὸ δέ τι ἐν τοῖς κοιλίαις ὑελῶδες καὶ σωματῶδες. ὁλοῦται δὲ ἐν τῇ σαρκοκόλλῃ καὶ κολλᾷ μιγνυμένου. σκληρόν δ' ἐστὶ διαυγὲς καὶ δριμύ· δυσδοκίμαστος δέ ἐστιν ὁ τῇ γεύσει λαμβανόμενος, διὰ τὸ ἄπαξ ἐνεχθέντος τῆς γλώττης ὑπομένειν τὸν πόρωσιν ἐφ' ἱκανὸν χρόνον, ὥς τι παῦσαι τὸ θερμαινόμενον εὐφόρβιον δοκεῖν εἶναι. ἢ μὴν

Euphorbium Libyca arbor est, ferulæ speciem habens, quæ in mõte Atlãte iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. cuius eximiũ feruorem expauescentes incolæ, ouillos ventres elutos, arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestímque è plaga, perinde atque vase quodam, in ventriculos copiosus lactis humor effluit, præterid quod humi sparsum, vulnus eiaculatur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ventriculis concrescit, atque vitreum spectatur. Eligendum est transluces, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocollæ, & glutini mistione, sed difficile quidẽ experimentum: quippe cũ leui gustu, os accensũ diu detineat, adeo vt quicquid ori obijciatur, planè euphorbiũ resipiat.

Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit, potus tota die exurit: quare melli collyriisque pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus: squamas ossium eadem die eximit: verùm eo vtentes, necesse est linamentis aut ceratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnúsque postea consuatur.

Galbanũ. Cap. XCVII.

GALBANVM succus est nascẽtis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium vocant. Maximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis, & ferulæ, graui odore, neque valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniaco. Galbanum excalfacit, vrit, extrahit, discutit: menses ac partus trahit apposito vel suffitu: lentigines aceto

ἡ μέν τοι εὕρεσις αὐτοῦ κατὰ Ἰόβαν τὸν βασιλέα τῆς Λιβύης ἐπεγνώσθη. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς, διαφορητικὴν ὑποχυμάτων ἐγχριόμενος, πυροῖ μέν τοι δι' ὅλης τῆς ἡμέρας ποθείς· ὅθεν μέλιτι μίγνυται, καὶ κολλυρίοις κατὰ ἀναλογίαν τῆς δριμύτητος. ἁρμόζει καὶ ἰσχίων ἀλγήμασι, μιγεὶς ἀρωματικῷ ποτήματι καὶ πινόμενος· ἀφίστησι δὲ καὶ λεπίδας αὐθημερόν· δεῖ μέν τοι χρωμένους ἀσφαλίζεσθαι τὴν περικειμένην τοῖς ὀστοῖς σάρκα, μοτοῖς ἢ κηρωταῖς. ἱστοροῦσι δέ τινες μηδὲν παρακολουθεῖν δυσχερὲς τοῖς ἑρπετοδήκτοις, ἐάν τις ἐκκόψας ἄχρις ὀστέου τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς, ἐγχέῃ τὸν ὀπὸν λεῖον καὶ ῥάψῃ τὸ τραῦμα.

Περὶ Χαλβάνης. Κεφ. ϟζ´.

Χαλβάνη ὀπός ἐστι νάρθηκος ἐν Συρίᾳ γεννωμένου, ἣν ἔνιοι μετώπιον καλοῦσιν. ἔστι δὲ αὐτῆς ἀρίστη λιβανοειδὴς, χονδρώδης, καθαρὰ, λιπαρὰ, ἄξυλος ἔχουσα δέ τι τοῦ σπέρματος καὶ τοῦ νάρθηκος μιγνυμένου, ὀσμὴ βαρεῖα, οὔτ' ἄγαν ὑγρὰ, οὔτε πάλιν κατάξηρος. δολοῦσι δὲ αὐτὴν μιγνύντες ῥητίνην, καὶ ἐρεγμὸν καὶ ἀμμωνιακόν. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, πυρωτικὴν, ἐπισπαστικὴν, διαφορητικὴν· προσθεμένη δὲ καὶ ὑποθυμιωμένη, ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα ἄγει· φακούς

τε

τε αἴρει μετ' ὄξους καὶ νίτρου ἐπιπλασθεῖσα· καταπίνεται δὲ πρὸς παλαιὰν βῆχα, δύσπνοιαν, ἄθματα, ῥήγματα, ἀπάσματα· αὐτὴ πάσχει δὲ καὶ τοξικῷ συὶ * ὄξει καὶ σμύρνῃ πρόσθεσις. ἐκβάλλει καὶ τεθνικότα ἔμβρυα ὁμοίως ληφθεῖσα· ἐπιτίθεται δὲ καὶ πρὸς ὀδύνην πλευρᾶς, καὶ πρὸς ἀδιλώδεις· ἐπιληπτικούς τε καὶ ὑστερικὰς πίσσης καὶ σκοτωματικοὺς ὀσφραινομένη διεγείρει, θηρία τὰ θυμιωμένη διώκει, τοὺς τε συγχριομένους ἀδήκτους τηρεῖ, σὺν σφονδύλῳ δὲ καὶ ῥάφῳ πρόσθεσις, ἑρπητὰ * κτείνει· ὀδόντος τὸν πόνον πρόσπλασθεῖσα ἢ ἀντιθεῖσα εἰς τὸ βρῶμα, παύει· δοκεῖ δὲ καὶ δυσουρήσει πιεῖν. λύει δὲ καὶ εἰς μὲ τὰ ποτήματα, πικροῖς ἀμυγδάλοις καὶ ὕδατι ἢ πίσσῃ ἢ μελικράτῳ ἢ ἄρτῳ θερμῷ. ἀήθως δὲ μικκανείῳ ἢ χαλκῷ κεκαυμένῳ, ἢ χολὴ ὑγρᾷ. καθαίρειν δὲ αὐτὴ βούλόμενος, κάθες εἰς ζεστὸν ὕδωρ· τακήσεται γὰρ αὐτῆς, ἐπιπλεύσει τὸ ῥυπαρόν· ὅταν χωρίσῃς ὅτως· εἰς ὀδόνιον καθαρὸν ἀφεὶς ἐνδήσας ἀποκρέμασον εἰς χαλκῆν πυξίδα ἢ ὀστράκινον ἀγγεῖον, ὡς μὴ ἅπτεσθαι πυθμένος τοῦ ἄγγους τὸν ἔνδεσμον· καὶ πωμάσας, εἰς αὐαβεστὸν ὕδωρ κάθες· οὕτω γὰρ τὸ μὲ νόσιμον ἀποτακήσεται ὡς δι' ἠθμοῦ· τὸ δὲ ξυλῶδες ἐν τῷ ὀδονίῳ μενεῖ.

Περὶ Ἀμ-

ceto & nitro perunctas tollit: deuoratur ad tussim veterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa: aduersatur toxicis, potum cum vino & myrrha. simili modo sumptum mortuos partus extrahit: imponitur lateris doloribus, & furunculis: comitiales, & vuluæ strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitat: si vratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur: serpentes cum oleo & sphondylo circumpositum, necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat: vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsáue. aliâs meconio, ære vsto, felle liquido. Si purgare Galbanum voles, in feruentem aquam demittito: nanque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis: mundo linteo raróque alligatũ in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: opertóque vase in feruidam aquam demittito: sic enim syncerũ, veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Ammo-

Ammoniacum. Cap. XCVIII.

Ammoniacum, ferulæ ſuccus eſt, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agaſyllim vocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris ſimilitudine, minutis glebis, denſum, ſyncerum, nulla ſorde ſpurcatum, caſtoreum odore imitans, guſtu amarum. hoc genus thrauſma, id eſt, friaturam appellant· quod verò terram, & calculos collegit, phyrama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, ſuccum ſtillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiáſque diſcutit: potum, aluum ſoluit: partus extrahit, lienẽ cõſumit, drachmæ põdere hauſtum: articulorum coxendicúmq; doloribus liberat: auxilio eſt anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Itẽ quibus humor in pectore coit, ſi cum melle delingatur, aut cũ ptiſanæ ſucco ſorbeatur: cruentam vrinã pellit: albugines oculorum abſterget: genarum ſcabritiã abſumit: tritũ autem cũ aceto, & impoſitũ, iocineris lieniſq; duritias ſedat: diſcutit tofos, qui in artubus cõcalluerũt, cum

Περὶ Ἀμμωνιακοῦ. Κεφ. ϛή.

Ἀμμωνιακὸν, καὶ τοῦτο ὀπός ἐστι νάρθηκος, γεννωμένου ἐν τῇ κατὰ κυρήνην λιβύῃ· καλεῖται δὲ αὐτοῦ ὅλος ὁ θάμνος σὺν τῇ ῥίζῃ, ἀγασυλλίς. ἐγκριτέον δὲ αὐτοῦ τὸ εὔχρουν καὶ ἄξυλον καὶ ἀλιθὲς, λιβανωτίζον τοῖς χόνδροις, καθαρὸν καὶ πυκνὸν, μηδεμίαν ἔχον ῥυπαρίαν, καστορίζον τῇ ὀσμῇ, πικρὸν δὲ τῇ γεύσει. καλεῖται δὲ τὸ τοιοῦτον, θραῦσμα· τὸ δὲ γεῶδες ἢ λιθῶδες, φύραμα. γεννᾶται δὲ ἐν λιβύῃ κατὰ ἄμμωνα. χυλὸς ὢν δένδρου ναρθηκοειδοῦς. Δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν, ἐπισπαστικὴν, θερμαντικὴν, διαφορητικὴν σκληρωμάτων τε καὶ φυμάτων· κοιλίαν τε ὑπάγει ποθέν· καὶ ἔμβρυα κατασπᾷ. σπλῆνα τήκει μεθ' ὄξους < ά ποθέν· καὶ ἄρθρων καὶ ἰσχίων ἀλγήματα παραιτεῖται· βοηθεῖ δὲ καὶ ἀσθματικοῖς, ὀρθοπνοϊκοῖς, ἐπιληπτικοῖς, καὶ τοῖς ὑγρασίαν ἐν θώρακι ἔχουσιν, ἐκλειχόμενον μετὰ μέλιτος, ἢ πτισάνης ῥοφούμενον χυλῷ· ἄγει δὲ καὶ οὖρα αἱματώδη· σμήχει δὲ καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς λευκώματα· καὶ τραχύτητας βλεφάρων τήκει. λειωθὲν δὲ σὺν ὄξει καὶ ἐπιτεθὲν, παύει τὰς περὶ σπλῆνα καὶ ἧπαρ σκληρίας· λύει καὶ τοὺς περὶ τὰ ἄρθρα πώρους μεθ

μὲν μέλιτος κεκαπλασμένον, ἢ κὴ πίσσῃ μιγὲν· ποιεῖ κὴ πρὸς κόπους καὶ ἰσχιάδας συγχριόμενον, μιγὲν ὄξει κὴ νίτρῳ κὴ κυπρίνῳ ἐλαίῳ αὐτὶ ἀκόπου.

Περὶ σαρκοκόλλας.

Κεφ. ϙθ'.

Ἡ δὲ σαρκοκόλλα ἔστι δάκρυον δένδρου ἠλιωμένον ἐν τῷ Περσίδι, ἔοικὸς λιβανωτῷ λεπτῷ, ὑπόκιρρον, ἔμπικρον τῇ γεύσει. Δυνάμιν δὲ ἔχει κολλητικὴν τραυμάτων κὴ ἐφεκτικὴν τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ῥευμάτων· μίγνυται δὲ καὶ ἐμπλάστροις. δολοῦται δὲ κόμμεσι αὐτῇ μιγνυμένου.

Περὶ Γλαυκίου. Κεφ. ϙ'.

Γλαύκιον χυλός ἐστι βοτάνης κατὰ ἱεράπολιν τῆς συρίας ἠλιωμένης, ἔοικε δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα τῇ κερατίτιδος μύκωνος, λιπαρώτερα δὲ κὴ μαλάκτικα, κὴ βαρύοσμα κὴ πικρότερα ἐν τῇ γεύσει· χυλὸν δὲ ἔχει πολὺ χροκίζοντα. τούτης τὰ φύλλα βάλλοντες οἱ ὀπτρόχοοι εἰς χύτρας, θερμαίνουσιν ἐν κλιβάνοις ἡμιψυχέσιν ἄχρι μαρασμοῦ, εἶτα ἐκπιέσαντες ἐκθλίβουσι τὸν χυλόν· ἔστι δὲ ἡ χρῆσις αὐτῆ πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ, ἐν ἀρχῇ φυκτικοῦ ὄντος.

Περὶ Κόλλης. Κεφ. ϙά.

Κόλλα ἐν ἔνιοι ξυλοκόλλαν καλοῦσιν ἢ ταυροκόλλαν, καλλίστη ἐστὶν ἡ ῥοδιακὴ, ἐκ τῶν βοείων βυρσῶν σκευα-

cum melle aut cum pice illitum. lassitudines, & coxendicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla.

Cap. XCIX.

Sarcocolla, lachrima est arboris in Persida nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnera glutinat, oculorum fluxiones inhibet: emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

Glaucium. Cap. C.

Glaucium, succus est herbæ quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, foliis ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, vsque dum flaccescant, deinde contusis succum exprimunt: cuius est vsus ad oculorum medicamenta, vtpote cum inter initia refrigeret.

Glutinum. Cap. CI.

GLVTINVM, quod xylocollan, alij taurocollã vocãt, præstantissimum Rhodiacum, quod

quod ex bubulis coriis conficitur, id candidũ est, & transluces. Nigrũ verò minus probatur. Resolutũ in aceto, impetigines lepráſq; cutis delet: ambuſtis igni ex aqua calida dilutũ illitúmque, puſtulas erumpere nó patitur. vulneribus prodeſt, melle aut aceto madefactum.

Glutinum piſcium. Cap. CII.

Ichthyocolla, gluten piſciũ, vẽter eſt piſcis cetacei. Præſtat candicans, natione Ponticum, ſubaſperum, minimè ſcabrũ, & quod celerrimè liqueſcit. Vtile emplaſtris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant, & extendunt.

Viſcum. Cap. CIII.

Viſcum optimum eſt recẽs, intus porraceum, extra fuluũ, quod aſperi nihil, aut furfuroſi conceperit. Fit acinis in robore naſcentibus, buxeo fruticis folio: contuſum acinum lauãt, & poſtea in aqua decoquunt. ſunt qui commanducando ipſum efficiant. Gignitur quoq; in mâlo, pyro, & pleriſque aliis arboribus: quinetiã inuenitur in quorundam fruticũ radicibus. Emollit, diſcutit, extrahit: paro-

σκευαζομένη· ἔστι δὲ λευκὴ καὶ διαυγὴς ἡ τοιαύτη· ἡ δὲ μέλαινα ἧττον. Δύναμιν δὲ ἔχει λυθεῖσα ὄξει, λειχμῶας καὶ λέπρας τὰς ἐπιπολαίους ἀφιστάνειν. πυείκμασι τέ τε οὐκ ἐᾷ φλυκταινοῦσθαι μὴ ὕδατος θερμοῦ ἐνεθεῖσα καὶ καταχριομένη. ἔστι δὲ καὶ τραυματικὴ, διεθεῖσα μέλιτι καὶ ὄξει.

Περὶ Ἰχθυοκόλλης. Κεφ. ϛϚ'.

Ἡ δὲ ἰχθυόκολλα λεγομένη κοιλία ἐστὶν ἰχθύος κητώου. διαφέρει δὲ ἡ ἐν πόντῳ γινομένη οὖσα λευκὴ, ὑποτραχυς, οὐ ψωρώδης, τάχεια τηκομένη· ὠφελεῖ δὲ εἰς τὰς κεφαλικὰς ἐμπλάστρους καὶ λιπαρικὰς διαμείς, καὶ εἰς τετάνωθρα τῶν προσώπων.

Περὶ Ἰξοῦ. Κεφ. ϛγ'.

Ἰξὸς καλός ἐστιν ὁ γλοιὸς καὶ προσίζων τῷ χρώματι κατὰ ἐντὸς, ἐκπὸς δὲ ὑποξανθος, μηδὲν ἔχων τραχὺ ἢ πιτυρῶδες. γίνεται δὲ ἔκ τινος καρποῦ ἀειφερῆς γινομένη ἐν δρυὶ τῇ ἐχούσῃ τὰ φύλλα ὅμοια πύξῳ· κόπτεται δὲ ὁ καρπὸς, εἶτα πλύνεται, εἶτα ἐν ὕδατι ἕψεται. ἔνιοι δὲ μασώμενοι αὐτὸν ἐξαλίζουσι. γίνεται δὲ καὶ ἐκ μιλέας καὶ ἀπίου καὶ ἐξ ἄλλων δένδρων· εὑρίσκεται δὲ καὶ περὶ ῥίζας δάμνων τινῶν. Δύναται δὲ διαφορεῖν, μαλάσσειν, ὅπως ἂν,

συμ-

ὐμπίπλειν φύματα, παρωτίδας, καὶ τὰς ἄλλας ἀποστάσεις· μηλὶς ῥητίνη καὶ κηρῷ ἴσαι, ἐπινυκτίδας τε ἐν σπλωίῳ ἰᾶται· σὺν λιβανωτῷ δὲ ἕλκη σηπεδονώδη καὶ καχοήθεις ἀποστάσεις μαλάσσει· καὶ σπλῆνας τήκει σὺν ἀσβέστῳ ἢ γαγάτῃ λίθῳ ἢ ἀσίῳ ἐμπλασθεὶς καὶ ἐπιτεθείς. ἕλκει δὲ καὶ ὄνυχας σὺν ἀρσενικῷ ἢ σανδαράχῃ ἐπιπλασθείς· μηλὶς δ' ἀσβέστῳ ἐν τρυῒ, ἐπιτείνει τὴν δύναμιν ἀμφω.

Περὶ Ἀπαρίνης. Κεφ. ρδ'.

Ἀπαρίνη, οἱ δὲ, ἀμπελόκαρπον, οἱ δὲ, ὀμφαλόκαρπον, οἱ δὲ, φιλάνθρωπον καλοῦσιν, οἱ δὲ, ἑξόνκλωνες πολλοὶ, μικροὶ, τετράγωνοι, τραχεῖς· φύλλα δὲ ἐν διαστήματος κυκλοτερῶς περικείμενα ὥσπερ τὰ τῆς ἐρυθροδάνου· ἄνθη λευκά· σπέρμα σκληρὸν, λευκὸν, στρογγύλον, ὑπόκοιλον ἐν μέσου ὡς ὀμφαλός, περισπᾶται δὲ ἓν ἱματίοις ἢ πόᾳ. χρῶνται δὲ αὐτῇ ἐν οἱ ποιμένες αὐτὴ ἡθμοῦ ἐπὶ τῆ γάλακτος, πρὸς ἕκλυσιν τῶν ἐν αὐτῷ πετρῶν. Ταύτης τὸ σπέρμα καὶ οἱ χυλοὶ καὶ τὰ φύλλα χυλιδέντα, φαλαγγιοδήκτοις καὶ ἐχιοδήκτοις βοηθεῖ πινόμενον μετὰ οἴνου· ἐν ὠτιλγίας ἰᾶται ὁ χυλὸς ἐγχυματιζόμενος. ἡ δὲ πόα αὐαλοφθεῖσα ὀξυγγίῳ λείῳ, διαφορεῖ χοιράδας.

Περὶ Αλύ-

parotidas, tubercula, cæteráſq; colle&tiones ad maturationem perducit: cum reſina autem, & cera pari, epiny&tidas in ſplenio ſanat: vetéra vlcera abſceſſusq; quos cachoëthes vocant, ex thure mollit: lienem cú calce, gagate, aut Aſio lapide co&tum & impoſitum abſumit: cũ ſandaracha, aut auripigmẽto illitum, vngues extrahit: miſtum cum calce, & vini fæce, ſuam vim intendit.

Aparine. Cap. CIIII.

Aparine ramis multis, & paruis fruticat, aſperis, quadrangulis, per interualla orbiculato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: ſemen durum, rotundum, concauum, album, vmbilici figura, aſperitate veſtium tenaci. Ea paſtores coli vice vtuntur, ad eximendos è lacte pilos. Seminis, caulium, ac foliorum ſuccus, potu contra viperarum phalangiorúmque mórſus auxiliatur: infuſu aurium dolori medetur.

Herba cum axungia trita ſtrumas diſcutit.

Alyſſum.

Alyssum. Cap. CV.

Alysson exiguus frutex est, vnicaulis, subasper, rotundis foliis: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen, quadamtenus latũ, in montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febri, potu discutit: idé efficit, si quis eã aut teneat, aut odoretur: cũ melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emẽdat. contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorũ morbos abigit.

Asclepias. Cap. CVI.

Asclepias ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: flos virus graue: semen securidacæ. nascitur in mõtibus. Radices ex vino potę torminibus auxiliãtur, & contra serpẽtiũ ictus. Folia aduersus vuluæ mammarúmq; vlcera, quæ cacoẽthe vocant, illinuntur.

Atractylis. Cap. CVII.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multò longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperáque, qua fœminę pro fusis vtuntur: capi-

Περὶ Ἀλύσσου. Κεφ. ρξ.

Ἄλυσσον φρυγανίου ὄντος, ὑποτραχυ, φύλλα ἔχον στρογγύλα· παρ' οἷς ὁ καρπὸς ὡς ἀσπίδια διάδηλα, ἐν οἷς τὸ σπέρμα ὑποπλατυ. φύεται ἐν ὀρεινοῖς καὶ τραχέσι τόποις. Ταύτης τὸ ἀφέψημα ποθὲν, λιγμοὺς πόνους ἵζανε πυρετῶν λύει· καὶ κραθὲν ἢ ὀσφραν-θὲν, τὸ αὐτὸ δρᾶ· σὺν μέλιτι δὲ λείον, φακοὺς καὶ ἔφηλιν ἀποκαθαίρει· δοκεῖ δὲ καὶ λύσσας κυνὸς ἰᾶσθαι. συγκοπὴν ἐδίσματι καὶ δοθὲν, καὶ κρεμάμενον δὲ ἐν οἰκίᾳ, ὑγιεινὸν λέγεται εἶναι καὶ ἀνθρώποις καὶ ζώοις ἀβάσκαντον. περιαφθὲν δὲ φοινικῷ ῥάκει, ἑρεμμάτων νόσους ἀπελαύνει.

Περὶ Ἀσκληπιάδος. Κεφ. ρϛ'.

Ἀσκληπιὰς κλωνία ἀγίνοτ μακρά· ἐφ' ὧν φύλλα μακρὰ κισσῷ ὅμοια· ῥίζας πολλὰς καὶ λεπτὰς εὐώδεις· ἄνθος βαρύοσμον· σπέρμα ὡς πελεκίνου. φύεται ἐν ὄρεσι. βοηθοῦσι δὲ αἱ ῥίζαι ἐν οἴνῳ πινόμεναι, σταφυλικοῖς καὶ σπειροδύκοις. καὶ τὰ φύλλα καταπλασθέντα, ἀρμόζει πρὸς ταῖς ἐν μαστοῖς καὶ μήτραις κακοηθείαις.

Περὶ Ἀβακτυλίδος. Κεφ. ρζ'.

Ἀβακτυλὶς ἄκανθά ἐστιν ἐοικυῖα κνίκῳ, μακροτέρα δὲ πολλῷ φύλλα ἔχουσα ἐπ' ἄκρου τὰ ῥάδια· τὸ δὲ πλεῖον γυμνὸν τραχὺ, ὃ καὶ αἱ γυναῖκες χρῶνται αὐτῇ ἀβάκλῳ· ἔχει

ἔχει δὲ καὶ* κεφάλια ἐπ' ἄκρου ἀνανθῆ· αὐξος ὠχρόν· ῥίζα δὲ λεπτὴ ἄχρηστος. ταύτης τὰ φύλλα καὶ ἡ κόμη καὶ ὁ καρπὸς λεῖα πωθέντα ζωὴ πιπέρει καὶ οἴνῳ, σκορπιοπλήκτοις ὠφελεῖ. ἔνιοι δ' ἰσοτιμοῦσι τοὺς φαλαγγίτας, ἄχρι περ ἂν κρατῶσι τὸ πόαν αὐωδιώδεις εἶναι. ἀποθεμένοις δὲ διαχεῖν.

Περὶ πολυκνήμου.

Κεφ. ρή.

Πολύκνημον θάμνος ἐστὶ φρυγανώδης, ἔχων φύλλα ὀρίγανῳ ἐμφερῆ· τὸ δὲ κωλὸν πολυγόνατον ὥστε καλάμης, ὃν ἔχει μὴ τοι τὸ σκιάδιον, μικρὰ δ' ἐπ' ἄκρῳ κόμια μετ' εὐωδίας τινὸς δριμείας. Ποιεῖ δὲ καὶ πλατύμυρον χλωρὸν ἢ ξηρὸν μετ' ὕδατος, πρὸς τραύματα, πολλῶσαι· δεῖ δὲ πεμπταῖον λύειν. πίνεται δὲ πρὸς τραγωδίαν καὶ ῥήγματα σὺν οἴνῳ.

Περὶ Κλινοποδίου. Κεφ. ρθ'.

Κλινοπόδιον θάμνιόν ἐστι καὶ τοῦτο φρυγανῶδες διπήχεος, φυόμενον ἐν πέτραις, ἔχον φύλλα ἑρπύλῳ παραπλήσια. καὶ τὰ ἄνθη ὅμοια ὡς κλίνης ποδί, ἐπιδιασημάτων ἐμφερῆ τραπέζῃ. Πίνεται δὲ ἡ πόα καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς, πρὸς θηρίων δήγματα καὶ σπάσματα, καὶ ῥήγματα καὶ τραγωδίαν· ἄγει καὶ ἔμμηνα, καὶ ἔμβρυα, καὶ ἀκροχορδόνας ἀπο-

capitula in cacumine spinis horrent: flos luteus: quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semẽ & folia cũ pipere, & vino teruntur vtilissimè cótra scorpionũ ictus. percussos tradũt quãdiu ea teneatur herba, nullũ experiri dolorẽ, ipsumq; deposita statim recrudescere.

Polycnemum.

Cap. CVIII.

Polycnemon, frutex est surculosus, foliis origani: caule, vt pulegij, geniculis multis intercepto, sine vmbella, tenui tamẽ in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. Ad vrinæ stillicidia ruptáque, cum vino bibitur.

Clinopodiũ. Cap. CIX.

Clinopodion frutex est foliis serpillo similis, surculosus, duũm dodrantũ altitudine. nascitur in petrosis. Flores, marrubij modo, ex interuallis distincti speciẽ lecti pedũ præbẽt. Bibitur herba & succi ei⁹ decoctũ, ad conuulsa, rupta, strãgurias, serpentiũ ictus: menses & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochordonas vocant, eiicit,

eiicit, aliquod diebus potũ. aluum sistit decoctũ ad tertias, potúmque, si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum.
Cap. CX.

Leontopetalon caulem emittit dodrantalem, aut altiorem, plurimis alis concauum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemonæ similes, punicei coloris: folia brassicæ, sed papaueris diuisura: radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpétium ictibus, ex vino pota. nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

Teucrium.
Cap. CXI.

Teucrion, siue vt aliis placet teucris, herba est virgæ referens effigiem, trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissadémque vbertim prouenit. Recens cum posca, aut aridæ feruefactæ ius, potu lienem potenter absumit: lienosis cum aceto & ficis illinitur: item

ἀποβάλλῃ ἐφ' ἡμέρας τεσσαράκοντα νόμιμον. κοχλίαν τὲ ἴσην ἐπὶ βίστον ἐνόμιμον καὶ πινόμενον, ἀπυρέτοις ἐν οἴνῳ, πυρέτιοισι δὲ δι' ὕδατος.

Περὶ Λεοντοπεταλι. Κεφ. ρί. ς

Λεοντοπέταλον καυλὸν ἀνίησι σπιθαμαῖον, ἢ ἐν μείζονα, ἔχοντα μασχάλας πλείστας, ἐφ' ὧν ἄκρων λοβοὶ ὅμοιοι ἀνεμώνοισι, ἐν δὲ τούτοις δύο ἢ τρία σπερμάτια· αὔξηται φοινικᾶ, ἐοικότα ἀνεμώνῃ· φύλλα δὲ ὅμοια κράμβῃ, ἐστεμμένα ὡς τὰ τῆς μήκωνος· ῥίζα μέλαινα ὅσον ῥαγγύλη, ἔξοχὰς ἔχουσα καθάπερ κονδύλους πινάς. φύεται δ' ἐν ἀρούραις καὶ ἐν τῷ σίτῳ. ταύτης ἡ ῥίζα σὺν οἴνῳ πινομένη, βοηθεῖ ἐρυσιπελάτοις. ταχέως ἀπόνους ποιοῦσα. μίσγεται δὲ καὶ εἰς τοὺς ἰσχιαδικοὺς κλυσμούς.

Περὶ Τευκρίου. Κεφ. ριά.

Τεύκριον, οἱ δὲ καὶ τοῦτο χαμαίδρυν καλοῦσι, πόα ῥαδδοειδὴς ἐοικυῖα χαμαίδρυϊ, λεπτόφυλλος, ἔχουσα ἐρεβίνθῳ πέταλον ὅμοιον. φύεται δὲ πλεῖστον ἐν κιλικίᾳ τῇ κατὰ* γρυτιάδα καὶ κισσάδα καλουμένῃ. δώσαμεν δὲ ἔχει χλωρὰ μετ' ὀξυκράτου ποθεῖσα ἢ ξηρὰ ἀποζεσθεῖσα καὶ πινομένη, σπλῆνα τήκειν ἰσχυρῶς. καταπλάσσεται δὲ μετὰ σύκων καὶ ὄξους ἐπὶ σπληνικῶν.

ἐπὶ

ἐπὶ θηριοδήκτων δὲ μετ' ὄξους μόνου χωρὶς σύκων.

Περὶ Χαμαίδρυος. Κεφ. ριϚ'.

Χαμαίδρις, οἱ δ' χαμαίδρυς, ἢ λυσίδρις. διὰ δὲ τὸ σάζειν πνὰ ἐμφέρειαν τῇ τευκρίῳ, καὶ ταύτην τινὲς τεύκριον ἐκάλεσαν. φύεται ἐν τραχέσι καὶ πετρώδεσι τόποις· ἔστι δὲ θαμνίσκος ἀπὸ θαμνίου, φύλλα ἔχων μικρὰ τῷ σχήματι καὶ τῇ χρόᾳ δρυῒ ὅμοια, πικρά· ἄνθος πορφυροῦν, μικρόν. συλλέγειν δὲ αὐτὴν δεῖ ἐγκύμονα τοῦ καρποῦ. Δυώδμιον δὲ ἔχει χλωρὰ ἀφεψηθεῖσα σὺν ὕδατι καὶ ποτιζομένη, βοηθεῖν ἀσάρμασι, βηχὶ, ἀπλοΐῃ ἐσκιρρωμένῳ, δυσουρεῦσιν, ὑδρωπικοῖς ἐν ἀρχαῖς· ἄγει καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα, ἀπλῶς πίνει ζωὸ ὄξει ποθεῖσα· θηρὸς δὲ τὰ θηρία σὺν οἴνῳ πινομένη, καὶ καταπλασσομένη ποιεῖ. λεῖα δὲ δύναται καὶ εἰς καταπότια ἀναπλάσσεσθαι πρὸς τὰ εἰρημένα· καὶ ἀναγκαθαίρειν ἕλκη παλαιὰ ζωὸ μέλιτι· αἴρει δὲ ἀχλῦς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς σὺν ἐλαίῳ λεῖα ἐγχριόμενα καὶ ἀλειφομένη. ἔστι δὲ θερμαντική.

Περὶ Λευκάδος. Κεφ. ρηϚ'.

Λευκὰς ὀρεινὴ, πλατυφυλλοτέρα τῆς ἡμέρου ὄζῃ, δριμυτέρον τε καὶ πικρότερον ἔχουσα τὸν καρπὸν καὶ ἀσομώτερον, δρασικωτέρα μέντοι τυγχάνει τῆς ἡμέρου ὀπὸς

item serpentium morsibus ex aceto solo, sine ficis.

Trissago. Cap. CXII.

Chamædris Græcis, aliis chamædrops: Latinis trissago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauere, propter eã quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis: frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potui tussibus, indurato lieni, vrinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: cit menses: partus extrahit, lienem ex aceto pota consumit: aduersus serpentium venena ex vino, potu, illitúque efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit: natura eius est calfacere.

Leucas. Cap. CXIII.

Leucas montana, latioribus q̃ vrbana foliis, semine acriore, amariore, ori ingrato, efficacior tamen q̃ satiua habetur.

Vtraque ex vino cõtra animalium venena, præcipuè marinorum opitulatur.

Lychnis coronaria.
Cap. CXIIII.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ simili, sed purpureo quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur.

Lychnis syluestris.
Cap. CXV.

Lychnis syluestris, omnia vrbanæ similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis poto: ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu, scorpiones torpescere, & incertes prorsus reddi.

Lilium. Cap. CXVI.

LILIA coronamentis sedendum, Liria à quibusdam vocata. E quibus vnguẽtum temperatur quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, neruos & priuatim vuluæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruefacta, ambustis proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulantur. Succus

ἐπιπλασσόμενα ἢ ἀμφότερα ἢ πινόμενα, ἀρμόζοισι μετ' οἴνου ἐπὶ τῶν ἰοβόλων, καὶ μάλιστα τῶν θαλασσίων.

Περὶ Λυχνίδος στεφανωματικῆς. Κεφ. ριδ'.

Λυχνὶς στεφανωματικὴ, ἄνθος ἔχει ὅμοιον λευκοΐῳ, ἐμπέφυκεν δὲ πλεκόμενον εἰς τὰ στεφάνια. ἧς τὸ σπέρμα βοηθεῖ σὺν οἴνῳ πρὸς τὴν σκορπιοπλήκτους.

Περὶ Λυχνίδος ἀγρίας. Κεφ. ριέ.

Λυχνὶς ἀγρία ὁμοία τῇ ἡμέρῳ κατὰ πάντα. τὸ δὲ σπέρμα ἀνῆς < β'. σπλῆθος ποθὲν ἄγει κατὰ κοιλίαν χολώδη· καὶ σκορπιοπλήκτοις ἀρμόζει. φασὶ δὲ καὶ τῶν σκορπίους ναρκώδεις καὶ ἀποφάκτους γίνεσθαι παρατεθείσης αὐτοῖς τῆς πόας.

Περὶ Κρίνου.
Κεφ. ριϛ'.

Κρίνον βασιλικὸν, τούτου τὸ ἄνθος στεφανωμάτικόν ἐστι. καλύμμυον ὑπ' ἐνίων λείριον. ἀφ' οὗ καὶ τὸ χρῖσμα κατασκευάζεται ὅ τινες λείριγον, οἱ δὲ σύσινον καλοῦσι, μαλακτικὸν ὂν τῶν νεύρων, καὶ ἰδίως τῶν περὶ μήτραν σκληρειῶν. τῆς δὲ πόας τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, ἑρπετοδήκτοις βοηθεῖ· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ χώματα ζεσθέντα· ταριχευθέντα ἢ ἐν ὄξει τραυματικὰ γίνεται.

ὁ δὲ

ὁ δὲ χυλὸς αὐτῶν μιγεὶς ὄξει ἢ μέλιτι, ἐφηδείς τε ὢν χαλκώματι ὑγιῶν γίνεται φάρμακον πρὸς τὰ παλαιὰ ἕλκη, καὶ πρόσφατα τραύματα. ἡ δὲ ῥίζα ὀπτὴ λεία σὺν ῥοδίνῳ, πυείκαυτα ἰᾶται, καὶ ὑστέραν μαλάσσει καὶ ἔμμηνα ἄγει καὶ ἕλκη ἐπουλοῖ· σὺν μέλιτι δὲ λεανθεῖσα νεύρων σπασμοὺς καὶ τρέμματα ἰᾶται· ἀλφοὺς τε ἀποκαθαίρει καὶ λέπρας, καὶ φύματα· καὶ ἀχῶρας σμήχει, τά τε πρόσωπα καθαίρει καὶ ἀῤῥυτίδωτα ποιεῖ· ζωὸν ὄξει δὲ λεία ἢ σὺν ὑοσκυάμου φύλλοις, καὶ ἀλεύρῳ πυείνῳ, ὄγκους φλεγμονὰς παραιτεῖται. τὸ δὲ σπέρμα ἑρπητῶν ὀδύνασιν ἀποφάρμακον πόθεν· ἐρυσιπελάτων δὲ κατάπλασμα σὺν οἴνῳ λεανθέντα, τό τε σπέρμα καὶ τὰ φύλλα. φασὶ δέ τινες καὶ πορφυρᾶ αὐτὴν κρίνου γίνεσθαι. σαρκέσκεται δὲ χλυνᾶται δὲ τῇ συείᾳ καὶ ποσθίᾳ τῆς παμφυλίας πρὸς τὸ τῶ χρίσματος κατασκεύασ.

Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati vlcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, vuluam emollit, menses ciet, vlcera cicatrice obducit: cum melle detrita, neruis præcisis, luxatísque medetur: vitiligines, furfures, & lepras emendat: vlceráque in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat: teritur in aceto cum hyoscyami foliis, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum morsibus serpentium aduersatur: ignibus sacris semen & folia cum vino illinuntur. Tradunt & rubra esse lilia. In Syria autem & Pisidia Páphiliæ, efficacissima vnguentis nascuntur.

Περὶ Βαλλωτῆς.

Κεφ. ριζ'.

Βαλωτὴ ἢ μέλαν πρόσπον· καυλὸς ἀνίσι τετραγώνοις, μέλανας, τραχυδάσιας, ἐκ μιᾶς ῥίζης πλείονας· φύλλα δὲ πρασίῳ ὅμοια μείζονα δὲ καὶ στρογγυλότερα καὶ σκιὰ διασημάτων τοῦ καυλοῦ παρπλήσια μελανοφύλλου, δυσώδη.

Ballote. Cap. CXVII.

Balloten, nomine alio nigrũ marrubiũ vocant: caules ædit quadrangulos, nigros, subhirsutos, cõplures ex vna radice: foliis maioribus quàm marrubij, hispidis, cingentibus per interualla caulẽ, subrotundis gra ueolẽtibus, apiastro proximis:

 ἔσθ' ὅτε

vnde aliqui apiaſtrum eam vo cauerũt: candidi flores vniuerſi verticillato ambitu caulem coronant. Vis eius efficax aduerſus canis morſus, foliis ex ſale illitis: feruenti cinere flaccescunt folia, vt condylomata reprimant. purgant & ſordida vlcera cum melle.

Apiaſtrum. Cap. CXVIII.

Meliſſophyllon ſiue melittęna, id eſt, apiaſtrum, id ſibi nomen vſurpauit, quoniam apes ipſa herba delectantur, cauliculi & folia ballotæ, de qua paulò antè diximus, ſimilia eſſent, niſi maiora, tenuioráque, nec ita hirſuta ſpectarentur: citreum malum olent. Folia cũ vino pota aut illita proſunt contra ictus phalangiorum, ſcorpionumque: item aduerſus canis morſum. Decoctum eorundem gratia, foueri prodeſt: deſeſſionibus fœminarum ad ciundos meſes conuenit, dentes eodem in dolore colluuntur, dyſentericis infunditur. Fungorum ſtrangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus & orthopnoicis, delinctu. Illita cum ſale ſtrumas diſcutiũt, vlcera purgant, articularios dolores illita ſedant.

Marru-

ὄθεν ἢ τοῦτο μελισσόφυλλον ἐκάλεσαν· καὶ τὰ αὐθη δὲ ἄμα πεφύκασι λευκοῖς τοῖς καυλοῖς. προχειρίζῶς. Ταύτης τὰ φύλλα καταπλασσόμενα μετ᾽ ἀλῶν, πίνεται πρὸς τὰ κυνόδηκτα· μαραινθέντα δὲ ἐν θερμοπότοις, κονδυλώματα στέλλει· ὑπαρᾷ τε ἕλκη σὺν μέλιτι ἀποκαθαίρει.

Περὶ Μελισσοφύλλου. Κεφ. ριή.

Μελισσόφυλλον, ὃ ἔνιοι μελίτταναν καλοῦσι, διὰ τὸ ἥδεσθαι τῇ πόᾳ τὰς μελίττας, ἔοικε ᾗ αὐτῆς τὰ φύλλα καὶ τὰ καυλία, τῇ προειρημένῃ βοτάνῃ, μείζονα ᾗ ταῦτα καὶ λεπτότερα, οὐχ οὕτω δασέα· ὄζονται δὲ κιτρομήλου. Ἁρμόζει δὲ τὰ φύλλα ποτιζόμενα σὺν οἴνῳ, καὶ καταπλασσόμενα πρὸς σκορπιοπλήκτοις, ἢ φαλαγγιοδήκτοις, καὶ κυνοδήκτοις. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν καταλλόμενον πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· εἴς τι ἐγκαθίσματα, πρὸς ἐμμήνων ἀγωγὴν εὐχρηστεῖ. ὀδοντολογίαις τε διάκλυσμα, ἕλκυσμά τε δυσεντερικοῖς· βοηθεῖ ἢ τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγομένοις σὺν νίτρῳ τὰ φύλλα τριφθέντα· καὶ τροφουμένοις, καὶ σπλεικτὴν ὀρθοπνοϊκοῖς. καταπλασσόμενα ᾗ σὺν ἁλσὶ, διαφορεῖ χειρῶδας, καὶ ἕλκη ἀνακαθαίρει, τά τε ὑπὸ τῶν ἀρθριτικῶν ἀλγήματα παραλλεῖται καταπλασθέντα.

Περὶ

Περὶ Πρασίου. Κεφ. ριθ'.

Πράσιον θάμνος ὄζην ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πολύκλαδος, ὑπόδασυς, λευκὸς, τετράγωνος τοῖς ῥάβδοις· φύλλον δὲ τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ ἴσον, ὑπογρόγγυλον, δασύ, ἔρισσον, πικρὸν τὴν γεῦσιν· ἐν διασημάτων δ' ἐπὶ τῶν κωλῶν τὸ σπέρμα· ἡ δὲ αὐξη οἰκεῖ σποδυλοι βαλέα. φύεται δὲ τὰ οἰκόπεδα, καὶ ἐρείπια. Τούτου τὰ φύλλα ξηρὰ σὺν τῷ σπέρματι ἐφόμενα σὺν ὕδατι ἢ χυλιζόμενα χλωρὰ, δίδοται μὴ μέλιτος φθισικοῖς, ἀθμαπικοῖς, βηχωσιν. αὐάγει καὶ πάχος ἐκ θώρακος ἴριδος ξηρᾶς μιγείσης. δίδοται καὶ ἢ μὴ καθαιρομέναις γυναιξὶ πρὸς ἀγωγὴν ἐμμιλιῶν καὶ δευτέρων, καὶ δυστοκούσαις, καὶ θηριοδήκτοις, καὶ τοῖς θανάσιμον πεπωκόσι· κύστει μύει τοι καὶ νεφροῖς ἄδηκτοι. τὰ δὲ φύλλα καταπλασσόμενα σὺν μέλιτι, ἐρυπαρὰ ἕλκη ἀναθαίρει. περιγιά τε καὶ νομὰς ἀφίησι, καὶ ὀδυνώδεις πλευρῶν παραιλεῖται. καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν δὲ σκευαζόμενον χύλισμα ἐνθλιβομένων τῶν φύλλων, καὶ συρεφόμενον ἐν ἡλίῳ πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· ἔστι δὲ καὶ ὀξυδερκὲς σὺν οἴνῳ καὶ μέλιτι ἐγχριόμενον· ἀποκαθαίρει δὲ καὶ ἐκτρέον διὰ τῶν ῥινῶν· ὠταλγίαις τε ἀρμόζει ἐγχυματιζόμενον καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ ῥοδίνου.

Περὶ Στα-

Maraubium. Cap. CXIX.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicē æquat: subrotūdum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex interuallis: flores verticillato ambitu asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua aut viridium succus datur cum melle suspirioſis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eiicit. Mulieribus à partu non purgatis datur, vt menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibns demorsi sunt: vesicam renésque lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis vlceribus purgandis: pterygia nomásque sistunt, laterum dolores mitigant. Succus foliis contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum vino & melle illitus oculorum claritatem adiuuat: naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys. Cap. CXX.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed longior: folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures virgas ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem: foliorũ decoctum potu pellit menstrua & secundas.

Περὶ Στάχυος. Κεφ. ρκ'.

Στάχυς θάμνος ἐμφερὴς πρασίῳ, ὑποπυκνότερος δὲ καὶ πλείονα φύλλα ἀραιὰ ἔχων ὑποδάσεα, σκληρὰ, ὑυώδη, λευκὰ, ῥαβδία ἢ πλείονα ἀπὸ τῆς αὐτῆς ῥίζης, λευκότερα τῶν τῆς πρασίου. φύεται ἐν ὀρεινοῖς, καὶ βαλάσσῃ χωρίοις. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, δριμεῖαν· ὅθεν τὸ ἀπόζεμα τῶν φύλλων ἔμμηνα καὶ ὑστέρας ἄγει πανόμφυον.

Phyllitis. Cap. CXXI.

Phyllitis, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena aut septena, recta, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem pensiles quasi vermiculos tenues ostendunt: in vmbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo: neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in vino pota serpentium morsibus aduersantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta aluus exarcet, potui datur.

Περὶ Φυλλίτιδος. Κεφ. ρκά.

Φυλλίτις φύλλα ἀγίνῃ ὅμοια λαπάθῳ, ὑπομηκέστερα δὲ καὶ ὑυδαλέστερα ς'. ἢ ζ'. ὀρθὰ, λεῖα ἐκ τῶν ἔμπροσθεν, ἐκ τῶν ὄπισθεν δὲ καθάπερ σκώληκας ἔχοντα, ἀπτερυμώδεις, λεπτούς· φύεται ἐν κατασκίοις καὶ παρ' ἐΐσοις, γευσαμένῳ τρυφνὴ, οὔτε δὲ καυλὸν οὔτε καρπὸν οὔτε ἄνθος φέρει. Ταύτης τὰ φύλλα μετ' οἴνου πινόμενα, πρὸς ἑρπετοδήκτους πρόσφορα ἐπὶ τετραπόδων τε διὰ στόματος ἐγχυματισθέντα βοηθεῖ· πίνεται καὶ πρὸς δυσεντερίαν καὶ διάῤῥοιαν.

Phalangiũ. Cap. CXXII.

Phalangiũ à quibusdam phalágites vocatur. ramuli sunt ei duo, aut tres, pluréfve, in diuersa tendétes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habẽs: semine

Περὶ Φαλαγγίου. Κεφ. ρκβ'.

Φαλάγγιον, οἱ δὲ φαλαγγίτην. οἱ δὲ καὶ ταύτην λευκάνθεμα καλοῦσι· κλῶνές εἰσι δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείονες, διεζῶντες ἀπ' ἀλλήλων· ἄνθη λευκὰ, παρεμπλήσια χίονι, σύστομας πολλὰς ἔχοντα· σπέρμα

σπέρμα δὲ παχὺ μέλαν, ὥσπερ φακοῦ ἥμισυ, ἰχνοτιθὲν ὠὸν τοι πολλῶν ῥιζίον μικρὸν, λεπτὸν, χλωρὸν ἅμα τῷ ἑλκωθῆναι ἐκ τῆς γῆς. ὕστερον γὰρ συμλέκεται· φύεται δὲ ἐν χεωλόφοις. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ αὐτὸς πινόμενον μετ' οἴνου, σκορπιοπλήκτοις βοηθεῖ, καὶ φαλαγγιοδήκτοις· λύει δὲ καὶ ἑρφούς.

Περὶ Τειφύλλου. Κεφ. ρκγ'.

Τείφυλλον οἱ δὲ ὀξύφυλλον, οἱ δὲ, μιλιανθὲς, οἱ δὲ ἀσφάλτιον, οἱ δὲ κνίκιον καλοῦσι, θάμνος ὢν πήχεως μείζων, ῥάβδους ἔχων λεπτὰς, μελαίνας, γονώδεις, περφυάδας ἐχούσας, ἐφ' ὧν φύλλα ὅμοια λοτῷ τῷ δένδρῳ, τρία καθ' ἑκάστην βλάστην· ὁσμὴ δὲ αὐτῶν ἄρτι μὴ φυομένων πιγαίου, ἀνθέντων δὲ ἀσφάλτου· ἄνθος δὲ ἀνίσι πορφυροῦν· σπέρμα δὲ ὑποπλατυ καὶ ὑποδυσυ, ἐν τῷ ἑτέρου πέρατος ὥσπερ * κεραίαν ἔχον, ῥίζα δὲ λεπτὴ, μακρὰ, * ἰσχνή. Βοηθεῖ δὲ τὸ σπέρμα καὶ τὰ φύλλα πινόμενα ἐν ὕδατι πλευριτικοῖς, δυσουρητικοῖς. ἐπιληπτικοῖς, ἀρχομένοις ὑδρωπιᾶν, ὑστερικαῖς· ἄγει δὲ καὶ καταμηνία· δεῖ δὲ διδόναι τὸ μὲ σπέρματος ⊲ γ'. τὸ δὲ φύλλων ⊲ δ'.

ἀρήγει

semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur: prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos cũ vino pota, auxiliantur contra scorpionum phalangiorúmque ictus: tormina quoque discutiunt.

Trifoliũ. Cap. CXXIII.

Trifoliũ, Græci triphyllon, alij ocytriphyllon, alij menyanthes, alij asphaltion, vocãt. Frutex supra cubiti altitudiné attollitur, virgas habens tenues, iũceas & nigras, vnde ramulares enascũtur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeũt folia, loto arbori similia: iis recéter enatis rutę odor inest: vbi aũt adoleuerũt, bitumé olét. Floré ædit purpureũ. Semé quadáten⁹ latũ, subhirsutũ, ex altera extremitate exertũ, antennæ modo corniculũ gerẽs. Radix tenuis, lóga, valida. Semé & folia in aqua pota pleuriticis, vrinæ difficulti, comitialib⁹, & iis qui aquę inter cuté prícipia sentiũt, fœminis quoq; vuluę vitio opportunis, auxiliantur: mẽses ciunt: ternæ drachmæ è semine dari debent, è foliis verò quaternæ.

Contra ſerpentium ictus trita folia, & ex aceto mulſo pota, præſidio ſunt. Tradũt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctũ fotu dolores eorũ finire, quos ſerpentes percuſſerint: qua aũt aqua ſanatus quis fuerit, ſi ea quiſpiã alius foueatur, qui vlcus habuerit perinde afficitur vt à ſerpẽte demorſus. Quidã terna folia aut ſemina in tertianis, cũ vino potui dedere: & in quartanis, quaterna, vt quæ febriũ circuitus diſcuterẽt. Radix antidotis inſeritur.

ἀρήγει δὲ καὶ θηριοδήκτοις τὰ φύλλα λεῖα συὼ ὀξυμέλιτι πινόμενα· ἱστοροῦσι δέ ἔνιοι ὅτι τὸ ἀφέψημα ὅλον τῶ θάμνου καὶ τῆς ῥίζης ἢ τῶν φύλλων καταντλούμενον ἐπὶ τῶν ἐρπετοδήκτων παραλείπεται τὸν πόνους, ᾧ δ' ἂν θεραπευθῇ τις ὕδατι, ἂν ἕτερος ἕλκος ἔχων καταντληθῇ, τὰ αὐτὰ πάσχει τοῖς δηχθεῖσι. ποτίζουσι δὲ πίνες ἐπὶ μὲν τεταρτάίου τρία φύλλα ἢ τρία σπέρματα συὼ οἴνου· ἐπὶ δὲ τεταρταίου δ'. ὡς λύοντα καὶ θεριόδηκτος. μίγνυται δ' αὐτῶν ἡ ῥίζα ἢ αὐτοδότοις.

Polium. Cap. CXXIIII.

Duo genera polij: montanũ, cui theuthrio nomẽ eſt, & cui eſt vſus. Tenuis frutex eſt, cãdidus, dodrantalis, ſemine refertus: capitulo in cacumine quãdam corymborũ ſpecié præ ſe ferẽte, paruo, cano hominis capillo ſimili, grauiter olente, nõ ſine quadam ſuauitate. Alterũ fruticoſius, non vſqueadeò valẽs odore, & viribus infirmius. Potũ feruefacti ius auxiliatur ſerpentiũ ictibus, hydropicis, morbo regio: & lienoſis ex aceto: ſtomachũ malè habet: caput doloribus afficit, aluum & menſes ciet: ſubſtratũ ſuffitúmve ſerpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

Περὶ Πολίου ὀρεινοῦ. Κεφ. ϙκδ'.

Πόλιον τὸ μέν, ἔστιν ὀρεινὸν, ὃ καὶ τευθρίον καλεῖται, οὗ καὶ ἡ χρῆσις· θαμνίον δέ ἐστι λεπτὸν, λευκὸν, ποιθαμιαῖον, καρπῶ θλῖβες, ἔχον κεφάλιον ἐπ' ἄκρου κορυμβοειδὲς μικρὸν ὡς πολιὰν τρίχα, βαρύοσμον μετὰ ποσῆς εὐωδίας. Τὸ δὲ ἕτερον θαμνωδέστερον, οὐχ ὅμοιον τοῦτονον τῇ ὀσμῇ, καὶ ἀσθενέστερον κατὰ τὴν δύναμιν. Δύναται δὲ αὐτῶν τὸ ἀπόζεμα πινόμενον, θηριοδήκτοις ἀρήγειν, ὑδρωπικοῖς, ἰκτερώδεσι, σπληνικοῖς δὲ συὼ ὄξει· ἔστι δὲ καὶ κεφαλαλγὲς καὶ κακοστόμαχον· ἄγει δὲ καὶ κοιλίαν καὶ ἔμμηνα· ὑποστρωνύμενον δὲ καὶ θυμιώμενον, θηρία διώκει. καταπλασσόμενον δὲ σκεύματα κολλᾷ.

Scor-

Περὶ

Περὶ σκορδίου. Κεφ. ρκέ.

Σκόρδιον φύεται ἐν ὀρεινοῖς τόποις καὶ ἑλώδεσι, φύλλα ἔχον ἑοικότα χαμαίδρυϊ, μείζονα δὲ καὶ οὐχ οὕτως ἐντετιμημένα πρὸς εὐφόρειαν, ποσῶς δὲ τῇ ὀσμῇ σκορδίζοντα, συμπικὰ δὲ καὶ ἐμετικὰ κατὰ τὴν χεῦσιν· καυλίαι δὲ τετράγωνοι· ἀφ' ὧν αὐτὸς ὑπέρυθρον. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡπάτων θερμαντικὴν, διουρητικὴν ποτιζομένη χλωρὰ, λεία, καὶ ξηρὰ ἀφεψομένη σὺν οἴνῳ πρὸς ἕρπητῶν δήγματα καὶ θανάσιμα· πρός τε δυσμὸν στόμαχου καὶ δυσεντερίαν, καὶ δυσουρίαν < β'. σὺν ὑδρομέλιτι· καθαίρει καὶ πάχος πνεύμονος ἐκ θώρακος. ποιεῖ καὶ πρὸς παλαιὰν βῆχα καὶ ῥήγματα, καὶ ἀπόσματα σὺν καρδάμῳ καὶ μέλιτι καὶ ῥητίνῃ μιγεῖσα ξηρὰ ἐν ἐμπλάστρῳ· καὶ ὑποχόνδριον χρονίως φλεγμαίνον, ἀναλαμβανομένη κηρωτῇ παρηγορεῖ· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ποδάγραν μετ' ὄξους δριμέως ἐπαλειφόμενον, ἢ μὴ ὕδατος καταπλασσόμενον· πρόσφατα δὲ ἐμπλαττόμενα κινεῖ· καὶ τραύματα κολλᾷ· ἕλκη παλαιὰ ἀναξηραίνει, καὶ ἀπουλεῖ σὺν μέλιτι· ξηρὰ δὲ ὑπερσαρκώματα σέλλει. πίνεται δὲ καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς χύλισμα πρὸς τὰ εἰρημένα πάθη. ἀναγόνατον δέ ἐστι τὸ πνευμονικὸν καὶ τὸ κρητικόν.

Περὶ

Scordium. Cap. CXXV.

SCORDIVM, in montibus & paluſtribus naſcitur, foliis triſſaginis, maioribus, nō ſic in ambitu diuiſis, aliquantum allia redolentibus, guſtu amaris & adſtringētibus: quadrangulis caulibus: ſubrubro flore. herba vim excalfactoriam habet: vrinam cit. Cocta recens aridáve cum vino, aduerſus venenatos ſerpentium morſus bibitur: ad ſtomachi quoque roſiones, dyſenteriam, & vrinæ difficultatem, binis drachmis cum hydromelite: craſſamen purulētum pectore expellit. Facit aridæ farina ad veterem tuſsim, rupta, conuulſa, ſi cum naſturtio melle & reſina miſceatur in eclegmate: inflammata modicè præcordia, cerato excepta, recreat: cum aceto acri aut aqua, podagris conueniēter illinitur: menſes impoſita mouet: vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit, ſicca excreſcētias in carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticúmq;.

Tuſsilago.

Tusilago. Cap. CXXVI.

Tusilagini folia sunt maiuscula quàm hederæ, sex aut septem à radice subalbida à terra, supernè virentia, in plures angulos exeuntia: caulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo vnà cum caule confestim exuitur: inde nõnulli his vacare existimauerunt. Radix tenuis est & superuacua: nascitur in amœnis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammationibus illitu medentur. Aridæ fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui ficca tussi atque orthopnœa infestantur: pectoris vomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & pota emortuos partus eiicit.

Artemisia. Cap. CXXVII

Artemisia magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus foliis, ramísque huius quidem genera duo. vnum lætius habitiúsque, foliis virgísque latioribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate

Πρὶ Βηχίου. Κεφ. ρκς'.

Βήχιον φύλλα ἔχει ὅμοια κισσοῦ, μείζονα δὲ ς' ἢ ζ'. ἀπὸ τῆ ῥίζης, ἐν μὲ τ πρὸς τὰ ἄνω λευκὰ, ἐν δὲ τ πρὸς τὰ κάτω χλωρὰ γωνίας πλείνς ἔχοντα· καυλὸν σπιθαμιαῖον· ἄνθος ὠχρὸν κ τὸ ἔαρ, ὀξέως δὲ ἀποβάλλει τὸ, τε ἄνθος καὶ τὸν καυλόν· ὅθεν τινὲς ὑπέλαβον ἄκαυλον καὶ ἀνανθῆ ὑπάρχειν τὴν πόαν. ῥίζα λεπτὴ, ἄχρηστος· φύεται δὲ λιβάδας κ εὐύδρους τόπους. Ταύτης τὰ φύλλα λεῖα σὺν μέλιτι καταπλασσόμενα, ἐρυσιπέλατα καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν ἰᾶτ. ὑποθυμιώμενα δ' ξηρὰ εἰς ἀποκαπνισμὸν, τὸν ὑπὸ ξηρᾶς βηχὸς κ ὀρθοπνοίας ὀχλεμοὺς διαρρήγνυσι, ὅταν χανόντες, τ καπνὸν τῷ στόματι δέξωνται, κ καταπίωσι· ῥήγνυσι δ' κ τὰ ἐν θώραξι ἀποστήματα. τὸ δ' αὐτὸ ποιεῖ κ ἡ ῥίζα ὑποθυμιωμένη. ἔμβρυόν τ τεθνηκὸς ἐκβάλ λει ὑδρομέλιτι ἐφθὴ πινομένη.

Πρὶ Ἀρτεμισίας πλυκλώνου. Κεφ. ρκζ'.

Ἀρτεμισία φύεται ἐν παραθαλασσίοις τόποις ὡς τὸ πολὺ, πόα θαμνοειδὴς παρόμοιος ἀψινθίῳ, μείζων. ἔχει κ λιπαρώτερα τὰ φύλλα ἔχουσα. κ ἡ μὲν πως ἔστιν αὐτ εὐδρὴς πλατύτερα ἔχουσα τὰ φύλλα κ τὰς ῥάβδους. ἡ δ', λεπτοτέρα, αἳ δὴ μικρὰ, λιπῆ, λευκὰ, βαρύοσμα·

μασθέρους δὲ ἀνθεῖ. Ἔνιοι δὲ τὸ ἐν μεσογείοις λεπτόκαυλον βοτάνιον ἁπλοῦν τῷ καυλῷ, σφόδρα μικρὸν, ἄνθους πλείστων, κιρροειδὲς τῇ χροιᾷ, λεπτὸν, καλοῦσιν ἀρτεμισίαν μονόκλωνον· ἔστι δὲ εὐωδεστέρα τῆς πρὸ αὐτῆς. Ἀμφότεραι δὲ θερμαίνουσι καὶ λεπτύνουσιν. ἀποζεννύμεναι δὲ ἁρμόζουσιν εἰς γυναικεῖα ἐγκαθίσματα, πρὸς ἀγωγὴν ἐμμηνίων καὶ δευτέρων καὶ ἐμβρύων, μύσιν τε καὶ φλεγμονὴν τῆς ὑστέρας καὶ θρύψιν λίθων, καὶ ἐποχὴν οὔρων. ἡ δὲ πόα κατὰ τοῦ ἤτρου καταπλασθεῖσα πολλὴ, ἔμμηνα κινεῖ. ὁ δὲ ἐξ αὐτῆς χυλὸς λεανθεὶς σμύρνῃ καὶ προστεθεὶς, ἄγει ἀπὸ μήτρας ὅσα καὶ τὸ ἐγκάθισμα. καὶ ποτίζεται δὲ ἡ κόμη πρὸς ἀγωγὴν τῶν αὐτῶν, πλῆθος < γ´.

æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellant, tenuem herbulam, ſimplici caule & minuto, floribus ſcatéte tenuibns, flauo colore: hæc iucundiorem quàm præcedens efflat odoré. Vtraque excalfacit, extenuat: ferueſactæ conuenienter in muliebres deſeſſus adiiciuntur, ad detrahendos menſes, partus, ſecundáſque: item ad præcluſiones vuluæ, & eiuſdem inflammationes: calculos cõminuũt: remoratam vrinam cient: menſes pellunt pubi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadẽ quæ inſeſſo trahit. Coma trib⁹ drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Περὶ Ἀρτεμισίας λεπτοφύλλου. Κεφ. ρκή.

Ἀρτεμισία λεπτόφυλλος, ἥ τις γεννᾶται περὶ ὀχετοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ εἰς χώρας σπορίμους. τὸ ἄνθος οὖν αὐτῆς καὶ τὰ φύλλα τριβόμενα, ὀσμὴν ἀποδίδωσι σαμψύχου. εἰ οὖν τις πονεῖ τὸν στόμαχον καὶ κόψει τὴν βοτάνην ταύτην μετὰ ἀμυγδαλίνου ἐλαίου καλῶς, καὶ ποιήσει ὡς μάλαγμα καὶ θήσει ἐπὶ τὸν στόμαχον, θεραπευθήσεται. εἰ δὲ καὶ τὰ νεῦρα τις πονεῖ, τὸν χυλὸν ταύτης μετὰ ῥοδίνου ἐλαίου μίξας χρίει, θεραπευθήσεται.

Περὶ

Artemiſia. Cap. CXXVIII.

Habetur & Artemiſiæ genus aliud, q̃ minutis foliis circa riuulos aggeréſque. Item in agris frumentariis naſcitur. floribus & foliis odoré Sampſuchi referentibus. ſi quis ex ea diligenter tuſa cum oleo amygdalarum malagma ſtomacho imponat: vexationem partis eius ſanabit. Neruorum dolores ſucco huius cum roſaceo inunctis curãtur.

Ambroſia.

Ambrosia. Cap. CXXIX.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus altitudine trium palmorum: foliis rutæ, circa imum caulem exiguis, cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, suaui: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores; qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys. Cap. CXXX.

BOTRYS fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia: tota suauè odorem spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnœas mulcet. Hãc Cappadoces Ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium. Cap. CXXXI.

GERANION foliis anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis

Περὶ Ἀμβροσίας. Κεφ. ρχθ'.

Ἀμβροσία, οἱ δὲ βόζυς, οἱ δὲ βότρις ἀρτεμισία, θαμνίσκος ὀζὴ τριπόδαμος τὸ ὕψος, πολύκλαδος· φύλλα ἔχων ὡς ἡ ἐνδολὴ τῆς κυνὸς μικρὰ ὡς πηγάνου· τὰ δὲ κλήματα ὡς σταφυλῆς ματίων, ἐοικότων βοτρυδίοις μικροῖς ἀνθοῦσι, τῇ ὀσμῇ οἰνώδης, ἡδεῖα· ἡ δὲ ῥίζα λεπτή, πολύθαμος. καὶ ἀναλέγεται δὲ ἐν καππαδοκίᾳ τοῖς στόμαχοις. Δύναμιν δ' ἔχει ἀναπτικὴν τῶν ἐπιφερομένων καὶ ἀποκρυστικὴν, καὶ τὰ πλατυνόμενα εὐφυῆ.

Περὶ Βότρυος. Κεφ. ρλ.

Βότρυς πόα ὀζὴν ὅλη κυκλίνη, θαμνοειδὴς, διακεχυμένη, πολλὰς ἔχουσα μασχάλας. τὸ δὲ σπέρμα ὅλοις τοῖς κλωνίοις περιπέφυκε· φύλλα κιχωρείῳ ἐμφερῆ, καὶ τὸ σύμπαν εὐῶδες ἱκανῶς· διὸ καὶ ἱματίοις συντίθεται. φύεται δὲ μάλιστα περὶ καρύδρας καὶ χειμάρρους. Δύναμιν δὲ ἔχει συνοίγουσαν πνευμόνων ὀρθοπνοίας παραιρετέαν, καὶ τοὺς ἀπὸ τούτων ἀμβροσίαν καππαδόκαι καλοῦσι, τινὲς δὲ ἀρτεμισίαν.

Περὶ Γερανίου. Κεφ. ρλά.

Γεράνιον, τὸ μὲν φύλλον ἔχει ὅμοιον ἀνεμώνῃ, ἐρισμένον, μακρότερον· ῥίζαν δὲ ὑποστρόγγυλον, γλυκεῖαν, ἐδωδιμώδη, ἣ τις πεφθεῖσα ἐν οἴνῳ ἄχρι τριῶν δραχμῶν, ὑστέρας ἐμπνευματώσεις λύει. καλεῖται δὲ ὑπ' ἐνίων καὶ ἕτερον γεράνιον, ἔχον κυκλίσκα λεπτὰ

λεπτὰ χροώδη, δι' ἀπάθεια· φύλλα μαλάχῃ ἐμφερῆ, ᾗ ἐπ' ἄκρων τῶν μαράθων ἐξοχάς τινας ἀναπεγευκύας ὡς γεραιῶν κεφαλὰς σὺν τοῖς ῥάμφεσιν, ἢ κυνῶν ὀδόντας. χρῆσις ἡ αὐτὴ ἐν ἰατρικῇ ἐδέμια.

tis & pilosis sesquipedalib⁹: foliis maluæ, in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus.

Πρὶ Γναφαλίν. Κεφ. ρλβ'.

Γναφάλιον, τούτῳ τοῖς φύλλοις πινὲς ἀντὶ γναφάλου χρῶν) λευκοῖς ἅπασι καὶ μαλακοῖς. ποιεῖ δὲ σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ ποτιζόμενα τὰ φύλλα πρὸς δυσεντερείαν.

Gnaphaliũ. Cap. CXXXII.

GNAPHALII foliis mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam.

Πρὶ Τύφης. Κεφ. ρλγ'.

Τύφη, φύλλον ἀνίσοι κυπείρῳ ὅμοιον· καυλὸν λεῖον, ὁμαλὸν, ἐπ' ἄκρῳ πεκιεμένον· ἄνθος πυκνὸν ᾧ ἐπαπτόμενον, ὃ καλοῦσιν ἔνιοι ἀνθήλιον. τούτης τὸ ἄνθος ἀναληφθὲν σέαπι παλαιῷ ὑείῳ πεπλυμένῳ, κατακαύματα θεραπεύει. φύεται δὲ ἐν ἕλεσι καὶ ὑδροποτίμοις τόποις.

Typha. Cap. CXXXIII.

Typha folium ædit cyperidi simile: caulé album, læué, æquabilem: floré in cacumine ambientem, déſum, qui in pappos soluitur, quod paniculã aliqui nominant. Huius herbæ flos, suillo adipe eloto exceptꝰ ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnãtibus.

Πρὶ Κιρκαίας. Κεφ. ρλδ'.

Κιρκαία, οἱ δὲ δρακαίαν καλοῦσι· τὰ μὲν φύλλα ἔχει σρύχνῳ ὅμοια κυπαίῳ, πεφυάδας δὲ πολλάς. ἄνθη μέλανα, μικρὰ, πολλά· καρπὸν δὲ κογχοειδῆ ἔν τισιν οἱονεὶ καρυΐοις· ῥίζας πεπαχυμένας γ' ἢ δ'. λευκὰς, εὐώδεις, θερμαντικὰς, μάλιστα δὲ ἔν τισι πετρώδεσι φύεται τόποις καὶ εὐπόροις εὐκλοις. ταύτης ῥίζα ὅσον μιᾶς δ'. θλασθεῖσα καὶ βραχεῖα ἡμέρας

Circæa. Cap. CXXXIIII.

CIrcæa, quam & dircæam aliqui vocant, foliis est hortẽsis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrantali radice, triplici fermè aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciẽte. Nascitur in apricis, saxis, & vento perflatis. Radicis tusæ pondo quatuor, in sextariis tribus vini dulcis,

per

per diem & noctem macerantur, potúque triduo vuluas expurgant. Semen in sorbitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

OEnanthe. Cap. CXXXV.

OENANTHE folia habet pastinacæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: semen atriplicis: radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem: nascitur in petris. Caulis eius & folia, cum mulso vino pota secundas eiiciunt. Radix è vino, vrinæ stillicidio conuenit.

Conyza. Cap. CXXXVI.

CONYZÆ duo genera: quæ parua vocatur, odore præstantior est: maior verò frutice altior est & foliis latioribus, graui odore. Vtriusque folia oleæ similia, hirsuta, pinguia. In maiore caulis binûm cubitorum altitudine attollitur. in minore pedem æquat. Flos fragilis, lutei coloris, subamarus qui in pappum abit: radices superuacuæ. Suffitu substratúque frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vulnerib⁹.

Flores

ἡμέραν καὶ νύκτα ἐν οἴνου γλυκέως κοτύλαις ϛʹ. καὶ ποθεῖσαι ἡμέρας γʹ. ὑστέραν ἀποκαθαίρει. ὁ δὲ καρπὸς γάλα κατασπᾷ, ἐν ῥοφήμασι λαμβανόμενος.

Περὶ Οἰνάνθης. Κεφ. ρλεʹ.

Οἰνάνθη, οἱ δὲ λεύκανθον καλοῦσιν· τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὥσπερ σταφυλῖνος. ἄνθη δὲ λευκά. καὶ καυλὸν παχὺν, σπιθαμιαῖον· καρπὸν δὲ ὥσπερ ἀτραφάξιος· ῥίζαν μεγάλην κεφαλὰς ἔχουσαν πλείονας, στρογγύλας. φύεται ἐν πέτραις. ταύτης ὁ καρπὸς καὶ ὁ καυλὸς καὶ τὰ φύλλα, ποτίζεται πρὸς δευτέρων ἐκβολὴν σὺν οἰνομέλιτι. ἡ δὲ ῥίζα σὺν οἴνῳ πρὸς στραγγουρίας ἁρμόζει.

Περὶ Κονύζης. Κεφ. ρλϛʹ.

Κόνυζα, ἡ μέν τις μικρὰ καλεῖται, εὐωδεστέρα οὖσα, ἡ δὲ μείζων, ὑπερέχουσα τῷ θάμνῳ καὶ τοῖς φύλλοις, πλατυτέρα καὶ βαρύοσμος. ἀμφότεραι δὲ προσεοίκασι τοῖς φύλλοις ἐλαίᾳ. ἔστι δὲ δασέα ταῦτα καὶ λιπαρά· ὕψος δὲ τοῦ καυλοῦ ἡ μὲν μείζων, δύο πήχεων ἔχει, ἡ δὲ ἐλάττων ποδός· ἄνθος ψαφαρὸν, μήλινον, ὑπόπικρον, ἐκπαππούμενον· ῥίζαι δὲ ἄχρηστοι. Δύναται δὲ ὁ θάμνος ὑποστρωννύμενος σὺν τοῖς φύλλοις καὶ θυμιώμενος, θηρία διώκειν, καὶ κώνωπας ἀπελαύνειν· κτείνει δὲ καὶ ψύλλας· καταπλάσσεται δὲ τὰ φύλλα ὠφελίμως ἐπὶ ἑρπετοδήκτων καὶ φυμάτων, καὶ τραυμάτων.

μάτων. καὶ πίνεται σὺν οἴνῳ τὸ ἄνθος καὶ τὰ φύλλα πρὸς καταμηνίων ἀγωγὴν καὶ ἐμβρύων ἐκβολὴν, καὶ στραγγουρίαν, καὶ στρόφους καὶ ἴκτερον· μετ' ὄξους δὲ ἐπιληπτικοὺς πινόμενα ὠφελεῖ. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς ἐγκαθίσματι, τὰ ἐν μήτρᾳ θεραπεύει. ὁ δὲ χυλὸς προστεθεὶς ἐκτρωσμοὺς ποιεῖ· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ῥίγη συγχριομένη ἡ πόα μετ' ἐλαίου. ἡ δὲ λεπτὴ καὶ κεφαλαλγίας καταπλασσομένη ἰᾶται. Γίνεται καὶ τρίτον εἶδος κονύζης· ἔστι δὲ καυλῷ παχυτέρα καὶ μαλακωτέρα, τοῖς δὲ φύλλοις μείζων τῆς λεπτῆς, ἐλάσσων δὲ τῆς μείζονος, οὐ λιπαρὰ, βαρυοσμοτέρα δὲ πολλῷ καὶ ἀηδεστέρα καὶ ἀπρακτοτέρα. φύεται δὲ ἐν ἐφύδροις.

Flores & folia cũ vino ad mẽses partúsque eiiciendos bibũtur: item contra vrinæ stillicidia, arquatum morbum, & tormina: comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in desessionib⁹ medetur vuluæ malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore: foliis mediæ inter maiorem ac minorem amplitudinis, minimè autem pinguibus: multò grauioris hæc est odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

Περὶ Ἡμεροκαλλίδος. Κεφ. ρλζ΄.

Ἡμεροκαλλὶς, φύλλα ἔχει καὶ καυλὸν ὅμοια κρίνῳ, χλωρὰ δὲ ὥσπερ πράσα. ἄνθη δὲ ἐν αὐτῷ καθ' ἑκάστην ἀπόφυσιν γ΄. ἢ δ΄. τὴν σχίσιν τῷ κρίνῳ ἐοικότα ὅταν ἄρχηται χαίνειν· τὴν δὲ χρόαν ἰσχυρῶς ὠχρὰν, ῥίζαν ὁμοίαν βολβῷ εὐμεγέθει, ἥτις λεία ποθεῖσα καὶ σὺν μέλιτι ἐν ἐρίῳ προστεθεῖσα πεσσὸς ἐστὶν ὑδραγωγὸς καὶ αἱματαγωγός. τὰ δὲ φύλλα λεῖα καταπλασσόμενα φλεγμονὰς μαστῶν τὰς ἐκ τοκετῶν καὶ ὀφθαλμῶν πραΰνει· καὶ

Hemerocallis, siue lilium syluestre. Cap. CXXXVII.

HEMEROCALLIS folium & caulem habet lilij, porraceo colore: flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuisura, quoties dehiscere cœperũt. colore perquàm pallido: radix magna est atque bulbosa: quæ pota, aut cum melle & lana in pesso apposita, aquam educit & sanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorúmque collectiones mitigãt.

Radi

Radix & folia igni ambustis vtilissimè illinuntur.

Leucoiũ, siue viola alba.

Cap. CXXXVIII.

Leucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia quædam: nanque aut cœrulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea verò præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruefacti in desessionibus, valent contra vuluæ inflammationes, & mẽstrua expellunt: sanãt oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duũm drachmarũ pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienẽ reprimunt, & podagricos iuuant.

Cratæogonum.

Cap. CXXXIX.

Cratæogonum, siue vt aliis placet crateonó, foliis melampyro simile est, multis calamis ex vna radice emicãtibus, multorũq; geniculorũ: semine milij: nascitur magna ex parte in opacis & frutetosis, sũmopere acre. Traditũ est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post mẽses purgatos, tribus obolis in cyatis aquæ duobus mulier,

καὶ καταπλάσαι. δὲ ἡ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα ὠφελίμως ἐπὶ τῶν πυρικαύστων.

Περὶ λευκοΐου. Κεφ. ρλη'.

Λευκόϊον γνώριμόν ἐστιν, ἔστι δὲ αὐτῶν διαφορὰ ἐν τῷ ἀνθεῖ. ἢ γὰρ λευκόν ἐστιν ἢ μέλινον ἢ κυανοῦν ἢ πορφυροῦν εὑρίσκεται. ἔστι δὲ αὐτῶν εὔχρηστον πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν τὸ μέλινον, οὗ τὰ ἄνθη ξηρὰ ἀποζεσθέντα εἰς ἔγκαθισμα τὰ ποιεῖ πρὸς τὰς ἀεὶ ὑσέρας φλεγμονὰς καὶ ἀγωγὰς ἐμμήνων· ἀναιροῦντα δὲ κυρωτὴν ῥαγάδας τὰς ἐν στόματι θεραπεύει· σὺν δὲ μέλιτι ἕλκη. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ σὺν οἴνῳ πεθεὶς δραχμῶν δυοῖν πλῆθος, ἢ πεσσευθεὶς σὺν μέλιτι, ἐμμηνα καὶ δεύτερα καὶ ἔμβρυα ἄγει. αἱ δὲ ῥίζαι καὶ ἀποσθεῖσαι σὺν ὄξει, στέλλουσι σπληνα, καὶ ποδαγρικοὺς ὠφελοῦσι.

Περὶ Κρατωγόνου.

Κεφ. ρλθ'.

Κρατωγόνον, οἱ δὲ κρατέωνον, φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τῆς μελαμπύρου, πλείους δὲ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης φύουσι βλαστοὶ γονατώδεις. καρπὸν δὲ ὅμοιον κέγχρῳ. φύεται ἐν σκιεροῖς καὶ φρυγανώδεσιν ὡς ἐπιπολὺ τόποις, ἰσχυρῶς δὲ δριμύ.

Ἱστορεῖται δὲ ὑπό τινων ἡ πόσις τοῦ καρποῦ γυναῖκα ἀγόνητον ποιεῖν, ἐάν τις μετὰ τὴν κάθαρσιν τῶν καταμηνίων πρὸς τὸ πλησ-

σάσαι

σιάσαι πίνῃ νῆστις τρὶς τ' ἡμέρας, ὀλκὴν τριωβόλου μὴ ὕδατος κυάθων ϛ'. ἐπὶ ἡμέρας μ'. ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ πινέτω ταὐτὸν ἡμέρας καὶ σαλπιαζέτω.

Περὶ Φύλλου. Κεφ. ρμ'.

Φύλλον, οἱ δὲ ἐλαιόφυλλον, οἱ δὲ βρυωνίαν καλοῦσι. φύεται ἐν πίτυσιν, τὸ μὲν θηλυγόνον λεπτόμυλλον, ὥσπερεὶ βρύον. ἔχον χλωρότερον ἐλαίας τὸ φύλλον· κυμὸν λεπτὸν, βραχυῶ· ῥίζαν λεπτὴν· αὐθος λευκόν· καρπὸν μείζονα ὥσπερ μύκωνος. τὸ δὲ ἀρρενογόνον, τὰ μὲν ἄλλα ὅμοιον τῷ προειρημένῳ· καρπῷ δὲ διαφέρει· ἔχει γὰρ ὅμοιον αὖθει ἐξωθηκίας ἐλαίας βοτρυάδια. λέγεται δὲ τὸ ἀρρενογόνον πεθὲν, ἀρρενοτοκεῖν, τὸ δὲ θηλυγόνον θηλοτοκεῖν. ἱστορεῖ δὲ τούτων Κρατεύας, ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τὰ τοιαῦτα μέχρι τῆς δεῖ αὐτῶν ἱστορίας προάγειν.

Περὶ Ὀρχεως. Κεφ. ρμά.

Ὀρχις, οἱ δὲ κυνὸς ὄρχιν καλοῦσι, φύλλα ἔχει κατὰ γῆς ἑτερομυόμενα δεῖ τὸν καυλὸν καὶ τὸν πυθμένα, ἐλαίᾳ μαλακῇ ὅμοια, στενώτερα δὲ καὶ λεῖα μακρότερα· καυλὸν ἀπὸ ἀμπέλου τὸ μῆκος, ἐφ' ᾧ αὖθι πορφυρομέλανι ῥίζαν βολβοειδῆ, ὀπωρινὴν, θηλυγόνον· ὡς ἐλαίας τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κατώτερον, καὶ τὸ μὲν, πλήρη τὸ

lier, cute conceptum quadraginta diebus, & vir modo cõsimili totidem diebꝰ ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

Phyllum. Cap. CXL.

Phyllum, quod & elæophyllon vocatur, duũm generum est, quod autem thelygonum appellant, in saxosis musci modo gignitur, folio oleæ, sed magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili: florem albũ profert: semen papaueris maiusculũ. Sed arrhenogonũ cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddã deflorentibus oleis nõ dissimile. Arrhenogonõ potu, masculi sexus facere partus, vt thelygonõ fœminei, proditur. Horũ Crateuas author est: sed huiusmodi historiatenus, mihi produxisse visum est.

Testiculus. Cap. CXLI.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocant, foliis circa imam caulis partem in terra stratis, oleæ molli simili-bus, longioribus, angustioribꝰ; læuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore,

quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, vt bulbi: ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem fœminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam verò, ad inhibendos: & alterũ alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sabuletis.

Τὴ δὲ μαλακὴν, καὶ ῥυσσὴν ἐδόντας ἡ ῥίζα ὡς βολβοὺς ἐφθεῖσα· καὶ σὺν ταύτῃ δὲ ἰσχεῖ), ἢ μὴ μείζονα ῥίζαν ἀνδρῶν ἐδομένῳ, ἀρρενογόνον εἶναι. ἡ δὲ ἑλάτινα τοῦ γυναικῶν, θηλυγόνον. σφοδρύνει δὲ καὶ ταῖς ἐν θετταλίᾳ γυναῖκας, τὸν μὲ ἁπαλὸν μὲ αἰγείου γάλακτος ποτίζειν, ὡς παύεσθαι τὰ ἀφροδίσια· τὸν δὲ ξηρὸν πρὸς ὀπόχεσιν καὶ ἔκλυσιν τῶ ἀφροδισίων, ἀναλύεσθαί τε ἢ ἕτερον ὑπὸ τῆ ἑτέρου πινόμενον. φύεται δὲ ἐν λιθώδεσι καὶ ἀμμώδεσι τόποις.

Testiculus alter. Cap. CXLII.

Testiculus alio nomine serapias, Andrea authore vocatur, quoniam radix ad multa vtilis sit, foliis est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculis simili: quæ illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent: sanántq; putredines, & oris vlcera cacoëthe: aluum sistunt è vino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo canis produntur.

Satyrium.

Περὶ Ὀρχεως ἑτέρου.

Κεφ. ϛμβ'.

Ὄρχις ἕτερος, ὃν σεραπάδα ἕτεροι καλοῦσιν, ὡς καὶ ἀνδρέας διὰ τὸ πολύχρηστον τῆ ῥίζης. φύλλα ἔχει ἐοικότα πρασίῳ ὀπμήκη, πλατύτερα δὲ καὶ λιπαρὰ, ἐπικαμπῆ εἰς τὰ μεσόλευκα· καυλία σπιθαμιαῖα· ἄνθη δὲ ὑποπόρφυρα· ῥίζα δὲ ὕπεισιν ὀρχεδίοις ὁμοία. Ἡ τις δλώσαιμι ἔχει καὶ φλεγμονὰς, οἰδημάτων σκεδαστικὴν, καὶ ἑλκῶν ἀνακαθαρτικὴν, καὶ ἕρπητος ἐφεκτικὴν, ἀνασκευάζει δὲ καὶ σύριγγας, καὶ τὰ φλεγμαίνοντα παρηρεῖ καταπλασσομένη. ξηρὰ δὲ νομὰς ἵστησι καὶ τὰ ἐν στόματι δόντι καὶ σώματι κακοήθη ἰᾶται. ἵστησι δὲ καὶ κοιλίαν σὺν οἴνῳ πινόμενα. ἰσχεῖται δὲ καὶ σὺν ταύτῃς, ὅσα, καὶ σὺν τῶ κυνὸς ὄρχεως.

Περὶ

Περὶ Σατυρείου. Κεφ. ριγ'.

Σατύριον, οἱ δὲ τετράφυλλον καλοῦσιν, ἔπειτα δὲ ὡς ἐπὶ πλῶ γλῶ φύλλα τείνε φέρῃ κεκλασμένα λαπάθῳ ἢ κρίνῳ ὅμοια ἐλάττονα μὲν τοι ἢ ἐνδευθῆ· καυλὸν δὲ ψιλόν, μακρὸν, ὡς πήχεως, ἄνθος *κριθοειδὲς, λευκόν· ῥίζαι βολβοειδῆ ὅσον μῆλον, πυρράν, τὰ δὲ ἐντὸς λευκὴν ὡσαρεὶ ὠόν· γευομένῳ γλυκεῖαν καὶ εὔοσμον· τοῦτον δεῖ πίνειν ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ πρὸς ἀποδότονον. καὶ εἰ βέλει γυναικὶ συνουσιάσαι, χρῆσαι, φασὶ γὰρ αὐτὴν ἢ ἐκεῖνον κινεῖν πλῶ ἐπὶ συνουσίᾳ.

Of Satyrium. Cap. CXLIII.

Satyrium aliqui trifoliũ vocant, quoniá tria fert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamẽ, ac rubra: caulem cubitalẽ, nudũ: florem lilij effigie, candidum: radicem bulboſam, mâli magnitudine, fuluá, intus vt ouum, candidam, guſtanti dulcem, & ori non ingratã: quam in vino nigro auſtero bibere conuenit, contra opiſthotonum. Vtendũ ea dum concumbendi inceſsit cupiditas, ſiquidẽ ea proniores ad venerem fieri affirmãt.

Περὶ Σατυρείου ἐρυθρονίου. Κεφ. ρμδ'.

Σατύριον τὸν ἐρυθρόνιον, οἱ δὲ σατύριον ἐρυθραϊκὸν, ἔχει σπέρμα λινοσπέρμῳ ἐμφερὲς, μεῖζον δὲ καὶ ῥωμαλέον, καὶ σίλβοι, καὶ λεῖον ὅσον ἱστορεῖται καὶ αὐτὸ συνουσίας ἐγείρειν ὡς περ καὶ ὁ σίκυος. ἔστι δὲ τὸ ῥίζης ἄνθος, ὁ μὲν φλοιὸς ὑπόχρυσος καὶ πυρρός· τὸ δὲ ἔνδοθεν λευκὸν, γευομένῳ εὔοσμον, καὶ γλυκύ. φύεται ἐν ἐυκλίοις καὶ ὀρεινοῖς τόποις. ἱστορεῖται δὲ ὅτι καὶ εἰς πλῶ χεῖρα ληφθεῖσα ἡ ῥίζα ἐρεθίζει πρὸς ἀφροδίσια· σὺν οἴνῳ δὲ πωθεῖσα μᾶλλον.

Of Satyrium erythronium. Cap. CXLIIII.

Eſt & alterum ſatyrium erythronium ſiue erythraicon, id eſt rubrum, ſemine lini, maiore, duro, læui, ſplendente: quod fertur, non ſecus atque ſcincus, libidiné excitare. Cortice radicis gracili, rufo: intus autem album includitur, ſapore dulci, non ingrato ori: in montoſis & apricis enaſcitur. Venerem, vt produnt, ſi omnino manu teneatur radix, ſtimulat, eóque magis, ſi bibatur in vino.

Περὶ Ὁρμίνου ἡμέρου. Κεφ. ρμέ.

ΟΡΜΙΝΟΝ ἥμερον πόα ἐστὶν ἐμφερὴς πράσῳ τοῖς φύλλοις. καυλὸς

Horminũ. Cap. CXLV.

HORMINVM HERba eſt, foliis marrubio ſimilis: caule

caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fuscúmque inuenitur: in altero, nigrum & oblongũ, cuius est vsus. Ad venerem stimulandã, cum vino bibi volũt. Purgat cum melle argemas albuginesq;, & illitũ ex aqua tumores discutit. Eo etiã extrahũtur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre magis viribus pollet: quare vnguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. Cap. CXLVI.

Hedysaron, quod vnguẽtarij pelecium, id est securidacã vocant, frutex est, foliis ciceris: semen rufũ in siliquis fert: corniculorũ modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur, vnde nomen accepit amarum gustu. Stomacho vtile in potu. Additur in antidota. Cũ melle ante coitus subditum, concipiẽdi spem adimit. Nascitur in segetibus & hordeis.

Onosma. Cap. CXLVII.

Onosma, oblonga folia habet: ad similitudinem anchusæ, longitudine

κωλὸς δ' τετράγωνος ὑμπιχυῶος, περὶ ὃν ἐξοχαὶ ὅμοιαι λοβοῖς ὡς ἐπὶ τῶ ῥίζαν γενευκῦαι, ἐν αἷς σπέρμα διάφορον· ὅπη μὲν γὸ τὸ ἀγρίου στρογγύλον εὑρίσκε- φαιόν· ὅπη δὲ τὸ ἑτέρου ὀπίμ- 5 κης ἢ μέλαν, ὃ καὶ ἡ χρῆσις. δο- κεῖ δὲ ἢ τοῦτο σὺν οἴνῳ πινόμενον, συνοισίαν παρεχεμᾶν. ἀποκα- θαίρει δὲ σὺν μέλιτι ἀργέμα, λευκώματα, καταπλαθὲν δὲ μὲθ' ὕδατος ἢ οἰδήματα διαφο- 10 ρεῖ, ἢ σκόλοπας ὀπισπᾶται. ἢ ἡ πόα δὲ καταπλαθεῖσα, τὰ αὐτὰ ποιεῖ. τὸ δὲ ἄγριον ἰσχυρότερον ἔχει τῶ δυνάμιν. ὅθεν μᾶλλον) καὶ συγχρίσμασι, μάλιστα δὲ τῷ γλευκίνῳ. 15

Περὶ Ηδυσάρου. Κεφ. ρμς'.

Ηδύσαρον τὸ ὑπὸ τῶν μαγειρῶν καλούμενον πηλεκῖνος, θάμνος ἐστὶ φυλλαρία ἔχων ἐρεβίνθῳ ὅμοια, λοβοὺς δὲ καρδίοις ἐοικότας· ἐν οἷς τὸ σπέρμα πυρρὸν, ὅ- 20 μοιον πηλέκει ἀμφισόμῳ, ὅθεν ἢ ὠνόμασται· πικρὸν γευσαμένῳ. εὐστόμαχον ποτόν. μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις. σὺν μέλιτι δὲ πρεσ- τεθὲν πρὸ τῆς μίξεως, ἀτόκιον εἶναι δοκεῖ. φύεται δὲ ἐν χριθαῖς 25 καὶ πυροῖς.

Περὶ Ονόσματος. Κεφ. ρμζ'.

Ονοσμα, οἱ δὲ ὀσμάδα, οἱ δὲ φλογῖτιν, οἱ δ' ὄνομη καλοῦσι, τὰ μὲ φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τῆ ἀγχέ- σης,

στης, παραμήκη, μαλακὰ ὡς τεσσαραδάκτυλα τὸ μῆκος, τὸ δὲ πλάτος δακτύλου, ἐπὶ γῆς κατεστρωμένα, ἐμφερέστατα τοῖς τῆς ἀγχούσης, ἔστι δὲ ἄκαυλος, ἄκαρπος, ἀνάνθης· ῥίζιον δὲ ὕπεστιν ὑπόμηκες, ἀσθενὲς, λεπτὸν, ἐνερευθὲς ἡσυχῇ· φύεται δὲ ἐν τραχέσι τόποις. Τούτου τὰ φύλλα ἐν οἴνῳ ποθέντα, ἔμβρυα ἄγει· φασὶ δὲ ὅτι κἂν ἔγκυος ὑπερβῇ τὴν πόαν ἐκτιτρώσκει.

Περὶ Νυμφαίας. Κεφ. ρμή.

Νυμφαία φύεται ἐν ἕλεσι καὶ ὕδασι στασίμοις, φύλλα δὲ ἔχει ὅμοια κιβωρίῳ σμικρότερα δὲ καὶ ἐπιμηκέστερα, ποσῶς ὑπερέχοντα τοῦ ὕδατος, τὰ δὲ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι πλείονα ἐκ τῆς αὐτῆς ῥίζης· ἄνθος δὲ λευκὸν, ὅμοιον κρίνῳ, ἔχον κροκῶδες τὸ μέσον. ὅταν δὲ ἀπανθήσῃ, στρογγύλον, μήλῳ παραπλήσιον τῇ περιφερείᾳ γίνεται, ἢ μήκωνος κεφαλῇ, μέλαν· ἐν ᾧ καρπὸς μέλας, πλατὺς, πυκνὸς, γευομένῳ γλίσχρος· ὁ δὲ καυλὸς λεῖος, οὐ παχὺς, μέλας, ὅμοιος τῷ τοῦ κιβωρίου· ῥίζα μέλαινα, τραχεῖα, ῥοπαλοειδὴς, ἥ τις τέμνεται φθινοπώρῳ. Ξηρὰ οὖν σὺν οἴνῳ ποθεῖσα, κοιλιακοὺς ὠφελεῖ, δυσεντερικοὺς, καὶ σπλῆνα τήκει. καταπλάττεται δὲ πρὸς στομάχου καὶ κύστεως ἀλγήματα ἡ ῥίζα, καὶ ἀλφοὺς σμήχει σὺν ὕδατι. ἀλωπεκίας τε σὺν πίσσῃ ἐπιτεθεῖσα ἰᾶται. πίνεται.

longitudine quatuor digitorum, & vnius latitudine, mollia, in terra iacentia, ſine caule, ſine ſemine, ſine flore: radice nititur longa, tenui, infirma, rubeſcente: gignitur in aſperis. Folia in vino pota partus extrahunt. Prægnans ſi eam ſupergrediatur, abortum facere dicitur.

Nymphęa. Cap. CXLVIII.

Nymphæa naſcitur in paludibus & ſtagnantibus aquis, foliis fabæ Ægyptiæ, minoribus, & longioribus, aliis in ſumma aqua, aliis demerſis pluribꝰ ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio ſimili, albo, & in medio crocos habente: cum deflorucrit, vt rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat: nigro ſemine, denſo & lato, lenti guſtus: caulis eſt læuis, niger, minimè craſſus, Ægyptiæ fabæ cognatus: radix nigra, ſcabra, clauæ ſimilis, quæ autumno ſecatur. Sicca cum vino pota cœliacis, dyſentericíſque auxiliatur, & lienem abſumit. Radix ſtomachi ac veſicæ doloribus illinitur, vitiligines ex aqua emendat: impoſita cum pice, alopeciis medetur. Ea-

dem contra veneris insomnia bibitur, siquidem ea prorsus adimit, pota assiduè aliquot diebus, genitaléque infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi vendicasse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bœotiæ Aliarto.

Nymphæa altera.

Cap. CXLIX.

Est & altera nymphæa, cuius flos blephara dicitur, foliis antè dictæ, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen & radix, contra fœminarū profluuia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

Androsaces.

Cap. CL.

ANDROSACES herba est amara, tenues spargens iuncos, sine foliis, folliculos in capitulis habens: in quibus semen continetur: gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis vrinam ciet. Idem effectus est semini poto, & herbę decocto: podagris vtiliter illinitur.

Asplenum.

πίνεται δὲ ἡ ῥίζα καὶ πρὸς ὀνειρωγμούς, παραιτεῖται τὸ τέτυς, ἀπνοίαν τε ἐργάζεται αἰδοίου πρὸς ὀλίγας ἡμέρας, εἴ τις ἐνδελεχῶς πίνοι. τὸ αὐτὸ δὲ ποιεῖ καὶ τὸ σπέρμα πινόμενον. δοκεῖ δὲ ὀνόμασθαι νυμφαία, διὰ τὸ ἔνυδρον φιλεῖν τόπον. εὑρίσκεται δὲ πολλὴ ἐν Ἤλιδι ἐπὶ τῷ Ἀνύγρῳ ποταμῷ, καὶ ἐν Βοιωτίᾳ ἐν Ἀλιάρτῳ.

Περὶ Νυμφαίας ἄλλης.

Κεφ. ρμθ'.

Γίνεται καὶ ἄλλη νυμφαία, ἧς τὸ ἄνθος βλέφαρα λέγεται, φύλλα ἔχουσα ὅμοια τῇ προειρημένῃ, ῥίζαν μὴν τοι λευκὴν καὶ τραχεῖαν ἔχει, ἄνθος μήλινον, σίλβον, ὅμοιον ῥόδῳ. ποιεῖ δὲ ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα πρὸς γυναικεῖον ἐν οἴνῳ μέλανι πινόμενον. φύεται ἐν τοῖς θελὶ Θεσσαλίαν τόποις καὶ ἐν πηνειῷ ποταμῷ.

Περὶ Ἀνδροσάκους. Κεφ. ρ'.

Ἀνδρόσακες γίνεται μὲν ἐν συεία ἐν παραθαλασσίοις τόποις, πόα δὲ ὅση λεπτή, λεπτόκαρφος, πτελέᾳ, ἄφυλλος, θυλάκιον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔχουσα θερμικὸν σπέρματος. δύναμιν δὲ ἔχει ποτεῖσα συὺ οἴνῳ < β. θλῖβος, οὖρα πολλὰ ἐπὶ ὑδρωπικῶν ἄγειν. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ τῆς πόας καὶ ὁ καρπὸς πινόμενος, τὸ αὐτὸ ποιεῖ· καταπλάσσεται δὲ καὶ ἐπὶ ποδαλγικῶν ὠφελίμως.

Περὶ

Περὶ Ἀσπληνίου. Κεφ. ργέ.

Ἀσπληνιον, οἱ δὲ σκολοπένδριον, οἱ δὲ ἀσπληΐτιον, οἱ δὲ ἡμιόνιον, οἱ δὲ πτέρυξ, φύλλα ἔχει σκολοπένδρᾳ τῷ ζωϊκῷ ὅμοια, πλείονα ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ἀνειχόμενα. φύεται ἐν τοίχοις καὶ πέτραις καὶ ἀπὸ κοχλάκων παλαιστίοις· ἄκαυλα, ἀγανθῆ, ἄκαρπα, ἐντελῶς μύα ὡς τὰ τῆς πολυποδίου, κάτω δὲ ὑποξανθα, καὶ δασέα, ἄνωθεν δὲ χλωρά. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ἀποζεσθέντα σὺν ὄξει καὶ πινόμενα ἐπὶ ἡμέρας μ'. σπλῆνα πίνειν δεῖ δὲ καταπλάσσειν καὶ τὸν σπλῆνα τοῖς φύλλοις λείοις σὺν οἴνῳ. βοηθεῖ καὶ στραγγουρίᾳ καὶ λιγμῷ, καὶ ἰκτέρῳ, καὶ λίθοις τὸν ἐν κύστει θρύπτει. δοκεῖ δὲ ἀτόκιος εἶναι καθ' ἑαυτὸν, καὶ μετὰ ἡμιόνου σπληνὸς θεραπεύειν. δὲ νύκτος φασὶ δεῖν αὐτὸν ὀρύσσειν ἀτόκιον.

Περὶ Ἡμιονίτιδος. Κεφ. ργβ'.

Ἡμιονῖτις, οἱ δὲ σπληνίον, φύλλον ἀνίσον ὅμοιον δρακοντείῳ, μίσσει δὲ· ῥίζαι δὲ ὕσταται πολλαὶ, λεπταὶ οὔτε δὲ καυλὸν, οὔτε, καρπὸν· οὔτε ἄνθος φέρει. φύεται ἐν πετρώδεσι τόποις, γεισσομένῳ δὲ ἡ πόα συπλικόν. ἤν τις σὺν ὄξει ποθεῖσα, πίνει σπλῆνα.

Περὶ Ἀνθυλλίδος. Κεφ. ργγ'.

Ἀνθυλλὶς διττή· ἡ μὲν

Asplenum. Cap. CLI.

Asplenum, aliqui scolopendrion vocant, alij splenion, alij Hemionium, foliis est multis, scolopendræ animali similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisq; siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet. folia filiculæ modò diuidũtur, subter flauescẽtia hirsutáq; supernè viridia. Vim hanc habent folia in aceto feruefacta, vt per dies quadraginta pota, lienem absumãt: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Stranguriæ & regio morbo prodest, singultũ sedat, calculos in vesica comminuit, Cõceptum adimere creditur, per sese aut cum muli liene appensa. Tradũt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendã.

Hemionitis. Cap. CLII.

Hemionitis, quam aliqui splenion vocant, folium emittit dracunculi, lunæ modò incuruũ, radicibus cohæret multis, tenuibus: nunquam flores, neque semẽ, neque caulem gignit: in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

Antyllis. Cap. CLIII.

ANTYLLIS duplex est

 quędã

quædam enim lenti ſimillima, foliis mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Naſcitur in ſalſis terris, & à ſole illuſtratis, non inſulſo guſtu. Altera eſt foliis ramuliſque aiugæ ſimilis, hirſutioribus tamẽ, breuioribus, & aſperioribus, flore purpureo, odoris admodum grauis: radice cichorij. Pota drachmis quatuor vrinæ difficultati, renibúsque plurimum prodeſt. Tritæ, vuluæ pituitas emolliũt, cum roſaceo, & lacte impoſitæ: vulneribus medẽtur. Quæ autem aiugæ ſimilitudinem refert, præter alia, pota cum aceto mulſo comitiales ſanat.

Anthemis. Cap. CLIIII.

Anthemidis genera tria, tantum flore diſtãtia: rami dodrãtales, fruticoſi, alis multis concaui: tenuibus foliolis, paruis, numeroſis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, forin ſecus orbiculato ambitu cãdidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ: naſcitur in aſperis, & iuxta ſemitas: colligitur vere. Vim habẽt radices, flores & herba excalfaciẽdi, extenuãdiq; : potu, & inſeſſione, pellũt mẽſtrua, partũ, vrinãm

χὸ φακῆ πυρεπλήσια φύλλα ἔχει καὶ κλωνία, πυθαμῆς ὕψος, ὀρθὰ δὲ ἢ τὰ φύλλα μαλακά. ῥίζα δὲ λεπτὴ, μικρά. φύεται ἐν ὑφαλμύροις τόποις καὶ ἐυηλίοις, γυμνώδη ὕφαλμος. Ἡ δ' ἑτέρα χαμαιπίτυϊ τὰ φύλλα καὶ τὰ κλωνία ἔοικε, θαυσίτερα μὲν τοι ἢ βραχύτερα, ἢ πραχύτερα, τὸ δ' ἄνθος πορφυρεοῦν, βαρύοσμον ἰσχυρῶς· ῥίζα ὥσπερ κιχωρίου. Δύναται δὲ ἰσχυρῶς δυσουρεῖσι καὶ νεφριτικοῖς πινομένη βοηθεῖν, σκλήθος < δ'. ἐν μαλάγμασι δὲ φλέγματα ἐν ὑστέρᾳ λεῖα. σὺν ῥοδίνῳ καὶ γάλακτι θερμαίνεται δὲ καὶ πεύκανα. ἡ δὲ τῇ χαμαιπίτυϊ ὁμοία, μὴ τ' ἄλλων ἢ ἐπιληπτικοὺς ἰᾶται σὺν ὀξυμέλιτι πινομένη.

Περὶ Ἀνθέμιδος. Κεφ. ρνδ'.

Ἀνθεμὶς, οἱ δὲ λευκάνθεμον, οἱ δὲ περάνθεμον, διὰ τὸ ἀνθεῖν ἐπ' ἔαρος, οἱ δὲ χαμαίμηλον, διὰ τὴν πρὸς τὰ μῆλα ὁμοιότητα τῇ ὀσμῇ, οἱ δὲ μελάνθεμον, οἱ δὲ χρυσάκμην, οἱ δὲ καλλίαν καλοῦσι· ταύτης εἴδη τέτταρα ἄνθεσι μόνον διαφέροντα· κλῶνες αὐτῆς θαμνοειδεῖς, μακρὰς ἔχοντες πολλὰς, κλωναρέα μικρὰ, λεπτὰ, πολλὰ, κεφάλια περιφερῆ· ἔνδοθεν μὲν χρυσίζοντα ἄνθη, ἔξωθεν δὲ περὶκυκλωτιρῶς λευκὰ, ἢ μήλινα ἢ πορφυρᾶ,

χῆ

καὶ μέγεθος πηλοῦ φύλλων· φύεται ἐν τόποις τραχέσι καὶ παρὰ τοὺς ὁδοὺς συλλέγεται δὲ ἔαρος. Δύναμιν ἔχουσι αἱ ῥίζαι καὶ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ βοταάνη θρυπτικήν, λεπτυντικήν· πινόμεναι δὲ καὶ ἐγκαθιζόμεναι, καταμήνια ἄγουσι καὶ ἔμβρυα, καὶ λίθους, καὶ ἕδρα ποτίζεται καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις καὶ εἰλεοὺς, καὶ ἕκτερον δὲ ἀποκαθαίρουσι καὶ ἡπατικοὺς ἰῶνται. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν εἰς πυρίας λαμβάνεται τοὺς πρὸς κύησιν. πραγικτικώτερον δὲ τοῖς λιθιῶσι τὸ προφυαρθές, ὃ δὴ τοῖς ὅλοις δοτὶ μεῖζον ἰδίως ἡσάνθεμον καλούμενον. τὸ δὲ λευκάνθεμον καλούμενον ῥυπτικώτερον καὶ τὸ χρυσάνθεμον. θεραπεύουσι δὲ καὶ αἰγιλώπια καταπλασσόμενα· διαμασσώμενα δὲ καὶ ἄφθας ἰῶνται. χρῶνται δέ τινες καὶ συγκλύσματι μετ' ἁλῶν, λειοτριβοῦντες αὐτὰ πρὸς αὐαισκευὴν τῶν πρὸς δικῶν πυρετῶν. ἀποτίθεται δὲ δεῖ τὰ φύλλα καὶ τὰ αὐτὰ ἔχειν αὐτῶν κόπτοντας ἰδίᾳ καὶ αὐαλαμβάνοντας προχόσχοις· τὴν δὲ ῥίζαν ἐκσαίροντας· χρεία δὲ ἐπιγνωμόνως, διδόναι ὁ τὲ μὲ τῆς βοταάνης μέρη β'. ὁ τὲ δὲ τῆς αὐθυος ἢ τ ῥίζης μέρος ἕν. ὁ τὲ δὲ τουναντίον, τῆς αὐθυος μὲ β'. τῆς δὲ βοταάνης ἑν, ἐναλλὰξ διπλασιάζοντας παρ' ἡμέραν· πίνειν δὲ δεῖ ἐν οἰνομέλιτι κεκραμένῳ.

vrinam, calculosque: aduersus inflationes, & ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgant: iocinerum vitia sanant: decocto earum vesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficaciſsima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuſcula est: hanc propriè heranthemon vocant. Ea cui leucanthemo nomen est, ité quæ chryſanthemon dicitur, vehementius vrinam ciunt. Ægilopiis illitæ medentur: commanducatæ vlcerum eruptiones in ore, ſanant. Nonnulli in clyſteribus ex oleo vtuntur, terunturque in farinam, ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tuſa, in paſtillos digeri: radix quoque ſiccari, dumque ingruit neceſsitas, binæ partes herbæ dari, modo floris aut radicis pars vna, modo contrà, floris partes duæ, & herbæ vna, permutatim duplicato ponderi, alternis diebus: bibere autem oportet in vino mulſo, dilu to.

Περὶ Παρ- Par-

Parthenium. Cap. CLV.

Parthenium, aliqui amaracon vocant, foliis est coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Siccatũ, cum aceto mulso, aut sale potũ, non secus atq; epithymũ, & bilem & pituitá detrahit: suspiriosis prodest, & melãcholicis. Herba sine flore à culosis, & anhelatoribus magna vtilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

Περὶ Παρθενίου. Κεφ. ρνέ.

Παρθένιον, οἱ δὲ ἀμάρακον, οἱ δὲ λευκάνθεμον, φύλλα ἔχει ὅμοια κορίῳ λεπτά· ἄνθη λευκὰ κύκλῳ, τὸ δὲ μέσον μύλινον, ὀσμὴ ὑποβρωμον, τῇ δὲ γεύσει πικρίζον. Δύναται δὲ ξηρὰ ζωὸ ἑξυμέλιτι ἢ ζωὸ μίσει πόθεῖσα ὡς τὸ ὀπίθυμον, φλέγμα, καὶ χολὴν ἄγειν κάτω· ἢ τὸν ἀθματικοὶς ὠφελεῖν ἢ μελαγχολικοὶς. ἢ πόα δὲ χωρὶς τοῦ ἄνθους, ὠφελίμως ἐπὶ λιθιώντων ἢ ἀθματικῶν πτίζεται. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς ἐγκάθισμα ὑστέρας ἐσκληρυμμένης ἢ φλεγμαινούσης ὑπόκατάπλασται δὲ ἢ πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ φλεγμονὰς σὺν τοῖς ἄνθεσιν.

Buphthalmum. Cap. CLVI.

Buphthalmon (quidam cachlam vocant) tenues emittit cauliculos, molléſq; folia fœniculi: luteum florem, anthemide maiorẽ, oculi similitudine, vnde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in cãpestribus: Flores cũ cerato triti, tumores duritiásque discutiunt. Aiunt eo tam post exitũ à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Περὶ Βουφθάλμου. Κεφ. ρνς.

Βούφθαλμον (οἱ δὲ κάχλαν καλοῦσι) καυλία ἀνίησι τρυφερὰ, ὑπόλεπτα· φύλλα δὲ μαραθρώδη· ἄνθη μύλινα, μείζονα τῆς ἀνθεμίδος, ὀφθαλμοειδῆ· ὅθεν καὶ ὀνόμασται· φύεται δὲ ἐν πεδίοις· καὶ περὶ ταὶς πόλεις. Ταύτης τὰ ἄνθη λεῖα σὺν κηρῷ, οἰδήματα καὶ σκληρίας διαφορεῖ· φασὶ δέ ὅτι ἐν τῷ βαλανείῳ μετὰ τὸ ἐξιδρῶσαι πινόμενον, οὐχροιαν ποιεῖ πρὸς χρόνον πνὰ τῶν ἰκτεριικῶν.

Paeonia. Cap. CLVII.

Pæonia siue glycysside. Græcis aliquibus pentoboron dicitur: sunt qui idæos dactylos radicé

Περὶ Παιωνίας. Κεφ. ρνζ.

Παιωνία, ἡ γλυκυσίδη, οἱ δὲ πεντόβορον· οἱ δὲ ἰδαίους δακτύλους τὴν ῥίζαν

τῶν ῥίζαν πυρηνίαν καλοῦσι. κυμλὸς ὁς δι' ὅλου θαμιαῖος. φύεται παραφυάδας ἔχων πολλάς· φύλλα δὲ ὅμοια τῇ ἀβρότονῳ βασιλικῇ καρύᾳ ὅμοια· ἡ δὲ θήλεια ἀπέχεται τὰ φύλλα ὥσπερ σμύρνιον. λοβοὺς δέ τινας ἀνίησιν ἐπ' ἄκρου τοῦ κυμλοῦ ἀμυγδάλοις ὁμοίους· ὧν ἀνοιχθέντων εὑρίσκονται ἐρυθροὶ κόκκοι πολλοὶ, μικροὶ, ἐμφερεῖς τοῖς τῆς ροιᾶς, ἐν μέσῳ δὲ μέλανες, ἐμπόρφυροι ἕως ς'. ῥίζα δὲ τῆς μὲν ἄῤῥενος, περὶ δακτύλου πάχος, μῆκος ὡς παλαιστῆς, γευομένῳ στύφουσα, λευκή· ἡ δὲ τῆς θηλείας παραφυάδας ὥσπερ βαλανίους ἔχουσα ζ'. ἢ ἡ. ὥσπερ ἀσφόδηλος. δίδοται ὡς γευστὴ ἡ ῥίζα τοῖς ἐκ τόκου μὴ καθαιρομένοις· κινεῖ δὲ καὶ τὰ καταμήνια ἀμυγδάλου μέγεθος πινομένη· τοῖς τε κατὰ γαστέρα ὀδυνωμένοις βοηθεῖ πινομένη ἐν οἴνῳ. ὠφελεῖ δὲ καὶ ἰκτερικοὺς, καὶ νεφριτικοὺς, καὶ κύστεως ἀγρυπνίας. ἐψηθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ πινομένη κοιλίαν ἵστησι. τοῦ δὲ καρποῦ ι. ἢ ιϛ'. κόκκοι συῤῥοὴ ποθέντες ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ ῥοῦν ἐρυθρὸν ἰσχύουσι· στομαχικοῖς τε δακνομένοις ἐδιτόμοις βοηθοῦσι. καὶ τὸ τῶν παιδίων πινόμενοι, καὶ ἐδιτόμοις ἀρχὰς λιθιάσεως παυσιτοῦσι. οἱ δὲ μέλανες καὶ πρὸς τὸν κῶν ἐρυσιπέλατων πυγμὰς καὶ πρὸς ταῖς ὑστερικαῖς στραγγαλαῖς καὶ ὀ-

radicē pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolescit, comitātibus multis stolonibus. Huius duo genera mas, folia iuglandis habet: in fœmina verò, smyrnij more diuidun tur. Summo caule siliquas emittit, veluti græcas nuces: in quibus cùm dehiscunt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix maris (tenuis) digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba: fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhærent, vt in hastula regia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses nucis græcæ magnitudine pota: sic ventris doloribus cum vino auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum, ac vesicæ dolores. Decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austero & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest. à pueris pota, initia calculorū eximūt. Grana nigra auxiliātur suppressionibus nocturnis, vuluæ strangulationibus,

&

& matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

Lithospermum.

Cap. CLVIII.

Lithospermon à seminis duritia nomen accepit: foliis est oleæ lõgioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent: foliis longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet, vt semine cum vino albo pōto calculos frangat pellatque vrinam.

Phalaris. Cap. CLIX.

Phalaris cauliculos emittit tres culmis similes, à minutis ac nullius vsus radicibus, multos, duūm palmorū, geniculis cinctos, graciliores tamen ac dulces: semē cādidū, oblongū, milij magnitudine. Tūditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus vtilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.

Rubia.

καὶ ὀδυώδης μύτρας ἐν μελικράτῳ ἢ οἴνῳ, ὅσον ιϛ'. κόκκοι πινόμενοι, πιοῦσι. *

Περὶ Λιθοσπέρμου.

Κεφ. ρνή.

Λιθόσπερμον, οἱ δὲ αὐγώνιχον, οἱ δὲ ἐξώνυχον, οἱ δὲ ἡρακλείαν, διὰ τὸν ὅμοιον τὸ σπέρμα ἰχμῶδον καὶ λιθόσπερμον ὠνόμασεν· φύλλα ἔχει ὅμοια ἐλαίας, μακρότερα δὲ καὶ πλατύτερα, καὶ μαλακώτερα, καὶ τὰ ὅμοια τὸν πυθμένα ὑπὸ γῆς κεῖται· κλωνία δὲ ὀρθὰ, λεπτὰ, πάχος ὀξυλίνου, στερεὰ, ξυλώδη, ἐπὶ δὲ τῶν ἄκρων αὐτῶν δίχηλος ἔκφυσις, καυλοειδὴς· ἔχουσα φύλλα μακρὰ παρ' οἷς σπέρμα λιθῶδες, στρογγύλον, μικρὸν, ὀρύζῃ ὅσον. φύεται ἐν τραχέσι τόποις καὶ ὑψηλοῖς. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ σπέρμα μετ' οἴνου λευκοῦ πινόμενον, λίθους θρύπτειν καὶ οὖρα ἄγειν.

Περὶ Φαλάριδος. Κεφ. ρνθ'.

Φάλαρις, καυλία ἀνίησιν ἐκ ῥιζῶν λεπτῶν καὶ ἀχρήστων πολλὰ, διπάλαιστα γονατώδη καλαμοειδῆ, ὁμοιότατα τοῖς τῆς ζέας· σπέρμα δ' ἔπεστι μέγεθος κέγχρου λευκὸν ὑπέμικες. Δύναμιν δ' ἔχει κοπτομένη ἡ πόα καὶ χυλιζομένη δ' ὕδατος ἢ οἴνου, πρὸς τὰ τῆς κύστεως ἀλγήματα ποιεῖν πινομένη. καὶ τὸ σπέρματος δ' μιᾶς κοχλιαρίου ὕδατος πλῆθος πινόμενον πρὸς τὰ αὐλὰ πιεῖ.

Περὶ Ἐρυ-

Περὶ Ἐρυθροδάνου. Κεφ. ρξ'.

Ἐρυθρόδανον, ἢ ἐρευθόδανον, ἔνιοι δὲ τεύθριον καλοῦσι, ῥίζα δέ ἐστιν ἐρυθρὰ βαφική· ἡ μὲν πόα ἀγρία· ἡ δὲ ἀπαρτὶ, ὡς ἐν Θηβαΐδι καὶ γαλιλαίᾳ, καὶ ῥαβδάννη δὲ ἰταλίας, καὶ ἐν καρίᾳ μεταξὺ τῶν ἐλαιῶν σπειρόμενον ὥσπερ καὶ τὸ ἐρύσιμον. ὠφελίμως δὲ σπείρεται, διὰ τὸ γίνεσθαι ἐκ τούτου πλείονα σπόρον. εἰσὶ δὲ αὐτῆς οἱ χαμαὶ πεδάγωνοι, μακροὶ, βαχεῖς, ὅμοιοι τοῖς τῆς ἀπαρείνης, καὶ πόα τὰ δὲ μείζονες καὶ ῥωμαλεώτερα· ἔχοντες ἐν διαστήμασι τὰ φύλλα κατ' ἔκαστον γόνυ, ὥσπερ ἀστέρας εἰς κύκλον σχηματίζοντα. καρπὸν στρογγύλον, τὸ μὲν πρῶτα χλωρὸν, εἶτα ἐρυθρὸν, εἶτα πεπαυόμενον μέλανα, ῥίζα λεπτὴ, μακρὰ, ἐρυθρὰ, δουρικὴ· ὄζει ἰκτεικοῖς μετὰ μελικράτου πινομένη βοηθεῖ, ἰσχιαδικοῖς τε καὶ παραλελυμένοις· ἄγει δὲ οὖρα πολλὰ καὶ παχέα. ἔδεσθαι δὲ καὶ αἷμα, λούεσθαι δέ τοι δεῖ καθ' ἡμέραν τοὺς πίνοντας. καὶ ὀρᾷν τῶν κενουμένων τὴν διαφοράν· θηριοδήκτοις τε βοηθεῖ ὁ χυλὸς μετὰ τῶν φύλλων πεθείς. ὁ δὲ καρπὸς μετ' ὀξυμέλιτος πινόμενος, σπληνιῶντα τήκει. σφακελιζόντα δὲ ἡ ῥίζα, ἔμβρυα καὶ ἔμμηνα ἄγει καὶ δεύτερα. θεραπεύει δὲ καὶ ἀλφοὺς λευκοὺς μετ' ὄξους καταπλασσομένη.

Περὶ Λογ-

Rubia. Cap. CLX.

Erythrodanum radix rubra est, qua tinguntur lanæ. Vna sponte prouenit, altera seritur vt in Thebana Galliæ, & Rauenna Italiæ: in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. hanc non sine quæstu ferunt: nanque maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules & quadranguli, longi, aparinæ non dissimiles, robustiores, & multò prorsus maiores: foliis per interualla certa circum articulos, stellatim decussatis. Semẽ eius rotundum, inter initia viride, mox rubrũ, postea cum ematuruit, nigrũ: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsa: item ischiadicis, & resolutis. Crassum, copiosamque vrinam pellit, nõnunquam & sanguinem: bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differẽtiam spectare. Aduersus serpentium morsus, ramulos cum foliis, vino bibere prodest. Semẽ ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, mẽses, secundásque. Albæ vitiligini, illita ex aceto medetur.

Lon-

Lonchitis. Cap. CLXI.

Lonchitis folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procumbentia, pauca in caule, in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes velut linguam, quæ ad labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomentum arrogauit: radix dauci. Nascitur in sitientibus, & asperis. Radix ex vino pota vrinam ciet.

Περὶ Λογχίτιδος. Κεφ. ξέ.

Λογχῖτις φύλλα ἔχει πράσου κάρτα ὅμοια, πλατύτερα δὲ καὶ ὑπόῤῥυθρα πλεῖστα, πρὸς τὴν ῥίζαν περικλώμενα ὡς ἐπὶ γῆν, ἔχει δὲ καὶ περὶ τὴν καυλὸν ὀλίγα, ἐφ' οὗ αὐτῇ ὅμοια πιλίσκοις, τῷ τύπῳ δὲ κωμικοῖς προσωπείοις κεχρωσμένοις, μέλανα μέν, λευκὸν δέ τι ἄπ' αὐτῶν ἐξέχει ἀπὸ τοῦ χάσματος πρὸς τὸ κάτω χεῖλος, ὥσπερ γλωσσάριον· τὸ σπέρμα δ' ὅμοιον λόγχῃ, τρίγωνον ἐν προκαρπίοις· ὅθεν καὶ τῆς προσωνυμίας ἠξιώθη· ῥίζα δὲ ὁμοία δαύκῳ. φύεται ἐν πετραίοις καὶ ἀνίκμοις τόποις. ταύτης ἡ ῥίζα διουρητικὴ πινομένη σὺν οἴνῳ.

Lonchitis folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procumbentia, pauca in caule, in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes velut linguam, quæ ad labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomentum arrogauit: radix dauci. Nascitur in sitientibus, & asperis. Radix ex vino pota vrinam ciet.

Lonchitis altera. Cap. CLXII.

Altera est lonchitis, quam aliqui asperá lonchitin dicũt: folia scolopédrij emittit, sed asperiora maioráque, ac multò magis diuisa. Vulneribus mirũ in modũ prodest, in eísq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienẽ absumit.

Περὶ Ἑτέρας λογχίτιδος. Κεφ. ξς'.

Λογχῖτις ἑτέρα, ἣ δὲ λογχῖτην πραχεῖαν, φύλλα ἀνίσην ὅμοια σκολοπενδρείῳ, πραχύτερα δὲ καὶ μείζονα, καὶ μᾶλλον ἐρισμένα. Δύναμιν δὲ ἔχει τραυματικήν, ἀφλέγματον· πίνεται δὲ καὶ σὺν ὄξει μετ' ὄξους πινομένη.

Althæa. Cap. CLXIII.

Althæa, quam alij ibiscũ vocãt, in syluestrium maluarum genere est, cui folia vt cyclamino, rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. Althæa appellatur, quòd inter

Περὶ Ἀλθαίας. Κεφ. ξς'.

Ἀλθαία, ἔνιοι δὲ ἰβίσκον καλοῦσι, μαλάχης ὅτι ἀγρίας εἶδος, φύλλα περιφερῆ ὥσπερ κυκλάμινος, ἔγχροα· ἔχει δὲ ἄνθος ῥοδοειδές· χαυλὸν δίπηχυν, ῥίζαν δὲ γλίσχρον, λευκὴν ἔνδοθεν. Ὠνόμασται δὲ ἀλθαία διὰ τὸ πλυαλ-

πολυαλθὲς καὶ πολύχρηστον αὐτῆς. ἐφθεῖσα γὰρ ἐν μελικράτῳ ἢ οἴνῳ, καὶ καθ' ἑαυτὴν ποθεῖσα ποιεῖ πρὸς βαύματα, παρωτίδας χοιράδας, ἀποσήματα, μαζοὺς φλεγμαίνοντας, δακτυλίων θλάσματα, ἐμφυσήματα, σπασμοὺς νεύρων· διαφορεῖ γὰρ ἐκπίνεται, ἢ ῥήγνυσι καὶ ἐπουλεῖ. συμμαλαχθεῖσα δὲ ἐφθὴ ὡς εἴρηται σὺν ὑείνῳ ἢ χηνείῳ ἢ τερεβινθίνῃ, πρὸς ὑστέρας φλεγμονὰς καὶ ὠδύνας ἐν πεσσοῖς ποιεῖ. καὶ τὸ ἀφέψημα δι' αὐτῆς τὸ αὐτὸ ποιεῖ, ἄλγος καὶ τὰ καλούμενα λόγχα. τὸ δὲ τῆς ῥίζης ἀφέψημα σὺν οἴνῳ πινόμενον, ὠφελεῖ δυσουρικοὺς, λιθιώντων ὠμότητας, δυσεντερικοὺς, ἰσχιαδικοὺς, τρωμώδεις, ῥηγματίας· καὶ πόνους ὀδόντων παύει σὺν ὄξει ἀφεψηθεῖσα καὶ διακλυζομένη. ὁ δὲ καρπὸς χλωρός τε καὶ ξηρὸς λεῖος κατεσθιεὶς σὺν ὄξει ἐν ἡλίῳ, σπερματικός ἐστιν ἀλφῶν· μετ' ὀξελαίου δὲ συγχριόμενος, προφυλακτικός ἐστιν ἰοβόλων. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς δυσεντερείας καὶ αἵματος ἀναγωγὴν καὶ διάῤῥοιαν. τὸ δὲ ἀφέψημα τοῦ ἀπόζεματος πινόμενον, καὶ πρὸς μελιττῶν καὶ τῶν λεπτῶν θηρίων πληγὰς παύτων, ἐν ὀξυκράτῳ ἢ οἴνῳ ποθέν. καὶ τὰ φύλλα δὲ μετ' ὀλίγου ἅλατος καταπλάσσεται ἐπὶ τῶν ἑλκυσμάτων καὶ ἐπὶ

inter primas sit vtilis, & pluribus polleat remediis. Decocta enim in vino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tusa, efficax est cõtra vulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mãmarum inflãmationes, fracta sedis, inflationes, neruorũ rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, vt dictũ est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthináve, vt malagmatis létor fiat, facit ad vuluæ inflãmationes, præclusionésq; in pessis subdita. Decoctum eodé fungitur munere: onera uuluæ, reliquiásq; à partu extrahit. decoctæ succus ex vino potus, succurrit vrinæ difficultati, calculosorũ cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis: dentiũ mulcet dolorem, cum aceto decocta colluto inde ore. Viride semen siccúmq; tritum, vitiligines in sole perunctas emendat: eodé cum oleo & aceto peruncti, à venenatis non feriuntur. Valet cõtra dysenteriã, & sanguinis reiectiones, aluíq; profluuiũ. In posca aut vino decoctũ bibitur, cõtra omnes vesparũ, apũ, similiumq; aculeatos ictus. Folia cũ olei mométo, morsibus,

&

& igni ambustis illinũtur. Constat aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

Alcea. Cap. CLXIIII.

Alcea sylueſtrium maluarum generi asſignatur: folia habet diuisa, verbenacæ proxima, caules treis aut quatuor, cortice cánabino veſtitos: florem roſæ, paruum: radices albas, latas, quinque aut ſex, cum plurimum cubitales: quæ cum vino aut aqua potæ, dyſentericis ruptíſque medentur.

Cannabis. Cap. CLXV.

Cannabis ſatiua planta magni in vita vſus ad robuſtiſsimos funes factitandos: foliis fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: ſemine rotundo, quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recẽte, conuenienter auriũ dolorib⁹ inſtillatur.

Cannabis ſylueſtris. Cap. CLXVI.

Sylueſtris cannabis virgas fert althææ ſimiles, minores, nigriores, & aſperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio ſatiuæ, nigriore & aſperiore: flore lychnidis, ſubrubro: ſemine & radice althææ. Deco-

ἢ ἐπὶ τῶν πυρετικῶν. πίνεται δὲ ἡ ῥίζα ἢ ὕδωρ μιγεῖσα λεία ἢ συνεξαιρεθεῖσα.

Περὶ Ἀλκέας. Κεφ. ρξδ'.

Ἀλκέα, ἣν αὐτὴ εἶδός ἐστιν ἀγρίας μαλάχης, ἔχουσα φύλλα ἐπερχόμενα πρὸς τὰ τῆς ἱερᾶς βοτάνης· καυλοὺς γ'. ἢ δ'· φλοιῷ ἔχοντας κανάβεα παραπλήσιον· αὖδος μικρὸν, ἐμφερὲς ῥόδῳ· ῥίζας λευκὰς, πλατείας ἑ. ἢ ς'. ὅσον πήχεως· αἱ πιεῖσαι οἴνῳ ἢ ὕδατι πόμθωαι, δυσεντερείαν καὶ ῥήγματα ἰῶνται.

Περὶ Κανάβεως ἡμέρας. Κεφ. ρξέ.

Κάνναβις φυτόν ἐστιν εὔχρηστον ἐν τῷ βίῳ πρὸς τὰς τῶν εὐτονωτάτων χοινίων πλοκάς· φύλλα φέρει παραπλήσια τῇ μελίᾳ, δυσώδη· καυλοὺς μακροὺς, κενούς· καρπὸν στρογγύλον, ἐς ἐδιόμυιος πλείων, σβέννυσι δ' γονήν. χλωρὸς δ' χυλισθεὶς, ἀμίζῃ πρὸς ταῖς τῶν ὠτων ἀλγηδόνας ἐνσταζόμενος.

Περὶ Κανάβεως ἀγρίας. Κεφ. ρξς'.

Κάνναβις ἀγρία ῥάβδια φέρει ὅμοια τοῖς τῆς ἀλθαίας, μελανίτερα δὲ καὶ τραχύτερα, καὶ μικρότερα, τὸ ὕψος πήχεως· τὰ δὲ φύλλα ὅμοια τῇ ἡμέρᾳ, τραχύτερα δὲ καὶ μελανίτερα· ἄνθη ὑπέρυθρα, λυχνίδι ἐμφερῆ· σπέρμα δ' ἢ ῥίζαν ὅμοια τῇ ἡμέρᾳ.

Δυνά-

Δυώδεκα δὲ ἔχει ἡ ῥίζα ἐφθὴ καταπλασθεῖσα, φλεγμονὰς παρηγορεῖν, καὶ οἰδήματα διαφορεῖν, καὶ πόρους διαχεῖν. καὶ ὁ ἀπὸ ταύτης δὲ φλοιὸς, οὕθετος εἰς φλοκιὰν ὀρνίων.

Περὶ Ἀναγύρεως. Κεφ. ξξζ.

Ἀνάγυρις, οἱ δὲ αὐάγυρον, οἱ δὲ ἄκοπον καλοῦσι, θάμνος ὅμοιος φύλλοις τῇ τῆς ῥάδου πεφυκυίᾳ ἄγνῳ, δενδρώδης, βαρύοσμος ἰσχυρῶς· αὖξος κράμβῃ ἐοικώς· καρπὸς ἐν κεραΐοις μακροῖς, τὸ χρῖμα νεφροῖς, ποικίλος * στερεὸς, σπληρύνεται δὲ περὶ τὸν τῆς σταφυλῆς πεπασμόν. Ταύτης τὰ φύλλα ἁπαλὰ, λεῖα καταπλασσόμενα, οἰδήματα στέλλει. ποτίζεται δὲ < πλῆθος ἐν γλυκεῖ πρὸς ἄθμα καὶ ἐκκολλᾷ χωείου, καὶ ἐμπλύων ἢ ἐμβρύω· πρὸς δὲ κεφαλαλγίαν σὺν οἴνῳ. ἔστι δὲ θείαπλον δυσκούσας· δεῖ μὴν τοι μετὰ τὸ ἀποτεκεῖν ἐυθέως ἀφελόντα ῥίπτειν τὸ θείαμμα. τῆς δὲ ῥίζης χυλὸς διαφορεῖ καὶ ἐκπέσσει. ὁ δὲ καρπὸς ἐσθιόμενος, ἔμετον σὺν τόνῳ κινεῖ.

Περὶ Κνπάιρος. Κεφ. ρξή.

Κνπάιρα ἐμφερὴς ὅλον αὐδράχνῃ, μελανώτερα δ' ἔχει τὰ φύλλα, ῥίζαν λεπτήν. Σοκδεῖ δὲ τὰ φύλλα πυόμβια σὺν οἴνῳ, σραγγουειῶσι καὶ ψωειῶσι πλὴν κύστιν· μάλιστα δὲ πυεῖ μετὰ ἑψήματος ῥιζῶν ἀσπαράγου

Decocta radix, illitu inflãmationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

Anagyris. Cap. CLXVII.

Anagyris frutex est arboris instar, perquàm grauis odore: foliis agni, virgísque: flore brassicæ: semen in siliquis non breuibus gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durescit vnà matureſcente. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt. si partus hæreat, & secũdæ mensesque morétur, dragmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino: Difficulter parientibus adalligãtur, ita vt à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis discutiendísque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet.

Cepæa. Cap. CLXVIII.

Cepæa portulacę similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in vino pota, vrinæ stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus, opitulantur: maximè id præstat, si cum decocto radicum aspara-

gi eius quem myacãthon, hoc est corrudam vocant, bibatur.

Alisma. Cap. CLXIX.

Alisma, alij damasonion appellant: folia ei plantaginis: nisi angustiora essent, lacinioſa, conuexáque in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallescéte: radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma vna aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorarunt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt: tor minibus atque dysenteriæ, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis. Cap. CLXX.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum: radicem paruã: nascitur in vliginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tuberc ula dissipat: cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Hype-

παραφέρου τοῦ μυακάνθου καλουμένου πινομένη.

Περὶ Ἀλίσματος. Κεφ. ρξθ'.

Ἄλισμα, οἱ μὲν ἀλκέαν, οἱ δὲ δαμασωνίων, οἱ δὲ ἄκυρον, οἱ δὲ λύεσν καλοῦσι· φύλλα μὲν ἔχει ἀγνοχλώσῃ ὅμοια, στενώτερα δὲ καὶ ἐπὶ γῆν κλώμενα· καυλὸς δὲ λεπτὸς, ἁπλοῦς ὑπὲρ πῆχυν ἔχων κεφάλια, θυρσοειδῆ· ἄνθη λευκὰ, λευκὰ, ὑπώχρα· ῥίζαι ὡς μέλανος ἐλλεβόρου λεπταὶ εὐώδεις, δριμεῖαι, ὑπολίπαροι· ὑδρωλὰ δὲ φιλεῖ χωρία. Ἀρμόζει ἡ ῥίζα πινομένη σὺν οἴνῳ, ὅσον ⊀ ά. ἢ β. τοῖς λαγὼν βεβρωκόσι θαλάσσιον, καὶ τοῖς ὑπὸ φρύνου δηχθεῖσι, καὶ τοῖς ὄπιον πιπωκόσι, καὶ τρόφοις καὶ δυσεντερίαν καθ' αὑτὴν, καὶ σὺν ἴσῳ σαύκῳ πινομένη. ἀρμόζει καὶ ἀπάσμασι καὶ πρὸς τὰ ὑστερικὰ πάθη. ἡ δὲ πόα ἴσχει κοιλίαν, καὶ ἔμμηνα ἄγει, καὶ οἰδήματα καταπλασθεῖσα φλεγμαίνει.

Περὶ Ὀνοβρυχίδος. Κεφ. ρξ.

Ὀνοβρυχὶς φύλλα ἔχει ὅμοια φακῷ, μικρῷ μακρότερα· καυλὸν σπιθαμιαῖον· ἄνθος φοινικοῦν, μικρὰν ῥίζαν. φύεται δὲ καθύγροις καὶ ἀγρίοις τόποις. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ πόα ὁμοίαν τοῖς λεία διαχεῖν φύματα· μετ' οἴνου δὲ πινομένη φαρμακρίαν θεραπεύει· σὺν ἐλαίῳ δὲ ἐνειφομένη ἱδρῶτας κινεῖ.

Περὶ Ὑπερι-

Περὶ Ὑπερικῶ. Κεφ. ροά.

Ὑπερικὸν, οἱ δὲ ἀνδρόσαιμον, οἱ δὲ κόριον, οἱ δὲ χαμαιπίτυν, διὰ τὸ καὶ τὸ σπέρμα ὀσμὴν ἐοικέναι πιτύνῃ ῥητίνῃ· φύλλα ἔχει πηγάνῳ ὅμοια, θάμνος φρυγανοειδὴς, σπαθαλιῶδες ὑπόρυθρος· ἄνθος ἔχον μήλινον, ὃ διαβρίζειν ἐν τοῖς δακτύλοις αἷμα τῶδη τὸ χυλὸν ἐκκρίνῃ, ὅθεν καὶ ἀνδρόσαιμον ἐκλήθη. κλωνάρια ὑποθάσεα, περομήκη ἐν τῷ στρογγύλῳ, μέγεθος κριθῆς, ἐν ᾧ σπέρμα μέλαν ῥητίνης ὄζον. φύεται δὲ ἐν ἐρασίμοις καὶ βαχέσι τόποις. Δύναμιν δὲ ἔχει διουρητικὴν, καὶ ἐμμήνων ἀγωγὸν περσιδέμενον. τεταρταίους δὲ καὶ τεταίους ἀπαλλάσσει μεθ' οἴνου πινόμενον. θεραπεύει δὲ ἰσχιάδας ἐπὶ ἡμέρας μ'. τὸ σπέρμα πινόμενον. καὶ τὰ φύλλα σὺν τῷ σπέρματι καταπλασθέντα καταχύματα ἴαται.

Περὶ Ἀσκύρου. Κεφ. ροϛ'.

Ἄσκυρον, οἱ δὲ ἀσκυροειδὲς, οἱ δὲ ἀνδρόσαιμον, καὶ τοῦτο εἶδός ἐστιν ὑπερικῆς, μεγέθει διαφέρον, κλωσὶ μείζον, φρυγανωδέστερον δὲ καὶ περφυρομμένον τοῖς φύλλοις λεπτοῖς· ἄνθη δὲ μήλινα φέρει· καρπὸν δὲ ὅμοιον ὑπερικῷ, ὄζοντα ῥητίνης, καὶ ἐν τῷ παραβρίζειν οἱονεὶ αἱματοῦσθαι τοὺς δακτύλους, ὡς διὰ τοῦτο ἀνδρόσαιμον κληθῆναι. Ποιεῖ δὲ καὶ ὁ τοῦτο καρπὸς πρὸς ἰσχιάδας πινόμενος ὡς ὑδρομέλιτος κοτυλῶν β. ἄγει

Hypericum. Cap. CLXXI.

Hypericū, alij androſæmon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniam ſemen odore reſinam imitatur: ſurculaceo frutice, dodrantali, ſubrubro, folio rutæ: flore luteo, qui digitis tritus ſanguineum ſuccum remittit, qua ex cauſa androſæmon cognominatur: ſubhirſuta ſiliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: ſemine intus nigro, reſinoſi odoris: gignitur locis cultis & aſperis. Vrinam cit, menſtrua pellit appoſitum: tertianis, quartanísque cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus hauſtum, iſchiadicis medetur. Folia cum ſemine illita, ambuſta ſanant.

Aſcyron. Cap. CLXXII.

ASCYRON ſiue aſcyroides, hyperici genus eſt, magnitudine diſtans, fruticoſius, maiores habens ramos, ſurculoſiores, rubentésque: folia tenuia: flores luteos, & fructum reſinoſum, hyperico nó abſimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de cauſa androſæmon vocauere. Vſus ſeminis ad iſchiadicos, potum in hydromelitis ſextario:

nam bilioſa recremẽta ampliſſimè detrahit: ſed aſsiduè dare oportet, donec ſanitati reſtituantur. Illinitur & ambuſtis efficaciter.

Androſæmum.
Cap. CLXXIII.

Androſæmon ab hyperico, aſcyróque differt, quòd frutícet ramulis ſurculoſis, ac tenuibus: rubétibus virgis: & foliis rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quę trita vinoſo ſucco manant: complureis alas habet in cacumine, vtrinque expanſas, pinnatasq́; circa quas, flores puſilli, lutei: & in calyculis ſemẽ papaueris nigri, inſigne lineis. Huius comæ tritæ reſinoſum odorem reddũt. Semen tritum drachmis duabus potum, bilioſa alui excremẽta pellit: iſchiadicis maximè medetur: ſed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambuſtis illita medetur, vulneribus ſanguinem cohibet.

Coris. Cap. CLXXIIII.

Coris, quod aliqui hypericon vocant, frutex eſt folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, ſuauis, odoratus, acris. Potum ſemen menſes trahit, & vrinas: contra

ἄγει γὰρ χολώδη κόπρια πολλά. συνεχῶς δὲ διδόναι χρὴ ἄχρις ἂν ὑγιασθῶσι. πιεῖ δὲ καὶ ἐπὶ πυρίκαυτα ὑπιπλασθείς.

Περὶ Ἀνδροσάιμου.
Κεφ. ρογ'.

Ἀνδρόσαιμον, οἱ μὲν διονυσιάδα, οἱ δὲ ἀσκυρὸν καλοῦσι, διαφέρει δὲ τοῦ ὑπερικοῦ καὶ τοῦ ἀσκύρου θάμνος ὢν λεπτόκλαδος, φευγανώδης· πτερυγμοὺς τὰ ῥαδία· φύλλα τετραπλάσια ἢ τὰ βατραπλάσια ἢ πηγάνου, ἃ διαθέντα οἰνώδη χυλὸν ἀφίησι· μασχάλας δ' ἔχει πλείους ἐπ' ἄκρῳ τετρασωμίας, ἐφ' ἃς αὐθήλια μικρὰ, μίλινα· καρπὸς ἐν κάλυκι, ὅμοιος τῷ τῆς μελαίνης μήκωνος, οἱονεὶ κατάγραφος. αὐατειφθεῖσα δὲ ἡ κόμη, ῥητινώδη ὀσμὴν ἀποδίδωσι. Καὶ τούτου ὁ καρπὸς λεῖος δυοῖν ὀλκὴν ποθεὶς, ἄγει χολώδη κόπρια· θεραπεύει δὲ μάλιστα ἰσχιάδας· δεῖ δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν ὕδατος ἀπέχεσθαι. καὶ πυρίκαυτα δὲ ἡ πόα καταπλασθεῖσα ἰᾶται. καὶ αἷμα ἐπέχει.

Περὶ Κόριος. Κεφ. ροδ'.

Κόρις, οἱ δὲ τὸ τοῦτο ὑπερικὸν καλοῦσι, φύλλον ἔχει παραπλήσιον τῷ τῆς ἐρείκης, μικρότερον δὲ καὶ λεπτότερον καὶ ἐρυθρὸν, θάμνος δ' ἐστὶ σπιθαμιαῖος, εὔοσμος, δριμὺς καὶ εὐώδης. Τούτου ὁ καρπὸς πιόμενος, οὖρα καὶ καταμήνια ἄγει.

βοηθεῖ

βοηθεῖ καὶ φαλαγγιοδήκτοις, ἰσχιαδικοῖς τε καὶ ὀπισθοτονικοῖς σὺν οἴνῳ πινόμενος· πρὸς δὲ ῥίγη σὺν πεπέρει, ὀπὶ δὲ ὀπισθοτονικῶν ἢ σύγχισμά ὄζει σὺν ἐλαίῳ ἀφ' μόδιον.*

cõtra phalangiorũ morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino potũ auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. Radix vino decocta potáque, defectis opem ferre creditur, sed laborante inter potandũ quamoptimè cooperiri licet: siquidem corpus totũ desudabit, ex qua repristinã agilitatem recuperabit.

Περὶ Χαμαιπίτυος. Κεφ. ροέ.

Aiuga, siue chamæpitys. Cap. CLXV.

Χαμαιπίτυς, ἣν οἱ δὲ πέντῳ ὁλόκυρον καλοῦσι, ἀθήνησιν ἰωνίαν. ἐν ᾗ ἐυδαίᾳ σπερίττην, πόα ἕρπουσα ὀπὶ γῆς ὑπόκυρτος· φύλλα ᾗ ἔχει ὅμοια ἀειζώῳ μικρῷ, λεπτότερα δὲ πολλῷ ἢ λιπαρώτερα ἢ δασέα, πυκνὰ περὶ τὸν κλάδον, ὀσμὴν μέλινα, ἢ λευκάῤῥιζαν ᾗ ὡς κιχωρείου. Ταύτης τὰ φύλλα πινόμενα μεθ' οἴνου ὀπὶ ἡμέρας ζ'. ἴκτηρον θεραπεύει ὀπὶ δὲ μ'. ἰσχιάδα θεραπεύει μεθ' ὑδρομέλιτος πινόμενα· δίδοται ἢ πατικοῖς ἢ δυσουρῆσι ἢ νεφριτικοῖς ἰδίως, ἀρμόζοντα ἢ τροφιμώτατα. χρῶνται δ' αὐτῇ ἢ οἱ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Ποντικῇ, ὡς ἀντιδότῳ πρὸς ἀκόνιτον. πατίζοντες τὸ ἀφέψημα. καταπλάσσεται ᾗ πρὸς τὰ τροφιμώτατα μεθ' ὑφίτων δεδευμένων τῷ ἀφεψήματι τῆς πόας. λειανθεῖσα δὲ σὺν σύκοις ἢ αὐτὴ καταποτίου δίδομένη,

AIVGA herba in terra repens: incuruæ similis: foliis semperuiui minoris, multò tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis, odore pinus: flore tenui, luteo, vel candido: radice cichorij. Folia septem diebus in vino pota, regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant: dantur peculiariter vrinæ difficultatibus, iocineris, & renum vitiis: torminosis prosunt. Et apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra aconitũ vtuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta: trita in farinam & cum fico in pilulis sumpta,

aluum emollit: excepta melle, cũ æris squama & resina deijcit: apposita ex melle, vuluæ vitia extrahit: mammarum duritias discutit: vulnera glutinat: vlcera quæ serpunt, cum melle illita, cohibet.

Aiuga altera. Cap. CLXXVI.

Alterum est genus aiugæ, cu bitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus, coma supradictæ: flore candido: semine nigro: hæc etiam pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, foliis exilibus, albis, pilosis, caule aspero, candido: luteis flosculis, semine iuxta alas. Resipit & hæc pinum. Hæ duæ vim superioris obtinẽt, sed nõ vsquequaquam efficacem.

μύη, μαλάσσει κοιλίαν· μετ' μέλιτος δὲ καὶ λεπίδος, καὶ ῥινὸς ἀναλημθεῖσα καθαίρει· ἄγει δὲ καὶ τὰ ἀπὸ ὑστέρας προσπεθεῖσα σὺν μέλιτι. διαφορεῖ δὲ καὶ σκληρίας μαζῶν, καὶ τραύματα κολλᾷ· καὶ σήπτας ἐπέχει μετὰ μέλιτος καταπλασσομένη.

Περὶ Ετέρας χαμαιπίτυος. Κεφ. ρος'.

Εστι καὶ ἑτέρα χαμαιπίτυς. κλάδους ἔχουσα πτχυαίους, ἀγκυροειδεῖς, λεπτοκάρφους· κόμιλυ δὲ ἐοικυῖαν τῇ προὸ αὐτῆ, καὶ αὐτὸς λευκὸν· σπέρμα ὡς μίλαν· ἀπόζει ὃ καὶ αὐτὴ πίτυος. Καὶ περὶ τῆς ὅτιν ἄρρην καλουμένη. ἔστι δὲ βοτανίον λεῖον. ἔχον φυλλάρια λεπτὰ, λευκὰ, δασέα· κωλὸν ὃ* βραχὺν, λευκόν· αὐθήλια μίλινα· σπερμάτιον δὲ περὶ τὰς μασχάλας. ὄζει δὲ καὶ τοῦτο πίτυος. Δυνάμιν δὲ ἔχουσι καὶ αὐτὰ ὁμοίαν τῇ προειρημένῃ, οὐμὲν οὕτω προσκτικήν.

μύη, μαλάσσει κοιλίαν· μετὰ μέλιτος δὲ καὶ λεπίδος, καὶ ῥινὸς ἀναλημθεῖσα καθαίρει· ἄγει δὲ καὶ τὰ ἀπὸ ὑστέρας προσπεθεῖσα σὺν μέλιτι. διαφορεῖ δὲ καὶ σκληρίας μαζῶν, καὶ τραύματα κολλᾷ· καὶ σήπτας ἐπέχει μετὰ μέλιτος καταπλασσομένη.

Περὶ Ετέρας χαμαιπίτυος. Κεφ. ρος'.

Εστι καὶ ἑτέρα χαμαιπίτυς. κλάδους ἔχουσα πτχυαίους, ἀγκυροειδεῖς, λεπτοκάρφους· κόμιλυ δὲ ἐοικυῖαν τῇ προὸ αὐτῆ, καὶ αὐτὸς λευκὸν· σπέρμα ὡς μίλαν· ἀπόζει ὃ καὶ αὐτὴ πίτυος. Καὶ περὶ τῆς ὅτιν ἄρρην καλουμένη. ἔστι δὲ βοτανίον λεῖον. ἔχον φυλλάρια λεπτὰ, λευκὰ, δασέα· κωλὸν ὃ* βραχὺν, λευκόν· αὐθήλια μίλινα· σπερμάτιον δὲ περὶ τὰς μασχάλας. ὄζει δὲ καὶ τοῦτο πίτυος. Δυνάμιν δὲ ἔχουσι καὶ αὐτὰ ὁμοίαν τῇ προειρημένῃ, οὐμὲν οὕτω προσκτικήν.

TERTII LIBRI FINIS.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΟΥ.

PEDANII

ΠΕΔΑΚΙΟΥ

ΠΕΔΑ- PEDANII

ΚΙΟΤ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΤ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΑΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

DIOSCORIDIS Anazarbei de medicinali materia Liber quartus.

Io. *Ruellio Sueßionẽſi interprete.*

ΕΝ τοῖς πρὸ τούτου τοῖς βιβλίοις φίλτατε ἄρχε, παρεδώκαμεν περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων καὶ ζώων καὶ σπερμάτων καὶ λαχάνων καὶ ῥιζῶν καὶ χυλισμάτων καὶ βοτανῶν καὶ σπερμάτων, ἐν τούτῳ τετάρτῳ ὄντι περὶ τῶν λειπομένων βοτανῶν καὶ ῥιζῶν διαλεξόμεθα.

Περὶ Κέστρου. Κεφ. α.

Κέστρον τὸ καλούμενον ψυχόπτορον, ἐπειδὴ ἐν τοῖς ψυχροτάτοις εὑρίσκεται τόποις ὁ ῥωμαῖοι βετόνικαν καλοῦσιν, ἢ ῥοσμαρίνῳ πόα ἐστὶ χαμαὶ ἔχουσα λεπτὸν πόχεως τὸ ὕψος, ἢ καὶ μείζονα, τετράγωνον φύλλα μακρὰ, μακαρὰ, ὅμοια δρυΐ, πλὴ περιφερῆ ἐρεσμένα, εὐώδη, μείζονα ἢ τὰ πρὸς τὴ ῥίζαν· ἐπ' ἄκρῳ ἢ τῶν καυλῶν ἔνεστι τὸ σπέρμα ἐσταχυωμένον ὡς ὁ σύμβρας. τούτης τὰ φύλλα δεῖ συλλέγοντας ξηραίνειν. ὧν ἐστι καὶ ἡ σπανία χρῆσις· ῥίζαι ἢ ὑπῆρξι λεπταὶ ὡς ἐλλεβόρου, αἱ πινόμεναι φλεγμα τῶν προσκαλοῦσιν ὑμερον, μεθ' ὑδρομέλιτος πινόμεναι.

τῶν

ΤRibus antè libris, amātiſsime Aree, tradidimus odoramenta, olea, arbores, vnguenta, animalia, frumenta, olera, radices, ſuccos, herbas, ſeminaque. In hoc autem quarto diſſeremus de radicibus, & eis quæ reſtant herbis.

Betonica. Cap. I.

Ceſtron pſycotrophon vocitatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini betonicam appellant. Herba eſt, caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuiſa, odorata, prope radicem maiora: in ſummis caulibus, ſemen veluti ſatureiæ ſpicatum ineſt. Decerpta huius folia ſiccantur, plurimos ad vſus. Radicibus nititur, vt veratri, tenuibus. Quæ ex hydromelite in potu, pituitoſam vomitionem euocant.

Folia dari debent ruptis, cõuul
sis, mulieribus vuluæ malo o-
portunis, & ad laxandos vteri
strangulatus, denarij pondere
cum hydromelite: tres in vini
sextario drachmæ, contra ser-
pentiũ morsus ebibuntur. Her
ba magna vtilitate illatis à ser-
pẽte vulneribus illinitur: aduer
sus etiã venena drachma ex vi-
no pota cõuenit: prẽsumpta ea,
si venenũ hauriatur, nihil noce
bit: vrinã ciet: aluum subducit:
medetur comitialibus & insa-
nis, pota ex aqua: & iocineris
lienisq; vitiis, drachmæ ponde-
re in aceto mulso: cõcoctionẽ
adiuuat, si quis eã fabæ magni-
tudine secundũ cœnam cum
melle cocto deuorarit: modo
cõsimili acida ructãtibus pro-
patur. Stomachicis eã mãdu-
care & succũ deuorare pro-
derit, si postea dilutũ vinũ sor-
beatur. Datur sanguinẽ excreã
tibus, tribus obolis, cũ diluti vi-
ni egelidi cyatho: ischiadicis,
renum & vesicæ doloribus, ex
aqua: aquæ intercutem binis
drachmis ex hydromelite, si fe
bricitãt: sin aliter, ex mulso: re-
gio morbo laborãtes recreat,
menses pellit, drachmæ pon-
dere cum vino pota: aluũ pur-
gant drachmæ quatuor potæ,
in

τῶν δὲ φύλλων δίδοναι σὺν τοῖς
ἀποσήμασι, ῥήγμασι, καὶ σὺν
ταῖς ἐν ὑστέρᾳ διαθέσεσι, καὶ πίνειν
ὑστερικοῖς < ά. ὀλκὴν μεθ' ὑδρομέ-
λιτος πινόμενα. θηριοδήκτοις δὲ
ὀλκαὶ γ'. μετ' οἴνου κοτυλῶν β'. §
καταπλασσομένη δὲ ἡ πόα, ἀφε-
λεῖ τὸν θηριοδήκτους, καὶ σὺν
τοῖς θανάσιμα ὀλκὴ μετ' οἴνου πο
θεῖσα ἀρμόζει· ἐὰν δέ τις σὺν
πῃ, οὐδὲν βλαβήσεται λαβὼν φάρ
μακον θανάσιμον· ἔστι δὲ ἑρπητικὴ, 10
κοιλίας τε ὑποβιβαστική· θεραπ-
εύει δὲ καὶ ἐπιλήπτους, καὶ μανι-
ώδεις μεθ' ὕδατος πινομένη,
καὶ ἰπποπικοὺς· σπληνικοὺς δὲ μετ'
ὀξυμέλιτος ὀλκὴ < ά. ὑπποθεῖσα· ποιεῖ δὲ καὶ πέψιν ἐάν 15
τις μετὰ τὸ δεῖπνον ἀυτίκα κυάθου μέγεθος κατάπῃ μετὰ μέλιτος ἐφθοῦ ὁμοίως καὶ ὀξυεσμιῶσι δίδοται· στομαχικοῖς δὲ διαμασᾶσθαι καὶ καταπίνειν τὸν χυλὸν, εἶτ' ἐπιῤῥοφᾶν οἴνου κυαθ- 20
ίσκον· δίδοται δὲ καὶ αἱμοπτοϊκοῖς ὀλκὴ τετριβόλου μετὰ κράματος κυάθου ἑνὸς γαλακτώδους· ἰσχιαδικοῖς τε μεθ' ὕδατος καὶ νεφριτικοῖς καὶ κύστιν ἀλγοῦσιν· ὑδρωπικοῖς δὲ < β'. μεθ' ὑδρομέλι- 25
τος πυρέσσουσιν· ἀπυρέτοις δὲ σὺν οἰνομέλιτι· ἰκτεριῶντας τε καθίστησι, καὶ καταμηνία ἄγει· ὀλκὴ < ά. μετ' οἴνου ποθεῖσα· κοιλίαν δὲ < δ'. ποθεῖσα καθαίρουσι

μεθ'

μεθ' ὑδρομέλιτος κυάθων δέκα. ποιεῖ ἢ πρὸς φθισικούς, ἐμπυϊκοὺς μετὰ μέλιτος. ἀποτίθεται δὲ δεῖ τὰ φύλλα ξηρά, λεῖα ἐν κεραμίῳ ἀγγείῳ.

Περὶ Βρεταννικῆς. Κεφ. β'.

Βρεταννικὴ ἢ βετονικὴ, πόα ἐστὶν ἔχουσα φύλλα ἐμφερῆ λαπάθῳ ἀγρίῳ, μικρότερα δὲ καὶ δασύτερα, σύφοντα ἐν τῇ γεύσει· χυλὸν δὲ ἀνίσων οὐ μέγαν· ῥίζαν λεπτὴν καὶ βραχεῖαν. χυλίζεται δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα, καὶ ἐν ἡλίῳ ἢ πυρεῖ συρέφεται. Δύναμιν δὲ ἔχει σύμπικλον ἰδίως ἁρμόζουσαν πρὸς τὰς ἐν στόματι καὶ παιδιομίοις νομὰς. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ ὅσα σύψεως χρήζει.*

Περὶ Λυσιμαχίου. Κεφ. γ'.

Λυσιμάχιον, οἱ δὲ λύτρον καλοῦσι, κυκλοῦς ἀνίσους πηχυαίους ἢ καὶ μείζονας, λεπτοὺς, θαμιώδεις, ὧν παρὰ τὰ γόνατα, φύλλων λεπτῶν ἐκφύσεις παρεμπλησίων τοῖς τῆς ἰτέας, συφόντων ἐν τῇ γεύσει· ἄνθος πυῤῥὸν ἢ χρυσοειδές. φύεται ἐν ἑλώδεσι τόποις. καὶ παρὰ τὰ ὕδατα. Ἁρμόζει δὲ ὁ χυλὸς τῶν φύλλων συμπικὸς ὤν, πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς καὶ δυσεντερίας πόμα καὶ ἔγκλυσμα· ῥοῦται γοναικεῖον ἴσχιον ἐν προσθέτῳ καὶ πρὸς τὰς ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας ἐμφερόμενόν ἢ πόα ἁρμόζει.

ἔστι

in hydromelitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem & purulentam execreationem. Folia ficca tritáque fictili vase reconduntur.

Britanica. Cap. Cap. II.

Britanica aut vetonica, folia habet sylvestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu adstringentia: radicem tenuem & breuem: caulem paruum emittit. Foliis exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lysimachia. Cap. III.

Lysimachia, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales altiorésve, frutico-sos, tenues, prodeuntibus geniculatim foliis, tenuibus, salicis figura, gustu adstringétib⁹: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringéte sua vi sanguinis reiectionem supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pessō: sanguinis profluuio subuenit, si nares ea herba obturentur:

vulnerum

vulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, seu polygonum. Cap. IIII.

POLYGONVM mas ramos habet teneros & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, vt gramen, repunt: folia rutæ, sed molliora longioráque: semine sub omnibus foliis turgescente: vnde marem appellari volunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare ac refrigerare: prodest cruentæ excreationi, choleræ, alui fluxionibus, & vrinæ stillicidio: nam vrinam apertè ciet. Cum vino potus, contra serpentiũ morsus auxiliatur, datúrque in febribus per horam ante significationes: fœminarum profluuia impositu sistit: idem succus purulentis auribus instillatur. Facit eximiè ad genitalium vlcera, cum vino, adiecto melle, decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionib⁹, tumoribus, & recẽtibus vulneribus folia illinuntur.

ἔστι δὲ καὶ θαυμαστικὴ καὶ ἴσχαιμος· θυμιαθεῖσα δὲ δριμύτατον ἔχει τὸν καπνόν· ὥς τε καὶ ἑρπητικὰ διώκειν καὶ μύιας ἀποκτείνειν.

Περὶ πολυγόνου ἄρρενος.

Κεφ. ΛΓ'. 5

Πολύγονον ἄῤῥεν πόα ὀζὲ κλῶνας ἔχουσα λεπτοὺς τερφερεῖς πολλοὺς γόνασι θελεληθμένους, ἕρποντας ἐπὶ τῆς γῆς ὡς περ ἄχρωτις· φύλλα δὲ παγκύου ὅμοια, ὀπωπίσθερ· ἔχει δὲ καρπὸν παρ' ἕκαστον φύλλον· ὄθην καὶ ἄῤῥεν καλεῖται· αὐτοῦ δὲ λευκὸν ἢ φοινικοῦν. Δυνάμιν δὲ ἔχει συμπτικὴν, ψυκτικὴν ὁ χυλὸς πινόμενος· ἁρμόζει δὲ αἱμοπτοϊκαῖς, καὶ τοῖς κατὰ κοιλίαν ῥεύμασι, χολερικοῖς τε καὶ φαγγουειῶσιν, ἄγει γὰρ οὖρα ἐναργῶς. βοηθεῖ καὶ θηριοδήκτοις μετ' οἴνου πινόμενος καὶ θερὸς θερμοὺς θερὶ μιᾶς ὥρας τῆς ἐπισημασίας λαμβανόμενος. ἵστησι καὶ δὲ ῥοῦν γυναικεῖον θερεθεὶς, καὶ θερὸς ὠταλγίας καὶ πυορροίας ἐγκαθιέμενος ἁρμόζει. συνψηθεὶς δὲ οἴνῳ καὶ μέλι θερσλαβὼν, ἄχρως ποιεῖ θερὸς τὰ ἐν αἰδοίοις ἕλκη. καταπλάσσεται δὲ τὰ φύλλα θερὸς σομάχου ἔγκαυσιν, καὶ αἵματος ἀναγωγὴν καὶ ἕρπητας, ἐρυσιπέλατά τε καὶ φλεγμονὰς, καὶ οἰδήματα καὶ τραύματα θερόσφατα.

Περὶ Πολυ-

Περὶ Πολυγόνου θήλεως.
Κεφ. ς.

Πολύγονον θῆλυ θαμνίον ὀζῶ μονόκλωνον, τετράφυλλον, καλαμοειδὲς, γόνατα σωτῷ ἔχον ἐγκείμενα ἀλλήλοις ὥσπερ σάλπιγγος· καὶ περὶ τοῖς γόνασιν ἐν κύκλῳ ἔξοχὰς πέντε, φυλλαρίοις ἐοικυίας. ῥίζα ἀγρεία· φύεται παρὰ τοῖς ὑδατώδεσι. Δύναμιν δὲ ἔχει συστατικὴν, ψυκτικὴν, ποιοῦσα τὰ αὐτὰ τῷ περὶ αὐτὸ ὅτι μὴ ἀδυνατώτερον.

Περὶ πολυγονάτου. Κεφ. ε'.

Πολυγόνατον φύεται ἐν ὄρεσι, θάμνος μείζων πήχεως· φύλλα ἔχων ὅμοια δάφνῃ, πλατύτερα δὲ καὶ μαλακώτερα, γευσαμένῳ ὅμοιον τι μήλῳ κυδωνίῳ ἢ ῥοιᾷ, μὴ σύψεως δὲ παρεμφαίνει, καθ' ἑκάστην δὲ ἔκφυσιν τῶν φύλλων ἄνθη λευκὰ, τῷ πλήθει ὑπερέχοντα τὰ φύλλα· ἡ ἀρχὴ ἀπὸ τῆς ῥίζης γινομένη· ῥίζαν ἔχει λευκὴν, μαλακὴν, μακρὰν, πολυγόνατον, δασεῖαν, βαρύοσμον, πάχος ἔχουσαν δακτύλου, ποιοῦσαν πρὸς τραύματα καταπλασσομένη· αἵρει δὲ καὶ αἵμα τὸ ἐν προσώπῳ.

Περὶ Κλιματίδος. Κεφ. ζ'.

Κλιματὶς, οἱ μὲν δαφνοειδὴς, οἱ δὲ συρραφοειδὴς, οἱ δὲ πολυγονοειδὴς καλοῦσι. φύεται ἐν εὐγείοις, κλῆμα τὸ μὲν ἔχει μικρὰ ὅσον σχῆνον τὸ πάχος, πέταλον δὲ μικρὸν, δάφνῃ ἐμφερὲς τῷ τε σχήματι καὶ τῇ χρόᾳ, μικρότερον

Sanguinaria fœmina.
Cap. V.

Sanguinaria fœmina frutícat vno caule, arundini tenero, simili, densis geniculis, & in se tubarum modo farctis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ similes. Radicis nullus vsus: nascitur in riguis. Huic quoq; spissandi refrigerádique natura, ad eadem valens, sed inefficacior.

Polygonatum. Cap. VI.

Polygonatum nascitur in mótibus, frutice cubito altiore: foliis lauri, latioribus, & læuioribus, sapore mali cotonei, aut punici, cum quadam adstrictione: flores p singulos foliorum exortus promit, candidos, foliis numerosiores, incepta à radice supputatione: radicem habet albam, mollem, lõgam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquãtem: quæ vulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas in facie delet.

Clematis. Cap. VII.

CLEMATIS HVMI serpit, læto, pinguíque solo prouenit, viticulas spargens crassitudine iunci exiguas: folio lauri figura & colore, multò

multò minora. Ea cum caulibus in vino pota, alui profluuia & dysenterias sedant: subdita in pesso cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatib⁹ vuluæ medentur. Dolores dētium commanducata finit: impositа serpentium morsibus, iuuamentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis.

Polemonia. Cap. VIII.

Polemoniam alij philæteriā, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis exilibus, vtrinque pinnatis: foliis paulo q̄ rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut sāguinariæ proximis, quibus in summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicāte, radiculæ simili: nascitur in mōtosis & asperis. Bibitur in vino radix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua aduersus vrinæ difficultatem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pōdere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum qui radicē gustauerit à scorpione non feriri: eúq;, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

μικρότερον δὲ πολλῷ. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ οἱ χαμλοὶ σὺν οἴνῳ πινόμενα, διαῤῥοίας καὶ δυσεντερίας παύει· μετὰ γάλακτος δὲ καὶ ῥοδίνου ἢ κυκρίνου ἐν πεσσῷ περιτιθέμενα, ὑστέρας πόνους θεραπεύει· παύει δὲ καὶ ὀδόντων πόνους διαμασσόμενα. βοηθεῖ καὶ θηριοδήκτοις ἐπιτιθεμένη. ἰσοφείτει δὲ καὶ ἀσπιδοδήκτοις μετ' ὄξους πινομένη βοηθεῖν. φύεται δὲ ἐν χέρσοις.

Περὶ Πολεμωνίας. Κεφ. ῑ΄.

Πολεμώνιον, οἱ δὲ φιλεταίειον, καππάδοκες μὲν χιλιοδύναμιν καλοῦσι, κλωνία ἔχει λεπτὰ πτερωτὰ φύλλα δὲ ὀλίγῳ μείζονα πηγάνου, ἐπιμηκέστερα δὲ πρὸς τὰ τῆς πολυγόνου ἢ τῆς καλαμίνθης, ἐπ' ἄκρου δὲ αὐτῶν ὥσπερ κόρυμβος, ἐν οἷς σπέρμα μέλαν· ῥίζα πηχυαία, ὑπόλευκος, ἐμφερὴς στρουθίῳ· φύεται ἐν ὀρεινοῖς καὶ τραχέσι τόποις. Ταύτης ἡ ῥίζα πίνεται ἐν οἴνῳ πρὸς θηρία καὶ δυσεντερίαν, δυσουρίαν τε καὶ ἰσχιάδα μεθ' ὕδατος. ἀπλυτικοὶ δὲ μετ' ὄξους ὅσον < ά. ὀλκήν. καὶ πρὸς πλῆξιν δὲ τοῦ ῥίζα πρὸς σκορπίου πληγήν. φασὶ δὲ μὴ τύπτεσθαι τὸν ἔχοντα αὐτὴν ἢ κἂν πληγῶσι μηδὲν πάσχειν· παύει δὲ καὶ ὀδοντιλγίας διαμασσόμενα.

Symphytū

Περὶ

Περὶ Συμφύτου πετραίου.
Κεφ. θ'.

Σύμφυτον πετραῖον φύεται ἐν πέτραις, κλωνία δὲ ἔχει ὅμοια ὀρειγάνῳ, λεπτά· κεφάλια δὲ ὡς θύμου· τὸ δὲ ὅλον ὀδὴ ξυλῶδες καὶ ἐυῶδες, γλυκὺ ἅμα πρὸς τὴν γεῦσιν, καὶ πίνελου προσκλητικόν· ῥίζαν δὲ ἔχει μακράν, ὑποπόρφυρον, ὅσον δακτύλου πάχος. Τοῦτο ἐψηθὲν σὺν μελικράτῳ καὶ ποθὲν ἀναγκαθαίρει τὰ ἐκ πνεύμονος· καὶ τοῖς αἷμα ἀναγρεῖσι, καὶ νεφριτικοῖς σὺν ὕδατι δίδοται· σὺν οἴνῳ δὲ ἐψηθὲν πίνεται πρὸς δυσεντερίαν, καὶ ῥοῦν γυναικεῖον ἐρυθρόν· σὺν ὀξυμέλιτι δὲ πρὸς ἀπόσματα καὶ ῥήγματα. καὶ ἄλλον δὲ ὅτι δαμασώμβιον, ἁρμόζει καὶ τοῖς βεγχυτραχύτησι· κολλᾷ καὶ νεόβωτα καὶ ἐντεροκήλας, ἀποκρατεῖ καταπλασσόμενον. καὶ τὰ κρέα δὲ συμπήγνυται ἐνόμενα σὺν αὐτοῖς.

Symphytum.
Cap. IX.

Symphyton petræon, id est alus, nascitur ĩ petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis thymi: surculosũ totum, odoratum, gustu dulce, saliuam ciens: longa radice, subrufa, digitali crassitudine. Decoctũ in aqua mulsa & potũ pulmonis vitia purgat: sanguinem reiiciẽtibus, & renum malis, ex aqua datur: ad dysenteriam, rubráque fœminarum profluuia, in vino decoctum: ad conuulsa verò & rupta ex aceto mulso bibitur. Quin & commanducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vulnera recentia enterocelásque conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cũ symphyto decoctæ coalescunt.

Περὶ Συμφύτου ἄλλου.
Κεφ. ί.

Σύμφυτον ἄλλο, οἱ δὲ πεκτίνα καλοῦσιν ἀνίσως διπηχαῖον ἢ καὶ μείζονα, κοῦφον, παχύν, γονιοειδῆ, κανὸν ὡσπερεὶ σόκχον, περὶ ὃν οὐκ ἐκ μεγάλων διαστημάτων, φύλλα δασέα, στενὰ, ὑπομίκη πρὸς τὸ βουγλώσσου· ἐξοχὰς δὲ ἔχει ὁ καυλὸς παρὰ τὰς γωνίας πρὸς τετραμμένας.

Symphytum alterum.
Cap. X.

Est & alterum symphyton, quod aliqui pecton vocant: id caulem emittit bicubitalẽ, aut maiorẽ, crassum, leue, angulosum, vt sonchi inanẽ: circa quẽ breui interuacante spatio, folia exeũt angusta, bugloſſo proxima, oblóga, hirsuta: caule secũdũ angulos quosdã striato: foliis

φύλλων

foliis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. Tã caulis quàm folia, aspera lanugine horrent, tactúque pruritũ cõcitant: radices demittuntur foris nigræ, intus candidæ, viscosæ: quarum est vsus. Tritæ & potæ cruentis excreationibus, ruptísque proficiunt: recentia vulnera illitæ conglutinant: carnes quoque, si concoquãtur, cogunt additæ: inflammationibus, præsertim sedis, cum senecionis foliis, vtiliter illinũtur.

Holostium. Cap. XI.

Holostion herba est pusilla, tribus quatuórve digitis supereminens extra terrã, foliis vitiliculisq; coronopo aut gramini proximis, gustu adstringentib⁹: radice alba, prætenui vsq; in capillamenti speciẽ, longitudine quatuor digitorũ: nascit̃ in collib⁹ terrenis. Vsus eius ad rupta, ĩ vino potę: nã & carnes cogũtur, decoctionib⁹ addita.

Stœbe. Cap. XII.

Stœbe vulgaris est notitiæ: cuius semẽ & folia stringũt: quapropter decoctũ dysentericis infundit̃: auribus quoq; purulẽtis instillatur. Illita folia oculis ab ictu

φύλλων λεπτῶν περιεχόντων, ἀφ' ἑκάστης μασχάλης, τὰ ἄνθη ἔπεστι μήλινα καὶ καρπὸς περὶ τὸν καυλὸν ὡς φλόμου. ὅλος δὲ ὁ καυλὸς καὶ τὰ φύλλα ἔχει χνοῦν ὑπότραχυν, κατὰ τὴν προσαφὴν κνησμὸν ἐμποιοῦντα· ῥίζαι δὲ ὕπεισι τὴν μὲν ἐπιφάνειαν μέλαιναι, ἔνδοθεν δὲ λευκαὶ καὶ γλίσχραι· ὧν καὶ ἡ χρῆσις. Ποιοῦσι δὲ λεῖαι πινόμεναι αἱμοπτοϊκοῖς καὶ ῥηγματίαις καὶ τὰ νεόβρωτα κολλῶσι καταπλασσόμεναι· καὶ τὰ κρέα δὲ συνεψόμεναι συνάγουσι· καταπλάττονται δὲ πρὸς φλεγμονὰς μάλιστα τὰς ἐν δακτυλίῳ ὠφελίμως μετὰ φύλλων ἠριγέροντος.

Περὶ Ὀλεσίου. Κεφ. ιά.

Ὀλέσιον* τί ἐστι μικρὸν ὑπὲρ γῆς ὡς τριῶν δακτύλων ἢ τεσσάρων. φύλλα δὲ ἔχει καὶ κλήματα κορωνόποδι παραπλήσια, ἢ ἀγρώστει, στυπτικά· ῥίζαν δὲ σφόδρα λεπτὴν ὡς τρίχα, λευκὴν τῷ εἴδει, μῆκος δακτύλων τεσσάρων· φύεται ἐν γεωλόφοις. Δύναται δὲ καὶ αὐτὴ κρέα συνάγειν συνεψομένη, καὶ πρὸς ῥήγματα σὺν οἴνῳ ποτίζεται.

Περὶ Στοιβῆς. Κεφ. ιβ'.

Στοιβή· ἧς ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα στύφει· ὅθεν καὶ δυσεντερικοῖς τὸ ἀφέψημα αὐτῶν ἐνίεται· ἐγκλύζεται δὲ καὶ εἰς ὦτα πυορροοῦντα· καταπλασθέντα δὲ τὰ φύλλα ὠφελεῖ

ὠφελεῖ σύ[γ]χυσιν ὀφθαλμῶν πρὸς ἐκ πληγῆς, καὶ αἱμορραγίαν ἴσχει.

Περὶ Κλυμένου. Κεφ. ιγ'.

Κλύμενον καυλὸν ἀνίησι τετράγωνον, ὅμοιον τῷ τοῦ κυάμου· φύλλα δὲ πρὸς τὰ τοῦ ἀρνογλώσσου· θυλάκια δὲ ἔχει ὅπη τοῦ καυλοῦ εἰς ἀγκῶνα νεύοντα, ἐοικότα ἰερδὶ καὶ πολύποδος πλεκταῖς. ἄκεστον δὲ τὸ ὀρεινόν. Χυλίζεται δὲ ὅλον σὺν τῇ ῥίζῃ. ποιεῖ δὲ ὁ χυλὸς πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς πυόμους· καὶ κοιλιακοὺς, καὶ ῥοῦς ἐρυθρὸν ἔχοντας καὶ ὑδατώδεις· ἐπέχει δὲ καὶ τὰς ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας. τὰ δὲ φύλλα λεῖα ἢ τὰ θυλάκια τοῖς νεοτρώτοις ἐπιτίθεμα, μέχρι τῆς ἐπουλώσεως ἐρύκει.

Περὶ Περικλυμένου.

Κεφ. ιδ'.

Περικλύμενον θαμνίσκος ἐστὶν ἁπλοῦς, ἔχων ἐκ διαστημάτων φυλλάρια περιληφότα αὐτὸν, ὑπόλευκα, κισσοειδῆ, καὶ παρὰ τὰ φύλλα ἐκβλαστήσεις· ἐφ' ὧν ὁ καρπὸς κισσῷ παραπλήσιος· αἴθος λευκὸν, κυάμῳ ἐμφερὲς, ὑποστρογγύλον, οἱονεὶ ὀπικείμενον τῷ φύλλῳ· καρπὸν πολλὸν καὶ δυσπόπαστον· ῥίζαν πάχεαν περιφερῆ. φύεται ἐν ἀρούραις καὶ φραγμοῖς. περιλίττεται δὲ τοῖς παλουμένοις θάμνοις. Τούτου ὁ καρπὸς πέπερεος συλλεγεὶς

ab ictu cruẽtis ꝓsunt, & erũpẽtis sanguinis impetus cohibẽt.

Clymenum. Cap. XIII.

Clymenum caulem fert fabæ, quadratum: folia plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, vt in iride, & polyporum cirrhis. Probatissimum est è montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: cœliacos, rubráque fœminarum profluuia, refrigerando infrænat: sanguinem naribus erumpentem supprimit. Trita folia, aut siliquæ recentibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

Periclymenum.

Cap. XIIII.

Periclymenon, simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea: inter folia surculi exeunt, in quibus baccæ, hederæ similes: flos fabę cãdidus, aliquantũ rotũdus, & quasi in foliũ procumbens: semen durũ, & quod difficile euellatur: radice rotũda, crassa. Nascitur in aruis ac sepib⁹, conuolués se adminiculis, propter assidentibus. Semen eius postquàm ematuruit collectũ,

&

ὁ δὲ καρπὸς αὐτῶν, χλωρὸς λιθιῶντας πινόμενος ὠφελεῖ. τὸ δὲ χερσαῖον ὅσον < ἀ.πινομένη καὶ καταπλασσομένη, τοὺς ἐγχανδύκτους ἀποκαθίστησιν· ἁρμόζει καὶ θανασίμοις μετ' οἴνου πινόμενος. κτείνει δ' καὶ ψύλλας τὸ ἀπόζεμα αὐτῶ ῥαντέον. οἱ δὲ θρῆικες τὸν στρυμόνα ποταμὸν ὀρῶκες, ἀφ' οὗπερ χλωρὰν ἱππροβοσκοῦσι· καρπὸν γλυκὺν ὅλιν καὶ τροφιμον, σίλοποι οὕτω), χρώμενοι αὐτῷ ἀντὶ ἄρτου.

Περὶ Λιμωνίου. Κεφ. ις'.

Λειμώνιον, οἱ δὲ, νευρεσιδές. τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια σεύτλῳ, λεπτότερα δὲ καὶ μακρότερα, δίκα ἢ πλείω· κρωλὸν λεπτὸν, ὄρθιον, ἴσον ὥσπερ κρίνου, γέμοντα καρποῦ ἐρυθροῦ σύφοντος τὸ γεῦσιν. Δώσαται δὲ ὁ καρπὸς λεῖος σὺν οἴνῳ πωθεὶς, ὀξυδάφοι πλῆθος δυσεντερικοὶς καὶ κοιλιακοὺς ὠφελεῖ· ῥοῦν δ' γυναικεῖον ἐρυθρὸν ἐφισάνειν. φύεται δὲ ἐν λειμῶσι καὶ ἑλώδεσι τόποις.

Περὶ Λαγώπεδος. Κεφ. ιζ'.

Λαγώπους δύναμιν ἔχει σκληρὰν κοιλίας πινόμενον μετ' οἴνου· ἐπὶ δ' τ' πυρεσσόντων μὴ ὕδατος. ὠφελεῖ δὲ καὶ πρὸς φλεγμονὴν βυβώνων· φύεται δὲ ἐν θερσαιαῖς.

Περὶ Μηδίου. Κεφ. ιη'.

Μήδιον φύεται ἐν παλισκίοις τόποις καὶ πετρώδεσιν· ἔχει φύλλα ὅμοια ἴριδι· κρωλὸς τείπηχυς, αὐτὴ

Semen dum recēs bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitáve, ictos à vipera recreat: contra venena cum vino aptissimè bibitur. Dectoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitát, virenti tribulo equos sagināt, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

Limonium. Cap. XVI.

Limonion, folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis cœliacísque prodest: rubra fœminarum profluuia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

Lagopus. Cap. XVII.

Lagopus herba sistit aluum in vino pota aut in febri, ex aqua. Eadem inguini alligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

Medium. Cap. XVIII.

MEDION in saxis & opacis nascitur: folia habet iridis: caulem tricubitalem,

& in eo florem grandem, purpureum, rotundū: semine cnici, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinā, & ex melle decocta, rubros mēses fœminarū sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semé in vino potum, mēstrua pellit.

Epimedium. Cap. XIX.

Epimedium, caulis est non magnus, hederæ foliis, denis atque duodenis, neque floré, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, impositō catapla smate, mammas increscere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post mēstruas purgationes, quinq; dieb⁹ in vino pota, præstāt mulierib⁹ ne cōcipiāt.

Gladiolus. Cap. XX.

Xiphion, alij phasganon, alij machæroniō, Romani gladiolum, vocant. nomen inde accepit, quod foliū gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinē digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus

ἄνθη πορφυρεοειδῆ μεγάλα καὶ θεσφερῆ· καρπὸς μικρὸς, ὁμοίως κύκλῳ· ῥίζα σπιθαμιαία, βακτηρίας ἔχουσα πάχος, στυφνὴ γευσμῷ. Ἡ πᾶσα ξηρὰ λεία σὺν μέλιτι ἐφθὴ ἐφ' ἡμέρας, ῥεῖν τὰ ἐρυθρὸν ἵστησι. τὸ δὲ σπέρμα σὺν οἴνῳ πιθὲν, ἄγει ἔμμηνα.

Περὶ Ἐπιμηδίου Κεφ. ιβ'.

Ἐπιμήδιον καυλός ἐστιν οὐ μέγας, κισσῷ παραπλήσια φύλλα ἔχων ὅσον ι'. ἢ ιβ'. οὔτε δὲ καρπὸν οὔτε ἄνθη φέρει· ῥίζαι δὲ λεπταὶ, μέλαιναι, βαρύοσμοι, γευσαμένῳ μυραί· φύεται ἐν τόποις ὑδρηλοῖς. Ταύτης τὰ φύλλα λεία μετ' ἐλαίου, καταπλασμα μαστῶν εἰς τὸ μὴ αὔξεσθαι. ἀτόκιός τις ἡ ῥίζα ᾗ τὰ φύλλα λεῖα πιθέντα ἐν οἴνῳ μετὰ τὴν κάθαρσιν < ἑ. πλῆθος ὀπὸ ἡμέρας ἑ. ἀσυλλήπτοις ποιεῖ.

Περὶ Ξιφίου. Κεφ. κ'.

Ξιφίον, οἱ δὲ, φάσγανον, οἱ δὲ, μαχαιρώνιον καλοῦσι, διὰ τὸ τὸ φύλλου σχῆμα, ἔοικε γὰρ ξιφιδί, ἐλαττον μὴν τοι καὶ στενώτερον, καὶ ἄπεφυ ὡς μαχαίριον, ἰνῶδες. καυλὸν δὲ ἀνίησι πηχυαῖον, ἐφ' οὗ ἄνθη πορφυρᾶ στημόνι, ἀπ' ἀλλήλων διεζωτα· καρπὸν δὲ στρογγύλον· ῥίζας βʹ. τῶν

ἡ μὲν μίαν ἐπὶ τ ἑτέρας καθημμένη. ὥστε βολβίοις μικρά· τούτων ἡ μὲν κάτω, ἰσχνή ἐστιν, ἡ δὲ ἄνωθεν, ἀδροτέρα· φύεται δὲ μάλιστα ἐν ἀρούραις. Διώκεται δὲ ἡ αὐτὴν ῥίζα καταπλασσομένη μετ' οἴνου καὶ λιβανωτοῦ, ἀνίδρας ἢ σκόλοπας ἐκπαττομένη· σὺν ἀλεύρῳ δὲ αἰρόμενη καὶ ὑδρομέλιτι διαφείρει φύγεδλα· ὅθεν τοῖς τοιούτοις ἐμπλάστροις μίγνυται. ἄγει δὲ καὶ καταμήνια θερσεδεῖπα. φασὶ δὲ καὶ ἀφροδίσια παρεσκευᾶν πινομένη σὺν οἴνῳ πεθεῖσαν, πινομένη δὲ ἀγώνυς ποιεῖν. ἐντερικοῖς τε παιδίοις ἀφελίμως δίδοται πινομένη ἐπαιωρίζα ἐν ποτῷ σὺν ὕδατι.

Περὶ Σπαργανίου. Κεφ. κά.

Σπάργανίον φύλλα ἔχει ἐοικότα ξιφιδίῳ, στενώτερα δὲ καὶ ἐπικλινέστερα· ἐπ' ἄκρῳ δὲ τὸ καυλοῦ ὡσεὶ σφαῖρία ἐν οἷς ὁ καρπός. δίδοται ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς σὺν οἴνῳ θηριοδήκτοις.

Περὶ Συρίδος. Κεφ. κβ'.

Συρὶς, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ἴριδι ὅμοια, πλατύτερα δὲ καὶ ἐξ ἄκρου ὀξέα· καυλὸν δὲ ἐν μέσῃ τῶν φύλλων πηχυαῖον, ἐκφυόμενον παχὺν ἐφ' ἑ λοβοὶ πέφυκασι καὶ ἐπ' αὐτῶν ἄνθος πορφυροῦν· τὸ δὲ ἐν μέσῳ φοινικοῦν· καρπὸς δὲ ἐν θυλακίοις κυάμοις ὅμοιος, στρογγύλος, ἐρυθρὸς, σπερμάτιον

radicibus geminis, vna pusillorum bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, superna vberior: nascitur in aruis. Superior cum thure illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpore extrahit: panos cum lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet. Menses imposita trahit. Superiori radice ex vino pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta sterilescere tradunt. Superiorem quoq; vtiliter infantiũ enterocelis cũ aqua potui dare præcipiũt.

Sparganium. Cap. XXI.

Sparganion, aliq xiphidion vocãt, folia habet gladioli, sed arctiora, & i terrã magis ꝓcũbẽtia: in fũmo caule veluti pilulæ ꝓminẽt, i q. bꝰ semẽ. Cõtra serpẽtis venena radix cũ vino datur.

Xyris. Cap. XXII.

XYRIS, folia habet iridis, latiora, & in cacumine mucronata: quorum medio caulis erumpit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares dependent: in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis, rotundum, rubrum, acre:

radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis vulnera fractáque efficax est: aculeos & spicula omnia citra molestiá extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radicis centaurij ac mellis quinta: tumoribus & collectionib⁹ illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, stranguarias & alui profluuia. Semen tribus obolis potum, vrinam vehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

ῥίζα ᾗ πολυγόναλος, μακρὰ, πυῤῥὰ, ποιοῦσα πρὸς τὰ ἐν κεφαλῇ πεπαύματα καὶ κατάγματα· ἀνάγει δὲ σκόλοπας, καὶ πᾶν βέλος ἐπασσάτου μιᾶς ἀποσίας μιγνύτος αὐτῇ χαλκοῦ ἀΐδους μέρος τέτου, καὶ κενταυρείε ῥίζης μέρος ἕ. καὶ μέλιτος. θεραπεύῃ δὲ καὶ οἰδήματα καὶ φλεγμονὰς καταπλασσομένη μετ' ὄξους· πίνεῖ δὲ καὶ πρὸς ἀπόσματα, ῥήγματα, ἰσχιάδας τε καὶ πραγγωσίας. καὶ διαῤῥοίας ἡ ῥίζα μετὰ γλυκέος πεθλασμένη. ὁ δὲ καρπὸς οὐρητικώτατος ἐστιν πεπόλον πεθεὶς ἐν οἴνῳ τήκῃ ᾗ καὶ σπλῆνα σὺν ὄξει πεθείς.

Anchusa. Cap. XXIII.

Περὶ Ἀγχόσης. Κεφ. κγ'.

ANCHVSA, quæ alio nomine calys, aut onoclea appellatur, folia habet lactucæ in acumen, fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquoversum humi sparsa, spinis horrida: radici crasitudo digitalis, quæ æstate prouenit, ac manus inficit sanguineo colore: læto solo nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & vetera vlcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polenta medetur: lepris & vitiligini-bus illinitur ex aceto: partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctum

Ἀγχῦσα, λῶ ἔνιοι κάλυκα, οἱ δὲ, ὀνόκλειαν καλοῦσι· τὰ μὲ φύλλα ἔχει ὁμοίως θριδακίνῃ ὀξυφύλλῳ παρομοίως, διασπάδα, βαχέα, μέλανα, πολλὰ. πανταχόθεν τῆς ῥίζης πρόσπεπλασμένα τῇ γῇ, ἀκανθώδη· ᾗ ᾗ ῥίζα διακτύλε τὸ πάχος, τελῶ χρόαν ὕφαιμος, ἐν τῷ ὄξει γινομένη καὶ βάπτουσα τὰς χεῖρας· φύεται ἐν εὐγείοις τόποις. Ἔστι ᾗ ἡ ῥίζα συστατικὴ· ποιοῦσα πρὸς καταχρώματα καὶ παλαιὰ ἕλκη, ἐναφεψομένη κηρῷ καὶ ἐλαίῳ· ἐριοπέπλασται ᾗ σὺν ἀλφίτῳ καταπλασθεῖσα θραπεύῃ· καὶ ἀλφὸς καὶ λέπρας σὺν ὄξει καταπλασσομένη· πρὸς τὸ θεμένη ᾗ καὶ ἔμβυα καταπᾷ· τὸ

δὲ ἀφέψημα αὐτῆς δίδοται καὶ ἐκτερικοῖς, νεφριτικοῖς, στραγγουριῶσι, πυρέτοις μετὰ μελικράτου· τὰ δὲ φύλλα κοιλίαν ἵστησι μετ' οἴνου πινόμενα. χρῶνται δὲ καὶ οἱ μυρεψοὶ τῇ ῥίζῃ πρὸς τὰς σύψεις τῶν μύρων.

Περὶ Ἀγχούσης ἑτέρας.

Κεφ. κδ'.

Ἀγχοῦσα ἑτέρα, ἣν ἔνιοι δηκιβιάδιον, ἢ ὀνοχειλὲς ἐκάλεσαν. αὕτη διαφέρει τῆς προτέρας, τῷ μικρότερα ἔχειν τὰ φύλλα, τραχέα δὲ ὁμοίως· καὶ τὰ κλωνία λεπτὰ ἐφ' ὧν αὖθις πορφυρέους ἵστησι στεφανικίζον· ῥίζας δὲ ἐρυθρὰς, εὐμήκεις, πρὸς τὸν πυρετὸν ἐχούσας τὸ αἷμα τῶν δυσφύεται δὲ ἐν ἀμμώδεσι τόποις. Δώμασι δὲ αὐτῆς, καὶ τῶν φύλλων θηλυδήκτοις βοηθεῖν, μάλιστα δὲ ἐχιοδήκτοις, ἐδώμενα, καὶ πινόμενα, καὶ θεραπόμενα· κἂν μασησάμενός τις εἰς τὸ στόμα τοῦ θηρίου ἀποπτύσῃ, ἀποκτενεῖ αὐτό.

Περὶ Ἑτέρας ἀγχούσης.

Κεφ. κε.

Ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ἐμφερὴς ταύτῃ, ἰλάπῳ δὲ καρπὸν ἔχουσα φοινικοῦν. ὃν ἐάν τις μασησάμενος ἀποπτύσῃ εἰς τὸ στόμα τοῦ ἐχίνου, ἀποκτενεῖ. ἡ δὲ ῥίζα μετὰ ὑσσώπου καὶ καρδάμου πόσει, ὀξυκράτῳ πλῆθος, πλατείαν ἕλμινθα ἐκπέμπει.

Περὶ

decoctum renum vitiis, lieni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Siftunt aluum folia in vino pota. Radice pigmentarij vtuntur ad vnguentorum spissamenta.

Anchusa altera.

Cap. XXIIII.

Est & altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles appellarũt. Hęc à priore distat, quòd minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles in quibus flos purpureus in puniceum vergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ mesibus sanguineum succum fundunt: in sabulosis nascitur. Vis ei foliisq; ineft, quę contra virus cùm reliquorum serpentium, tum maximè viperarum auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit.

Anchusa tertia.

Cap. XXV.

EST & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota, latas ventris tineas excutit.

Lycopsis. Cap. XXVI.

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, foliis lactucæ, longioribus, asperioribus, latioribúsque, crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore in iis paruo purpurascente: radice rubra, & adstringente: nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Περὶ Λυκόψεως. Κεφ. κς'.

Λύκοψις. οἱ δὲ, ἣν καὶ ταύτην ἀλλοι φασιν ἐκάλεσαν, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια ῥίδακι, μακρότερα δὲ καὶ πραχύτερα καὶ παχέα καὶ πλατύτερα, πιπτοκότα περὶ τὴν ῥίζης κεφαλὴν κοντὸν ἀνίσου μακρὸν, ὀργυιὰν. βραχὺ, παρεφυάδας ἔχοντα πολλὰς, πυχναίας, βραχείας· καὶ ἐπ' αὐτῶν αὖθις μικρὰ, πορφυρίζοντα· ῥίζα δὲ ἐρυθρὰ, συμπικνὴ φύσει· ἐν πεδίοις. καὶ τὰ πλατύτερα μὲν ἐλαίῳ ἡ ῥίζα, βαύματα ἰᾶται· μὴ δὲ μίσητον ἢ ἐρυσιπέλατα· λεία δὲ συναλίφομένη μετ' ἐλαίου ἰᾶται κινεῖ.

Περὶ Ἐχίου. Κεφ. κζ'.

Ἔχιον, οἱ δὲ, ἀειδὲς, οἱ δὲ, λιχενίδιον, τὰ μὲν φύλλα ἔχει παρεμφερῆ μύκητι, πραχέα, ὑπόλεπτα, πρὸς τὰ τῆς ἀγχούσης, ἃ πονα δὲ καὶ λεπτὰ ὑπικείμενα, καὶ ἃ καὶ διασώζει τὰ φύλλα· καυλία λεπτὰ, πολλά· ἑκατέρωθεν δὲ φυλλάρια λεπτὰ παρεσύμενα, μέλανα, ἐλάττονα δὲ πρὸς λόγον τὰ ἐπ' ἄκρου τοῦ καυλοῦ. τὰ δὲ αὖθις παρὰ τὰ φύλλα πορφυροειδῆ ἐν οἷς ἐστι καὶ ὁ καρπὸς κεφαλὴν ἔχος ὅμοιος· ῥίζα δὲ λεπτοτέρα διακτύλου, ὑπομέλαινα. ἤν τις ἐμόγον τοῖς ἀνθοῦσιν ὑπὸ ἕρπετῶν βοηθεῖ πεθεῖσα μεθ' οἴνου, ἀλλὰ καὶ τοὺς πεπότας ἀδήκτους ποιεῖ. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς

Lumborum

πός. παύῃ δὲ ἢ ὀσφύος ἄλγημα, καὶ γάλα κατασπᾷ μετ' οἴνου ἢ ῥοφήματος ληφθεῖσα.

Περὶ Ὠκιμοειδοῦς. Κεφ. κά.

Ὠκιμοειδὲς, οἱ, δὲ φιλεταίριον, φύλλα μὲν ἔχει ὠκίμῳ ὅμοια, κλῶνας δὲ ἀπαλωτέρους, δασεῖς· λοβοὺς δὲ παρεπλησίους ὑοσκυάμῳ, πλήρεις σπέρματος μέλανος, ἐοικότας μήκωνι. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ σπέρμα πινόμενον ἐν οἴνῳ, ἐχιδνήκτους καὶ τὰ ἄλλα τῶν ἑρπετῶν ἄλγήματα θεραπεύειν. δίδοται δὲ καὶ ἰσχιαδικοῖς μετὰ σμύρνης καὶ πεπέρεως· ῥίζα δὲ ὕπεστι λεπτὴ καὶ ἄχρηστος.

Περὶ Εἰρίνου. Κεφ. κθ'.

Εἰρινος φύεται περὶ ποταμοὺς καὶ χρήνας, φύλλα ἔχει ὠκίμοις ὅμοια, μικρότερα δὲ καὶ ἐπεξεσμένα ἐκ τῶν αὐθεν μερῶν, κλωνία ἢ ἓξ. ἢ ἑπτά. σπαθαμιαῖα, ἄνθη λευκὰ καρπὸν ἔχοντα μέλανα, μικρὸν, σφυρόν· ὀσφὺς δὲ μεσοῦ ὄζου ὁ χυλὸς καὶ τὰ πέταλα. Τούτου ὁ καρπὸς < Ϛ'. πλῆθος μιγεὶς σὺν μέλιτος κυάθοις τέσσαρας, ῥεύματα ὀφθαλμῶν ἐγχριόμενος ἴσχει. ὁ δὲ χυλὸς ὧν τόνον παύει μετ' ὄξους ἀπύρου καὶ νίτρου ἐπιζόμενος.

Περὶ Ἀγρώστεως. Κεφ. λ'.

Ἄγρωστις κλήματα ἔχει γονατώδη ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀπὸ τῶν κλάδων περιέμβατα· ῥίζας γλυκείας γονατώδεις· φύλλα ὀξέα, σκληρὰ,

Lumborum dolores sedat, in vino aut sorbitione sumpta, & lac extrahit.

Ocimastrũ. Cap. XXVIII.

Ocimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrãtales, hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, semine, vt gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in vino potum, qua viperarum cæterarúmque serpentium morsibus medeatur. Datur ischiadicis cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui, & supernacua.

Erinus. Cap. XXIX.

Erinus nascitur apud fontes & fluuios, foliis ocymi, sed minoribus, parte superna diuisis, dodrantalibus surculis quinis senisve, flore candido: semine nigro paruo & acerbo: folia & caules lacteo succo turgẽt. Semen drachmis duabus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

Gramen. Cap. XXX.

GRAMEN geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata,

Lycopsis. Cap. XXVI.

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs lactucæ, longioribus, asperioribus, latioribúsque, crasis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore in iis paruo purpurascente: radice rubra, & adstringente: nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Περὶ Λυκόψεως. Κεφ. κϛ'.

Λύκοψις, οἱ δὲ, ἡ παρθένιον ἄλλοι δέ τινες ἐπάλεσαν, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια ὀρίδακι, μακρότερα δὲ καὶ παχύτερα καὶ παχέα καὶ πλατύτερα, περικοτα περὶ τῆς ῥίζης κεφαλὴν κοιλὸν ἀνίσιν μακρὸν, ὀρθόν. βραχὺ, περιφυάδας ἔχοντα πολλὰς, πυχιαίας, βραχείας· ἡ ἐπ' αὐτῶν ἄνθη μικρὰ, πορφυρίζοντα· ῥίζα δὲ ἐρυθρὰ, συπικὴν φύσιν ἐν πεδίοις. καὶ τὰ πλανοῦμενα δὲ μετ' ἐλαίου ἡ ῥίζα βάυματα ἰᾶται· μετ' ὀφίτου ἡ ἐρυσιπέλατα· λεία ἡ συναλιφομένη μετ' ἐλαίου ἰσχυρῶς κινεῖ.

Echium. Cap. XXVII.

ECHION, folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pinguia, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutáque vtroque latere folia, expansa, pinnatáque, nigra, in summo caule breuiora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarũ similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percusis modò a serpentibus ex vino prodest, sed eos qui anteà biberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus.

Περὶ Ἐχίου. Κεφ. κζ'.

Ἔχιον, οἱ δὲ, ἀεί δυν, οἱ δὲ, λιχενίδιον, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια μήκωνι, παχέα, ὑπόλεπτα, περὶ τὰ τῆς ἀγχούσης, ἥπονα δὲ καὶ λιπαρὰ, ἀκανθίδια λεπτὰ ὀπικείμενα, καὶ ἃ καὶ δασύει τὰ φύλλα· καυλία λεπτὰ, πολλά· ἑκατέρωθεν δὲ φυλλάρια λεπτὰ παρεμμένα, μέλανα, ἐλάπονα δὲ περὶ λόγον τὸ ἐπ' ἄκρῳ τοῦ καυλοῦ. τὰ δὲ αὐθη παρὰ τὰ φύλλα πορφυροειδῆ ἐν οἷς ἔστι καὶ ὁ καρπὸς κεφαλῇ ἔχος ὅμοιος· ῥίζα δὲ λεπτοτέρα δακτύλου, ὑπομέλαινα. ἥτις ἐ μόνον τοῖς δηχθεῖσιν ὑπὸ ἑρπετῶν βοηθεῖ πιθεῖσα μεθ' οἴνου, ἀλλὰ καὶ τὸν πεσόντας ἀδύκτους ποιεῖ. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς,

Lumborum

πος. παύει δὲ καὶ ὀσφύος ἄλγημα, καὶ γάλα κατασπᾷ, μετ' οἴνου ἢ ῥοφήματος ληφθεῖσα.

Lumborum dolores ſedat, in vino aut ſorbitione ſumpta, & lac extrahit.

Περὶ *Ὠκυμοειδοῦς. Κεφ. κη'.

Ὠκυμοειδὲς, οἱ δὲ φιλεταίριον, φύλλα μὲν ἔχει ὠκίμῳ ὅμοια, κλῶνας δὲ σπιθαμιαίους, δασεῖς· λοβοὺς δὲ παραπλησίους ὑοσκυάμῳ, πλήρεις σπέρματος μέλανος, ἐοικότας μελανθίῳ. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ σπέρμα πινόμενον ἐν οἴνῳ, ἐχιοδήκτους καὶ τὰ ἄλλα τῶν ἑρπετῶν δήγματα θεραπεύειν. δίδοται δὲ καὶ ἰσχιαδικοῖς μετὰ σμύρνης καὶ πεπέρεως· ῥίζα δὲ ὕπεστι λεπτὴ καὶ ἄχρηστος.

Ocimaſtrũ. Cap. XXVIII.

Ocimoides, Latini ocimaſtrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrãtales, hirſutos: ſiliquas hyoſcyamo ſimiles, ſemine, vt gith, nigro prægnantes. Vim habet ſemen in vino potum, qua viperarum cæterarúmque ſerpentium morſibus medeatur. Datur iſchiadicis cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui, & ſuperuacua.

Περὶ Ἐρίνου. Κεφ. κθ'.

Ἔρινος φύεται περὶ ποταμοῖς καὶ κρήναις, φύλλα ἔχει ὠκίμοις ὅμοια, μικρότερα δὲ καὶ ἐπεσχισμένα ἐκ τῶν ἄνωθεν μερῶν, κλωνία δὲ ε. ἢ ς'. σπιθαμιαῖα, ἄνθη λευκά· καρπὸν δὲ μέλανα, μικρὸν, στρυφνόν· ὀποῦ δὲ μεστός ἐστιν ὁ καυλὸς καὶ τὰ πέταλα. Τούτου ὁ καρπὸς < β'. πλῆθος μιγεὶς πρὸς μέλιτος κυάθοις τέσσαρας, ῥεύματα ὀφθαλμῶν ἐγχριόμενος ἵστησιν. ὁ δὲ χυλὸς ὤτων πόνον παύει μετὰ θείου ἀπύρου καὶ νίτρου ἐνσταζόμενος.

Erinus. Cap. XXIX.

Erinus naſcitur apud fontes & fluuios, foliis ocymi, ſed minoribus, parte ſuperna diuiſis, dodrantalibus ſurculis quinis ſeniſve, flore candido: ſemine nigro paruo & acerbo: folia & caules lacteo ſucco turgẽt. Semen drachmis duabus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum ſulphure & nitro inſtillatus, aurium dolores ſedat.

Περὶ Ἀγρώστεως. Κεφ. λ'.

Ἄγρωστις κλημάτια ἔχει γονατώδη ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀπὸ τῶν κλάδων περιεχόμενα. ῥίζας γλυκείας γονατώδεις· φύλλα ὀξέα, σκληρά,

Gramen. Cap. XXX.

GRAMEN geniculatis ſerpit ramulis, à quibus radices ſpargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata,

 dura,

dura,&,vt arundinis paruæ,lata,in exilitatem fastigiátur, eáque iumenta & boues pascũt. Trita radix illitu vulnera conglutinat. Decoctũ ei⁹ in potu. torminibus medetur, & vrinæ difficultatib⁹: calculosa etiam vesicæ excreméta comminuit.

Gramen arundinaceum.

Cap. XXXI.

EST & arundinaceum gramẽ, priore multò maius, quod iumenta necare traditur,præsertim in Babylone id quod iuxta vias nascitur.

Gramen Parnasaicum.

Cap. XXXII.

QVOD in Parnãso monte gignitur, densius fruticat: foliis hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutili: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis,mollibus,robustis, ac dulcib⁹. Succus si in vino cum melle pari,& myrrhæ dimidio decoquatur, adiiciátúrque piperis & thuris tertiæ portiones,probatissimum erit oculorum medicamẽtum:id in ærea pyxide reconditur. Decoctum radicis idem quod herba,præstat. Semen vehementius vrinã impellit, aluũ vomitionesq; sistit. Natum in Cilicia gramen, quod

σπληνὰ, πλατύτερα, ὡς καλάμου μικροῦ, τρέφοντα βόας καὶ κτήνη. Ταύτης ἡ ῥίζα καταπλαπομένη λεία, τραύματα κολλᾷ. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον, πρὸς τρόφους ποιεῖ ἢ δυσουρίαν. ἢ τὰ πρὸς τὴν κύστιν ἐκπώματα λιθόλυτα ἐργάζεται.

Περὶ Καλαμαγρώστεως.

Κεφ. λά.

Καλαμάγρωστις μείζων ἐστὶ κατὰ πάντα τῆς ἀγρώστεως. ἔστι δὲ κτηνῶν ἀναιρετικὴ σφοδρῶς τε, καὶ μάλιστα ἡ ἐν βαβυλῶνι παρὰ τὰς ὁδοὺς φυομένη.

Περὶ τῆς ἐν παρνασσῷ ἀγρώστεως. Κεφ. λβ'.

Ἡ δὲ ἐν τῷ παρνασσῷ φυομένη ἄγρωστις, πολυκλαδεστέρα ἐστὶ φύλλα δὲ κισσῷ ὅμοια φέρει· ἄνθος λευκὸν, καὶ εὐῶδες· καρπὸν, μικρὸν, οὐκ ἄχρηστον· ῥίζας ε'. ἢ ς'. δακτύλου πάχος, λευκὰς, μαλακὰς, γλυκείας ἰσχυρῶς. ὧν ὁ χυλὸς ἐφθεὶς σὺν οἴνῳ καὶ μέλιτι συμμείτῳ καὶ σμύρνης ἡμίσει μέρει, πεπέρει τε καὶ λιβανωτῷ τῷ τείτῳ, φάρμακόν ἐστιν ἄριστον πρὸς ὀφθαλμούς· ἀποπίνεται δὲ ἐν χαλκῇ πυξίδι. τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν ῥιζῶν, ποιεῖ πρὸς ἃ καὶ αὐτή. τὸ δὲ σπέρμα τοῦτο ἰσχυρῶς διουρητικὸν, καὶ ἐμέτων καὶ κοιλίας ῥεύσεις σταλτικόν. Ἡ δὲ ἐν χλοερᾷ γλυκωμένη,

ὧν

λῶ οἱ ἐπιχώριοι κίνναν καλοῦσιν, ὑγρὰ βρωθεῖσα πολλάκις, πίμφησι τοὺς βόας.

Περὶ Σιδηρίτιδος. Κεφ. λγ'.

Σιδηρῖτις, οἱ δὲ ἡράκλειαν, πόα δὲ φύλλα ἔχουσα ὅμοια θρασίῳ, ὀπιμηκίστερα δὲ πρὸς τὰ τοῦ ἐλελισφάκου ἢ δρυός, μικρότερα μὲν τοι καὶ τραχέα· καυλοὺς δὲ ἀνίσους τετραγώνους, ἀποδαμαίους ἢ καὶ μείζονας, οὐκ ἀεὶ δὲ ἐν τῇ γεύσει, καὶ ποσῶς ὑποστύφοντας· ἐν οἷς ἐκ ῥαγισμάτων ἀπόῤῥυλοι φερόμεναι ὥσπερ θρασίου, καὶ ἐν αὐτοῖς ἄνθρμα μέλαν· φύεται δὲ ἐν ὑποπέτροις χωρίοις. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, τραυμάτων κολλητικὴν καὶ ἀφλέγμαντον.

Περὶ Ετέρας σιδηρίτιδος. Κεφ. λδ'.

Ἄλλη σιδηρῖτις καλοῦσιν ἔχει δὲ πτόχεις, λεπτούς· φύλλα δὲ ὑπὸ μόχθων μακρῶν, ὅμοια τοῖς τῆς πτερείδος, ἀκροκλᾶ πολλὰ ἑκατέρωθεν, ἐκ δὲ τῶν αὐτέρω μασχαλῶν, ἀποφύσεις μακραὶ, λεπτὰς, ἐπ' ἄκρῳ σφαιροειδεῖς, κεφαλὴν ἐχούσας βαχεῖαν, ἐν οἷς ἄνθρμα ὅμοιον σπύλῳ, τρογγυλώτερον δὲ καὶ σκληρότερον. Δύναμις δὲ καὶ ταύτης ἐστὶ καὶ τῶν φύλλων τραυματική.

Περὶ Ετέρας σιδηρίτιδος. Κεφ. λε.

Ἔστι καὶ ἑτέρα εἶναι λέγει σιδηρῖτις, ἣν καὶ

quod incolæ cinnã appellant, boues inflammat, si eo virenti sæpe pascantur.

Sideritis. Cap. XXXIII.

Sideritin aliqui heracleã vocant: folia habet marrubij, sed longiora, satis ad frondẽ quercus aut saluiæ accedẽtia, minora tamen, & aspera: caules ædit quadratos, dodranté altos, ac quandoq; etiam maiores, non iniucúdi gustus, aliquãtúmque subſtringẽtis: in quibus per interſtitia orbiculatæ vertebræ, vt in marrubio, ſpectantur, & semé in eis nigrum: naſcitur in petroſis. Illita folia ſuapte vi, vulnera ſine inflãmationis periculo iungunt.

Sideritis altera. Cap. XXXIIII.

Altera ſideritis binûm cubitorũ ramulis, exilibus: folio filicis, numeroſo, vtrinq; per oras diuiſo: pediculo lõgo, prodeũtibus è ſummo alarũ ſinu ſurculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aſpero, in quo ſemen continetur, q̃ betæ rotũdius aliquantò, ac durius. Huius vis, foliorúmque, ad vulnera, præcipua eſt.

Sideritis tertia. Cap. XXXV.

Sideritin aliam eſſe tradunt, quam

quam Crateuas heracleam vocat, in materiis, & vincis nascétem, foliis ab vna radice multis, coriádro similibus, circa coliculos dodrantales, teneros, læues, subcâdidos atq; subrubicúdos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & léto. Huius ea vis est, vt quanuis recenti vulneri imposita, sanguinem supprimat.

Achillea. Cap. XXXVI.

Achillea, quibusdã Achillea sideritis, dodrãtales aut maiores gerit scapos, fusorũ effigie, minutulis foliis circũdatos, ex obliquo crebras habẽtibus incisuras sectionibus, coriandro similibus, subfuluo colore lentis, odore multo, nõ insuaui, verum medicato: vmbella in cacumine rotunda, floribus candidis [purpureis] & aurũ æmulãtib⁹: prouenit lęto solo. Trita coma sanguinoléta glutinat, & ab inflãmationũ periculo tuetur: erũpentẽ sanguinẽ inhibet, & cruẽta vuluę pfluuia in vellere. Decocto quoque insidẽt fœminæ fluxione vuluæ laborantes. Ad dysenteriã bibitur.

Rubus. Cap. XXXVII.

Rubus, notitię vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum deco-

πης, ὡῦ ϗ αὐτὴν κρατεύας ἡράκλειαν καλεῖ, φυομένην ἐν τοίχοις ϗ ἀμπελῶσιν, ἔχουσα φύλλα πολλὰ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ὅμοια κοριάνῳ περὶ καυλίοις ἀσταμιαίοις, λείοις, τηυφερεῖς, ὑσσωλεύκοις, ἐναλλὰξ ἐστηκότα· αὐτὴ δὲ φοινικᾶ, μικρὰ, γεμομένῳ σπερμᾶ, γλίσχρα, καὶ ταύτης ἡ δύναμις ἐπιπλαστικὴ, κολλητικὴ αἱμάτων ϗ νευρῶν.

Περὶ Ἀχιλλείου. Κεφ. λε'.

Ἀχίλλειος, καλοῦσι τινὲς καὶ τὸ ἀχίλλειον σιδηρῖτην, φέρει δὲ ῥαβδία ἀσταμιαῖα ἢ καὶ μείζω, ἀτρακτοειδῆ, καὶ περὶ αὐτὰ φυλλάρια λεπτὰ, ἐν πλαγίων ἐντομὰς ἔχοντα πυκνὰς, σπερμοφερῆ κοείῳ, ὑποπυρα, γλίσχρα, πελύσμια, οὐκ ἀνθῆ, φαρμακώδη δὲ τὸ ὅμιλον· σκιάδιον ἐπ' ἄκρου περιφερὲς, αὐτὸ λευκὸ καὶ χρωίζοντα· φύεται ἐν εὐηλίοις τόποις. Καὶ τούτου ἡ κόμη λεία, ἐναίμων ὄζει κολλητικὴ, καὶ ἀφλέγματος, αἱμορῥαγίας τε ἐφεκτικὴ, καὶ τῆς ἐκ μήτρας ἐκῤῥύσεως. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς ὄζει ἐγκάθισμα ῥοϊκαῖς. πίνεται δὲ καὶ πρὸς δυσεντερίαν.

Περὶ Βάτου. Κεφ. λϛ'.

Βάτος, ὡῦ γινώσκομεν. σύφει καὶ ξηραίνει· τείχας βάπτει. τὸ

τὸ δ' ἀφέψημα τῶν ἀκρεμόνων αὐτῆς, κοιλίαν ἵστησι πινόμενον, καὶ ῥοῦν ἐπέχει γυναικῶν· καὶ στρυφνῆρος δίγματι ἐυθετεῖ. κραταίνει δὲ καὶ οὖλα καὶ ἄφθας ὑγιάζει διαμασώμενα τὰ φύλλα, καὶ ἕρπητας ἐπέχει, καὶ ἀχῶρας τῶν ἐν κεφαλῇ θεραπεύει, καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονάς, καὶ κονδυλώματα, καὶ αἱμορροΐδας καταπλασσόμενα τὰ φύλλα. καὶ ἐπὶ στομαχικῶν δὲ καὶ καρδιακῶν λεῖα ἐπιτιθέμενα ἀφελίζει. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς ἐνθλιβέντων τῶν καυλῶν καὶ τῶν φύλλων, συσταφεὶς ἐν ἁλὶ, βέλτιον ποιεῖ εἰς πάντα τὰ εἰρημένα. ἔτι καρπεῖ αὐτῷ ὁ χυλὸς πεπείρου ὄντος τελείως εἰς τὸ στοματικὰ ἀφελίζειν· ἵστησι δὲ καὶ κοιλίαν ἐσθιόμενος ὁ μέσος πέπειρος, καὶ τὸ αὖδος δὲ αὐτῆς ποθὲν σὺν οἴνῳ, κοιλίαν ἵστησι.

decoctum, potu aluũ sistit, & fœminarũ profluuia: presteris morsu accómodatissimũ. Gingiuas firmant, & oris vitijs folia cómanducata medétur, cohibentque illita, vlcera quæ serpunt. Vlceribus in capite manãtibus, oculisq; procidentibus remedio sunt, & códylomatis, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita cõueniéter imponuntur. Caules cũ foliis tunduntur, exprimiturque succus, mox sole cogitur, singulari remedio, cótra omnia quæ modò dicta sunt. Mori in rubo nascétis, quamoptimè maturi succus, ad oris medicaméta cõuenit: sistitur aluus præmaturi cibo, nec nõ flore in vino poto.

Πεϱὶ Ἰδαίας βάτου.

Rubus Idæus.

Κεφ. λή.

Cap. XXXVIII.

Βάτος ἰδαία ἁπλῶς μὲν διὰ τὸ πολλαχοῦ ἐν τῇ Ἴδῃ γίνεσθαι. ἔστι δὲ ἀπαλωτέρα πολλῷ τῆς περὶ αὐτῆς, ἀκάνθας μικρὰς ἔχουσα. δύναται δὲ τὰ αὐτὰ τῇ περὶ αὐτῆς. ἐν πλείστοις δὲ τὸ αὐτῆς αὖδος σὺν μέλιτι λειανθὲν, ὀφθαλμικαῖς φλεγμοναῖς πεπεριγμένον βοηθεῖ, καὶ ἐπισπάσματα σβέννυσι· στομαχικοῖς τε μετ' ὕδατος ἐν ποτῷ δίδοται.

Idæus rubus appellatus est, quoniã copiosus in Ida prouenit. Est autẽ lõgè tenerior priore, ac minoribus spinis horrés: quanquã & sine spinis inuenia tur. Iusuper eadem præstat, quę supradictus. Cæterum flos cũ melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisque ex aqua bibendus datur.

Πεϱὶ Ἐλ-

Hel-

Περὶ Ελξίνης. Κεφ. λθ'.

Ελξίνη ἔχει φύλλα ὅμοια κισσῷ, ἐλάττονα δὲ, καὶ κλωνία μικρὰ, περιπλεκόμενα ὅπου αὖ τύχοι. φύεται δὲ ἐν φραγμοῖς καὶ ἀμπελῶσι καὶ σίτῳ. Δυώδυμον δὲ ἔχει τῶν φύλλων ὁ χυλὸς πινόμενος λυτικὴν κοιλίας.

Περὶ Ελατίνης. Κεφ. μ'.

Ελατίνη τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια τῇ ἑλξίνῃ, μικρότερα δὲ καὶ στρογγυλώτερα, βαθέα· κλῶνας λεπτοὺς, σπιθαμαίους ἢ ἧσσον. ἀπὸ τῆς ῥίζης, φύλλων πλήθης συφιγῶν ἐκ τῆς γαύσεως. φύεται ἐν σίτοις καὶ τόποις ἐργασίμοις. Δυώδυμον δὲ ἔχει τὰ φύλλα καταπλασθέντα σὺν ἀλφίτοις, φλεγμαίνοντας καὶ ῥευματιζομένους ὠφελεῖν ὀφθαλμούς. ἐκφυθεῖσα δὲ καὶ ῥοφουμένη δυσεντερίαν ἵστησιν.

Περὶ Εὐπατωρίου. Κεφ. μά.

Εὐπατώριον πόα ἐστὶ φρυγανώδης, ῥάβδον ἀφιεῖσα μίαν, λεπτὴν, ξυλώδη, ὀρθὴν, μέλαιναν, ἔνδασυν, πηχυαίαν ἢ καὶ μείζονα· φύλλα δὲ ἐν διασημάτων, ἐσχισμένα μάλιστά που εἰς ἑπτὰ μοίρας ἢ καὶ πλείους, τοῖς τῆς πενταφύλλου ἢ χαμαίδρυος μᾶλλον ἐοικότα, καὶ αὐτὰ δὲ ὑπομέλανα φρικωδῶς ἐξ ἄκρων ἐντετμημένα· σπέρμα δὲ περιπέφυκεν ἀπὸ μέσου τοῦ καυλοῦ, ὑπόδασυ, κάτω γενικὸν, ὡς καὶ τοῖς ἱματίοις ἐπέχεσθαι ξηραινόμενον.

Ταύ-

Helxine. Cap. XXXIX.

Helxine cognomẽto ciſſampelos, foliis eſt hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus cõplectitur quodcũq; contigerit adminiculũ. Naſcitur in ſepibus, vinetis, & ſegetibus. Foliorũ ſuccus potu deiicit aluũ.

Elatine. Cap. XL.

Elatine folia habet helxinæ, minora, rotundiora, piloſa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis ſeniſve, à radice foliоſis, guſtu adſtringẽtibus. Naſcitur in ſegetibus & cultis. Oculorũ fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, foliis cũ polenta tritis, & impoſitis. Eadem cocta ſorbitionis vſu dyſenteriam ſiſtit.

Eupatorium. Cap. XLI.

Eupatorium, fruticoſa herba eſt, vnicum efferens caulem, lignoſum, nigricantem, rectum, tenuem, hirſutum, cubitalem, interdum amplioré: foliis per interualla quinquefolij, aut cannabis potius ſimilibus, quinquepartito aut amplius diuiſis, nigricantibus, & ipſis per ambitum ſerratis: ſemen medio caule erumpit, piloſum, deorſum ſpectans, quod ſiccatũ veſtibus inhæret.

Con-

Contrita huius folia, & cũ ſuillo adipe impoſita, vlceribꝰ quę ęgrè cicatricé trahunt, medentur. Herba & ſemẽ in vino potũ, dyſenteria, iocineris vitiis, & ſerpériũ ictibus liberat. Nec deſunt, qui aberrãtes argemoné hanc appellarint, cũ tamen longè alia ſit, vti expoſuimus.

Ταύτης τὰ φύλλα μετὰ τέττιγος χοιρείου παλαιοῦ λεῖα ὑποτιθέντα, τὰ δυσαπούλωτα τῶν ἑλκῶν ἰᾶται. τὸ δὲ σπέρμα καὶ ἡ πόα μετ' οἴνου σπόμβυα, δυσεντερικοῖς καὶ ἑρπετοδήκτοις ὠφελεῖ. ἔνιοι ταύτην ἀρτεμισίαν ἐκάλεσαν πλανηθέντες, ἑτέρα γάρ ἐστιν ὡς ὑπεδείξαμεν.

Quinquefolium.

Cap. XLII.

Quinquefoliũ ramulos fert ſectucarum ſimilitudine, tenues, dodrantales, in quibus ſemen: folia menthæ, quina ſingulis pediculis, raro plura, in ambitu ſerrata: florem ex candido palleſcentem, auri æmulum. Naſcitur in riguis, & aquariis ductibus. Subrubram habet radicem, oblongam, veratro nigro craſsiorem. Plurimis pollet remediis. Ius radicis decoctæ ad tertias, ſi in ore contineatur, dentium dolores ſedat: putrida oris vlcera, collutione ſiſtit: arteriæ ſcabritias, gargarizatu læuigat: contra alui profluuia, & dyſenterias auxiliatur: item articulorum coxendicúmque cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, ſerpentia vlcera cohibet: ſtrumas, tumores, duritias, abſceſſus & collectiones diſcutit ignes

Περὶ Πενταφύλλου.

Κεφ. μβ'.

Πενταφύλλου κλῶνας φέρει χαρφοειδεῖς, λεπτοὺς, ἀσθμαίους, ἐφ' ὧν ὁ καρπός· φύλλα ἢ ἔχει ἐοικότα ἡδυόσμῳ, πέντε καθ' ἕκαστον μόχλον, σανίνως δέ που πλείονα, κύκλωθεν ἐχόμενα τριποειδῶς· ἄνθος ἢ ὠχρόλευκον, χρυσοειδές. φύεται δὲ ἐν ὑδρηοῖς τόποις καὶ παρ' ὀχετοῖς. ῥίζαν ἢ ἔχει ὑπέρυθρον, ἐπιμήκη, παχυτέραν ἐλλεβόρου μέλανος. ἔστι δὲ πολύχρηστος. Δύναται δὲ τὸ τῆς ῥίζης ἀφέψημα ἄχρι βίττα καταβρεχθὲν ἐν τῇ ἐψήσει, ὀδοντηγίας παύειν διακρατούμενον ἐν τῷ στόματι· καὶ σπειδόνας τὰς ἐν τῷ στόματι διακλυζόμενον ἴσησι· καὶ τραχύτητας ἀρτηρίας ἀναγαργαριζόμενον παραιτεῖται· κοιλίας τε ῥεούσας καὶ δυσεντερίας βοηθεῖ· ἀρθριτικοῖς τε καὶ ἰσχιαδικοῖς πιόμενον. ἐφθὴ ἢ δὲ ὄξει λεῖα καταπλασσομένη, ἕρπητας ἐπέχει· διαφορεῖ χοιράδας, σκληρίας, οἰδήματα, αἰωρύσματα, ἀποσήματα. ἐρυσι-

ignes ſacros, reduuias, condylomata, pſoráſque ſanat. Teneræ radicis ſuccus, contra iocineris, pulmonúmq, vitia prodeſt: item aduerſum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternûm ramulorum: in tertiana verò, ternûm: in quotidiana, vnius. Ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus proſunt. Foliorum ſuccus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle & ſale, tam vulneribus quàm fiſtulis remedio ſunt: enterocelicis auxilium præſtant, Quinquefoliũ ſanguinis profluuia & potu & illitu ſiſtit. Ad expiationes, caſtimonias, & incantamenta inciditur.

ἐριοπέλατα, πεφύλλα τὰ ἐν δακτύλῳ, καὶ κονδυλώματα καὶ ψώρας ἰᾶται. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης ἀπαλῆς, πιεῖ σὺν τῷ ὄξει πάπαι καὶ πνεύμονι πάσῃ καὶ τὰ θανάσιμα. τὰ δὲ φύλλα πίνεται καὶ μεθ' ὑδρομέλιτος ἢ οἴνου κεφαλώου καὶ πεπέρεως ὀλίγου πρὸς περιόδους, ἐπὶ μὲν τοι τεταρταίου, τεταράων κλωναείων φύλλα, ἐπὶ δὲ τριταίου τριῶν, ἐπὶ δὲ ἐφημερινοῦ ἑνός. αἴρει δὲ καὶ ἐπιληψίας πινόμενα ἐφ' ἡμέρας λ'. ὑγιάζει δὲ καὶ ἴκτερον ταχέως ὁ χυλὸς τῶν φύλλων ποθεὶς ἐπὶ πίνας ἡμέρας τριῶν κυάθων πλῆθος. τραύματά τε ἡ σύριγγας μεθ' ἁλῶν ἢ μέλιτος καταπλασθέντα ἰᾶται· βοηθεῖ δὲ καὶ ἐντερικηλικοῖς, καὶ αἱμορραγίας ἴσχει πινόμενον καὶ καταπλασθέν. τέμνεται δὲ καὶ πρὸς καθαρμοὺς ἢ αἱμορραγίας καὶ ἀγνείας.

Phœnix. Cap. XLIII.

Phœnix folia habet hordei, ſed breuiora, & anguſtiora, ſpicam lolio ſimilem: calamos digitorum ſenûm, radici aduolutos: ſeptenas octonáſve ſpicas. In aruis tectisque recenter illitis naſcitur. Harum viriũ compos, vt in vino auſtero pota, alui profluuium, & emanantem vulua ſanguiné ſiſtat, vrinæ

Περὶ Φοίνικος. Κεφ. μγ'.

Φοῖνιξ, οἱ δὲ ῥοῶν, οἱ δὲ ἀγχόπωα, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια κριθῆς, βραχύτερα δὲ ἢ στενώτερα, στάχυν δὲ ἐμφερῆ τῇ αἴρᾳ· κλῶνας δὲ ἐξαδακτύλους κύκλῳ τῆς ῥίζης. ἢ στάχυς ζ'. ἢ ὀ. φύεται δὲ ἐν ἀρούραις, ἢ ἐπὶ τῶν τειχῶν τῶν νεοκατασκίστων. Δώσιμον δὲ ἔχει πινόμενον ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ, διάρροιαν ἢ αἱμορραγίαν ἀπ' ἐκ μήτρας ἢ

καὶ οὔρων πλείονα φορὰν ἱστᾷ. ἱστορεῦσι δέ τινες καὶ ἴσχαιμον αὐτὴν εἶναι ἐνδεσμουμένην φοινικῷ ἐρίῳ καὶ περιαπτομένην.

Περὶ Ἰδαίας ῥίζης. Κεφ. μδʹ.

Ἰδαία ῥίζα, ὀξυμυρσίνῃ τὰ φύλλα ἔοικε· παρ' αὐτὰ δὲ ὡς ἕλικες μικραὶ πεφύκασιν, ἐξ ὧν καὶ τὸ ἄνθος. ταύτης ἡ ῥίζα στυπτικὴ σφόδρα, ἁρμόζουσα ἐφ' ὧν στύψεως ἐστὶ χρεία. πίνεται δὲ καὶ πρὸς κοιλίας ῥεύματα καὶ ῥοῦν γυναικεῖον· αἱμοῤῥαγίαν τε πᾶσαν ἵστησι.

Περὶ Ῥοδίας ῥίζης.

Κεφ. μέ.

Ῥοδία ῥίζα γίνεται ἐν μακεδονίᾳ, ἐοικυῖα κόστῳ, κουφοτέρα δὲ καὶ ἀνώμαλος ῥόδων ἐν τῇ διαθρίψει ἀποφορὰν ποιοῦσα ὁμοίαν· χρησιμεύει δὲ ἐπὶ τῶν κεφαλαλγούντων σὺν ῥοδίνῳ ὀλίγῳ λεπτὴ ἐπιτιθεμένη καὶ ἐμβρεχομένη μετώπῳ καὶ κροτάφοις.

Περὶ Ἱππούριδος. Κεφ. μςʹ.

Ἵππουρις φύεται ἐν τόποις ἐφύδροις καὶ τάφροις· καυλία ἔχει κενά, ὑπέρυθρα, ὑποτράχεα, στερεά, γόνασι διειλημμένα, ἐμπεφυκόσιν εἰς ἄλληλα, περὶ δὲ αὐτὰ σχοινώδη φύλλα πυκνά, λεπτά. αὔξεται δὲ εἰς ὕψος ἀναβαίνουσα ἐπὶ τὰ παρακείμενα στελέχη καὶ κατακρημνᾶται περικεχυμένη κόμαις πολλαῖς μελαίναις καθάπερ ἵππου οὐρά. ῥίζα ξυλώδης, σκληρά.

Στυπτι-

vrinæ impetus infrænet. Sunt qui adalligatã in puniceo vellere & suspensam, sanguinem supprimere prodant.

Idæa radix. Cap. XLIIII.

Idææ radici folia sunt ea quæ rusco: circum ea veluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluum: mensesque, & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rhodia radix.

Cap. XLV.

Gignitur Rhodia radix in Macedonia, costo similis, leuior, inęquabilis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur.

Equisetum. Cap. XLVI.

Equisetum in riguis & scrobibus nascitur: cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se farcti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, vicinos arborum caudices scandens, obuolutumque dependet, comis multis, nigris, vt equorum cauda: radix lignosa dura.

Vis

Vis herbæ ſpiſſare: quare ſanguiné naribus erumpenté ſuccus ipſe ſiſtit: prodeſt dyſentericis in vino potus: vrinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur tritis foliis, & illitis. Radix cũ ſua herba tuſsim, orthopnœam, ruptáque adiuuat. Foliis in aqua potis, diſſectiones veſicæ & inteſtinorum, enterocelæq; in vnum coaleſcere, cogíq; feruntur.

Equiſetum alterum.

Cap. XLVII.

Alterũ equiſetum caulis eſt rectus, æqualis, cubito maior, inanis: comisper interualla breuioribus, cãdidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vulneribus remedio eſt, eadémque fungitur facultate.

Coccum infectorium.

Cap. XLVIII.

Coccũ quo infectores vtuntur, frutex eſt ſurculoſus, paruus, cui grana ceu lẽtes adhærẽt, quę electa cógerũtur. Optimũ gignitur in Galatia, & Armenia, deinde Aſia, & Cilicia: vlumũ ex omnibus Hiſpanicũ. Vis huic ſpiſſandi · vulneribus, neruíſq; pręciſis, cóueniẽter ex aceto tritum illinitur. Naſcitur quoq; in Cilicia, è quercubus, cochlearũ exiliũ ſimilitudine, quod

Στυπτικὴ δὲ ἡ πόα· ὅθεν ὁ χυλὸς αὐτῆς αἱμορῤῥαγίας ἴσχει τὰς ἐν μυκτῆρι· καὶ δυσεντερείας ὠφελεῖ πινόμενος μετ' οἴνου· κινεῖ δὲ οὖρα. τὰ δὲ φύλλα ἕναιμα τραύματα κολλᾷ λεῖα ἐπιπασσόμενα. ἡ δὲ ῥίζα καὶ ἡ πόα βήσσησί τε καὶ ὀρθοπνοϊκοῖς καὶ ῥηγματίαις ἀρήγει. ἰσχεῖται δὲ καὶ ἐντέρου διαῤῥήσεις καὶ κύστεως διακοπὰς, καὶ ἐντεροκήλῃ συνάγειν τὰ φύλλα πινόμενα ἐν ὕδατι.

Περὶ Ετέρας ἱππουριδος. Κεφ. μζ'.

Ἱππουρις ἑτέρα κόμας ἐν διασημάτων ἔχουσα ἐφεχυτέρας καὶ λευκοτέρας καὶ μαλακωτέρας. ἥ τις καὶ αὐτὴ λευθέσα σὺν ὄξει τραύματα ἰᾶται τὸν αὐτὸν ἔχουσα δύναμιν.

Περὶ Κόκκου βαφικῆς. Κεφ. μή.

Κόκκος βαφικὴ θάμνος ὀξὺ μικρὸς φρυγανώδης ᾧ θερσεύονται οἱ κόκκοι ὡς φασὶ, οἵ τινες ἐκλεγόμενοι συντίθενται. ἀρίστη δέ ἐστιν ἡ γαλατικὴ καὶ ἡ ἀρμενιακὴ, ἔπειτα ἡ ἐν ἀσίᾳ καὶ ἡ κιλίκειος· ἐσχάτη δὲ πασῶν ἡ ἐν ἱσπανίᾳ. δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικὴν· ἁρμόζουσαν τραύμασι καὶ νεύροις τρώσεσι, λεῖα μετὰ ὄξους καταπλασσομένη. γίνεται δὲ ἡ ἐν κιλικίᾳ ἐν τοῖς δρυσὶν ὁμοίως κοχλία μικρῷ,

ὡς

ἣν αἱ τῇδε γυναῖκες τῷ στόματι ἀναλέγουσι, κόκκον καλοῦσιν.

quod illius regionis mulieres ore legunt,& coccú vocitant.

Περὶ Τραγίου. Κεφ. μθʹ.

Τράγιον φύεται μὲν ἐν Κρήτῃ μόνῃ, ἔχει δὲ τὰ φύλλα σχίνῳ ὅμοια, καὶ τὰς ῥάβδους καὶ τὸν καρπὸν, μικρότερα δὲ πάντα, φέρει δὲ ὀπὸν κόμμει παραπλήσιον. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὸ δάκρυον καταπλασσόμενα σὺν οἴνῳ, ἐπισπᾶται σκόλοπας καὶ πάντα τὰ ἐμπηγνύμενα. πινόμενα δὲ στραγγουρίαν ἰᾶται. καὶ λίθους τοὺς ἐν κύστει θρύπτει, καὶ καταμήνια ἄγει. λαμβάνεται δὲ ὁλκὴν < α. φασὶ δὲ καὶ τὰς ἀγρίας αἶγας τοξευθείσας καὶ νεμηθείσας τὴν πόαν, ἐκβάλλειν τὰς ἀκίδας.

Tragium. Cap. XLIX.

Tragiũ naſcitur in Creta tan tũ inſula, létiſco ſemine, folio, & ramis ſimile, ſingulis tamen minorib⁹,ſuccus ei lacteus,gũmi non diſsimilis.Semen,folia, lachrymáq;,illitu ſpicula è corpore eiiciunt: omnia quoque corpori impacta,euocant:pota ſtranguriæ medentur; calculos veſicæ frangunt,menſes trahunt.Modus in ſumptione eſt, drachma vna. Fama eſt ſylueſtres capras ſagittis cõfoſſas, eius herbæ pabulo ſpicula excutere.

Περὶ ἄλλου τραγίου. Κεφ. νʹ.

Τράγιον ἄλλο τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια σκολοπενδρίῳ, ῥίζαν δὲ λεπτὴν, λευκὴν, παραπλησίαν ῥαφανίῳ ἀγρίᾳ· ἥτις βοηθεῖ δυσεντερικοῖς ὠμή τε καὶ ἑφθὴ ἐσθιομένη. προσβάλλει δὲ κατὰ τὸ φθινόπωρον τὰ φύλλα τράγου ὀσμήν· ὅθεν καὶ ὠνόμασται τράγιον.

Tragium alterum. Cap. L.

Eſt & alterum tragium,quod tragoceros aliqui vocant, folia ſcolopendrij habet,& radicem ſylueſtris raphani, tenuẽ, candidam: quam crudam vel coctam eſſe dyſentericis prodeſt. Folia autumno, hirci virus olent: exinde ſibi tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus,& præcipitiis.

Περὶ Τράγου Κεφ. ναʹ.

Τράγος, οἱ δὲ, σκορπίον, οἱ δὲ, τράγανος· φύεται παρὰ θάλατταν μάλιστα, θαμνίσκος ἐπὶ γῆς, ἐπιμήκης, οὐ μέγας, ὅσον σπιθαμῆς ἢ μείζων,

Tragum. Cap. LI.

Eſt etiã herba tragos,quã aliqui ſcorpiõ aut traganõ vocãt: maximè in maritimis naſcens, palmum alta aut amplior,fruticoſa,

ticosa, humilis, oblonga, sine foliis, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex vino poti, cœliacis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asseruantur, quibus vtuntur cum opus est.

Iuncus. Cap. LII.

Iunci duo genera: vnũ læuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera: vnũ sterile, reliquum fert semẽ nigrũ, rotudũ, & crassiore constat calamo, carnosioréq;. Tertius est iuncus qui vocatur oloscœnos, priorib⁹ carnosior, asperiórq;, is similem supradicto fructum in cacumine parit. Semen vtriusque tostum, ex diluto vino potũ, sistit aluum, & rubra fœminarum profluuia: vrinam cit, capitisque dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Æthiopici iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

ζων, φύλλα δὲ οὐκ ἔχει, ὅπ δὲ τῶν κλάδων περέκεινται οἱονεὶ ῥάγες μικραὶ, πυρραὶ, κατὰ μέγεθος πυροῦ, ὀξεῖαι ἐπ' ἄκρου, πολλαὶ λίαν γευσαμένῳ συστικαί. τούτου ὁ καρπὸς ὡς ῥάγες ς δέκα ζωὸ οἴνῳ ποθεῖσαι, κοιλιακοὺς ἅ καὶ ῥοϊκὰς γυναῖκας ὠφελοῦσιν. ἔνιοι δ' ἁ κόπτοντες αὐτὸν, ἀναπλάττουσι τροχίσκους εἰς ἀπόθεσιν ἁ οὕτω χρῶνται.

Περὶ Σχίνου. Κεφ. νϚ'. 10

Σχίνος τούτου διττὸν εἶδος. τὸ μὲν τοι αὐτὸ καλεῖται σχῖνος λεία, τὸ δὲ, ὀξύχηνος ἄποξις ἐπ' ἄκρου, διττὸν ἅ καὶ τούτου εἶδος· ἡ μὲ γὸ ἄκαρπος, ἡ δ' καρπὸν μέλανα ἔχει 15 στεμφερῆ, παχύτεροι δὲ ταύτης οἱ κάλαμοι, καὶ σαρκωδέστεροι. Ἔστι δὲ καὶ τείτη πολλῷ σαρκωδεστέρα ἁ τραχυτέρα τῶν δυοῖν, ὁλόχηνος λεγομένη, ἔχει δὲ ἁ αὐτὴ καρπὸν ἐπ' ἄκρου ὅμοιον τῷ 20 περὶ αὐτῆς. Ἀμφοτέραν δὲ ὁ καρπὸς φρυγεὶς ἁ πινόμενος μ' κράματος, κοιλίαν ἁ ῥοῶν ἐρυθρὸν ἴστησι, ἁ ὕρα κινεῖ· ἔστι δ' ἁ κεφαλαλγές. τὰ δὲ πρὸς τὸν ῥίζαν ἀπαλὰ φύλλα καταπλαττόμενα, φα- 25 λαγγιοδάκτους ἀμύζει. Ἡ δὲ αἰθιοπικὴ χῆνος, ὑπνωτικὸν ἔχει τὸν καρπόν· φυλλάπιεδαι δὲ δεῖ αὐτὸ ἐν ταῖς πόσεσι τὸ πλῆθος, καιροῦ χάριν λίαν.

Περὶ Λει-

Περὶ Λειχῆνος. Κεφ. νγ'.

Λειχὴν, ὁ ἐπὶ τῶν πετρῶν, οἱ δὲ, βρύον καλοῦσι, βρύον δὲ προσηχθμένον ταῖς ἐν ῥόοις πέτραις. τοῦτο καταπλασθὲν αἱμορραγίας ἴσησι, καὶ φλεγμονὰς παρεμπεφυκυίας, καὶ λειχῆνας θεραπεύει· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἐκτερικοὺς μετὰ μέλιτος διαχριόμενον· στόματος δὲ καὶ τῆς γλώττης ῥευματισμοὺς παρεμπεφυκυίας.

Περὶ Παρωνυχίας. Κεφ. νδ'.

Παρωνυχία φύεται ἐν πέτραις δασυκίσκιον ὅμοιον πέπλῳ, τῷ δὲ μήκει ἔλαττον, τοῖς δὲ φύλλοις μεῖζον. ὅσον καταπλασθὲν λεῖον ὅλον παρωνυχίας καὶ κηλὶς θεραπεύει.

Περὶ Χρυσοκόμης. Κεφ. νε.

Χρυσοκόμη ῥαδίον ἐστὶ θαμμαῦν· ἔχον κόμην κορυμβοειδῆ, ὁμοίαν ὑοσκυάμῳ ῥίζαν δασεῖαν, λεπτὴν, ὡς ἑλλέβορος μέλανος· γεύσει μὲν ἐν ἀπιθῇ, κυπέρῳ ὅσην ἔσαν, ἐν τῷ γλυκεῖ ὑπαύστηρον· φύεται ἐν παλιστίοις καὶ πετρώδεσι. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν καὶ συστατικὴν ἡ ῥίζα· ἡπατικοῖς καὶ περιπνευμονικοῖς ἁρμόζουσιν· λαμβάνεται δὲ καὶ σὺν ὑδρομέλιτι ἐφθὴ πρὸς κάθαρσιν ὑστέρας.

Περὶ Χρυσογόνου. Κεφ. νς'.

Χρυσόγονον φύλλα ἔχει ὁμοιὰ δρυΐ, ὁ δὲ θάμνος ὅσον πυκνὸς· αὐτὸς δὲ παρεμπλήσιον τῷ στεφανωματίτῃ

Lichen. Cap. LIII.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur: aspersinosis petris adhæret, vt muscus. Is illitus sanguinis profluuia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris & linguæ defluxiones inhibet.

Paronychia. Cap. LIIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus foliis. Illita paronychiis atque duritiis, remedio est.

Chrysocome. Cap. LV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat: coma specie corymborũ, hyssopo simili: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosis opacísque nascitur. Radix calfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio malè habet: contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum. Cap. LVI.

Chrysogonũ denſe fruticat, quernis foliis: flore coronarij

verbaſci:radix vt rapum extuberat, intus ruberrima,foris nigra. Quæ trita cum aceto,atq; impoſita, muris aranei morſibus auxiliatur.

Elichryſum. Cap. LVII.

Elichryſon quidam chryſanthemon, nonnulli & id amaranton vocant, quo deorũ ſimulacra coronant:ramulũ habet candidum, virentem, rectum,firmum:folia interceden tibus ſpatiis anguſta,abrotono ſimilia: comam aureæ lucis in orbem, vmbella rotunda veluti ſiccis corymbis dependentibus,radice tenui:naſcitur in aſperis,& torrentiũ alueis. Contra ſerpentium ictus,coxendicũ dolores,vrinæ ſtillicidia,ruptáque,coma è vino pota opitulatur: ciet menſes. Sanguinẽ concretũ ventris ac veſicæ abſumit,pota cum mulſo:ieiunis, triũ obolorũ põdere, ſiſtit deſtillationes, data in vino albo diluto:veſtibus inſeritur,vt eas ab erodentiũ iniuriis tueatur.

Chryſanthemum.

Cap. LVIII.

Chryſãthemũ aut caltha,nõnullis buphthalmos: herba eſt tenera,fruticoſa,leues proferẽs caules,& multifida folia:flores ſupra modũ ſplẽdentes,luteos, orbem

ματικῷ φλόμῳ. ῥίζαν ὁμοίαν γογγύλῃ, ἔνδοθεν ἐρυθρὰν, ἔξωθεν δὲ μέλαιναν. ἣ τὶς βοηθεῖ σοὺ ὄφει λεανθεῖσα καὶ ὀπτηθεῖσα μυγαλῆς δήγμασιν.

Περὶ Ελιχρύσου. Κεφ. νζ'.

Ελίχρυσον, οἱ δὲ χρυσάνθεμον, οἱ δὲ, καὶ τοῦτο ἀμάραντον καλοῦσιν, ᾧ καὶ τὰ εἴδωλα στεφανοῦσι· ῥαβδίον λευκὸν, χλωρὸν, ὀρθὸν, στερεόν· φύλλα στενὰ, ἐν διασημάτων ἔχον πρὸς τὰ τοῦ ἀβροτόνου· κόμιν, κυκλοτερῆ, χρυσοφανῆ, σκιάδιον περιφερὲς, ὥσπερ κορύμβοις ξηροῖς, ῥίζαν λεπτήν. φύεται δὲ ἐν τραχέσι καὶ χαραδρώδεσι τόποις. Βοηθεῖ δὲ ἡ κόμη σοὺ οἴνῳ ποθεῖσα, δυσουρίαις καὶ ἑρπετῶν δήγμασι, καὶ ἰχμάσι καὶ ῥήγμασι· καὶ ἔμμηνα ἄγει. καὶ θρόμβους αἵματος τοὺς ἐν κύστει ἢ κοιλίᾳ πίπτει ζωὸ οἰνομέλιτι πινομένη· ἴσχει δὲ καὶ καταῤῥοὰς ὄσον τειάβολον γήσει δοθεῖσα ἐν κράμπι οἴνου λευκοῦ· σαυτίδεται δὲ καὶ μετὰ ἱματίων ἄβρωτα τηροῦσα αὐτά.

Περὶ χρυσανθέμου.

Κεφ. νή.

Χρυσάνθεμον, ἢ χαλκὰς, οἱ δὲ βούφθαλμον· πευκεδανόν τις πόα, θαμνοειδὴς δὲ, λείοις ἀναφέρουσα καυλοὶς καὶ φύλλα πολυχιδῆ· ἄνθη μίλινα, ἰσχνῶς στίλβοντα,

καὶ

καὶ ὀφθαλμὸν κυκλοτερῆ, διὸ καὶ οὕτως ὠνόμασται· φύεται περὶ τὰς πόλεις· οἱ καυλοὶ δ' αὐτοῦ λαχανεύονται. Τὰ δὲ ἄνθη λεῖα μετὰ κηρωτῆς, στεατώματα λέγεται διαφορεῖν· ἰκτερικοῖς δέ, προσκαίρως εὐχροεῖν ποιεῖ ποθεῖσα μετὰ τὴν ἐν τοῖς λουτροῖς ἀπὸ τῆς μακρᾶς διατριβῆς ἔξοδον.

Περὶ Ἀγηράτου. Κεφ. νθʹ.

Ἀγήρατον θάμνος ἐστὶ φρυγανώδης, σπιθαμώδης, ταπεινὸς, ἁπλοῦς, ἐμφερὴς μάλιστα ὀριγάνῳ· σκιάδιον ἔχων, ἐφ' οὗ ἄνθος πομφολυγῶδες, χρυσοειδὲς, ἔλαττον ἑλιχρύσου. ὠνόμασται δὲ ἀγήρατον, διὰ τὸ ἐπιπολὺ τὸ ἄνθος ὁμοιοειδὲς φυλάττεσθαι. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ πυρωτικήν· καὶ αὐτὴ ἡ πόα ὑποθυμιωμένη οὖρα ἄγειν, καὶ τὰ περὶ ὑστέραν μαλάττειν.

Περὶ Περιστερεῶνος. Κεφ. ξʹ.

Περιστερεὼν φύεται ἐν ἐνύδροις τόποις. δοκεῖ δὲ ὠνομάσθαι ἐκ τοῦ τὰς περιστερὰς ἡδέως διατρίβειν ἐν αὐτῇ. πόα δέ ἐστι σπιθαμὴν ἔχουσα τὸ ὕψος, ἢ καὶ μεῖζον, πέταλα ἐντετμημένα, ὑπόλευκα, ἐκπεφυκότα ἐκ τοῦ καυλοῦ· μονόκλωνος ὡς τοπολὺ καὶ μονόρριζος εὑρίσκεται. Δοκεῖ τε τὰ φύλλα σὺν ῥοδίνῳ ἢ στέατι χοιρείῳ νεαρῷ προστιθέμενα, ἀνωδυνίαν ὑστέρας ποιεῖν.

orbẽ oculi imitantes, vnde buphthalmi nomẽ traxit: propter oppida naſcitur. Cuius caules oleris vice manduntur. Flores cũ cerato triti, ſteatomata diſcutere produntur: regio morbo correptis, colorẽ breui reddunt, ſi ſequente longo balnei vſu, poſt exitum ebibantur.

Ageratum. Cap. LIX.

Ageraton fruticoſa herba eſt, palmari longitudine aſſurgens, ſimplex, humilis, origano maximè ſimilis: vmbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryſo minor. Nomen ei inditum eſt, quoniam diutiſsimè flos in ſua coloris ſpecie conſeruetur. Vis decocti feruens: huius vſtæ nidor vrinam cit, & vuluæ duritias emollit.

Verbenaca. Cap. LX.

Periſterion, ſiue verbenaca naſcit̃ in aquoſis. Nomẽ ex eo duxiſſe videtur, ꝙ colũbæ circa hãc perquàm libẽter verſari ſoleant. Dodrantis altitudine, & interdum amplius adoleſcit: folia è caule prodeũt inciſa, & ſubalbida: ea ſingulari ramo, radicéq; ſola, cõſtare ſępius inuenitur. Folia cum ſuilla adipe recenti, aut roſaceo impoſita, vuluarũ doloresfinire putãtur.

ignem ſacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant: veteráque ex melle, ad cicatricem perducunt.

Sacra herba. Cap. LXI.

Sacra herba, quæ & periſtereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiuſculos, anguloſos, in quibus ex interualli folia querc°, ſed minora anguſtioráq; eiſdem diuiſuris in ambitu, colore aliquatenus cęſio: radix longa, tenuis· flores purpurei, graciles. Folia cũ radice in vino pota, illitáve, aduerſus ſerpétes pollent: eadem drachmæ põdere cũ thuris obolis tribus, in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, cõtra regiũ morbũ bibũtur: veteres tumores & inflãmationes mitigãt: ſordida vlcera purgãt. Tota in vino decocta, tonſillarũ cruſtas abrumpit: oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt, ſi aqua ſpargatur tricliniũ, qua maduerit, lætiores cõuictus fieri. Datur potãdum in tertianis febribus, tertium à terra geniculũ, cum foliis circundantibus: quartanis, quartũ. Sacrã vocant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

Aſtra-

στέλλει δὲ καὶ ἐρυσιπέλατα σὺν ὄξει καταπλασθεῖσα, καὶ σηπεδόνας ἐπέχει. καὶ τραύματα κολλᾷ, καὶ ἀπουλοῖ τὰ παλαιὰ σὺν μέλιτι.

*Περὶ Ἱερᾶς βοτάνης. Κεφ. ξά.

Ἱερὰ βοτάνη, οἱ μὲν περιστερεῶνα ἐκάλεσαν, ῥάβδους ἀνίσους πηχυαίους ἢ καὶ μείζονας γονιοφυεῖς, ἀπὸ δὲ τὰ φύλλα ὁμοιοτρόπως ἔοικότα δρυΐ, πλὴν στενώτερα καὶ πλονα, ἐντετμημένα ὁμοίως τῷ κύκλῳ, πόλλαυκα· ῥίζαν δὲ ὑπομήκη, λεπτὴν· ἄνθη πορφυρᾶ, λεπτά. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ ῥίζα ποτιζόμενα μετ' οἴνου καὶ καταπλασσόμενα, ποιεῖ πρὸς ἑρπετά· πρὸς δὲ ἴκτηρον τὰ φύλλα δοὺς ἐλκὼν μετὰ λίβανωτοῦ πεισθόλιν, σὺν οἴνου παλαιοῦ κοτύλῃ μιᾷ νήστει ἐφ' ἡμέρας μ'. πινόμενα· οἰδήματά τε χρονια καὶ φλεγμονὰς καταπλασθέντα θεραπεύει· καὶ ῥυπαρὸν ἕλκη καθαίρει· ἐψηθεῖσα δὲ ὅλη σὺν οἴνῳ, ἐξαίρας τὸν ἐν παιδομίοις θερμήπιεν καὶ νομὰς τὰς ἐν τοῦ στόματι ἀναγραφιζούσας ἐφίστησι. ῥαινόμενόν τε ἐν συμποσίοις τὸ ἀπόβρεγμα, εὐδιαγωγοτέρους ἰσχεῖ ποιεῖν· δίδοται δὲ πεντάζουσι ποιεῖν τὸ τέτον γένος ἀπὸ τῆς γῆς σὺν τοῖς θερμοτέροις φύλλοις· τεταρταίζουσι δὲ τὸ τέταρτον. καλοῦσι δὲ αὐτὴν ἱερὰν βοτάνην διὰ τὸ εὔχρηστον ἐν τοῖς καθαρμοῖς εἶναι εἰς θεράμματα.

Περὶ

Περὶ Ἀστραγάλου. Κεφ. ξϚ'.

Ἀστράγαλος θαμνίσκος ἐστὶ μικρὸς ἐπὶ γῆς, φύλλοις καὶ κλωνίοις ὅμοιος ἐρεβίνθῳ· ἄνθη πορφυρᾶ, μικρά· ῥίζα ἣ ὕπεστι στρογγύλη ὡς ῥάφανος ἐυμεγέθης, παχυφύλλους ἔχουσα κεραΐας, μέλαινας, σκληρότερας ὡς κέρατα αὐτὴ πεπλεγμένας ἀλλήλαις, γευσαμένῳ στυπτικάς. φύεται δὲ ἐν ἐυανέμοις καὶ συσκίοις καὶ χαμαιζομένοις τόποις. πολλὴ δὲ ἐν μέμφει τῆς ἀρχαδίας. Ἴσχει δὲ κοιλίαν ῥευματιζομένῳ ἐν οἴνῳ πεθεῖσα ἡ ῥίζα· κινεῖ τε καὶ ὕδρα· πιεῖ καὶ πρὸς παλαιὰ ἕλκη ξηρὰ ὀπὸ παιομένῳ· καὶ αἷμα ἴσχει· κόπτεται δὲ διαῤῥῶς καὶ διὰ τὸ σεσὴν αὐτῆς.

Περὶ Ταχίνθου.

Κεφ. ξγ'.

Τάχινθος φύλλα ἔχει ὅμοια βολβῷ· κυκλόν· σπαθαμιαῖον, λεῖον, λεπτότερον τοῦ μικροῦ δακτύλου, χλωρόν· κόμιν ὀπικεκμηκυῖαν κυκλοτερῆ αὐθοις πλήρη πορφυρουσθοῦς· ῥίζαν καὶ αὐτὴν ἐμφερῆ βολβῷ. Ἡ πεσοῦσα οἴνῳ καταπλαθεῖσα λευκῷ ὀπὶ πύδων, ἀγκύλους τηρεῖν πεπίστευται· ἴσχει δὲ καὶ κοιλίαν, καὶ οὖρα ἄγει πεθεῖσα, καὶ φαλαγγιοδήκτοις ὠφελεῖ. ὁ καρπὸς δὲ στυπτικώτερος ὢν, καὶ αὐτὸς θηριακοῖς ἁρμόζει· ἴκτερόν τε ἀποκαθαίρει σὺν οἴνῳ πινόμενος.

Περὶ

Astragalus. Cap. LXII.

Astragalus, paruus à terra frutex, foliis & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. nascitur in ventosis, opacis, & in niualibus: ea Memphis Arcadiæ scatet. Aluum sistit radix in vino pota: vrinam mouet: vetustis vlceribus, sicca efficaciter inspargitur: sanguinem supprimit: ægrè propter duritiam tunditur.

Hyacinthus. Cap. LXIII.

Hyacinthus folia habet bulbi: dodrantalem caulem, læuem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam: radicem quoque bulbaceam. Quæ, vt creditur, pueris cum vino albo illita, pubertatē coërcet, & non patitur erumpere: sistit aluum pota & vrinam impellit, phalangiorumque morsibus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitū: regium morbū emendat, cum vino potum.

Pauauer erraticum.
Cap. LXIIII.

Papauer erraticum, quod rhœada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo naſcitur, flore protinus deciduo, vnde & nomen apud Græcos accepit. Folia erucæ, aut origano, aut cichorio, aut thymo ſimilia ſpectantur, ſed lógiora, diuiſa, ſcabra: iúceus ei caulis, rectus, cubitalis, aſper: flos ſylueſtris anemones, puniceus, interdum albus: oblógũ caput, ſed quàm anemones minus: ſemẽ rufum: radix longa, ſubalbida, minoris digiti craſsitudine, guſtu amara. Hnius capita quinq; aut ſex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus ſomnus accerſendus eſt. Semina acetabuli méſura ex aqua mulſa pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præſtandũ mellitis placentulis. & dulciariis libis admiſcentur. Folia cũ calycibus illita, inflammationes ſanant: eorundem fotu & perfuſione, ſomnus allicitur.

Papauer ſatiuum.
Cap. LXV.

E ſatiui papaueris genere, quod hortenſe eſt, ſemen in panem denſatur, qui ſanis in vſu ſit: eo etiã ex melle pro ſeſama vtuntur:

Περὶ Μήκωνος ῥοιᾶς.
Κεφ. ξδ'.

Μήκωνα ῥοιὰς, ὠνόμασαν ἤ διὰ τὸ ταχέως τὸ ἄνθος ἀποβάλλειν, φύεται ἐν ἀρούραις ἔαρος, ὅ τε καὶ συλλέγεται. ἔοικε δὲ τὰ φύλλα θριδακίνῳ, ἢ ἐυζώμῳ ἢ κιχωρείῳ ἢ θύμῳ ἐπαφρισμένα, μακρότερα δὲ καὶ τραχέα· κεφαλὴν δὲ φυάδη, ὄρθιον, τραχὺ ὡς πήχεως· ἄνθος φοινικοῦν, ἐνίοτε δὲ καὶ λευκὸν ὅμοιον τῷ τῆς ἀγρίας ἀνεμώνης, κεφαλὴ δὲ περμήκης, ἤπιον μὲν τι ἢ τῆς ἀνεμώνης· χαρπὸς πυρρός· ῥίζα ὀπωμήκης, ὑπόλευκος, δακτύλου ἔχουσα μικροῦ πάχος, πικρά. Ταύτης τὰ κεφάλια πέντε ἢ ς'. μετ' οἴνου κυάθων τριῶν ἐφθήσας ὡς εἰς β'. ἀγαγεῖν, πότιζε οἷς ἂν βούλει ὑπνῶσαι. τοῦ δὲ σπέρματος πόδιν ὄσον ὀξύβαφον σὺν μελικράτῳ, κοιλίαν ἤπιως μαλάσσει· μίγνυται δὲ καὶ μελιπηδίοις καὶ ἰπτείοις πρὸς τὸ αὐτό. τὰ δὲ φύλλα σὺν τοῖς καυλίοις καταπλασθέντα φλεγμονὰς ἰᾶται· καὶ τὸ ἄνθημα δὲ αὐτῶν αὐτανδὲν, ὑπνοποιὸν ὄν.

Περὶ Μήκωνος ἡμέρου.
Κεφ. ξέ.

Μήκων ἡ μέν τις ὀξὺν ἥμερος, καπυτὴ, ἧς τὸ σπέρμα ἀποτίθεται εἰς τὸ ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν καὶ σὺν μέλιτι ἢ αὐτὸ σησάμης αὐτῇ χρῶν-

χῶνται. χαλεῖται δὲ θυλακῦπις. ἐπίμηκες ἔχουσα τὸ κεφάλιον, καὶ τὸ σπέρμα λευκόν. Ἡ δέ τις ἀγρία ἐγκαθημβόλιον ἔχουσα ἐπ' κωδίαν, μέλαν σπέρμα. ὃ καὶ πιθῖτιν ὀνομάζεται ὑπ' ἐνίων ἐπὶ ῥοιᾶς καὶ αὐτή, διὰ τὸ ῥεῖν ἐξ αὐτῆς τὸν ὀπόν. Τείτη δὲ ἀγριωτέρα καὶ φαρμακωδεστέρα καὶ μακροτέρα τούτων, ἔχουσα τὸν κωδίαν ὀπμένον. Κοινὴ δὲ αὐτῶν δύναμις ψυκτικὴ· ὅθεν τὰ φύλλα καὶ αἱ κωδίαι καθεφθεῖσαι ἐν ὕδατι καὶ πεσσοντλεύμεναι, ὑπνοποιοῦσι. πίνεται δὲ πρὸς ἀχρυπνίαν τὸ ἀφέψημα, καὶ εἰς τὰ καταπλάσματα δὲ λεῖαι αἱ κωδίαι μετὰ ἀλφίτων μιγνύμεναι, πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐρυσιπέλατα ἁρμόζουσι. δεῖ δὲ κόπτοντας αὐτὰς χλωρὰς ἀναπλάττειν εἰς βολίσκους, καὶ ξηραίνοντας ἀποτίθεσθαι, καὶ οὕτω χρῆσθαι. καθ' ἑαυτὰς δὲ ἐφθεῖσαι αἱ κωδίαι ἐν ὕδατι μίχρις ἡμίσεως, εἶτα σὺν μέλιτι πάλιν ἑφθεῖσαι, ἄχρις ἂν συραφῇ τὸ ὑγρὸν, ποιοῦσι φάρμακον ἐκλεικτίν. ἀγαθύνουσι πρὸς βῆχας καὶ ῥευματισμοὺς ἀρτηρίας καὶ κοιλίας καὶ διαθέσεις. ἐπιτήδειον δὲ γίνεται μιγνύμενον αὐτῷ ὑποκυστίδος χυλοῦ καὶ ἀκακίας. τὸ δὲ σπέρμα τῆς μελάνης μύκωνος λεῖον σὺν οἴνῳ ποτίζεται πρὸς ῥεῦμα κοιλίας καὶ γυναικεῖον ῥοῦν, καταπλάσ-

vtuntur: thylacitin vocant: Capitulum habet longum, & semen cādidum. Sylueſtre verò, caput inſidens, demiſſúmque, & nigrum ſemen, quod pithitis nominatur: nonnullis tamē & ipſum rhœas dicitur, quoniam eius ſcapolacteus ſuccus emanat. Tertium magis ſylueſtre, et ad medicinas valentius, multò his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix: quare ſi capita ipſa, & folia decoquantur in aqua, ſomnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Calices cum polenta triti, & cataplaſmatis admiſti, ignib⁹ ſacris, & inflammationibus proſunt. Tunduntur quoque virides, & digeruntur in paſtillos, qui ſiccati ad vſum recóduntur. Capita quoque per ſe in aqua coquuntur ad dimidias, iterúmq; adiecto melle, dū humor coēat in eclegmatis lentorem. Id medicamentū in tuſsi, arteriæ fluxionibus, & cœliacorū affectu doloris leuamentum præbet. Efficacius tamē redditur, addito hypociſtidis ſucco et acacia. Papaueris nigri ſemē tritum cū vino bibitur, cōtra citā aluum, & fœminarum ꝓfluuia:

uia: in peruigiliis fronti temporibúsque illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccátque: sumptum erui magnitudine, doloré finit, cócoquit, & somnum allicit: tussi, atque cœliacorum valetudini auxiliatur: verùm si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis cum rosaceo perfusum efficax est: auriũ dolori, cum amygdalino, myrrha et croco instillatur: inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo ꝓficit: igni sacro & vulneribus, cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & croco somnum accersit, subditum sedi pro balano: Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facilè aqua diluitur, læue, candidũ, neque asperũ, neq; grumosum, quod inter colandum non vt cera coëat, & in sole diffundatur: dein admotum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique, odoris vim cóseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo, adulterant. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci coloré reddit lactucaceo succo fictũ, exiliter

καταπλάσσεται δὲ ἐπὶ τῶν ἀγρυπνούντων μεθ' ὕδατος, κατὰ τοῦ μετώπου καὶ τῶν κροτάφων. ὁ δὲ ὀπὸς καὶ αὐτὸς ψύχων ἐπιπλέον καὶ παχύνων καὶ ξηραίνων· ληφθεὶς βραχὺς ὅσον ὄροβος, ἀνώδυνός ἐστι καὶ ὑπνοποιὸς καὶ πεπτικός· βοηθεῖ βηχὶ καὶ κοιλιακαῖς διαθέσεσι· πλείων δὲ ποθεὶς βλάπτει, ποιῶν ληθαργικοὺς καὶ ἀναιρεῖ. ποιεῖ δὲ καὶ κεφαλαλγοῦσι σὺν ῥοδίνῳ ἐμβρεχόμενος· ὠταλγοῦσι δὲ σὺν ἀμυγδαλίνῳ καὶ κρόκῳ καὶ σμύρνῃ ἐγχεόμενος· ἐπὶ δὲ φλεγμοναῖς ὀφθαλμῶν σὺν λεκύθῳ ὀπτῇ καὶ κρόκῳ· καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα δὲ καὶ τραύματα σὺν ὄξει· πρὸς δὲ ποδάγρας σὺν γάλακτι γυναικείῳ καὶ κρόκῳ· προστεθεὶς δὲ* δακτύλῳ ἀντὶ βαλάνου ὕπνον ποιεῖ. κράτιστος δέ ἐστιν ὀπὸς ὁ πυκνὸς καὶ βαρὺς, ἐν δὲ τῇ ὀσμῇ καρωτικὸς, πικρὸς ἐν τῇ γεύσει, εὐχερῶς διϊέμενος ὕδατι, λεῖος, λευκὸς, οὐ τραχὺς, οὔτε θρομβώδης, οὔτε συστρεφόμενος ἐν τῷ διηθεῖσθαι ὡς κηρὸς, ἔν τε τῷ ἡλίῳ τεθεὶς, διαχεόμενος καὶ πρὸς λύχνον ἐξαπτόμενος οὐ ζοφώδει φλογί· φυλάσσων τε μετὰ τὸ σβεσθῆναι τὴν ἐν τῇ ὀσμῇ δύναμιν. δολοῦσι δὲ αὐτὸν γλαύκιον μιγνύντες ἢ κόμμι, ἢ χυλὸν ἀγρίας θρίδακος· ἔστι δὲ ὁ μὲν ἐκ τοῦ γλαυκίου κροκίζων ἐν

ἐν τῇ ἀνέσει. ὁ δὲ ἐκ τῆς θρίδακος ἐξίτηλος τὴν ὀσμὴν καὶ βραχύτερος· ὁ δὲ ἐκ τῆς κόμμεως ἄτονος καὶ διαυγής. ἔνιοι δὲ εἰς τοσοῦτον ἀνοίας παραγίνονται, ὡς καὶ στέαρ παραμίσγουσιν αὐτῷ. φώγνυται δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ἐπ' ὀστράκου καινοῦ ἕως ἂν μαλακώτερος καὶ κιρρότερος φανῇ. Ἐρασίστρατος μέν τοι Διαγόραν φησὶν ἀποδοκιμάζειν αὐτοῦ τὴν χρῆσιν ἐπὶ τῶν ὠταλγικῶν, καὶ ὀφθαλμιώντων. διὰ τὸ ἀμβλυωπὲς εἶναι καὶ καρωτικόν. Ἀνδρέας δέ φησιν, ὅτι εἰ μὴ ἐδολοῦτο, ἐτυφλοῦντο ἂν οἱ ἐγχριόμενοι ὑπ' αὐτοῦ. Μνησίδημος δέ φησι μόνην αὐτοῦ χρῆσιν εἶναι τὴν κατ' ὄσφρησιν εἰς ὕπνον ἁρμόζουσαν, ἄλλως δὲ ἐπιβλαβῆ τυγχάνειν. ἅπερ ἐστὶ ψευδῆ ὑπὸ τῆς πείρας ἐλεγχόμενα· διὰ τὸ ἐπιμαρτυρεῖσθαι τοῖς ἔργοις τὴν ἐνέργειαν τοῦ φαρμάκου. οὐκ ἄτοπον δὲ ὑπογράψαι καὶ τὸν τρόπον ᾧ συλλέγουσι τὸν ὀπόν. ἔνιοι μὲν οὖν τὰς κωδίας μετὰ τῶν φύλλων κόπτοντες ἐκθλίβουσι διὰ πιεστῆρος, καὶ τρίβοντες ἐν θυίᾳ, ἀναπλάττουσι τροχίσκους· καλεῖται δὲ τὸ τοιοῦτον μηκώνειον ἀδρανέστερον τοῦ ὀποῦ. ὀπίζοντας δὲ δεῖ μετὰ τὸ τὰς δρόσους ἀνικμασθῆναι, διαχαράσσειν μαχαιρίῳ τὸν ἀστερίσκον, ὡς μὴ εἰς τὰ ἐντὸς διατρῆσαι, καὶ ἐκ πλαγίων δὲ τῆς κωδίας ἐπ' εὐθείας ἐκτέμνειν ἐξεπιπολῆς,

καὶ

exiliter ſpirat, & aſperius ſpectatur: gūmi vitiatum, ſplendeſcit, & infirmū eſt. Nec deſunt qui eò demétiæ deuenerint, vt adipem ei admiſcerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicaméta, dum mollius atque rufius appareat. Diagoras, vt Eraſiſtratꝰ author eſt, vſū eius damnauit, oculorū lippitudinibus, & auriū vitiis infundi vetans, quoniā viſus acié hebetaret, et ſoporé gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinꝰ excæcari, ſi non adulteraretur. Mneſidemus vſum dũtaxat olfactandi probauit, quoniā ad conciliãdum ſomnū conueniret, alioqui nobis vt noxio interdicit. Quæ cõmentitia eſſe, experimento deprehendũtur: ſiquidé effectus, viriū huiuſce medicaméti, fidé faciũt, quare non alienū fuerit ſcriptis mãdare, quonã modo is excipiatur ſuccus. Aliqui capita ipſa et folia tundunt, & prælo exprimunt, terétesq; in mortario, digerũt in paſtillos: id meconiū vocatur, multū opio ignauius. Porrò opij faciundi ratio hæc eſt: Cũ ros in eo exaruerit, cultro decuſſatim in ſtellas, ne penitꝰ adigaſ, ex obliquo ĩ rectū ſummā cuté incidere oportet,

lachrymam

lachrymam exeuntem, digito in conchá abstergere, nec multò pòst redire, vt cócreta inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiá offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cùm tamé inciditur, retrocedendum est, ne vestib⁹ succus deradatur.

καὶ ἀποψᾶν τὸ δάκρυον ἐκτρεχόμενον δακτύλῳ εἰς μύακα· καὶ πάλιν ἐπιπορεύεσθαι μετ' οὐ πολύ· εὑρίσκεται γὰρ ἐπισυνεστὼς, καὶ τῇ ἐπιούσῃ δὲ οὕτως εὑρίσκεται, δεῖ δὲ ἐν θυΐᾳ* τρίβειν καὶ ἀποτίθεσθαι ἀναπλάσσοντας, ἐν μέν τοι τῷ τέμνειν ὀπίσω ἀναχωρεῖν δεῖ πρὸς τὸ μὴ ἀποψᾶσθαι τῶν ἱματίων τὸν ὀπόν.

Corniculatum papauer. Cap. LXVI.

PAPAVER ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, verbasco similia in ambitu syluestris papaueris more serrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo fœnigræci, in corniculorum modum inflexo, vnde nomen mutuatur: semine papaueris, pusillo nigróque: radice per summa cespitum, nigra, crassa: nascitur in maritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanet: prodest his qui crassa quædam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsa poto. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floréſque, & argema

Περὶ Μήκωνος κερατίτιδος. Κεφ. ξς΄.

Μήκων κερατῖτις, οἱ δὲ, παράλιον, οἱ δὲ, ἀγρίαν μήκωνα, οἱ δὲ, θαλάσσιον· φύλλα ἔχει λευκά, δασέα, ὅμοια φλόμῳ, πεπρισμένα τὴν περιφέρειαν, ὥσπερ τὰ τῆς ἀγρίας μήκωνος, καὶ τὸν καυλὸν ὅμοιον, ἄνθος ὠχρόν· καρπὸν δὲ μικρὸν, καμπύλον ὥσπερ κέρας, ὅμοιον τῷ τῆς τήλεως· ὅθεν καὶ ἐπωνόμασται· σπέρμα δὲ μικρὸν, μέλαν, ὅμοιον τῷ τῆς μήκωνος, ῥίζαν ἐξ ἐπιπολῆς φυομένην, μέλαιναν, παχεῖαν· φύεται ἐν παραθαλαττίοις τόποις καὶ τραχέσι. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ μὲν ῥίζα ἑψηθεῖσα ἄχρις ἡμίσεως ἐν ὕδατι καὶ ποθεῖσα, ἰσχιάδας καὶ ἡπατικὰς διαθέσεις θεραπεύειν· καὶ τοὺς παχέα ἢ ἀραχνώδη οὐροῦντας ὠφελεῖν. τὸ δὲ σπέρμα πλῆθος ὀξυβάφου ποθὲν σὺν μελικράτῳ, κοιλίαν ἐπιεικῶς καθαίρει· τὰ δὲ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη ἐσχάρας περιρρήττει καταπλασθέντα σὺν ἐλαίῳ·

ἐγχρισθέντα

ἐγχριόμενα δὲ τὰ ἐπὶ κτηνῶν αἴγεμα καὶ νεφέλια ἀποκαθαίρει. ἔνιοι δὲ ἐπλανήθησαν νομίσαντες ἐκ ταύτης τὸ γλαύκιον γίνεσθαι διὰ πλὴν τῶν φύλλων ἐμφέρειαν.

Περὶ Μήκωνος ἀφρώδους.

Κεφ. ξζ'.

Μήκων ἀφρώδης, ὑπὸ δέ τινων ἡράκλεια κληθεῖσα, χαμαλὸν ἔχει τὴν θαλλίαν, καὶ τὰ φύλλα σφόδρα μικρά, σρυδίῳ ἐοικότα, καὶ καρπὸν παρ' αὐτοῖς λευκὸν, καὶ τὸ ὅλον δὲ βοτάνιον λευκόν ὅθι καὶ ἀφρῶδες· ῥίζαν δὲ λεπτὴν ὀπωδέστατον. Ταύτης ὁ καρπὸς συλλέγεται ὅταν τελείως ἀδρωθῇ θέρους, καὶ ξηρανθεὶς ἀποτίθεται· χαίρει δὲ δραχμῇ ὀξυβάφου ὅλῃ θος σὺν μιλτράτῳ λαμβανόμενος· ἰδίως δὲ ἡ τοιαύτη κάθαρσις ὀπωπικοῖς ἁρμόζει.

Περὶ Τυπικοῦ. Κεφ. ξή.

Τυπικοον, οἱ δὲ, ὑποφοινικοῦν καλοῦσί τινες, φύεται δὲ ἐν τῷ σίτῳ καὶ τοῖς ἀρίραις· φύλλον δὲ ἔχει πηγάνῳ ὅμοιον, κλῶνας μικρούς. Δύναμιν δὲ ἔχει ἀναλογοῦσαν τῷ τῆς μήκωνος ὀπῷ.

Περὶ Τοσκυάμου.

Κεφ. ξθ'.

Τοσκύαμος, θάμνος ὃς τὴν χαμαλοὺς ἀπιεὶς παχεῖς, φύλλα πλατέα, ὀπωπικὰ, ἐχόμενα, μέλανα, θαλάσια, παρὰ γῆ ἢ χαμαλὸν ἐρεξῆς πόγωσιν αὖξη ὥσπερ ῥοιᾶς κύτη-

gema ac nubeculas iumentorum perunctas, abstergút. Sút qui glauciũ, hoc papaueris genere factitari existimarút, falsi quadã foliorum cognatione.

Spumeum papauer.

Cap. LXVII.

Aliud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeũ vocatur, ab aliis heracleum, caule dodrantali: foliis admodum paruis, radiculæ similibus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota: radice in sũmo cespite. Legitur æstate semen, cũ integrè adoleuit, decidítque exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa vomitione expurgat: priuatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

Hypecoum. Cap. LXVIII.

Hypecoon, aliqui hypopheon vocant: nascitur in segetibus aruísque, foliis rutæ, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

Apollinaris, siue hyoscyamus. Cap. LXIX.

Hyoscyamus, frutex est caules emittens crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis, ordine pendeunt, tãquam punicorũ cyti-

ni,

ni, scutulis septi seminũ plenis, vt papaueris. Tres eius differẽtiæ: Vna semine nigro, floribus penè purpureis, smilacis foliis, cytinis præduris, & spinosis. Alterius semen subflauũ, vt irionis: flores lutei: folia, & siliquæ simpliciores. Ambo insaniã gignunt & soporem, ideo in cõmuni vsu dãnantur. Tertiũ genus, vt quod mitissimum esset, medici recepere: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminísque, in maritimis ruderibúsque nascens. Cuius occasio si non adsit, rufum vsurpari oportet: niger, vt deterrimꝰ, improbatur. Recenti semine, caulibus, foliísque tusis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus ad annum vsque prorogatur: nam facilè corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Cõtusa herba recẽs, addita trimestri farina, digeritur ĩ pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod à sicco semine exemptum est, collyrijs, quæ doloris sensum auferunt, commodissimè inseri solent:

contra

νοι, πεφραγμένοι ἀσπιδίσκοις καὶ σπέρματος μεστοῖς, ὥσπερ μήκωνος. ἔστι δὲ αὐτοῦ διαφορὰ τρισσή· Ὁ μὲν γὰρ ἄνθη ὑποπόρφυρα φέρει, φύλλα σμίλακι ὅμοια, σπέρμα μέλαν, καὶ τοὺς κυτίνους σκληροὺς καὶ ἀκανθώδεις. Ὁ δέ τις ἄνθη μηλοειδῆ, φύλλα καὶ λοβοὺς ἁπαλώτερα, σπέρμα ὑπόξανθον ὥσπερ ἐρύσιμον· ἀμφότεροι δὲ οὗτοι μανιώδεις ὑπάρχουσι καὶ καρωτικοί, δύσχρηστοι. Εὔχρηστος δὲ εἰς θεραπείαν ἠπιώτατος ὢν ὁ τρίτος λιπαρὸς καὶ ἁπαλὸς καὶ χνοώδης, ἄνθη λευκὰ ἔχων, καὶ τὸ σπέρμα λευκόν· φύεται παρὰ θαλάττῃ καὶ ἐρειπίοις. εἰ δὲ μὴ παρείη οὗτος, χρῆσθαι δεῖ τῷ ξανθῷ, τὸν δὲ μέλανα ἀποδοκιμάζειν ὡς χείριστον. Χυλίζεται δὲ ὁ καρπὸς ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ καυλοὶ κοπτόμενοι καὶ ἐκθλιβόμενοι ἐν ἡλίῳ, ξηραινομένου τοῦ ὑγροῦ· χρῆσις δὲ αὐτοῦ πρὸς ἐνιαυτὸν διὰ τὸ εὔσηπτον. χυλίζεται δὲ καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατ' ἰδίαν κοπτόμενον ξηρόν, ὑφ' ὕδατος θερμοῦ παραχεομένου καὶ ἐκθλιβομένου. ἔστι δὲ βέλτιον τοῦ ὀποῦ τὸ χύλισμα, καὶ ἀνωδυνώτερον. ἡ δὲ χλωρὰ κοπεῖσα καὶ μιγεῖσα σιτανίῳ ἀλεύρῳ, ἀναπλάσσεται εἰς ἀρτίσκοις καὶ ἀποτίθεται. ἁρμόζει δὲ τὸ πρῶτον χύλισμα καὶ τὸ ἀπὸ ξηροῦ τοῦ σπέρματος εἰς κολλύρια ἀνώδυνα,

να, καὶ

τα, καὶ πρὸς ῥεῦμα δριμὺ καὶ θερμῶν· ὠταλγίαν τε καὶ τὰ περὶ ὑστέραν. σὺν ἀλεύρῳ δὲ ἢ ἀλφίτοις, πρὸς τε ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ ποδῶν καὶ τὰς ἄλλας. τὸ δὲ σπέρμα τὰ αὐτὰ παρέχει. πιοῦσι καὶ πρὸς βῆχας καὶ καταῤῥοὰς καὶ ῥεῦμα ὀφθαλμῶν καὶ φλεγμονίας, πρός τε ῥοῦν γυναικεῖον καὶ τὰς ἄλλας ἀμμορραγίας, ὅσον ὀβολὸς σὺν μήκωνος σπέρματι καὶ μελικράτῳ πεδέν. ἁρμόζει καὶ πρὸς ποδάγρας, ὅσοις πφυσωμένοις, μασοὺς ἐν τοκατῷ ἔπυρρομένους, λεῖον μετ' οἴνου καταπλασσόμενον, καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἀγώδυνα καταπλάσματα μίγνυται ὠφελίμως. καὶ τὰ ἀναπεπλασμένα φύλλα, εἰς πάντα τὰ ἀγώδυνα σὺν λήκνῃ μιγνύμενα ἀλφίτοις, καὶ καθ' ἑαυτὰ καταπλασσόμενα. τὰ δὲ πρόσφατα φύλλα καταπλασθέντα, ἀνωδυνώτατα πρὸς πάντα πόνον. πίεσα δὲ ἢ τέτταρα ποθέντα σὺν οἴνῳ, ἠπάλους πυρετοὺς θερα-πεύει· ἐψηθέντα δὲ ὡς λάχανα καὶ βρωθέντα πεψελίου πλῆθος, μετείαν παρέχουσιν ἐργάζεται. φασὶ δὲ ὅτι ἐάν τις ἕλκος ἔχοντα ἐν κύκλῳ ἐγκλύσῃ τὸ αὐτὸ ἀπεργάζεται. ἡ δὲ ῥίζα μετ' ὄξους ἐψηθεῖσα, ὀδοντολγίας ὀξὺ διάκλυσμα.

contra acutas calidásque fluxiones, dolores aurium, atque vuluæ mala, prosunt: cum farina autem aut polenta, oculorum, pedum, cæterarúmque partium inflammationes placant. Semen eadem præbet: tusi, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus, effi cax: contra mensium abundãtiam, & rumpentem aliunde sanguinẽ, oboli pondere cum papaueris semine, & aqua mul sa, bibitur: podagris subuenit: testibus inflatis, mammísque tumentibus à partu, tritum ex vino illinitur. Aliis quoque cataplasmatis, quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, vtilissimè imponuntur: recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur: cum vino terna, quaternáve pota, sanant algidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura mãduntur, mediocrem insaniam gignunt: idem efficere tradũt, si, colo vlcus sentiẽte, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluũtur.

Περὶ

Psyllium

Psyllium. Cap. LXX.

Psyllion foliis coronopo nõ dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmẽtosa fœni modo, in totum herbula: ramis dodrantalib': coma à medio caule exoritur, duob' tribúsve cõuolutis in cacumine capitulis: ĩ his semine duro, nigro, pulicũ simili vnde & nomen: in aruis & incultis nascit. Vis ei ad refrigerandũ, inspissandũ, & molliendũ conueniens: articulorũ morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitũ auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cũ rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantiũ, & prominẽti vmbilico, illitũ ex aceto, medet. Terit acetabuli mẽsura, & ĩ aquæ sextario madefactũ, vbi cõcreuit aqua, illinit: siquidẽ vehementer refrigerat, & in feruentẽ aquã deiectum calorẽ reprimit. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domũ importet, nõ sinere in ea pulices gigni. Cũ adipe tusũ, sordida vlcera, & q̃ cacoëthe vocant, expurgat. Succus vermiculosis aurib', aut fluxiõe laborãtib', ex melle, pdest

Hortẽse solanũ. Ca. LXXI.

HORTENSE solanum frutex cibis idoneus, pusillus, multis

Περὶ Ψυλλίου. Κεφ. ο'.

Ψύλλιον φύλλον ἔχει κορωνόποδι ὅμοιον, δασύ. *κλῶνας δὲ σπιθαμιαίους καὶ τὸ ὅλον βοτάνιον χορτῶδες· ἄρχεται δ' αὐτοῦ ἡ κόμη ἀπὸ μέσου τοῦ καυλοῦ, κεφάλια δὲ δύο ἢ τρία ἐπ' ἄκρου συνεστραμμένα· ἐν οἷς σπέρμα ψύλλοις ὅμοιον, μέλαν, σκληρόν· φύεται ἐν ἀρούραις καὶ χέρσοις. Δύναμιν δὲ ἔχει *ψυκτικὴν· ὠφελεῖ δὲ καταπλαττόμενον, ἀρθρίτιδας, παρωτίδας, φύματα, οἰδήματα, *στρέμματα, κεφαλαλγίαν, μετὰ ῥοδίνου ἢ ὄξους ἢ ὕδατος· ἐντεροκήλας τε τὰς ἐπὶ παίδων καὶ ἐξομφάλους ὑγιάζει καταπλασσόμενον σὺν ὄξει. δεῖ δὲ ὀξυβάφου πλῆθος λεαίνοντας βρέχειν ἐν δυσὶν ὕδατος δακτύλοις, καὶ ὅταν παγῇ τὸ ὕδωρ ἐπιπλάττειν· ψύχει γὰρ ἱκανῶς, καὶ εἰς ὕδωρ δὲ ζέον ἐπιτιθέμενον καταστέλλει τὴν θέρμην, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα. φασὶ δὲ ὅτι κομισθεῖσα ἐν οἴκῳ χλωρά, οὐκ ἐᾷ ψύλλας γενέσθαι. κοπεῖσα δὲ μετὰ στέατος, τὰ ῥυπαρὰ καὶ κακοήθη τῶν ἑλκῶν ἀνακαθαίρει. ὁ δὲ χυλὸς μετὰ μέλιτος πρὸς ὦτα ῥευματιζόμενα ποιεῖ καὶ σκώληκας ἔχοντα.

Περὶ Στρύχνου. Κεφ. οα'.

Στρύχνος κηπαῖος ἐδώδιμος ἐστὶ θαμνίσκος, οὐ μέγας· μασχάλας

μαχάλας ἔχων πολλάς· φύλλα μέλανα, ἀκύμου μείζονα καὶ πλατύτερα· καρπὸν φέρει, χλωρὸν μέλας δὲ ἡ κόρυς γίνεται μετὰ τὸ πεπανθῆναι· ἀβλαβὴς δὲ ἡ βοτάνη πρὸς λοιμόν. Δύναμιν δὲ ἔχει ψυκτικήν· ὅθεν τὰ φύλλα κατὰ πλακούντων, ἁρμόζει πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας μετὰ πεπάλης ἀλφίτου· καθ' ἑαυτὰ δὲ ὀπτηθέντα λεῖα, σιγλώπα θεραπεύει καὶ κεφαλαλγίαν· καὶ στομάχῳ κατασυμβάλλεται βοηθεῖ· παρωτίδας δὲ διαφορεῖ σὺν ἁλὶ λεῖα κατὰ πλασσόμενα. χυλὸς δὲ αὐτῆς πιεῖς πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας, σὺν ψιμμυθίῳ καὶ ῥοδίνῳ καὶ λιθαργύρῳ· πρὸς αἰγίλωπα δὲ σὺν ἄρτῳ. ἁρμόζει καὶ συεῖοι πυοδόοις σὺν ῥοδίνῳ ἐμβρεχόμενος· μίγνυται δὲ καὶ κολλυρίοις ἀντὶ ὕδατος ἢ ὠοῦ τοῖς πρὸς ῥεύματα δριμέα εἰς τὰς ἐγχύσεις· ὠφελεῖ καὶ ὠταλγίαν ἐναγείς. ἔχει δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον ἐν ἐείῳ πρόσθεσις. ὁ δὲ χυλὸς ἀναγκαῖος ὄζῃ πρὸς αἰγίλωπας, συμμαλασσόμενος ἀφόδῳ πυρῷ, ὀρνίθων κατοικιδίων κόπρῳ ὀπτηθέντων.

Περὶ Σβύχνου ἀλικακάβου.

Κεφ. οβ'.

Ἔστι καὶ ἕτερον στρύχνον, ὁ ἰδίως ἀλικάκαβον καλοῦσιν, οἱ δὲ φυσαλίδα

tis concauus alis: folio nigro, maiore quàm ocimi, & latiore: fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit: herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentæ illinuntur: ægilopia, capitísque dolores, trita & imposita per se sanant: æstuanti stomacho auxiliantur: parotidas, cũ sale detrita, illitu discutiunt. Valet succus eiº aduersus ignẽ sacrum, atque vlcera quæ serpunt, cum ceruſſa, rosaceo & argenti spuma: ad ægilopas cum pane: infantium adustioni, quam syriasin vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyriis, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiã sistit, in vellere subditus. Succus fluuo gallinarum cortalium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopiis præsentaneo est remedio.

Solanum halicacabon.

Cap. LXXII.

Est & aliud solanũ, qđ peculiari nomine halicacabó aut psy-

ſalida, id eſt veſicariam vocát, foliis antedicto ſimilibus, verú latioribus: cuius caules, poſteaquàm adoleuerunt, prona terram ſpectant: folliculis orbiculatis veſiculis ſimilibus: ſemine intus fuluo, rotundo, læui acinorum vuæ effigie: quo coronarij vtuntur, corollis intorquentes. Vim vſúmque horténſis ſolam habet: verum cibis nequaquam expetitur. Regiú morbum purgat, ſemine poto, & vrinam pellit. Ex vtraque herba ſuccus extrahitur, qui ſiccatus in vmbra, reconditur, ad eadem valens.

Solanum ſomniferum. Cap. LXXIII.

SOLANVM ſomniferum, aliqui etiam halicacabon appellant, fruticat multis ramis, denſis, caudicoſis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæque mali ſimilium plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, ſubrubro cortice veſtita: naſcitur in ſaxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmę pondere potus, ſomnificá vim habet, opio mitiorem. Semen vehemẽter vriná cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: ſi quid

λίδα φύλλοις ὅμοιον τῷ προειρημένῳ, πλατυτέροις μέντοι· οἱ καυλοὶ δὲ αὐτοῦ μετὰ τὸ αὐξηθῆναι χαμαικλινεῖς γίνονται· καρπὸν δὲ ἔχει ἐν θυλακίοις περιφέρεσιν ὅμοιον φύσαις, πυῤῥὸν, περιφερῆ, λεῖον, ὡς ῥᾶγα σταφυλῆς, ᾧ καὶ οἱ στεφανοπλόκοι χρῶνται καταπλέκοντες τοὺς στεφάνους. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ χρῆσιν τὴν αὐτὴν τῷ κηπαίῳ στρύχνῳ· χωρὶς τοῦ βιβρώσκεσθαι. δύναται δὲ ὁ καρπὸς αὐτοῦ πινόμενος, ἴκτερον ἀποκαθαίρειν οὐρητικὸς ὤν. χυλίζεται δὲ ἀμφοτέρων ἡ πόα, καὶ ξηραίνεται ἐν σκιᾷ πρὸς ἀπόθεσιν, ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ αὐτά.

Περὶ Στρύχνου ὑπνωτικοῦ. Κεφ. ογ΄.

Στρύχνον ὑπνωτικὸν, οἱ δὲ, ἁλικάκαβον, θάμνος ἐστὶ κλάδους ἔχων πολλοὺς, πυκνοὺς στελεχώδεις, δυσθραύστους, φύλλων πλήρεις λιπαρῶν, ἐμφερῶν μήλῳ κυδωνίῳ· ἄνθος ἐρυθρὸν, εὐμέγεθες· καρπὸν ἐν λοβοῖς κροκίζοντα· ῥίζαν φλοιὸν ἔχουσαν ὑπέρυθρον, εὐμεγέθη· φύεται ἐν πετρώδεσι τόποις οὐ πόῤῥω θαλάσσης. Ταύτης ὁ φλοιὸς τῆς ῥίζης ἐν οἴνῳ ποθεὶς < ὁλκὴ ὑπνωτικὴν ἔχει δύναμιν τοῦ ὀποῦ τῆς μήκωνος ἐπιεικεστέραν. ὁ δὲ καρπὸς οὐρητικός ἐστιν ἄγαν· δίδονται δὲ ὑδρωπικοῖς κόρυμβοι ὡς ιβ΄. πλείονες

πλείονες δὲ ποθέντες, ἔκστασιν ἐργάζονται. βοηθοῦνται δὲ μελικράτῳ πολλῷ πινομένῳ. μίγνυται καὶ ἀνωδύνοις ὁ χυλὸς αὐτῆς καὶ τροχίσκοις· ἀναφεψηθεὶς δὲ οἴνῳ καὶ διακρατούμενος ὀδονταλγίαις ἀρήγει. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης ἀμβλυωπίας μετὰ μέλιτος ἐγχριθεὶς παραιτεῖται.

Περὶ Στρύχνου μανικοῦ.

Κεφ. οδʹ.

Στρύχνον μανικὸν, ὃ ἔνιοι πέρσιον, οἱ δέ, θρύον ἐκάλεσαν. τούτου τὸ μὲν φύλλον παραπλήσιον ἐστὶν εὐζώμῳ, μεῖζον δὲ πρὸς τὰ τῆς ἀκάνθης, ἥ τις καὶ παίδερως καλεῖται· καυλοὺς δὲ ἀνίησιν ἀπὸ τῆς ῥίζης ὑπερφυεῖς δέκα ἢ ιβʹ. ὀργυιὰς ἔχοντας ὕψος· τὴν κεφαλὴν ἐπικειμένην ὥσπερ ἐλαίαν, δασυτέραν δὲ ὡς πλατάνου σφαῖραν μείζονα δὲ καὶ πλατυτέραν· ἄνθος μέλαν. μετὰ δὲ τοῦτο καρπὸν ἴσχει βοτρυοειδῆ, στρογγύλον, μέλανα*, ῥαγάδας ι ἢ ιβʹ. ὁμοίας κισσοῦ κορύμβοις, μαλακὰς ὥσπερ σταφυλή. ῥίζα δὲ ὕπεστι λευκή, παχεῖα, κοίλη ὡς πήχεως· φύεται ἐν ὀρεινοῖς χωρίοις καὶ περιηνέμοις καὶ πλαταμῶσι. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα πινομένη μετ' οἴνου < ά πλῆθος, φαντασίας ἀποτελεῖν οὐκ ἀηδεῖς· δύο δὲ < ποθεῖσαι, ἐξιστᾶσιν ἄχρι τριῶν ἡμερῶν,

δ. δὲ

si quid numero adiiciat, alienationé mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamétis quæ doloris leuamétũ præbét: decoctus in vino, si in ore cótineat, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Manicũ solanũ. Ca. LXXIIII.

Solanũ manicon, aliqui persion, alij thryon appellauere. Huic foliũ crucæ simile, maius aliquáto, satis acantho, qué pæderota vocant, accedés: caules à radice proceros emittit decé aut duodecim, vlnæ altitudine adolescentes: caput in cacumine, oliuæ figura, sed vt platani pilulæ hirsutius, verùm maius, latiúsque: florem nigrum: postquam eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis cóstans, similibus hederæ corymbis, vt vuæ mollibus: radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali: gignitur in montibus, vento perflatis, & platanetis. Radix drachmæ vnius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginésque nó iniucúdas obuersari, sed duplicatº hic modus, ad treis vsq; dies mentis alienationé affert:

E ij qua-

quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copiosa potata, & vomitione reiecta.

Dorycniũ. Cap. LXXV.

Dorycnion Crateuas halicacabon, aut caleã vocat, frutex oreæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris, non procul á mari, ramis cubito minoribus, foliis oleæ similibus colore, minusculis, firmioribꝰ, præter modum scabris: flore candido: siliquis í cacumine, ceu ciceris, dẽsis, rotundis, quinis intus, aut senis seminibꝰ, exigui erui magnitudine, læuibꝰ, firmis, versicoloribus: radix ad digiti crassitudiné & cubiti longitudiné adolescit. Id somniferũ esse cõstat. Copiosius haustũ mortem adfert. Nec defuere, qui dicerent, semẽ in amatoria expeti.

Mãdragoras. Cap. LXXVI.

Mãdragorã, aliqui antimalũ, alij circeam vocãt, quoniá videatur radix ad amatoria cõducere. Duo eiꝰ genera: niger, quæ fœmina existimatur, thridacias appellatus, angustioribꝰ foliis, ac minoribꝰ quàm lactucæ, virosis ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibꝰ inhæret bene magnis, binis,

δ'. ᾗ ποθεῖσαι, ἢ ἀγαθιεῦσιν, ἀντὶ φαρμάκων ᾗ ὄξυν αὐτῇ μελίκρατον, πολὺ πινόμενον ἢ ἐξεμέμενον.

Περὶ Δορυκνίου. Κεφ. οε'.

Δορύκνιον κρατεύας ἀλικάκαβον ἢ καλέαν καλεῖ, θάμνος ὅμοιος ἐλαίᾳ ἀσπφυεῖ· κλῶνας ἔχων ἐλαότινας πήχεως· φύεται ἐν πέτραις, οὐ πέρρω θαλάσσης, φύλλα δὲ τῷ χρώματι ἐλαίᾳ παραπλήσια, μικρότερα δὲ καὶ στερρότερα, καὶ τραχέα ἰσχυρῶς· ἄνθος λευκόν, ἐπ' ἄκρου ἔχει πυκνὰ θυλάκια ὥσπερ ἐρεβίνθια. ἐν οἷς σπερμάτια στρογγύλα ἑ ἢ ς'. ὅσον ὄρεσβοι μικροί, λεῖα, ἰσχυρὰ ἢ πεπίλα· ῥίζαν πάχος δακτύλου, μῆκος δὲ πήχεως· δοκεῖ ᾗ καὶ τοῦτο ὑπνωτικὸν εἶναι πλεοναζὸν δὲ ἀναιρεῖν. φασὶ δέ τινες ἢ τὸ σπέρμα αὐτῆς εἰς τὰ φίλτρα παραλαμβάνεσθαι.

Περὶ Μανδραγόρου. Κεφ. οϛ'.

Μανδραγόρας, οἱ δὲ αὐτίμιλον, οἱ δὲ θρικίαν, οἱ ᾗ κιρκαίαν καλοῦσιν, ἐπειδὴ δοκεῖ ῥίζα φίλτρων εἶναι ποιητική. ἔστι ᾗ αὐτῆς ὁ μὲν τις θῆλυς ὁ μέλας θριδακίας καλούμενος· φύλλα ἔχων τενάτερα καὶ μικρότερα θριδακος, βεβρωμένη ἢ βαρέα κατὰ πλῶ ὀσμὴν, κεχυμένα δὲ ἐπὶ γῆς καὶ παρ' αὐτὰ μῆλα οὖοις ἐμφερῆ, ὠχρά, εὐώδη, ἐν οἷς καὶ καρπὸς ὥσπερ ἀπίου. ῥίζαι συμφέτεις

δύ-

δύο ἢ τρεῖς, ἀντεμπεπλεγμένα ἀλλήλαις. μέλαινα κατὰ τὸν ὀπῶρα, ἔνδοθεν λευκὴ καὶ παχύφλοιος· χυλὸν δὲ ἀφίησι. Τῶ δὲ ἄρρενος καὶ λευκῆ, ὃν ἔνιοι νάσιον καλέουσιν, φύλλα ὑπὲρ μεγάλα, λευκὰ, πλατέα, λεῖα καθάπερ πύτυλα· τὰ δὲ, μῆλα διπλάσια, κροκίζοντα τὴν χροιᾶ, εὐώδη μετὰ βάρεος τινός· ἃ καὶ ἐσθίοντες οἱ ποιμένες ποσῶς ὑποκαρδιοῦνται· ῥίζα δὲ ὁμοία τῇ πρὸ αὐτῆς, μείζων δὲ καὶ λευκοτέρα· ἄχυλος δὲ καὶ αὐτή. Χυλίζεται δὲ ὁ φλοιὸς τῆς ῥίζης χλωρὸς κοπεὶς καὶ ὑποτεθεὶς πιεσθεὶς· δηλοῖ δὲ λεάναντας μετὰ τοῦ συραφῆναι ἀποτίθεσθαι ἐν ὀστρακίνῳ ἀγγείῳ. χυλίζεται δὲ καὶ τὰ μῆλα ὁμοίως, ἀνεμμένον δὲ γίνεται τὸ ἐξ αὐτῶν χύλισμα. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ ἡ ῥίζης πεπαυσμένης καὶ διαβεβρεγμένης λίνῳ, χρεμᾶται εἰς ἀπόθεσιν. ἔνιοι δὲ καθεψοῦσιν οἴνῳ τὰς ῥίζας ἄχρι βίτυ, καὶ διυλίζοντες ἀποτίθενται· χρώμενοι ὅπερ τῷ ἀχρύπνῳ καὶ πεπαυμένων κυάθῳ ἑνὶ, καὶ ἐφ' ὧν βέλονται ἀναπαύσεσθαι τεμνομένων ἢ καιομένων ποιῆσαι. ὁ δὲ ὀπὸς πεθεὶς ὀβολῶν δυοῖν πλῆθος ὀλκῆς, σὺν μελικράτῳ, ἄγει ἄνω φλέγμα καὶ μέλαιναν χολὴν ὡς ἐλλέβορος· ἀφελεῖ δὲ πεθεὶς ἐξάγει τε ζλῶ, μίγνυται καὶ εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς καὶ ἀνωδύνους δυνάμεις, καὶ πεπόσι μαλακτικοῖς. καὶ

binis, ternisve, inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caule viduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis norion vocitatus: huius folia magna, alba, lata, læuia vt betæ: mala quàm alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cum grauitate quadam olentia: quorum pomorum cibo, aliquantum opiliones soporãtur. radix, alterius similis, maior & cãdidior, orbata & hæc caule. Succus fit è cortice recẽtis radicis tuso, & prelis subiecto: qui insolatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis quoq; succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Deliratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defœcatũ ius seruant: cyatóque vno vtuntur, in peruigiliis, & doloribus, & ante sectiones vstionésque ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem atram pituitámq; extrahit: verùm potu largiore, vita adimitur. medicamentis ocularibus, & his quę dolores finiunt, pessis quoque emollientibus,

admiſcetur: ſemioboli pōdere indit⁹,per ſe mēſes & part⁹ expellit:ſubdit⁹ ſedi ꝑ balano,ſomnificus eſt.Radix ebur emollire fertur, q̄ ſenis horis cū eo decocta ſit:& ad accipiēdam, quam effingere optaueris, formá,ipſú facile pręſtat.Folia recētia cōuenieter oculorū inflā mationib⁹, & collectionibus, quas vlcera citarūt,cū polenta illinunt:duritias omneis ſuppurationes,ſtrumas,& tubercula diſcutiūt: ſtigmata ſine exulceratiōe delēt,ſi q̄nis ſeniſve dieb⁹,ſenſim perfricent.Folia ſeruant in muriis, eoſdē ad vſus. Trita radix ignib⁹ſacris ex aceto, & ſerpētium ictib⁹ ex melle aut oleo, medetur : ſtrumas atq; tubercula,cum aqua diſsipat:articulorū cruciatus,cū polēta ſedat.Fit citra coctionem vinū è cortice radicis, ad hunc modum : Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur ex eo terni cyathi , iis q̄ ſecari aut amburi debent, vt antè dictū eſt: ſiquidem nullo tūc afficiūtur dolore,ſed veterno quodam preſsi,torpeſcunt. Mala ſoporē afferūt olfactu,& etiā ſi mandātur: item expreſſis ex eis ſuccus : nimio tamen odore percuſsi , obmuteſcunt.

Semen

καθ' ἑαυτὸν δὲ ἴσον ἡμιώβολον προστεθεὶς, ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα ἄγει, δακτυλίῳ τε ἀντὶ βαλάνου ἐπιτεθεὶς ὕπνον ποιεῖ. μαλάσσειν δὲ καὶ ἐλέφαντα λέγεται ἡ ῥίζα συνεψομένη αὐτῷ ἐπὶ ὥρας ς'. καὶ εὔπλαστον αὐτὸν εἰς ὃ ἄν τις βουληθῇ σχῆμα παρασκευάζει. τὰ δὲ φύλλα πρόσφατα ἁρμόζει πρός τε ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, καὶ τὰς ἐπὶ τῶν ἑλκῶν μετ' ἀλφίτου καταπλασσόμενα. διαφορεῖ δὲ καὶ πάσαν σκληρίαν καὶ ἀποστήματα, χοιράδας, φύματα παρατριβόμενά τε ἡσυχῇ ἐπὶ ἡμέρας ε' ἢ ς'. στίγματα ἄνευ τοῦ ἑλκοῦν ἀφανίζει. ταριχευθέντα δὲ τὰ φύλλα, ἀποτίθεται πρὸς τὰς αὐτὰς χρείας. ἡ δὲ ῥίζα σὺν ὄξει λεία, ἐρυσιπέλατα ἰᾶται· πρὸς δὲ ἑρπετῶν πληγὰς, σὺν μέλιτι ἢ ἐλαίῳ· σὺν ὕδατι δὲ χοιράδας καὶ φύματα διαχεῖ· καὶ ἄρθρων πόνους παύει μετὰ ἀλφίτων. σκευάζεται δὲ καὶ δίχα ἑψήσεως οἶνος ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς ῥίζης. δεῖ δὲ ἐμβάλλειν μνᾶς γ'. εἰς μετρητὴν οἴνου γλυκέος, διδόναι τε ἐξ αὐτοῦ κυάθους γ'. τοῖς μέλλουσι τέμνεσθαι ἢ καίεσθαι ὡς προείρηται, οὐ γὰρ ἀντιλαμβάνονται τοῦ ἀλγήματος διὰ τὸ καταφέρεσθαι. τὰ δὲ μῆλα ὀσφραινόμενα καὶ ἐσθιόμενα καρωτικά· καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν χυλός· πλεονασθέντα δὲ καὶ ἀφώνους ποιεῖ.

τὸ δὲ

τὸ δὲ σπέρμα τῶν μήλων ποθὲν, ὑστέραν καθαίρει· προστεθὲν δὲ μετ' ἀπύρου θείου ῥοῦν ἵστησιν ἐρυθρόν. ὀπίζεται δὲ περιχαραττομένης τῆς ῥίζης πολυειδῶς, καὶ τοῦ συῤῥέοντος εἰς τὴν κοιλότητα συλλεγομένου. ἔστι δὲ ἐνεργέστερος τοῦ ὀποῦ ὁ χυλός· οὐκ ἐν παντὶ δὲ τόπῳ φέρουσιν ὀπὸν αἱ ῥίζαι, ὑποδείκνυσι δὲ τὸ τοιοῦτον ἡ πεῖρα. Ἱστοροῦσι δὲ καὶ ἑτέραν μώριον λεγομένην, φυομένην ἐν παλισκίοις καὶ περὶ τὰ ἄντρα· φύλλα ἔχουσαν ὅμοια τῷ λευκῷ μανδραγόρᾳ. μικρότερα δὲ ὡς σπιθαμιαῖα, λευκά, κύκλῳ περὶ τὴν ῥίζαν, οὖσαν ἁπαλὴν καὶ λευκὴν, μικρῷ μείζονα σπιθαμῆς πάχος δακτύλου μεγάλου. ἣν φασὶ πινομένην ὅσον < α. ἢ μετὰ ἀλφίτων ἐσθιομένην ἐν μάζῃ ἢ ὄψῳ, ἀπομωροῦν. καθεύδει γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἐν ᾧ περ ἂν φάγοι σχήματι, αἰσθανόμενος οὐδενὸς ἐπὶ ὥρας γ΄. ἢ δ΄. ἀφ' οὗ περ ἂν προσενέγκηται. χρῶνται δὲ καὶ ταύτῃ οἱ ἰατροὶ ὅταν τέμνειν ἢ καίειν μέλλωσι. φασὶ δὲ καὶ ἀντίδοτον εἶναι τὴν ῥίζαν πινομένην μετὰ στρύχνου τοῦ καλουμένου μανικοῦ.

Περὶ Ἀκονίτου. Κεφ. οζ΄.

Ἀκόνιτον, οἱ δὲ, παρδαλιαγχὲς, οἱ δὲ, κάμμορον, οἱ δὲ, θηλύφονον, οἱ δὲ, μυοκτόνον* θηροφόνον.

φύλλα

Semen malorum potum vuluas purgat: appoſitúmq; cum ſulphure ignem non experto, rubra fœminarum profluuia ſiſtit. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lachryma, cauo vaſe recipitur. Liquamentum autem ſucco lacteo præſtãtius eſt: ſed non vbique, vt experientia docet, radices lacteum ſuccũ delachrymant. Alium tradũt eſſe mãdragorã, nomine morion, in opacis iuxta ſpecꝰ enatum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambiẽtibꝰ: quæ mollis eſt & cãdida, paulò maior palmo, pollicéq; craſsitudine æquat. Tradũt eam in pane, offa, obſonióve, drachmæ pódere deuoratam, vſum rationis intercipere. Obdormiſcit enim homo, eo ferè quo comederit habitu ſenſus impos, ternis quaternísve, ex quo data eſt, horis. Hac medici vtũtur, cũ ſcindẽdi vrẽdiq; neceſsitas adeſt. Antidotũ eſſe volunt radicẽ, cum manico ſolano potam.

Aconitum. Cap. LXXVII.

ACONITVM, aliqui pardalianches, alij cammoron, alij theliphonon, alij myoctonon, alij theriophonon vocãt:

folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta: caulem palmo altũ: radix scorpij caudam emulatur, & alabastri modo splendet. Torpescunt, vt fama est, scorpiones admota radice, stupétq; qui rursum hellebori cõtactu excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur: Enecat panthe ras, sues, lupos & feras omneis in carnibus obiectum.

Aconitũ alterũ. Ca. LXXVIII.

Est & alterũ aconitũ, qđ aliq cynoctonon, alij lycoctonon appellãt. Huius genera sũt tria: vnũ, quo vtũtur venatores: alia duo in vsum suũ vertêre medici. è quib⁹ tertiũ qđ Põticũ nominaſ, plurimũ in Italia, mõtibus Iustinis exilit, à priore distãs, qm̃ folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, lõgiora, & multò nigriora: caulẽ ficilis pediculo similẽ, nudũ, cubitali altitudine, aut ampliorẽ: semẽ in siliqs oblõgis recõdit: radices in modũ squillæ marinæ cirrorũ nigrescũt. Quib⁹ ad venationem luporũ vtũtur, insertæ siquidẽ crudis carnibus, & deuoratæ, lupos enecant.

Cicuta. Cap. LXXIX.

Cicuta caulẽ ædit geniculatũ, vt

φύλλα ἔχει πέντε ἢ τέσσαρα, ὅμοια κυκλαμίνῳ ἢ συκίῳ, μικρότερα δὲ καὶ ὑποτράχηλα· καυλὸς ὃ ἀπὸ ταυτῶν· ῥίζα ὁμοία σκορπίου οὐρᾷ, σίλλουσα ἀλαβαστροειδῶς. Τούτῳ δὲ ῥίζαν φασὶ θερμανθεῖσαν σκορπίῳ, παραλύειν αὐτόν· διεγείρεσθαι δὲ πάλιν ἐλλεβόρου θιγόντος. μίγνυται δὲ καὶ ὀφθαλμικαῖς ἀναδιώσεσι δυνάμεσι. κτείνει δὲ καὶ παρδάλεις καὶ σῦς καὶ λύκους καὶ πᾶν θηρίον κρεαφάγοις ἐντιθέμενον καὶ παραβαλλόμενον.

Περὶ Ετέρου ἀκονίτου.

Κεφ. οὐ.

ΑΚΟΝΙΤΟΝ ἕτερον, ὃ ἔνιοι κυνοκτόνον, οἱ δὲ λυκοκτόνον καλοῦσι. γίνεται μὲν πλεῖστον ἐν Ἰταλίᾳ, ἐν τοῖς καλουμένοις Ἰουστίνοις ὄρεσι διαφέρειν τοῦ πρὸ αὐτοῦ· φύλλα δὲ ἔχει ὅμοια τοῖς τοῦ πλατάνου, μᾶλλον δὲ ἐπιχρισμένα καὶ μακρότερα, πολλῷ καὶ μελανότερα· καυλὸν δὲ καθάπερ πήχεως, μόχθον ψιλόν, ὕψος πήχεως, ἢ καὶ μείζονα· καρπὸν δὲ ἐν λοβοῖς ὀπωρινοῖς ποώδεις· ῥίζας ὥσπερ πλεκτάνας καρίδων μελαίνας· αἷς χρῶνται πρὸς τοὺς τῶν λύκων θηρᾶς, ἐντιθέντες κρέασιν ὠμοῖς. βρωθεῖσα γὰρ ὑπὸ τῶν λύκων, ἀναιρεῖ αὐτούς.

Περὶ Κωνείου. Κεφ. οϛ.

Κώνειον καυλὸν ἀγίνει γονατώδη

ὃς

ὡς μάραθρον, μέγαν, φύλλα δὲ ναρθηκι ἐμφερῆ, στενώτερα δὲ καὶ βαρύοσμα· ἐπ' ἄκρων δὲ ἀποφύσεις καὶ σκιάδια· ἄνθος ὑπόλευκον· σπέρμα ἐμφερὲς ἀνίσῳ, λευκότερον· ῥίζα κοίλη καὶ οὐ βαθεῖα. Ἐστι δὲ καὶ αὐτὸ τῶν φθαρτικῶν, κατὰ ψύξιν αὐαρῶν. βοηθεῖται δὲ ἀκράτῳ. χυλίζονται δὲ τὰ ἄκρα περὶ τοῦ ξηραινθῆναι τὸ σπέρμα, ἢ ἡ κόμη, καὶ ἐκθλίβεται κοπτομένη, καὶ συγκέφετται ἐν ἡλίῳ. ἔστι δὲ πολύχρηστον εἰς τὴν ὑγιαστικὴν χρῆσιν ξηραινθέν· μιγνύμενον ἐπιτηδείως τοῖς αὐωδιώδεσι κολλυρίοις τὸ χύλισμα· ἕρπητάς τε καὶ ἐρυσιπέλατα καταπλαθὲν σβέννυσιν. ἡ δὲ πόα καὶ ἡ κόμη λεία καταπλαττομένη τῶν δι' ὑδρώπων βοηθεῖ· παύει δὲ καὶ αἰδοῖα καταπλαθέντα. καὶ γάλα σβέννυσι, μαστούς τε ἐν παρθενίᾳ κωλύει αὔξεσθαι, καὶ δι' ὑδρώπων ἀτόφους ποιεῖ ὑπὸ παιδίων. ἐνεργέστατον δέ ἐστι τὸ κριτικὸν καὶ μελαινικὸν καὶ τὸ ἀπικόν, καὶ τὸ ἐν τῇ χίῳ καὶ κιλικίᾳ γινόμενον.

vt fœniculi grãdé, folia ferulæ, angustiora, graui odoratu: rami, mox vmbellę in summo prodeũt: flores quoq; albicãtes: & semẽ aniso cãdidius: radice nõ alta, cõcaua. Cicutæ letale venenũ ineſt, suáq; vi refrigerato ria necat. Remedio eſt vini meraculi potus. Succ⁹ exprimitur cõtusis cacuminibus, priusquã semina & comę ſicceſcãt, q̃ ſole dẽſatur in paſtillos. Mult⁹ ad medendi rationẽ vſus eſt aridi: cõmodè miſcẽt collyriis, q̃ leuãdi doloris gratia tẽperãtur: ignes ſacros, & vlcera quæ ſerpũt, illitu reſtinguit. Herba cũ coma trita, & teſtib⁹ circũlita, libidinũ imaginationes in ſomno, cõpeſcit: ſed genitale reſoluit. lac puerperarũ mãmis appoſita extinguit: in virginitate mãmas coërcet, & increſcere nõ patit: pueris pręſtat, vt eorũ teſticuli cibũ nõ ſentiẽtes, intabeſcãt. Efficaciſsima vis Creticæ, Megarẽſi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia naſcenti.

Περὶ Σμύλακος.

Κεφ. ϙ'.

Σμύλαξ, οἱ δὲ Σύμαλον, ῥωμαῖοι δὲ τέρμινθον καλοῦσι, δένδρον ἐστὶ παραπλήσιον φύτῃ τοῖς φύλλοις καὶ μεγέθει, ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐν ναρβωνίᾳ τῇ κατὰ τὴν ἱσπανίαν φυόμενον.

Taxum. Cap. LXXX.

SMILAX à Græcis, taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiuſdem figura, in Italia & Narbonenſi Gallia Hiſpanię contermina naſcens.

Auicu-

Auiculæ quæ Italicæ taxi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdẽ homines, alui profluuio corripiũtur. Narbonæ tam præsentis est veneni, vt si qui dormiãt sub ea, aut eius vmbra subsideant lædantur, & sæpenumero moriantur: quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus.

Apocynum. Cap. LXXXI.

Apocynon, siue cynocrãbe, brassica canina, frutex est longis viticulis cõstans, malè olẽtibus, lẽtis, vitiliumq; modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederę, molliore tamẽ, & per extremũ acutiore, lẽto, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ, ceu fabarũ, folliculari specie, digiti longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Neriũ, seu rhododendrũ. Cap. LXXXII.

Nerion aliqui rhododaphnen, alij rhododendron vocãt, frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quàm amygdala foliis, crassioribúsque. flore in rosam conformato: fructu nuci græcæ

τοῦ δὲ ἐν Ἰταλίᾳ γινομένου τὸν καρπὸν ὀρνίθια ἐσθίοντα, μελαίνεται· οἱ δὲ προσενεγκάμενοι, διαῤῥοίαις περιπίπτουσι. τὸ δὲ ἐν τῇ Ναρβωνίᾳ, τοσαύτης δυνάμεως μετέχει, ὡς καὶ ἐκ τῆς σκιᾶς τοὺς ὑποκαθίσαντας ἢ κοιμηθέντας βλάπτεσθαι, πολλάκις δὲ καὶ θνήσκειν. ἱστορεῖται δὲ περὶ αὐτῆς χάριν τοῦ προφυλάττεσθαι.

Περὶ Ἀποκύνου. Κεφ. πά.

Ἀπόκυνον, οἱ δὲ, κύναγχον, οἱ δὲ, παρδαλιαγχὲς, * οἱ δὲ κυνόμορον, οἱ δὲ κυνοκράμβην καλοῦσι, ἔρνος ἐστὶ ῥάβδοις ἔχον μακρὰς, λυγώδεις, δυσραύστους, φύλλα κισσῷ ὅμοια, μαλακώτερα δὲ καὶ ὀξύτερα κατ' ἄκρον, βαρύοσμα, ὑπόγλισχρα, ὀποῦ μεστὰ μηλίνου· καρπὸς δὲ ὡσεὶ λοβὸς κυάμων περὶ δακτύλου τὸ μῆκος, θυλακώδης· ἐφ' ὧν σπερμάτια, σκληρὰ, σμικρὰ, μέλανα. ταύτης τὰ φύλλα σὺν στέατι ἀρτοποιηθέντα καὶ παραβληθέντα, κτείνει κύνας, λύκους, ἀλώπεκας, παρδάλεις· παραχρῆμα δὲ παραλύει αὐτῶν τὰ ἰσχία.

Περὶ Νηρίου. Κεφ. πβ΄.

Νήριον, οἱ δὲ, ῥοδοδάφνη, οἱ δὲ, ῥοδόδενδρον, θάμνος γνώριμος, ἀμυγδαλῆς μακρότερα καὶ παχύτερα ἔχων φύλλα. τὸ δὲ ἄνθος ῥοδοειδές· καρπὸν δὲ ἐμφερῆ ἀμυγδάλαις,

μυγδάλω, ὡς κέρατι ἀνεωγυίαν, πλήρη ἐερώδους φύσεως, ὅμοιον τοῖς ὑακινθίνοις πάπποις· ῥίζα δὲ ἄπεξυς καὶ μακρὰ, ξυλώδης, λευκαυγὴς ἁλμυρά. φύεται δὲ παραθαλασσίοις καὶ παραθαλαττίοις τόποις καὶ παρὰ ποταμοῖς. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ ἄνθος καὶ τὸ φύλλα, κυσὶν δὲ καὶ ὄνοις καὶ ἡμιόνοις καὶ τῶν πλείστων τετραπόδων δὲ ζώων φθαρτικόν· ἀνθρώποις σωτηρικὴν σὺν οἴνῳ πινόμενα πρὸς δήγματα θηρίων· καὶ μᾶλλον εἰ πηγάνῳ παραμίξειας· τὰ δὲ ἀδενέστερα τῶν ζώων ὡς αἶγες καὶ πρόβατα, ἐπὴν τὸ ἀπόβρεγμα αὐτῶν πίῃ, ἀποθνήσκει.

grææ ſimili, corniculato, qui patefactus quandam lanoſam naturam oſtendit, ſpinarum pappos repræſentantem, radice longa, acuta, lignoſa, guſtanti falſa: naſcitur in amœnis, maritimis, & ſecus amnes. Flores & folia mulis, canibus, aſinis, & quadrupedum plurimis venena ſunt: hominibus verò contra ſerpentium morſus præſidia, è vino pota: eo magis ruta addita: imbecillæ etiam animantes, vt pecus & capræ, ſi aquam bibant, in qua folia ea maduerint moriũtur.

Περὶ μυκήτων.

Κεφ. πγ'.

Μυκήτων διαφοραὶ δύο· ἢ γὰρ βρώσιμοί εἰσιν, ἢ φθαρτικοί. παρὰ πολλὰς δὲ αἰτίας γίνονται τοιοῦτοι, ἢ γὰρ ἥλοις καπνωθέντες, ἢ ῥάκεσι σεσηπόσιν, ἢ ἑρπετῶν φωλεοῖς παραφύονται, ἢ δένδρεσιν ἰδίως βλαστικοὺς φέρουσι τοὺς καρπούς· ἔχουσι δὲ καὶ γλοιώδη οἱ τοιοῦτοι ὑπόπαχον· καταστέλλοντες δὲ μετὰ τὸ ἀφαιρεθῆναι, ταχέως διαφθείρονται σηπόμενοι. οἱ δὲ μὴ τοιοῦτοι ζωωφελεῖς, ἡδεῖς· ὀλεθρεύουσι γάρ τοι καὶ οὗτοι βλάπτοντες δυσπεπούμενοι, πυρέττοντες ἢ χολέραν ἐπάγοντες.

Fungi. Cap. LXXXIII.

Fungorũ differentia duplex: aut enim mãduntur, aut perniciales ſunt. Multis de cauſis venenoſi gignũtur, vbi videlicet clauus ferreꝰ, in quo ſit rubigo, aut pãni marcor adfuerit, aut ſi iuxta ſerpẽtis cauernã, arboréſve, quę priuatim pariũt noxios fructus, erumpãt. Continẽt qui tales ſunt, neſcio quod ſtrigmẽtũ concretámq; pituitã, terrámque eruti, quam celerrimè cõputreſcunt, atq; marcore vitiãtur. Sed qui veneno imbuti nõ ſunt, ſuauẽ in iuribus gratiã habẽt: largius tamẽ ſumpti nocẽt, & ægrius conco ſti ſtrangulãt, aut choleram morbum citant.

Reme-

Remedio eſt nitri pot', aut lixiuiú cú acida muria, aut feruefactę ſatureiæ, aut origani iuſculú: debellátur etiã gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiuſdem delinctu cũ melle multo. Corpus alunt, ſed ægrè diſſoluũtur: cũ magna ex parte integri ipſi, cum recremẽtis alui reiiciãtur.

βοηθοῦνται δὲ πάντες πεπιζόμενοι νίτρῳ ἢ κονίσι, μετὰ ἐξάλμης, ἢ ὑμενέρασι ἀπεζέματι, ἢ ὀρνιθείῳ κόπρῳ μετ' ὄξους πινόμενοι, ἢ μέλιτι ἀναλειχόμενοι πολλῷ. πέφυκε δὲ εἶναι καὶ δυσδιάλυτοι· ὁλοχερεῖς δὲ ὡς ἔπιτο πελὺ σὺν τοῖς ἀκαθάρτοις ἀποδίδονται.

Colchicũ. Cap. LXXXIIII.

Colchicon, aliqui ephemeron, ſunt qui agreſtẽ bulbũ vocant, autumni exitu floré ædit croci, candicantem, ab eo tempore, folia bulbi, ſed pinguiora: caulé palmo altum, ferétem rufum ſemen: radicem foris è nigra rufeſcẽtem, quæ delibrata, cãdida & mollis ſpectatur, lacteo ſucco madet, atque guſtatu dulcis inuenitur: bulbus eius mediam habet rimam, fiſſurámque, qua flos erũpit: plurimum in Meſſenia, & Colchis enaſcitur. Ea comeſa, fungorum more, ſtrangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquã imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modũ ſaporis voluptate imperitos allicit. Remedio ſunt eadem quæ fungis: bubulum etiam lac potũ auxiliatur. itaque cum adfuerit, nõ aliud deſideratur auxilium.

Περὶ Κολχικοῦ. Κεφ. πδ'.

Κολχικὸν, οἱ δὲ, ἐφήμερον, οἱ δὲ βολβὸν ἄγριον, λήγοντος τοῦ φθινοπώρου ἀνίσιον αὔξος ἰσάπαλευκον, ὅμοιον κρόκου αὔξει· ὕστερον δὲ τὰ φύλλα φέρει βολβῷ παραπλήσια, λιπαρώτερα· καυλὸν σπιθαμιαῖον, καρπὸν ἔχοντα πυρρόν· ῥίζαν φλοιὸν ἔχουσαν ἔγκιρρον ἐν τῷ μέλανι, ἣ τις λεπτομυὴς λευκὴ καὶ ἁπαλὴ καὶ ὀπτοῦ μισὴ εὑρίσκεται καὶ γλυκεῖα· ἔχει δὲ ὁ βολβὸς διάφισιν μέσην καθ' ὃ τὸ αὔξος ἀφίησι· γλυφᾶται δὲ πλεῖστον ἐν τῇ μεσηνίᾳ καὶ κόλχισι. βρωθεῖσα δὲ κτείνει κατὰ τὸν σπυγμὸν ὁμοίως μύκησι. Ἀνεχάλαμβον δὲ αὐτὸν ἵνα μὴ λάθῃ βρωθεῖσα αὐτὶ βολβοῦ· παραδέξεως γάρ ὅτιν ἐπακτικὴ διὰ τὸν ἥδονὴν τοῖς ἀπείροις. βοηθεῖ δὲ τοῖς φαγροῦσιν ὅσα καὶ τοῖς μύκησι φαγροῦσι. καὶ γάλα βόειον πινόμενον· ὥς τε ὅταν παρῇ τοῦτο, μηδενὸς ἄλλου δεῖσθαι βοηθήματος.

Ephe-

Περὶ Ἐφη-

Περὶ Ἐφημέρου. Κεφ. πε'.

Ἐφήμερον, οἱ δὲ, ἶριν ἀγρίαν, φύλλα καὶ καυλὸν ὅμοια ἔχει κρίνῳ, λεπτότερα δὲ· ἄνθη λευκὰ, πικρά· καρπὸν δὲ μαλακόν· ῥίζα δὲ ὕπεστι δακτύλου πάχος μία,* μακρὰ, συπτικὴ, εὐώδης· φύεται ἐν δρυμοῖς καὶ παλισκίοις. Τούτου ἡ μὲν ῥίζα ὀδονταλγίας ἐστὶ φάρμακον διακλυζομένη. τὰ δὲ φύλλα ἐν οἴνῳ ἑψηθέντα καὶ καταπλασθέντα οἰδήματα καὶ φύματα διαφορεῖ, μήπω ὑγρὸν ἔχοντα.

Περὶ Ἑλξίνης. Κεφ. πς'.

Ἑλξίνη, οἱ δὲ, παρθένιον, οἱ δὲ, σιδηρῖτιν, οἱ δὲ, ἡράκλειαν, οἱ δὲ, ἀσυρίαν, οἱ δὲ, ὑγιεινὴν ἀγρίαν, οἱ δὲ, κλιβάδιον, οἱ δὲ, πολυώνυμον καλοῦσι· φύεται ἐπὶ θριγγοῖς καὶ τοίχοις· καυλία δὲ ἔχει λεπτὰ ὑπέρυθρα· φύλλα ὅμοια λινοζώστει, δασέα· περὶ δὲ τοὺς καυλοὺς οἱονεὶ σπερμάτια τραχέα, ἀντιλαμβανόμενα τῶν ἱματίων. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ψυκτικὴν, συπτικήν· ὅθεν καταπλασσόμενα ἰᾶται ἐρυσιπέλατα, κονδυλώματα, κατακαύματα, φύγεθλα ἀρχόμενα, καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν καὶ οἰδήματα· ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς μιγεὶς ψιμμυθίῳ, ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας ὠφελεῖ καταχριόμενος, καὶ ποδάγρας σὺν κηρωτῇ κυπρίᾳ ἀναληφθεὶς ἢ τραγείῳ στέατι, ὠφελεῖ καὶ βήττοντας χρονίως ὁ χυλὸς καταῤῥοφούμενος ὅσον κύαθος, καὶ

Ephemerũ. Cap. LXXXV.

Ephemeron, aliqui syluestrẽ irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem vnam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam: nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluãtur. Folia in vino cocta, discutiũt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est, muralis herba. Cap. LXXXVI.

Helxine nascitur in parietinis, sepibus, vineis & segetibus: folia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos veluti semina aspera, adhærentia vestibus. Folia refrigandi spissandíque naturam habent, qua ex causa sanant illitu sacros ignes, adusta condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationésque. Succus eius cum cerussa, ignibus sacris, & vlceribus quæ serpunt, commodè illinitur, imponitúrque podagris cum hircino adipe aut cerato cyprino: veterem tussim emendat instar cyathi haustus: tonsil-

tonsillis inflammationē sentiētibus vtiliter & gargarizatur,& oblinitur: auriū dolorem cum rosaceo instillatus leuat.

Alcine. Cap. LXXXVII.

Alsinen,aliqui anthillion,nōnulli myos ota vocant,quoniā musculorū aures folia imitantur. Lucis opacisq, gaudet,vnde alsine dicta est.Hęc erat eadē quæ helxine, nisi humilior esset,& foliis minoribꝰ,nec hirsuta. cū teritur odorē cucumis reddit. Vim refrigerādi,astringēdiq; obtinet:oculorū inflammationibus cū poléta illinitur. Succus auriū doloribus infunditur: quin & emēdat oīa quæ helxine,id est,muralis herba.

Lens paluſtris.

Cap. LXXXVIII.

Lens paluſtris, inuenitur in aqua non fluente, muſcus lenticulæ ſimilis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus,igni ſacro, & podagris, illinitur per ſe, & cum polenta: glutinat, & procidentia puerorum interanea.

Semperuiuum magnū,ſeu ſedū. Cap. LXXXIX.

Semperuiuū magnū ideo nominatur, quoniā perpetuò folia vireant: cuius caules cubiti alti-

ϰὴ παριεθμίοις φλεγμαίνουσιν ἀναγαργαρίσμα ϰὴ διάχρισμα ὠφέλιμόν ἐστι· καὶ ὠταλγίαν σὺν ῥοδίνῳ ἐγχεόμενον ὠφελεῖ.

Περὶ Αλσίνης. Κεφ. πζ'.

Αλσίνη,οἱ δὲ,μυὸς ὦτα, ἀπὸ τοῦ ἔχειν φύλλα ὅμοια μυὸς ὠτίοις. ἀλσίνη δὲ, διὰ τὸ σκιεροὶς ϰὴ ἀλσώδεις φιλεῖν τόποις..πόα ἐστὶν ὁμοία ἑλξίνῃ, ταπεινοτέρα δὲ καὶ μακροφυλλοτέρᾳ. καὶ οὐ δασεῖα. διατεφθεῖσά τε, συκίνῳ ὄζει. Δώσιμον δὲ ἔχει ψυκτικὸν. συσπαστικὸν· ἀρμόζουσαν πρὸς φλεγμονὰς ὀφθαλμῶν, μετὰ ἀλφίτων καταπλασσομένη καὶ πρὸς ὤτων πόνον ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνσταζόμενος. καὶ καθόλου δύναται τὰ αὐτὰ τῇ ἑλξίνῃ.

Περὶ φακοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ τελμάτων. Κεφ. πή.

Φακὸς ὁ ἐπὶ τοῦ τελμάτων, εὑρίσκεται ἐπὶ τῶν στασίμων ὑδάτων, βρύον ὃν ὅμοιον φακῷ, ψύχων τῇ δυνάμει. πάσαις φλεγμοναῖς ϰὴ ἐρισιπέλασι ϰὴ ποδάγραις ἀρμόζει καταπλασσόμενος, καθ' ἑαυτόν τε ϰὴ σὺν ἀλφίτῳ· παρεγκολλᾶται δὲ καὶ ἐντερομήλαις ταῖς ἐπὶ πούδῳ.

Περὶ Μειζόνου τοῦ μεγάλου. Κεφ. πθ'.

Μείζονον τὸ μέγα ὀνόμασται διὰ τὸ ἀειθαλὲς τῶν φύλλων· ϰαυλοὺς δ' ἀνίησι πηχυαίους, ἢ ϰὴ μείζο-

μείζονας, πάχος δακτύλου μεγάλου, λιπαρούς, εὐθαλεῖς, ἐντομὰς ἔχοντας ὥσπερ τῶ χαρακίνῳ πηθυμάλλου· φύλλα λιπαρά, μέγεθος δακτύλου μεγάλου, * γλωσσοειδῆ κατὰ τὸ ἄκρον, καὶ τὰ μὲν κατωτέρω τῶν φύλλων ὑπτιούμενα, τὰ δὲ κατ' ἄλλα κύκλον ἐφθαλμοειδῆ περιέχοντα· φύεται δὲ ἐν τόποις ὀρεινοῖς καὶ ὀχθώδεσιν. ἔνιοι δὲ φυτεύουσιν αὐτὸ ἐπὶ τῶν οἰκημάτων. Δύναμιν δὲ ἔχει ψυκτικὴν, σύφουσαν, πεπτικὴν πρὸς ἐρυσιπέλατα, ἕρπητας, νομὰς, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, πυρίκαυτα, ποδάγρας, καταπλάττεται τὰ φύλλα καθ' ἑαυτὰ καὶ μετὰ ἀλφίτων. ὁ δὲ χυλὸς πρὸς κεφαλαλγίας μετὰ ἀλφίτου καὶ ῥοδίνου ἐμβρέχεται· καὶ φλαγμοδύκτοις ἐν ποτῷ δίδοται, καὶ διαῤῥοιζομένοις, καὶ δυσεντερικοῖς, τραγύλας τὰ ἕλμινθας ἐκπιάσει σὺν οἴνῳ πεπεισμένος· ἴσχει καὶ ῥοῦν γυναικεῖον ἐν πρόσθετῳ. ἐγχρίεται δὲ ὁ χυλὸς καὶ ἐπὶ τῶν ὀφθαλμιώντων ὠφελίμως ἀπὸ αἵματος.

altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, virentes, characiæ tithymali modo insecti: folia pinguia, carnosa, magnitudine pollicari, in cacumine linguæ similia alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita vt ambitu effigiem imitentur oculi: nascitur in montibus, & testaceis: supra domicilia etiam feritur. Eius vis refrigerare, & adstringere: medentur igni sacro, nomis, vlceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluique profluuia: teretes tineas potus in vino excutit: subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit: succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptis: inungitur.

Περὶ Ἀειζώου τοῦ μικροῦ.

Κεφ. ϟ'.

Ἀείζωον τὸ μικρὸν φύεται ἐν τοίχοις καὶ πέτραις, καὶ θρυγοῖς καὶ τάφροις ὑποσκίοις, χωλία ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πολλὰ, λεπτὰ, πρὸς-

Semperuiuum paruum.

Cap. XC.

Semperuiuũ paruũ in petris, parietinis, & maceriis, nec non scrobib⁹ opacis nascit, caulibus ab vna radice multis, tenuibus, crebro

crebro foliatis: exilibus foliis, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto vmbellam herbidósque flores, & tenues gerente. Folia eisdem cum priore viribus prædita sunt.

περίπλεα φυλλαρίων περιφερῶν λιπαρῶν, μικρῶν, ὀξέων ἐπ' ἄκρῳ· ἀνίησι δὲ καὶ καυλὸν ἐν μέσῳ περὶ σπιθαμὴν τὸ μέγεθος, ἔχοντα σκιάδιον καὶ ἄνθη λεπτὰ καὶ χλωρά. τούτου τὰ φύλλα δύναμιν ἔχει τὴν αὐτὴν τῷ προειρημένῳ.

Semperuiuum tertium. Cap. XCI.

Περὶ Ἀειζώου τρίτου. Κεφ. ϛα.

Tertium videtur semperuiui genus, quá aliqui andrachnen agriam, aut telephion vocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassioribúsq; foliis, hirsutis, portulacæ proximis: nascitur in saxis. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: illita cum axungia strumas discutit.

Δοκεῖ δὲ εἶναι καὶ τρίτον εἶδος ἀειζώου, ὃ ἔνιοι ἀνδράχνην ἀγρίαν ἢ τηλέφιον ἐκάλεσαν, ῥωμαῖοι δὲ ἰλλέκεβραν· ἔχει δὲ αὕτη παχύτερα τὰ φυλλάρια πρὸς τὰ τῆς ἀνδράχνης καὶ δασέα. φύεται ἐν πέτραις. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, δριμεῖαν, ἑλκωτικήν· χοιράδων διαφορητικὴν σὺν ὀξυγγίῳ καταπλασθέν.

Vmbilicus Veneris. Cap. XCII.

Περὶ Κοτυληδόνος. Κεφ. ϛβ'.

Cotyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, ineuidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum vino circumlitus, instillatúsve, contecta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesa, calculos frangunt, vrinam cient, hydropi-

Κοτυληδὼν, οἱ δὲ, σκυτάλιον, οἱ δὲ, κυμβάλιον, φύλλον ἔχει ὥσπερ ὀξύβαφον, περιφερὲς, λεληθότως κοῖλον· καυλίον δὲ ἐν μέσῳ βραχὺ, ἐν ᾧ τὸ σπέρμα· ῥίζαν ὡς ἐλαίαν στρογγύλην.

Ταύτης καὶ τῶν φύλλων ὁ χυλὸς μετ' οἴνου περιχριόμενος, ἢ ἐγκλυζόμενος, φύμοις τοῖς ἐν αἰδοίοις χαλᾷ· φλεγμονάς τε καὶ ἐρυσιπέλατα καὶ χιμέτλας καὶ χοιράδας καταπλαττομένη ὠφελεῖ, καὶ στόμαχον καυσούμενον. ἐσθιόμενα δὲ τὰ φύλλα σὺν τῇ ῥίζῃ λίθους θρύπτει, καὶ οὖρα κινεῖ· καὶ ὑδρω-

ἡ ὑδροπικοῖς σὺν οἰνομέλιτι δίδοῦ). χρῶνται δὲ αὐτῇ καὶ εἰς τὰ φίλτρα.

Περὶ Ετέρας κοτυληδόνος.

Κεφ. ργ'.

Εστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος κοτυληδόνος, φλαυότερα ἔχον καὶ λιπαρὰ φύλλα ὡς γλωτλάρια, πυκνὰ περὶ πολὺ ῥίζαν, οἱονεὶ ὀφθαλμὸν ἕνα μέσον περιεχόμενα ὡς ἂν τὸ μεῖζον ἀείζωον, τῇ γεύσει σύφοντα· χαυλίον λεπτὸν, καὶ ἐπ' αὐτῷ αὖθις καὶ σπέρματα ὅμοια ὑπερικῷ· ῥίζαν δὲ μείζονα. ποιεῖ δὲ ταῦτὸ ἃ καὶ τὸ ἀείζωον.

Περὶ Ακαλήφης. Κεφ. ρδ'.

Ακαλήφη, οἱ μέν, κνίδην, διοσκ. εἶδος ἐστιν αὐτῆς, ἣ μὴ, γάρ ἐστιν ἀγελαία τέρα, βαρυτέρα καὶ πλατυτέρα καὶ μελανωτέρα τοῖς φύλλοις· καρπὸν δὲ ὅμοιον λαπαθίῳ ἔχει, πολὺ ἐλάττονα. Η δὲ ἑτέρα λεπτόσπερμος ἡ καὶ οὐχ ὁμοίως βαρεῖα. Αμφοτέρων δὲ τὰ φύλλα καταπλασθέντα μετ' ἀλῶν, κυνόδηκτα ἰᾶται καὶ γαγγραινικὰ, καὶ τὰ κακοήθη καὶ καρκινώδη, καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν καὶ τρέμματα, φύματα, παρωτίδας, φύγεθλα, ἀποσήματα πολυνικρὶς δὲ μετὰ κηρωτῆς ἐπιτίθεται· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ταῖς ὠμοκτήρων αἱμορραγίας τὰ φύλλα σὺν τῷ χυλῷ λεῖα ἐπιτιθέμενα· κινεῖ δὲ καὶ ἔμμηνα, λεῖα μετὰ σμύρνης ἐπιτιθέμενα, καὶ ὑστέρας προπίπτοντας ἀποκαθίστησι παρὰ τὰ φύλλα θερμαπτόμενα. τὸ δὲ

dropicis ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria.

Vmbilicus Veneris alter.

Cap. XCIII.

Est & alterum genus eiusdē, cymbalion aliqui vocant, pinguibus foliis, latioribus, ligularum modo densis circa radicē, medium oculi ambitum describētibus, vt in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuiuum.

Vrtica. Cap. XCIIII.

Duo vrticæ genera: syluestris, asperior, latioribus, nigrioribusque foliis: semine lini, sed minore. Altera non æquè aspera, minuto semine. Folia vtriusque illita, canis morsibus, addito sale medentur: gangrænas, carcinomata, sordida vlcera, & quæ cacoēthe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationésque sanant· lienosis cum cerato imponuntur: faciūt ad profluuia narium, cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum myrrha, & imposita procidentes vuluas, recentia contactu resilire cogūt:

Semen potum ex passo, venerem stimulat, vuluæ ora patefacit: cum melle delinctum, orthopnœæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, vrinas mouent, inflationes discutiũt: decocta cum ptisana, vitia pectoris extrahunt: mulierũ menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentẽ vuam, gargarizatus succus exprimit.

Galiopsis. Cap. XCV.

Galiopsis, frutex in totum caulem, & folia habet vrticæ, læuiora, & quæ grauem odorem trita reddant: flore purpurascente, tenui: nascitur circa sepes, ædificiorum areas, ac semitas vbique. Folia, caules, semen, succúsque, duritias & carcinomata dissipãt: strumas, panos, & parotidas discutiunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere: ad putrescentia, gangrænas, & nomas cum sale efficaciter illinuntur.

τὸ δὲ σπέρμα ἐπὶ συνοσίαν παρορμᾷ πινόμενον μετ᾽ γλυκέος, καὶ ὑστέραν ἀνασμοῖ· σὺν μέλιτι δὲ ἐγκλειχόμενον ὀρθοπνοίας ὠφελεῖ καὶ πλευρίτιδας καὶ πεπνευμονίας. ἀνάγει δὲ καὶ τὰ ἐν θώρακος· μίγνυται δὲ καὶ σπιλάδας. συνεψηθέντα δὲ τὰ φύλλα κοχλαρίοις ταῖς κοιλίας μαλάττει· λύει ἐμπνευματώσεις. οὖρα κινεῖ. σὺν πτισάνῃ δὲ ἑψηθέντα τὰ ἐν θώρακος ἀνάγει. τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν φύλλων σὺν ὀλίγῃ σμύρνῃ πεθὲν, κινεῖ καταμηνία. ὁ δὲ χυλὸς ἀναγαργαριζόμενος, σέλλει ἰσχιάδα φλεγμαίνουσαν.

Περὶ Γαλεόψεως. Κεφ. ϛέ.

Γαλεόψις, οἱ δὲ, γαλεόδολον, ὅλον τὸ θαμνίον σὺν τῷ καυλῷ καὶ τοῖς φύλλοις ἐμφερὲς ἐστὶ κνίδῃ, λεπτότερα δὲ τὰ φύλλα καὶ ἰκανῶς δυσώδη ἐν τῷ διατείλαι· αὐξηθὲν λεπτὰ τορφυείζοντα· φύεται ἐν φραγμοῖς καὶ παρὰ τὰς ὁδοὺς καὶ οἰκόπεδα παντα χοῦ. Δυνάμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καὶ ὁ χυλὸς καὶ ὁ καυλὸς καὶ ὁ καρπὸς, διαχυτικὴν σκληρωμάτων καὶ καρκινωμάτων, χειρώδων, παρωτίδων, φυγέθλων· δεῖ δὲ μεῖ᾽ ὄξους τ᾽ ἡμέρας καὶ ἐπιπλάσσειν χλιαρὸν ποιοῦντας τὸ κατάπλασμα. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτὸ καταυλεῖ ὠφελίμως· ποιεῖ καὶ πρὸς νομάς. γαγγραίνας καὶ σπιδόνας μεθ᾽ ἁλῶν καταπλασσόμενα.

Περὶ

Περὶ Γαλίου. Κεφ. ϛϛ'.

Γάλλιον, οἱ δὲ, γαλλέειον, οἱ δὲ, γαλάπον· ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ γάλα πηγνύειν αὐτὶ πύας ἁυτό· τὸ δὲ κλωνίον, ᾗ τὸ φύλλον ἔχει ἐμφερέστατον ἀπαρείνῃ, ᾗ ὀρθὸν δὲ ᾗ ἐπ' ἄκρου αὖθος μέλαν, λεπτὸν, πυκνὸν, πολὺ εὔοσμον· Οὗ τὸ αὖθος πρὸς τὰ πυρίκαυτα καταπλάσσεται, καὶ αἱμορραγίας ἴσχει· μίγνυται δὲ καὶ κηρωτῇ ῥοδίνῃ ἡλαιόμελον ἄχρις ἂν λευκὴν χρόνῃται· ᾗ ἔστι τοιοῦτον ἄκορον. ἡ δὲ ῥίζα πρὸς συνουσίαν παρορμᾷ. φύεται δὲ ἐν ἑλώδεσι τόποις.

Περὶ Ηειγέροντος. Κεφ. ϛζ'.

Ηειγέρων καυλίον ἔχει πηχυαῖον, ὑπόξυθρον, σπειρηδὸν ἔχον φυλλάρια, ἀκροχλόη ὥσπερ εὔζωμον, παρόμοιον δὲ ἐλάπονα· αὖθη μηλίζοντα, ταχέως ῥιζόμενα καὶ ἐξανθοῦντα εἰς τοὺς λεγομένους πάππους. ὅθεν καὶ ἠειγέρων ὠνόμασθη, διὰ τὸ ἔαρος τὰ αὖθη πειρωμένους πολιοῦσθαι. ῥίζα ἄχρηστος· φύεται μάλιστα ὑπὸ θριγγοῖς ᾗ περὶ τὰς πόλεις. Δυνάμιν δὲ ἔχει ψυκτικὴν τὰ φύλλα σὺν τοῖς αὖθεσιν· ὅθεν καταπλάσσουσα τὰ φύλλα σὺν ὀλίγῳ οἴνῳ ἢ καὶ καθ' ἑαυτὰ φλεγμονὰς ὄρχεων καὶ σκληρίου θεραπεύει· σὺν δὲ μάννῃ, τά τε ἄλλα τραύματα καὶ τὰ ἐν νεύροις ἰᾶται· ᾗ οἱ

Galion. Cap. XCVI.

Galion, nomen ex eo traxit, quòd in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat: ramulum foliúmque habet aparinæ simillimum, rectum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustis illinitur, sanguinis profluuia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolatum vsque dum albescat: lassitudines reficit. Radix venerem concitat. Nascitur in palustribus.

Senecio. Cap. XCVII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, erucæ modo per extremitates diuisis, sed minoribus multò: luteis floribus, qui celeriter dissecti vanescunt in pappos. Nomen verò sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu, vere canescant. radice superuacua: nascitur maximè in maceriis, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant: quare illita cum vini modico, vel per sese, testium & sedis inflammationes sanant: quin & ex manna thuris medentur, cũ reliquis vulneribus, tum iis quæ nerui acceperunt.

Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præstant: verùm recentes epoti, strangulant. Tus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores à bili contractos, persanat.

Thalictrū. Cap. XCVIII.

Thalictron folia coriādri habet, pinguiora paulò: coliculum rutæ crasitudine, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maximè in cam pestribus.

Marinus muscus.

Cap. XCIX.

Marinus muscus nascitur in scopulis, testaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

Phycus marinus. Cap. C.

Phyci marini generib⁹, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertiū candidū, nascens in Creta iuxta terram, floridū valdè, quod nulla corruptionis labe polluit. Omnia vim habēt refrigeratoriam, nó podagræ modò, sed etiā inflāmationib⁹, in cataplasmatiseffi caciter vtilé: verū iis vti humidis cóuenit, priusquā exarescát.

Nican-

καὶ οἱ πάπποι δὲ, καθ' ἑαυτὸν καταπλαδέντες ἐν ὄξει τὸ αὐτὸ δρῶσι· πεδέντες μὴν τοι νεαρεῖ, πισμὸν ἐπιφέρουσιν. ὅλος ὁ καυλὸς ζωὸ ὕδατι ἐψηθεὶς καὶ σὺν γλεύκει πινόμενος, στομάχου πόνους τοὺς ἀπὸ χολῆς θεραπεύει.*

Περὶ Θαλίκτρου. Κεφ. ϛή.

Θάλικτρον φύλλα παρεπλήσια κορίῳ ἔχει, λιπαρώτερα δὲ, καὶ καυλίον πηχαῖον φάσκει. ἐφ' οὗ τὰ φύλλα ἅπερ καταπλαδέντα λεῖα, τὰ χρόνια τῶν ἑλκῶν ἐπουλοῖ. φύεται δὲ μάλιστα ἐν πεδίοις.

Περὶ Βρύου θαλασσίου.

Κεφ. ϛθ'.

Βρύον θαλάσσιον φύεται ἐπὶ λίθων καὶ ὀστράκων παρὰ θάλασσαν, πεπλεγδες ἔχον, ἄκαυλον, ἱκανῶς συμπικνόν, πιοῦσι πρὸς φλεγμονὰς καὶ πεδάγρας, καὶ σύψεως στομώσας.

Περὶ φύκους θαλασσίου.

Κεφ. ρ'.

Φύκος θαλάσσιον γίνεται, τὸ μὲν τι ἀπὸ πλατὺ, τὸ δὲ ὑπόμηκες καὶ φοινίκιον, τὸ δὲ, λευκὸν, φυόμενον δὲ ἐν κρήτῃ πρὸς τῇ γῇ. ἐναντὲς ἄγαν καὶ ἄσηπτον. Ψυκτικὴν ἔχει παῦτα πᾶν δύναμιν, ποιοῦσαν ἐν καταπλάσμασι, ποδαγρικαῖς καὶ ταῖς φλεγμοναῖς· δεῖ δὲ αὐτοῖς χρῆσθαι ὑγιέσι πρὸ τοῦ ξηραινθῆναι.

νίκαι-

νίκαδρος δέ φησι καὶ φοινικοῦν εἶναι τὸ φοινικοῦν. ὃ τῶν ἔδοξαν ἔνιοι εἶναι ὅ αἱ γυναῖκες χρῶνται, ὄντος ἐκείνης ῥιζίου. ὀμωνύμως δὲ καλουμένῳ φύκοις.

Περὶ Ποταμογείτονος. Κεφ. ϛέ.

Ποταμογείτων φύλλον ὃν ὅμοιον σεύτλῳ, βραδὺ καὶ ὀλίγον ὑφερυθρόν τὸ ὕδατος. ψύχει δὲ καὶ ξύφει αἱμόζουσι κνησμοῖς καὶ νεμομένοις καὶ παλαιοῖς ἕλκεσιν. ὠνόμασται δὲ διὰ τὸ ἐν τέλμασι καὶ ἀνύδροις τόποις φύεσθαι.

Περὶ Στρατιώτου. Κεφ. ρϛ'.

Στρατιώτης, ὁ ὅπου τὸ ὑδάτων φυόμενος· οἱ δὲ πτέρμιον στρατιώτην καλοῦσιν· ὠνόμασται δὲ διὰ τὸ ἐπινήχεσθαι τοῖς ὕδασι καὶ χωρὶς ῥίζης ζῆν. φύλλον δὲ ἔχει ἐλαίου ὅμοιον, μεῖζον μέντοι, καὶ ψυκτικὴν ἔχον δύναμιν. ἑφθὸν ταῖς ἐκ νεφρῶν αἱμορραγίας πινόμενον· τραύμασι δὲ ἀφλέγμαντα τηρεῖ· καὶ ἐρυσιπέλατα καὶ οἰδήματα ζωὸν ὄζει καταπλασσόμενον.

Περὶ Χιλιοφύλλου στρατιώτου. Κεφ. ρζ'.

Στρατιώτης ὁ χιλιόφυλλος ἔστι δαμίσκος μικρὸς, ἀπὸ δαμιαῖος καὶ μείζων· ἔχων τὰ φύλλα ὅμοια νεοττῷ πτερῷ· εἰσὶ δὲ αἱ ἀκρόφυσεις τῶν φύλλων σφόδρα βραχεῖαι, ἐχινωδῶαι. ἔοικε δὲ μάλιστα τὰ φύλλα τῇ βραχύτητι, καὶ τῇ

Nicāder, puniceū aduersus serpētes dedit. Hoc fuco quidā putant mulieres suū coloré mentiri, cum tamé sit radicula eiusdem nominis, qua sese fucant.

Potamogeton. Cap. CI.

Potamogeton, foliū betæ simile, hirsutū, paululum supereminens extra aquā. Refrigerat & inspissat: pruriginibus vtile, & cōtra veterum vlcerum nomas. Nomé ex eo inditum est, quòd paluſtribus, & aquosis enascatur.

Stratiotes. Cap. CII.

Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomentum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia: quę refrigerant. Sanguiné qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnera quę inflammationem minātur, intumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

Stratiotes millefolium. Cap. CIII.

Stratiotes millefoliū exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit: foliis auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectóq; foliorū exortu. Folia syluestre cuminum simulant, præsertim breuitate

atque ſcabritia, breuiora paulò, denſiore vmbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, candidos. Naſcitur in aſperis agris, præcipuè circa ſemitas. Eximij vſus ad vlcera vetera, recentiáque, profluentem ſanguinem, & fiſtulas.

Verbaſcum. Cap. CIIII.

VERBASCVM differētias ſummas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas & fœmina intelligitur. Fœminę igitur folia ſunt braſſicæ, piloſiora multò, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, ſubhirſutus: flores albi, aut ſubpallidi: ſemen nigrum: radix longa, guſtu acerba, craſsitudine digiti: naſcitur in campeſtribus. Verbaſcum, qui mas appellatur, oblongius, albis foliis, & anguſtioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorſus albo ſimile eſſet, niſi nigriore latioréque conſtaret folio. Syluęſtre folia fert ſaluiæ, altas virgas, & lignoſas, & circa eas ramulos quales marrubium: flores luteos, auri æmulos. Sunt & phlomides duæ, hirſutiæ ſummas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas & fœmina intelligitur. Fœminę igitur folia ſunt braſſicæ, piloſiora multò, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, ſubhirſutus: flores albi, aut ſubpallidi: ſemen nigrum: radix longa, guſtu acerba, craſsitudine digiti: naſcitur in campeſtribus. Verbaſcum, qui mas appellatur, oblongius, albis foliis, & anguſtioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorſus albo ſimile eſſet, niſi nigriore latioréque conſtaret folio. Syluęſtre folia fert ſaluiæ, altas virgas, & lignoſas, & circa eas ramulos quales marrubium: flores luteos, auri æmulos. Sunt & phlomides duæ, hirſutiæ

καὶ τῇ τραχύτητι κυμίνῳ ἀγρίῳ καὶ ἐπὶ βραχύτερα, καὶ τὸ σκιάδιον δὲ πυκνότερον τούτου καὶ ἀδροτέρεν. ἔχει γὰρ ἐπ' ἄκρου καρφία μικρὰ, ἐφ' ὧν τὰ σκιάδια ἐστὶν ἀγήδου τρόπον· αὔξη μικρὰ, λευκὰ φύει· ἐν ἀγροῖς ὑποστρωμνύει καὶ θέλει τὰς ὁδοὺς μάλιστα. ἔστι δὲ αὕτη ἡ βοτάνη σφόδρα ἀγαθὴ πρὸς αἱμορραγίαν καὶ ἕλκη παλαιὰ, καὶ πεσσόματα καὶ σύεγγας.

Περὶ Φλόμου. Κεφ. ρδ'.

Φλόμος ἡ μὲν αὐτότατος διαφορὰν ἔχει δύο, ἡ μὲν, μαρὶ ἐστιν αὐτὴ λευκὴ, ἡ δὲ, μέλαινα· καὶ ἡ λευκὴ ἡ μὲν, θήλεια, ἡ δὲ, ἄρρην. τῆς μὲν οὖν θηλείας τὰ φύλλα παραπλήσιά ἐστι κράμβῃ, μαλακώτερα δὲ πολλῷ καὶ πλατύτερα καὶ λευκά· καυλὸς πυχυαῖος καὶ μείζων, λευκὸς, ὑποτόμους· αὔξη λευκὴ ὑπωχρα· σπέρμα μέλαν ῥίζα ἡ μακρὰ, τρυφνὴ, πάχος ἔχουσα δακτύλου φύει δὲ ἐν πεδίοις. Ἡ δὲ ἄρρην καλεμβύη, λευκόφυλλος, ὑπομύκης ἡ καὶ στενωτέρα τοῖς φύλλοις, καὶ τῷ καυλῷ ἡ λεπτοτέρα. Ἡ δὲ μέλαινα ὁμοία τῇ λευκαῖς κατὰ πάντα, πλατυφυλλοτέρα μόνον τι καὶ μελανωτέρα τοῖς φύλλοις ὑπάρχει. Γίνει καὶ ἡ λεομβύη ἀγρία, ῥάβδους ὑψηλὰς φέρουσα καὶ δενδρώδεις, φύλλα ψελισφάκῳ ὅμοια· ἔχει δὲ κλῶνας θέλει τὰς ῥάβδους ὥσπερ πρόσπον. ἄνθος μέλαν, χρυσοειδές, εἰσὶ δὲ καὶ φλομίδες διπλαῖ, δα-

διπλαῖ, δασεῖαι, πεφυκυῖαι τῇ γῇ, στρογγύλα ἔχουσι τὰ φύλλα. Καὶ τρίτη φλομὶς ἡ καλουμένη λυχνῖτις, ἥτις δὲ πάνυ θρυαλλὶς, φύλλα γ' ἢ δ', ἃ καὶ πλείονα, ἔχουσα παχέα, λιπαρὰ, δασέα. εἰς ἐλλύχνια χρήσιμα. τῶν μὲν γὰρ πεφυτων δύο, ῥίζα συμπιὸν ὅσον διαμέτρου ὠμοὺς, ὅσον ἀσφάλαστος σὺν οἴνῳ ὠφελίμως ἐν ποτῷ δίδοται. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς ῥήγμασι καὶ σπάσμασι καὶ θλάσμασι καὶ βηξὶ παλαιαῖς ἀρήγει. ὀδοντολγίας τε πεφύγει διακλυζόμενον. ἡ δὲ χρυσοειδὴς τὰ αὐτὰ, τείχας βάπτει, καὶ ὅπου αὖ τιθῇ σίλφας σωάγει. τὰ δὲ φύλλα ἑφθὰ ἐν ὕδατι, πρὸς οἰδήματα καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καταπλάττεται, ᾧ πρὸς σφακελίζοντα ἕλκη σὺν μέλιτι ἢ οἴνῳ· σὺν ὄξει δὲ τραύματα θεραπεύει, καὶ σκορπιοπλήκτοις βοηθεῖ. τὰ δὲ τῆς ἀγρίας φύλλα * πυρικαύτων ὄξει καταπλάσματα. τὰ δὲ τῆς ἡμέρου φύλλα φασὶ μετὰ σύκων ξηρῶν σωτηρίωμα, ἄσκοπα αὐτὰ διαφυλάττειν.

hirsutæ, rotũdis foliis, humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab aliis autẽ thryallis, foliis ternis, aut quaternis, vel paulò pluribꝰ, hirsutis, crassis, pinguibúsq;: apta ad lucernarũ lumina. Radix priorum duarum astringit: quare quod magnitudine ludicrũ talum æquet, in alui profluuio, cõueniéter ex vino datur. Decoctum ruptis, cõuulsis, fractis, antiquæ tussi, auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit, & quocunque abiiciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vino & melle illinuntur: cum aceto quoque vulneribus medentur: contra scorpionum ictus, sunt auxilio. Sylvestris folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aiunt in foliis eius, quam fœminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

Περὶ Αἰθιοπίδος. Κεφ. ϛέ.

Αἰθιοπὶς, καὶ αὐτὴ παρεμφερὴς φλόμῳ ἔχει τὰ φύλλα, δασέα δὲ λίαν καὶ πυκνὰ, κύκλῳ περὶ τὸν πυθμένα τῆς ῥίζης· κεφαλὴν τετράγωνον, σκληρὰν, καὶ τραχὺν, ἐοικότα μελισσάνει ἢ ἀγκιθῳ, μαχόμενα

Æthiopis. Cap. CV.

Æthiopis folia habet verbasco similia, perquàm hirsuta, densaque, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, erassum ac scabrũ, simile apiastro, aut arctio,

multis concauum alis: semé erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescunt duranturq;. vt cornua possint videri: plurima nascitur in Ida monte Throadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritiis, decocta radix, & pota: quin & cum melle, ecclegmatis vicem præbet.

Arction. Cap. CVI.

Arction, aliqui potius arcturon vocant, similis est verbasco foliis, nisi quòd hirsutiora, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulcíque. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta pernionésq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxēdicum dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. Cap. CVII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora & hirsutiora, nigriora & crassiora: caulem albicantem, quanquam & interdū vidua caule reperiatur: radice

μαζάλας ἀνιέντα πολλάς· καρπὸν δὲ ὅσον μέγεθος ὀρόβου σωὶ δύο ἐν ἑνὶ ἀγγείῳ· ῥίζαι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πυθμένος πολλαὶ, μακραὶ, παχεῖαι, γευσμώδεις κολλώδεις· γίγνονται δὲ ζηραινόμεναι μέλαιναι ὡς σκληραὶ, κέρασιν ἐοικυῖαι· πλέκεται δὲ γυναῖκα κατὰ τὴν μεσογειαν καὶ τὴν ἴδην. Ταύτης ἡ ῥίζα ἑψομένη καὶ πινομένη βοηθεῖ ἰσχιάδι, πλευρίτιδι, αἵματος πύσει, καὶ ἀρτηρίας τραχύτητι· λαμβάνεται δὲ μετὰ μέλιτος αὐτὴ ἐκλειχτόν.

Περὶ Ἀρκτίου. Κεφ. ϙϛ'.

Ἄρκτιον, οἱ δὲ ἀρκτοῦρον, φλόμῳ ὡς αὐτὴ ἔχει ἐοικότα τὰ φύλλα, σκληρότερα δὲ καὶ τρογυλώτερα· ῥίζαν ἁπαλὴν, γλυκεῖαν, λευκήν· καυλὸν δὲ μαλακὸν, μακρόν· καρπὸν δὲ κωνώπῳ μικρῷ ὅμοιον. Ταύτης ἡ ῥίζα ἑψωμένη καὶ ὁ καρπὸς ἀφεψηθέντα ἐν οἴνῳ, ὀδοντολγίας διακενοῦ μένα παραῦγεν, καὶ πνευμώνων καὶ χωλέτλης ὀξεῖ καταπλασμα· πίνεται δὲ καὶ πρὸς ἰσχιάδας ὡς δυσουρίαν ἐν οἴνῳ.

Περὶ Ἀρκείου. Κεφ. ϙζ'.

Ἀρκίον, οἱ δὲ, προσώπιδα, οἱ δὲ, προσώπου καλοῦσι, φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τῆς κολοκύνθης, μείζονα μέν τοι καὶ σκληρότερα καὶ μελανώτερα καὶ δασέα· καυλὸν ὑπόλευκον, εἰσότε δὲ καὶ ἄκαυλος ἡ πόα· ῥίζα

ρίζα μεγάλη καὶ λευκὴ ἔνδοθεν, ἔξωθεν δὲ μέλαινα. Ἡ τῆς βοηθείσης ἀ. πλῆθος μετὰ τροφίλων, αἱμοπτοϊκοῖς, ἐμπυικοῖς, παυέι καὶ τὰ ἐν τῶν λυγισμῶν ἕλκη τὰ ἄρθρα δηγήματα καταπλασσομένη λεία. ᾗ τὰ φύλλα δὲ ὠφελίμως ἐπὶ τῶν παλαιῶν ἑλκῶν καταπλάττεται.

Περὶ Πετασίτου. Κεφ. ρή.

Πετασίτης μόριον ἐστὶ μείζων πήχεως, δακτύλου μεγάλου πάχος, ἐφ' οὗ φύλλον πετασώδες μέγα, στρογγύλωμον ὥσπερ μύκης ποιοῦσι πρὸς τὰ καλούμενα ᾗ φαγεδαινικὰ ἕλκη λείον καταπλασσόμενον.

Περὶ Ἐπιπακτίδος. Κεφ. ρθ'.

Ἐπιπακτὶς, οἱ δὲ ἑλλεβορίνην, θαμνίσκος μικρὸς, ᾗ ἄχρηστα φυλλάρια ἔχων. πρὸς τὰ θανάσιμα δὲ πίνεται, ᾗ πρὸς τὰ ἐν ὑπαλείπτῳ.

Περὶ Καπνοῦ. Κεφ. ρί.

Καπνὸς βοτανίον ἐστὶ θαμνοειδὲς, κορίῳ ἐοικὸς, πυρρὸν ἀπὸ μέσου· τὸ δὲ φύλλα λευκότερα καὶ περιφερῆ πολλὰ παλαιὰ ἔνδοθεν· ἄνθος πορφυροῦν. τούτου ὁ χυλὸς δριμύς, ὀξυδερκὴς, δακρύων ἀγωγός· ὅθεν καὶ τοὔνομα εἴληχεν. δύναται δὲ καὶ τὰς ἐν τῶν βλεφάρων διπλᾶς τείχας σὺν κόμμει καταχριθεὶς μὴ ἐᾶν φύειν. βρωθεῖσα δὲ ἡ πόα, οὖρα ἄγει χολώδη.

radice grandi, intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ vnius pondere pota, cum pineis nucibus, puruléta & cruenta extusientibus auxiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia vtiliter antiquis vlceribus illinuntur.

Petasites. Cap. CVIII.

Petasites pediculus cubito maior, crasitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus depédet. Contra phagedænas, & vlcera quæ cacoëthe vocant, efficaciter illinitur.

Epipactis. Cap. CIX.

Epipactis ab aliis helleborine, parua herba, exiguis foliis. Iocineris vitiis vtilis, & contra venena pota.

Capnos, seu fumaria. Ca. CX.

Fumaria fruticosa herbula est, prætenera, coriandri similis: foliis candidioribus, vndique numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationémque: vnde nomen traxit. Illitus cũ gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam vrinam trahit.

Περὶ

Lotus

Lotus vrbana. Cap. CXI.

Lotum vrbanam alij trifoliũ vocãt: nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterásque caligines discutit.

Syluestris lotus. Cap. CXII.

Syluestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis: foliis trifolij pratensis: semine fœnigræci, multò minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculásque, cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cum maluæ semine, in vino aut passo bibitur aptissimè contra dolores, qui vesicam malè habent.

Cytisus. Cap. CXIII.

CYTISVS, frutex est albus in totum, vt rhamnus, ramos spargens cubitales, sæpe maiores, in quibus folia fœnigræci, aut loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustatáque cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutiũt, si cum pane trita illinantur.

Decoctũ

Περὶ λωτοῦ ἡμέρου. Κεφ. ρια΄.

Λωτὸς ἥμερος, οἱ δὲ τρίφυλλον· φύεται ἐν παραδείσοις. ὃς χυλισθεὶς καὶ μιγεὶς μέλιτι, ἄργεμα καὶ νεφέλια καὶ λευκώματα καὶ τὰ ἐπισκοτοῦντα τῇ κόραις ἀποκαθαίρει.

Περὶ λωτοῦ ἀγρίου. Κεφ. ριβ΄.

Λωτὸς ἄγριος, οἱ δὲ, λίβυον καλοῦσι, φύεται μὲν, πλεῖστος ἐν λιβύῃ, καυλὸν φέρων δίπηχυν ἢ καὶ μείζονα, μασχάλας ἔχοντα πολλάς· φύλλα ὅμοια λωτῷ τριφύλλῳ, τῷ ἐν χορτοκοπείοις γινομένῳ· σπέρμα ἐοικὸς τήλιδι, μικρότερον δὲ πολλῷ, φαρμακῶδες ἐν τῇ γεύσει. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, ἠπίως συπτικήν. ἀποκαθαρτικὴν σπίλων τῶν ἐπὶ τοῦ προσώπου καὶ ἐφηλίδων σὺν μέλιτι καταχριόμενος. πινόμενος δὲ καθ' ἑαυτὸν λεῖος ἢ καὶ μετὰ μαλάχης σπέρματος σὺν οἴνῳ ἢ γλυκεῖ, τοῖς περὶ κύστιν ἀλγήμασι βοηθεῖ.

Περὶ κυτίσου. Κεφ. ριγ΄.

Κύτισος θάμνος ἐστὶ λευκὸς ὅλος ὡς ῥάμνος, κλάδους ἀνιεὶς πηχυαίους καὶ μείζονας, περὶ οὓς τὰ φύλλα ὅμοια τήλιδι, ἢ λωτῷ τριφύλλῳ μικρότερα δὲ καὶ ῥάχιν ἔχοντα μείζονα. ἐν δὲ τῷ διατρίβεσθαι τοῖς δακτύλοις ὄζοντα εὐζώμου, ἐν δὲ τῇ γεύσει ὅμοια ἐρεβίνθοις χλωροῖς. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ψυκτικήν· διαφορητικὴν τῶν ἐν ἀρχῇ οἰδημάτων σὺν ἄρτῳ λεῖα καταπλασθέντα.

θέντα. κινεῖ δὲ καὶ οὖρα. τὸ ἀφέψημα αὐτῶν πινόμενον. ἔνιοι δὲ φυτεύουσιν αὐτὸν παρὰ τοῖς σμήνεσιν ὡς ἐπακτικὸν τῶν μελισσῶν.

Περὶ λωτοῦ αἰγυπτίου. Κεφ. ριδ´.

Λωτὸς, ὁ ἐν αἰγύπτῳ γινόμενος ἐν τῷ ὕδατι τῶν ἐπικλυσθέντων πεδίων καυλός ἐστι τῷ τοῦ κυάμου ἐμφερής· ἔχων ἄνθος μικρὸν, λευκὸν, ἐοικὸς κρίνῳ, ὅ φασι κατὰ τὰς ἀνατολὰς τοῦ ἡλίου* ἀναπλοῦσθαι, δύοντος δὲ μύειν· καὶ ὅλην τὴν κωδίαν κρύπτεσθαι ἐν τῷ ὕδατι, πάλιν τε πρὸς τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου ὑπερκύπτειν. ἔοικε δὲ ἡ κωδία μήκωνι μεγίστῃ· ἐν ᾗ καρπὸς ὡς κέγχρος, ὃν ξηράναντες οἱ ἐν αἰγύπτῳ, βάλλουσιν εἰς ἀρτοποιΐαν. ῥίζαν δὲ ἔχει ὁμοίαν μήλῳ κυδωνίῳ, ἥ τις καὶ αὐτὴ ἐσθίεται ὠμή τε καὶ ἑφθή. ἀναλογεῖ δὲ ἑψηθεῖσα τῇ ποιότητι λεκύθῳ ᾠοῦ.

Περὶ Μυριοφύλλου. Κεφ. ριε´.

Μυριόφυλλον καυλίσκος ἐστὶ μονοφυὴς, τρυφερὸς, μονόῤῥιζος· περὶ ὃν φύλλα πολλὰ, λεῖα, μαράθρῳ ὅμοια· ὅθεν καὶ ὠνόμασται. ὁ δὲ καυλός ἐστιν ὑπόκιῤῥος, * διαποίκιλος, ὡς ἐπιτηδὲς διαῤῥινισμένος*· φύεται ἐν ἑλώδεσι τόποις. τοῦτο τηρεῖ ἀφλέγμαντα τὰ νεότρωτα τῶν ἑλκῶν σὺν ὄξει χλωρόν τε καὶ ξηρὸν καταπλασσόμενον· ποτίζεται δὲ καὶ πρὸς πτώματα σὺν ὕδατι καὶ ἁλσίν.

Περὶ

Decoctum potu vrinam ciet. Nonnulli, quòd apes adiiciat, prope aluearia ſerunt.

Lotus Ægyptia.

Cap. CXIIII.

EST & in Ægypto lotus, quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule fabæ: flore paruo, candido, lilio ſimili, quem tradunt occidente ſole comprimi occludíque. ad ortum autem aperiri: addúntque, caput ipſum veſpera aquis condi, & ad exortum ſolis emergere. Caput quale papaueris, maximũ: & intus grana ceu milij, quæ Ægyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos hæc habet, mali cotonei ſimilitudine, quæ cruda coctaq; mãditur: decoctáque lutei oui qualitatem exhibet.

Millefoliũ. Cap. CXV.

Myriophyllum, ſiue millefoliũ, caulis eſt tener, ſingularis, vnica nixus radice: plurimis foliis, læuibus, fœniculo ſimilib⁹: vnde nomẽ accepit. Caulis flaueſcit varius, ac veluti ex induſtria delimatus: naſcitur in paluſtribus. Vulnera recentia ab inflammatione vindicat, ſi vel viride, vel ſiccũ ex aceto, oblinatur: pręcipitatis in potu cum aqua & ſale datur.

Myrrhis.

Myrrhis. Cap. CXVI.

Myrrhis, simillima est cicutæ, caule foliisque: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuauis. Quæ pota in vino, phalangiorum morsibus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos, purgátque á puerperio fœminas: subuenit & phthisicis cocta in sorbitione. Aiunt quoq; eãdem bis die térve potam ex vino, in pestilétia salutaré esse, & ne morbi cõtagia sentiantur obstare.

Πρὶ Μύῤῥιδος. Κεφ. ρις'.

Μύῤῥις, οἱ δὲ μύῤῥαν καλοῦσιν, τῷ χυλῷ καὶ τοῖς φύλλοις ἔοικε κωνείῳ· ῥίζαν δὲ ἔχει ὀπωμύκη, ἁπαλὴν, εὐώδη, ἡδεῖαν βρωθῆναι. Ἡ πιοῦσα σὺν οἴνῳ φαλαγγιοδήκτοις βοηθεῖ· καθαίρει δὲ ἐμμῆνα, καὶ λοχία· καθυφηθεῖσα δ' ἐν ῥοφήμασιν, ὠφελίμως φθισικοῖς δίδοται. ἰσορροῦσι δὲ ἔνιοι πιομένης αὐτῆς δὶς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας σὺν οἴνῳ ἐν λοιμικαῖς καὶ ἀσάτοις, βοηθεῖν πρὸς τὸ ἀνόσους διαμεῖναι.

Myagrum. Cap. CXVII.

Myagron, aliqui melampyron vocant, herba est furculacea, foliis rubiæ, pallidis, tripedanea: semen oleosum, fœnograeco simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq; virgis ad lucernarum lumina vtuntur hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atque expoliri constat.

Πρὶ *Μυάγρου. Κεφ. ριζ'.

*Μύαγρος, οἱ δὲ μελάμπυρον, τὰ φρυγανώδης δίπηχυς φύλλα ἔχουσα ἐμφερῆ τοῖς τῆς ἐρυθροδάνου, ὠχρά· σπέρμα βαχίλῳ ἐοικὸς λιπαρόν. ᾧ χρῶνται, κόπτοντες αὐτὸ πυρωμένον, καὶ θερμαίνοντες ῥάβδοις, καὶ ἀντὶ λύχνου χρῶνται. δοκεῖ δὲ ἐξ αὐτῶν λίπος ὁμαλίζειν καὶ λειαίνειν τὰ τοῦ σώματος τραχύτητας.

Onagra. Cap. CXVIII.

ONAGRA, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, vinum olente: nascitur in montibus, Aqua in qua radix maduerit, in potu

Πρὶ Ονάγρας. Κεφ. ριη'.

Ονάγρα, οἱ δ' ὀνοθήραν, οἱ δ' ὄνυριν, θάμνος ὀξὺ δενδροφόδης, εὐμεγέθης, φύλλα ἔχων ἀμυγδαλῆς πλατύτερα* γλυκύῤῥα δ' καὶ ἐμφερῆ τοῖς τῆς κρίνου· ἄνθη ῥοδοφόδη, μεγάλα· ῥίζαν δὲ λευκὴν, μακρὰν, ἥτις ξηρανθεῖσα, οἶνον ὀσμὴν ἀποδίδωσι. φύεται δ' ἐν ὀρεσινοῖς τόποις. Δυώδεκα μὲν δ' ἔχει τὸ ἀπόῤῥημα τῆς ῥίζης

ὕσω

ὑπὸ τῶν ἀγρίων ζώων πινόμενον, ἡμεροῖ αὐτά· καταπλασθεῖσα δὲ πραΰνει τὰ θηριώδη ἕλκη.

Περὶ Κιρσίου. Κεφ. ριθ´.

Κίρσιον καυλός ἐστιν ἁπαλός, ὡς δίπηχυς, τρίγωνος, τὰ κάτωθεν φυλλάρια ῥοδοειδῆ ἔχοντα· τὰς γωνίας ἀκανθώδεις ἐκ διαστημάτων μαλακάς. τὰ δὲ φύλλα βουγλώσσῳ ἐμφερῆ, δασέα μετρίως καὶ μακρότερα, ὑπόλευκα, ἀκανθώδη τοῖς πέρασι. τὸ δὲ ἀνωτάτω τοῦ καυλοῦ περιφερὲς, δασὺ καὶ ἐπ' αὐτοῦ κεφάλια ἀκροπόρφυρα, ἐκπαππούμενα. ταύτης τὴν ῥίζαν ἀνδρέας ἀναγράφει ὑπὲρ τὸν ἀλγοῦντα τόπον ἀναδέμενον, παύειν κιρσῶν πόνους.

Περὶ Ἀστέρος ἀττικοῦ.
Κεφ. ρκ´.

Ἀστὴρ ἀττικὸς ῥαβδίον ξυλῶδες, ἐπ' ἄκρου ἔχον ἄνθος πορφυροῦν, ἢ μήλινον, ὥσπερ ἀνθεμίδος κεφάλιον περισχιδές· ἔχει δὲ φυλλάρια ἀστέρι ὅμοια. τὰ δὲ περὶ τὸν καυλὸν φύλλα ὑπομήκη καὶ δασέα. Ὠφελεῖ δὲ στόμαχον ἐκπυρούμενον καταπλασσόμενον, καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ βουβῶνας, καὶ τὰς προπτώσεις ἕδρας. φασὶ δὲ καὶ τὸ πορφυρίζον τοῦ ἄνθους μεθ' ὕδατος ποθὲν, συναγχικοῖς βοηθεῖν καὶ ἐπιληψίαις παίδων. ἁρμόζει δὲ καταπλασσόμενον ὑγρὸν πρὸς βουβώνων φλεγμονάς.

ξηρὸν

in potu data, feras mitigat, & cicures facit: illitu quoque tetra vlcera mulcet.

Cirſium. Cap. CXIX.

Cirſium, caulis eſt tener, duorum cubitorum, triágulo ſimilis: ab imo foliola, roſæ ſpeciem referentia: anguli ſpinoſi, per interualla molles: folia bugloſſo ſimilia, maiora, ſubcãdida, modicè hirſuta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hiſpidum, in quo capitulo in ſummo purpurea, quæ ſoluũtur in lanugines. Radicẽ huius loco laborãti adalligatã, dolores varicum ſedare Andreas ſcripſit.

Aſter Atticus. ſeu inguinalis. Cap. CXX.

Aſter Atticus cauliculus lignoſus, florem in cacumine habẽs purpureũ, luteũmve, per ambitũ, anthemidis capituli modo diuiſum, foliolis ſtellę modo radiatis: quæ autẽ caulẽ circũdãt folia oblonga ſunt ac hirſuta. Feruenti ſtomacho, oculorum inflãmationibus, ꝓciduæ ſedi, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florem, ſi ex aqua bibaẽ, anginis, & pueris comitiale malum ſentiẽtibus opitulari. Inguinũ inflãmationi recentẽ illinire cõuenit.

Si aridus

Si aridus flos finiſtra dolentis manu decerpatur,& inguinib⁹ adligetur,dolore liberat.

Ἐξὲν ἢ ἀναιρεῖν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ ἄνθος τοῦτο, καὶ περιαφθὲν τῷ βουβῶνι, ἀπαλλάσσει τὸν ὀδύνας.

Ιſopyrum. Cap. CXXI.

ISOPYRON, aliqui phaſiolon ob ſimilitudinem vocant, quoniam foliũ quod eſt aniſo ſimile in pampinos torquetur: capitula ſunt in ſummo caule, tenuia, plena ſeminis, melanthij guſtum imitantis. Contra tuſsim, & cætera pectoris vitia, ſemen ex aqua mulſa bibitur:hepaticis,& ſanguinem excreantibus vtile.

Πρὶ Ισοπύρου. Κεφ. ρκά.

Ισόπυρον, οἱ δὲ, φασίολον καλοῦσιν, ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος φασιόλῳ, τῷ κατ' ἄκρον τὸ πόπαλον ἕλικα φέρειν· ἔστι δὲ κεφαλαὶ ἐπ' ἄκρῳ τῷ καυλοῦ, λεπταὶ, σπερματίων πλήρεις, παραπλησίων μελανθίῳ τὴν γεῦσιν. τὸ δὲ φύλλον ἀνίσῳ· τοῦτο τὸ σπέρμα πινόμενον σὺν μελικράτῳ, τοὺς βηχας ὠφελεῖ· αἱμοπτοϊκοῖς τε καὶ ἡπατικοῖς ἁρμόζει.

Viola purpurea. Cap. CXXII.

VIOLA purpurea folium habet hedera minus, tenuius ac nigrius, nec multò diſsimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo floſculus, ſuauiſsimè olens, purpureus:opacis & aſperis naſcitur. Refrigerandi naturam habet.Folia per ſe,& ex polenta illinuntur aptiſsimè ſtomacho æſtuanti,& oculorum inflammationibus, ſedíque procidenti.

Πρὶ Ιου. Κεφ. ρκβ'.

Ιον φύλλον ἔχει μικρότερον ἴσατι καὶ λεπτότερον, μελανότερον δὲ καὶ οὐ πάνυ μίσυ· ἀπὸ τῆς ῥίζης, ἐφ' ἓν ἄνθιλλον σφόδρα εὐώδες, πορφυροῦν. φύεται δὲ παλισσοῖς καὶ τραχέσι τόποις.

Δύναμιν δὲ ἔχει ψυκτικήν. οὗ τὰ φύλλα καταπλασσόμενα καθ' ἑαυτὰ καὶ μετὰ ἀλφίτων, βοηθεῖ τομάχῳ καυσουμένῳ, καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς, καὶ ταῖς τῆς ἕδρας προπτώσεσι. φασὶ δὲ τὸ πορφυροῦν τὸ ἄνθος μεθ' ὕδατος πεθὲν, σπαγγικοῖς βοηθεῖν καὶ ἐπιληψίαις τοῖς ἐπὶ παίδων.

Cacalia. Cap. CXXIII.

CACALIA, quæ leonticen vocatur, folia fert magna, alba, è quibus medius caulis emicat,

Πρὶ Καγκαλίας. Κεφ. ρκγ'.

Καγκαλία, οἱ δὲ, λεοντικὴ, φύλλα φέρει λευκὰ, ἐυμεγέθη· καυλὸς

δὲ ἐξ αὐτῶν μέσος ὀρθός, λευκός, ἄνθος ἔχων ἐοικὸς δρυῒ ἢ ἐλαίᾳ· ἐν ὄρεσι δὲ φύεται. Ταύτης ἡ ῥίζα ἐν οἴνῳ βρεχομένη ὡς τραγάκανθα καὶ ἐκλειχομένη ἢ διαμασωμένη καθ᾽ ἑαυτὴν, βῆχας καὶ τραχύτητας τῆς ἀρτηρίας θεραπεύει. οἱ δὲ μετὰ τὴν ἐξάνθησιν ἐπιφυόμενοι κόκκοι λεῖοι, ἀναληφθέντες κηρωτῇ καὶ ἐπιχρισθέντες, τεταμένον καὶ ἀῤῥυτίδωτον τηροῦσι τὸ πρόσωπον.

Περὶ Βουνίου. Κεφ. ρκδ΄.

Βούνιον καυλὸν ἀνίησι τετράγωνον, ἐυμήκη, πάχος δακτυλιαῖον, φύλλα δὲ * ὅμοια σελίνῳ, λεπτότερα δὲ πολλῷ πρὸς τὰ τοῦ * κορίου· ἄνθος ἀνήθου· σπέρμα εὐῶδες, ὑοσκυάμου μικρότερον. Ἔστι δὲ οὐρητικὸν, θερμαντικὸν, καὶ δευτέρων ἀγωγὸν σπληνί τε καὶ νεφροῖς καὶ κύστει ἐπιτήδειον· χρῆσις δὲ αὐτοῦ ὑγροῦ τε καὶ ξηροῦ, καὶ χυλισθέντος σὺν ταῖς ῥίζαις καὶ τοῖς καυλοῖς καὶ τοῖς φύλλοις μετὰ μελικράτου.

Περὶ Ψευδοβουνίου. Κεφ. ρκε΄.

Ψευδοβούνιον θαμνίον ἐστὶ * σπιθαμιαῖον ἐν κρήτῃ, ἔχον φύλλα βουνίῳ ὅμοια δριμέα. * δύναται δὲ καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ πινόμενα κλωνία ὅσον δ΄. σὺν ὕδατι, στρόφοις καὶ στραγγουρίας, καὶ πλευρᾶς πόνον θεραπεύειν· διαφορεῖ δὲ καὶ χοιράδας μετὰ ἁλῶν καὶ οἴνου καταπλασσόμενα χλιαρά.

Περὶ

emicat, rectus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, vt tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus, scabritiis arteriæ, medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur, trita & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extédunt.

Bunion. Cap. CXXIIII.

Bunion caulé ædit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis foliis ac floribus scatent: folia proximè radicé, apio similia, longè tenuiora, coriãdrinis pxima: flores anethi: semen odoratum, hyosciamo minus. Vrinã ciet, excalfacit, secúdas euocat: lieni, vesicæ, renibus vtile: Tam humidi q̃ sicci, expressiq; succi caulib⁹, foliis, radicibusq; vsus inualuit ex aqua mulsa.

Pseudobunion. Cap. CXXV.

Pseudobunion palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulósque napi ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriam, laterúmque dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quoque cum sale & vino, tepentes, strumas discutiũt.

Chamæ-

Chamæcissus. Cap. CXXVI.

Chamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longiore, ramulis à radice quinis senisve, dodrãtalibus, foliosis: flore violę albę simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili: nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis trib⁹, tricenis quadragenisve diebus. eodé pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Περὶ Χαμαικίσσου. Κεφ. ρκς'.

Χαμαίκισσος φύλλα ἔχει ὁμοιότατα κισσῖς, μακρότερα δὲ καὶ λεπτότερα, πολλὰ, κλωνία ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ἕως ε', ἄνθη λευκοΐοις ὅμοια, μικρότερα, καὶ πικρὰ σφόδρα τὴν γεῦσιν ἰσχυρῶς· ῥίζα λεπτὴ, λευκὴ, ἄχρηστος· φύεται ἐν ἐρημικοῖς χωρίοις. Ἁρμόζει δὲ τὰ φύλλα ἰσχιαδικοῖς, ὄσον τριώβολον ἐν ὕδατι κυάθοις τρισὶ πινόμενα ἐπὶ ἡμέρας μ' ἢ ν'. καὶ ἐκτρέπει δὲ ἀποκαθαίρει, ὁμοίως πινόμενα ἐπὶ ἡμέρας ς' ἢ ζ'. ἡμέρας.

Chamæleuce. Cap. CXXVII.

Chamæleuce lumborũ doloribus propitia est, herba virens: incuruis foliis, surculisq;: flore rosaceo.

Περὶ Χαμαιλεύκης.

Κεφ. ρκζ'.

Χαμαιλεύκη πιεῖσα πρὸς ὀσφύος ἀλγήματα ἐν ὕδατι λεία πινομένη.

Buglossum, seu lingua bubula. Cap. CXXVIII.

Buglossum verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitãs linguas. Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

Περὶ Βουγλώσσου.

Κεφ. ρκη'.

Βούγλωσσον ἔοικε φλόμῳ, φύλλον δὲ ἔχει χαμαιπετὲς, τραχύ τι καὶ μελανίτερον, ὅμοιον βοὸς γλώσσῃ. ὃ ἐν οἴνῳ καθιέμενον εἰς τὸν οἶνον εὐφροσύνων δοκεῖ εἶναι.

Cynoglossum. Ca. CXXIX.

Cynoglosson folia latifoliæ plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur: pruenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe veteri, medentur morsibus canum, alopeciis, &

Περὶ Κυνογλώσσου. Κεφ. ρκθ'.

Κυνόγλωσσον φύλλα ἔχει ἀρνογλώσσῳ ἢ πλατυφύλλῳ ἐμφερῆ, στενώτερα ὃ καὶ μικρότερα, χνοώδη, ἄκαυλον, ἐπὶ γῆς ἑρπόμενον· φύεται ἐν ἀμμώδεσι τόποις. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα λεῖα σὺν στέατι παλαιῷ ὑείῳ, κυνόδηκτα καὶ ἀλωπεκίας, καὶ

τηχίας, καὶ κατακαύματα ἰᾶται· ἑψηθεῖσα δὲ ἡ πόα καὶ πινομένη σὺν οἴνῳ, κοιλίας ἐστὶ μαλακτική.

Περὶ Φυτεύματος. Κεφ. ρλ'.

Φύτευμα φύλλα ἔχει ὅμοια στρουθίῳ, μικρότερα δέ· καρπὸν πολὺν τετρημένον· ῥίζαν μικρὰν, λεπτὴν, ἐπιπόλαιον· ἣν ἀναγράφουσί τινες ἐνθετεῖν πρὸς φίλτρον.

Περὶ Λεοντοποδίου. Κεφ. ρλα'.

Λεοντοπόδιον διδακτυλιαῖον ἐστὶ βοτάνιον, ἔχον φυλλάρια στενὰ *ἰσχυρὰ, ὡς τεσσάρων δακτύλων ἢ καὶ τριῶν τὸ μῆκος, δασέα, ἐριωδέστερα τὰ πρὸς τῇ ῥίζῃ καὶ ὑπόλευκα· ἐπ' ἄκρων δὲ τῶν καυλῶν κεφάλια ὥσπερ *τετρημένα, ἐν οἷς ἄνθη μέλανα· ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ δυσθεώρητος διὰ τὸν περικεχυμένον αὐτῷ χνοῦν· ῥίζα δ' ὕπεστι μικρά. φασὶ δὲ καὶ ταύτην *συγχρηστεῖν εἰς φίλτρα.

Περὶ Ἱππογλώσσου. Κεφ. ρλβ'.

Ἱππόγλωσσον θαμνίσκος ἐστὶ μυρσίνῃ ἀγρίᾳ καὶ λεπτῇ τὰ φύλλα ὅμοιος. κόμην δὲ ἀκανθώδη ἔχει, καὶ ἐπ' ἄκρου ὥσπερ *γλωσσίδια παρὰ τοῖς φύλλοις· δοκεῖ δὲ ἡ κόμη περίαμμα εἶναι χρήσιμον κεφαλαλγοῦσι· μίγνυται δὲ καὶ εἰς μαλάγματα ἥτε ῥίζα καὶ τὸ χύλισμα.

Περὶ Ἀντιρρίνου. Κεφ. ρλγ'.

Ἀντίρρινον, οἱ δὲ ἀνάρρινον, ἔνιοι

& ambustis. Emollit aluum, decoctum herbæ ex vino potum.

Phyteuma. Cap. CXXX.

Phyteuma folia habet radiculæ, minora: copiosum semẽ, perforatum: radicem paruã, tenuem, per summa terræ nitentem: quã ad amatoria cõuenire, nonnulli scriptũ reliquerũt.

Leontopodiũ. Cap. CXXXI.

Leontopodiõ duûm digitorum herbula est, folia ferẽs angusta, lõgitudine ternûm quaternúmve digitorũ hirsuta, q̃ iuxta radicẽ lanosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semẽ vsq; adeò spissa lanugine inuolutum est, vt sæpe fallat: radice parua cohæret: quã tradunt appẽsam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum. Cap. CXXXII.

Hippoglosson, frutex est folia habens rusci tenuis figurã, & spinosam comã, & in summo ceu linguas è foliis exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit: Malagmatis radix succúsque admiscetur.

Antirrhinũ. Cap. CXXXIII.

Antirrhinõ, alij anarrinõ vocant,

cant,herbam caule & foliis anagallidi similem: flore albæ violæ, purpureo, minore tamen, ideóque syluestris lychnis nominata est: semine vtili narium simili. Tradunt perunctos ea, cum oleo lilino, venustiores fieri: nec vllo medicamento lædi posse,si quis appensum gestet.

Catanáce. Cap.CXXXIIII.

Ex eo genere vna,folia coronopi habet longa,radicē iunci modo prætenuem:capitula sena,septenáve,in quib⁹ erui semen inest. Arescens in terram flectitur,& se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parui magnitudinē explet,radice exiguæ oliuæ magnitudine:foliis quoque oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis,humi inclinatis,semen, vt cicer,minutum,in virgulis dependet, punicei coloris,multis foraminibus pertusum. Vtráque narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his vti traduntur.

Tripolion. Cap. CXXXV.

Tripolion in marinis nascitur locis, quæ allidit vnda, recedénsque dimittit, neque in mari, neque in ficco: folio glasti

ἔχει ἡ ἐν ταύτῃ λυχνίδα ἀγρίαν ἐκάλεσε, πόα ὅλη ἐμφερὴς ἀναγαλλίδος φύλλοις καὶ καυλῷ· τὰ δὲ ἄνθη πορφυρᾶ, ὅμοια λευκίῳ. μικρότερα δέ, διὸ καὶ ἀγρία λυχνὶς ἐκλήθη· καρπὸν δὲ φέρει μόρσιῳ ὅμοιον, ῥᾴστου ἰδεῖν. ἰσοτρέπεται δὲ τοῦτο ἀντιπαθὲς εἶναι φαρμάκοις θηλαπόμενον· ὑπάχαιόν τε ποιεῖν ἀληφόμενον σὺν ἐλαίῳ κρινίνῳ, ἢ κυφρίνῳ.

Περὶ Καταράγκης. Κεφ. ρλεʹ.

Καταράγκη, ἡ μέν τις αὐτῆς ἔχει φύλλα μακρὰ ὡς κορωνόποδος, ῥίζαν λεπτὴν, χορτώδη· κεφαλὰς δὲ εʹ, ἢ ϛʹ. ἐν αἷς καρπὸς ὅμοιος ὀρόβῳ· κάμπτεται δὲ ἐμπαναγόμενος ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐπτίνει ὄνυξιν ὁμοίοις γυπός. Τὸ δὲ ἕτερον μέγεθος ἔχει μικρὸν· ῥίζαν δὲ μικρὰν ὅσον ἐλαίας· τὰ δὲ φύλλα σχήματι καὶ χροιᾷ ἐοικότα ἐλαίᾳ, μακρὰ δὲ ἐπὶ γῆς ἐρωμένα καὶ ἐπερχόμενα· καρπὸν ἐπὶ ῥαβδίοις μικρόν. τετρημένον καὶ πολλὰ μέχρις ἐρίζοντα φοινικοῦν· ἀμφοτέρας δὲ ἰσοροῦσι πηγὲς εἰς φίλτρα ἁρμόζειν. χρῶνται δὲ λέγουσιν αὐτῆς καὶ θηλάλεις γυναῖκας.

Περὶ Τριπολίου. Κεφ. ρλεʹ.

Τριπόλιον φύεται ἐν παραθαλασσίοις τόποις ὅς ὑπακλύζει ἡ θάλασσα καὶ ὑποχωρεῖ, οὔτε δὲ ἐν ξηρᾷ, οὔτε ἐν θαλάσσῃ· φύλλα

ὃ ἔχει ἰσάτῃ παραπλήσια, παχύτερα μὲν, τὸν καυλὸν σπιθαμιαῖον ἄνωθεν ἐπεσχισμένον. ταύτης ἱστορεῖται τὸ ἄνθος τρὶς τῆς ἡμέρας μεταβάλλειν τὸ χρῶμα, πρωῒ μὲν λευκὸν, κατὰ δὲ τὴν μεσημβρίαν πορφυρίζον, ὀψὲ δὲ φοινικοῦν. ῥίζα λευκὴ, εὐώδης, θερμαντικὴ γευομένῳ. ἧς πινομένη ἐν οἴνῳ < β'. πλῆθος, κατὰ κοιλίας ὕδωρ ἄγει καὶ οὖρα. τέμνεται δὲ καὶ εἰς ἀλεξιφάρμακα.

Περὶ Ἀδιάντου. Κεφ. ρλϛ'.

Ἀδίαντον, οἱ δὲ, πολύτριχον, φυλλάρια ἔχει κοριάνδρῳ ὅμοια, ἐπεσχισμένα ἐπ' ἄκρου· τὰ δὲ καυλία ἐφ' ὧν ἐκπέφυκε μέλανα, ἰσχυρῶς λεπτὰ, σπιθαμιαῖα, στίλβοντα· φύλλα ὅμοια πτέριδι, μικρὰ λίαν· οὔτε δὲ καυλὸν, οὔτε ἄνθος, οὔτε καρπὸν φέρει. ῥίζα ἄχρηστος. Δύναται δὲ τὸ ἀφέψημα τῆς πόας πινόμενον, βοηθεῖν ἀσθματικοῖς, δυσπνοϊκοῖς, ἰκτερικοῖς, σπληνικοῖς, δυσουροῦσι· θρύπτει δὲ καὶ λίθους, καὶ κοιλίαν ἵστησι, καὶ θηριοδήκτοις βοηθεῖ· καὶ στομάχου ῥεύματι σὺν οἴνῳ πινόμενον· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα καὶ λόχια· ἵστησι δὲ καὶ αἵματος ἀναγωγήν· καταπλάττεται δὲ καὶ πρὸς θηριόδηκτα ὠμὴ, καὶ ἀλωπεκίας δασύνει, χοιράδας σκορπίζει· ἀποσμᾷ πίτυρα καὶ ἀχῶρας σὺν κονίᾳ· σὺν λαδάνῳ δὲ καὶ μυρσίνῳ,

καὶ

glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, vt tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero punicei cõspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in vino pota, aquã, vrinámque per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcent.

Adiantũ. Cap. CXXXVI.

Adianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa, cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, pal-mum alti: radice superuacua: neque caulem, neque fructũ, neque florem profert. Decoctum herbæ potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrinæ difficili. Calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est. Cõtra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet & menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Cõtra serpẽtiũ morsus cruda herba illinitur, alopecias dẽsat, strumas discutit: furfures et manãtia capitis vlcera, ex lixiuio emẽdat: defluẽtes capillos continet, cum ladano & myrtino,

ὡς πλατείας σφαίρας, ἀντιλαμβανόμενον τῶν ἱματίων μετὰ τὴν ψαῦσιν. Δύναται δὲ ὁ καρπὸς πρὶν τελείως ξηρανθῆναι, συλλεγεὶς καὶ κοπεὶς καὶ ἀποτεθεὶς εἰς κεραμεοῦν ἀγγεῖον ξανθὰς τρίχας ποιεῖν. ἐάν τις ἐπὶ τῆς χρήσεως λαβὼν τρυβλίου πλῆθος ἐξ αὐτοῦ, διεὶς τῷ ὕδατι χλιαρῷ, καὶ προεκνιτρώσας τὴν κεφαλὴν καταπλάσῃ. τινὲς δὲ καὶ μετ' οἴνου κόψαντες αὐτὸ, ἀποτίθενται. καταπλάττεται δὲ, καὶ πρὸς οἰδήματα ὁ καρπὸς ἐπιτηδείως.

Περὶ Αἰγίλωπος. Κεφ. ρλθʹ.

Αἰγίλωψ βοτάνιον ἐστὶ φύλλα πυροῦ ἔχον ὅμοια, μαλακώτερα δὲ, ἐπ' ἄκρας δὲ τῆς κεφαλῆς, καρποὺς ἔχον βʹ ἢ γʹ. ἐρυθροὺς, ἐφ' ὧν ἀθέρες οἱονεὶ τρίχες ἐκπεφύκασι. θεραπεύει δὲ ἡ πόα μετ' ἀλεύρου καταπλασθεῖσα αἰγίλωπα, καὶ σκληρίας διαφορεῖ. ἀποτίθεται δὲ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ αὐτὰ μιγεὶς ἀλεύρῳ καὶ ξηρανθείς.

Περὶ Βρώμου. Κεφ. ρμ.

Βρῶμος πόα ἐστὶν αἰγίλωπι ἐμφερής. Δύναμιν ἔχουσα ἐπιξηραντικὴν, ἀφεψηθεῖσαν οὖν σὺν ταῖς ῥίζαις μεθ' ὕδατος, ἕως ἀποτριτωθῇ τὸ ἀπόζεμα, διυλίζων αὐτὸ ἐπίμισγε μέλι τοσοῦτον, καὶ ἕψε μέχρις ἂν γένηται πάχος ὑγροῦ μέλιτος. καὶ ποιεῖ ἐπὶ τῶν ὀζαινικῶν, εἰ βρέχων ὀθόνην προστιθείης τῷ μυκτῆρι, καὶ καθ' ἑαυτὸ μέντοι ποιεῖ οὕτως·

ἔνιοι

spinosum, qui contactu vestibus adhærescit. Is anté collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili vase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabili instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro antè perfrictum illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asseruant.

Semen aptissimè tumoribus imponitur.

Ægilops siue festuca. Cap. CXXXIX.

Ægilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternáve rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cũ farina herba ægilopiis medetur, duritias discutit. Succus farinæ admixtus, siccatur, & eorundẽ gratia reponitur.

Bromus. Cap. CXL.

Bromus herba ægilopi similis, exiccatoriam vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adiicitur: rursus incoquitur, dũ liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam vlcerum efficax est.

 Aliqui

μοιῶν· καρπὸν δὲ φέρει βοτρυώδη ὡς ὀπφυλλίδα πεπαυμένα ἐρυθρὸν, ὑποδάκνοντα ἡδέως ἐν τῇ γεύσει· ῥίζαν σκληράν, παχεῖαν· φύεται ἐν τόποις ἐλαφροῖς καὶ βαχώδεσι. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς θνησιμων ὄφεων ἀντίδοτος, σφενδάμνου, καὶ ὀπιπνόμενα. παραδίδοται ὅτι ἐάν τις ἀπτηλυεῖ παιδίῳ τείλας τί τούτων δῷ πιεῖν· ὑπ' οὐδενὸς δηλητηρίου φαρμάκου βλαβήσεται. τίμνεται δὲ καὶ εἰς ἀλεξιφάρμακα.

Περὶ Σμίλακος λείας.

Κεφ. ρμέ.

Σμίλαξ λεία, ὁμοία κισσῷ τὰ φύλλα ἔχει, μαλακώτερα δὲ καὶ λειότερα καὶ λεπτότερα· τὰ δὲ κλήματα ὥσπερ ὁ σὸς αὐτῆς ἀκανθώδη καὶ ἕλκοντα· ἐλίσσεται δὲ περὶ τὰ δένδρα. ὡς ἡ σφενδάμνος· καρπὸν δὲ ἔχει ὥσπερ θέρμου μέλανα, μικρόν· ἀεὶ δὲ ἐπαίρω ἔχοντα ἄνθη λευκὰ πολλά. κῦ πᾶσαν δὲ σμίλακα καὶ θεριφερῆ, καὶ σκιναὶ δὲ αὐτῆς γίνονται τῷ θέρει· φυλορροεῖ δὲ τῷ φθινοπώρῳ. Τούτου δὲ καρπὸς μετὰ δορυκνίου πτισάνου, πεπωκόλου ὁλκὴ ἑκάτερον ὑπύπια πολλὰ, καὶ παραχώδη ὁρᾶν ἰσορρέπεται.

Περὶ Μυρσίνης ἀγρίας.

Κεφ. ρμς.

*Μυρσίνη ἀγρία, τὸ μὲν φύλλον μυρσίνῃ ἔχει ὅμοιον, πλατύτερον

Fert racemos exiles, quī maturi rubescunt, gustúmque leniter mordent. Nascitur in palustribus & asperis: radice dura, crassáque. Folia & acini, & antè & pòst epoti, venenorum antidota sunt. Tradūt, si infantibus nuper in lucē æditis, quid ex his trium propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamēta quibus venena arcentur.

Læuis smilax.

Cap. CXLV.

Læuis smilacis folia hederæ similitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora: huius sarmenta nullis horrent spinis: cō uoluitur arborib⁹ vt prior: fructū parit lupini modo nigrū, exiguum: flores circunquaque exiliunt candidi, copiosi, orbiculati. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam factitantur: folia per autumnum decidua. Semine cū dorycnio poto, ternis singulorū obolis, varia & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

Ruscus.

Cap. CXLVI.

Sylvestris myrtus, aliquibus oxymyrsine, aut myrtacātha,

Latinis ruſcum appellatur: folium fert myrti, latius, in formā lanceæ mucronatū: baccæ per maturitaté rubeſcūt, rotundæ, à medio folio depédentes, oſſeo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu cótumaces, folioſi: radice graminis ſimili, acerba, & ſubamara. Folia & baccæ in vino potæ vrinā ciēt, menſes pellunt, veſicæ calculos frangunt, ſtillicidio vrinæ medentur, dolores capitis ſanant, & regium morbū. In aſperis & præcipitibus locis enaſcif. Decoctum radicis in vino potū, eoſdem præbet effectus. Cauliculi recētes, aſparagorū vice, in cibo ſumūtur. Amari autem ſunt, ſed vrinam mouent.

Laurus Alexandrina. Cap. CXLVII.

Laurus Alexandrina, folio eſt ruſci maiore, molliore, & candidiore: ſemine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos ſpargit in terra dodrātales, interdum longiores: radice ſyluestri myrto ſimili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montoſis. Difficiles partus accelerat, radice pota ſex drachmarum pōdere in vino dulci: & ἐστὶν δὲ, λογχοειδὴς, ὀξὺ ἐπ' ἄκρῳ· τὸν δὲ καρπὸν στρογγύλον, ἐν μέσῳ δὲ τῷ πετάλῳ ἀφειρῆ, ἐρυθρὸν ἐν τῷ πιπάνεσθαι, ἔχοντα τὸ ἐντὸς ὀστῶδες· κλωνία λυγοειδῆ πολλὰ ἐκ τῆς ῥίζης αὐτῆς δύσθραυστα. δοσις πόλεως, φύλλων μετά· ῥίζαν περιπλησίαν ἀλφίτοις, γευομένῳ στυφνῶν, ὑπόπικρον. Δυνάμεων δὲ ἔχει τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ἐν οἴνῳ πινόμενα, οὖρα κινεῖν, καταμηνία ἄγειν, καὶ λίθους τοὺς ἐν κύστει θρύπτειν· θεραπεύει δὲ καὶ ἕλκεσι καὶ στραγγουρείαν, καὶ καυαλγίαν· φύεται ἐν τραχέσι τόποις καὶ κρημνώδεσι. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ τῆς ῥίζης σὺν οἴνῳ ποθὲν, τὰ αὐτὰ ποιεῖ. καὶ αὐτὴ ἀπαραίρετος δὲ οἱ κωμικοὶ νεοθαλεῖς λαχανευόμενοι ἐδίδοσαν). εἰσὶ δ' ἔμπικροι καὶ διουρητικοί.

Περὶ Δάφνης. Κεφ. ρμζ'.

Δάφνη ἀλεξάνδρεια, οἱ δ' ἰδαία, οἱ δὲ δενδρώδης, οἱ δ' ὑπόγλωσσον, οἱ δὲ ζάλεια, οἱ δὲ στεφάνη, φύλλα ὁξυμυρσίνῃ ὁμοια ἔχει, μείζονα δὲ καὶ μελανώτερα, καὶ λευκότερα· καρπὸν δὲ ἐν μέσοις ἐρυθρὸν ἐρεθίνθου τὸ μέγεθος· κλῶνας ὑπὲρ τὰς πηχυαίους ἢ καὶ μείζονας· ῥίζαν περιπλησίαν τῇ ὀξυμυρσίνῃ, μείζονα δὲ καὶ εὐώδη καὶ μελανωτέραν· φύεται) ἐν τόποις ὀρεινοῖς. Δυνάμεων δὲ ἔχει ἡ ῥίζα πινομένη < ς'. σταθμοῦ μεθ' οἴνου γλυκέος, ἐμπνεῖν

βοηθεῖν τοῖς δυσκούσοις ἢ στραγγουειῶσιν. ἄγει δὲ καὶ αἷμα.

Περὶ Δαφνοΐδος. Κεφ. ρμή.

Δαφνοειδὲς, οἱ δὲ ὑπέταλον, οἱ δὲ χαμαιδάφνιν, οἱ δὲ πάπλιον καλοῦσι, δαιμόνιόν ἐστι πηχυαῖος, κλάδους πολλοὺς ἔχων ἱματώδεις πρὸς τὰ ἄνωθεν ἥμισυ, φυλλοφόρους· φλοιὸς δὲ περὶ τὰς ῥάβδους γλίχρος ἰσχυρῶς· φύλλα δάφνῃ ἐοικότα, μαλακώτερα δὲ καὶ ἰσχνότερα καὶ οὐκ εὔκλασα, δάκνοντα καὶ πυροῦντα τὸ στόμα καὶ φάρυγγα· ἄνθη λευκά· καρπὸν μέλανα, ὅταν πεπανθῇ· ῥίζα ἄχρηστος· φύεται ἐν ὀρεινοῖς τόποις· ἄγει δὲ καὶ τὸ φύλλον αὐτῆς ξηρὸν ἡ νεαρὸν ποθὲν κῆ· κοιλίας φλεγματώδη, κινεῖ δὲ ἐμέτους καὶ ἔμπλυσμα· καὶ διαμασηθὲν ἀποφλεγματίζει· ἔστι δὲ καὶ πλατικὸν· καθαίρει δὲ καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς ὅσον κόκκοι ιε΄ πυρῶν.

Περὶ Χαμαιδάφνης. Κεφ. ρμβ΄.

Χαμαιδάφνη, οἱ δὲ καὶ ταύτην ἀλεξανδρείαν ἐκάλεσαν, ῥάβδοις ἀνίσοις πηχυαίοις, ἐρυθραῖς, λεπτὰς καὶ λείας· καὶ ταύτης δὲ τὰ φύλλα ὅμοια δάφνῃ, λειότερα δὲ πολλῷ καὶ χλωρότερα· καρπὸν δὲ φέρει ἐρυθρὸν, τοῖς φύλλοις ὁμοφυόμενον. Ταύτης τὰ φύλλα λεῖα καταπλασθέντα, κεφαλαλγίας καὶ στόμαχου ἐσχώσεσιν ἀρήγει· πωθέντα δὲ μετ' οἴνου στόφοις παύει· ὁ δὲ

& stillicidio vrinæ auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides.
Cap. CXLVIII.

Daphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisque, multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modū viscosus ramos vestit: folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntnr: flores candidi: bacca, cum emāturuit, nigra: radix inutilis: nascitur in montosis. Pituitas extrahit foliū recens vel aridum in potu, menses ciet & vomitus: caput inanit commanducatum, sternutaméta mouet. Baccę quindecim potæ aluum resoluunt.

Chamædaphne.
Cap. CXLIX.

Chamædaphne virgas emittit cubitales, singulari ramulo constātes, rectas, tenues, læues: folia lauri similitudine, læuiora multò, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexum foliis. Illinuntur capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina cū vino bibuntur.

Potus

Potus cum vino ſuccus, menſes & vrinam ciet: idem facit peſſo appoſitus.

Veratrum album.

Cap. CL.

Helleborum album, Latini veratrum album vocãt, fert folia plantaginis aut betæ ſylueſtris ſimilia, ſed breuiora, & nigriora, rubeſcentia: caulem caum, quadrantalem, tunicis cõuolutum quas abdicat cum areſcere incipit: radicib⁹ nititur multis, tenuibus, ab oblõgo & exiguo capite ceparum modo exeuntibus: naſcitur in montibus & aſperis. Radices meſsibus colligendę. Optimũ habetur candidum, friabile, carnoſum, modicè extentum, nec tamen iunci modo mucronatũ, quod frangẽdo puluerẽ emittit, & tenuẽ habet medullã, guſtu non admodũ feruens, neq; ſaliuã ſubinde ciens (huiuſcemodi autẽ ſtrangulat.) Primatum Cyrenaicum tenet. Galaticum autẽ & Cappadocicum, candidiora, & puluere quodã obſita, celerius ſtrãgulatus mouent. Vomitione autem varios extrahit humores. Collyriis admiſcetur, quæ caliginem oculorum diſcutiunt. Partus impoſitum necant, menſes pellit, ſter-

ὁ δὲ χυλὸς συὶ οἴνῳ πότιζόμενος καταμήνια καὶ οὖρα ἄγει καὶ ἐν ποσῷ προσεδὲὶς τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

Περὶ Ελλεβόρου λευκοῦ.

Κεφ. ρʹ.

Ελλέβορος λευκὸς φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τοῦ ἀρνογλώσσου, ἢ σύντλου ἀγρίου, βραχύτερα δὲ καὶ μελανώτερα καὶ ἐρυθρὰ πρὸς χρόαν· καυλὸν δὲ παλαιστιαῖον, κοῖλον, σπερμοφλοιζόμενον ὅτε ἄρξεται ξηραίνεσθαι· ῥίζαι δ' ὑπεισι πολλαὶ, λεπταὶ, ἀπὸ κεφαλίου μικροῦ καὶ ὀπωπώσαις, ὡς σπερὶ χρομμύου συμπεφυκυῖαι· φύεται ἐν ὀρεινοῖς τόποις καὶ τραχέσι. Συλλέγειν δὲ δεῖ τὰς ῥίζας περὶ τὸν πυραμιτόν. ἄριστος δὲ ὅστις αὐτοῦ, ὁ μετρίως τετραμμένος καὶ λευκὸς, καὶ * εὔθρυπτος καὶ σαρκώδης, οὐκ ἄπυξις δὲ καὶ χρονώδης, ἢ χροιᾶς ἀφιεὶς ἐν τῷ θραύεσθαι, ἔχων δὲ καὶ πρὸς ἐντερεάνλιν λεπτὸν, ἐκ πυρῶν πρὸς ζέσιν οὐλίαν, οὐδὲ ἀθρόως, στέλον ὀπωπώμενος, πιπώδης γὰρ ὁ τοιοῦτος· προσοτύνει δὲ ὁ * κυρηναϊκός· ὁ δὲ γαλατικὸς καὶ καππαδοκικὸς, * λευκότερος καὶ χροώδης καὶ πιπωδέστερος. Καθαίρει δὲ δι' ἐμέτων ἄγων ποικίλα. μίγνυται δὲ καὶ κολλυρίοις τοῖς διωμένοις τὰ ὀπισθοῶπα τῆς κόρας ἀποκαθαίρειν. καὶ ἔμμηνα ἄγει, καὶ ἔμβρυα κτείνει προσιδόμενος.

παρ-

πταρμούς τε ἐρεθίζει, καὶ μύας κτείνει σὺν μέλιτι καὶ ἀλφίτῳ φυραθεὶς, συγκαθεψόμενός τε χρήσιμος, σωτήριος αὐτά. δίδοται δὲ νήστει καθ' ἑαυτὸν καὶ μετὰ σπάνου καὶ θαψίας χυλοῦ, ἢ ἄλυκος, ἢ μελικράτου, ἢ πόλης, ἢ φακοῦ ἢ ἄλλου ῥοφήματος. συστατοποιεῖται δὲ ἢ ἀρτῳ ἢ ὀπτᾶται. ἡ δὲ θεραπεία καὶ ἐπιδιάτησις, ἐξειργασμένη περὶ τοῖς θεραπευομένοις περὶ τῆς δόσεως αὐτῆς γράψασι, μάλιστα δὲ συγκατατιθέμεθα φιλωνίδῃ τῷ σικελῷ τῷ ἀπὸ ἔνης, μακρὸν γάρ ἐστιν ἐν ὕλῃ παραδόσει θεραπευομένων θεραπευτικὴν ἐκτίθεσθαι ἀγωγήν. δίδοσι δὲ ἔνιοι σὺν * πολλῷ ῥοφήματι ἢ χυλοῦ σταλίδει, ἢ ἢ τροφὴ ὀλίγη προδιδόντες, ὅπως δίδοσι τὸν ἑλλέβορον εὐθέως, ἐφ' ᾧ μάλιστα πυγμὴς ὑποπίπτει ἢ ἀδένων σύσματος ὑπόκειται, ἀκίνδυνος δὲ ὅτι τῶν οὕτω λαμβανόντων ἢ κάθαρσις· διὰ τὸ μὴ ἀκαίρως τὸ φάρμακον παραδίδεσθαι τοῖς σώμασι· καὶ βάλανοι δὲ ἐξ αὐτοῦ προσεθεῖσαι τῇ ἕδρᾳ μετ' ὄξους, διεγείρουσι κινοῦσαι.

Περὶ Ἑλλεβόρου μέλανος.

Κεφ. ρνά.

Ἑλλέβορος μέλας, οἱ δὲ μελαμπόδιον, οἱ δὲ ἔκτομον, οἱ δὲ πολύῤῥιζον, μελαμπόδιον δὲ λέγεται

sternutamenta excitat, mures interficit cum melle & poléta subactũ, absumit carnes si coquatur vná. Datur per se ieiunis, & cum sesama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lêtis cremore, cũ aqua mulsa, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cũ pane, & ita inassatur. Præparatio corporũ, ac victus ratio, diligéter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarũt, tum maximè à Philonide Siculo Ennési, cui núc assentimur: quippe lógum nimis esset, in hac præsertim æditione de materia, simul medicã curandi rationé exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucũ antea cibum dari præcipientes, statim veratrũ offerunt, iis præsertim, quibus strágulationis suspicio imminet, aut si valetudo corp⁹ infirma: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, & cibo munitis nó intempestiuè medicamentũ corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditę ex eo balani, cũ aceto.

Veratrum nigrum.

Cap. CLI.

Helleborũ nigrũ, appellatur melampodion, quoniam caprarũ

prarũ pastor, nomine Melampus, furẽtes in se prœtidas, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, foliis sphondylij proxima, subaspera, nigriora, pluribꝰ diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi racematim cohęrentes: semen cnici, quod in Anticyra sesamoides vocant: quo deiectiones moliuntur: radicibus cohæret nigris, tenuibus, à capitulo, cepæ simili confibratis: quarũ est vsus: in collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimum est quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruẽsque: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Ætolia natum: attamẽ Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat ventrem, detrahit bilem pituitasq; datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma salis: decoquitur vel cũ lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articulariis doloribus, & resolutis.

Menses

γεται), ἐπειδὴ δοκεῖ μελάμπους τὶς αἰπόλος τὰς προίτου θυγατέρας, μανείσας ἐν αὐτῷ καθᾶραι πρότος καὶ θεραπεῦσαι. ἔχει δὲ τὰ φύλλα χλωρὰ, πλατάνῳ προσεμφερῆ, ἥττονα δὲ πρὸς τὰ τῆς σπονδυλίου καὶ πολυσχιδέστερα καὶ μελάντερα καὶ ὑποτράχεα· καυλὸς τραχύς· ἄνθη δὲ λευκὰ, ἐμπόρφυρα, τῷ δὲ σχήματι βοτρυώδη· καὶ ἐν αὐτῷ καρπὸς κνίκῳ ὅμοιος, ὃν καὶ αὐτὸν καλοῦσιν οἱ ἐν ἀντικύρᾳ σησαμοειδῆ· χρώμενοι πρὸς τὰς καθάρσεις αὐτῷ. ῥίζαι δ' ὕπεισι λεπταὶ, μέλαιναι, οἱονεὶ ἀπό τινος κεφαλῆς κρομμυώδους ἠρτημέναι. ὧν καὶ ἡ χρῆσις· φύεται ἐν τραχέσι καὶ γεωλόφοις καὶ καταξήροις τόποις. Καὶ ἄριστος ὁ ἐκ τῶν τοιούτων λαμβανόμενος χωρίων. οἷός ἐστιν ὁ ἐξ ἀντικύρας. καὶ γὰρ ὁ μέλας καὶ κάλλιστος ἐν αὐτῇ γίνεται. ἐκλέγου δὲ τὸν εὔσαρκον καὶ εὔτροφον, λεπτὴν ἔχοντα τὴν ἐντεριώνην, δριμὺν ἐν τῇ γεύσει καὶ πυρώδη. τοιοῦτος δέ ἐστιν ὁ ἐν τῷ ἑλικῶνι καὶ παρνασῷ καὶ αἰτωλίᾳ φυόμενος· διαφέρει μέντοι ὁ ἑλικώνιος. Καθαίρει δὲ τὴν ἄνω κοιλίαν, ἄγων φλέγμα καὶ χολὴν, καθ' ἑαυτὸν ἢ μετὰ σκαμμωνίας διδόμενος, καὶ ἁλῶν < α ἢ τριωβόλου ὁλκῆς· συνέψεται δὲ καὶ φακῇ, καὶ ζωμοῖς τοῖς εἰς κάθαρσιν λαμβανομένοις. ὠφελεῖ δὲ ἐπιληπτικοὺς, μελαγχολικοὺς, μαινομένους, ἀρθριτικοὺς, παραλελυμένους.

προ-

προστεθεὶς δὲ, ἔμμηνα ἄγει, καὶ ἔμβρυα κτείνει, σύριγγάς τε καθαίρει καταταθεὶς καὶ μετὰ τρίτην ἐξαιρεθείς. ὁμοίως καὶ ἐπὶ δυσηκοούντων καθίεται εἰς τὸ οὖς, ἐώμενος ἐπὶ β΄. ἢ γ΄ ἡμέρας. θεραπεύει δὲ καὶ ψώρας μετὰ λιβανωτοῦ ἢ κηροῦ καὶ πίσσης καὶ κεδρίνου ἐλαίου καταχριόμενος· μετ᾽ ὄξους δὲ καθ᾽ ἑαυτὸν καταπλασσόμενος, ἀλφοὺς καὶ λειχῆνας καὶ λέπρας θεραπεύει· ἑψηθεὶς δὲ σὺν ὄξει ὀδονταλγίας πραΰνει διακλυζόμενος· σηπταῖς τε μίγνυται· μετὰ δὲ κριθίνου ἀλεύρου καὶ οἴνου, κατάπλασμά ἐστιν ὑδρωπικοῖς ὠφέλιμον· συμφυτευθεὶς δὲ ἀμπέλοις πρὸς τῇ ῥίζῃ, τὸν ἐξ αὐτῶν οἶνον καθαρτικὸν ἐργάζεται. περιρραίνουσι δὲ καὶ οἰκίαις αὐτὸν καθαρτικὸν εἶναι νομίζοντες· ὅθεν καὶ ὀρύσσοντες ἵστανται προσευχόμενοι ἀπόλλωνι καὶ ἀσκληπιῷ φυλαττόμενοι ἀετὸν, ἐφίπτασθαι γάρ φασιν οὐκ ἀκινδύνως· δίδωσι γὰρ θάνατον ὁ ὄρνις ἐάν περ ἴδῃ τὴν ὀρυχὴν τοῦ ἐλλεβόρου. συντόμως δὲ δεῖ ὀρύττειν, διὰ τὸ καρηβαρείαν ἐκ τῆς ἀποφορᾶς γίνεσθαι· ὅθεν εἰς προφυλακὴν οἱ ὀρύττοντες, ἐσθίουσι σκόροδα, καὶ οἶνον πίνουσιν. ἀβλαβέστεροι γὰρ οὕτω διατίθενται. ἐξεντερίζεται δὲ ὥσπερ καὶ ὁ λευκὸς ἐλλέβορος.

Περὶ Ση-

Menses inditum trahit, partus necat, purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. Item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alterum aut etiam tertium diem esse sinitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat: erodentibus medicamentis commiscetur: hydropicorum ventri vtilissimè imponitur factũ ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma: consitum proximè radices vitiũ, vinum purgãdi facultate donat. Huius resparsu domos expiari arbitrãtur: quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Æsculapiúmque precantur, ac vitãt aquilæ volatus, aduolare enim nõ sine periculo tradunt: nanque si auis effossionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, auguriũ est. Celeriter effodiatur oportet, quoniam halitu caput aggrauat: quapropter, ad id arcendũ, fossuri, alliũ præsumere, & vinum bibere cõsueuerũt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesa-

Sesamoides magnum.
Cap. CLII.

Sesamoides magnũ, in Anticyra helleborũ vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem detrahit: datur tritum ad bilis pituitæque deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsa.

Sesamoides paruum.
Cap. CLIII.

Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantales: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasque, semen ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Sylvestris cucumer.
Cap. CLIIII.

Cucumis sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem

Περὶ Σησαμοειδοῦς τ' μεγάλου. Κεφ. ριϛ'.

Σησαμοειδὲς τὸ μέγα, ἐν ἀντικύρᾳ ἐλλέβορον καλοῦσι, διὰ τὸ μίγνυσθαι ἐν ταῖς καθάρσεσι τῷ λευκῷ ἐλλεβόρῳ. ἔοικεν ἡ πόα πεπαιγέρσῃ ἢ πηγάνῳ· φύλλα μακρά· ἄνθος λευκόν· ῥίζα ἰσχνὴ ἄωδος· σπέρμα ὅμοιον σησάμῳ, πικρὸν ἐν τῇ γεύσει. Ὁ καθαίρει * αὖω φλέγμα τε καὶ χολὴν ὅσην τοῖς τείσι δακτύλοις λεῖον λαφθὲν μετὰ ἐλλεβόρου λευκοῦ τειῶν ἡμιωβόλων σὺν μελικράτῳ.

Περὶ Σησαμοειδοῦς τοῦ μικροῦ. Κεφ. ριγ'.

Σησαμοειδὲς τὸ μικρὸν χαμαίλια ὀξὺ ἀπαθαμαία· ἕρπετα φύλλα κορωνόποδι ὅμοια, θασσύτερα μέντοι καὶ μικρότερα· ἐπ' ἄκρου δὲ τῶν χαμαίλιων κεφάλια αὐθίων ὑποπυρρόφυρον, ὧν τὸ μέσον, λευκόν· ἐν οἷς σπέρμα σησάμῳ ἐοικὸς, πικρὸν, ῥίζα λεπτή. Καθαίρει * δὲ χολὴν καὶ φλέγμα κάτω πτὼν τὸ σπέρμα, ὀξυβάφου ἥμισυ σὺν μελικράτῳ· καταπλασθὲν δὲ μετ' ὕδατος, φύματα καὶ οἰδήματα διαφορεῖ. φύεται ἐν τραχέσι χωρίοις.

Περὶ Σίκυος ἀγρίου. Κεφ. ριδ'.

Σίκυς ἄγριος τῷ καρπῷ μόνῳ διαφέρει τοῦ ἡμέρου· σίκυος, ἐλάσσο-

ἐλάσσονα πολλῷ ἔχων βλαστοὺς ὁμοιοτάτους ἐοικότα· τὰ φύλλα καὶ τὰ κλήματα ἡμέρῳ ὅμοια· ῥίζαν δὲ λευκὴν καὶ μεγάλην· φύεται ἐν οἰκοπέδοις καὶ ἀμμώδεσι τόποις, ὅλος δὲ ὁ θάμνος πικρός. Ἁρμόζει δὲ ὁ τῶν φύλλων χυλὸς ἕλκεσι ζόμυρος ὠταλγίαις. ἡ δὲ ῥίζα καταπλασθεῖσα μετὰ ἀλφίτου παῖ οἴδημα παλαιὸν διαφορεῖ· μετὰ ῥητίνης δὲ τερεβινθίνης ὑποτεθεῖσα, φύματα ῥήγνυσι· μετ' ὄξους δὲ ἐμπλασθεῖσα καὶ καταπλασθεῖσα, ποδάγρας διαφορεῖ· καὶ ἰσχιάδος δὲ ὄξει ἔγκλυσμα. καὶ ὀδόντων ἀλγίας διάκλυσμα τὸ ἀφέψημα. ξηρὸν δὲ λείαν ἀλφοὺς, λέπρας καὶ λεχήνας σμήχει· οὐλάς τε μελαίνας καὶ στίγμασι τὸν ἐν προσώπῳ ἀποκαθαίρει. καὶ ὁ χυλὸς δὲ τῆς ῥίζης, πλῆθος τριῶν ἡμιωβολίων τὸ ἐλάχιστον. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ ὅσον τέταρτον ὀξυβάφου καταμὶξ φλέγμα καὶ χολὴν, καὶ μάλιστα ὅταν ὑδρωπικῶν, δίχα δὲ τῆς τὸν στόμαχον ἀδικεῖν πιεῖται πρὸ κάθαρσιν, δεῖ δὲ τῆς ῥίζης λαβόντα ἡμίλιτρον, μετὰ δυοῖν ξεστῶν οἴνου μέλιτα λιβυκοῦ λεαίνειν καὶ διδόναι ἐπὶ τούτου κυάθους γ' * ἕως ἂν ὁ ὄγκος ἐκπαθῶς συσταλῇ.

quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque sarmenta satiui refert: radice candida, magna: nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discutit, decocta ex aceto, & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Aridæ farina impetiginem, lepras & vitiligines absterget: nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquioboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, bilem pituitamque deiiciunt, præsertim in hydropicis: (deiectiones autem circa stomachi iniuriam mouet) radicis febhra, in vini præsertim Libyci hemina conteritur, dantúrque ex eo terni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur.

Περὶ Ἐλατηρίου. Κεφ. ρνέ.

Τὸ δὲ λεγόμενον ἐλατήριον, ἐκ τοῦ καρποῦ τῶν σικυάδων σκευάζεται τὸν

Elaterium. Cap. CLV.

E fructu huiusce cucumeris, fit medicamẽtũ qđ elateriũ vocatur, ad hũc

tur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte vna: postridie imposito supra craterem rariore cribro, vtrisque manibus prȩhensi, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur: simúlque carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur: quod ita pressum est, residere sinitur, atque in vicinã peluim demittitur. Coaceruata auté in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pressa abiiciũtur. Humor in pelui agitatur, & linteo opert⁹, soli exponitur: dúmq; steterit, tota supernatans aqua cũ humore concreto, effunditur. Hoc verò idẽtidem fieri solet, donec existens aqua liquescat: qua stillatim exhausta, sedimẽtũ mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiã, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauantes, triplicatũ linteũ obtundant, per quod eleterium cum sua humiditate diffundunt, siccatúmque, in pila, vt dictum est, conterunt.

Aliqui

τὸν τρόπον τοῦτον· τοὺς ἅμα τῷ ἅψασθαι σικύους ἀποπηδῶντας ἐκλέγων, ἀποτίθεσο, ἐῶν νύκτα· τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπὶ κρατῆρι κόσκινον μὴ πυκνὸν ἐπιθεὶς, καὶ μαχαίριον ὕπτιον ἁρμόσας, τὴν ἀκμὴν ἔχον ἄνω, λαμβάνων ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ καθ' ἕνα τῶν σικυῶν, διαίρει καὶ ἔκθλιβε διὰ τοῦ κοσκίνου τὸ ὑγρὸν εἰς τὴν ὑποκειμένην κρατηρείαν· προσεκθλίβων καὶ τὸ ἐν αὐτοῖς σαρκῶδες ὃ δὴ περιπίπτει τῷ κοσκίνῳ· ἵνα καὶ αὐτὸ διεκπίπτῃ· καὶ εἰς λεκάνην παρακειμένην τὰ ἐκθλιβόμενα βάλλε. σωρεύσας δὲ τὰ τετμημένα ἐπὶ τοῦ κοσκίνου, ὕδατι γλυκεῖ περιχέας καὶ ἀποπιέσας, ταῦτα μὲν ῥίπτε. ταράξας δὲ τὸ ἐν τῇ λεκάνῃ ὑγρὸν καὶ σκεπάσας ὀθόνῃ, τίθεσο ἐν ἡλίῳ· καὶ ὅτε στῇ, πᾶν τὸ ἐπινηχόμενον ὕδωρ μετὰ τοῦ ἐπιπάγου, ἀπόχει. καὶ τοῦτο ποίει πολλάκις ἄχρις οὗ καταστῇ τὸ ἐφιστάμενον ὕδωρ. ὃ γὰρ ἐκσπογγίσας ἐπιμελῶς, τὴν ὑπόστασιν βαλὼν εἰς θυίαν, λέαινε, καὶ ἀνάπλαττε τροχίσκους. ἔνιοι δὲ πρὸς τὸ ταχέως ἀνικμασθῆναι τὸ ὑγρὸν, τέφραν σεσησμένην ἐπὶ γῆς καταστρώσαντες καὶ κοιλάναντες τὸ μέσον, ὀθόνιον τριπλοῦν ἐπιθέντες, κατὰ τούτου τὸ ἐλατήριον σὺν τῇ ἰκμάδι ἐπιχέουσιν, ἀναξηρανθὲν δὲ θυίᾳ λεαίνουσιν ὡς προείρηται.

ἔνιοι

ἔνιοι δὲ ἀντὶ τοῦ ὕδατος θάλατταν παραχέοντες, πλύνουσιν. οἱ δὲ, τῇ τελευταίᾳ πλύσει μελίκρατον παραχέουσι. δοκεῖ δὲ ἐλατήριον κάλλιστον εἶναι τὸ μετὰ τοῦ λευκοῦ ἢ σύγχρουν ἔνικμον, κοῦφον, λεῖον, πικρότατον τῇ γεύσει, καὶ προσαχθὲν λύχνῳ εὐεξαπτές. τὸ μέν τι προσίζον καὶ τραχὺ καὶ θολερὸν τῇ ὄψει, γέμον ὀροβίου καὶ τέφρας, βαρύ τέ ἐστι καὶ φαῦλον. ἔνιοι δὲ καὶ τῷ χυλῷ τοῦ σικύου, μιγνύουσιν ἄμυλον, πρὸς τὸ μιμήσασθαι αὐτὸ λευκὸν καὶ κοῦφον. εἰς μέν τοι τὰ καθαρτικὰ ὁ διετὴς ἁρμόζει ἄχρι δεκαετῶν· ἡ δὲ τελεία * πόσις ὀβολός· ἡ δὲ ἐλαχίστη ἡμιωβόλιον· παιδίοις δὲ δίχαλκον· πλεῖον γὰρ ποθὲν κίνδυνον ἐπιφέρει. κινεῖ δὲ τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω κάθαρσιν ἄγον φλέγμα καὶ χολήν. ἀρίστη δὲ τοῖς δυσπνοοῦσιν ἡ δι᾽ αὐτοῦ κάθαρσις. εἰ μὲν οὖν θέλεις κατὰ κοιλίαν καθαίρειν διπλάσιον ἁλῶν μίξας καὶ στίμμεως ὅσον χρῶσαι δι᾽ ὕδατος ὀροβιαῖα καταπότια δίδου, ἐπιῤῥοφείτω δὲ χλιαροῦ ὕδατος κύαθον ἕνα· εἰς δὲ ἔμετον ὕδατι ἀνιεὶς, πτερῷ τοὺς ὑπὸ γλῶσσαν διάχριε τόπους ὡς ἔπι ἐσωτάτῳ· εἰ δὲ δυσεμὴς εἴη ἢ ἐλαίῳ ἢ ἰρίνῳ μύρῳ διεὶς, κώλυε δὲ κοιμᾶσθαι. τοῖς δὲ ὑπερκαθαιρομένοις, συνεχῶς προσφέρειν δεῖ οἰνέλαιον·

ἐμουμ-

Aliqui pro dulci aqua marinã perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotione, mulsam aquã respergunt. Elateriũ optimũ esse constat, leue, nõ ponderosum, cũ candore leniter humectum, gustu amarissimum, quódque lucernarũ luminibus obiectũ, facilè flagret. Porraceũ tamen scabrumq́;, si turbidũ spectetur, atq; erui cinerisq; plenũ sit, graue & vitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis succo amylũ immisceãt, vt candorẽ ipsũ & læuitatẽ imitẽtur. A bimatu ad decenniũ deiectionib⁹ vtile est. Integer mod⁹, obolus est: minim⁹, semiobolus: pueris, chalci duo: siq̃dẽ copiosi⁹, periculũ adfert. Bilẽ ac pituitã vtrauis parte extrahit. Optima suspiriosis est purgatio: q̃ si ĩ animo sit deiectionẽ moliri, adiecto salis duplo, & stibij q̃d colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudĩe catapotia dato, postea cyath⁹ vn⁹ aquę tepidę sorbeat: ad citãdas tñ vomitiões aqua diluẽs elateriũ, subiectas linguę partes peritissimè pẽna oblinito: q̃ si q̃squã difficili⁹ euomat, oleo aut vnguẽto irino resoluito, somnũ ĩhibeto. Porrò his q̃ eximiè vacuãt cõtinuè vinũ, & oleũ dari cõuenit:

H etenim

etenim vomendo restituuntur. Quòd si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, & partus enecat, in pesso subditum: morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat: efficacissimè anginis illinitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. Cap. CLVI.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles nigrosq; : fert floré glasti· & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrũ, ex nigro subfulueſcentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mulsa dentur, crassum humorem per vomitum purgãt: sed qui hauserũt, ambulare debent. prudenter tamen attendere oportet, & aquã mulsam cõtinuò potui dare: quoniã pericula strangulationis inferũt, &

ἐμοῶντες γὰρ ἀποκαθίστανται. μὴ παυομένων δὲ τῶν ἐμέτων, ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ἄφιτον καὶ ἐξύκρατον καὶ ὀπώραν, καὶ ὅσα δύνανται τὸ στόμαχον πυκνοῦσα προσενεκτέον. κινεῖ δὲ τὸ ἑλατήριον καὶ ἔμμηνα, καὶ ἔμβρυα κτείνει ὑποθέτων· ὀγχνίδιόν τε μετὰ γάλακτος εἰς τοὺς ῥώθωνας, ἴκτιδος ἀποκαθαίρει, καὶ κεφαλαλγίας ταῖς χρονίοις ἀπαλλάττει· συναγχικοῖς δὲ διάχρισμα προσκτικὸν μετ' ἐλαίου παλαιοῦ ἢ μέλιτος ἢ χολῆς ταυρείας. τοῖς δὲ ὑμέρου σικύου ἡ ῥίζα λεῖα ποθεῖσα σὺν ὑδρομέλιτι ἀόλκῃ, ἐμέτοις κινεῖ. εἰ δέ τις μετὰ τὸ δεῖπνον προσφέρει ἐμέσαι ἐθέλει, ἀρχοῦσιν ὀβολοὶ β'.

Περὶ Σταφίδος ἀγρίας. Κεφ. ϛνϛ'.

Σταφὶς ἀγρία φύλλα μὲν ἔχει ὥσπερ ἀμπέλου ἀγρίας ἐπεσχισμένα· καυλία ὀρθὰ, μαλακὰ, μέγαν· τὸ δὲ ἄνθος φέρει ἰσάτῃ ὅμοιον· ἡ δὲ καρπὸν ἐν θυλακίοις χλωροῖς ὥσπερ ἐρεβίνθου, τετράγωνον, τραχύν, ὑποκίρρον ἐν τῷ μέλανι, τὸ δὲ ἔνδον λευκὸν, γευσαμένῳ δριμύ. τούτου κόκκους ιε' ἕως ις' ἐάν τις λεαίνας ἐν μελικράτῳ δῷ, καθαίρει δι' ἐμέτων πάχη· προπατέτωσαν δὲ οἱ πιπωκότες. δεῖ μὴν τοι προσέχειν σωτέων μελίκρατον διδόντας, διὰ τὸ ἐπιφέρειν τοὺς κατὰ πνιγμὸν κινδύνους, καὶ

καὶ καίειν τὴν φάρυγγα. ἀφιώζει δὲ τριφθεῖσα καὶ ἐν ἐλαίῳ συγχρισθεῖσα πρὸς φθειριάσεις καὶ κνησμοὺς καὶ ψώρας. διαμασηθεῖσα δὲ φλέγμα ἄγει πλεῖστον· καὶ ὀδονταλγίαις ὠφελεῖ σὺν ὄξει ἑψηθεῖσα καὶ διακλυζομένη· οὖλά τε ῥευματιζόμενα στέλλει· καὶ ἄφθας τὰς ἐν στόματι θεραπεύει μετὰ μέλιτος. μίγνυται καὶ τοῖς πυρωτικοῖς μαλάγμασιν.

Περὶ Θαψίας. Κεφ. ρνζ΄.

Θαψία ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ δοκεῖν πρῶτον εὑρῆσθαι ἐν Θάψῳ τῇ νήσῳ τῇ ὁμωνύμῳ. τῇ δ' ὅλῃ φύσει ἔοικεν νάρθηκι, ἰσχνότερος δ' αὐτῆς μᾶλλον ὁ * καρπὸς καὶ τὰ φύλλα μαράθρῳ ἐμφερῆ· ἐπ' ἄκρου δὲ σκιάδια καθ' ἑκάστην ἀπόφυσιν, ἀνήθῳ ὅμοια· ἐφ' ὧν ἄνθος μήλινον· σπέρμα ὑπόπλατυ, τῷ τοῦ νάρθηκος ἐμφερὲς, ἔλαττον μέντοι· ῥίζα ἔνδοθεν λευκὴ, μεγάλη, μέλαινα δ' ἔξωθεν, παχύφλοιος, δριμεῖα. Ἥτις ὀπίζεται περιορυχθεῖσα καὶ ἐγκοπτομένη τὸν φλοιὸν, ἢ κοιλανθεῖσα, αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ θολοειδῶς ἡ ῥίζα καὶ πωματιζομένη πρὸς τὸ καθαρὸν μένειν τὸν ὀπόν· τῇ δ' ὑστεραίᾳ δεῖ ἐπιόντας ἀναιρεῖσθαι τὸν ἐπισυλλεγμένον ὀπόν. χυλίζεται δὲ κοπεῖσα ἡ ῥίζα καὶ διὰ κυρτίδος καὶ ὀργάνου ἐκθλιβεῖσα καὶ ξηρανθεῖσα ἐν ἡλίῳ δι' ὀστρακίνου παχέος ἀγγείου.

ἔνιοι

& fauces adurunt. Trita & ex oleo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris. Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheumatismum gingiuarum sistit: vlcera oris mananti cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

Thapsia. Cap. CLVII.

Thapsia nomẽ ideo accepit, quod in Thapso eiusdẽ nominis Insula, primum inuenta sit. Tota verò natura ferulæ similis est: graciliore caule: foliis fœniculi: vmbella anethi in cacumine, à singulis surculis erũpente: flore luteo: semen quale ferulæ, latiusculum, sed aliquanto minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ratio hæc est: Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornicis speciem in se excauata, cooperitur, quò merus succus confluat: oportet illuc sequenti die se conferre, & congestũ succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallũ expressus fictili crasso insolatur.

 Ali-

Aliqui foliũ vnà terunt: sed inualidior huiuscemodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è foliis autẽ extractus, excicca-tur, atq; teredinũ iniuriã sentit. Qui succũ colligit, stare debet non obuersus vẽto: aut potius, cũ dies apricus est, & à flatu si-let: quoniã ob halitus acrimo-niã facies vehemẽter intume-scit, nudáq; corpora inuadunt pustulę: ob id prius liquido ce-rato, & adstringẽte, nudas par-tes illinunt, & ita muniti acce-dũt. Tam cortex radicis, q̃ suc-cus, purgandi vim habẽt, & lac-teus succus in aqua mulsa po tus: ná vtrinq; bilẽ extrahũt. Ra dicis modus, quaterni oboli, cũ trib⁹ seminis anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus vnus: quod eo amplius assumi-tur, periculosum est. Huiusmo-di purgatio cõuenit suspiriosis, & diuturnis laterũ doloribus, reiectionibúsq;, datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit vomere. Tã radix, q̃ succ⁹ omniũ maximè, quæ pares cũ eis vires adepta sunt, vim habent extractoriã ex alto, vbi ex imo aliquid euocãdũ est, aut mea-tuũ laxitas aliò transferẽda est: vnde

ἔνιοι δὲ καὶ τὰ φύλλα συναπο-θλίβουσιν· ἀσθενὴς δὲ ὁ τοιοῦ-τος. διακείνεται δὲ τῷ βρωμα-τωδέστερον εἶναι τὸν ἀπὸ τῆς ῥί-ζης καὶ μᾶλλον ἔνικμον· ξηραί-νεσθαι δὲ τὸν ἀπὸ τῶν φύλλων καὶ πρωθυπιζέσθαι. ὀπίζοντα δὲ δεῖ μὴ κατ' ἀνέμου ἵστασθαι· μᾶλ-λον δὲ γλωτμίας οὔσης. ἕτεροι δεῖ γὰρ ἰσχυρῶς τὸ πρόσωπον καὶ φλυκταινοῦσθαι τὰ γυμνὰ μέρη· διὰ τὴν δεκμύτητα τῆς ἀποφορᾶς· δεῖ οὖν κηρωτῇ συ-φούσας ὑγιαῖς προχρίειν τὰ γυ-μνὰ τῶν μερῶν, καὶ οὕτω προσ-έρχεσθαι. Δώσαμεν δὲ ἔχει καθαρτικὴν, ὅ τε φλοιὸς τῆς ῥί-ζης καὶ ὁ χυλὸς, καὶ ὁ ὀπὸς σὺν μελικράτῳ πιγόμενος· ἄγω γὰρ καὶ κάτω χολὴν καθαίρουσι. δίδοται δὲ τῆς μὲν ῥίζης τε-τραώβολον μετὰ ἀνήθου σπέρμα-τος < γ. τοῦ δὲ χυλίσματος τριώβολον· τοῦ δὲ ὀπτοῦ ὀβολός· πλεῖον γὰρ δοθὲν, κινδυνώδης. ἀρμόζει δὲ ἡ δι' αὐτοῦ κάθαρ-σις πάθεσιν ἀσθματικοῖς, πλευ-ρῶν ἀλγήμασι χρονίοις, καὶ ἀνα-γωγαῖς· τοῖς δὲ δυσπέπτοις ἐν σι-τίοις ἢ ἐψήμασι δίδοται. κέκτη-ται δὲ καὶ μετασυγκριτικὴν δύ-ναμιν ὅ τε ὀπὸς καὶ ἡ ῥίζα πάν-των μᾶλλον τῶν ἰσοδυναμούν-των ὅσου τι δεῖ ἐκ βάθους ἑλκύσαι, ἢ μετὰ προσποιῆσαι.

ὅθεν

ἕστιν ἀλωπεκίας καταχριόμενος ὁ χυλὸς ἢ ἡ ῥίζα χλωρὰ σφοστειδωμένη, δασοῦσι. ὑπωπιά τε αἴρει καὶ πελιώματα λεία ἡ ῥίζα ἢ ὁ χυλὸς σὺν λιβανωτῷ καὶ κηρῷ ἴσοις· δεῖ δὲ μὴ πλέον δυοῖν ὡρῶν ἐᾶν· μὴ δὲ ταῦτα πυετίᾳ θερμῇ θαλάττῃ· αἷς ἢ ᾗ ἔσηλται σὺν μέλιτι καταχριθείς, καὶ λέπρας ἀφίστησι· φύματά τε ῥηγνῦσι μὴ θείου καὶ ἀσβόλου ὁ χυλὸς· χνοῖσι ἢ καταχρίει καὶ ἐπὶ τῶν χρονίας ἐχόντων διαθέσεις δεῖ πλευρὰν ἢ πνεύμονα, ἢ πόδας ἢ ἄρθρον· χρῆται δὲ καὶ πρὸς ἐπαγωγὰ ἐπὶ τῶν μὴ ὀρθοτομῆς λειποδέρμων οἴδημα ἐγείρων, ὅθεν καταπλούμενον καὶ τοῖς λιπαίνουσι μαλαττόμενον, τὸ ἔλλειπὲς τῆς πόσθης ἀναπληροῖ.

vnde ſuccus illitione, aut radix recens affrictu, alopecias explent. Radix ſuccuſque cum æquis ceræ thuríſque portionibus, ſugillata liuoréſque tollunt: ſed non plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat, cum melle illitus ſuccus: lepras tollit: tubercula diſcutit, peruncus cum ſulphure. In diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articulorúmque valetudinibus vtiliter illinitur. Valet ad integendam colis glandem, iis qui natura, non circunciſione, curti ſunt: tumorem enim excitat, qui pinguium fotu emollitus, præputij iacturã reſarcit.

Περὶ Σπαρτίου. Κεφ. ρνή.

Σπαρτίον θάμνος ὀζοῖ φέρων ῥάβδους μακράς, ἀφύλλους, στερεάς, εὐθραύστους, αἷς ταῖς ἀμπέλοις δεσμεύουσι· φέρει δὲ λοβοὺς ὥσπερ φασήλους, ἐν οἷς σπερμάτια φακοειδῆ· αὐξος μήλινον ὥσπερ λευκοΐου. Τούτου ὁ καρπὸς καὶ τὰ αὐξηθέντα σὺν μελικράτῳ ὁλκὴ ὀβολῶν ε. καθαίρει ἄνω μετ' ἐντάσεως ὥσπερ ὁ ἐλλέβορος ἀκονιδύνως, ὁ δὲ καρπὸς κινεῖ τὴν κάτω κάθαρσιν, καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ῥάβδων ἐν ὕδατι βεβρεχισμένων, εἶτα κοπεισῶν καὶ χυλισθεισῶν, ἰγλα-

Spartium. Cap. CLVIII.

Spartion frutex eſt, longas ferens virgas, ſine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: ſemen lenticulæ, in folliculis phaſiolorũ modo naſcés: florem, vt albæ violæ, luteum. Purgant per ſupernavehementer, hellebori vice, citra periculũ flores, & ſemina, quinis obolis in aqua mulſa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua macera tis, mox tuſis, extractus ſuccus,

ischiadicis, & angina laborãtibus auxiliatur, si cyathi modũ ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere: strigmenta autẽ elicit cruenta.

Silybum. Cap. CLIX.

Silybon, lata spina est, folia ferens chamæleonis albi. Hæc recens cum sale oleóque cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus, vomitiones ciet.

Glans vnguentaria. Cap. CLX.

Glans vnguentaria, fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanæ nucis, cuius nucleus Græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vtuntur: nascitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, recens, candida, quæ facilè delibretur. Ea drachmæ pondere pota, lienem absumit, cum lolij farina, & aqua mulsa podagricis illinitur: psoras lepráfque decocta in aceto, vitiligines & nigras cicatrices cum nitro, emendat: & cum lotio lentigines, varos & papulas in facie, & cutis vitia tollit.

Vomi-

ἰσχιαδικῶν καὶ συναγχικῶν ὄστ βοήθημα, ὅσον κύαθος εἰς πινόμενος νήστων. ἔνιοι δ' ἐναπεβρέξαντες ἅλμῃ ἢ θαλάττῃ, ἐγκλύζουσι τοὺς ἰσχιαδικούς· ὄγκοι δὲ αἱματῶδες καὶ ξυσματῶδες.

Περὶ Σιλύου. Κεφ. ρνθ'.

Σίλυον ἄκανθά ἐστι πλατεῖα, φύλλα ἔχουσα χαμαιλέοντι ὅμοια τῷ λευκῷ. ἡ τις αὐτοῦ ῥίζα ἐφθὴ σὺν ἐλαίῳ καὶ ἁλσὶ. τὸ δὲ ῥίζης ὁ ὀπὸς ὅσον ὁλκὴ πόθεὶς σὺν μελικράτῳ, ἐμέτους κινεῖ.

Περὶ Βαλάνου μυρεψικῆς. Κεφ. ρξ'.

Βάλανος μυρεψικὴ καρπός ἐστι δένδρου μυρίκῃ ἐοικότος, ὅμοιος τῷ λεγομένῳ πεντικῷ καρύῳ, οὗ τὸ ἐντὸς θλιβόμενον ὥσπερ τὰ πικρὰ ἀμύγδαλα, ἐξίησιν ὑγρὸν, ᾧ εἰς τὰ πολυτελῆ μύρα ἀντ' ἐλαίου χρῶνται· χρυσᾶται δὲ ἐν Αἰθιοπίᾳ καὶ Αἰγύπτῳ καὶ Ἀραβίᾳ καὶ ἐν τῇ κατ' Ἰουδαίαν πέτρᾳ. διαφέρει δὲ αὐτῶν νέα καὶ πλήρης, λευκή τε καὶ εὐλέπτυστος. Ἡ τις μεθ' ὁψυκράτου ποθεῖσα λεῖα ὅσον ὁλκὴν σκληρὰ πήγει καὶ καταπλάσσουσα ἐπ' αὐτὰ μετ' ἀλείνου ἀλεύρου, καὶ μετὰ μελικράτου καὶ σὺν πολυγελικῶν· σὺν ὄξει δὲ ἐφθεῖσα ἀποσμήχει ψώρας, λέπρας· σὺν νίτρῳ δὲ ἀλφοὺς, οὐλὰς μελαίνας· σὺν ὕδατι δὲ ἄρει φακοὺς, ἰόνθους, ἐφηλίδες, ἐξανθήματα ἐν προσώπου ἐμέτους.

ἐμέτους δὲ κινεῖ, καὶ κοιλίαν λύει μετὰ ὑδρομέλιτος· κακοστόμαχος δέ ὅτιν ἱκανῶς, καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς ἔλαιον τοῦτον τὴν κοιλίαν ἐπάγει, συμπικώτερος δὲ ὅτιν ὁ φλοιὸς αὐτῆς· τὸ δὲ * ἐκκοπείσης καὶ ἐνθλιβείσης αὐτῆς ἐκπίεσμα, μίγνυται σμήγμασι τοῖς πρὸς τραχύτητας καὶ κνησμοὺς ἐυδοκιμοῦσι.

Περὶ Ναρκίσσου. Κεφ. ρξά.

Νάρκισσος, ἔνιοι καὶ τοῦτο ὥσπερ τὸ κρίνον λείειον ἐκάλεσαν, τὰ μὲν φύλλα παρόσον ἔοικε, λεπτὰ δὲ καὶ μικρότερα καὶ πολὺ, καὶ στενώτερα· καυλὸν κενὸν, ἄφυλλον μείζω ἀπανθαμῶς ἐφ' οὗ ἄνθος λευκὸν ἔσωθεν δὲ χροᾶς ἔχει ἐπ' ἐνίων δὲ πορφυροειδές· ῥίζα δὲ λευκὴ, ἔνθοθεν στρογγύλη, βολβοειδὴς, καρπὸς ὡς ἐν ὑακίνθοις, μέλας, παρομοίως· φύεται ὁ κάλλιστος ἐν ὀρεινοῖς τόποις, εὐώδης· ὁ δὲ λοιπὸς παρασήσει, καὶ βοτανώδη τὴν ἀποφορὰν ἔχει. Τούτου ἡ ῥίζα βρωθεῖσα ἐφθὴ καὶ πωθεῖσα, ἐμέτους κινεῖ· ἁρμόζει δὲ καὶ πνευματώδεσι σὺν μέλιτι λεία· καὶ τοὺς ἀπὸ νεύρα διακοπὰς παρακολλᾷ καλαπλασσομένη· σὺν ῥέμματά τε σφυρῶν καὶ τὰ ἀπὸ ἄρθρα χρόνια ἀλγήματα λεία σὺν μέλιτι καταπλασθεῖσα ὀνίνησι· καθαίρει δὲ ἕφηλιν καὶ ἀλφὸν σὺν κηδῆς σπέρματι καὶ ὄξει· σὺν ὀρόβῳ δὲ καὶ μέλιτι τοὺς

Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluũ potu ciet. Cortex eius magis adstringit: verùm tusæ & expressæ succus abstergentibus medicamentis adiicitur, quæ aduersus prurigines & scabritias idonea sunt.

Narcissus. Cap. CLXI.

Narcissum sunt qui vt liliũ, lirium appellarint, folia porro similia, tenuia, multò minora, & angustiora: caulis vacuꝰ, & sine foliis, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrum, longum: probatissimus nascitur in montibus, suaui odore: cæteri porrum imitantur, atque herbaceum virus olent. Radix cocta, siue estur siue bibitur, vomitoria est: ambustis igni prodest, cum exiguo melle trita: præcisos neruos illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnísque articulorum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit: vitia cutis in facie, vitiligenésq; cum semine vrticæ, & aceto emaculat: cum eruo & melle,

vlcerum sordes expurgat: absceſſus rumpit cõcoctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaës. Cap. CLXII.

Hippophaës, quo fullones veſtes interpolant, in ſabuloſis maritimiſque naſcitur, ſurculaceo frutice, vndique denſo & largo, foliis oleæ, longioribus, mollioribúſq; inter quæ candicantes ſpinę emicant, ſiccæ, anguloſæ, interſtitio quodam diſtantes: flores hederæ corymbis ſimiles, racematim cohærent, minuſculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubeſcentes: radix lacteo ſucco madet, craſſa, mollis, amara guſtanti: ex qua, perinde ac thapſia, ſuccus eximitur, qui per ſe, & cum erui farina ſubactus, ſiccatur, & ad vſum reconditur. Syncerus pituitas, bilem, aquáſque detrahit, oboli pondere: erui verò farina ſubactus, quatuor obolis, cum aqua mulſa. Frutex cum radicibus ſiccatus tũditur, & cum aquæ mulſæ dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depromitur, vti in thapſia: huius in purgationibus modus eſt drachma.

Hippo-

ταὶ ἀκαθαρσίας τῶν ἑλκῶν ἀποκαθαίρει· καὶ τὰ δύσπεπτα τῶν ἀποσημάτων ῥήσσει· ἄγει καὶ σκόλοπας σὺν αἰείνῳ ἀλεύρῳ καὶ μέλιτι καταπλασσόμενον.

Περὶ Ἱππφαοῦς. Κεφ. ρξϛ'. 5

Ἱππφαὲς, ᾧ γλάφουσι τὰ ἱμάτια, φύεται μὲν ἐν παραθαλασσίοις καὶ ἀμμώδεσι τόποις, θάμνος δὲ ὅλος φρυγανώδης, πυκνὸς ἀμφιλεφὴς, φύλλα ἔχων μακρὰ ὡρὸς τὰ τῆ ἐλαίας, στενώτερα δὲ καὶ λεπτότερα καὶ μεταξὺ ἀκανθώδης ἑηρὰς ὑποτελεύκοις, γονιοειδεῖς, ἀπ' ἀλλήλων διεχώσας· ἄνθη κορύμβοις ἐοικότα κισσῦ, ὡς βοτρύδια προσκείμενα μήλοις, πλὴν μικρότερα καὶ μελανά, καὶ μὴ τοῦ λευκοῦ φοινίσσοντα ἐν μέσοις· ῥίζα πάχεῖα καὶ μελανή, ὀπῶ μεστὴ, γευσαμένῳ πικρὰ, ὀπιζομένη ὥσπερ θαψία. Ἀποτίθεται δὲ κατ' ἐαυτὸ ὁ ὀπὸς καὶ σὺν ὀροβίνῳ δηλέῳ ἀναλαμβανόμενος καὶ ἑηραινόμενος· καθαίρει δὲ χολῶδες, ὑδατῶδες καὶ φλεγματῶδες κάτω, ὅσον ὀβολὸς ἀκέραιος· τὸ δὲ μὴ τὸ ὀροβίνῳ τεθρύβολον σὺν μελικράτῳ καὶ ὁ θάμνος δὲ σὺν τοῖς ῥίζαις ἑηραινόμενος κόπτεται, καὶ δίδοται λεῖος μετὰ μελικράτου κοτύλης μιᾶς ἡμισείας· γίνεται δὲ καὶ χύλισμα τῆς ῥίζης καὶ τῆς πίας ὥσπερ ἐπὶ τῆ θαψίας· δίδοται δὲ τούτου < ἀ εἰς τὰς καθάρσεις.

Περὶ Ἱππο-

Περὶ Ἱπποφαίστου. Κεφ. ρξγ'.

Ἱππόφαιστον, οἱ δὲ καὶ τοῦτο ἱπποφαὲς καλοῦσι, φύεται ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις, ἐν οἷς καὶ τὸ ἱπποφαὲς, καὶ αὐτὸ γραφικῆς ἀκάνθης εἶδος ὑπάρχον· ἔστι δὲ χαμαιπετὲς, ἔχον μόνον φυλλάρια μικρὰ, ἀκανθώδη, καὶ κεφάλια χαῦνα· οὔτε δὲ χυλὸν οὔτε ἄνθος φέρει· ῥίζαν δὲ παχεῖαν καὶ μαλακὴν. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ τὴν ῥίζαν καὶ τῶν κεφαλίων χυλίσας, ξήρανε καὶ δίδου ὁλκῷ πεπωκόλου μετὰ μελικράτου ὡς βάλανον· ἡ δὲ διὰ τούτου κάθαρσις, ὕδωρ καὶ φλέγμα ἄσηθι ἰδίως ἢ ὀρθοπνοίαις ἀρμόζει καὶ ἐπιληψίαις καὶ τοῖς περὶ νεῦρα πάθεσιν ἡ διὰ τούτου κάθαρσις.

Περὶ Κίκεως. Κεφ. ρξδ'.

Κίκι ἢ κρότων, οἱ δὲ σύσαμον ἄλλοι, οἱ δὲ σίσελι κύπριον, οἱ δὲ κρότωνα ὠνόμασεν κρότων, διὰ τὸ πρὸς τὸ ζῷον ἐμφέρειαν τοῦ σπέρματος· δένδρον δέ ἐστι συκῆς μικρᾶς μέγεθος ἔχον· φύλλα δὲ ὅμοια πλατάνῳ, μείζονα δὲ καὶ λειότερα καὶ μελανίτερα· τὰ δὲ στελέχη καὶ τοὺς κλάδους κοῖλα καλάμου δίκην ἔχει· καρπὸν δὲ ἐκβόσκουσι βατράχοις, λεπιδώτοις, ὁμοίοις κρότωνι τῷ ζώῳ. Ἐξ οὗ καὶ ἀποθλίβεται τὸ λεγόμενον κίκινον ἔλαιον. ἄκρατον μὲν, ἀνίως δὲ χρήσιμον εἰς λύχνους καὶ ἐμπλάστρας καθαρτικὰς δὲ ὅσον λ' κόκκοι τοῦ ἀριθμοῦ καὶ πεπεμμένοι,

Hippophęstũ. Cap. CLXIII.

Hippophæston, id quod aliqui hippophaës appellant, nascitur eisdem locis quibus hippophaës, estque spinæ fullonię genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: foliis paruis, spinosis: radiculas habens molles, crassas. Succus radice, foliis & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in aqua mulsa, aquam pituitásque detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum vitiis, & orthopnœæ cõuenit huiusce modi purgatio.

Ricinus. Cap. CLXIIII.

CICI, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine: arbor prouenit paruæ ficus altitudine, folio platani, maiore, læuiore, & nigriore: ramis, caudicibúsque cauis in arundinis morem: semine in vuis asperis, quod corticibus exutum, ricinum animal repræsentat: ex quo oleum, nomine cicinum, exprimitur, cibis fœdum, lucernis emplastrísque vtile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas bilem

lem, aquámque per aluum extrahunt, vomitionésq; mouẽt, sed iniucũda admodum est, & molesta purgatio: siquidẽ stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varósque expurgat. Folia cum poléta trita, inflammationes oculorũ, tumoréque leniunt: rigentes mammas cohibent: eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

Tithymali. Cap. CLXV.

Tithymali genera septem, quorũ masculus characias appellatur, ab aliquib⁹ amygdaloides: alter, myrtites, qui fœmina existimatur, eumq; myrsiniten aut caryiten vocãt: tertius, paralius, quem tithymalida appellarunt: alius, helioscopius: quintus, cyparissias: sext⁹, dendroides: septimus, platyphillos dicitur. Characiæ caules supra cubiti altitudinẽ attolluntur: rubri, lacteo succo atque acri madẽtes: foliis oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearũ similes, in quibus semẽ cõtinetur: nascitur in asperis, & mõtibus. Succus aluum purgat: trahit

τες λεῖον, ἄγυιαν κ᾽ κοιλίαν φλέγμα κ᾽ χολὴ κ᾽ ὕδωρ· κινῆσι δὲ κ᾽ ἔμετον, ἔστι δὲ λίαν ἀηδὴς καὶ ἐργώδης ἡ τοιαύτη κάθαρσις· ἀναβέπουσα γὰρ μάλιστα ἰσχυρῶς· ποιεῖ σά τ᾽ κ᾽ καὶ ἀπλαθεῖσα ἰόηθες κ᾽ ἐφήλις καθαίρει. τὰ δὲ φύλλα τεθέντα μετὰ πεπάλης ἀλφίτων, ὀφθαλμῶν οἰδήματα κ᾽ φλεγμονὰς παύει κ᾽ ἀσπαργῶντας μαστοὺς, ἐρυσιπέλατά τε σβέννυσι καθ᾽ ἑαυτὰ κ᾽ μετ᾽ ὄξους καταπλασσόμενα.

Περὶ Τιθυμάλων. Κεφ. ρξέ.

Τιθυμάλων εἴδη ζ. ὧν ὁ μὲν ἄρρην χαρακίας καλεῖται, ὑπὸ δέ τινων κομήτης, ἢ ἀμυγδαλοειδὴς ἢ κωνῖτις ὀνομάζεται· ὁ δέ τις θῆλυς ἢ μυρτίτης, ὃν κ᾽ καρυΐτην ἢ μυρσινίτην καλοῦσιν· ὁ δὲ παράλιος, ὃν ἔνιοι τιθυμαλίδα ἐκάλεσαν· ὁ δέ τις ἡλιοσκόπιος. ὁ δὲ κυπαρισσίας· ὁ δὲ δενδροειδὴς· ὁ δὲ πλατύφυλλος. Τῶν δὲ χαρακιῶν καλαμώδη, καυλοὶ μὲν, ὥσπερ πῆχυν ὑπερεκτείνεις, ὑπέρυθροι καὶ λευκοῦ μεστοί· φύλλα δὲ περὶ τοὺς ῥάδδους ὅμοια ἐλαίᾳ, μακρότερα δὲ κ᾽ στενώτερα· ῥίζα ἀδρὰ καὶ ξυλώδης· ἐπ᾽ ἄκρων δὲ τῶν καυλῶν κόμη ὁμοιοειδὴς ῥαβδίων, καὶ ὥσπ᾽ αὐτῶν ὑπόκοιλα ὅμοια πυέλοισιν, ἐν οἷς ὁ καρπὸς φύεται· ἐν τραχεῖ καὶ ὀρεινοῖς τόποις. Δυνάμιν δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς καθαρτικὴν τῆς κάτω κοιλίας· ἄγων

ἄγων φλέγμα καὶ χολὴν ὀβολῶν β πλῆθος λαμβανόμενος μετ' ὀξυκράτου· σὺν μελικράτῳ δὲ καὶ ἔμετον κινεῖ. ὀπίζεται δὲ περὶ τὸν τρυγητόν. συναχθεισῶν τῶν ῥάβδων καὶ ἀποτμηθεισῶν, ἐγκλεῖσθαι δ' αὐτὰς δεῖ εἰς ἀγγεῖον. ἔνιοι δ' ὀρόβινον ἄλευρον μιγνύντες, συναναπλάσσουσιν ὀροβιαῖα μεγέθη. τινὲς δὲ εἰς τὰ ξηραινόμενα σῦκα ἀποστάζουσι σταλαγμοὺς γ' ἢ δ'. καὶ ξηραίνοντες ἀποτίθενται. καθ' ἑαυτὸν δὲ τριβόμενος ἐν θυίᾳ ἀναπλάσσεται καὶ ἀποτίθεται. ἐν δὲ τῷ ὀπίζειν οὐ δεῖ κατὰ ἄνεμον ἵστασθαι, οὐδὲ τὰς χεῖρας ἄγειν τοῖς ὀφθαλμοῖς· ἀλλὰ καὶ πρὸ τοῦ ὀπίζειν τὸ σῶμα δεῖ χρίειν στέατι ἢ ἐλαίῳ μετ' οἴνου καὶ μάλιστα πρόσωπον καὶ τράχηλον καὶ ὄσχεον, τραχύνει δὲ καὶ τὴν φάρυγγα· ὅθεν δεῖ καταπότια περιπλάττειν κηρῷ ἢ μέλιτι ἑφθῷ, καὶ οὕτως διδόναι· ἰσχάδες μέντοι δύο ἢ τρεῖς λαμβανόμεναι, αὐτάρκεις εἰσὶ πρὸς κάθαρσιν. ψιλοῖ δὲ καὶ τρίχας ὁ ὀπὸς πρόσφατος ἐπιχρισθεὶς μετ' ἐλαίου ἐν ἡλίῳ, καὶ τὰς ἐπιγινομένας δὲ ξανθὰς καὶ λεπτὰς ποιεῖ· καὶ τέλος ἐκφθείρει πάσας. ἐντίθεται δὲ καὶ τοῖς βρώμασι τῶν ὀδόντων κουφίζων τὰ ἀλγήματα· κηρῷ δὲ δεῖ τοὺς ὀδόντας ἐμπλάττειν, ἵνα μὴ παραρρυεὶς κακώσῃ.

trahit pituitam bilémque, binis obolis in poſca ſumptis: & cum aqua mulſa, vomitiones mouet. Appetente vindemiarū tempore, ſuccus congeſtis ramulis, mox diſſectis, & vaſe cōcluſis, excipitur. Aliqui adiiciūt farinam erui, & in paſtillos digerūt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternásve guttas inſtillant, vt cum his inareſcant: quas ad vſus recondunt. Per ſe etiam tuſus in pila, & in paſtillos coactus reponitur. Però cum extrahitur lac, neque quò ventus aſpiret, ſtare quéquam, neque manus oculis admouere conuenit: ſed antequam colligas, corpus, præſertim faciem, collū, ſcrotúmque genitalis, adipe aut oleo cū vino perungere. Fauces autem exaſperat: quapropter catapotia cera aut decocto melle oblini par eſt, & hoc modo dari: binas tamen ternásve ficos, purgationis gratia ſumpſiſſe, ſatis eſt. Recens lac ex oleo, perunctos in ſole capillos euellit, renaſcentesq; flauos, & exiles efficit: denique omnes perimit. Dentiū cauernis incluſum, leuat dolores: ſed cera dētes oblinendi ne ſuo delapſu, fauces

fauces & linguam vitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes verrucas, pensiles, & quæ thymi florem repræsentant. Valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas vlcerum, gangrænas, fistulásq;. Legitur semen autumno, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactúmque loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cũ lacte lepidio, & caseo cõtuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

Tithymali fœmina.

Fœmina, quam myrsiniten, aut caryiten vocarunt, similis suapte natura daphnoidi: foliis myrthi, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungẽtibus: ramulos ab radice mittit dodrantales: fructum fert alternis annis, nuci similem, mordaci gustu: nascitur & hęc in asperis. Succus, radix, semẽ, folia, consimilem antedicto sortiũtur facultatem: sed ad citandas vomitiones inualidior hęc est.

Aliud

κακώσῃ τὴν φάρυγγα ἢ τὴν γλῶτταν. αἴρει δὲ καὶ μυρμηκίας, καὶ ἀκροχορδόνας καὶ θύμους καὶ λειχῆνας ἐπιχριόμενος. ἁρμόζει καὶ πρὸς πτερύγια καὶ ἄνθρακας, φαγεδαίνας, γαγγραίνας, σύριγγας. καὶ ὁ καρπὸς δὲ φθινοπώρῳ συλλεγεὶς, καὶ ξηρανθεὶς ἐν ἡλίῳ, κοπεὶς τε κούφως καὶ ἀποβρασθεὶς καθαρῶς ἀποτίθεται. καὶ τὰ φύλλα ὁμοίως ξηρά. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα τὰ αὐτὰ τῷ ὀπῷ, πλῆθος ἡμίσεος ὀξυβάφου ποτιζόμενα. ἔνιοι δὲ καὶ ταριχεύουσιν αὐτὰ, μιγνύντες τῷ διὰ τοῦ γάλακτος λεπιδίῳ, καὶ τυρῷ κοπτῷ. καὶ ἡ ῥίζα δὲ ἐμπασθεῖσα < α. σὺν ὑδρομέλιτι καὶ ποθεῖσα, ἄγει κατὰ κοιλίαν, ἑψηθεῖσα δὲ σὺν ὄξει καὶ διακλυζομένη, ὀδονταλγίας βοηθεῖ.

Περὶ τοῦ θήλεος.

Ὁ δὲ θῆλυς, ὃν ἔνιοι μυρσινίτην ἢ καρυΐτην ἐκάλεσαν, προσεμφερὴς τῷ δαφνοειδεῖ τὴν φύσιν· καὶ τὰ φύλλα ὅμοια ἔχει μυρσίνῃ, μείζονα δὲ καὶ στερεὰ, ἐπ' ἄκρου ὀξέα καὶ ἀκανθώδη· κλήματα δὲ ἀπὸ τῆς ῥίζης σπιθαμιαῖα ἀφίησι· τὸν δὲ καρπὸν φέρει παρ' ἐνιαυτὸν καρύῳ ὅμοιον, ἡσυχῆ δάκνοντα τὴν γλῶσσαν· ἐν τραχέσι δὲ χωρίοις καὶ οὗτος φύεται. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα ὁμοίαν τῷ περὶ αὐτοῦ· ἐμετικώτερος μέν τοι ἐκεῖνος τούτου ἐστίν.

Περὶ τοῦ

Πρὶ τῦ παραλίυ.

Ὁ δὲ παράλιος λεγόμυος πιθύμαλος, ὃν ἔνιοι πιθυμαλίδα ἢ μίχωνα ἐκάλεϱ φύεϱ ἐν παραθαλαττίοις τόποις. κλῶνας δὲ ἔχει πιθαμιαίυς ὑφϱύθρυς, ἐξ ἧς ἀπὸ τῆ ῥίζης, ϖελέας τὰ φύλλα στοιχηδὸν μικρὰ, ὑποστενα, ϖεμμικνα, ἐοικότα λίνῳ· κεφαλὴ δὲ ἐπ' ἄκρυ ϖεφυϱεγμένη, ὡς ἡ ὁ καρπὸς ὡς ὄϱεγδος, ποικίλος, ἀνθῶν λευκά. ὅλος ὃ ὁ θάμνος χϱῆται καὶ ἡ ῥίζα, ὁποῖα λευκῶ μεθ' ὑδατος καὶ ἀπόθεσις, ὅμοια δὲ τοῖς ϖεφϱεμμένοις.

Aliud tithymali genus.

Aliud tithymali genꝰ dicitur paralios, quē tithymalida, aut mecona aliqui appellauere: nascitur ī maritimis, ramis subrubētibus, palmū altis, quinis, senísve à radice exeūtibus: foliis lini, anguſtis, paruis, oblógis, in verſus quoſdā digeſtis: capite in cacumine orbiculato, ī quo ſemen, vt eruum, vario colore emicat: flos albus. Frutex totus cū radice lacteo ſucco turget. Similes ad vſus reconditur.

Πρὶ τῦ ἡλιοσκοπίυ.

Ὁ δὲ ἡλιοσκόπος λεγόμυος, ἄνθϱάχνῃ ὅμοια φύλλα ἔχει, λεπτότερα δὲ καὶ ϖεφϱέδρα· κλῶνας δὲ ἀφίησιν ἀπὸ τῆ ῥίζης δ' ἢ ἑπτὰ θαμιαίυς, λεπτοὺς καὶ ἐρυθϱοὺς, ὁποῖα λευκῶ, μεσοὺς ϖολλῶ· κεφαλὴ δὲ ἀνθοειδὴς· καὶ ὁ καρπὸς δὲ ὥσϖεϱ ἐν κεφαλίοις, συμϖεφέϱεται δὲ τότε ἡ κόμη τῇ τῦ ἡλίυ κλίσει. ὅθεν καὶ ὀνόμασται ἡλιοσκόπος ἔν ἐνίοις δὲ μάλιστα καὶ ϖεὶ ταῖς ϖόλεις φύεται. συλλέγεται δὲ ὁ ὀπὸς καὶ ὁ καρπὸς ὥσϖεϱ καὶ τῶν ἀνῶν. Δυώαμιν ἔχων τὴ ἀυτὴ τοῖς ϖϱοτέϱοις, ἀλλ' ἀσθενέστεϱος ὀπτεταμένος.

Heliosſcopius.

Helioſcopius dicitꝰ, foliis portulacæ, tenuioribus, rotūdioribusq; : ramulis prodeúnbus à radice, quatuor aut quinq;, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copioſi plenis: capite anethi: ſemine velut in capitulis incluſo: Helioſcopi nomen accepit, quoniā comas cum ſole circumagat: circa oppida naſcitur, potiſsimū in ruderibus. Colligitur ſuccus ſeménque, vt aliorum. Eædem quæ ſuperioribus vires, non tamen vſque adeò validæ.

Πρὶ Κυπαϱυσσίυ.

Ὁ δὲ κυπαϱυσσίας, καυλὸν μὲν αὐίνιον ϖαθαμιαῖον, ἢ καὶ μείζονα, ὑϖόξυθϱον, ἐξ οὗ βεβλάστηκε τὰ φύλλα τοῖς τῆς ϖίτυος ὅμοια, στυφεϱώ-

Ciparíſsias.

CIPARISSIAS in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, ſubrubrū: ex quo folia picæ ſimilitudine exoriuntur, molliora

molliora tamẽ, & tenuiora: & in totum naſcẽtem piceam æmulatur, vnde nomen traxit. Candido ſucco madet, cui eadem vis quæ ſuperioribus.

Aliud dendroides nominatum.

In petris naſcens, dendroides cognominatur. ampliter opacat, in cacumine frondoſam ſpargens comam, ſucco lacteo prægnans, cauliculis rubẽtibus: foliis myrti tenuioris: fructu characiæ. Eiuſdem effectus, cuius ſuperiores, ſimiliq; modo reconditur.

Platyphyllos.

PLATYPHLLOS, verbaſco ſimilis eſt. Radix, ſuccus, & folia, per inferna trahunt aquas. Piſces necat, tuſus, & aquæ inſparſus. Reliqua tithymalorũ genera quæ ſuprà ſcribuntur, idem efficiunt.

Pityuſa. Cap. CLXVI.

Pityuſam ſpecie à cypariſſia differre conſtat, etſi tithymalorum generi aſſignetur. caulis ſupra cubiti altitudinem aſſurgit, geniculatus: foliis piceæ, acutis, exilibus: flore paruo: velut purpureo: ſemine inſtar lenticulæ, lato: radice craſſa, candida, ſucco referta, quibuſdam

πυροδώτερα μὴν τοι ἢ λεπτότερα· καὶ καθόλου ἔοικε πίτυϊ ἀρτιφυεῖ· ὅθεν καὶ ὠνόμασται. πεπλήρωται δὲ ἢ ὅτου ὀπῆς λευκῆς. Διύαμιν δ' ἔχει ὁμοίαν τοῖς πρὸ αὐτῆς.

Περὶ τῆς ἐν πέτραις πόας φυομένης.

Ὁ δὲ ἐν πέτραις φυόμενος δενδροειδὴς δὲ καλούμενος, ἀμφιλαφὴς αὔξεται καὶ πτύκωμος, ὀπῆς μεστὸς, ὑπόρυθρος τοὺς κλάδους· πρὸς οὓς τὰ φύλλα μυρσίνης λεπτῆς προσεοικότα· καρπὸς δὲ ὅμοιος τῷ τῆς χαρακίας, παραπλησίως δὲ καὶ ἢ ὅτου ἀποτίθεται. καὶ ἐνεργεῖ ὁμοίως τοῖς προγεγραμμένοις.

Περὶ Πλατυφύλλου.

Ὁ δὲ πλατύφυλλος φλόμῳ ἔοικε. καὶ αὐτῆς ἡ ῥίζα καὶ ὁ ὀπὸς καὶ τὰ φύλλα, ἄγει ὑδατώδη κοιλίαν· ἀποκλείνει δὲ καὶ τοὺς ἰχθύας κοπεὶς καὶ διεδεὶς τῷ ὕδατι· καὶ οἱ προσεχόμενοι τὸ αὐτὸ δρῶσι. Περὶ Πιτυέσης. Κεφ. ρξς'.

Πιτύωσα, οἱ δὲ κλῆμα, οἱ δὲ χαμαιτέλιον, οἱ δὲ παρώλιον, οἱ δὲ χαιροπικὸν καλοῦσιν· εἶδει δοκεῖ διαφέρειν τῆς κυπαρισσίτιδος πυθμάκι· ὅθεν καὶ εἴδους ἐν αὐτοῖς καταριθμεῖται. ἀνίκα δὲ χαυλὸν πήχεως μείζονα πολυγόνατον φυλλαρίοις ὀξέσι, λεπτοῖς καλλιμμένον, ἐμφέρεσι τοῖς τῆς πίτυος· αὐθὶς μικρὰ ὡσεὶ περφυρᾶ καρπὸν ἢ πολλὴν ὡς φασκόν· ῥίζαν λευκὴν, παχεῖαν ὅπῃ μεστὴν οὐρίσκει

εὑρίσκεται δὲ κατὰ τόπους σφόδρα εὐμεγέθης ὁ θάμνος. Καθαίρει δὲ κάτω ἡ μὲν ῥίζα, < β. ὁλκὴ δοθεῖσα σὺν μελικράτῳ· τοῦ δὲ καρποῦ ά. τοῦ δὲ ὀποῦ ὅσον κοχλιάριον ἐν καταποτίῳ ἀναληφθέντος ἀλεύρῳ· τῶν δὲ φύλλων ὁλκαὶ γ΄.

Περὶ Λαθυρίδος. Κεφ. ρξζ΄.

Λαθυρὶς, οἱ δὲ, καὶ ταύτην τιθύμαλον καλοῦσι, καταριθμοῦνται τινὲς καὶ αὐτὴν ἐν τοῖς τιθυμάλοις, καυλὸν ἀνίησι πήχεως τὸ ὕψος, κενὸν, πάχος δακτύλου· ἐπ' ἄκρου δὲ αὐτοῦ μασχάλαι· φύλλα δὲ τὰ μὲν ἐπὶ τοῦ καυλοῦ ἐπιμήκη, ὅμοια τοῖς τῆς ἀμυγδαλῆς, πλατύτερα δὲ καὶ λειότερα· τὰ δ' ἐπ' ἄκρων τῶν κλωνίων μικρότερα, ὥσπερ ἀριστολοχίας ἢ κισσοῦ τοῦ ἐπιμήκους. καρπὸν δὲ ἔχει ἐπ' ἄκρων τῶν κλάδων τρίχωρον, περιφερῆ ὥσπερ κάππαριν, ἐν ᾧ τρία σπερμάτια διειργόμενα ἐλύτροις ἀπ' ἀλλήλων, περιφερῆ, μείζονα ὀρόβων· λεπισθέντα δὲ λευκὰ καὶ γλυκέα ἐν τῇ γεύσει. ῥίζα λεπτὴ, ἄχρηστος, ὅλος δὲ ὁ θάμνος ὀποῦ μεστὸς ὥσπερ τιθύμαλος. Δύναμιν δὲ ἔχει καθαρτικὴν κοιλίας τὰ σπέρματα, ὅσον ζ΄ ἢ η΄. τὸν ἀριθμὸν λαμβανόμενα ἐν καταποτίῳ, ἢ ἐσθιόμενα καὶ καταπινόμενα μετ' ἰσχάδων ἢ φοινίκων, ὕδατος ψυχροῦ ἐπιρροφου-

dam in locis frutex hic prægrã dis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabꝰ data in aqua mulſa: item ſeminis drachma: ſucci cum farina ſubacti cochlearium, in catapotio datur: modus foliorum drachmæ tres.

Lathyris. Cap. CLXVII.

Lathyris, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adſcribunt, caulẽ emittit cubiti altitudine, & digitali craſsitudine, inanẽ: gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblõga, amygdalinis proxima, latiora, & lęuiora: quæ autẽ in ſummis ramulis exierunt, minora conſpiciuntur, ariſtolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum ſummis ſurculis gerit, triplici loculamẽto inſignem, rotundũ, ceu capparim, in quo grana incurſantibus membranis inter ſe diſtincta continentur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuũtur, cãdida ſunt, & guſtu dulcia: Nullus radicis vſus. totus frutex lacteo ſucco turget, vti tithymalus. Grana ſex aut ſeptem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant: ſed aqua frigida poſtea

ſtea ſorbenda: trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquuntur ad eoſdem effectus.

ἐπιρροφούμενος· ἄγει δὲ φλέγμα καὶ χολὴν καὶ ὕδωρ. καὶ ὁ ὀπὸς ἀναληφθεὶς ὥσπερ ὁ τοῦ τιθυμάλου τὸ αὐτὸ ποιεῖ. συνέψεται δὲ καὶ ὄρνιθι ἢ λαχάνοις τὰ φύλλα πρὸς τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν.

Peplus. Cap. CLXVIII.

PEPLOS frutex eſt lactei ſucci plenus, foliis paruis, vt rutæ, paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi reſperſa: ſemine ſub foliis rotundo, minore quàm candidi papaueris: pluribus ſcatet auxiliis, vnicam radicem habet, ſuperuacuam, ex qua fruticat: naſcitur inter vites, & in hortis. Colligitur meſsibus: ſiccatur in vmbra, & continuè verſatur. Fructus tuſus, & feruefactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto: obſonij inſperſa conturbat aluum: muria conditur.

Περὶ Πέπλου. Κεφ. ρξη.

Πέπλος, οἱ δὲ, συκῆν, οἱ δὲ μήκωνα ἀφρώδη καλοῦσι, θαμνίσκος ἐστὶν ὀποῦ λευκοῦ μεστὸς, ἔχων φύλλον μικρὸν, ὅμοιον πηγάνῳ, πλατύτερον δέ· ἡ δὲ σύμπασα κόμη ὡς σπιθαμῆς, περιφερὴς, ἐκκεχυμένη ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ ὑπὸ τοῖς φύλλοις καρπὸς μικρὸς, στρογγύλος, ἥττων τῆς λευκῆς μήκωνος· πολύχρηστος δὲ ἡ πόα ῥίζαν ἔχουσα μίαν ἄχρηστον, ἀφ' ἧς ὅλος ὁ θάμνος πέφυκε· γίνεται δὲ ἐν κήποις καὶ ἀμπελῶσι. Συνάγεται ἐν πυραμητῷ ξηραινομένη ἐν σκιᾷ, καὶ συνεχῶς στρεφομένη. ἀποτίθεται δὲ ὁ καρπὸς κοπεὶς καὶ ἀποβρασθείς. ἄγει δὲ φλέγμα καὶ χολὴν ὀξυβάφου πλῆθος, μετὰ ὑδρομέλιτος *κυάθου πινόμενος· καὶ ἐν *προσοψήμασι δὲ μιγνύμενος ταράσσει τὴν κοιλίαν, ταριχεύεται δὲ εἰς ἁλμαίας.

Peplis. Cap: CLXIX.

Peplis, quam aliqui ſylueſtrẽ portulacam vocant. Hippocrates pepliõ, in maritimis maximè naſcitur, latè opaco frutice: candidi ſucci pleno: foliis ſatiuæ

Περὶ πεπλίδος. Κεφ. ρξθ.

Πεπλὶς, οἱ δὲ ἀνδράχνην ἀγρίαν, Ἱπποκράτης δὲ πέπλιον καλεῖ· φύεται μάλιστα ἐν παραθαλασσίοις τόποις, θάμνος ἀμφιλαφὴς, ὀποῦ μεστὸς λευκοῦ· φύλλα ἔχων

ἔχων ὅμοια τῇ κιττίκῃ ἀνδράχνῃ, φερόμενα δὲ καὶ ἐπὶ τὰ κάτω ἔχοντα εὐθυτενῆ· καὶ ὁ καρπὸς δὲ στρογγύλος ὑποκάτω τῶν φύλλων, ὥσπερ τὸ πέπλιον, πυρώδης τὴν γεύσιν, ῥίζα λεπτὴ, μία, ἄχρηστος. συλλέγεται δὲ καὶ ἀποτίθεται, καὶ δίδοται ὥσπερ ὁ πέπλος, καὶ ταριχεύεται. Δυνάμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτήν.

Περὶ Χαμαισύκης.

Κεφ. ρό.

Χαμαισύκη, οἱ δὲ συκῆν καλοῦσιν, κλῶνας ἀνίησι τρεῖς ἢ πέντε ἐπὶ γῆς ἐρριμμένους, φερομένους, ὅπου μεσοῦσι· φύλλα φακοειδῆ, τῷ πέπλῳ ὅμοια, μικρὰ, λεπτὰ πρὸς τὴν γῆν· καρπὸς δὲ ὑπὸ τοῖς φύλλοις στρογγύλος ὡς πέπλου· οὔτε δὲ αὐλὸς, οὔτε κλῶν ἔχει· ῥίζαν λεπτὴν καὶ ἄχρηστον. Δυνάμιν δὲ ἔχουσιν οἱ χλωροὶ λειανθέντες σὺν οἴνῳ, τὰς πρὸ μιᾶς ἡμέρας ὀδύνας παύειν, ἐπὶ πόσου προσπιττόμενοι· καταπλασσόμενοι δὲ οἰδήματα ἀφροχρῶτας καὶ μυρμηκίας ἀφιστᾶσιν· ἐφθοὶ δὲ ἐσθιόμενοι κοιλίαν ἐκλύουσι. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν δὲ ὁπὸς τὰ αὐτὰ δρᾷ καὶ καταχριόμενος, σπερπόντιον πληγὴν, βοηθεῖ· ἁρμόζει καὶ πρὸς ἀμβλυωπίαν καὶ ἀχλῦ, καὶ ἀφροφθάλμους ὑποχύσεις, οὐλὰς, νεφέλια, σὺν μέλιτι ἐγχριόμενος. φύεται δὲ πετρώδεσι καὶ ἀνύδροις τόποις,

satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub foliis rotundo, vti in peplo, fer uente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi ac dari, vti peplos, & sale cõdiri solet. Eadem habet vires.

Chamæsycè. Cap. CLXX.

CHAMÆSYCEN aliqui sycen nominant, ramos emittit quaternûm digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, peplum planè referentia, tenuia, quæ à terra non attollũtur: semine sub foliis rotundo, vt in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedant in pessō appositi: tollunt tumores ac verrucas omnium generum illiti: decoctorum cibo, aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest: illitus contra scorpionis ictum auxiliatur: aduersus caligines oculorum vtilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosisque nascitur.

Scãmonia. Cap. CLXXI.

Scãmonia, ramos ab vna radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant: foliis helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotũdo, in calathi modũ cauo, grauiolente: radice prælõga, crassitudine cubitali, cãdida, graui odore, succo grauida. Legif ad hunc modũ succus: Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excauatur, quo fit vt in cauũ confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandũ foliis, profundũt succum, siccatumq; extrahũt. Laudatur autẽ scãmoniũ leue, niti dum, rarũ & colore quãsimillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportat. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat (hoc enĩ euenit adulterato, qđ admisto fit tithymali lacte) sed lõgè magis antea narratis. item si non veheméter linguam exurat, id quod misti tithymali argumẽtum est. Natione autẽ Syriacũ & Iudaicũ deterrima habetur, grauia,

Περὶ Σκαμμωνίας. Κεφ. ροδ.

Σκαμμωνία κλῶνας ἀνίησι πολλοὺς, ἀπὸ μιᾶς ῥίζης τειπήχεις, λιπαροὺς, ἐμφαίνοντας* τὸ παχύτητος· καὶ τὰ φύλλα δὲ δασέα. ὅμοια ἑλξίνῃ ἢ κισσῷ, μαλακώτερα μὴν τοι καὶ περιφερῆ, κοῖλα ὡς οἱ κάλαθοι, βαρύοσμα· ῥίζα δὲ ἐυμήκης, παχεῖα ὅσον* πῆχυς, λευκὴ βαρύοσμος, ὁποῦ μεσή. Συλλέγεται δὲ ὁ ὀπὸς τῆς κεφαλῆς ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀφαιρεμένης, καὶ θολοῦδες ἐμπομένης εἰς κοιλότητα, συῤῥεῖ γὰρ εἰς αὐτὴν ὁ ὀπὸς καὶ οὕτως ἀναλαμβάνεται εἰς μύκητας. ἔνιοι δὲ τὴν γλυφὴν ὀρύξαντες, θολοῦδες καρύας φύλλα ὑποθέντες, κατέχουσι τὸν ὀπὸν, καὶ οὕτω ξηραινόμενα ἀναιροῦνται. ἔστι δὲ καλὸς ὁ λιανὴς καὶ κοῦφος, ἀραιὸς, πανεσχολωδὴς τὴν χρόαν, σύριγγας ἔχων λεπτὰς, σφογγώδης, τοιοῦτος δὲ ἔστιν ὁ ὀλίγιστα τῆς κατὰ τὴν ἀσίαν κομιζόμενος. μὴ ἱκανὸν δὲ μόνον τῷ λευκαίνεσθαι αὐτὸν, κατὰ τὴν τῆς γλώττης ἕξιν (τοῦτο γὰρ γίνεται καὶ παραμιγνύντος αὐτῷ ὀπὸν τιθυμάλου) μᾶλλον δὲ τοῖς περιφλεγμένοις. καὶ τῷ μὴ λίαν πυροῦν τὴν γλῶσσαν, ὅπερ γίνεται τιθυμάλου μιγνύντος. ὁ δὲ συνειλὸς καὶ ὁ ἐν Ἰουδαίᾳ γινόμενος χείριστος βαρεῖς, πυκνοὶ, δολώδεις

δολόμυμοι πτυσμάλω, ἢ ὀροβίνῳ ἀλεύρῳ. Δυώμιον δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς ληφθεὶς σὺν μελικράτῳ, ἢ ὕδατι πλῖδος < ἢ τεβωλόλου, καθαίρει κάτω χολὴν καὶ φλέγμα. εἰσὶ δὲ τὸ λύσαι τὴν κοιλίαν ἀρκέσουσιν ὀβολοὶ β'. μετὰ σησάμου ἢ πυὸς ἄλλου σπέρματος λαμβανόμενοι. δίδοται δὲ πρὸς ἐνεργεστέραν κάθαρσιν τοῦ μὲν ὀπὸς τεβόλου, ἐλλεβόρε δὲ μέλανος ὀβολοὶ β'. καὶ ἄλόης < ά. σκευάζονται δὲ καὶ ἄλες καθαρτικοὶ πρὸς κυάθους ς'. τῶν ἁλῶν ὁλκὴν κ'. τῆς σκαμμωνίας τοῦ ὀπτοῦ μιγνυμένου. λαμβάνεται δὲ πρὸς δυώμιν τὸ μὲν τέλειον, τρία κοχλιάρια· μέσον δὲ β'· τὸ δὲ ἐλάχιστον ά. καθαίρει δὲ καὶ τῆς ῥίζης < ά. ἢ β'. σὺν οἷς εἴρηται. ἔνιοι δὲ ἀφέψοντες αὐτὴν, πίνουσι. σὺν ψηδεῖσα δὲ ὄξει καὶ λιανθεῖσα μετὰ ἀλεύρου κριθίνου, ἰσχιαδικῶν ἐστι κατάπλασμα. ὁ δὲ ὀπὸς πρὸς τοὺς ἐμμένοντας ἐν ἐείῳ τῇ μήδρᾳ, ἔμβρυα φθείρει. διαφορεῖ δὲ καὶ φύματα σὺν μέλιτι ἢ ἐλαίῳ καταχριόμενος· ἐψηθεὶς δὲ ἐν ὄξει καὶ καταχρισθεὶς, λέπρας ἐξάγει· κεφαλαλγίας τε χρονίας ἐστὶν ὀπὶ ῥεῦμα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ.

Περὶ Χαμελαίας. Κεφ. ροβ'.

Χαμελαία, οἱ δὲ πυρὸς ἄχνη ἢ ἄκανθος, οἱ δὲ κόκκος κνίδειος· κλῶνας

grauia, densa, erui farina, & tithymalo vitiata. Succi drachmæ vnius aut quaternûm obolorum pondere hausſtus, ex aqua pura vel mulsa, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum sesama, alióve semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris purgatiõis causa, succi tres oboli, cum duobus veratri nigri & aloës drachma vna. Fiunt purgatorij sales, drachmis viginti succi scãmoniæ, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportione virium: integer quidem, tria cochlearia: medius, duo: minimus, vnum. Radicis drachmæ vna aut altera purgat, cum iis quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum ordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis vtili. Partus enecat succus, vuluæ in lana subditus: tubercula discutit cum melle aut oleo illitus: decocto in aceto perunctę lepræ abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

Chamelæa. Cap. CLXXII.

Chamelæa surculosa fruti-

cat, ramis dodrantalibus: folia oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gusta ta linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilémque, foliis præsertim in catapotio deuoratis: nãque duæ absinthij partes, adiecta chamelææ vna, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur: ea autem in vẽtre non liquescunt: siquidem quotquot fuere deuorata, regeruntur. Foliis cum melle tritis sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa. Cap. CLXXIII.

THYMELÆA est, qua granum gnidium, quod est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apolinum vocant, quoniam satiui lini frutex suapte natura similitudinem referat. Virgas ædit perpulchras, multas, tenues, binûm cubitorum altitudine: foliis chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisq; si mordeãtur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia viret, & tãdem rubescit: inuolucrum fructus durũ, foris nigrum intus album. Hoc per inferna bilem, pituitam, aquasq;

κλῶνας μ῍ ἔχει ποδαμιαίους, ὁ δ᾽ θάμνος φρυγανώδης· φύλλα ἔχει ἐλαίᾳ παραπλήσια, λεπτότερα δὲ καὶ πυκνὰ, καὶ πικρὰ, δάκνοντα τὰς γλῶσσαν, καὶ χαράττοντα τὰς ἀρτηρίαν. Ταύτης τὰ φύλλα κάτω καθαίρει φλέγμα καὶ χολὴν, μάλιστα ἐὰν καταποτίῳ λαμβανόμενα. μιγνυμένου δὲ ταλασίνου ἀφύτου πρὸς τὸ μέρος τῆς χαμελαίας ἀναλαμβανέσθω δὲ ὕδατι ἢ μέλιτι εἰς καταπότιον ἕως δὲ ἄπεπτα. δεῖ δὲ ἀχωρεῖται ὧν ὅσα λαμβάνει). ἀναλαμβανόμενα λεῖα τὰ φύλλα μετὰ μέλιτος ἀνακαθαίρει τὰ ῥυπαρὰ ἕλκη καὶ ἐξαρωμένα.

Περὶ Θυμελαίας. Κεφ. ροϛ΄.

Θυμελαία, οἱ δὲ χαμελαίαν, οἱ δὲ πυρὸς ἄγχιλυν, ἢ κίστρον ἢ κνίδωρον καλοῦσιν, ἐν ταύτης ὁ κνίδειος κόκκος καρπὸς ὢν συλλέγεται). ὃν* ἐυδοξεῖς μ῍ αὐτόλινον καλοῦσιν, οἱ δὲ λῖνον, διὰ τὸ εἶναι τῷ ἀπαρτῷ λίνῳ θάμνον ἢ φύσει παρόμοιον. ῥάδιος ἡ ἀνίσου καλαὶ καὶ πολλαὶ ὅσον διπήχεις· τὰ δὲ φύλλα χαμελαίᾳ ὅμοια, πλὴν στενώτερα καὶ λεπτερώτερα ὑπόγλισχρα ἐν τῷ διαμασᾶσθαι καὶ κολλώδη· αὐθη λευκὰ· καὶ μεταξὺ αὐτῶν ὁ καρπὸς, ὡς μύρτον μικρὸς, στρογγύλος, ἐν ἀρχῇ μὲν χλωρὸς, αὖθις δὲ ἐρυθρός· τὸ δὲ ἄκαρπον σκληρὸν καὶ μέλαν, τὸ δ᾽ ἐντὸς λευκόν. Ο οὖν καθαίρει κάτω χολὴν καὶ φλέγμα

καὶ

καὶ ὕδωρ, ὅσον κ΄. κόκκων τὸ ἐντὸς ποθέν· καίει δὲ τὴν φάρυγγα. διὸ μετὰ ἀλεύρου ἢ ἀλφίτου δοτέον, ἢ ἐν ῥαγὶ σταφυλῆς ἢ μέλιτι ἑφθῷ περιειλημμένον καταπιεῖν. συγχρίειν δὲ καὶ τοὺς δυσιδρῶς λεῖον μετὰ νίτρου καὶ ὄξους. τὰ δὲ φύλλα ἅπερ ἰδίως καλεῖται κνέωρον, συλλέγειν δεῖ περὶ τὸν πυραμητὸν, καὶ ἀποτίθεσθαι ξηράναντας ἐν σκιᾷ. διδόντας δὲ δεῖ κόπτειν καὶ ἀφαιρεῖν τὰς ἐν αὐτοῖς ἶνας. καθαίρει δὲ ἐπιπλασσόμενον ὅσον ὀξυβάφου πλῆθος μετὰ κράματος ἄγον ὑδατώδη· μετριωτέραν δὲ ποιεῖ τὴν κάθαρσιν μιχθὲν ἑφθῇ φακῇ καὶ λαχάνοις τριπτοῖς. ἀποτίθεται δὲ λεῖα ἀναληφθέντα ὄμφακος χυλῷ εἰς ἀρτίσκους. ἔστι δὲ κακοστόμαχος ἡ βοτάνη· προστεθεῖσα δὲ ἔμβρυα κτείνει. φύεται ἐν ὀρεινοῖς καὶ τραχέσι τόποις. Πλανῶνται δὲ νομίζοντες τὸν κνίδειον κόκκον, τῆς χαμελαίας εἶναι καρπὸν, ἀπατώμενοι διὰ τὸ τῶν φύλλων ὁμοειδές.

Περὶ Ἀκτῆς. Κεφ. ροδ΄.

Ἀκτὴ δισσή ἐστιν· ἡ μὲν γάρ τις ἐστὶ δενδρώδης, κλάδους καλαμοειδεῖς ἔχουσα, στρογγύλους, ὑποκοίλους, ὑπολεύκους, εὐμήκεις· τὰ φύλλα γ΄ ἢ δ΄. ἐκ διαστημάτων περὶ τὴν ῥάβδον, καρύᾳ βασιλικῇ ὅμοια, βαρύοσμά τε καὶ * τμητικώτερα· ἐπ' ἄκρων δὲ τῶν κλάδων ἢ τῶν

aquasq; detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur: verùm fauces adurit. Itaq; cum farina aut polenta, aut in vuæ acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari. Qui ægrè desudant, trito semine cũ nitro & aceto, inunguntur. Folia, quæ peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in vmbra recondi. Quibus dare libeat, anteà tundere, & neruos eximere conuenit. Illitum acetabuli modo cũ diluta vini potione, aquá extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut cõtritis oleribus. Thymelææ farina vuæ acerbæ succo excipit, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus impo sita necat. Nascitur in mõtibus & asperis. Hallucinãtur, q̃ coccon gnidium fructũ esse chamelææ existimãt, decepti quadam foliorum similitudine.

Sãbucus. Cap. CLXXIIII.

Sãbuci duo genera: vnũ in arboré assurgit, surculos spargés arũdinaceos, teretes, cauos, cãdicãtes, ꝓceros: folia iuglandis, terna quaternáve, ex interuallis circa ramos exeunt, grauia odore, minutim in ãbitu secta: & in ramulorum cacuminib⁹,

 cauli-

cauliculisq; circinatæ vmbellæ, quæ florem candidum parunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, vinosumq;.

Chamæacte. Cap. LXXV.

Alterum genus, Chamæacte vocatur, Romanis ebulum longè humilius est, magísque herbaceo generi assignãdum, caule quadrangulo, geniculato: foliis amygdalæ, ex interuallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatísque, graueolentibus, in ambitu serratis: muscario sambuci: flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem vtriusque vis, & vsus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum more coquuntur, ad pituitam bilémque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adiuuat: prodest viperarum morsibus, eodem pota modo: vuluas emollit insidentium decocto, patefacit earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem fungũtur munere: denigrant capillos illiti.

Folia

ἢ τῶν χαμαιλῶν, σκιάδια ἀφειδρῆ, ἔχοντα ἄνθη λευκὰ· καρπὸν δ' ἐοικότα τερμίνθῳ ἐν τῷ μέλανι ὑποπόρφυρον, βοτρυώδη, πολύχυλον, οἰνώδη.

Περὶ Χαμαιάκτης. Κεφ. ροέ.

Τὸ δὲ ἕτερον αὐτῆς χαμαιάκτη καλεῖται· αὕτη χαμαιπετὴς ὖσα ἐλάσσων ὀξὶ καὶ βοτανωδεστέρα, χαμαλὸν ἔχουσα τρίγωνον καὶ πολυγόνατον· τὰ δὲ φύλλα ἐν διασημάτων ἕκαστον γόνυ τετραφυῆ μύα, ὅμοια ἀμυγδαλῇ, κεχαραγμένα δὲ κύκλῳ καὶ μακρότερα, βαρύοσμα· σκιάδιον δὲ ἐπ' ἄκρῳ ὅμοιον τῇ περὶ αὐτὴ ἔχουσα, καὶ αὐτὸς καὶ καρπὸν· ῥίζα δ' ὑπέστι μακρὰ, δακτύλῳ παχος. Δύναμις δὲ ἡ αὐτὴ ἀμφοτέρας καὶ χρῆσις, ἐκπεπτική, ὑδραγωγὸς, κακοστόμαχος μὴν τοι ἐνόμβα δὲ τὰ φύλλα ὡς λάχανα, καθαίρει φλέγμα καὶ χολήν. καὶ οἱ χαμλοὶ δὲ ἁπαλοὶ ἐν λοπάδι ἐφθέντες τὰ αὐτὰ ποιοῦσιν. ἡ ῥίζα δὲ αὐτῆς ἀφεψηθεῖσα σὺν οἴνῳ καὶ διδομένη πρὸ πλοῦ δίαιταν, ὑδρωπικοὺς ὠφελεῖ· βοηθεῖ καὶ ἐχιοδήκτοις ὁμοίως πινομένη· ἀφεψηθεῖσα δὲ μετ' ὕδατος, ἐγκάθισμα. μαλάσσει ὑστέραν καὶ ἀναστομοῖ, καὶ διορθοῦται τὰς περὶ αὐτὴ διαθέσεις. καὶ ὁ καρπὸς ὁ σὺν οἴνῳ πεσθεὶς, τὰ αὐτὰ ποιεῖ· μαλάσσει δὲ καὶ τείχας ἐγχριόμενος·

τὰ

τὰ δὲ φύλλα πρόσφατα καὶ ἁπαλὰ, φλεγμονὰς πραΰνει μετ᾽ ἀλφίτων καταπλασσόμενα· καὶ κατακαύμασιν ἁρμόζει καὶ κυνοδήκτοις καταπλασσόμενα· κολλᾷ δὲ ὑποφοράς, καὶ ποδαγρικοῖς βοηθεῖ, μετ᾽ στέατος ταυρείου ἢ τραγείου καταπλασσόμενα.

Περὶ πυκνοκόμου. Κεφ. ροϛ'.

Πυκνόκομον φύλλα ἔχει ὅμοια εὐζώμῳ, τραχέα δὲ καὶ παχέα καὶ δριμύτερα· καυλὸν τετράγωνον· ἄνθος δὲ τῷ τοῦ ὠκίμου ἐμφερές· καρπὸν δὲ, ὡς *πρασίου· ῥίζαν μέλαιναν, στρογγύλην, ὠχράν, ὡς μικρὸν μῆλον, γεῶδες ὄζουσαν· φύεται ἐν πετρώδεσι τόποις. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς ποθεὶς ὅσον < α΄ πλῆθος, ταραχώδη καὶ δεινὰ ἐνύπνια ποιεῖν· διαφορεῖ δὲ καὶ οἰδήματα ἐπιπλασσόμενος σὺν ἀλφίτῳ, καὶ ἀκίδας καὶ σκόλοπας ἐξάγει. καὶ τὰ φύλλα δὲ καταπλασσόμενα, φύματα καὶ δοθιῆνας διαφορεῖ. ἡ δὲ ῥίζα αὐτοῦ λυτικὴ κοιλίας καὶ κινητικὴ χολῆς, δίδοται < β΄. ἐν μελικράτῳ.

Περὶ Ἀπίου. Κεφ. ροζ'.

Ἄπιος, οἱ δὲ, ἰσχιάδα, οἱ δὲ, χαμαιβάλανος, ὀρεινὴ ἢ ἀγρία, οἱ δὲ, λινόζωστις, κλωνία δύο ἢ τρία ἀπὸ γῆς ἀνίησι, σχοινώδη, λεπτὰ, ἐρυθρὰ μικρὸν ὑπὲρ τῆς γῆς αἴροντα· φύλλα πηγάνῳ ἐοικότα, ἐπιμηκέστερα μέν τοι καὶ στενότερα, χλωρά·

καρπὸς

Folia, si prætenera ac mollia ex polenta illinantur, inflāmationem mitigant: ambustis & canis morsibꝰ illitu ꝓsunt: vlcera quæ dehiscunt in fistulā, agglutinant: iis qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino prosunt illita folia.

Picnocomū. Ca. CLXXVI.

Picnocomon constat erucæ foliis, acrioribus, scabris, & crassis: caule quadrangulo: flore ocymi: semine marubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redoléte: inuenitur in saxosis locis. Semen grauia somnia & tumultuosa facit, drachmæ instar potum: tumores discutit, illitum cum polenta & spicula, adactósque corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tubercula, panósq; discutiūt. Radix eius in qua mulsa duûm drachmarum pondere, aluum soluit, & bilem extrahit.

Apios. Cap. CLXXVII.

APIOS RAMVLOS duos, siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: foliis rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis:

 semine

semiffe paruo, radice hastulæ regiæ, in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fœcunda, intus habet corpus candidum, extra cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem pituitásque extrahit: inferior, per aluum: tota vtrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat péna selectũ, exiccat. Purgat vtraque parte is succus, sesquiobolo pot⁹.

Colocynthis. Cap. LXXVIII.

Colocynthis sarmenta foliáque satiui cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsa, melle cocto, myrrha & nitro excipiãtur, & cogãtur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteribus prosunt neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitiis, vt quæ bilem, pituitam & strigmenta,

interdum

καρπὸς μικρός. ῥίζα* ἀσφοδέλῳ παραπλήσια καὶ πρὸς τὸ τοῦ ἀπίου σχῆμα, στρογγυλωτέρα δὲ, μεστὴ ὀποῦ. φλοιὸν ἔχουσα ἔξωθεν μέλανα, ἔνδοθεν δὲ λευκόν. Ταύτης τὸ μὲν ἔνδοθεν μέρος τῆς ῥίζης ληφθὲν, δι' ἐμέτων ἄγει χολὴν καὶ φλέγμα· τὸ δὲ πρὸς τῇ ῥίζῃ κάτω καθαίρει· ὅλη δὲ ληφθεῖσα, ἀμφοτέρας τὰς καθάρσεις κινεῖ. ὀπίσαι δὲ βουληθεὶς, κόπτε τὰς ῥίζας, καὶ βαλὼν εἰς κρατῆρα ὕδατος συντάραττε, καὶ τὸ ἐφιστάμενον ὀπὸν πτερῷ ἀναλέγων ξήραινε. τούτου τρία ἡμιωβόλια ποθέντα, ἄνω καὶ κάτω καθαίρει.

Περὶ κολοκυνθίδος. Κεφ. οη'.

Κολοκυνθὶς, οἱ δὲ, κολόκυνθα ἀγρὸς, οἱ δὲ, σικύαν πικρὰν, οἱ δὲ, κολόκυνθα ἀλεξανδρίνη, κλήματα καὶ φύλλα ἐστρωμένα ἐπὶ τῆς γῆς ἀνίησιν, ὅμοια τοῖς τοῦ ἡμέρου σικύου, ἐπεσχισμένα· καρπὸν δὲ περιφερῆ, ὅμοιον σφαίρᾳ μέσῃ, πικρὸν ἰσχυρῶς· ὃν δεῖ συνάγειν ἀρχόμενον μεταβάλλειν ἐπὶ τὸ ὠχρότερον. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ μὲν ἐντεριώνη τοῦ καρποῦ καθαρτικὴν, τετρωβόλου πλῆθος μετὰ ὑδρομέλιτος λαμβανομένη σὺν νίτρῳ καὶ σμύρνῃ καὶ μέλιτι ἑφθῷ εἰς καταπότιον. αὗται δὲ αἱ σφαῖραι ξηραὶ λεῖαι, ὠφελίμως μίγνυνται κλύσμασιν ἐπὶ ἰσχιαδικῶν, καὶ παραλυτικῶν, καὶ κωλικῶν, ἄγουσαι φλέγμα καὶ χολὴν καὶ ξύσματα,

ἔθ.

ἔτι δ' ὅτι δὲ καὶ αἱματῶδες· ἐμβρυά τ' φθείρουσι προσιόμενα· ὀδοντα λγίας τὸ διάκλυσμα, ἐάν τις ἐκκαθάρας αὐτὸν καὶ σκευλάσας πολῷ, ἐναποζέσας τὸ ὄξει καὶ νίτρῳ, δῷ διακλύζεσθαι· εἰ δέ τις ἐναφεψήσας μελίκρατον ἢ καὶ γλυκὺ καὶ ἐξαυριάσας δῷ πιεῖν, καθαίρει πάχος καὶ ξύσμα· ἔτι δὲ κακοστόμαχος λίαν· προσίσταται δὲ καὶ βάλανος ἐξ αὐτῆς, σκῶς κομιδῇ τῶν περιττωμάτων. καὶ χλωρᾶς δὲ αὐτῆς ὁ χυλὸς, ὁπὸ ἰσχιαδικῶν ἀναπειθόμενος ἀφύλλει.

Περὶ Ἐπιθύμου. Κεφ. ροθ'.

Ἐπίθυμον θύμου ὄζειν αἴθος τὸ σκληρότερον καὶ θύμβρα ἐοικότος, ἔχει ἡ κεφάλια λεπτὰ, κῦφα, ἐφαρμοὶς ἔχοντα ὡς τείχας. Πινόμενον δὲ σὺν μέλιτι, κάτω καθαίρει φλέγμα καὶ χολὴν μέλαιναν. ἰδίως ἀφύλλον ὁπὸ μελαγχολικῶν καὶ ἐμπνευματουμένων, ὀξυβάφου πλῆθος σκῶς ὀλκὴν < δ'. σὺν μέλιτι καὶ ὄξει καὶ ὀλίγῳ ὄξει. γινᾶται δὲ πλεῖστον ἐν καππαδοκίᾳ καὶ παμφυλίᾳ.

Περὶ Ἀλύπου. Κεφ. ρπ'.

Ἄλυπον φρυγανώδης ἐστὶ πόα, ὑπέρυθρος, λεπτόκαρφος, λεπτόφυλλος· αἴθυια μαλακὴ καὶ κούφη μεσὴ, ὡς ῥίζα τεύτλου λεπτή. μεσὴ ὀποῦ δ' εἰμίος· σπέρμα ὡς ὁπιθύμου. γινᾶται ἡ ἐν τόποις παραθαλασσίοις,

interdum etiam cruorẽ eliciãt: fœtus admotę enecant: dentiũ dolorem tollit, si vna repurgetur & luto oblita cũ aceto & nitro inferuescat, hócque iure decocti dentes colluantur: si aqua mulsa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmenta alui detrahet: stomacho supra modũ aduersatur: subdita ex ea balano alui excremẽta eiiciuntur. Virẽtis succo vtilissimè ischiadici perfricantur.

Epithymũ. Cap. CLXXIX.

Epithymon, flos est è thymo duriore, satureię simili: capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas, quasi capillamẽta. Potum cum melle detrahit pituitam bilémq; atram, per inferna. Priuatim prodest melãcholicis, & inflatis, acetabuli mẽsura, ad quatuor drachmas, cũ melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

Alypum. Cap. CLXXX.

Alypon surculosa herba est, subrubra: gracilibus ramulis: tenuibus foliis: flore molli, leui, & copioso: radice betæ, tenui, referta acri succo: semine epithymi: gignitur in maritimis,

timis, maximè Libyæ, quanquam alibi quoque plurima prouenit. Semen atram bilem deiicit, si mensura epitymo pari cum sale & aceto sumatur: verùm interanea leuiter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga.

Cap. CLXXXI.

Empetron aliqui phacoides vocant, nascitur in montibus, & maritimis, salso gustu: sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquâ si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

Clematis. Cap. CLXXXII.

Clematis viticulosum emittit ramulum, rubescentē. Lentum, folium gustu admodum acre ac exulcerans, repit per arbores, vt smilax, semen tritum, pituitam bilémque detrahit, in aqua, aut hydromelite potum. folia eius illita lepras purgant, cum lepidio conditur ad cibos.

Vitis syluestris.

Cap. CLXXXIII.

Vitis syluestris sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice foliis hortensis solani, longioribus ac latioribus: muscoso flore, & capillaceo: fructu exiguis

Θαλασσίοις, μάλιστα τοῖς τῆς Λιβύης τόποις πλεῖσον, καὶ ἄλλοις δὲ χωρίοις πλεῖστη. Καθαίρει δὲ τὸ σπέρμα μέλαιναν χολὴν κάτω λαβὸν ὑδρωμένον τὸ ἴσον πλῆθος μετ' ἀλῶν τῷ ὄπῳ θύμῳ καὶ ὄξει· τὰ δὲ ἔντερα ἐλαφρῶς ἕλκοῖ.

Περὶ Ἐμπέτρου.

Κεφ. ρπά.

Ἔμπετρον, οἱ δὲ, φακοειδὲς, ἐν παραλίοις καὶ ὀρεινοῖς φύεται, ἁλυκὸν τῇ γεύσει· τὸ δὲ θερμογειότερον, πικρότερον. πίνεται δὲ ὑδρόμελι· καθαίρει φλέγμα καὶ χολὴν καὶ ὑδατώδη.

Περὶ Κληματίτιδος. Κεφ. ρπϐ.

*Κληματῖτις κλῆμα ἀνίησιν ὑπέρυθρον, λυγώδες, φύλλον δριμὺ, λίαν γευομένῳ καὶ ἑλκωτικὸν· σπερμολόγοις δὲ τοῖς δένδροις ὡς σμίλαξ. Ταύτης ὁ καρπὸς λεῖος ἐν ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος ποθεὶς, ἄγει κάτω φλέγμα καὶ χολήν. τὰ δὲ φύλλα καταπλασθέντα, λέπρας ἀφίστησι. παρεγχύεται δὲ μετὰ τοῦ λεπιδίου εἰς βρῶσιν.

Περὶ Ἀμπέλου ἀγρίας.

Κεφ. ρπγ.

*Ἄμπελος ἀγρία κλήματα ἀνίησι μακρὰ, ὡς ἀμπέλου, ξυλώδη, τραχέα, φλοιορραγοῦντα, φύλλα δὲ ὅμοια τρυγὸς κηπαίου, πλατύτερα δὲ καὶ μακρότερα· ἄνθος ὡς βίκας βρυώδεις· καρπὸν δὲ βο

δὲ βοτρυδέσις μικροῖς ὁμοιον, πεπαγόμενον ἐρυθρόν· ἀφεψεῖς δὲ ὅτι τὸ αἷμα τῶν κόκκων. Ταύτης ἡ ῥίζα ἀποζεσθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ μεθ' ὕδατος πυομελῆ τὰ θαλασσωμφύων κυάθων β. ὑδατώδεις καθαίρει· δίδοται δὲ καὶ ὑδρωπικοῖς. οἱ δὲ βότρυες ἐφήλεις ἀποκαθαίρουσι καὶ πάντα σπίλον. ταινιοῦνται δὲ καὶ οἱ ταύτης ἀκρέμονες ἀρτιφυεῖς εἰς βρῶσιν.

Περὶ ἀμπέλου λευκῆς. Κεφ. ρτδ'.

Ἄμπελος λευκὴ, ἡ ἣ βρυωνίαν, οἱ ἣ ὀφιοσάφυλον, οἱ δὲ χελιδόνιον, ἢ μίλωθρον, ἢ ψίλωθρον, ἢ ἀρχέζωστιν, ἢ ἄχεωσιν, ἢ κέδρωσιν καλοῦσι. ταύτης τὰ κλήματα καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ ἕλικες, ὅμοια τῇ ἡμέρῳ ἀμπέλῳ, δασύτερα ἣ πάντα, καὶ ἐμπλέκει τοῖς παρακειμένοις δάμνοις ἑλλαμβανομένη τοῖς ἕλιξι· καρπὸν δὲ ἔχει βοτρυοειδῆ, πυρρὸν, ᾧ ψιλοῦ τὰ σπέρματα. ταύτης οἱ ἀπαπάραγοι καὶ ἡ ῥιζότομη ἐκκλάσιον ἐφ' ὁδοὶ ἐδίδονται ὕρπιν καὶ κοιλίαν κινοῦντες. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα δριμεῖαν· ὅθεν ἐπὶ τῶν χειρωνίων καὶ γαγγραινικῶν καὶ φαγεδαινικῶν καὶ σαπρικῶν ἑλκῶν μεθ' ἁλὸς καὶ ἀπαλαπάσματα ποιεῖ. ἡ ἣ ῥίζα χρῶτα ῥίπτει καὶ τενταῖ καὶ ἔφηλιν ἀποκαθαίρει ἰόνθους, φακὰς, οὐλὰς μιαίνας σὺν ὄξει καὶ γῆ χίᾳ καὶ τίλει καθεψηθεῖσα δὲ μετ'

exiguis vuis similis, post maturitatem rubente: rotunda est acinorũ facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duob⁹ vini aqua marina diluti, pota, humorem alui ciet: ideò hydropicis datur. Vuæ eius, vitia cutis in facie, & maculas omneis expurgant. Enascentes viticulæ, cibi gratia sale condiuntur.

Vitis alba. Cap. CLXXXIIII.

Vitem albam aliqui bryoniam vocant. Foliis viticulis, pampinisque, satiuam vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea quos prope se nacta sit frutices, suis clauiculis complectitur: fructus rubens in vua dependet, quo coria pilis spoliantur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & vrinam cient. Folia, fructus, radix, acrem vim sortiuntur: itaque vlcerum phagedænis, gangrænis, chironiis, putrentium tibiarum tædio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: vitia cutis in facie, varósque, lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & fœnogræco. Eodem effectu prodest decocta

in

in oleo, vſque dum liqueſcat: ſugillata tollit, & reduuias cõmittit: inflammationes diſcutit illita ex vino: ſuppurationes rumpit: medicamento aptè immiſcetur, quod carnem exeſt: infracta oſſa extrahit, trita & impoſita. Datur comitialibus in potu drachmę pondere, quotidie, anno toto. Prodeſt attonitis, & vertigine laborantibus, conſimiliter aſſumpta. Contra viperarum ictus pota drachmis duabus, auxiliatur: partus necat: mentem interdũ ſubturbat: fœminarũ locis appoſita, partus ſecundáſq; morantes trahit: cit vrinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficile ſpirantibus ſtrangulatu oppreſsis, tuſsiẽtibus, vulſis, ruptis, & laterũ doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, triginta diebus, conſumit: illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres inſeſſus decoquitur: ſiquidem vuluas purgat, ſed abortum facit. Succus è radice vere exprimitur, qui trahit pituitam, cum aqua mulſa potus. Ad pſoras & lepras, ſemen efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit ſuccus eius, ſi cum tritico decocto ſorbeatur.

Vitis

μετ' ἐλαίου μέχρι τακηρωθῇ, πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει· αἴρει δὲ καὶ ὑπώπια, καὶ πτερύγια τὰ ἐν δακτύλοις συστέλλει· σὺν δὲ οἴνῳ καταπλασσομένη, διαφορεῖ φλεγμονάς· καὶ ἀποστήματα ῥήσσει· ἀνάγει δὲ καὶ ὀστᾶ, λεῖα καταπλασσομένη. σηπτικαῖς τε μίγνυται ἐπιτηδείως· πίνεται δὲ καὶ πρὸς ἐπιληψίας ὁλκὴ α. καθ' ἡμέραν πρὸς ἐνιαυτόν. ὠφελεῖ ἀποπλήκτους καὶ σκοτωματικοὺς ὁμοίως λαμβανομένη. δυοῖν δὲ < ὁλκὴ ποθεῖσα, ἐχιοδήκτοις βοηθεῖ, καὶ ἔμβρυα φθείρει· ὑποταράττει δ' ἐνίοτε τὴν διάνοιαν· * καὶ οὖρα κινεῖ πινομένη, καὶ προστεθεῖσα ὑστέρᾳ ἔμβρυα καὶ δεύτερα ἐπισπᾶται. καὶ * ἔκλεικτον δὲ μετὰ μέλιτος δι' αὐτῆς τοῖς πνιγομένοις, καὶ δυσπνοοῦσι, καὶ βήσσουσι· πλευρᾶν τε ἀλγοῦσι καὶ ῥήγμασι, καὶ σπάσμασι δίδοται. καὶ σπλῆνα τήκει τριωβόλου ὁλκὴ ποθεῖσα σὺν ὄξει ἐπὶ ἡμέρας λ'. καὶ καταπλάσσεται δὲ μετὰ σύκου πρὸς τὰ αὐτὰ χρησίμως. ἀφέψεται δὲ καὶ εἰς ἐγκάθισμα· καθαρτικὸν ὑστέρας ὄν, καὶ ἐκβόλιον. χυλίζεται δὲ ἡ ῥίζα αὐτῆς ἔαρος· πίνεται δὲ σὺν μελικράτῳ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ αὐτὰ ἄγων φλέγμα. ὁ δὲ καρπὸς ποιεῖ πρὸς ψώρας καὶ λέπρας συγχριόμενος καὶ καταπλασσόμενος. κατασπᾶται δὲ καὶ γάλα ὁ καρπὸς αὐτῆς χυλισθείς. καὶ μετὰ πυρῶν ἑψημένων ῥοφηθείς.

Περὶ Ἀμπέ.

Περὶ Ἀμπέλου μελαίνης.
Κεφ. ρπέ.

Ἄμπελος μέλαινα, οἱ δὲ βρυωνία μέλαινα, οἱ δὲ χειρώνιον ἄμπελον, φύλλα ἔχει κισσοῦ ὅμοια, μᾶλλον δὲ πρὸς τὰ τῆς σμίλακος· οὐ μὴν κλῶνοι, μείζονα δὲ * ταῦτα· ἑλλαμβάνεται δὲ οὐ μόνον τῶν δένδρων τῶν ἐλικοειδῶν, καρπὸς βοτρυώδης, χλωρὸς καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ πεπαινόμενος ὑπὸ μέλανος γίνεται· ῥίζα μέλαινα ἔξωθεν, ἔνδοθεν δὲ πυξοειδής. Καὶ ταύτης οἱ κλῶνοι κατὰ τὴν πρώτην ἐκβλάστησιν λαχανεύονται· εἰσὶ δὲ οὐρητικοὶ καὶ καταμηνίων ἀγωγοί, πικτικοὶ ἀπλυτοῦ, ἐπιληπτικοῖς, καὶ σκοτωματικοῖς, καὶ παραλυτικοῖς ἁρμόζουσιν· ἔχει δὲ ἡ ῥίζα δύναμιν ὁμοίαν τῇ λευκῇ πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζουσαν, ἧττον μέντοι ἐνεργεῖ. ποιεῖ δὲ πρὸς τὸν τῶν ὑποζυγίων λόφους ἐπιδεθὲν ἑλκωθῶσι τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ καταπλασσόμενα· καὶ πρὸς ἑρπήματα ὁμοίως ἐπιτίθενται.

Vitis nigra.
Cap. CLXXXV.

Nigra vitis. quam aliqui nigram bryoniam vocant, folia fert hederæ, smilaceis proxima, sed maiora: caules etiam cognatos, capreolis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit: fructus racematim cohærent, qui inter principia virent, & post maturitatem nigrescunt: radix foris nigra, intus buxeo colore. Viticulæ quæ primo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur: menses pellunt, vrinas cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione tentatis, prosunt. Radix eadem, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Περὶ Πτέριδος. Κεφ. ρπς'.

Πτέρις, οἱ δὲ, βλῆχνον, οἱ δὲ, πολύῤῥιζον καλοῦσι, φύλλα ὀξέα ἄκανθα, καὶ αὐανθῆ, καὶ ἄκαρπα ἐξ ἑνὸς μόρου, σχεδὸν τὸ μέγεθος, ἐντεθλιμμένα καὶ ἀνωπλωμένα ὡς πτέρυξ, ὑποδυσώδη· ῥίζαν δὲ ἔχει ὀπισθεν, μέλαιναν, ὑπομήκη, ἐμφύσεις ἔχουσαν πολλὰς, ὑπο-

Filix. Cap. CLXXXVI.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt multifida, & lateribus pénata, subgraui odore: radice per summa cesp̃itũ nigra, oblonga, filices multas fundente, subastrin-

subastringẽte gustu: nascitur in mõtibus, & saxosis. Radix latas tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si cum scammoniæ aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, alia prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu cum axungia vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio: cuius rei probatio talis fertur: Peribit filix, quam per ambitũ sata copiosior arúdo coronet: & contrà, euanescẽs abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit.

ὑποσυφούσας τῇ γεύσει· φύεται ἐν ὀρεινοῖς καὶ πετρώδεσι τόποις. Ταύτης ἡ ῥίζα ἐλμινθα πλατεῖαν ἐκπιπάσει < δ'. ὀλκὴ μετὰ μελικράτου λαμβανομένη· βέλτιον δὲ εἰ μετὰ σκαμμωνίας ἢ ἐλλεβόρου μέλανος ὀβολῶν τεσσάρων δοίη τις. δεῖ δὲ προεκκορδοφαγεῖν τοὺς λαμβάνοντας. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἀποκατάστασιν σπληνιῶσι. καὶ μετὰ ἀξουγγίου δὲ ἡ ῥίζα πεθεῖσα καὶ καταπλασθεῖσα, ποιεῖ πρὸς τοὺς ὑπὸ κάλαμου πληγήντας· ἡ δὲ δοκιμὴ τοιαύτη. ἔνθα ἂν θῇς πολὺ κάλαμος καὶ πολὺ βλάχον, στεφάνωσον. ἀφανίζεται τὸ βλάχον.

Filix fœmina.

Cap. CLXXXVII.

Filix fœmina foliis est filicis, furculosis, altioribusq;, & quæ non singulari, vt illa, pediculo fulciantur: radicibus lõgis, pluribus, obliquis, quę ex nigro in luteũ flauescunt: aliquæ etiam num rubræ inueniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle, eclegmate sumpto: potæ cũ vino, drachmis tribus, teretes tineas eiiciunt: datæ fœminis, sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis vlceribus & cica-

Περὶ Θηλυπτεριδος.

Κεφ. ρπζ'.

Θηλυπτεριδες, οἱ δὲ τυμφαίαν πτέριν ὀνομάζουσι, τὰ μὲν φύλλα πτέρι δὲ ὅμοια, οὐ μονόμοχλα δ' ὡς τὰ ἐκείνης, ἀλλὰ πολλὰς ἔχοντα ἀποφύσεις καὶ ὑγηλοτέρας· ῥίζαι δ' ὑπῆσι μακραὶ, πλαγίαι, πλείους, ὑποξανθοι ἐν τῷ μέλανι· τινὲς δὲ ἐρυθραί. Καὶ αὗται δὲ ζωὰ μέλιτι ἐν ἐκλείκτῳ λαμβανόμεναι, πλατεῖαν ἕλμινθα ἐκβάλλουσι. σὺν οἴνῳ δὲ πινόμεναι, < γ' πλῆθος τροχίσκου ἐκπιπάσουσιν ἕλμινθα· γυναιξὶ δὲ δοθεῖσαι, ἀσυλληψίαν ποιῦσι, κἂν ἔγκυος δὲ διαζῇ ἐκπιτρώσκει. ξηραὶ δὲ ἐπὶ τῶν ἑλκῶν ἐπι-

ἐπιπλάσσονται· λόφοις τὲ ὑπορρυγίων ἰῶνται. τὰ δὲ φύλλα αὐτῆς ἀφὶ τίθεται λαχανεύεται ἐφθὰ βιβρωσκόμενα, καὶ κοιλίαν μαλάσσουσιν.

Περὶ Πολυποδίου.

Κεφ. ρπή.

Πολυπόδιον φύεται ἐν πέτραις βρύα ἐχούσαις καὶ ἐν τοῖς ἀγείοις παρέρποντος τοῖς ἀπὸ τῆ δρυῶν, ἀπὸ δαμοῦς ἔχουσα τὸ ὕψος, ὅμοιον τῇ πτέριδι, ὑπόδασυ, τετμημένον, οὐ μὴν οὕτω λεπτομερῶς· ῥίζα δ' ὕπεστι δασεῖα, πλεκταίας ὡσπερεὶ πολύπους ἔχουσα, πάχος μικρῷ δακτύλου, ξυώδεσα δὲ ἔνδοθεν, χλωρὰ, τρυφνὴ, τῇ γεύσει ὑπόγλυκυς. Δύναμιν ἔχουσα καθαρτικήν· δίδοται δὲ συγκαθεψομένη ὄρνιθι, ἢ ἰχθύσι, ἢ σύτλῳ, ἢ μαλάχῃ πρὸς κάθαρσιν. ξηρὰ δὲ ἐπιπασσομένη ἐν μελικράτῳ, ἄγει φλέγμα καὶ χολήν. πτιεῖ καὶ πρὸς ῥέμματα ἡ ῥίζα λεία καταπλασσομένη, καὶ πρὸς ῥαγάδας τὰς ἐν μεσοδακτύλοις.

Περὶ δρυοπτεύδος. Κεφ. ρπθ'.

Δρυοπτερὶς φύεται ἐπὶ τὰ βρυώδη μέρη τῶν παλαιῶν δρυῶν, ὁμοία πτέριδι ἐλάττων δὲ πολλῷ τῇ φύσει· ῥίζας δὲ ἔχει κατ' ἐπιπλοκὴν δασείας, τρυφερὰς καὶ τῇ γεύσει, ἐν τῷ γλυκεῖ ῥέπουσα· Λύτη ἐπιπλαθεῖσα λεία σὺν ταῖς ῥίζαις, πείχας ψιλοῖ· δεῖ δὲ ἀποψᾶν τὸ πρῶτον

cicatrici repugnãtibus inſpargitur: iumentorũ ceruibus medetur. Folia recentia, in oleribus cocta manduntur, vt ventrem emolliant.

Filicula, ſiue polypodiũ.

Cap. CLXXXVIII.

Filicula naſcitur in muſcoſis petris, & vetuſtis arborũ caudicibus, præſertim quercuum, palmi altitudine, filici ſimilis, ſubhirſuta, non tenui perinde diuiſura: radix piloſa, in qua continentur cirri, ceu polyporum, craſsitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, auſtera aliquantum, & guſtu ſubdulcis. purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piſcibus, aut beta, aut malua, ad aluum ſoluendam. Aridæ farina aquæ mulſæ inſparſa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduerſus rimas quæ inter digitos fiunt.

Dryopteris. Ca. CLXXXIX.

Dryopteris naſcitur in veterum roborum muſco, filici ſimilis, multo minore foliorum inciſura: radicibus inuicẽ implexis, hirſutis, guſtu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Pſilothrum eſt cum radicibus trita: illinitur enim primum

mum vſque dum ſudorem euocet, mox ſudor abluitur,& recens imponitur.

Cnicus. Cap. C X C.

Cnicus foliis conſtat oblongis, per ambitũ diuiſis,aſperis, ſpinoſis:caule ſeſquipedali: capitulo magnitudine grãdis oliuæ:flore croci:ſemine candido,alioqui rufo, lõgo,anguloſo.Huius flore in obſoniis vtũtur.Seminis tuſi & expreſsi ſuccus,cũ aqua mulſa,vel iure gallinacei aluũ purgat,ſed ſtomacho aduerſatur.Ex eo autẽ fiũt offulę,quas placentulas vocãt, adiectis ſucco amygdalis, nitro, aniſo, & melle decocto, quæ aluũ emolliunt.Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudiné impleant: è quibus ante cœnam duas vel tres ſumpſiſſe ſatis eſt. Ratio temperãdi hæc eſt: Cnici candidi ſextarius, amygdalorum toſtorum & delibratorum cyathi tres, aniſi ſextarius vnus,aphronitri drachma vna, cum carnibus triginta caricarum. Seminis ſuccus lac cogit, & magis ipſum reſoluẽdæ alui facultate donat.

Mercurialis. Cap. C X C I.

Lynozoſtis,aliquĩ partheniõ, alij hermũbotanion appellãt: foliis

πεφθῶν μετὰ τὸ ἐκμάσσειν τὸν χρῶτα καὶ νεαρὸν ὀπιπλάσσειν.

Περὶ κνίκου.

Κεφ. ξε'.

Κνίκος φύλλα ἔχει ὀπιμήκη, ὀντετμημένα, τραχέα, ἀκανθώδη· καυλοὺς δὲ πηχυαίους ἐφ' ὧν κεφαλὴ κατὰ μέγεθος θαλλίας· ἄνθος κρόκῳ ὅμοιον· σπέρμα λευκὸν καὶ πυρρὸν, ὀπίμακες, γωνιωμένον. Τούτῳ τῷ ἄνθει χρῶνται εἰς τὰ φαρμακήματα. τὸ σπέρμα κοπτόμενον καὶ χυλιζόμενον ζωμῷ ὑδρομέλιτι ἢ ζωμῷ ὄρνιθος, κοιλίαν καθαίρει, κακοστόμαχον δέ ὅτι γίνεται δὲ καὶ κοπιδεία κοιλίας μαλακτικὰ, τοῦ ὀπτοῦ αὐτοῦ μυξύτου ἀμυγδάλῳ καὶ νίτρῳ, καὶ ἀνίσῳ, καὶ μέλιτι ἑφθῷ. δεῖ δὲ φαγὸν δείπνου λαμβάνειν εἰς δ'. διαλύοντα, ὡς βασιλικοῦ καρύου μέγεθος β'. ἢ γ'. σκωλάζειν δὲ τὸν τρόπον τοῦτον δεῖ. κνίκου λευκοῦ ξέστην ά.* θαλασσίων πεφωγμένων καὶ λελεπυσμένων κυάθοις τρεῖς ἀνήσου ξέστην ἕνα, ἀφεψείτω < ἀ. ἰχάδων τῆς σαρκὸς ἀριθμῷ λ'. πίνει δὲ καὶ γάλα ὁ χυλὸς τοῦ σπέρματος, καὶ λυπικώτερον ποιεῖ.

Περὶ λυνοζώστεως.

Κεφ. ρξά.

Λυνόζωστις, οἱ δὲ παρθένιον, οἱ δὲ ἑρμοῦ βοτάνιον καλοῦσιν ἔχει

ἔχει τὰ φύλλα ὅμοια ὠκίμῳ, πρὸς τὰ τῆς ἑλξίνης, ἐλάττονα δέ· κλωνία διγόνατα, μασχάλας πολλὰς, πυκνὰς ἔχοντα· τὸν δὲ καρπὸν, ἡ μὲν θήλεια βοτρυοειδῆ καὶ πολύν· ὁ δὲ ἄῤῥην, πρὸς τοῖς πετάλοις μικρὸν, στρογγύλον ὥσπερ ὀρχίδια κατὰ δύο προσκείμενα· ὅλος δὲ ὁ θαμνίσκος σπιθαμιαῖος ἢ καὶ μείζων. Κινοῦσι δ' ἀμφότεραι κοιλίαν λαχανευόμεναι καὶ ἐσθιόμεναι· καθεψόμεναι δὲ ἐν ὕδατι καὶ πινομένου τοῦ ὕδατος, ἄγουσι χολὴν καὶ ὑδατώδη. δοκεῖ δὲ τὰ μὲν τῆς θηλείας φύλλα λεῖα πινόμενα καὶ προστιθέμενα μετὰ τὴν κάθαρσιν τοῖς αἰδοίοις, σύλληψιν θήλεως ποιεῖσθαι, τὰ δὲ τοῦ ἄῤῥενος ὁμοίως ἐπιτηδευθέντα ἀῤῥενογόνα γίνεσθαι.

Περὶ Κυνοκράμβης.
Κεφ. ρϟβ.

Κυνία ἢ κυνοκράμβη, οἱ δὲ, λινόζωστις ἀγρία ἄῤῥην, καυλίον ἀνίησι δισπιθαμιαῖον, τρυφερὸν, ὑπόλευκον· φύλλα ἐμφερῆ λινοζώστιδι ἢ κισσῷ, ὑπόλευκα ἐκ διαστημάτων· τὸν δὲ καρπὸν πρὸς τοῖς πετάλοις προσκείμενον μικρὸν, στρογγύλον. Δύναμιν δὲ ἔχει ὅ, τε καυλὸς καὶ τὰ φύλλα πινόμενα, κοιλίας κινητικήν. λαχανευόμενα. καθεψομένων δὲ, τὸ ὕδωρ ἄγει χολὴν καὶ ὑδατώδη.

Περὶ Ἡλιο-

foliis conſtat ocymi, helxinæ cognatis, ſed minoribus: ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarũ cauis multis: fructu fœminæ, copioſo, quandam racemorum ſpeciem prębente: mari, è foliorum ſinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis teſticulis vnà cohærentibus: frutice dodrãtali aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aluum ciendam: cocta in aqua, epoto iure, bilem aquámque detrahit. Conſtat vt mares gignantur, hunc facere: vt fœminæ, illam, ſi à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

Cynocrambe.
Cap. CXCII.

CYNIA aut cynocrambe, cauliculum binûm dodrantum altitudine emittit, mollem, ſubalbidum: folia mercuriali aut hederæ ſimilia, certis interſtitiis ſubalbida: ſemen foliis adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient: oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilem aquámq; detrahit.

K Helio-

Heliotropium magnum. Cap. CXCIII.

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis caudæ, vnde scorpiuro ei nomen: & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfluuus incuruatur vt scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu pituitam bilémque per aluum extrahit: contra scorpionum ictus ex vino potum, & illitú prodest: adalligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam vnam ante accessiones, seminis grana quatuor cũ vino quartanas finire: tria verò, tertianas. Illitum semen formicantes verrucas pensilésque, & thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillationibus, quas syriaseis vocant, podagris, luxatisque vtilissimè illinuntur: menses cient: partus trita & imposita pellunt.

Heliotro-

Περὶ Ηλιοτροπίου τοῦ μεγάλου. Κεφ. ϛγ'.

Ηλιοτρόπιον τὸ μέγα, ὃ ἔνιοι ἐκάλεσαν σκορπίουρον ἀπὸ τοῦ εἶδος ἔχειν τὸ ἄνθος σήματος, ἡλιοτρόπιον δὲ ἀπὸ τοῦ συμπεριτρέπεσθαι τὰ φύλλα τῷ τοῦ ἡλίου κλίσει. ἔχει δὲ τὰ φύλλα ὠκίμου παραπλήσια, δασύτερα δὲ καὶ μελανότερα, καὶ μείζονα· κλωνία ἀπὸ τῆς ῥίζης ὅσον γ'. ἢ δ'. ἢ ε. καὶ ἐκ τούτων μασχάλας πλείους· ἐπ' ἄκρων δὲ ἄνθος λευκὸν, ὑποπύρρον, σπειρηδὸν, καθάπερ σκορπίου οὐρά· ῥίζα δὲ λεπτὴ, καὶ ἄχρηστος· φύεται ἐν τραχέσι τόποις. Τούτου ὅσον δέσμη ἀφεψηθεῖσα μετ' ὕδατος καὶ ποθεῖσα, ἄγει φλέγμα καὶ χολὴν διὰ κοιλίας· ἁρμόζει δὲ καὶ σκορποπλήκτοις μετὰ οἴνου πινομένη καὶ καταπλασσομένη· πρὸς ἀντίον δὲ περιάπτεται. φασὶ δὲ πρὸ μιᾶς ὥρας τῆς ὀπισθασίας, τοῦ καρποῦ δ'. κόκκους μετ' οἴνου πιόντας, τεταρταίους καταπαύειν· τριταίους δὲ τρεῖς. καταπλασσόμενος δὲ ὁ καρπὸς, μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ θύμους καὶ ὀπισθυκτίδας ξηραίνει. τὰ δὲ φύλλα ποδάγραις καὶ τρέμμασι καὶ σειλῶσι παιδίοις ὀπισθάπτεται ὠφελίμως· κινεῖ δὲ καὶ ἔμμηνα. καὶ ἔμβρυα ἄγει λεῖα προστιθέντα.

Περὶ

Περὶ Ηλιοτρόπιου τοῦ μικροῦ.
Κεφ. ϱϵδ'.

Ηλιοτρόπιον τὸ μικρὸν φύεται ἐν τελματώδεσι τόποις καὶ παρὰ λίμναις, ἔχον φύλλα παρεμπλήσια τῷ πετρωμένῳ, στρογγυλώτερα δέ· καρπὸν στρογγύλον ἀποκρεμάμενον ὡς ἀκροχορδόνας. Δυώματα δὲ ἡ πόα μετὰ τοῦ καρποῦ πινομένη σὺν νίτρῳ καὶ ὑσσώπῳ καὶ καρδάμῳ καὶ ὕδατι, ἕλμινθα πλατεῖαν καὶ στρογγύλην ἐκπυάσειν· αἴρει δ' καὶ ἀκροχορδόνας ζωὰ ἁλσὶ καταπλασσομένη.

Heliotropium paruum.
Cap. CXCIIII.

Heliotropion paruum, nascitur in paluſtribus, iuxta lacus, foliis antedicto proximis, rotundioribus: ſemine, acrochordonum verrucarum modo, penſili, rotundo. Herba cum ſuo ſemine pota, adiecto nitro, hyſſopo, naſturtio, & aqua, latas tineas teretéſq; excutit. Penſiles verrucas, quæ acrochordones vocãtur, cum ſale illita tollit.

Περὶ Σκορποειδοῦς. Κεφ. ϱϛ'.

Σκορποειδὲς βοτάνιον φύλλα ἔχον ὀλίγα καὶ σπέρματα, οὐραῖς σκορπίου ἐμφερῆ. βοηθεῖ δὲ καταπλασσόμενα σκορποπλήκτοις ἄκρως.

Scorpioides. Cap. CXCV.

Scorpioides herbula eſt, foliis paucis, ſemine caudæ ſcorpionis effigie. Illita ſcorpionum ictibus præſentaneo eſt auxilio.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ.

QVARTI LIBRI FINIS.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ

PEDANII

PEDANII DIOSCORIDIS Anazarbei de medicinali materia Liber quintus.

Io. Ruellio Sueßionēsi interprete.

SVPERIORIBUS quatuor libris, amicissime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, & earundem lachrymis ac fructibus: item animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleribus, necnō de omni radicum, herbarum, succorum, seminumque ratione. In hoc autem totius operis quinto disseremus de vinis & metallicis, à vite nostram commentationem auspicati.

Vitis vinifera. Cap. I.

Folia vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigāt, & inflammationem stomachi ardorémque, cum polenta: folia etiam per se, vt quæ refrigerent & adstringant, imponi solent. Potus eorū succus dysentericis, sanguinē excreantibus, stoma-

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΑΠΟΔΟΝΤΕΣ ἐν τοῖς προγραφεῖσι τέτρασι βιβλίοις φίλτατ᾽ Ἄρειε τὸν περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων, καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν καρπῶν τε καὶ δακρύων· ἔτι τε ζώων καὶ μέλιτος καὶ γάλακτος καὶ στεάτων καὶ τῶν καλουμένων σιτηρῶν καὶ λαχάνων. καὶ τὸν σύμπαντα περὶ ῥιζῶν καὶ βοτανῶν καὶ χυλισμάτων, καὶ σπερμάτων λόγον. ἐν τούτῳ τελευταίῳ ὑπάρχοντι τῆς ὅλης πραγματείας. διαλεξόμεθα περί οἴνων καὶ τῶν καλουμένων μεταλλικῶν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς περὶ ἀμπέλου παραδόσεως.

Περὶ Ἀμπέλου οἰνοφόρου. Κεφ. α.

Ἀμπέλου οἰνοφόρου τὰ φύλλα καὶ αἱ ἕλικες λεῖαι καταπλασσόμεναι κεφαλαλγίας πραΰνουσι, φλεγμονήν τε τοῦ στομάχου καὶ καῦσον σὺν ἀλφίτῳ· καὶ καθ᾽ ἑαυτὰ ἐπιτιθέμενα τὰ φύλλα ψυκτικὰ καὶ στυπτικὰ ὄντα. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν δὲ χυλὸς ποθεὶς ὠφελεῖ δυσεντερικοὺς καὶ αἱμοπτοϊκοὺς

καὶ

καὶ στομαχικοὺς καὶ κιρσώσας. ἀποθεραπεύεται δὲ καὶ αἱ ἕλικες ἐν ὕδατι καὶ ποθεῖσαι, τὰ αὐτὰ ποιοῦσι. τὸ δὲ δάκρυον αὐτῆς ὅμοιον ὂν κόμμει, ὠφελεῖ πτυόμενον τοῖς τελέχεσι, λίθους ἐκπνέοντες πινόμενον σὺν οἴνῳ· ἰᾶται δὲ καὶ λειχῆνας καὶ ψώρας καὶ λέπρας καταχριόμενον, δεῖ δὲ προεκπιεσθῆναι τὸν τόπον· σὺν ἐλαίῳ δὲ ἐγχριόμενον συνεχῶς, φιλεῖ τοὺς τείχας, καὶ μάλιστα ὁ ἀπὸ τοῦ χλωροῦ κισσοῦ κλήματος ἀφιδρύμενος ἰχώρ· ὃς καὶ μυρμηκίας ἐκπροχριόμενος ἐκβάλλει. ἡ δὲ ἐκ τῶν κλημάτων καὶ τεμφύλων τέφρα, τὰ ὠὲλ δακτύλιον ἀφαιρεθέντα κονδυλώματα καὶ θύμια, ζυθῷ ὄξει καταπλασθεῖσα θεραπεύει, καὶ ἕλκεσι, καὶ ἐχροδήκτοις ὠφελεῖ, καὶ σπληνὸς φλεγμοναῖς ζυθῷ ῥοδίνῳ καὶ πηγάνῳ καὶ ὄξει καταπλασσόμενα.

Περὶ Ἀμπέλου ἀγρίας. Κεφ. β'.

Ἄμπελος ἀγρία ὀλίγη, ἡ μὲ γὰρ αὐτῆς οὐ περιφέρει τὸν σταφυλῆν, ἄγρι δ' αὐθήσεως ἄγει τὸν λεγόμενον οἰναθόν. ἡ δέ τις τελεσφορεῖ μικροῤῥαγῆ οὖσα, καὶ μέλαινα, καὶ συστατική. Φύλλα δὲ ἔχει ταύτης τὰ φύλλα καὶ αἱ ἕλικες καὶ οἱ κλωνοὶ, ὁμοίως τῇ ἡμέρῳ.

Περὶ Σταφυλῆς. Κεφ. γ'.

Σταφυλὴ, ἡ μὲν πεσσόμενος φῶσα ἐκτρέφουσι κοιλίαν· καὶ ἐμ-

stomachicis, & grauidarum malaciæ medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli & poti. Lachryma vitium, quę veluti gummi in caudicibus concrescit, ex vino pota calculos pellit: illita lichenas & psoras lepráque nitro prius perfrictas sanat: eadem cũ oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet: maximéque sanies, quam accensa sarmenta vitium viridia exudarunt: qua & perunctæ verrucarum informicationes extrahuntur. Cinis sarmentorum & vinaceorum, detractis in sede condylomatis, & thymiis, illitus ex aceto medetur: prodest luxatis & viperarum morsibus: contra lienis inflammationem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

Labrusca. Cap. II.

Labrusca duorum generum est: alterius vua non maturescit, sed flore tenus œnanthen nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clauiculæ quibus repunt, vim habent cultæ viti similem.

Vua. Cap. III.

Vuæ recentes aluũ turbant,

in oleo, vsque dum liquescat: sugillata tollit, & reduuias cómittit: inflammationes discutit illita ex vino: suppurationes rumpit: medicamento aptè immiscetur, quod carnem exest: infracta ossa extrahit, trita & imposita. Datur comitialibus in potu drachmę pondere, quotidie, anno toto. Prodest attonitis, & vertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra viperarum ictus pota drachmis duabus, auxiliatur: partus necat: mentem interdū subturbat: fœminarū locis apposita, partus secundásq; morantes trahit: cit vrinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficile spirantibus strangulatu oppresśis, tusśiétibus, vulsis, ruptis, & laterū doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, triginta diebus, consumit: illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres insessus decoquitur: siquidem vuluas purgat, sed abortum facit. Succus è radice vere exprimitur, qui trahit pituitam, cum aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras, semen efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

Vitis

μετ' ἐλαίου μέχρι τακερωθῇ, πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει· αἴρει δὲ καὶ ὑπώπια, καὶ πτερύγια τὰ ἐν δακτύλοις συστέλλει· σὺν δὲ οἴνῳ καταπλασσομένη, διαφορεῖ φλεγμονάς· καὶ ἀποστήματα ῥήσσει· ἀνάγει δὲ καὶ ὀστᾶ, λεία καταπλασσομένη. σηπτικαῖς τε μίγνυται ἐπιτηδείως· πίνεται δὲ καὶ πρὸς ἐπιληψίας ὁλκὴ ά. καθ' ἡμέραν πρὸς ἐνιαυτόν. ὠφελεῖ ἀποπλήκτους καὶ σκοτωματικοὺς ὁμοίως λαμβανομένη. δυοῖν δὲ < ὁλκὴ ποθεῖσα, ἐχιοδήκτοις βοηθεῖ, καὶ ἔμβρυα φθείρει· ὑποταράττει δ' ἐνίοτε τὴν διάνοιαν· * καὶ οὖρα κινεῖ πινομένη, καὶ προστεθεῖσα ὑστέρᾳ ἔμβρυα καὶ δεύτερα ἐπισπᾶται. καὶ *ἔκλεικτον δὲ μετὰ μέλιτος δι' αὐτῆς τοῖς πνιγομένοις, καὶ δυσπνοοῦσι, καὶ βήσσουσι· πλευρὰν τε ἀλγοῦσι καὶ ῥήγμασι, καὶ σπάσμασι δίδοται. καὶ σπλῆνα τήκει τριώβολον ὁλκὴ ποθεῖσα σὺν ὄξει ἐπὶ ἡμέρας λ'. καὶ καταπλάσσεται δὲ μετὰ σύκου πρὸς τὰ αὐτὰ χρησίμως. ἀφέψεται δὲ καὶ εἰς ἐγκάθισμα· καθαρτικὸν ὑστέρας ὄν, καὶ ἐκβόλιον. χυλίζεται δὲ ἡ ῥίζα αὐτῆς ἔαρος· πίνεται δὲ σὺν μελικράτῳ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ αὐτὰ ἄγων φλέγμα. ὁ δὲ καρπὸς ποιεῖ πρὸς ψώρας καὶ λέπρας συγχριόμενος καὶ καταπλασσόμενος. κατασπᾷ δὲ καὶ γάλα ὁ καρπὸς αὐτῆς χυλισθείς. καὶ μετὰ πυρῶν ἑψημένων ῥοφηθείς.

Περὶ Ἀμπέ.

Περὶ Ἀμπέλου μελαίνης.
Κεφ. ρπέ.

Ἄμπελος μέλαινα, οἱ δὲ βρυωνίαν μέλαιναν, οἱ δὲ χειρώνιον ἄμπελον, φύλλα ἔχει κισσῷ ὅμοια, μᾶλλον δὲ πρὸς τὰ τῆς σμίλακος· καὶ οἱ καυλοὶ, μείζονα δὲ * ταῦτα· ἐλλαμβάνεται δὲ καὶ αὕτη τῶν δένδρων τῇ ἕλικι· καρπὸς βοτρυώδης, χλωρὸς καθ' ἀρχὴν, πεπανθεὶς δὲ μέλας γίνεται· ῥίζα μέλαινα ἔξωθεν, ἔνδοθεν δὲ πυξοειδής. Καὶ ταύτης οἱ καυλοὶ κατὰ τὴν πρώτην ἐκβλάστησιν λαχανεύονται· εἰσὶ δὲ καὶ οὐρητικοὶ καὶ καταμηνίων ἀγωγοὶ, τηκτικοὶ σπληνὸς, ἐπιληπτικοῖς, καὶ σκοτωματικοῖς, καὶ παραλυτικοῖς ἁρμόζουσιν· ἔχει δὲ ἡ ῥίζα δύναμιν ὁμοίαν τῇ λευκῇ πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζουσαν, ἧττον μέν τοι ἐνεργεῖ. ποιεῖ δὲ πρὸς τοὺς τῶν ὑποζυγίων λόφους ἐπειδὰν ἑλκωθῶσι τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ καταπλασσόμενα· καὶ πρὸς στρέμματα ὁμοίως ἐπιτίθενται.

Vitis nigra.
Cap. CLXXXV.

Nigra vitis. quam aliqui nigram bryoniam vocant, folia fert hederæ, ſmilaceis proxima, ſed maiora: caules etiam cognatos, capreolis ſuis arbores, quaſi adminicula, comprehendit: fructus racematim cohærent, qui inter principia virent, & poſt maturitatem nigreſcunt: radix foris nigra, intus buxeo colore. Viticulæ quæ primo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur: menſes pellunt, vrinas cient, lienem abſumunt, vertiginoſis, comitialibus, neruorum reſolutione tentatis, proſunt. Radix eadem, quæ vitis alba præſtat, ſed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus commodiſsimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Περὶ Πτέρεως. Κεφ. ρπς΄.

Πτέρις, οἱ δὲ, βλῆχνον, οἱ δὲ, πολύρριζον καλοῦσι, φύλλα ἐστὶν ἄκαυλα, καὶ ἀνανθῆ, καὶ ἄκαρπα ἐξ ἑνὸς μόσχου, περὶ πῆχυν τὸ μέγεθος, ἐντετμημένα καὶ ἀνηπλωμένα ὡς πτέρυξ, ὑποδυσώδη· ῥίζαν δὲ ἔχει ἐπιπόλαιον, μέλαιναν, ὑπομήκη, ἐκφύσεις ἔχουσαν πολλὰς, ὑπο-

Filix. Cap. CLXXXVI.

Filici folia ſine caule, ſine fructu, ſine flore, ex vno pediculo, cubitali lõgitudine exeunt multifida, & lateribus pẽnata, ſubgraui odore: radice per ſumma ceſpitũ nigra, oblonga, filices multas fundente, ſubaſtrin

ἐπιπλάσσονται· λόφοις τὲ ὑποζυγίων ἴῶνται. τὰ δὲ φύλλα αὐτῆς ἀρτίβλαστα λαχανεύεται ἑφθὰ βιβρωσκόμενα, καὶ κοιλίαν μαλάσσουσιν.

Περὶ Πολυποδίου.

Κεφ. ριή.

Πολυπόδιον φύεται ἐν πέτραις βρύα ἐχούσαις καὶ ἐν τοῖς ἀγελείοις τρέμνοις τοῖς ἐπὶ τῆ δρυῶν, σπιθαμιαῖς ἔχουσα τὸ ὕψος, ὅμοιον τῆ πτέριδι, ὑποδασυ, τετμημένον, οὐ μὴν οὕτω λεπτομερῶς· ῥίζα δὲ ὕπεστι δασεῖα, πλεκταῖς ὡσπερεὶ πολύποις ἔχουσα, πάχος μικρὸν δακτύλου, ξυσθεῖσα δὲ ἔνδοθεν, χλωρὰ, τρυφερὴ, τῆ γεύσει ὑπογλυκυς. Δύναμιν ἔχουσα καθαρτικήν· δίδοται δὲ συγκαθεψομένη ὄρνισι, ἢ ἰχθύσι, ἢ σύπλῳ, ἢ μαλάχῃ πρὸς κάθαρσιν. ξηρὰ δὲ ἐπιπασσομένη ἐν μελικράτῳ, ἄγει φλέγμα καὶ χολήν. ποιεῖ καὶ πρὸς ῥέμματα ἡ ῥίζα λεία καταπλασσομένη, καὶ πρὸς ῥαγάδας ταῖς ἐν μεσοδακτύλοις.

Περὶ δρυοπτεριδος. Κεφ. ρπθ'.

Δρυοπτερὶς φύεται κατὰ τὰ βρυώδη μέρη τῶν παλαιῶν δρυῶν, ὁμοία πτέριδι ἐλάττων ἢ πολλῷ τῆ φύσει· ῥίζας ἔχει κατ' ἐπιπλοκὴν δασείας, τρυφερὰς καὶ τῆ γεύσει, ἐν τῷ γλυκεῖ ῥέπουσα· Αὕτη ἐπιπλαθεῖσα λεία σὺν ταῖς ῥίζαις, τείχας ψιλοῖ· δεῖ δὲ ἀποξαῖνε τοῦτον

cicatrici repugnãtibus inſpargitur: iumentorũ ceruibus medetur. Folia recentia, in oleribus cocta manduntur, vt ventrem emolliant.

Filicula, ſiue polypodiũ.

Cap. CLXXXVIII.

Filicula naſcitur in muſcoſis petris, & vetuſtis arborũ caudicibus, præſertim quercuum, palmi altitudine, filici ſimilis, ſubhirſuta, non tenui perinde diuiſura: radix piloſa, in qua continentur cirri, ceu polyporum, craſsitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, auſtera aliquantum, & guſtu ſubdulcis. purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piſcibus, aut beta, aut malua, ad aluum ſoluendam. Aridæ farina aquæ mulſæ inſparſa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduerſus rimas quæ inter digitos fiunt.

Dryopteris. Ca. CLXXXIX.

Dryopteris naſcitur in veterum roborum muſco, filici ſimilis, multo minore foliorum inciſura: radicibus inuicẽ implexis, hirſutis, guſtu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Pſilothrum eſt cum radicibus trita: illinitur enim primum

mum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluitur,& recens imponitur.

Cnicus. Cap. C X C.

Cnicus foliis constat oblongis, per ambitū diuisis,asperis, spinosis:caule sesquipedali: capitulo magnitudine grādis oliuæ:flore croci: semine candido,alioqui rufo, lōgo,angulofo.Huius flore in obsoniis vtūtur.Seminis tusi & expressi succus,cū aqua mulsa,vel iure gallinacei aluū purgat,sed stomacho aduersatur.Ex eo autē fiūt offulę,quas placentulas vocāt, adiectis succo amygdalis, nitro, anisō, & melle decocto, quæ aluū emolliunt.Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinē impleant: è quibus ante cœnam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperādi hæc est: Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres, anisi sextarius vnus,aphronitri drachma vna, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluēdæ alui facultate donat.

Mercurialis. Cap. C X C I.

Lynozostis,aliquī partheniō, alij hermūbotanion appellāt: foliis

περῶτον μετὰ τὸ ἐκμάσσειν τὸν χρῶτα ἢ νεαρὸν ἐπιπλάσσειν.

Περὶ κνίκου.

Κεφ. ϱξ΄.

Κνίκος φύλλα ἔχει ἐπιμήκη, ἐντετμημένα, τραχέα, ἀκανθώδη· χωλοὺς δὲ πηχυαίους ἐφ' ὧν κεφαλὴ κατὰ μέγεθος θαλλίας· ἄνθος χρόκῳ ὅμοιον· σπέρμα λευκὸν καὶ πυῤῥὸν, ἐπιμηκες, γογγυλιῶδες. Τούτῳ τῷ ἄνθει χρῶνται εἰς τὰ φερόμενα ψήματα. τὸ σπέρμα κοπτόμενον καὶ χυλιζόμενον ζωὸν ὑδρομέλιτι ἢ ζωμῷ ὄρνιθος, κοιλίαν καθαίρει, κακοχύμους δὲ ὀξύνει· γίνεται δὲ καὶ κοπιάδια κοιλίας μαλακτικὰ, τοῦ ὀπτοῦ αὐτοῦ μιγνύντος ἀμυγδάλῳ καὶ τίτῳ, καὶ ἀνίσῳ, καὶ μέλιτι ἑφθῷ. δεῖ δὲ φερὸ δείπνου λαμβάνειν εἰς δ΄. διελόντα, ὡς βασιλικοῦ καρύου μέγεθος β. ἢ γ. σκευάζειν δὲ τὸν τρόπον τοῦτον δεῖ. κνίκου λευκοῦ ξέσεις ά.* δαυσίων πεφωγμένων ἢ λελεπυσμένων κυάθους τρεῖς ἀνίσου ξέσεις ἕνα, ἀφεψήσου < ά. ἰχάδων τῆς σαρκὸς ἀριθμῷ λ΄. πίνεται δὲ καὶ γάλα ὑγρὸς τοῦ σπέρματος, καὶ λυπώτερον ποιεῖ.

Περὶ Λινοζώστεως.

Κεφ. ϱξά.

Λινόζωστις, οἱ δὲ παρθένιον, οἱ δὲ ῥᾳμοῦ βοτάνιον καλοῦσιν ἔχει

ἔχει τὰ φύλλα ὅμοια ὠκίμῳ πρὸς τὰ τῆς ἐλξίνης, ἐλάττονα δὲ· κλωνία δ' γόνατα, μακρὰς πολλάς, πυκνὰς ἔχοντα· τὸν δὲ καρπὸν, ἡ μὲν θήλεια βοτρυοδὴν καὶ πολύ· ὁ δὲ ἄρρην, πρὸς τοῖς πετάλοις μικρὸν, στρογγύλον ὥσπερ ἐρεβίνθια κατὰ δύο προσκείμενα· ὅλος δὲ ὁ θαμνίσκος ἀπὸ θαμιαῖος ἢ καὶ μείζων. Κινοῦσι δ' ἀμφότεραι κοιλίαν λαχανευόμεναι καὶ ἐδώδιμοι· καθεψόμεναι δὲ ἐν ὕδατι καὶ ἀπομύττου τοῦ ὕδατος, ἄγουσι χολὴν καὶ ὑδατώδη. δοκεῖ δὲ τὰ μὲν τῆς θηλείας φύλλα λεῖα ἀπόμυκτα καὶ προσιδόμενα μετὰ τὸ κάθαρσιν τοῖς αἰδοίοις, σύλληψιν θήλεως ποιεῖσθαι, τὰ δὲ τοῦ ἄρρενος ὁμοίως ὀπτηδευθέντα ἀρρενογόνα γίνεσθαι.

foliis constat ocymi, helxinæ cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarũ cauis multis: fructu fœminæ, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari, è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis vnà cohærentibus: frutice dodrãtali aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aluum ciendam: cocta in aqua, epoto iure, bilem aquámque detrahit. Constat vt mares gignantur, hunc facere: vt fœminæ, illam, si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

Περὶ Κυνοκράμβης.

Κεφ. ρϛ'.

Κυνία ἢ κυνοκράμβη, οἱ δὲ, λινόζωστις ἀγρία ἄρρην, καυλίον ἀνίησι δ' σπιθαμιαῖον, πυρρὸν, ὑπόλευκον· φύλλα ἐμφερῆ κυνοζώστει ἢ κιννῳ, ὑπόλευκα ἐκ διασημάτων· τὸν δὲ καρπὸν πρὸς τοῖς πετάλοις προσκείμενον μικρὸν, στρογγύλον. Δύναμιν δὲ ἔχει ὅ, τ' καυλοὶ καὶ τὰ φύλλα πτόμενα, κοιλίας κινητικήν. λαχανεύεται. καθεψόμενον δὲ, τὸ ὕδωρ ἄγει χολὴν καὶ ὑδατώδη.

Cynocrambe. Cap. CXCII.

CYNIA aut cynocrambe, cauliculum binûm dodrantum altitudine emittit, mollem, subalbidum: folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitiis subalbida: semen foliis adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient: oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilem aquámq; detrahit.

Περὶ Ἡλιο-

Heliotropium magnum. Cap. CXCIII.

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis caudæ, vnde scorpiuro ei nomen: & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfluuus incuruatur vt scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu pituitam bilémque per aluum extrahit: contra scorpionum ictus ex vino potum, & illitú prodest: adalligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam vnam ante accessiones, seminis grana quatuor cũ vino quartanas finire: tria verò, tertianas. Illitum semen formicantes verrucas pensilésque, & thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillationibus, quas syriasseis vocant, podagris, luxatisque vtilissimè illinuntur: menses cient: partus trita & imposita pellunt.

Περὶ Ηλιοτροπίου τοῦ μεγάλου. Κεφ. ρϟγ'.

Ηλιοτρόπιον τὸ μέγα, ὃ ἔνιοι ἐκάλεσαν σκορπίουρον ἀπὸ τοῦ ἀεὶ τὸ ἄνθος ἡλίματος, ἡλιοτρόπιον δὲ ἀπὸ τοῦ συμπεριτρέπεσθαι τὰ φύλλα τῇ τοῦ ἡλίου κλίσει. ἔχει δὲ τὰ φύλλα ὠκίμῳ παρεμπλήσια, δασύτερα δὲ καὶ *μιλαύτερα, καὶ μείζονα· κλωνία ἀπὸ τῆς ῥίζης ὅσον γ'. ἢ δ'. ἢ ε. καὶ ἐπὶ τούτων μασχάλας θλείους· ἐπ' ἄκρων δὲ αὐθος λευκὸν, ὑποπυῤῥον, σπειρηδὸν, καθάπερ σκορπίου οὐρά· ῥίζα δὲ λεπτὴ, καὶ ἄχρηστος· φύεται ἐν τραχέσι τόποις. Τούτου ὅσον δέσμη ἀφεψηθεῖσα μετ' ὕδατος καὶ ποθεῖσα, ἄγει φλέγμα καὶ χολὴν καὶ κοιλίας· ἀμύζει δὲ καὶ σκορποπλήκτοις μετὰ οἴνου πινομένη καὶ καταπλασσομένη· θεῖον ἀντίον δὲ θεραπεύει. φασὶ δὲ θερὸ μιᾶς ὥρας τῆς ὀπισθοτονίας, τοῦ καρποῦ δ'. κόκκους μετ' οἴνου πιθέντας, τεταρταίους καταπαύειν· τεσσαρεσκαιδεκαταίους δὲ τρεῖς. καταπλασσόμενος δὲ ὁ καρπὸς, μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ θύμους καὶ ὀπυκτίδας ἐκβαίνει. τὸ δὲ φύλλα ποδάγραις καὶ τρέμμασι καὶ σπειρώσι παιδίοις ὀπαλάπτεται ὠφελίμως· πινεῖ δὲ καὶ ἔμμηνα. καὶ ἔμβρυα ἄγει λεῖα θερμαθέντα.

Heliotro-

Περὶ

Περὶ Ηλιοτρόπιου τοῦ μικροῦ.
Κεφ. ρξδ'.

Ηλιοτρόπιον τὸ μικρὸν φύεται ἐν τελματώδεσι τόποις καὶ παρὰ λίμναις, ἔχον φύλλα παρεμπλήσια τῷ περεγρινωδεῖ, στρογγυλώτερα δέ· καρπὸν στρογγύλον ἀποκρεμάμενον ὡς ἀκροχορδόνας. Δαύεται δὲ ἡ πόα μετὰ τοῦ καρποῦ πινομένη σὺν νίτρῳ καὶ ὑσσώπῳ καὶ καρδάμῳ καὶ ὕδατι, ἕλμινθα πλατεῖαν καὶ στρογγύλην ἐκπιάσειν· ἄλλῃ δ' ἀκροχορδόνας ζωὰ ἁλὶ καταπλασσομένη.

Περὶ Σκορπιοειδοῦς. Κεφ. ρξέ.

Σκορπιοειδὲς βοτάνιον φύλλα ἔχον ὀλίγα καὶ σπέρματα, οὐραῖς σκορπίου ἐμφερῆ. βοηθεῖ δὲ καταπλασσόμενα σκορπιοπλήκτοις ἄκρως.

Heliotropium paruum.
Cap. CXCIIII.

Heliotropion paruum, naſcitur in paluſtribus, iuxta lacus, foliis antedicto proximis, rotundioribus: ſemine, acrochordonum verrucarum modo, penſili, rotundo. Herba cum ſuo ſemine pota, adiecto nitro, hyſſopo, naſturtio, & aqua, latas tineas teretéſq; excutit. Penſiles verrucas, quæ acrochordones vocãtur, cum ſale illita tollit.

Scorpioides. Cap. CXCV.

Scorpioides herbula eſt, foliis paucis, ſemine caudæ ſcorpionis effigie. Illita ſcorpionum ictibus præſentaneo eſt auxilio.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ.

QVARTI LIBRI FINIS.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ

PEDANII

PEDANII DIOSCORIDIS Anazarbei de medicinali materia Liber quintus.

Io. Ruellio Sueßionẽsi interprete.

SVPERIOribus quatuor libris, amicißime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, & earundem lachrymis ac fructibus: item animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleribus, necnõ de omni radicum, herbarum, succorum, seminumque ratione. In hoc autem totius operis quinto disseremus de vinis & metallicis, à vite nostram commentationem auspicati.

Vitis vinifera. Cap. I.

Folia vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigãt, & inflammationem stomachi ardorémque, cum polenta: folia etiam per se, vt quæ refrigerent & adstringant, imponi solent. Potus eorũ succus dysentericis, sanguiné excreantibus, stoma-

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΑΠΟΔΟΝΤΕΣ ἐν τοῖς προγεγραφεῖσι τέτρασι βιβλίοις φίλτατε ἄρειε τὸν περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων, καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν καρπῶν τε καὶ δακρύων· ἔτι τε ζώων καὶ μέλιτος καὶ γάλακτος καὶ στεάτων καὶ τῶν καλουμένων σιτηρῶν καὶ λαχάνων. καὶ τὸν σύμπαντα περὶ ῥιζῶν καὶ βοτανῶν καὶ χυλισμάτων, καὶ σπερμάτων λόγον. ἐν τούτῳ τελευταίῳ ὑπάρχοντι τῆς ὅλης πραγματείας. διαλεξόμεθα περὶ οἴνων καὶ τῶν καλουμένων μεταλλικῶν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς περὶ ἀμπέλου παραδόσεως.

Περὶ Ἀμπέλου οἰνοφόρου. Κεφ. α.

Ἀμπέλου οἰνοφόρου τὰ φύλλα καὶ αἱ ἕλικες λεῖαι καταπλασσόμεναι κεφαλαλγίας πραΰνουσι, φλεγμονὴν τοῦ στομάχου καὶ καῦσον σὺν ἀλφίτῳ· καὶ καθ' ἑαυτὰ ἐπιτιθέμενα τὰ φύλλα ψυκτικὰ καὶ στυπτικὰ ὄντα. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν δὲ χυλὸς ποθεὶς ὠφελεῖ δυσεντερικοὺς καὶ αἱμοπτοϊκοὺς

καὶ

καὶ στομαχικοῖς καὶ κιρσώσαις. ἀποθεραπεύεται δὲ καὶ αἱ ἕλικες ἐν ὕδατι καὶ ποθεῖσαι, τὰ αὐτὰ ποιοῦσι. τὸ δὲ δάκρυον αὐτῆς ὅμοιον ὂν κόμμει, ἀσπιγνύμενον τοῖς σκέλεσι, λίθους ἐκπνάσει πινόμενον σὺν οἴνῳ· ἰᾶται δὲ καὶ λειχῆνας καὶ φῶρας καὶ λέπρας καταχριόμενον, δεῖ δὲ θερμοτέρου τὸν τόπον· σὺν ἐλαίῳ δὲ ἐγχριόμενον συνεχῶς, μηλοῖ τοὺς τείχας, καὶ μάλιστα ὁ ἀπὸ τῶν χλωρῶν κλημάτων ἀφιδρύμενος ἰχώρ· ὃς καὶ μυρμηκίας ἐπιχριόμενος ἐκβάλλει. ἡ δὲ ἐκ τῶν κλημάτων καὶ θεμφύλων τέφρα, τὰ θέλη δακτύλιον ἀφαιρεθέντα κονδυλώματα καὶ θύμια, ξὺν ὄξει καταπλασθεῖσα θεραπεύει, καὶ σφέμματα, καὶ ἐχιοδήκτοις ὠφελεῖ, καὶ σπληνὸς φλεγμονὰς ξὺν ῥοδίνῳ καὶ πηγάνῳ καὶ ὄξει καταπλασσομένη.

Περὶ Ἀμπέλου ἀγρίας. Κεφ. β'.

Ἄμπελος ἀγρία λευκή, ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς οὐ περικάζει τὸν σταφυλῆν, ἄχρι δ' ἀθήσεως ἄγει τὸν λεπομήλινον οἰνάνθην. ἡ δέ τις τελεσφορεῖ μικροῤῥαξ οὖσα, καὶ μέλαινα, καὶ συσταλική. Δυνάμιν δὲ ἔχει παύτης τὰ φύλλα καὶ αἱ ἕλικες καὶ οἱ καυλοὶ, ὁμοίως τῇ ἡμέρῳ.

Περὶ Σταφυλῆς. Κεφ. γ'.

Σταφυλὴ, ἡ μὴ πεπόσατος πᾶσα ἐκπαχύνει κοιλίαν· καὶ ἐμ-

stomachicis, & grauidarum malaciæ medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli & poti. Lachryma vitium, quę veluti gummi in caudicibus concrescit, ex vino pota calculos pellit: illita lichenas & psoras lepràsque nitro prius perfrictas sanat: eadem cũ oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet: maximéque sanies, quam accensa sarmenta vitium viridia exudarunt: qua & perunctæ verrucarum informicationes extrahuntur. Cinis sarmentorum & vinaceorum, detractis in sede condylomatis, & thymiis, illitus ex aceto medetur: prodest luxatis & viperarum morsibus: contra lienis inflammationem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

Labrusca. Cap. II.

Labrusca duorum generum est: alterius vua non maturescit, sed flore tenus œnanthen nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clauiculæ quibus repunt, vim habent cultæ viti similem.

Vua. Cap. III.

Vuæ recentes aluũ turbant,

& stomachum inflant: innocentiores, quæ decerptæ diu pependere, (ideo quòd in eis copia humoris exiccatur) vtilesq; fiũt stomacho, ægrisque, atque cibi auiditatem excitãt. In vinaceis & ollis seruatæ, ori & stomacho gratæ sunt: aluum sistunt (sed vesicam & caput tentant) & sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque, quæ in musto fuere. Sapa aut passo conditæ, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua cœlesti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosis, ardentibus & longis febribus salubres. Reconditi vinacei inflammatis mammis, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & fœminas fluxione vuluæ laborantes iuuat infusa: ad desessiones, ac fotus assumitur. Nuclei acinorũ adstringendi vim obtinẽt, stomacho vtiles sunt: inspargitur farina tostorũ, polentæ modo, dysentericis, & cœliacis, & solutis stomacho.

Vua passa alba.
Cap. IIII.

Vua passa alba adstringẽtior est:

καὶ ἐμπνευματοῖ στόμαχον· αἱ δὲ ἐπὶ χρόνον τινὰ κρεμασθεῖσαι, ὀλίγον μετέχει τούτων (διὰ τὸ πολὺ τῆς ἰκμάδος ἀνεξηράνθαι) εὐστόμαχός τε ἐστὶ καὶ ὀρέξεως ἀνακλητικὴ, καὶ ἐπιτήδειος πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντας. αἱ δὲ ἐκ τῶν στεμφύλων καὶ ἐκ τῶν βικῶν, εὔστομοι, εὐστόμαχοι· κοιλίας ἐφεκτικαὶ (κύστεως δὲ καὶ κεφαλῆς ἅπτονται) ἁρμόζουσι δὲ καὶ αἱμοπτοϊκοῖς. ὅμοιαι δέ εἰσι καὶ αἱ εἰς τὸ γλεῦκος ἐμβαλλόμεναι. αἱ δὲ ἐκ τοῦ ἑψήματος καὶ γλυκέοις κακοστομαχώτεραι. (συντίθενται δὲ καὶ μετ' ὀμβρίου ὕδατος προσταφιδωθεῖσαι, γίνονται δὲ αἱ τοιαῦται ἐπ' ὀλίγον οἰνώδεις, διψώδεσι δὲ καὶ καυσώδεσι καὶ χρονίοις πυρετοῖς χρήσιμοι. τὸ δὲ στέμφυλον αὐτῶν ἀποτεθὲν, καταπλάττεται μεθ' ἁλῶν πρὸς φλεγμονὰς καὶ σκληρίας καὶ σπαργώσεις μαστῶν· τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν στεμφύλων, δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς καὶ ῥοϊκαῖς ὠφελεῖ ἐνιέμενον· καὶ εἰς ἐγκαθίσματα καὶ προσκλύσματα λαμβάνεται. Τὰ δὲ ἐξ αὐτῶν γίγαρτα στυπτικὰ, εὐστόμαχα· φρυγέντα δὲ καὶ ἀντὶ ἀλφίτου ἐπιπλαττόμενα λεῖα, ἁρμόζει δυσεντερικοῖς, καὶ κοιλιακοῖς καὶ τοῖς τὸν στόμαχον ἀναλελυμένοις.

Περὶ Σταφίδος. Κεφ. δ'.

Τῆς δὲ σταφίδος στυπτικωτέρα ἐστὶν ἡ λευκή·

ἡ λευκή· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἡ σὰρξ αὐτῶν ἐσθιομένη ἀρτηρίας καὶ βῆχας καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν καὶ δυσεντερίαν σὺν τοῖς γιγάρτοις ἐσθιομένη καθ' ἑαυτήν· μιγεῖσα δὲ ἀλεύρῳ κεγχρίνῳ καὶ κριθίνῳ καὶ ὠῷ, καὶ τηγανισθεῖσα μετὰ μέλιτος καὶ λαμβανομένη, εἴς τε ἀποφλεγματισμοὺς καθ' ἑαυτήν· καὶ σὺν πεπέρει μασσωμένη εὐθετεῖ. διδύμων τε φλεγμονὰς παύει, καταπλασθεῖσα μετὰ ἀλεύρου κυαμίνου, καὶ κυμίνου. ἐπινυκτίδας δὲ καὶ ἄνθρακας καὶ κηρία καὶ τὰς περὶ ἄρθρα σηπεδόνας καὶ γαγγραίνας, χωρὶς γιγάρτων ἰᾶται λεία σὺν πηγάνῳ ἐπιτιθεμένη· πρὸς τὰς ποδάγρας ἁρμόζει μετὰ τοῦ ὀποπάνακος καταπλασσομένη· καὶ ὄνυχας δὲ θᾶττον ἀφίστησι σαλευθέντας ἐπιπλασθεῖσα.

Περὶ οἰνάνθης. Κεφ. έ.

Οἰνάνθη καλεῖται ὁ τῆς ἀγρίας ἀμπέλου καρπὸς, ὁπότε ἀνθεῖ. ἀποτίθεσθαι δὲ δεῖ εἰς ἀκόνιτον ἀγγεῖον ὀστράκινον, συλλέγοντας καὶ ξηραίνοντας ἐπὶ ὀθονίου, ἐν σκιᾷ. καλλίστη δὲ γίνεται ἐν συρίᾳ καὶ κιλικίᾳ καὶ φοινίκῃ. Δύναμις δὲ αὐτῆς στυπτική. ὅθεν πινομένη εὐστόμαχος καὶ οὐρητική· κοιλίαν ἐφιστῶσα καὶ αἵματος πτύσιν· ξηρὰ δὲ καταπλασθεῖσα, καὶ πρὸς ἀσώδη καὶ ὀξύνοντα στόμαχον ποιεῖ· ἔστι δὲ καὶ κεφαλαλγίαις ἐμ-

est: prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ouo, valet ad purgandum caput: eiusdemq; gratia cum pipere com manducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat: podagræ conuenienter cũ panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita celerius extrahit.

Oenanthe. Cap. V.

Oenanthe vocatur vitis syluestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non picato, collectáque substrato linteo, in vmbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho ac ciundæ vrinæ vtilis: aluum sistit, ac sanguinis excreationes: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita efficax est: capitis doloribus

 tam

tam viridis, quàm ſicca: ex aceto & roſaceo perfunditur: ſanguolenta vulnera cataplaſmate, & incipientes ægilopas, oris vlcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & roſaceo, ab inflammatione vindicat: peſsis miſcetur, ad ſiſtendum ſanguinem: contra oculorum delachrymationem, & ſtomachi ardores, cum pollinæ polentæ & vino illinitur. Cinis crematæ in teſta, candentibus prunis, facit ad oculorum medicamẽta: reduuias & pterygia, abſcedentes gingiuas, cruentáſque, cum melle ſanat.

Omphacium. Cap. VI.

Omphacion, ſuccus eſt acer bæ vuæ, nondũ matureſcentis, è Thaſia vite aut Aminæa. Oportet autẽ ante Canis ortum, expreſſam melligine in rubro ære, linteo cooperto, inſolare, vſq; dum cogatur, ſemperque quod ceruici vaſis cõcretũ hęſit, reliquo humori permiſcere: noctúq; à ſubdialibus locis in lectũ referre: quãdoquidẽ nocturni rores ipſum cõcreſcere non ſinunt. Eligendũ eſt flauũ, friabile, veheméter adſtringẽs, & linguam mordens. Sunt qui coquendo mellignem cogant. Prodeſt

ἔμβρεγμα, συὼ ὄξει καὶ ῥοδίνῳ χλωρῷ τε καὶ ξηρῷ· κατάπλασμά τε ἰσχαίμων ἀφλέγματον, καὶ ἀρχομένων αἰγιλώπων, καὶ τῶν ἐν σώμασι οὐλῶν, καὶ νομῶν τ' ἐν αἰδοίοις, συὼ μέλιτι ἢ καὶ κρόκῳ καὶ ῥοδίνῳ καὶ σμύρνῃ λεανθεῖσα· ἔις τε στομαχὰς μίγνυται πρὸς ἐπίσχεσιν αἵματος καὶ ῥεύματα ὀφθαλμῶν ἢ χαυσούμενον στόμαχον καταπλάσσεται συὼ παιπάλῃ ἀλφίτου ἢ οἴνου. καυθεῖσα δὲ ἐν ὀστράκου διαπύρεις ἀνδρᾶσι, ποιεῖ πρὸς τὰ ὀφθαλμικά· παρωνυχίας τε καὶ πτερύγια καὶ οὖλα ἀφιστῶντα καὶ ἀμαλτώμενα συὼ μέλιτι θεραπεύει.

Περὶ Ομφακίου.

Κεφ. ς'.

Ομφάκιον, ἔστι μὲν χυλὸς ὄμφακος θασίας σταφυλῆς μήπω πορκαζούσης, ἢ ἀμπελίας. δεῖ δὲ πρὸ κυνὸς ἐπιτίλλοντα τὸν χυλὸν ἐλαίζειν ἐν χαλκώματι ῥυτῷ ἐσκεπασμένῳ ὀθονίῳ μέχρις οὗ συστραφῇ ὅλον ἀεὶ τὸ περιπηγνύμενον μίσγοντα τῷ ὑγρῷ· νύκτωρ δὲ αἴρειν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ὑπαιθρείου· κωλύουσι γὰρ αἱ δρόσοι τὴν σύστασιν αὐτῶν. ἐκλέγου δὲ τὸ ξανθὸν, καὶ εὔθρυπτον, εὔφορον ἱκανῶς καὶ δάκνον τὴν γλῶτταν. ἔνιοι δὲ ἕψοντες τὸν χυλὸν συστρέφουσιν.

Αρμόζει

Ἁρμόζει δὲ πρὸς παιδάρια καὶ γαυλιὰ· ἄφθας, οὖλα πλαδαρὰ, ὦτα πυορροοῦντα σὺν μέλιτι ἢ γλυκεῖ· πρὸς δὲ σύριγγας καὶ παλαιὰ ἕλκη καὶ νομὰς σὺν ὄξει. ἐγκλύζεται δὲ ὑπὸ δυσεντερικῶν καὶ ῥοϊκῶν· ἔτι δὲ καὶ ὀξυδερκὲς, πρὸς αχύτησι δὲ ὀφθαλμῶν ἁρμόζει καὶ σκληρώσεσι καυδῶν· πίνεται καὶ πρὸς αἵματος πτύσιν πλὴν πρόσφατον καὶ κατὰ ῥῆξιν ἡμιμόλιον· ὑδαρεῖ δὲ δεῖ χρῆσθαι λίαν καὶ ὀλίγῳ· ὑπακύει γὰρ ἰσχνῶς.*

Περὶ πιότητος τῶν οἴνων καὶ λεπτότητος. Κεφ. ζ.

Οἶνοι οἱ μὲν παλαιοὶ νεύρων βλαπτικοὶ καὶ τῶν λοιπῶν αἰσθητηρίων, πρὸς δὲ γαῦρον ἡδίονες· ὅσον ὑπὸ τὴν ἀσθενές τι μέρος ἐχόντων ἔνδον, παρεμπιπτέον. ὑπὸ μὲν γὰρ τὴν ὑγείαν χρήσεως ὀλίγος τε καὶ ὑδαρὴς λαμβάνεται ἀβλαβῶς. ὁ δὲ νέος ἐμπνευματικὸς, δύσπεπτος, δυσόνειρος, οὐρητικός. ὁ δὲ μέσος τῇ ἡλικίᾳ, συμπέφυκε τὰ ἀμφότερα ἐλαττώματα· ὅθεν ἐκκριτέος ἐστὶν ἔν τε ὑγείας καὶ ἀσθενείας χρήσεσιν.

Ἐκ τῆς χρόας Κεφ. η.

Ἐπὶ μὲν λευκὸς λεπτός τε καὶ εὐανάδοτος καὶ εὐστόμαχος ὑπάρχει. ὁ δὲ μέλας παχὺς καὶ δύσπεπτος· μέθης καὶ σαρκῶν γεννητικός. ὁ δὲ

Prodest contra tõsillas, vuam, vlcera oris, humida gingiuarũ vitia, purulẽtas aureis, cũ melle aut passo: itẽ ad fistulas, vetera vlcera, nomásq;, ex aceto. Dysentericis, & mulierib⁹ fluxione vuluæ laborãtibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, & erosionib⁹ angulorũ cõuenit. Bibitur ad recentẽ sanguinis excreationẽ, etiã si rupta parte aliqua cõtin gat, sed pauco, et aquatiore est vtendũ: valde siquidẽ exurit.

Vini natura.

Cap. VII.

VINO vetere nerui lædũtur, & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est: quare cauendum ijs qui intestinæ alicuius partis imbecillitatẽ sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutũ, innoxiè sumitur. Nouũ inflat, ægrè coquitur, insomnia parit grauia, & vrinam ciet. Ætate medium, vtraque vitia fugit: quare ad victus sanorũ ægrorúmque vsurpatur.

Vinũ album. Cap. VIII.

Albũ, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctu difficile: carnem alit, & ebrietatem creat.

Giluum,

Giluũ, vtpote quod mediũ eſt, medias inter vtrũque vires habet: in ſecũda tamen & ſiniſtra valetudine, cũ primis laudat̃ album. Quin & vina ſapore diſtãt.

Vinum ſapore differens, & mixtione. Cap. IX.

Siquidem dulce craſsis partibus cõſtat, & difficilius à corpore expirat: ſtomachũ inflat: aluum & interanea, vt muſtũ, turbat: ſed minus inebriat, renibus & veſicæ aptiſsimũ. Auſterum, per vrinam celerius tranſit: ſed capita dolore tentat, & temulẽtiam gignit. Acerbũ, ad ciborum per mẽbra digeſtionem accõmodatiſsimũ: aluum, & cæteras fluxiones cohibet, minúsq; vriná expellit. nouum neruos minus tentat. Vinum aqua marina factũ, ſtomacho aduerſatur: ſitim ſtimulat, neruos infeſtat, aluo aptum, à valetudine ſe recolligentibus inutile. Paſſũ, quod vuis ſole ſiccatis in area, aut in ſarmento torrefactis exprimitur, Creticũ cognomine, aut pramnion, aut protropon: & ſapa quæ fit muſto igni decocto, Græci ſirion aut hepſema appellãt: nigra quidé, & quæ dicũtur melãpſithia, craſſa ſunt, & corpora multũ alũt. candidũ, tenuius &

ὁ δὲ κιῤῥὸς μέσος ὢν, μέσην ἔχει, καὶ τὴν πρὸς ἑκάτερα τούτων δύναμιν· αἱρετώτερος μὲν τοι ἔν τε ὑγείᾳ καὶ ἀσθενείᾳ ὁ λευκός. ἔτι καὶ πρὸς τὴν ποιότητα διαφέρουσιν.

Ἐκ τῆς γεύσεως καὶ τῶν μεμιγμένων. Κεφ. θ΄.

Ὁ μὲν γὰρ γλυκὺς οἶνος, ἁδρομερής τε ἐστὶ καὶ δυσδιάπνευστος· στομάχου πνευματωτικός. κοιλίας τε καὶ ἐντέρων ταρακτικὸς, ὥσπερ καὶ τὸ γλεῦκος· ἧττον δὲ μεθύσκει. κύστει δὲ καὶ νεφροῖς εὔθετος. ὁ δὲ αὐστηρὸς οὐρητικώτερος· κεφαλαλγίας τε καὶ μέθης ποιητικός, ὁ δὲ στρυφνὸς εὐθετώτατος πρὸς ἀνάδοσιν σιτίων· κοιλίας τε σταλτικὸς, καὶ τῶν ἄλλων ῥευματισμῶν. ὁ δὲ ἁπαλὸς ἧττον ἅπτεται τῶν νευρώδους, καὶ ἧττον ἐστὶν οὐρητικός. ὁ δὲ τεθαλασσωμένος, κακοστόμαχος, διψοποιὸς, νεύρων κακωτικὸς, εὐκοίλιος, ἀνεπιτήδειος τοῖς ἐξ ἀσθενείας. ὁ δ᾽ ἐκ τῆς ἡλιοπεδευθείσης σταφυλῆς ἢ ἐπὶ τῶν κλημάτων ὀπτηθείσης, καὶ πειβομένης γινόμενος, γλυκὺς καλούμενος κρητικὸς ἢ πρότροπος ἢ πράμνιος· καὶ ὁ καθεψομένου τοῦ γλεύκους σίριος, ἢ ἕψημα καλούμενος· ὁ μὲν μέλας, καλούμενος δὲ μελαμψίθιος παχύς ἐστι καὶ πολύτροφος· ὁ δὲ λευκὸς, λεπτότερος.

ὁ δὲ

ὁ δὲ μέσος, μέσην ἔχει τὴν τοῦ δύναμιν. συμπικὸς δὲ πᾶς ἐστι, σφυγμῶν ἀνακτητικός· πιεῖν δὲ πρὸς πάντα τὰ θανάσιμα ὅσα κατὰ ἕλκωσιν ἀναιρεῖ. πνεύμονας συν ἐλαίῳ, καὶ ἐξεμουμένους· ἐστὶ δὲ πρὸς μηκάνειον δὲ καὶ φαικὸν, καὶ τοξικὸν, καὶ κόνειον. καὶ γάλα θρομβωθὲν· καὶ πρὸς κύστιν καὶ νεφρεῖς ὀδυνωμένους καὶ ἑλκουμένους. εἰσὶ δὲ πνευματικοὶ καὶ κακοστόμαχοι. ἰδίως δὲ ὅτι τῶν τοῦ κοιλίαν ῥευματιζομένων ἁρμόζει· ὁ μελαμπύθιος. ὁ δὲ λευκὸς μᾶλλον. ὁ δὲ τοῦ γύψου ἔχων κακωτικὸς τῶν νεύρων, καρηβαρικὸς, πυρώδης, κύστεως ἄθετος· πρὸς δὲ τὰ θανάσιμα τῶν ἄλλων εὐθετώτερος. οἱ δὲ πίνακα ἢ ῥητίνην πιτυΐνην ἔχοντες θερμαντικοὶ, καὶ πεπτικοὶ· ἄθετοι δὲ τοῖς αἱμοπτοϊκοῖς. οἱ δὲ καλούμενοι ἀπαρά χυτοι, ἔχοντες δὲ ἔμφυσιν μεμυγμένου, κεφαλῆς εἰσὶ πληρωτικοὶ, μέθης γλυκεῖς ποιοί, δυσδιάπνευστοι, κακοστόμαχοι.

Περὶ Διαφορᾶς τῶν τόπων. Κεφ. ι.

Ο ῥοῦς δοκῶν πρωτεύειν τὴν ἐν Ἰταλίᾳ οἴνων φάλερνος δὲ καλούμενος, παλαιοθεὶς ἄγαν εὔπεπτος, σφυγμῶν ἀνακλητικὸς, κοιλίας στρωτικὸς, καὶ εὐστόμαχος· κύστει ἄθετος, καὶ ἀμβλυωπίαν, καὶ

& heluola iter hęc media, medias sortiuntur vires. Omnia tamẽ adstringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus venena, quæ exulcerando necãt, ex oleo pota, & vomitionib⁹ redditа, cõtra cicutas, meconium, pharicon, toxica & cõcretum in grumos lac: item contra renum ac vesicæ pruritus, rosiones, exulcerationésque. Inflant tamen, & stomacho aduersantur. Priuatim, prodest melampsithium, si vẽter rheumatismũ sentiat. Albũ, magis cæteris emollit aluum. Gipso conditum neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: cõtra venena cæteris aptiꝰ. Picata, aut resinata, excalfaciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimica. Quę verò aparachyta vocant, vt quæ admistam sapam recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum malè habent.

Vinũ loco differẽs. Cap. X.

INTER Italica vina Falernum principem locũ obtinet, quod inueteratũ perquã facilè coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstrigit, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque iis qui visus hebetudinem sentiunt, &

& ad potus crebros minimè idoneum. Albana crasioribus constant partibus, dulcia stomachum inflant, ventrem emolliunt (sed concoctionem non æquè adiuuant,) & neruo sa minus, infestant: vetustate, eadem austerum saporem cõcipiunt. Cecubum cum sit dulce, est & Albano crasius: corpus & colorem alit: ægrè tamẽ coquitur. Surrentinũ valde austerum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inueteratũ suauius redditur, & stomacho vtile. Adrianum & Mamertinũ in Sicilia æquè crasis partibus gignunt: modicè adstringunt, & ocysimè inueterantur, minusq; ob suam tenuitatẽ, neruos tẽtant, Parætypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratũ ac tenuius est: quare liberaliter epotum fallit, diu seruat ebrietatem, & soporem adfert. Istricum Parætypiano simile est, sed vrinam vehementius pelit. Chium tamen antedictis mollius, et aptũ potui est: bene alit, & minꝰ inebriat, fluxiões cohibet oculorũ medicamẽtis vtile. Lesbium facilè mẽbra subit, Chio leuius, & aluo idoneũ.

ἡ πρὸς πολυποσίαν ἀναρμοστος. ὁ δὲ ἀλβανὸς ἀδρομερέστερος τῶ φαλερείνῳ ἔγχυλος· ἐμπνευματοῖ τὸ μαχον, κοιλίαν τε μαλάττων (πέψει τε οὐχ ὁμοίως σωφρονῶν) τῶ δὲ νευρώδες ἧττον κακωτικός· παλαιωθεὶς δὲ ἧττος αὐστηρὸς γίνεται. ὁ δὲ κέκυβος γλυκὺς ὤν, ἀδρομερέστερός ἐστι τ' ἀλβανῶ· σαρκῶν τε καὶ εὐχροίας χυμωτικός· πέψει δὲ ἄθετος. ὁ δὲ συρεντῖνος αὐστηρὸς ἰσχυρῶς ἐστιν· ἔστι δὲ ἐντέρων ἡ στομάχου ῥεῦμα ἵστησι, κεφαλῆς τε ἧττον ἅπτεται λεπτομερὴς ἂν· παλαιωθεὶς δὲ εὐστόμαχος ἡδὺς γίνεται. ὁ δὲ ἀδριανὸς ἡ ὁ μαμερτῖνος χυμώδεις ἐν σικελίᾳ, κατ' ἴσον εἰσὶν ἀδρομερεῖς· μετρίως σύφοντες, ἡ τάχος παλαιοῦνται, ἧττον τε τοῦ νευρώδους ἅπτον), διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς λεπτόν. οἱ δὲ θρᾳττικὸς ἡ αὐτὸς ἐκ τῶν κατ' ἀδρίαν καμιζόμενος τόπων, εὐώδης ἡ λεπτός ἐστιν. ὁ δὲ λαυθάνει πολὺς πινόμενος, φυλάττει τε ἐφ' ἱκανὸν τὴν μέθην ἡ καρεῖ. ὁ δ' ἰστρικὸς λεπτόμενος, ἔοικε τῷ θρᾳττικῷ, οὐρητικώτερος ὑπάρχων· ὁ μὴν τοι χίος ἀπαλώτερος τῶν θρεπτικῶν, εὔπεπτος, πότιμος, ἧττον μεθύσκων, ῥεύματος σαλτικὸς, χρήσιμος εἰς τὰ ὀφθαλμικά· ὁ δὲ λέσβιος εὐανάδοτος, κεφάτερος τῶ χίου καὶ εὐκοίλιος.

Ephesium

τὴν

τῷ αὐτῷ δὲ τύτῳ κίκτῃ δύναμιν, ὁ κατὰ ἔφεσον ἡγεμόνιος, καλύμνιος δὲ φυγελίτης· ὁ δὲ ἐν τῆς ἀσίας μεσογείτοις ἐν τῷ μόλυ, καφαλαγὴς καὶ νεύρων βλαπτικός. ὁ δὲ κῶος, καὶ κλαζομένιος διὰ τὸ θαλάττης πολλῆς μετέχειν σύφαρτος, καὶ ἐμπνευματώδης, κοιλίας τε παρατικὸς καὶ νεύρων δὲ βλαπτικός.

Περὶ δυνάμεως τῶν οἴνων. Κεφ. ιά.

Κοινῶς δὲ πᾶς ἀμιγὴς οἶνος καὶ ἀκέραιος, ἀυσηρὸς δὲ τὴν φύσιν, θερμαντικὸς, ἐυανάδοτος, ἐυστόμαχος, ὀρεκτικὸς, θρεπτικὸς, ὑπνοποιὸς, ῥωστικὸς, ἐυχροίας παρασκευαστικός. ἱκανῶς δὲ πυθεὶς, βοηθεῖ τοῖς κώνιον, ἢ κώειον, ἢ φαρικὸν, ἢ ἰξίας, ἢ μηκώνειον, ἢ λιθάργυρον, ἢ σμίλακα, ἢ ἀκόνιτον, ἢ μύκητας εἰληφόσι. θορός τε ἑρπετῶν δηγμοὺς καὶ πληγὰς παίντων, ὅσα πλήξαντα ἢ δακόντα κατὰ ψύξιν ἀναιρεῖ ἢ ἀναπρήθει στόμαχον. ποιεῖ καὶ θορὸς ἐμπνευμάτωσιν χροίας καὶ δῆξιν ὑποχονδρίου, καὶ πλατυσμὸν, καὶ λύγγα στόμαχου, ἐντέρων τε καὶ κοιλίας ῥευματισμόν. καὶ ἱδρῶσι καὶ διαφορυμένοις ἁρμόζοισι, μάλιστα δὲ οἱ λευκοὶ καὶ παλαιοὶ καὶ ἐυώδεις. εἰ μήν τοι παλαιοὶ καὶ γλυκεῖς, καὶ

Ephesium eandem vim habet, quod Phygelites nominatur: verùm Asianũ è Tmolo môte, Mesogites appellatum, capitis dolores ciet, & neruos lædit. Coum verò et Clazomenium, quoniã multã sibi maris aquã vendicant, facilè corrũpuntur: flatus mouent, aluum turbant, neruis officiunt.

Vini facultas. Cap. XI.

Vinum omne (vt reliqua in commune dicãtur) merum ac syncerum, & sua natura austerum excalfacit, facilè in membra distribuitur, stomachũ adiuuat appetentiam ciborũ inuitat, vires alit, ac robur auget: somnum conciliat, & cõmendat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptã cicutam, coriãdrum, pharicum, ixiam, meconiũ, argẽti spumã, taxum, aconita, fungósve: contra serpentiũ morsus, et omniũ ictus quæ refrigerando necãt, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad lõgas inflationes, rosionesq; p̃cordiorũ, ac distẽtiones, stomachi resolutionẽ, & si vẽter aut interanea rheumatismũ sentiant. Cõueniũt sudatoribus. & quib⁹ corpus immodico sudore digerit, maximè alba vetera et odorata. Quæ

Quę tamẽ vetuſtate dulceſcũt, renibus ac veſicæ accómodatiora reddũtur: vulneribus, inflammationibúſque in ſuccida lana imponuntur: tetra vlcera, & phagedænica, & fluxionib⁹ obnoxia, cómodè perfunduntur. Quæ marinam nõ receperunt, auſtera & alba, ad ſanorum victus vſurpantur. In his præſtãt Italica, Falernum, Surrentinũ, Cecubum, Signinum, & permulta Campaniæ, & Parætypianũ ab Adriatico ſinu, & Siculũ quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheſo. Craſſa verò & nigra, ſtomacho negotium exhibẽt, inflationem pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & auſtera ſtomacho proſunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius vrinam ciunt, & dolores capitis mouent, neruóſque largius pota tentãt. In media ætate, vt à ſeptimo anno, potui ſaluberrima ſunt. Modus autem pro ætate, & tempore anni, & cõſuetudine, & qualitate vini definiatur. Non ſitire, & modicè cibos prolui, optimũ eſt præceptũ. Nocet ebrietas omnis, & maximè aſſidua: ſiquidem

καὶ πρὸς τὰ περὶ κύστιν καὶ νεφρὺς ὀπτικωτέρους· πρός τε τραύματα καὶ φλεγμονὰς σὺν ἐρίοις οἰσυπηροῖς ὀπτικὰ μίγνυται. καταπλοῦται δὲ ὠφελίμως πρὸς τὰ θηριώδη καὶ φαγεδαινικὰ καὶ ῥευματιζόμενα ἕλκη. πρὸς δὲ τὴν ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν εὔθετοι οἱ ἀδιάλαυτοι αὐστηροὶ καὶ λευκοί. διαφέρουσι δὲ τούτων οἱ Ἰταλικοί. ὡς ὁ Φαλερεύτης, ὁ Συρεντῖνος καὶ Κεκούβιος, ὁ τε σιγνῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ οἱ ἀπὸ τῆς Καμπανίας, καὶ ὁ Θραικιανὸς ἀπὸ τῆς Ἀδριανοῦ, καὶ σικελιωτικὸς ὁ μαμερτῖνος καλούμενος. ἑλληνικῶν δὲ χῖος, λέσβιος, φυγελλίτης ὁ ἐν Ἐφέσῳ γλυκύμελος. οἱ δὲ παχεῖς καὶ μέλανες κακοσόμαχοι, φυσώδεις, σαρκὸς μέν τοι γλυπτικοί. οἱ μὲν τοι λεπτοὶ καὶ αὐστηροὶ εὐσόμαχοι, ἧττον δὲ σαρκοποιοί. οὐρητικώτεροι δὲ καὶ κεφαλαλγεῖς οἱ σφόδρα παλαιοὶ καὶ λεπτοὶ καὶ λευκοί, ἄπτονται δὲ τῆς νευρώδους πλεονασάντες. οἱ μέσοι δὲ τὴν ἡλικίαν ἄριστοι πρὸς πόσιν. ὡς οἱ ἀπὸ ζ' ἐτῶν, ἡ δὲ ποσότης παρὰ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν τῶν ἐτῶν ὥραν, καὶ ἕξιν καὶ ποιότητα τοῦ οἴνου διειλέχθω. καὶ τὸ μὴ δίψῶν δεῖσθαι πρόγευμα, καὶ τὸ μετρίως βραχίω τὴν τροφήν. μέθη δὲ πᾶσα, καὶ μάλιστα ἡ συνεχὴς ἐπιλαβόν-

τα

τὰ τε γὰρ νεῦρα πολυρρεύμονα καὶ ἐκάστην ἐπιδίδωσι καὶ παύων ὀξέων ἀρχὰς ἐμπιεῖ καθημέραν ἡ πολυποσία. μετέωος δὲ οἰνοῦσθαι ἐπὶ πλείων ἡμερῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ ὑδροποσίας ὠφέλιμον· μετασυγκρίνει γάρ πως ταῖς τε αἰσθητικὰς ἀναγεσθαίρου ἐκκρίσεις, καὶ ὑδάλλως ποεῖ ποιοῦν. δεῖ μὴν τοι γε μετὰ τὴν οἴνωσιν ὕδωρ πίνειν· ἀπὸ θεραπείας γάρ τινος χάριν τῆς συγκεκιμμένης οἰνώσεως, ῥόπον ἀπάγει βοηθείας.

Περὶ ὀμφακίτου οἴνου. Κεφ. ιβ'.

Ὁ δὲ καλούμενος ὀμφακίτης σκυθάζει ἰδίως ἐν λέσβῳ, θηλοπωλευομένης μήπω κατὰ πάντα πεπείρου ἡ σταφυλῆς ἥσης, ἔπι δὲ ἐξιζήσης, ἐπὶ ἡμέρας γ' ἢ δ'. ἕως ἂν ῥυσωθῶσιν οἱ βότρυες, καὶ μετὰ τὸ ἀνθλιβῆναι ἠλαίζεται ἐν καμμίοις οἴνοις. στυπτικὴν δ' ἔχει τὴν δύναμιν καὶ εὐστόμαχον, καὶ κοιλώδεσι καὶ εἰλεώδεσι καὶ τοῖς δυσπέπτοις καὶ εἱλελυμμένοις τὸν στόμαχον ἁρμόζουσιν· δοκεῖ δ' καὶ λοιμικῆς διαθέσεσι βοηθεῖν καταστεφάμενος. χρήζουσι δὲ ἡ τοιοῦτοι οἴνοι ἐτῶν πλειόνων, ἄλλως γὰρ οὐκ εἰσὶ πότιμοι.

Περὶ Δωτείας καὶ ἀσθενάμου. Κεφ. ιγ'.

Ὁ δὲ καλούμενος δευτείας, ὃν ἔνιοι πότιμον καλοῦσι, σκευάζεται φοῦτον ἢ τρόπον· εἰς τὰ σέμφυλα, ὧν

siquidé obsessos neruos quotidie remittit: largiórq; pot⁹, acutorum morborū adfert initia. Mediocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maximè post aquæ potus, vtilis: nanq; modo quodā ex alto euocat, sensiléfque expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. Sed aquā post vinolétiā bibere oportet: siquidé valetudinis alicuius gratia factæ temulentiæ remedium affert frigida.

Omphacites. Cap. XII.

OMPHACITES nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri vua, paulò ante maturitatē decerpta, triduo aut quatriduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressúmque vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet: prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malaciæ, & crudis: in pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt.

Lora. Cap. XIII.

Lora, quā deuteriā, alij potimō appellāt, fieri solet, adiectis metretis trib⁹ aquæ, ī vinacea, quibus

quib⁹ triginta vini metretę extractæ fuerint: calcatis vinaceis, expreſſóq; decocto ad tertias parteis, & additis in ſingulos congios modi eius qui remanſit, binis ſalis ſextariis, poſt hyemem transfunditur in vaſa. Lora intra annum vtēdum: etenim celeriter exoleſcit. Cóuenit ægris quib⁹ timemus noxam vini, coacti ſæpe deſideriis eorum obtemperare: item à longa valetudine ſe recolligentibus. Fit & vinum quod adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo: Pares aquæ, & muſti menſuræ coquũtur molli igne, donec abſumatur aqua: quod, vbi refrixerit, elutriaton, picato vaſe reconditur. Alij marinæ, & cœleſtis aquæ, mellis & muſti pares miſcent portiones, decapulant, & quadraginta dieb⁹ inſolant: quo ad annum vtuntur ad omnia eadem.

Vinum è ſylueſtri vua expreſſum. Cap. XIIII.

VINVM è ſyueſtri vua nigrum adſtringit: prodeſt alui & ſtomachi fluxionibus, & cæteris quibus conſtrictione, & contractione opus eſt.

ὧν ἐξέθλιψας οἴνου μετρηταὶ λ'. βάλε ὕδατος μετρηταὶ γ'. καὶ μίξας καὶ πατήσας ἐκθλιψον, καὶ ἀφέψησον εἰς τὸ τέτον, χρεὶ δὲ ἑκάστῳ τῶν ἀναλφθέντων μέτρων, μίξον ἁλὸς ξέστας β'. καὶ μετὰ τῶν χειμῶνα διάχει εἰς καρέμια. χρῶ δ' αὐτῷ μετ' ὀλιγον τάχεως γὰρ ἐξίτηλος γίνεται. ἀρμόζει δὲ ἐφ' ὧν διαζόμυ οἶνον διδόναι, ἀναγκαζόμυοι δ' ἐπιθυμίαν τῶ νοσέντος. καὶ ἐπὶ τῶ νόσων ἀναλαμβανόντων χρονίως. Γίνεται δὲ καὶ ἀδύναμος λεγόμυος τὴν αὐτὴν ἔχων τῷ δευτερίῳ δύναμιν. δεῖ δὲ ἴσ μέτρον ὕδατος τῷ τῶ γλεύκους μίξαντας, ἑψῆσαι πρὸς ἥλιον πυρὶ μαλακῷ ἄχρις ἂν ἐξαναλωθῇ τὸ ὕδωρ· καὶ μετὰ τῶτο ψύξαντας καταγγίζειν εἰς ἀγγεῖον πεπωκυμμένον. ἔνιοι δὲ θαλάττης παλαιὸς καὶ ὕδατος ὁμβρείου καὶ μέλιτος καὶ γλεύκους ἴσα μίξαντες καταγγίσαντες, ἡλιάζουσιν ἐπὶ ἡμέρας μ'. χρῶνται δὲ αὐτῷ πρὸς τὰ αὐτὰ μετ' ὀλιγον.

Περὶ οἴνου ἐκ τῆς ἀγρίας σταφυλῆς. Κεφ. ιδ'.

Ο δὲ, ἐκ τῆς ἀγρίας σταφυλῆς μέλας, στυπτικὸς ὑπάρχων, ἁρμόζει κοιλίᾳ ῥεομαπτζομένῃ, καὶ στομάχῳ, καὶ πρὸς τὰ ὄμματα ὅσα σύψεως καὶ συστολῆς χρήζει.

Vinum

Περὶ Μυ-

Περὶ Μελιτίτου οἴνου. Κεφ. ιε'.

Οἶνος μελιτίτης, δίδοται μὲν ἐν χολικοῖς πυρετοῖς ἀδυνᾶ τὸ στόμαχον ἔχοντι· ἔστι μαλάττει γὰρ τὴν κοιλίαν, ὕβρεα κινεῖ, τὸ στόμαχον ἀπο καθαίρει, ἁρμόζει καὶ ἀρθριτικοῖς, καὶ νεφριτικοῖς, καὶ τοῖς ἀδυνᾶ ἢ κεφαλὴν ἔχουσι· χρήσιμος ἐστὶ καὶ γυναιξὶν ὑδροπεπύωσας· εὐώδης γάρ ἐστι καὶ θρεπτικός. διαφέρει δὲ οἰνομέλιτος, ὅτι ἐκεῖνος μὲν ἐξ αὐστηροῦ οἴνου, καὶ παλαιοῦ καὶ ὀλίγου μέλιτος σκευάζεται. ὁ δὲ μελίτης πρὸς ἑκτὸν χοᾶς αὐστηροῦ γλεύκους, μέλιτος χοῦν ἕνα καὶ ἁλὸς κύαθον ἕνα. σκευάζειν δὲ δεῖ ἐν μεγάλῳ ἀγγείῳ ἵνα τόπον ἔχῃ, πρὸς τὸ ζεῖν παρασκευάσοντας τῷ θερμῷ μᾶλλον ἁλὸς καὶ ὀλίγον ἄχρις ἂν ἐκζέσῃ, παυσαμένου δὲ καὶ ἀγγεῖα εἰς ἕλδρα καὶ ῥάμια. Περὶ οἰνομέλιτος. Κεφ. ις'.

Οἰνόμελι δὲ διαφέρει τὸ μὲν τῷ παλαιῷ οἴνῳ καὶ αὐστηρῷ καὶ μέλιτος καλῶς γινόμενον ἧττον τὸ πνεῦμα τοῦ καὶ ταχέως παρίσταται τὸ τοιοῦτον. ἔστι δὲ τὸ μὲν παλαιὸν θρεπτικόν· τὸ δὲ μέσον εὐκοίλιον, ἁρμοστικόν· βλάπτει δὲ ἐπὶ βοφῇ ληφθέν· πινόμενον δὲ ἐν ἀρχῇ πλησμοῖ· ὀφελεῖν δὲ μὴ τυῦτα κινεῖ. σκευάζεται δὲ πρὸς δύο μερίδας ὡς ἐπὶ πολὺ, οἴνου ἑνὸς μερῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, οἴνου ἑνὸς μερῶν μέλιτος μιᾶς μύου. οἱ δὲ, ἵνα τάχιον ἀνοῦ παρασκήσωσι, σωφλοῦσι τὸ μέλι τῷ οἴνῳ, καὶ οὕτω καταγίζουσιν, ἕως

Vinũ melitites. Cap. XV.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt: nanque aluum leuiter emollit, vrinam ciet, stomachũ expurgat. Prodest articulario morbo, renum viciis, imbecillo capillo, & mulieribus abstemiis: odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso qđ fit è vino vetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinq; cógios austeri musti, mellis cógio, & salis cyatho. Cortinis magnis, quo magis ad efferuescendum locus pateat, fieri oportet, sensim aspersо sale: cúmque effer uere desierit, in alia vasa trãsfunditur.

Mulsum. Cap. XVI.

Mulsum è vetere vino austeróque, & bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in vsum venit. Vetus, corpus alit: media ætate, aluo prodest, vrinã pellit: à summo cibo sumptũ, nocet: & inter initia potum, implet: dein appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum duabus vini metretis, admixta vna mellis. Aliqui, quo celeri præberi possit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt.

Alij vtilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, vnum mellis adiiciunt: & vbi ferbuerit vase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa. Cap. XVII.

Aqua mulsa easdē quas mulsum vires possidet. Cruda vtimur, cū moliri deiectionē, aut vomitionē incitare volum⁹, vt iis qui venena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elāguescētis pulsus, quos illi dixere microsphyctos, tussiētib⁹, peripneumonicis, & iis q̄ immodico sudore digerunt. Iā paratū cōditiuū, quod aliqui hydromeli ꝓpriè vocant, media ætate adynamo vino, aut loræ in recreādis viribus respōdet, & similem vim adipiscitur: quare inflāmationibus alicuius mēbri plus q̄ lora ꝓdest. Inueterati tamē vsus dānatur, inflāmatis, aut cōstrictis: sed laborāti stomacho, aut cibū fastidiēti, sudatoribúsve cōuenit. Fit, duabus pluuiæ aquæ veteris ad vnā mellis partē additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adiiciunt, & ad tertias parteis decoquūt, & ita recōdunt. Nec desunt q̄ hydromeli appellēt, q̄ à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed

ἔνιοι δὲ διὰ λυσιτέλειαν, γλεύκους ζέοντος ξέσας ς'. πρὸς ξέσας ἀ. μέλιτος μιγνῦντες μετὰ τὸ ἀποζέσαι καταγίζουσι. μᾶλλον δὲ γλυκύ.

Περὶ Μελικράτου. Κεφ. ιζ'.

Μελίκρατον δὲ τὸ αὐτὸ τῷ οἰνομέλιτι δυνάμιν κέκτηται. χρώμεθα δὲ τῷ ἀφεψημένῳ, ἐφ' ὧν κοιλίαν μαλάξαι βεβούλεθα. ἢ ἔμετον κινῆσαι, ὡς ἐπὶ τῶν θανάσιμον πεπωκότων. διδόντες αὐτὸ μετ' ἐλαίου, τῷ δὲ ἀφεψημένῳ ἐπὶ τῶν μικροσφύκτων καὶ ἀδένων καὶ βηττόντων καὶ περιπνευμονικῶν καὶ διαφορημένων. Τὸ δὲ σκευαστὸν καὶ ἀπόθετον ὁ ἴδιος, ἔνιοι ὑδρόμελι καλοῦσι, μίσον μὲν τῇ ἡλικίᾳ ὑπάρχον ἀναλογεῖ τῷ δευτείᾳ καὶ ἀδυνάμῳ οἴνῳ ὅσον ἐπὶ τῷ παὶ δυνάμεις ἀνακτᾶσθαι· ὅθεν ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων τὶ μέρος ὀξὺν οὔθετον μᾶλλον τὸ δευτείᾳ. τὸ δὲ παλαιότερον. ἀδόκιμον ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων καὶ στεγνῶν· ἐπὶ δὲ τῶν στόμαχον πεπονθότων ἢ ἀγορίκτων ἢ διαφορημένων ἐπιτήδειον. Σκευάζεται δὲ πρῶς ἓν μέλιτος μέρος, δύο ὕδατος ὀμβρίου παλαιᾶ μιγνυμένῳ καὶ ἡλιαζομένῳ. οἱ δὲ, πηγαῖον μίξαντες ἀφεψῆσιν εἰς τὸ βίτον καὶ ἀποτίθενται. καλοῦσι δέ τινες καὶ τὸ ἀπὸ μέλιτος ἐκπλυνομένων τῶν κηρίων ὕδατι σκευαζόμενον, ὑδρόμελι, καὶ ἀποθέμενον·

πηγνύμενον. δεῖ δ' αὐτὸ καὶ ἀκρατέστερον ποιεῖν. οἱ δέ, καὶ τοῦτο ἕψουσι. ἔστι δὲ ἄδηκτον ὅτι νοσούντων, διὰ τὸ πλεῖστον ἔχειν κηρωθέντος.

Περὶ ὑδάτος. Κεφ. ιή.

Ὕδωρ, τὸ μὲν ἐν τῷ καθόλου ἐπίκρισιν δυσχερῆ ἔχει διὰ τὰς τῶν τόπων ἰδιότητας καὶ ἰδιοσυγκρισίας, καὶ τὸν ἀέρας καὶ ἄλλα ἃ ὀλίγα. ὡς δὲ ἐπιτροπολὺ ἄριστόν ἐστι τὸ καθαρὸν καὶ γλυκύ, ἀμύτοχον δὲ οἵας δηποτοῦν ποιότητος καὶ τοῖς ὑποχονδρίοις μὴ δ' ἐλάχιστον χρόνον ἐπιμένον. ἔτι τὲ ἀλύπως ἐνδοθοῦν καὶ ἐμπνευματοῦν μὴ δὲ διαφθειρόμενον.

Περὶ Θαλασσίου ὕδατος.

Κεφ. ιθ'.

Θαλάσσιον ὕδωρ θερμὸν, δριμὺ, καυστόμαχον (χολίας γὰρ τὰ ῥακτικὸν) ἄχρι φλέγμα. θερμὸν δὲ καταστρόμενον, ὑπακτέται καὶ διαφορεῖ· ἁρμόζον τοῖς περὶ νεῦρα πάθεσι καὶ χρώμασι πρὸ τὸ ἑλκωθῆναι. ὠμηλύσεσί τε ὑπτιδείοις μίγνυται, καὶ ἐμπλάστροις καὶ μαλάγμασι διαφορητικοῖς σύστατον. καὶ πρὸς τὰ κινώματα ἐνέμβρυον χλιαρόν· καὶ πρὸς τρόφους θερμὸν, ῥώσας τὲ καὶ κινησιῶν καὶ κνησμῶν καὶ κονίδων, καὶ μασῶν ἀπαργώντων καταπλασμα. διαφορεῖ καὶ πλιώματα πυκιώμενον, καὶ πρὸς τὰ τῶν θηρίων δήγματα ἅρα

sed meracius confieri cõuenit: aliqui id coquunt. Ægrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vẽdicat.

Aqua. Cap. XVIII.

De aquis in vniuersum decernere, ꝓpter locorũ proprietates, & peculiares naturas, cœlum, & alia pleraq; difficile est. Magna tamẽ ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps, & q̃ ne minimo quidẽ tempore in præcordiis cõmoratur: ad hęc, quæ & facili via fertur, & citra molestiã, nec inflationes creat, & minimè computrescit.

Aqua marina. Cap. XIX.

AQVA maris calida est, & acris: stomacho aduersatur (aluum enim conturbat) pituitam expellit. Si verò calida ad fotus adhibeatur, elicit & discutit: neruorum vitiis, & pernionibus, ante vlcera prodest. Miscetur cataplasmatis ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepefacta infunditur & ad tormina: calida, pſoras, pruritus, impetigines, lendes, & mãmas rigẽtes, foueri vtile est: liuores fotu discutit: ad venenatos ictus,

qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maximè scorpionum, phalangiorum, aspidúmque: etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. Et malo habitu confectis iam diu corporibus, neruísque, balneæ ex ea vtiles: hydropicos, capitis dolores, auriú grauitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquæ mistione reposita, virus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verùm post deiectionem, dant gallinæ aut piscium iuscula, ad domandã morsus acrimoniam.

Thalassomeli.

Cap. XX.

QVOD thalassomeli vocatur, vehementer purgare cõstat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defæcatis, & picato vase per Canis æstus insolatis. Alij ad binas marinæ coctæ singulas mellis adiiciút, & vase condunt: huiusmodi moderatiõ est aqua marina & mitius.

Acetum. Cap. XXI.

Acetú refrigerat, & adstringit: stomacho

ὅσα πρόμοις καὶ ψυγμοὺς φέρει, μάλιστα δὲ σκορπίων καὶ φαλαγγίων, καὶ ἀσπίδων, καὶ εἰ προσεμβαίνει τις εἰς θερμὸν αὐτὸ ὠφελεῖ. καὶ ταῖς χρονίαις καχεξίαις τὸ σώματος καὶ τῶν νεύρων, ὠφέλιμον τὸ δι' αὐτὸ λουτρόν· ὑπαλμυζόμενον ἢ θερμόν, ὑδρωπικοὺς, κεφαλαλγίας καὶ δυσκοΐας παρηγορεῖ. ἀποτιθέμενα δὲ ἡ ἀκέραιος θάλασσα καὶ ἀμιγὴς ποτίμου ὕδατος, ἄβρωμος γίνεται. οἱ δὲ, προσφέρουσιν αὐτῷ καὶ οὕτως ἀποτίθενται. δίδοται δὲ καὶ πρὸς κάθαρσιν καθ' ἑαυτὸ ἢ μετὰ ὀξυκράτου, ἢ οἴνου ἢ μέλιτος· καὶ μετὰ τὸ καθαρθῆναι, ἐπιδίδασι ζωμὸν ὄρνιθος ἢ ἰχθύων, πρὸς τὸ κατακερασαι τὴν τῆς δύξεως δριμύτητα.

Περὶ Θαλασσομέλιτος.

Κεφ. κ'.

Θαλασσόμελι δοκεῖ καθαίρειν ἀνδρικῶς. σκευάζεται δὲ ἐκ μέλιτος καὶ ὕδατος ὀμβρείου καὶ θαλάσσης, ἴσων δυλιαθέντων καὶ ἡλιαθέντων ἐν ἀγγείῳ πεπονημένῳ ἐν τοῖς ὑπὸ κυνὸς καύμασιν. οἱ δὲ, δύο μέρη θαλάσσης ἀφεψημένης καὶ ἓν μέλιτος καταμίξαντες, καταγλίζουσι· μετειώτερον δὲ γίνεται καὶ εὐπεπέστερον τὸ τοιοῦτον τῆς θαλάσσης.

Περὶ Ὀξους. Κεφ. κά.

ΟΞΟΣ ψύχει καὶ στύφει, εὐστόμαχόν

ὑγρὸν μαλθακόν τε ὄζει καὶ εὐόρικτον σαλπικέν τε αἱμορραγίας πάσης, πινόμενόν τε ἢ ἐγκαθιζόμενον ἢ ἐπὶ ῥευμάτων κοιλίας συνεχόμενον τοῖς προφαῖς ἁρμόζει. ἕλκεσί τε ὄζει καὶ ἀφλέγμαντον σὺν ἐείοις οἰσυπηροῖς ἢ πτέρυξι ἐπιτιθέμενον· σέλλει ἢ ὑστέραν καὶ ἕδραν προπίπτων κᾶν· ἢ οὖλα ἀφιεῖσῶτα καὶ αἱμορραγοῦντα. ποιεῖ ἢ θεὸς νομὰς καὶ ἐρυσιπέλατα, ἕρπητας, λέπρας, λειχῆνας, πτερύγια, σὺν πίνι τῶν ἐπιτηδείων μιγνύμενον· φαγεδαινικά τε ἕλκη συνεχῶς ἀπαντλούμενον, καὶ νομὰς ἰσχναίνει· ὠφελεῖ καὶ ποδαγρικοὺς καταντλούμενον θερμῷ μετὰ θείου· ὑπώπιά τε αἴρει σὺν μέλιτι καταχριόμενον· θεός τ' ταῖς ἐγκαύσεις τῆς κεφαλῆς σὺν ῥοδίνῳ ἢ οἰσυπηροῖς ἐείοις ἢ πτέρυγι· ὑδρωπικούς τε καὶ δυσικόους ὑπατμιδὶν θερμὸν ὠφελεῖ, καὶ ἤχους καὶ συριγμούς· ἐνωτίοις δὲ κτείνει τὸν ἐν ὠσὶ σκώληκας. σέλλει καὶ φύγεθλα χλιαρὸν καταντλούμενον, ἢ διὰ σπόγγου ἐπιτιθέμενον, καὶ κηκιεῖς παρηγορεῖ. θεός τε ἐνείων δήγματα ὅσα ψύχει καταίτλημα θερμόν· ψυχρὸν δὲ τοῖς πυρετοῦσι τ' ἰοβόλων. ποιεῖ καὶ θεὸς τὰ ἀσάσιμα πάντα πινόμενον θερμὸν καὶ ἐξεμούμενον, μάλιστα

stomacho vtile, & appetẽtiam excitat: erumpentem vndecũque sanguinem, potu infestúve fistit: prodest alui fluxionibus coctum cũ cibis: cruentis vulneribus inditur, & inflãmationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum: reprimit procidentia sedis, vuluæq; : itẽ abscedẽtes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, vlcera quæ serpũt, lepras, impetigines, pterygia, cũ aliquo conuenienti efficax est: phagedẽnas vlcerum, nomásque fotu continuo cohibet: podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur: fugillationes rapit, cum melle illitũ. Contra capitis ardores cũ rosaceo in succidis vellerib⁹, aut spongia imponitur. Ad aquam inter cutẽ, grauitaté aurium, & sonit⁹, sibilosq; feruẽtis vapor proficit: instillatũ quoq; auriũ vermes necat. Panos coërcet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spõgia admoueatur, & pruritus ꝓmulcet. Cótra venenatos serpentiũ ictus, qui refrigerãdo nocẽt, calidũ cõmodè fouetur: & frigidũ, iis q̃ exurẽs virus eiaculanť. Calidũ potũ, atq; vomitionibus redditũ, aduersus omnia venena efficax est,

præsertim contra meconium, & haustam cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiam, taxúmque, cum sale. Haustu voratas hirudines, si forbeatur, eiicit: tussim veterem mitigat, & recentem lacessit. In orthopnœa calidum commodè forbetur: gutturis fluxiones gargarizatum inhibet, anginis & vuæ procidenti cõuenit: contra dentiũ doloré, calidum colluitur.

μετὰ θερὸς μηκωνείου καὶ κωνείου πόσιν, ἢ αἵματος καὶ γάλακτος θρόμβωσιν ἐν κοιλίᾳ, θερός τε μύκητας καὶ ἰξίαν, καὶ σμίλακας συὸ ἁλσί. βδέλλας τὸ πεθὲν σας καταῤῥοφούμενον ἀποβάλλει· καὶ βῆχα χρονίαν θεραύνει, πίνω δὲ θερόφατον ῥεθίζει. ἁρμόζει ἢ καὶ θερὸς ὀρθόπνοιαν θερμὸν καταῤῥοφούμενον· στέλλει δὲ ἀναγαργαριζόμενον καὶ τὰ ἐν βρόγχοις ῥεύματα, συναγχικοῖς τε ἁρμόζει ἢ θερὸς κιονίδα κεχαλασμένων ἢ θερὸς ὀδόντων πόνον θερμὸν διακλυζόμενον.

Acetũ mulsum. Cap. XXII.

Acetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc modo temperatur: Aceti heminas quinque, salis marini pondo, mellis minas decẽ, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atque vbi refrixerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & arti culorũ morbo conflictatis, pdesse credit. Cõtra morsũ eius viperæ quam sepa vocant, haustũ meconiũ, ixiámve, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizat.

Πρὶ Ὀξυμέλιτος. Κεφ. κβ΄.

Ὀξύμελι σκευάζεται οὕτως· λα ζὰν ὄξους κοτύλας ε. καὶ ἁλὸς θαλασσίου μνᾶν μίαν, μέλιτος μνᾶς ι. ὕδατος κοτύλας ι. μίξας ἕψησον ἄχρις οὗ δεκάκις ἀναζέσῃ. ἢ ψύξας κατάγγισον, δοκεῖ δὲ λαμβανόμενον πάχος ἄγειν, ὠφελεῖν ἰσχιαδικοὺς, ἢ ἀρθριτικοὺς ἢ ἐπιληπτικούς. ἁρπᾷ δὲ ἢ τοῖς ὑπὸ ἐχίδνης τῆς καλουμένης σκπὲς δηχθεῖσι, καὶ τοῖς μηκώνειον ἢ ἰξίαν πιοῦσιν. ἀναγαργάρισμά τε συναγχικῶν ὠφέλιμον.

Acida muria. Cap. XXIII.

Acida muria, quã Græci oxalmen vocãt, cõtra nomas fotu, putrida vlcera, canũ morsũ, &

Πρὶ Ὀξάλμης. Κεφ. κγ΄.

Ὀξάλμη ὠφελεῖ καταπλασμένη θερὸς νομὰς, σκπεδόνας, κυνόδηκτα, ἢ

κτα, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἰοβόλων δήγματα. σέλλει δὲ καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν λιθοτομηθέντων αἱμορραγίας, ἐυθέως μετὰ τὴν χειρουργίαν θερμὴ ἐγκλυζομένη, καὶ ἕδραν σφιγγομένη ἐγκλύζεται δὲ ὑπὸ τῶν μετὰ νοσῶν δυσεντερικῶν· δεῖ δὲ ἐπεζυματίζειν γάλακτι. καταῤῥοφηθεὶς δὲ καὶ ἀναγαργαριζόμενος βδέλλας κτείνει· σμήχει δὲ καὶ πάντα καὶ ἀχῶρας.

Περὶ Θυμοξάλμης. Κεφ. κδ'.

Θυμοξάλμη, ἣν ἐχρῶντο οἱ ἀρχαῖοι ὑπὸ τῶν ἀδενῶν τὸν στόμαχον ἐχόντων. κατὰ τρεῖς ἢ τέσσαρας κυάθους σφῆς ὕδατι θερμῶν κεκραμένοις καὶ διδόντες, καὶ ὑπὸ ἀρθριτικῶν καὶ πνευματουμένων. ἄγει δὲ παχέα καὶ μέλανα. σκευάζεται δὲ οὕτω. Θύμου λείου ὀξύβαφον, ἁλῶν ἴσον ἀλφίτων, πηγάνου, γλήχωνος, ἑκάστου ὀλίγον βαλὼν εἰς ἄγγος, ἐπίχει ὕδατος κοτύλας ς'. ὄξους ἡμικοτύλιον σφενδαμίνου τε ὀβολὸν ἐξαιθρίαζε.

Περὶ Σκιλλητικοῦ ὄξους.

Κεφ. κε.

Τὸ δὲ σκιλλητικὸν ὄξος σκευάζεται τῷδε τῷ τρόπῳ· καθάρας λευκὴν σκίλλαν καὶ κατατεμὼν καὶ διείρας λίνῳ ὡς τὰ μὴ ἅπτεσθαι τὰ τόμια ἀλλήλων, ξηράνας ἐν σκιᾷ ὑπὸ ἡμέρας μ', λαβὼν μνᾶς μίαν ἐξ αὐτῆς κάθες

& venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur, & prociduam sedem reprimit: dysenthericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat furfures, & manantia capitis vlcera exterget.

Thymoxalme. Cap. XXIIII.

Thymoxalme veteres vtebãtur, dabãtq; laborãtibus imbecillitate stomachi, ternos quaternósve cyathos, aqua calida dilutos, in articularib⁹ morbis, et inflationib⁹. Crassos humores, atrósq; trahit. Hoc modo factitat: Thymi triti acetabulũ, salis idẽ mod⁹, rutæ, pulegij, polentæ, singulorũ exiguæ portiones in vas coniiciuntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circũpositio linteo sub dio madescunt.

Scillinum acetum.

Cap. XXV.

SCILLINVM acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata concidi tur, traiectáque lino segmenta modicis interuallis, ne se contingãt, siccãtur in vmbra quadraginta diebus: mina eorum

in aceti boni sextarios duodecim immergitur,& vase diligéter operto septenis diebus in sole madefcit:post eum numerum dierum scilla eximitur, & expressa abiicitur: defæcatum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scillæ miná, quinque aceti sextariis miscent. Alij circa exiccationem repurgantes,parem mensuram adiiciút, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multò magis humorum lentitias digerit: gingiuas humore prægnãtes collutione stringit firmatq;,& motos dentes stabilit: putredines oris, & graues halitus tollit:durat fauces sorbitione,& callosas facit: vocem expedit, & lympidá canoramq; reddit. Datur stomachicis,ægrè cibum concoquẽtibus, melancholicis,comitialibus,vertiginosis,mẽte captis: item vuluarum strangulationibus,lienis incremento laborãtibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodũ recreat: corpus sanũ reddit,& bonum coloré præstat:oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque auriũ infusione purgat. In súma,ad omnia efficax. Cauédum tamẽ intestinis exulcerationibus, in capitis dolore,aut neruorũ vitiis.

Datur

κάθης εἰς ξέστας ὄξους καλοῦ ιβ'. ἄφες τὲ ἡλίῳ ἡμέρας ζ'. βρέχεσθαι, πιεμάσας τὸ ἀγγεῖον ὅπως λῶον· μετὰ δὲ ταῦτα ἀνελόμενος τὴν σκίλλαν καὶ ἐκπίεσον, ἀπόβαλε μὴν ῥίζαν· τὸ δὲ ὄξος ὑλίσας, κατάγγιζε καὶ ἀποτίθεσο. ἔνιοι δὲ μιᾶς πρὸς ὄξους ξέστας ε. μίσγουσιν. οἱ δὲ, αὐτόθεν καθάρσοντες δίχα τῆ ξηράνσει, τὸν σταθμὸν ἴσον βάλλουσι, καὶ ἐῶσι μῆνας ς'. γίνεται δὲ τὸ τοιοῦτον τραχυπικώτερον. Εὐθετεῖ δὲ διακλυζόμενον, πρὸς ἕλκη ἰωδῶντα στέλλον καὶ στρόποιοιῶν αὐτά· καὶ ὀδόντας κινεμένους· καὶ τοὺς πρὸ τοῦ στόμα σηπεδόνας καὶ δυσωδίας, ἱκανῶς ἀναστομάζον· καταῤῥόφημενον δὲ τόν τε βρόγχον στερεοῖ καὶ τυλώδη ποιεῖ καὶ τὸν ἦχον εὔτονον καὶ λαμπρὸν ἀποτελεῖ. παραλαμβάνεται δὲ πρὸς στομαχικοὺς καὶ δυσπεπτοῦντας, σπληπτικοὺς, σκοτοδινιῶντας, μελαγχολικοὺς, ἀπολιθομένους· ἔτι δὲ καὶ πρὸς ὑστερικὰς πάγας, καὶ πολιῶσεις ἐμβρόγκους καὶ ἰσχιάδας. ἀναλαμβάνει δὲ καὶ τὸν λίαν ἀδυνεῖς· καὶ τὸ σῶμα ὑγιεινὸν, καὶ εὔχρουν κατασκευάζει· ἔστι δὲ καὶ ὀξυβερκὰς· καὶ πρὸς δυσκοίαν ἐκταλιῶσαι δυνατὸν, ἐὰν ἐγχυματίζηται. καὶ καθόλου πρὸς ἅπασα ἐνδεῖ. πλὴν ἑλκώσεων τῶν ἐντὸς κεφαλαλγιῶν καὶ νευρικῶν.

δίδου

δίδου δὲ καθ' ἡμέραν ῥοφεῖν νήστει, τὸ μὲν ἀρχὴ ὀλίγου, καταβραχὺ δὲ προσαύξων ἄχρι κυάθου. πῖνες δὲ κυάθους β' διδόασιν ἢ καὶ πλείους.

Datur quotidie ieiunis sorbendum, inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum vsque. Nonnulli binos dãt cyathos, aut largius.

Περὶ Σκιλλιτικοῦ οἴνου.

Κεφ. κς'.

Ο δὲ ἀπὸ τῆς σκίλλης οἶνος γίνεται οὕτως· καταστεμμὰν ὡς εἴρηκα τὴν σκίλλαν, ξήρανον ἐν ἡλίῳ, ἔπειτα κόψας αὐτῆς μᾶν μίαν καὶ διασήσας λεπτῷ κοσκίνῳ, ἔνδυσον ὀθονίῳ ἀραιῷ, καὶ κάδῳ εἰς γλεύκους καλοῦ καὶ παρσράτου ξέσας κ'. τείμηνόν τε ἔασον βεαχύναι, μετὰ δὲ ταῦτα μετηράσας τὸν οἶνον εἰς ἕτερον ἀγγεῖον, ἀπόδου ἀδελφικώτατα ἐπιμελῶς. ἔνεστι δὲ καὶ ὑγρᾷ τῇ σκίλλῃ χρῆσθαι. ἐπτέμνοντα αὐτὴν λογγυλίδος τρόπον, καὶ τὸν ὅλκὸν διπλασιάσαντα· δεῖ δὲ ἡλιάζειν ἐπὶ ἡμέρας μ'. καὶ παλαιοῦ ἄγαν. Επὶ δὲ καὶ οὕτω σκευάζεται ὁ προσεκπεμπόμενος οἶνος· λαβὼν σκίλλης ἐντετμημένης καὶ κατὰ θαρμυδικὰς μνᾶς γ'. κάδῳ εἰς γλεύκους καλοῦ μετρητὴν ἰταλικόν, καὶ μείνας ἓξ ἔασον πωμάσας· εἶτα ὑλίσας καὶ μετερέσας ἀπόδου, εὐθετεῖ δὲ πρὸς ἀπεψίας καὶ διαφθορὰς τροφῆς, καὶ τὸν ἀπομοῦντας ταύτην, ἐφ' ὧν τε πάχος κοιλίᾳ παρέκειται ἢ στομάχῳ. πολυικοῖς καὶ καχέκτοις, καὶ ὑδρωπικοῖς, ἰκτε-

Scillinum vinum.

Cap. XXVI.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, vti dictum est, scillam, & sole siccatã contundito, minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam, in vicenos sextarios musti recẽtis ac boni demergito: vbi trimestri spatio maduerit, elutriatum vinum, obstructo diligenter vase, recondito. Licet quoque sic humida scilla vti: In orbiculos rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & valde inueterascere. Alia parandi ratio: Scillæ dissectæ & repurgatæ tres minas, in Italicam metretã musti demittito, & senos menses in vase obstructo macerari finito: post id tempus defæcatum & excolatum vinum recondito. Vtile est cõtra cruditates, & ciborum corruptiones: ité iis qui reuomũt cibum, etsi pituita in ventre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, malè habitis corporibus, aquæ inter cutem, regio

regio morbo, difficili vrinę, torminosis, inflationibus, resolutioni neruorum, horroribus longis, vertiginosis, & vulsis. Menses pellit, miniméque neruos infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendus in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

ἰκτερικοῖς, δυσουρούσι, σφακιζομένοις. πνευματουμένοις, παραλυτικοῖς, ῥίγεσι χρονίοις, σκοτωματικοῖς. ἀπάσμασι, καταπιλώσεσι τὰ ἀγγεῖα. ἅπτεται δὲ νεῦρα λυπεῖ, ἀμένων δὲ ὁ παλαιότερος. φυλάσσεσθαι δὲ δεῖ ἀυτῷ τῷ χρῆσιν ἔν τι πυρετοῖς, ἢ ἐπὶ τῶν ἐντὸς ἐχόντων ἕλκος.

Marina vina.
Cap. XXVII.

Marina variè factitantur: Aliqui enim statim quum decerptæ sunt vuæ, aquam maris admiscent. Alij in area vuas sole siccant: quibus calcatis, marinam adiiciunt. Alij passas prius vuas in doliis marina aqua macerát, mox calcatas exprimũt: id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduẽtantium indicia valent, si modo meliora non adsint: aluum subducunt: prosunt purulenta extussientibus, aut si dura alu⁹ exerceat. Quæ ex Aminæis vuis fiunt, caput tentát, stomacho aduersantur, flatus creant. Verùm quo plenior habeatur historia, iis qui huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non

Περὶ Θαλαττίων οἴνων.
Κεφ. κζ'.

Οἱ δὲ διὰ θαλάττης οἶνοι, ποικίλως σκευάζονται· οἱ μὲν γὰρ εὐθέως ἀυτῶν μετὰ τὸ τρυγηθῆναι τῷ σταφυλῇ, μιγνύουσι θάλασσαν. ἔνιοι δὲ προθειλοπεδεύουσι· καὶ οὕτω πατοῦσι μιγνύντες θάλασσαν. οἱ δὲ, σταφιδώσαντες τῇ σταφυλῇ, βρέχουσιν ἐν σκάφεσι μετὰ θαλάσσης, καὶ οὕτω πατοῦσιν ἐκθλίβουσι. γίνεται δ' ὁ τοιοῦτος γλυκύς. οἱ μὲν τοι γε πρὸς τῷ χεῦσιν αὐστηρότερον σκευαζόμενοι, ποιοῦσι καὶ πρὸς πυρετῶν παρασκευὴ εἰ μὴ παρεῖεν ἀμένους, καὶ πρὸς κοιλίας ὑπαγωγὴ, καὶ ἐμπύοις, σκληροκοιλίοις, καὶ ὅσοι ὑπὸ τῶν ἀμιναίων φλαύονται κεφαλῆς. κακοστόμαχοί μὲν τοι καὶ οὗτοι καὶ πνευμάτων γόνιμοι. Οὐκ ἄχρηστον δὲ ὑποκρίνεσθαι νομίζομεν πρὸς τὸ πλήρη τῆς ἱστορίαν τοῖς φιλοτόποις γνώσεσθαι καὶ τῆς τῶν ποικιλωτέρων οἴνων σκευασίας, οὐκ

ρὺχ ὅτι πολλή τις ἡδὺν ἢ ἀναγκαία ἡ χρῆσις αὐτῶν, ἀλλ' ἵνα καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτῶν ἐλλείπειν δοκῶμεν. εἰσὶ δὲ αὐτῶν ἔνιοι, ἃ ἤδιον παίζοντες εἰς τὴν χρῆσιν ὡς ὁ διὰ τῶν κυδωνίων καὶ ἀπίων καὶ κερατίων· ἔτι δὲ καὶ ὁ διὰ μύρτων σκευαζόμενος.

not quod frequẽs eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad eorum rationẽ attinet. Sunt autem quædam ex iis factitia, minoris curæ ac impẽdij, quæ cadunt in vsus: vti quæ ex cotoneis, malis, pyris, siliquis, ité myrti baccis componuntur.

Περὶ Κυδωνίτου οἴνου.

Κεφ. κά.

Cydonites. Cap. XXVIII.

Ὁ μὲν κυδωνίτης οἶνος ἔνιοι μιλίτην καλοῦσι, σκευάζεται οὕτως· μήλων κυδωνίων ἐξελὼν τὸ σπέρμα καὶ τεμὼν ὡς γογγυλίδα εἰς μεζόνην γλεύκους, χάλασον μναῖ ιϚ'. ὕδατος ἡμέρας λ', εἶτα διυλίσας ἀπόδου. σκευάζεται δὲ καὶ οὕτως· δεῖ μετὰ τὸ κόψαι καὶ ἐκθλίψαι τὰ κυδώνια, τοῦ χυλοῦ τούτων μέρη τοῖς ιϚ' ξέστοις, ἵνα ξέστιον μίλιτος, καὶ οὕτω χρῆ ἀποθέσθαι. ἔστι δὲ στυπτικός, ἐυστόμαχος, δυσεντερίαις ἁρμόζων, ἤπατικοῖς, νεφριτικοῖς τε, καὶ δυσουρικοῖς.

Cydonites nomine alio melites appellat, & ita fieri cõsueuit: Mala cotonea exẽptis seminib⁹, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarũ põdo, in musti metretã, triginta dieb⁹ macerãtur, postea defæcatũ vinũ reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorũ tusorũ pressorúmq; adiicere, & ita recõdere. Vinũ hoc adstringit: ꝓdest stomacho, dysenteriæ, hepaticis, renũ vitiis, & vrinæ difficultati.

Περὶ Μηλομέλιτος. Κεφ. κϑ'.

Καὶ μηλόμελι δὲ ὃ καὶ κυδωνόμελι ὀνομάζεται, σκευάζεται οὕτως· μήλων κυδωνίων ἐξαιρεθέντων τὰ σπέρματα καὶ βληθέντων εἰς μέλι ὅτι πλεῖστον, ὥς τε ἐπισφιγῶσθαι· γίνεται δὲ σπισθὲν μετ' ἐνιαυτὸν, οἰνομέλιτι ἐοικός. ἁρμόζει δὲ πρὸς ἃ καὶ ἡ διὰ αὐτῶν σκευασία.

Melomeli. Cap. XXIX.

Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala seminibus suis castrata, in quamplurimum mellis, quo penitus demersa contegantur, coniiciuntur: id post annum mitescit, mulso nõ dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

Περὶ Hydro-

Hydromelum. Cap. XXX.

Fit hydromelon duabus mẽ ſuris aquæ coctæ, & ſub caniculæ ſydus inſolatæ, additis ad vnam melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem eſt.

Omphacomelites. Cap. XXXI.

Omphacomelitis faciẽdi ratio hæc eſt: Acerbæ vuæ adhuc immaturę, & tribus diebus inſolatæ exprimuntur, & ad ternas ſucci partes mellis optimi, deſpumati ſingulæ partes adiiciũtur: & inſolatur in vaſa trãſfuſum. Vim reprimendi ac refrigerandi habet: ſtomachicis cœliacisq; conuenit. Vſus poſt annum eſt.

Apiites. Cap. XXXII.

Fit & è pyris, perinde atque cotoneis, vinũ, apiites nomine, ſed ita vt pyra nõ magnopere matureſcant. Ex ſiliquis etiam, meſpilis, ſorbis, ſimili modo tẽperatur. Omnia hæc genera acerba ſunt, & adſtringunt: ſtomacho vtilia ſunt atque inteſtinas fluxiones cohibent.

Oenanthinũ. Cap. XXXIII.

Fit è feraci vite ſylueſtri, quod vocatur œnãthinũ: Sicci flores minis duab⁹ muſti cado macerati, poſt triginta dies mutantur,

Περὶ Υδρομήλου. Κεφ. λ'.

Υδρόμηλον ὁ σκευάζε῀ μιγνυμένου τ῀ ἐκ τ῀ κυδωνίου μηλομέλιτος μεζόντα ἑνὸς πρὸς β' μετρητὰς ἀφεψημένου ὕδατος καὶ ἡλιαζομένου ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα. Δύναμις δὲ καὶ τούτου ἡ αὐτή.

Περὶ Ομφακομέλιτος. Κεφ. λά.

Ομφακόμελι δὲ σκευάζε῀ τῶν τ῀ πρόπυν λαβὼν ὄμφακας μήπω σῆς καζούσας, ἡλίαζε ἐπὶ ἡμέρας γ'. καὶ μετ' ταῦτα ἐκθλίψας, βάλε πρὸς γ' μέρη τ῀ χυλῶ μέλιτος καλλίστου ἀπηφρισμένου μεζόντων μέρος ἕν· καὶ ἡλίαζε καταγίσας εἰς κεράμους. Δύναμιν δὲ ἔχει σταλτικὴν, ψυκτικὴν· ὅθεν αἱ μάλιστα στομαχικοῖς, κοιλιακοῖς. ἡ χρῆσις δὲ αὐτῶ μετ' ἐνιαυτόν.

Περὶ ἀπίτου οἴνου. Κεφ. λϐ'.

Απίτης σκευάζεται ὁμοίως, ὥσπερ καὶ ὁ κυδωνίτης, μὴ λίαν δὲ ἑψοῦσιν οἱ ἄποροι πέπειροι. καὶ ὁ τῶν κερατίων δὲ καὶ ὁ τῶν μεσπίλων καὶ οὔων, ὁμοίως σκευάζεται. πάντες δὲ εἰσὶ συστικοὶ, στυφνοὶ, ἐυστόμαχοι, ῥεύματα ἔνδον ἐπέχοντες.

Περὶ Οἰναν θίνου. Κεφ. λγ'.

Ο δ' οἰναν θίνος σκευάζε῀ ὅταν λαβὼν τ῀ ἀγρίας ἀμπέλου τὸ ἄνθος βρυόσης ἑκτὸν μιᾶς β'. εἰς μεζόντιον γλεύκους πρὸς ἡμέρας λ'.

εἶτα

ἕως τὰ δυλίσους ἀπόδου. ποιεῖ δὲ πρὸς ἀλογίαν στομάχου, ἀνορεξίαν, κοιλιακοὺς, καὶ δυσεντερικούς.

Περὶ Ροΐτου οἴνου.

Κεφ. λδ'.

Ὁ δὲ ροΐτης οἶνος σκευάζεται οὕτως· ῥόας ἀπυρηνίους λαβὼν ὠείμους καὶ ἀποθλίψας τὸν χυλὸν τῶν κόκκων ἀπόδου, ἢ ἀφεψήσας εἰς τρίτον οὕτως ἀποτίθεσο· ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ ἐντὸς ῥεύματα καὶ πυρετοὺς ῥοώδεις. ἔστι δὲ εὐστόμαχος καὶ στρωτικὸς κοιλίας, καὶ οὐρητικός.

Περὶ Ροδίτου οἴνου.

Κεφ. λέ.

Ροδίτης δὲ ὅτω σκευάζεται· ῥόων ξυρῶν κεκομμένων μναῦν μίαν ἐνδήσας εἰς ὀθόνιον, κάθες εἰς γλεύκους ξέστας ἡ· μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας δυλίσας μετάγγιζε καὶ ἀποτίθεσο. χρήσιμος ἡ ἀπυρέκτοις, πρὸς στόμαχου πόνους καὶ πόνους ὀπισθονόμους, πρός τε καθύγρους κοιλίας καὶ δυσεντερίας. σκευάζεται δὲ καὶ διὰ χυλοῦ ῥόδων, καὶ μέλιτος μυρσινίτου, ὃ καλεῖται ῥοδόμελι, ἁρμόζει πρὸς τὰς ἐν ἀφηπείᾳ τραχύτητας.

Περὶ Μυρτίτου οἴνου. Κεφ. λς'.

Μυρτίτης δὲ σκευάζεται ὅτω· δεῖ μύρτα μέλανα παρασκευάζοντα λαβόντα, κόπτειν καὶ ἐκθλίβειν τὸν χυλὸν δι' ὀργάνου καὶ καταγγίζειν. ἔνιοι δὲ καὶ ἀφεψοῦσιν εἰς τρίτον, οἱ δὲ,

tantur, mox colatum vinũ recõditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatẽ, cibi fastidia, cœliacos, & dysentericos.

Rhœtes. Cap. XXXIIII.

Fit è punicis malis maturis quod rhœten nominãt, succo expresso ab acinis eorũ, quib⁹ lignosus nucleus abest, apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita repositio. Efficax est cõtra fluxiones internas, & febrim cũ alui profluuio exortam: stomacho vtile: astringit aluum, & vrinam mouet.

Rhodites. Cap. XXXV.

Rhodites sic fit: Rosarũ siccarum tusarúmque minã linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses, defæcatum vinum transfundens, recondito. Vtile iis qui febri carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & cõtra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarũ, addito melle, quod rhodomeli vocant, quod arteriæ scabritiis conuenit.

Myrtites. Cap. XXXVI.

MYRTITES fit, baccis nigris, quę maturitatem excesserint, tusis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt.

Alij

Alij baccas prius ſole torrent, & quaternis ſextariis contuſarum, ternas aquæ heminas adiiciunt, & vini veteris parē modum poſtea exprimunt, & ſeruant. Magnopere adſtringit: ſtomacho vtile: fluxionibus vē tris ac ſtomachi prodeſt: & cōtra inteſtinas vlcerationes, & profluuia: denigrat capillos.

Myrſinites. Cap. XXXVII.

Myrſinites ſic tēperatur: Rami nigræ myrti cū ſuis baccis & foliis tuſi, decem minarum pondo, in tribus muſti congiis feruescunt, donec duo ſupersint, aut certè dimidium: id vinum colatum ad vſus reconditur. Contra furfures, vlcera in capite manātia, eruptiones papularum, gingiuas, tonſillas, & purulentas aureis efficax eſt: ſudores ſiſtit.

Lentiſcinum. Cap. XXXVIII.

Lentiſcinū ſimiliter vt myrſinites temperatur.

Terebinthinum. Cap. XXXIX.

Nec ſecus terebinthinū paratur. Nanq; bacciferi eorū rami ſumi debēt. Similes inſunt vires: adſtringunt, ſtomacho accōmodantur, & defluxionibus inte-

οἱ δὲ, ἢν προθειλοπεδήσωσιν ἐν ὑ-
λίῳ, καὶ ἐκπιάσαντες μίσγουσι τῇ
χίνικι κοτείσῃ, τρεῖς κοτύλας ὕ-
δατος ἢ οἴνου παλαιοῦ τὸ αὐτό, ὕ-
στω τε ἐκθλίβουσι ἢ ἀποτίθενται.
ἱκανῶς δὲ ὅτι συπτικὸς καὶ εὐστό- 5
μαχος, ῥευματιζομένῳ τε στομά-
χῳ ἢ κοιλίᾳ χρήσιμος πρός τε
τὰς ἐντὸς ἑλκώσεις καὶ ῥοῦν· με-
λαίνει δὲ ἢ τρίχας ἐν κεφαλῇ.

Περὶ Μυρσινίτου οἴνου.

Κεφ. λζ'. 10

Μυρσινίτης δὲ σκευάζεται οὕ-
τω· δεῖ λαβόντα τῶν μελαίνων
μυρσινῶν τὸν ἀκρέμονας καὶ τὰ
φύλλα σὺν τοῖς μύρτοις κόπτειν,
καὶ βάλλειν εἰς τρεῖς χ' γλεύ- 15
κους χόας, τῆς μυρσίνης κεκομέ-
νης μνᾶς ι'. ἢ ἕψειν ἄχρις οὗ δύο
ὑπολειφθῶσιν ἢ τὸ ἥμισυ, ἢ διυ-
λίσαντας ἀποτίθεσθαι. ποιεῖ δὲ
οὗτος πρός τε ἀχῶρας καὶ πί- 20
τυρα, ἐξανθήματα, οὖλα, πε-
ρίθυμα, ὦτα πυορροοῦντα· στέλ-
λει καὶ ἱδρῶτας.

Περὶ Σχινίνου οἴνου. Κεφ. λη'.

Καὶ ὁ σχίνινος δὲ ὁμοίως τῷ
μυρσινίτῃ σκευάζεται.

Περὶ Τερεμινθίνου οἴνου.

Κεφ. λθ'. 25

Καὶ ὁ τερεμίνθινος ὁμοίως. ἔγ-
καρποι γὰρ καὶ τούτων οἱ ἀκρέ-
μονες λαμβάνονται. καὶ παρα-
πλησίας εἶσι δυνάμεως, συπτι-
κοὶ καὶ εὐστόμαχοι, ῥευμασί τε
αἱμό-

ἁρμόζοντες στομάχου, ἐντέρων, κύστεως, αἱμορραγίας· καὶ ἑλκώσι δὲ καὶ τὰ ῥευματικὰ πάντα ἕλκη ἐπαιτλούμωσι· τοῖς τε περὶ ὑστέραν καὶ ἕδραν ῥευματισμοῖς στέλλοσιν ἐγκαθιζόμωσι.

inteſtinorum, veſicę, & ſtomachi, & ſanguinis profluuio: vlcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones vuluæ ac ſedis, inſeſſione cohibent.

Περὶ Φοινικίτου οἴνου.

Κεφ. μά.

Φοινικίτης· λαβὼν φοίνικας τοὺς χυδαίους πεπειρωμένους, βάλε εἰς πιθάκνιον τετρημένον ἐν τῷ πυθμένι, καὶ ἐσφλωμωμένον καλάμῳ πεπλωμένῳ· τὸ δὲ πρῆμα λίνῳ βεβύσθω, ἐπίχεε δὲ τοῖς δέκα χοίνιξιν ὕδατος χόας γ'. εἰ δὲ μὴ λίαν αὐτὸ γλυκὺ θέλοις εἶναι, πέντε χόας ἐπίχει. ἔα δὲ ὅπου ἡμέρας ἑ. τῇ δὲ ἑ. ἀφαιρῶν τὸ ἀπὸ τοῦ καλάμου ὀθόνιον, ἀπόδεχου οἶνον παχὺν καὶ γλυκὺν καὶ ἀποτίθεσο. Ἔστι δὲ ὑδὺς μὲν, κεφαλαλγὴς δέ· πιοῦσι γὰρ ῥεύματα διὰ τὸ σύφλυσθεν στομαχικοῖς, καὶ κοιλιακοῖς, καὶ αἱμοπτοϊκοῖς, καὶ ἁρμόζει. ἔνιοι δὲ τὸ αὐτὸ πάλιν τῷ ὕδατος μίσγοντες δέχονται, καὶ τοῦτο τρίτον ποιοῦσι, καὶ τέταρτον, καὶ πέμπτον, ὅτε λοιπὸν ὀξίζει.

Palmeum vinum.

Cap. XL.

Palmulas maturas, quas vocãt chydæas, in vrceolum imo pertuſum, & obſtructũ picata arundine, demittito: lino foramẽ ſit obturatũ, & quadragenis ſextariis ternos aquæ congios infundito: qđ ſi ipſum ita dulce eſſe nõ libeat, quinq; cõgios infudiſſe ſatis eſt. poſt decẽ dies detracto ab arũdine linteo, aſſumito vinũ craſſum & dulce, & reponito. Suaue illud quidẽ, ſed capiti noxiũ: contra fluxiones, propter adſtrictoriã vim, efficax: ſtomachicis, cœliacis, ſanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idẽ addita aqua iterũ capiũt, & tertio, quarto, quinto, ſextóve faciũt, quod tandem acore vitiatur.

Περὶ Κατορχάτου οἴνου. Κεφ. μά.

Καὶ ὁ κατορχάτης δὲ, ὃν ἔνιοι συκίτην καλοῦσι, ἐν κύπρῳ σκευάζεται ὁμοίως τῷ φοινικίτῃ· διαφέρει δὲ ὅτι ἐπὶ τάτε ἔνιοι αὐτὸ ὕδαλος, στεμφύλων ἀπόζεγμα νεοθλίπτων, τὸ ἴσον μέτρον βάλλουσιν. ἐκθ-

Catorchites. Cap. XLI.

Catorchites, aliquibus ſycites vocatur, in Cypro fit, ita vt palmum: ſed hoc intereſt, quoniam pro aqua tãtundem humoris adiiciũt, in quo recenter preſſa vinacea maduerint.

Cari-

Caricæ quæ chelidoniæ, aut phœniceæ appellantur, præsertim nigræ macerantur, vti diximus, & post decem dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem modus aquæ in qua vinacea maduerint infunditur: simili modo intercedẽte spatio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acoré contrahit, & aceti vsum præbet. Id tenue est: flatus gignit, stomacho aduersatur, fastidiũ parit, aluo tamen prodest, vrinã ciet, menses trahit, lactis vbertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, vt potio quam zython appellamus. Aliqui sex amphoris: decem salis sextarios adiiciunt. Alij muriæ amphoram: quod non facile vitiatur, & aluo idoneum fore censent. Alij thymum & fœniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt: & ita vicissim, donec vas expleuerint.

ἰσάδες δὲ λαμβάνονται αἱ χελιδόνιοι καλούμεναι, ἢ φοινικαὶ, μέλαιναι δὲ εἰσὶ καὶ ἀποβρέχονται ὡς σφοδρότατα, μετὰ δὲ ἡμέρας δέκα ἐκλαμβάνεται τὸ ὑγρὸν, καὶ ἐκ δευτέρου καὶ τρίτου ὁπωσοῦν, τοῦ ἐκ τῶν συμφύλων ἀποβρέγματος τὸ αὐτὸ μέτρον· ὁμοίως δὲ ἐκ διασημάτων ἐκλαμβάνεται τὸ δ'. καὶ ἑ. ἀπόβρεγμα ὁμοίως ὀξίζον, ᾧ αὐτῷ ὄξεσι χρῶνται. Λεπτομερὲς δέ ὄξος καὶ φυσῶδες καὶ χαλεπὸν μάλιστα, ἀποστρέφων ὄρεξιν, ἐυκοίλιος μήν τοι καὶ οὐρητικὸς, κατασσῇ δὲ καὶ ἔμμηνα, καὶ γάλα δαψιλὲς ποιεῖ, αἷμα δὲ φαῦλον κατασκευάζει, καὶ ἐλεφαντιάσεως ὄξος ποιητικὸν, ὡς καὶ τὸ ζῦθος, ἔνιοι δὲ καὶ ἁλῶν τοῖς ἓξ χαραμίοις ξέστας ἐμβάλλουσι δέκα. οἱ δὲ, ἅλμης χαράμιον· δυσμετάβλητον καὶ εὐκοίλιον ἔσεσθαι διανοούμενοι. οἱ δὲ, καὶ θύμου καὶ μάραθρον σφοδρὰ ἐπιθέασι τῷ πυθμένι, εἶτα τὰς ἰσάδας, καὶ ἐναλλὰξ πῦρ ποιοῦσιν ἄχρις ἂν πλήσωσι τὸ ἀγγεῖον.

Vinũ è sycomoris factũ.

Cap. XLII.

Fit & è sycomoris eodẽ modo vinũ, sed in acetũ acre degenerat: quoniã non ita præualet vis eorum, vt fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Περὶ Συκομορίνου οἴνου.

Κεφ. μβ'.

Σκευάζεται δὲ καὶ ὁ ἐκ τῶν συκομόρων ὡσαύτως, ὄξος δὲ γίνεται δριμὺ, διὰ τὸ μὴ ἐξισχύειν ἢ δύναμιν ἀυτῶν φυλάττειν τὴν γλυκύτητα τοῦ ὑγροῦ.

Resi-

Περὶ

Περὶ Ρητινίτου οἴνου.

Κεφ. μγ'.

Ὁ δὲ ῥητινίτης καὶ κατὰ τὰ ἔθνη σκευάζεται· σκευάζει δὲ ἐν γαλατίᾳ διὰ τὸ ἀποξηρᾶσθαι τὸν οἶνον ἀπεπαύτου μηνὸς τῆς σαφυλῆς, διὰ τὸ ψύχειν, εἰ μὴ παρφπλακῆ σευκίνη. κόπτεται δὲ συὺ τῷ φλοιῷ ἡ ῥητίνη, καὶ τῷ κεραμίῳ μίγνυται ἡμικοτύλιον. καὶ οἱ μὲν, ἀποδοῦσι μετὰ τὸ ἀποζέσαι χωρὶς ζοντες τὴν ῥητίνην. οἱ δὲ, ἐῶσι. παλαιωθέντες δὲ γίνονται ἡδεῖς. Παύτες δὲ κεφαλαλγεῖς οἱ τοιοῦτοι καὶ σκοτωματικοὶ, πεπτικοὶ μὲν τοι καὶ οὐρητικοὶ, κατάῤῥοιζομένοις καὶ βήσσουσιν ἀρμόζοντες· κοιλιακοῖς, δυσεντερικοῖς, ὑδρωπικοῖς, καὶ ῥοϊκαῖς γυναιξί· τοῖς δὲ ἐμβάθει εἰλκωμένοις ἕλκυσμα συστικώτερος μὲν τοι τοῦ λευκοῦ ἔστιν ὁ μελανίζων.

Περὶ Στροβιλίτου οἴνου.

Κεφ. μδ'.

Στροβιλίτης δὲ σκευάζεται κατατριβομένων τῶν γλεύκει στροβύλων προσφάτων καὶ τεθλασμένων. ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ τῷ ῥητινίτῃ, ἐὰν δὲ γλεύκει κατατριβέντας τὶς τῶν στροβίλους ἐψήσῃ, ἀρμόζει καὶ φθινάζουσιν ἰκανῶς πνεύμονας.

Περὶ Κεδρίνου. Κεφ. με.

Ὁ δὲ κέδρινος ἢ ἀρκεύθινος, ἢ καὶ πρίσσινος, ἢ δάφνινος ἢ πιτύϊνος, ἢ ἀνά-

Resinatum vinum.

Cap. XLIII.

Resinatum vinũ populatim factitari solet: copiosum in Galatia: quoniã vinum illic coacescat, vua non matureſcente, ob cœli algoré, niſi picea reſina temperetur. Reſina autem cum cortice tonditur, & amphoræ dimidiata hemina permiſcetur. Aliqui vbi efferbuit, excolant, ſeparantes reſinã: alij relinquũt. Hæc vina vetuſtate dulceſcunt, Omnia capitis doloré, & vertigines faciunt, concoctioné tamen adiuuant, & vrinã cient: tuſsientibus, ac deſtillatione vexatis conueniunt: item cœliacis, dyſentericis, & hydropicis, & fœminis fluxione vuluæ laborãtibus: altis exulcerationibus infunditur. In hoc autẽ genere nigricans magis albo conſtringit.

Strobilites. Cap. XLIIII.

Strobilites fit maceratis in muſto nucibus, pineis, recentibus fractiſq;, præbétq; reſinati effectus. Si quis madefactas nuces pini muſto decoquat, potum affatim conuenit iis, qui tabitudine conficiuntur.

Cedrinum vinũ. Cap. XLV.

Cedrinum, iuniperinum, cupreſsinũ, laurinum, pineũ, aut

abiegnum, simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cùm fructum ædût, aut soli, aut balneo, aut igni, admouere oportet, vti confudent, congióque vini minam vnam permiscere, & post duos menses transfundere, & antequàm recondantur, insolare. Factitiorum vinorum vasa impleri debét: nanq; non plenis vasis, vina in acoré corrumpuntur. Medicata autē vina, rectè valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt, vrinam cient, & substringût. Laurinum tamen vehemētius excalfacit. Fit quoq; è fructu cedri maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra: diebus quadraginta insolari debet, & defæcatum in vasa transferri.

Vinum è iuniperis.

Cap. XLVI.

Fit etiam vinum è baccis iuniperi, non aliter quàm cedrites, & ad eadem valens.

Cedrites. Cap. XLVII.

Cedrites hoc modo fit: Cedriā dulci aqua lauāt, & singulas amphoras singulis cyathis diluût, & ita musto replēt. Hoc genus vini excalfacit, extenuat, tussi antiquæ vtile sine febre, pectoἐλάτινος, σκευάζεται ὁμοίως. χρὴ γὰρ τὰ ξύλα νεότμητα σχίζοντας, ὅτε τὸν καρπὸν ἐκδίδωσι, πτέναι πρὸς ἥλιον ἢ ἐν βαλανείῳ, ἢ ἐν πυρὶ ὡς τε σωιδρῶσαι, καὶ μίσγειν τῷ χρὶ τοῦ οἴνου μιᾶν μίαν καταμίξαντάς τε ἓξ μιῶας β'. εἶτα μεταγγίζειν, καὶ ἡλιάσαντα ἀποτίθεσθαι. πληροῦσθαι δὲ τὰ ἀγγεῖα τῶν σκευαζομένων οἴνων· ἀποξυῶσι γὰρ τὰ ἀπόκενα. ἄθικτοι μὲν τοῖς φαρμακώδεσι οἶνοι τοῖς ὑγιαίνουσι. θερμαντικοὶ δὲ πάντες, οὐρητικοὶ, ὑποσύφοντες. ὁ μὲν τοι δάφνινος θερμαντικώτερος. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ τῶν μειζόνων κέδρων οἶνος, δεῖ δὲ τῷ χρὶ τοῦ γλεύκους ἡμιμναίου κεκομμένων τῶν καρίδων μίξαι· ἡλιάζειν τε ἐφ' ἡμέρας μ'. μὴ δὲ ταῦτα διυλίζειν, μεταγγίζειν.

Περὶ Ἀρκευθίδινου οἴνου.

Κεφ. μς'.

Γίνεται καὶ ἐκ τῶν τῶν ἀρκευθίδων καρποῦ. ὁμοίως τῷ κεδρίτῃ τὰ ἄλλα ποιῶν.

Περὶ Κεδρίτου. Κεφ. μζ'.

Κεδρίτης δὲ γίνεται οὕτω· κεδρίαν πλύναντες ὕδατι γλυκεῖ, διακλύζουσιν ἕκαστον χερσὶν κυάθῳ ἑνὶ, καὶ οὕτω πληροῦσι γλεύκους. θερμαντικὸς δὲ, καὶ οὗτος γίνεται καὶ λεπτυντικὸς, βηχὶ παλαιᾷ ἁρμόζων δίχα πυρετοῦ, καὶ πό-

καὶ πόνοις θώρακος, πλευρῶν, φρόφοις, ἕλκεσι τοῖς ἐν κοιλίᾳ, καὶ ἐντέροις, ἐμπυϊκοῖς, ὑδρωπικοῖς, ὑστερικοῖς· ποιεῖ καὶ πρὸς ἕλμινθας, καὶ πρὸς ῥίγη· βοηθεῖ σπειροδήκτοις καὶ ἑρπετὰ κτείνει· ὠταλγίας τε ἐκπαζόμενος ἰᾶται.

pectoris laterúmq; doloribus, torminib⁹, vētris & interaneorū vlceribus, purulentis excretionibus, mulierib⁹ vuluæ causariis, hydropicísq;: facit aduersus ventris tineas & horrores: cōtra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Περὶ Πισσίτου οἴνου.

Κεφ. μά.

Οἶνος πισσίτης σκευάζεται διὰ πίσσης ὑγρᾶς, καὶ γλεύκους. δεῖ δὲ πλυθὲν πίσσαν πρῶτον πλυνῆναι θαλάσσῃ ἢ ἅλμῃ ἐφ' ἱκανὸν μέχρις ἂν λευκανθῇ, καὶ ἡ θάλασσα καθαρὰ ἀποῤῥέῃ, ἔπειτα ὕδατι γλυκεῖ· καὶ τοῖς ἑξῆς μίσγειν οὐγγίας πίσσης ά. ἢ β. καὶ ἐὰν μὴ δὲ τὸ αὐαξῆσαι καὶ κατασῆναι κατὰ γίζειν. ἔστι δὲ θερμαντικὸς, πεπτικὸς, σμηκτικὸς, αὐαντικὸς· εὔθετος τοῖς περὶ θώρακα, κοιλίαν, ἧπαρ, σπλῆνα καὶ ὑστέρας πόνοις, δίχα πυρετοῦ, καὶ χρονίοις ῥεύμασι, καὶ ἐλκώσεσι τοῖς ἐν βάθει· ποιεῖ καὶ πρὸς βῆχας, βραδυπνοίας, πνευματώσεις, ἄθματα, καὶ πρὸς ῥέμματα δὲ μᾶλλον μετ' οἰσυπηρῶν ἐείσης.

Picatū vinū. Cap. XLVIII.

Picatum ex liquida pice & musto tēperatur. Picem autem primum marina aut muria tātisper eluere oportet, dū inalbuerit, & syncera maris aqua defluat, mox aqua dulci proluēda: cōgiis octo musti, vncia picis vna aut altera adijcitur: vbi efferbuerit & cōstiterit, in vasa diffunditur. Hoc genus vini excalfacit, cōcoquit, purgat, abstergit: vtile doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis & vuluæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationib⁹ in altū recedētibus, tussi, suspiriis, cōcoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

Περὶ Ἀψινθίτου οἴνου. Κεφ. μβ'.

Ἀψινθίτης ποικίλως σκευάζεται. οἱ μὲν γὰρ τοῖς μ'. καὶ ἡ. ξέσαις τῆ ἰταλικῆν κεραμίων, μίξαντες ἀψινθίου ποντικοῦ λίτραν μίαν ἕψουσι μέχρι τοῦ γ' ἀπολιφθῆ. ἔπειτα

Absinthites. Cap. XLIX.

Absinthitę faciūdi ratio euariat. Aliqui enim duodequinquaginta sextariis Italicarū amphorarū, admistā absinthij Pōtici librā decoquūt ad tertias:

& vbi ifuderint fex aceti fextarios, & abfinthij felibrã, ac dili géter pmifcuerint, diffundũt in vas: dũq; cõquieuerit, defæcãt. Alij abfinthij minã í amphorã demittũt, tufamq;, & raro líteo deligatã, í cado mufti macerãt, binis méfib⁹. Alij abfinthij quadrãté, alij triété, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cafsiæ, floris iũ cì odorati, calami, elatæ, palmarũ, fingulos fextãtes iniũciũt in metretã mufti, et tũdétespri⁹pila, obftructo vafis fpiraculo, binis ternífve méfib⁹ dimittũt: poftea defæcatũ vinũ trãsfundũt ad vfus. Alij addũt í mufti cadũ, Celticæ nardi darchmas xiiij. & abfinthij drachmas xl. linteo ſuolutas: & poft quadrageſimũ dié elutriãt. Alij in ſenos fextarios mufti, abfinthij librã, & ficcę pinireſinę fextãté immittũt, & poft decẽ dies excolãt, et recõdũt. Vtile eſt ſtomacho: vrinã cit: tardã cõcoctionẽ accelerat: hepaticis, regio morbo, et renũ vitiis auxiliat: faſtidia diſcutit: iis ꝓdeſt quib⁹ ſtomach⁹ negotiũ exhibet: valet cõtra lõgã ꝓcordiorũ diſtẽtionẽ, & iflationes, teretéſq; vẽtris tineas, & remoratos mẽſes: cõtra hauſta ixię venena q̃plurimũ potũ, & vomitionibus redditũ, auxiliat.

Hyſſo-

ἔπειτα θερμοπιήσαντες * γλεύκοις ξέσας ς' καὶ ἀψινθίου ἡμίλιτρον ὀπτμελῶς μίξαντες. καταγίζουσι· κατασβέντα δὲ διυλίζουσιν. οἱ δὲ, μιᾶν ἀψινθίου εἰς τὸ καρράμινον καθιᾶσι, * κόψαντες καὶ ἐνδήσαντες εἰς ὀθόνιον ἀραιὸν ἐῶσιν ἐπὶ μιλιας δύο. οἱ δὲ, ἀψινθίου οὐγγίας γ'. ἔνιοι δὲ τέσσαρας, καὶ νάρδου συριακῆς, κιννα-μώμου, καυσίας, ξήρου κάλυθος, καλάμου, ἐλάτης, φοινίκης ἀνὰ οὐγγίας β'. καθιᾶσιν εἰς μετρητὴν γλεύκους, καὶ εἰς ὅλκον κόψαντες καὶ σφηκώσαντες, ἐῶσι δὶ μήνιον ἢ τρίμηνον· εἶτα διυλίσαντες καὶ μεταγίσαντες ἀποτίθενται. Οἱ δὲ, εἰς γλεύκους μεζητὴν νάρδου κελτικῆς ⊀ ιδ' καὶ ἀψινθίου ⊀ μ'. καθιᾶσιν ἐν ὀθονίῳ δήσαντες καὶ μεθ' ἡμέρας μ' μεταγίζουσιν. οἱ δ', εἰς τὸν ξέστας κ' τῶν γλεύκους λίτρας ά. ἀψινθίου ἐμβάλλουσι, καὶ πιτύϊνης ξηρᾶς ῥητίνης οὐγγίας β'. μετὰ δὲ ἡμέρας ί. διυλίσαντες ἀποτίθενται. ἔστι δὲ εὐστόμαχος, ἐρεπτικὸς, χρήσιμος πρὸς δυσπεψίαν, ἡπατικοῖς τε καὶ νεφριτικοῖς, καὶ ἰκτερικοῖς, ἀνορέκτοις, καὶ κοιλιόδυσι στόμαχον καὶ πρὸς ὑπερχολίων τάσιν χρόνιον, καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις, ἑλμινθιάσεις φρογμούλας· ἔμμηνα ἐπισχόμενα· πρὸς ἰξίου πόσιν πλεῖστος ποθεὶς καὶ ἐξεμούμενος ἀρμόζει.

Περὶ Τανα-

Περὶ Ὑσσωπίτου οἴνου. Κεφ. ν'.

Ὑσσωπίτης δὲ ὁ ἐν τοῦ κιλικίου ὑσσώπου, καλλιστός ὅτι, σκευάζεται δὲ ὁμοίως τῷ ἀψινθίτῃ, δεῖ δὲ τῷ κεραμίῳ τῶ γλεύκους λίτραν μίαν τῶ ὑσσώπου κεκομμένων τῶν φύλλων περιδῆσαι. ἐπειλοῦντας εἰς ὀθόνιον ἀραιὸν, συγκαθιέναι δὲ λιθάρια, ἵνα τῷ πυθμένι προσκαθίσῃ ὁ ἔνδεσμος· μετάγγιζε δὲ δι' ἡμέρας μ' δυλίζων. αἱρεῖ δὲ πρὸς τὰ ἐν θώρακι καὶ πλευρῷ καὶ πνεύμονι πάθη, βῆχας τε παλαιὰς, καὶ ἆθμα· ἔστι δὲ καὶ οὐρητικὸς, καὶ τροφυσμένοις αἱρεῖ, πρός τε ῥῖγη τὰ ἐν περιόδοις· κινεῖ δὲ καὶ ἔμμηνα.

Περὶ Χαμαιδρυΐτου οἴνου.

Κεφ. να'.

Καὶ ὁ Χαμαιδρυΐτης ὁμοίως τῷ ὑσσωπίτῃ σκευάζεται. θερμαντικὸς ὢν καὶ διαλυτικός· αἱρεῖ δὲ πρὸς ἀσθμοῖς καὶ ἰκτέρῳ, ὑστερικαῖς πνευματώσεσι, βραδυπεψίαις, ὕδρωπι ἀρχομένῳ. ἀμείνων δὲ παλαιούμενος γίνεται.

Περὶ Σπυκαδίτου οἴνου.

Κεφ. νβ'.

Σκευάζεται καὶ σπυκαδίτης ὁμοίως. δεῖ δὲ τοῖς ς' χοεῦσι μιᾶς μίαν σπυκάδος διδόναι. διαλύει δὲ πάχη, καὶ πνευματώσεις, καὶ πόνους πλευρᾶς καὶ νεύρων, καὶ κατάψυξιν· δίδο-

Hyssopites. Cap. L.

Hyssopites è Cilicio hyssopo maximè laudatur, fitque similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti coniecta, linteolo raro, cum quibusdam lapillis, folia inuoluuntur, vt degrauatus ponduſculo fasciculus fidat: vinū post quadraginta dies defæcatū eluatur, Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria prodest: vrinam cit: torminibus, & horroribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur: menses mouet.

Chamædryites. Cap. LI.

Simili modo chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tardæ concoctioni, incipiēti aquæ inter cutem, subuenit. Inueteraſcens melius redditur.

Stœchadites. Cap. LII

Stœchadites nō secus tēperatur. Cōgiis sex stœchadis minā addere oportet. Crasitié, inflationes, laterū, neruorūq; cruciatus, & perfrictiones discutit:

comitialibus commodè datur, cum pyrethro & sagapeno.

Acetū ex stœchade herba. Cap. LIII.

Fit ad eadem acetum è stœchade herba, vt paulò ante diximus, aceto macerata, quod eosdem implet effectus.

Vinum è betonica. Cap. LIIII.

Fit vinum è betonica, quam cestron psychotrophon appellant. Herbam semine maturo prægnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congiis duobus vini macerant, & post septimū mensem transfundūt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutex ipse, pollet. Et vt in vniuersum dicatur, factitia vina, sibi misturarū vires adsciscūt: quare non difficile fuerit, iis qui illarum naturas norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: veruntamen vinorum vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum è betonica acetum, ad eadem vitia vtile.

Tragoriganites. Cap. LV.

Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios cōiectis, et post tertiū mēsē trāsfusis. Prodest tormini bus, vulsis,

δίδοῦ· ἔστι δὲ ἐπιληπτικοῖς ὠφέλιμος μετὰ πυρέθρου καὶ σαγαπηνοῦ.

Περὶ Ὄξους στοιχαδικοῦ.

Κεφ. νγ'.

Γίνεται καὶ ὄξος διὰ στοιχάδος πρὸς τὰ εἰρημένα, ἐναποβρεχομένης ὄξει τῆς πόας ὡς προείρηται, ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ αὐτά.

Περὶ Κεφαλίτου οἴνου.

Κεφ. νδ'.

Γίνεται καὶ ἐκ τοῦ κέστρου τοῦ ψυχοτρόφου οἴνος. δεῖ δὲ λαμβάνειν τὴν πόαν σπέρματος πλήρη πεπέψου σὺν τοῖς κλάδοις, καὶ μνᾶν μίαν βάλλειν εἰς οἴνου χοᾶς β'. ἔᾶν τι ἐπὶ μῆνας, καὶ οὕτω μεταγγίζειν. ποιεῖ δὲ πρὸς πολλὰ τῶν ἐντὸς παθῶν καὶ ὁ θάμνος αὐτῆς. καὶ καθόλου πάντες οἱ σκευασθέντες οἶνοι ἀναλαμβάνουσι τὴν δύναμιν τῶν μιγμάτων· διὸ τοῖς τὰς ἰδιότητας γινωσκόσι φύσεις εὐχερὲς καὶ τὰς τῶν οἴνων δυνάμεις συμβάλλειν. ἀπυρέτοις μὴν τοι θέσις ἡ τῶν οἴνων χρῆσις. καὶ ὄξος δὲ ἐξ αὐτῆς γίνεται πρὸς τὰ ἐοικότα παθήματα χρήσιμον.

Περὶ Τραγοριγανίτου οἴνου.

Κεφ. νε.

Τραγοριγανίτης· τραγοριγάνου < δ'. εἰς γλεύκους ξέστας δ'. ἐν ὀθονίῳ χαλᾶ πρὸς μύας γ'. καὶ μετάγγιζε. ἀρμόζει τρόφοις, ἀσάμαι

σπάσμασι, ῥήγμασι, πόνοις πλευρῶν, πνευμάτων διαδρομαῖς, δυσπεψίαις.

Περὶ Βουνίτου οἴνου.

Κεφ. νς΄.

Οἶνος διὰ βουνίου· βουνίου < β΄ κόψας, κάθες εἰς κοτύλας γλεύκους τέσσαρας, καὶ τ᾽ ἄλλα ὁμοίως ποίει. ἁρμόζει δὲ στομαχικοῖς κακοπωμένοις δι᾽ ὁπλομαχίαν, ἢ ἱππασίαν πολλήν.

Περὶ Δικταμνίτου οἴνου.

Κεφ. νζ.

Δικταμνίτης· δικτάμνου < δ΄ * εἰς γλεύκους κοτύλας ή. ἀπόβρεχε ὁμοίως. ποιεῖ δὲ ἀσιτωμένοις στόμαχον, ἄγει καὶ λόχια καὶ ἔμμηνα.

Περὶ Πρασίτου οἴνου.

Κεφ. νη΄.

Ο διὰ πρασίου· πρασίου τοῦ ἀκμαίου φύλλα κόψας χοίνικας β΄, κάθες εἰς μετρητὴν γλεύκους, καὶ τ᾽ ἄλλα ὁμοίως ποίει· ἁρμόζει δὲ τοῖς περὶ θώρακα, καὶ πρὸς ὅσα τὸ πράσιον.

Περὶ Θυμίτου οἴνου.

Κεφ. νθ΄.

Θυμίτης· θύμου κεκομμένου καὶ σεσησμένου οὐγγίας ρ΄ ἐνδήσας εἰς ὀθόνιον, κάθες εἰς γλεύκους κεράμιον. ἁρμόζει πρὸς δυσπεψίας, ἀνορεξίας, δυσεντερείας, νεύρων πόνοις, ὑποχονδρείων,

φεί-

bus, vulsis, ruptis, laterũ doloribus, spirituum discursationi, ægris concoctionibus.

Bunites vinum.

Cap. LVI.

E napis fit vinum, nomine bunites, drachmis duabus tusi napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis, Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis.

Dictamnites.

Cap. LVII.

Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextariis. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit.

Vinum ex marrubio.

Cap. LVIII.

Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc vinũ pectoris vitiis, & omnibus quibus marrubiũ.

Vinum ex thymo.

Cap. LIX.

Thymi tusi & cribrati vncias centum linteo colligatas, in amphoram musti adiicito. Valet cõtra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & præcordiorũ dolores,

 hyber

hybernos algores, & venenata animalia, quorũ morsum frigo insequitur, aut putrescit locus.

Vinum è satureia.

Cap. LX.

Simili modo è satureia vinũ fit, quod eadem quæ thymites præstat.

Origanites.

Cap. LXI.

Sic quoque origanites ex heracleotico origano conficitur similiter cum supradicto. Facit eadem quæ thymites.

Vinum è calamintha.

Cap. LXII.

E calamintha, pulegio, & abrotono vina fiunt eodem quo thymites modo, prosunt stomachicis, cibũ fastidiétibus, & regio morbo: ꝙ vriná moueant.

Vinum è conyza.

Cap. LXIII.

Fit item è conyza vinum, contra venenata ante alia efficax.

Aromatites.

Cap. LXIIII.

Aromatites ita fit: Palmæ, aspalathi, calami, nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contrieris, passo subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operφείκας χειμερινὰς, καὶ πρὸς ἰοβόλα τὰ ψύχοντα καὶ σύπεντα.

Πρὶ Θυμβρίτου οἴνου.

Κεφ. ξ

Θυμβρίτης ὁμοίως σκευάζεται, καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ, πρὸς ἃ καὶ ὁ θυμίτης.

Πρὶ Οριγανίτου οἴνου.

Κεφ. ξά.

Οριγανίτης δ' ὁριγάνου ἡρακλεωτικῆς σκευάζεται ὁμοίως τῷ θυμίτη· ποιῶν πρὸς τὰ αὐτά.

Περὶ Καλαμινθίτου γληχωνίτου καὶ ἀβροτονίτου οἴνου.

Κεφ. ξβ'.

Καλαμινθίτης γληχωνίτης, ἀβροτονίτης, ὁμοίως σκευάζεται τῷ διὰ θύμου· ποιοῦσι δὲ στομαχικοῖς καὶ ἀνορεκτοῦσι, καὶ πρὸς ἴκτερον· οὐρητικοὶ γάρ εἰσιν.

Πρὶ Κονυζίτου οἴνου.

Κεφ. ξγ'.

Οἶνος κονυζίτης ὁμοίως σκευάζεται· ἔστι δὲ πάντων μᾶλλον θηριακός.

Περὶ Αρωματίτου οἴνου.

Κεφ. ξδ'.

Ο δὲ ἀρωματίτης οὕτω κατασκευάζεται φοίνικος· ἀσπαλάθου, καλάμου, νάρδου κελτικῆς, ἑκάστου χοίνικα λειώσας, φύραμα γλυκεῖ, καὶ ποιήσας ὑμιγέθεις μάζας, βάλε εἰς γλεύκους ἀυστηροῦ ξέστας ιϛ'.

καὶ ἔα-

καὶ ἔασον ἡμέρας μ'. σφικώσας ἀγγεῖον εἶτα διυλίσας ἀποτίθεσο. σκευάζεται δὲ καὶ ἄλλως· καλάμου ὀλκὰς ἡ. φοῦ < ζ'. κόστου < β'. ναρδου συριακῆς < ς'. κασίας < ἡ. κρόκου < δ'. ἀμώμου < ἑ. ἀσάρου < δ'. ταῦτα ὁμοῦ λειώσας καὶ ἐν ὀθονίῳ δήσας χάλασον εἰς μετρητὴν γλεύκους, καὶ μετὰ τὸ ἀποζέσαι τὸν οἶνον μετάγγιζε. ποιεῖ δὲ πρὸς πόνους θώρακος, πλευρῶν, πνεύμονος, δυσουρίας τε καὶ ῥίγεσιν, ἐμπλωίοις ὑποχονδρίοις, καὶ τοῖς διὰ κρυμόν, ὀδύνουσιν ἁρμόζει πνιγμῶδος· καὶ πρὸς τὸν πάλαι ῥιγοῦντας· ἁρμοττει δὲ καὶ εὐχρωστικόν τε ὄντι καὶ ἀνώδυνος τοῖς αἰδοίοις, καὶ νεφρῶν ἁρμόζων πάθεσι.

operculato vase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde vbi fæce expurgatũ fuerit, recõdito. Alia eius ratio: calami vncia, phu drachmę septem, costi drachmæ duæ, nardi syriaci drachmæ sex, casiæ vncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quĩq;, asari drachmæ quatuor: omnia simul trita & linteo colligata in cadũ musti demerguntur, & postquã vinũ deferbuerit, trãsfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores: difficili vrinæ, horribꝫ, retardatis mẽsibus, atq; iis qui per frigora iter faciũt, potũ cõuenit: pituitæ crassitiẽ extenuat: coloré alit, somnũ conciliat, dolorem finit, renum & vesicæ vitiis auxiliatur.

Περὶ οἴνου ἐκ σμύρνης, πεπέρεως, καὶ ἴριος.

Κεφ. ξε'.

Σκευάζεται δὲ οἶνος πρὸς καταῤῥους, βῆχας, ὠμότητας, ἐμπνευματώσεις καὶ πλάδον στομάχου· σμύρνης < β'. πεπέρεως λευκοῦ < ά. ἴριος < ς'. ἀνήθου* < γ'. ταῦτα ὁλόκοπα* ἐνδήσας εἰς ὀθόνιον, κάθες εἰς ξέστας ς'. οἴνου· μετὰ δὲ πεντε̃ιν διυλίσας ἀποτίθεσο εἰς λάγηνον. καὶ πότιζε μεθ' ἑσπέραν τὸν διδοὺς ἄκρατον κύαθον ά.

Vinum ex myrrha, pipere & iride. Cap. LXV.

Fit & vinũ ad destillatiões, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coiit: Myrrhæ duæ drachmę, piperis cãdidi drachmæ vnã, iridis drachmę sex, anisi drachmæ tres: oĩa plenius tusa & linteolo inuoluta ĩ sex vini sextarios cõiiciunt: vinum post triduũ colatur, & in lagena reconditur. Datur post deambulationem, meraculum, cyathi vnius mensura.

Περὶ

Nectarites

Nectarites. Cap. LXVI.

FIT quoque nectarites ex helenio herba: Radice ſicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in cõgios ſex muſtis addita, & poſt tres mẽſes effuſa. Facit ad ſtomachi & pectoris vitia: vrinam pellit.

Vinum ex Syriaca nardo, & Celtica, malabatróq;. Cap. LXVII.

E Syriaca nardo, & Celtica, malabathróq; vinũ factitatur, hac ratione: Singulorũ ſelibrã in binos muſti cõgios mittito, poſt menſes duos colato. Datur cyathus vn⁹ cũ trib⁹ aquę. Hoc vinum efficax eſt contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinæ difficultatẽ: prodeſt ſtomachicis, atque iis quos pallor decolorat, Alij vnciam, aut ſextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem, in muſti amphoram adiiciunt.

Vinum aſarites. Cap. LXVIII.

Aſari quadrantem in ſenos muſti ſextarios itidem demittito. Id vini genus vrinam ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, iſchiadicíſque conuenit.

Vinum

Περὶ Νεκταρίτου οἴνου. Κεφ. ξϛ'.

Ὁ δὲ νεκταρίτης σκευάζεται ἐκ τοῦ ἑλενίου· ὃ ἔνιοι μηδικὸν, οἱ δὲ σύμφυτον, οἱ δὲ, ἰδαῖον φλόμον, οἱ δὲ, ὀρέστιον, οἱ δὲ νεκτάρειον καλοῦσιν· ἑλενίου ῥίζης ξηρᾶς < ε. ἐνδήσας εἰς ὀθόνιον, κάθες εἰς χόας ϛ'. γλεύκους, καὶ μετὰ γ'. μῆνας ἀπόχει. ποιεῖ δὲ πρὸς στόμαχον, θώρακα· ἄγει δὲ καὶ οὖρα.

Περὶ τοῦ διὰ συριακῆς νάρδου καὶ κελτικῆς καὶ μαλαβάθρου οἴνου. Κεφ. ξζ'.

Ὁ δὲ διὰ συριακῆς νάρδου, καὶ κελτικῆς, καὶ μαλαβάθρου, σκευάζεται οὕτως· ἑκάστου ἡμίμναιον λαβὼν, εἰς δίχουν γλεύκους κάθες καὶ μετὰ μῆνας β'. διύλιζε. δίδου δὲ καὶ κύαθον α. πρὸς τρεῖς ὕδατος. ποιεῖ νεφριτικοῖς, ἰκτερικοῖς, ἡπατικοῖς, δυσουροῦσιν, ἀχροοῦσι, στομαχικοῖς. οἱ δὲ ἀκόρου οὐγγίας α' ἢ β'. κελτικῆς νάρδου οὐγγίας γ'. ἐν κεραμίῳ γλεύκους σκευάζουσιν.

Περὶ Ἀσαρίτου οἴνου. Κεφ. ξη'.

ΑΣΑΡΙΤΗΣ ἀσάρου οὐγγίας γ'. κάθες εἰς γλεύκους κοτύλας ιβ'. ὁμοίως. ἔστι δὲ διουρητικός, ὑδρωπικοῖς ἁρμόζων, καὶ ἰκτεριῶσιν, ἡπατικοῖς, ἰσχιαδικοῖς.

Περὶ

Περὶ τοῦ διὰ τῆς ἀγρίας νάρδου οἴνου. Κεφ. ξθ'.

Ὁ δὲ διὰ τῆς ἀγρίας νάρδου· νάρδου ἀγρίας τῆς ῥίζης προσφάτου λειώσας σεσησμένης καθεὶς οὐγγίας η'. εἰς χοῦν γλεύκους ὁμοίως. καὶ ἔα μῆνας β'. χρήσιμος ἡπατικοῖς, δυσουροῦσι, πνευματουμένοις, στομαχικοῖς.

Vinum ex nardo syluestri. Cap. LXIX.

Radicis syluestris, nardi recentis & tritæ cribratæq; bessem in congium musti coniicito, duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili vrinæ, inflationibus, stomachicis.

Περὶ δαυκίτου οἴνου. Κεφ. ο'.

Δαυκίτης δαύκου τῆς ῥίζης ὁλοκόπου < ς'. εἰς γλεύκους κεράμιον καθεὶς ὁμοίως καὶ μετάγγιζε. ποιεῖ δὲ πρὸς πόνους θώρακος, ὑποχονδρίων, ὑστέρας· ἄγει ἔμμηνα, ἐρυγὰς κινεῖ, καὶ οὖρα· ἁρμόζει βηχὶ, σπάσμασι, ῥήγμασιν.

Vinum ex dauco herba. Cap. LXX.

Radicis dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imponito, & similiter trásfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ: menses pellit, ructus ciet, & vriná: prodest tussi, ruptis, vulsisq;.

Περὶ ἐλελισφακίτου οἴνου. Κεφ. οα'.

Ἐλελισφακίτης ὁμοίως· ἐλελισφάκου οὐγγίας η'. ὁμοίως εἰς γλεύκους ἀμφορέα* ὅ ἐστι κεράμιον, καθεὶς. ποιεῖ δὲ πρὸς νεφρῶν πόνους, καὶ κύστεως καὶ πλευρῶν, αἵματος ἀναγωγὰς, βῆχα, ῥήγματα, σπάσματα, θλάσματα, ἔμμηνα ἐπεχόμενα.

Vinum ex saluia. Cap. LXXI.

SALVIÆ vnciam in musti amphorá, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet cótra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses.

Περὶ πανακίτου οἴνου. Κεφ. οβ'.

Πανακίτης, πάνακος οὐγγίαν α'. εἰς χόα γλεύκους καθεὶς ὁμοίως μετάγγιζε. ποιεῖ σπάσμασι, ῥήγμασι, θλάσμασιν, ὀρθοπνοίαις· λεπτυντικὸς πάχους σπληνός· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς στρόφους, ἰσχιάδας, βραδυπεψίας·

Vinũ ex panace. Ca. LXXII.

Panacis vnciã in musti congium mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, contusis, orthopnœæ: lienis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores, efficax est: tardas

tardas cõcoctiones accelerat: mẽses & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentiũ ictibus auxiliatur.

Vinũ ex acoro. Ca. LXXIII.

Vinum ex acoro & dulci radice cõsimili modo fiũt. Oportet enĩ singulorũ vncias octo in senos cõgios mittere, tribus mẽsibus macerare, mox in vas transferre. Faciũt ad pectus, & latera, & vrinam mouent.

Vinũ ex apio. Ca. LXXIIII.

Seminis apij recentis, maturi & cribrati vnciæ nouẽ in linteo colligatæ in musti amphorã demittanẽ. Appetitũ excitat: stomachicis, & difficili vrinæ auxiliatur: faciles spiritus facit.

Vinum ex fœniculo & anetho. Cap. LXXV.

Ex fœniculo, anetho, & petroselino, vina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia.

Vinum ex salis flore. Cap. LXXVI.

Fit & è flore salis vinũ, multò ad purgandum efficacius, q̃ vinũ aqua marina tẽperatum. Fauces, vesicã, renes, & stomachum infestat: quare neque in secunda, neque aduersa valetudine prodest.

Vinũ phthoriõ. Ca. LXXVII.

Fit etiã vinũ qđ phthoriõ vocant,

βραδυπεψίας· καταμηνία ἄγει καὶ ἔμβρυα ὑδρωπικοῖς, καὶ σπριδήκτοις ἁρμόζει.

Περὶ Ἀκοείτου οἴνου.

Κεφ. ογ'.

Ἀκοείτης δὲ καὶ ὁ ἀπὸ γλυκυρίζης ὁμοίως σκευάζεται. δεῖ γὰρ ἐκθύσου οὐγγίας * π'. εἰς χόας ς'. σὺν μηνὸς γ'. ἀποβρέχοντας μεταγγίζειν. ποιοῦσι δὲ πρὸς πλευρὰν, καὶ θώρακα, καὶ νεφροῦντες καὶ οὖρησιν.

Περὶ Σελινίτου οἴνου. Κεφ. οδ'.

Σελίνου σπέρματος ὠείμου νέου σεσεσμένης ἀγγίας θ'. ἐνδήσας εἰς ὀθόνιον, βάλε εἰς καρδάμινον γλεύκους ὁμοίως. ποιεῖ δὲ ὄρεξιν· καὶ στομαχικοῖς ἁρμόζει, καὶ δυσεξοῦσιν. ἔστι δὲ καὶ εὔπνους.

Περὶ Μαραθρίτου καὶ ἀνηθίνου οἴνου. Κεφ. οε'.

Καὶ μαραθρίτης καὶ ἀνήθινος, καὶ πετροσελινίτης ὁμοίως σκευάζονται πρὸς τὰ αὐτὰ ποιοῦντες.

Περὶ Ἁλοσταθήνου.

Κεφ. ος'.

Σκευάζεται καὶ δι' ἁλὸς ἄνθους καθαρτικώτερος ἢ διὰ τῆς λάπης. κακοῖ δὲ φάρυγγα, καὶ νεφροὺς, κύστιν, στόμαχον· ὅθεν οὔτε πρὸς ὑγείαν ὅτε πρὸς πάθη χρήσιμος ὁ τοιοῦτος.

Περὶ Θυείου ἐμβρύων.

Κεφ. οζ'.

Γίνεται δὲ καὶ φθόριος ἐμβρύων οἶνος,

οἶνος, φυτευομένοις γὰρ τοῖς ἀμπέλοις συμφύεται ἐλλέβορος ἢ σίκυος ἄγριος, ἢ σκαμμωνία, ὧν ἀναλαμβάνει ἡ ἄμπελος πλὴν δύναμιν. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν οἶνος γίνεται φθόριος. γίνεται δὲ καὶ ἐπὶ ἐμμήκεσι νήσοις κυάθων πλῆθος ἡ κεκραμένος.

Περὶ Θυμελαίτου οἴνου.
Κεφ. οὐ.

Ὁ θυμελαίτης τῶν κλώνων σὺν τοῖς φύλλοις καὶ τῷ καρπῷ < λ'. βάλε εἰς γλεύκους χόας γ'. καὶ σκεύασε ἑψῶν κούφως, ἄχρις ἂν β'. ἀπολιφθῶσι χόες, καὶ διυλίσας ἀποπίθιζε. καθαίρει ὑδατώδη καὶ πλιῶσα τήκει.

Περὶ Χαμαιλαίτου.
Κεφ. οθ'.

Χαμαιλαίτης ἐπειδὰν ἀνθῇ ὁ θάμνος, μετὰ τῶν φύλλων κόψας καὶ σίσας βάλε < ιβ'. εἰς γλεύκους χοῦν, καὶ μετὰ μῆνας β'. μετάγιζε. ποιεῖ δὲ ὑδρειῶσιν, ἡπατικοῖς, κεκοπωμένοις. καὶ ἔτι ἐν τοκετῷ δυσκαθάρτοις.

Περὶ Χαμαιπιτύϊνου.
Κεφ. π'.

Χαμαιπιτύϊνος ὁμοίως σκευάζεται, καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει διουρητικὸς ὤν.

Περὶ

cant, quoniam partus necat, & abort⁹ facit, veratro aut scāmonia, aut sylueſtri cucumere, iuxta radices vitiū ſato: ſiquidem vites ſibi illorū vires adſciſcūt. Id vinū part⁹ enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ antè vomuerunt, cyathorum octo mē ſura, dilutum.

Vinum ex thymelæis.
Cap. LXXVIII.

Rhamorū thymelææ cū ſuis foliis, & fructu triginta drachmas mittito in cōgios tres muſti, & leui igne coquito, donec congij duo ſuperſint, defæcatūq; recondito. Aquoſa purgat excremēta, & lienē abſumit.

Vinum ex chamelæa.
Cap. LXXIX.

Chamelæa dum floret, cū foliis tuſa & cribrata decē drachmarum pondere, in muſti cōgium additur. Poſt duos menſes vinum in vas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & laſſitudine cōfractis, efficax eſt: item mulieribus quę à partu ægrè purgantur.

Chamæpityinum.
Cap. LXXX.

Chamæpityinum ſimili modo fit, & ad eadē conueniens: vrinam quoque ciet.

Vinum

Vinum ex mandragora. Cap. LXXXI.

Librum radicis mādragoræ cōcidito, segmēta lino traiicito, quod selibrā æquat in musti cadum demittito, ibiq; esse sinito ad mēses treis, deinde trasfundito. Media potio, heminæ dimidiū: bibit, passo in duplū addito. Aiunt heminā vini cōgio mistā, potu soporem adferre: cyathus vnus cū sextario vini potꝰ, enecat: mediocris vsus eiꝰ doloris sensū aufert: fluxiones incrassat: olfactu, potúq;, & cum inditur idē præstat.

Vinū ex verano. Ca. LXXXII.

In cōgiū musti aquà marina diluti, drachmas xij. nigri veratri triti ī linteo mūdo, mittito: dūq; efferbuerit, in marinæ aquæ cōgios xiiij. aut xv, vbi pleniuscule fregeris, iniicito: post aliquot dies colato, & vtitor. Dato cyathum vnum ex aqua balnei in potu, ad aluū soluēdā, iis qui euomuerūt à cœna. Alia ratio: Veratri drachmas viginti, iūci odorati vncias duodecī, spicæ Syriacæ vncias tredecim, cribratas, & linteo colligatas in septē vini Coi sextarios dieb⁹ quadraginta macerādas indito, postmodum calato: dabis in potu sesquiheminam.

Aliter:

Πρὶ Μανδραγορείτου. Κεφ. πέ.

Μανδραγορείτης, τῶ φλοιῶ τῆς ῥίζης καταπτισμὸν, ἔνειρον εἰς λίνον ἢ μυγαλοῦν, καὶ κάθες εἰς μετρητὴν γλεύκους σὺν μιλῶσας γ΄. εἶτα μετάγγιζε. ἡ μέση πόσις ἡμικοτύλιον· πίνεται δὲ γλεύκους σὺν σιδομύλου εἰς δίπλασιον. φασὶ δὲ κοιμίζειν καὶ καρωῶν κοτύλιν ἀπὸ χοῒ ἑνὶ μιχθῆσαν, καὶ πυθῆσαν· μετὰ ξέστου δὲ οἴνου κύαθος εἷς πυθεὶς ἀναιρεῖ· ἔστι δὲ ἡ σύμμετρος χρῆσις ἀγώδυνος· ῥευμάτων παχυντική· ὀσφραινόμενος δὲ καὶ ἐξελυζόμενος τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

Πρὶ Ἐλλεβορίτου. Κεφ. πβ΄.

Ἐλλεβορίτης εἰς χρῶ γλεύκους πεθαλασσωμένου μέλανος ἐλλεβόρου < ιβ΄ λείου βάλε εἰ ὀθονίῳ καθαρῷ, μετάχει δὲ ὅταν ἀναζέσῃ· εἰς θαλάσσης χόας ιβ΄. ἢ ιδ΄. ὁλοχρῶς σωθλάσας βάλε, καὶ μεθ' ἡμέρας πέντε διυλίσας χρῶ. πόσις δὲ κύαθον ἀ, πρὸς κοιλίας λύσιν μεθ' ὕδατος εἰ βαλανείου, ἐμημεκόσιν, ἀπὸ δείπνου. ἢ ἐλλεβόρου < κ΄. σίνηπος οὐγγίας ιβ΄. κάχρυος σεσειακοῦ οὐγγίας γ΄. σησαμίνης εἰ ὀθονίου δύσας. κάθες εἰς κοτύλας ιβ΄. κοῖλ οἴνου ἐπὶ ἡμέρας μ΄, εἶτα ἀποθύσας πόπιζε πέντε ἡμικοτύλια. ἢ εἰς

ἢ εἰς γλεύκους κεραίμιον θα-
λάττης πελαγίας ἐψιλωμένης ξέσας
ιβ'. ἑλλεβόρου λευκοῦ λίτρας ς'.
ἔμβρεχε ἡμέρας μ'. καὶ ἀπωθήσας
χρῶ. ἢ ἑλλεβόρου < ιβ'. ἀ-
φρονίτρου < δ' γλεύκους κο-
τύλας ιβ'. βρέχε ἐπὶ ἡμέρας μ'. καὶ
ἀπωθήσας χρῶ μετὰ μιλῶας ξέ-
σεως καὶ βρέφη ἐκπιτρώσκει, ἢ
καὶ ἐκθελοποιεῖ νομιζόμενα σαφυ-
λῆς βάλε εἰς γλεύκους μέτρη-
τὴν (ἔστι δὲ ὁ μετρητὴς χόες ι')
καὶ βάλε γύψον εἰς τὸν οἶνον <
κ'. καὶ ἔασον ἡμέρας β'. καὶ κά-
θες ἐνδέσμιον ἑλλεβόρου μέλα-
νος ὀυγγίας λ'. κάγου ὀυγγίας λ'.
καλάμου ὀυγγίας λ'. ἀρκευθίδων
ἡμιχοίνικον καὶ δ'. σμύρνης δὲ
καὶ κρόκου ἀνὰ ὀυγγίαν ά. ἐπει-
λίσας ὀθονίῳ κρέμασον ἡμέρας
μ'. εἶτα διύλιζε καὶ δίδου
κυάθους γ'. ἢ β'. κεράσας.
καθαίρει τὰς ὑπὸ τοκε-
τῶν καὶ ὑπὸ βωμῶν·
καταστᾷ δὲ καὶ
ἔμβρυα καὶ πρὸς
τὰς ὑστερικὰς
πλίσας ποιεῖ.

Περὶ Σκαμμωνίτου. Κεφ. πγ'.

Σκαμμωνίτης· σκαμμωνίας δ' ῥίζης < ιδ'. ὀξυπόρου μάγνησίν πυραμοῦ ἔμβαλε εἰς γλεύκους χοᾶν ἐνὰ λείας, δήσας ἐν ὀθονίῳ ἐπὶ ἡμέρας λ'. καθαίρει

Aliter: Decoctæ marinæ aquæ ex alto petitæ sextarios duodecim, veratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die, q̃ madefeceris, colato, & vtitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodenas, et aphronitri quaternas, in senis, musti sextariis diebus quinisdenis macerato, mox colato: & semestri ex acto, vtitor. Id vini genus abortus facit, & partus necat. Aut vuas in sole siccatas imponito in musti metretã (implet autẽ metreta cõgios duodecim) & gypsum in vinũ mittito pódo drachmarum viginti, & biduo residere finito, coniicio veratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorũ drachmas triginta, baccarũ iunipери sextarios duos, & triẽtẽ, myrrhæ & croci singulorũ drachmam, inuolués linteolo diebus quadraginta appẽdito, postea colato. Dabis heminas treis aut duas dilutas. Purgat à partu, & abortu fœminas: fœt⁹ extrahit, cõtra strãgulat⁹ vuluæ efficax.

Scãmonites. Cap. LXXXIII.

Scammonites fic fit: Radicis scammoniæ per messes effossæ, tritæ, & linteo colligatæ drachmas quinq; in musti cõgium mittito, ad dies triginta.

Aluum

Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

METALLICA OMnia, & primum Cadmia. Cap. LXXXIIII.

Ex cadmiæ generibus optima est Cypria, botryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore spodij, q̃ fracta cinerulenta est, & erugi nosa. Proxima habet foris cœrulea, intus candidior, internatis venarum discursibus, onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt, quæ è veteribus metallis effodiuntur. Quædam etiã placodes, id est, crustosa dicit, segmentis quibusdã perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet, terrã amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychitis, vtiles: reliquæ ad emplastra, & farinas quę cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hispania delata improbãtur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare,

καθαίρει δὲ κοιλίαν, ἄγων χολὴν καὶ φλέγμα.

ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΟΣ λιθοῦ μεταλλικοῦ.

Περὶ Καδμείας. Κεφ. πδ'.

Καδμείας ἀείστι μὲν ὅδιν ἡ κυπρία, καλουμένη δὲ βοτρυῖτης, πυκνὴ, βαρεῖα μέσως, καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὸ κουφότερον ῥέπουσα, ἔχουσα τὴν ἐπιφάνειαν βοτρυώδη, χρώματι ἀποδιδοῦσα, θλασθεῖσα δὲ ἔντερος ἔνδοθεν καὶ ἰώδης. ἐχομένη δέ ἐστιν ἡ ἔξωθεν μὴ κυανίζουσα, ἔνδοθεν δὲ λευκοτέρα, διαφύσεις ἔχουσα ἐμφερεῖς ὀνυχίτῃ λίθῳ, τοιαῦτα γάρ εἰσιν αἱ ἐκ τῶν παλαιῶν μετάλλων ὀρυσσόμεναι. Ἔστι δὲ καὶ πλακώδης τις λεγομένη ὥσπερ ζώνας ἔχουσα τὰς διαφύσεις, ὅθεν καὶ ζωνῖτην αὐτὴν ἐκάλεσε. καλεῖται δέ τις καὶ ὀστρακῖτης ἰσχνὴ, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μέλαινα. γεώδης δὲ ἡ ὀστρακώδει κεχρημένη ἐπιφανίᾳ. φαύλη δὲ ἡ λευκή. χρῆσιμεύει δὲ πρὸς μὲν τὰ ὀφθαλμικὰ φάρμακα ἡ βοτρῦῖτις καὶ ὀνυχῖτης καλουμένη· αἱ δὲ λοιπαὶ εἰς ἐμπλάστρους καὶ ξηρὰ κατουλοῦν δυνάμεναι. καὶ πρὸς ταῦτα χρήσιμεύει ἡ κυπρία. ἡ δὲ ἐκ Μακεδονίας καὶ Θράκης καὶ Ἱσπανίας κομιζομένη, ἄδοκος. Δύναμιν δ' ἔχει συστελλικὴν, κοιλωμάτων ἀνακαθαρτικὴν, καθαιρετικὴν ῥυπαρίων παρεμπλάστου

παρεμπλάστει δὲ καὶ ξηραίνει καὶ ἐσχαροῖ, καὶ στέλλει τὰ ἐκσαρκώματα, καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἑλκῶν ἀπουλοῖ. Γεννᾶται δὲ ἡ καδμεία ἐκ τοῦ χαλκοῦ καμινευομένου, προσιζανούσης τῆς λιγνύος τοῖς τοίχοις καὶ τῇ κορυφῇ τῶν καμίνων. εἰσὶ δὲ αὗται σιδηραὶ παμμεγέθεις, ὑπὸ τῶν μεταλλουργῶν καλούμεναι ἀκεστίδες, κατὰ κορυφὴν συνημμέναι πρὸς τὸ κατέχεσθαι καὶ ἐφιζάνειν τὰ ἀναφερόμενα σώματα ἀπὸ τοῦ χαλκοῦ. ἅπερ δὴ καὶ μᾶλλον ἐφιζάνοντα ἐπισωματοῦται, καὶ ποτὲ μὲν ἓν εἶδος αὐτῆς, ποτὲ δὲ δύο, ἢ ἅπαντα ἀποτελεῖται. μεταλλουργεῖται δὲ ἐκ τοῦ προϋπερκειμένου σολέων ὄρους τοῦ λεγομένου πυρίτου λίθου καιομένου· ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ὄρει εὑρίσκεται οἱονεὶ διαζώματά τινα χαλκίτεως, μίσυος, σώρεως, μελαντηρίας κυανοῦ, χρυσοκόλλης, χαλκάνθου, διφρυγοῦς. τινὲς δὲ καὶ ἐν μετάλλοις φασὶ λιθίνοις εὑρίσκεσθαι καδμείαν πλανώμενοι ὑπὸ λίθων πολλὴν ἐμφέρειαν ἐχόντων· ὥσπερ καὶ ὁ ἐν τῇ κύμῃ λίθος εὑρισκόμενος. Δύναμιν δὲ οὐδεμίαν ἐνδεικνύμενος. ἐπιγινωσκομένων αὐτῶν ἐκ τοῦ κουφοτέρους αὐτοὺς εἶναι τῆς καδμείας, καὶ διαμασσηθέντας μὴ *ἐπιεικεῖς ἐν τῇ γεύσει.

ἀγανακτεῖν

exiccare, corporis meatus infarcire, excreſcentia in carne coërcere, cruſtas creare, & vlcera quæ cachoëte vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egeſta flatu, & lateribus cameríſque fornacum inhærẽte. Prægrandes autem ac ferreæ ſunt rudes ab officinis appellatę aceſtides, per ſũma faſtigia cõnexæ & concameratæ, vt quæ ab ære iactantur ſurſum corpuſcula cohæreãt, & inibi detineantur: quæ cum ſpiſsius inſident, in corpus concreſcunt, & modo gen9 vnũ eius, modo duo, modo omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia ĩ Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato lapide cui pyritæ cognomen eſt: in quo etiã monte quædam quaſi venæ chalcitis, miſyos, ſoreos, melanteriæ, cærulæi, chryſocollæ, atramẽti ſutorij, diphrygisq; inueniunt. Nec deſunt qui cadmiã in lapidum fodinis inueniri tradant, falſi quadã lapidum cognatione: qualis inuenit, & apud Cumas lapis, nullam ſui vim oſtẽdens. Ii eo deprehenduntur, ꝙ ſunt cadmia leuiores, nullumq; alienũ mãdẽtibus ſaporẽ exhi-

bent

bent:commanducatus item lapis,dentes offendit:cadmia,vtpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinâ detrita, & aceto subacta, atq; in sole siccata, coit:quod in lapide nõ accidit. Item tritº & igni appositus lapis,prosilit, & fumum igni similem eiaculatur: cadmia verò quieta manet,fuliginẽq; luteo colore aut æreo splendentem expuit, vario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus,atq; refrigeratus,colorem mutabit,ac leuior multò fiet.sed cadmia nihil euariat,nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior,ac minus ponderosa, sed viribus nequaquam comparãda ærarię.Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur,& ferrei stercoris modo bullet:mox extinguitur vino Aminęo,q̃ ad emplastra præparatur:sed quæ ad psorarum medicamenta præparatur,aceto . Alij hoc modo exustã conterunt in vino,rursúmq; fictili crudo torrẽt, donec pumicosa videatur:iteruq; tritam ex vino,tertio vrũt,donec prorsus in cineré redigatur,

ἀγαγακτεῖν ἢ τὸν ὀδόντας ἐν τῇ γεύσει εἰ λίθος εἴη ἐν τῷ διαμασήσει. εἰ ἢ καδμεία εἴη, ἀνέχεται τῆς διαβρώσεως συμεικόσης ἀυτ̃. ἔτι διαχρίνει καὶ τῷ τὴν μὲν καδμείαν λειοτριβηθεῖσαν, σὺν ὄξει, καὶ ξηρανθεῖσαν ἐν ἡλίῳ ἐκπέζειν. τὸν δὲ λίθον μὴ πάσχειν τοῦτο. καὶ ὅτι τε ὑπθέντα μὴν τὸν λίθον τυρευμένον πυρὶ ἀποπηδᾶν, καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ καπνὸν ὁμοίως ἀναφέρειν τῷ πυρί· τὴν δὲ καδμείαν, μένειν τε καὶ ἀναδίδοναι αἰθάλλιν μαλίζουσαν καὶ χαλκοφανῆ, ὡσπερεὶ ζώνιλον τινὰ ποικίλιον. ἔτι ὁ μὲν λίθος πυρωθεὶς καὶ ψυχεὶς ἀμίωθήσεται τῷ χρώματι, καὶ κυρότερος ἔσται. ἡ ἢ καδμεία κατ' ὀλὲν μεταβάλλει, εἰ μή τις αὐτὴν ἐφ' ἱκανὰς ἡμέρας ἐκκαύσει. χρυσᾶ δὲ καὶ ὀκ τῶν ἀργυρείων λευκοτέρα καὶ κυροτέρα ἔσα, κτ̃ δὲ τὴν ἀκρόαιαν ἧττον, χαυσέον δὲ τὴν σκευασμένην καδμείαν ἐκρύπτοντας εἰς ἄνθρακας, ἕως ἂ ἀφανὴς γένηται, καὶ πυρφλυγήσῃ ὡς σιδήρου σκωρία· εἶτα ἐν οἴνῳ σβεννύειν ἀμιναίῳ, τὴν δὲ εἰς τὰ φαρμακὰ ὄξει. πρὸς δὲ τὴν ὕστερον κρεῖσσαν ἀναλιάνοντες, οἴνῳ καθάπαξ πάλιν ἐν ἀμῇ χύτρᾳ μέχρι κονιορτώδους ἂ ὄψιν γένηται· πάλιν δὲ μετ' ὄξους λεοβιδισθῆσα βίτον, καίουσι μέχρι τελείας εἰς ἀποδύν ἀγαλυθῆ,

μηδὲν

μηδὲν ἔχυσα τραχύ· καὶ ἀπὶ ἀποδίσ χᾶν· εἶτα τοιαύτη. πλυνεῖ δὲ ἐν ὑδρίᾳ πεζομένῳ συὼ ὕδατι, ἀποχεομένου τοῦ ὕδατος ἄχρι μηδὲν ἐφιστᾶται ῥύπα ἐὸν, καὶ ἀναπλασθεῖσα ἀποπήγεται.

tur, nihil scabritiæ retinēs: hac spodij vice vtuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Περὶ Πομφόλυγος.

Κεφ. πέ.

Πομφόλυξ ἀποδίδυ εἰδικῶς διαφέρει, χρωικὴν γὰρ οὐκ ἔχει παραλλαγήν. ἡ μὲν γὰρ ὑποκυανίζει καὶ βαρυτέρα δεῖ κρίνεσθαι τὸ πλεῖστον, ἔμπλεως καπφῶν, καὶ τεφρῶν καὶ λίθος ὡσανεὶ ἀπόψημά τι καὶ σύρμα τῶν ἐν τοῖς χαλκουργείοις ἐδάφων καὶ καμίνων οὖσα· ἡ δὲ πομφόλυξ λιπαρὰ ὑπάρχει καὶ λευκή, ἔτι δὲ κουφοτάτη, ὡς διύεσθαι ὑπὸ τοῦ ἀέρος. καὶ ταύτης δὲ δύο δοκεῖν εἶδη. τὸ μὲν, ἀργύριζον καὶ ὑποκυάνεον· τὸ δὲ, λίαν λευκὸν, καὶ ἄκραν ἔχον κουφότητος. γίνεται δὲ ἡ λευκὴ πομφόλυξ, ὅταν ἐν τῇ κατεργασίᾳ καὶ τελειώσει τοῦ χαλκοῦ, πυκνότερον οἱ ἐκ τῶν χαλκουργείων συμπάσσωσι λελεασμένην καδμείαν, βεβποιῶν αὐτὴν βωλόμενοι. ἡ δὲ ἀπὸ ταύτης ἀναφερομένη αἰθάλη λευκοτάτη οὖσα πομφολογοῦται οὐ μόνον δὲ ἐκ τῆς τοῦ χαλκοῦ κατεργασίας τε καὶ ὕλης γίνεται πομφόλυξ, ἀλλὰ καὶ ἐκ καδμείας ἀφηνημένης ἐκφυσωμένης εἰς χρόσιν αὐτῆς.

Pompholyx.

Cap. LXXXV.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidē spodos nigricat, & plerunque ponderosior est, palearum pilorúmque plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum pauimētis & fornacibus euerritur, pompholyx verò pinguis est, & candida, vsqueadeo leuis, vt in auras euolare possit. Cuius duo fluxerūt genera: vnum ad aēris colorem vergens, subpinguе: alterum magnopere candidum, summámque leuitatem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in perficiúdo ære, fabri præstantiorem facere volentes, detritam cadmiam cumulatius insparserint. Nanque tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygen coit. Cæterùm pompholyx non ex æris modo materia, & fabrili industria factitatur, sed ex cadmia quoque, ad gignēdam ipsam, eximiè follibus proflata.

Cuius faciundæ ratio hæc est: In domo gemina cõtignatione operta, fornax extruitur, iuxta quã mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat: domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacé vsque perforetur, ad excipiendam follis narem: ostium mediocre habeat, pro exitu ingressúq; artificis fabricatum: domũcula altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & flator suo munere fungantur: deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis: idem negotium obit inferné artificis minister, simúlq; carbones adiicit, vsque dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaq; egesta suffitu tenuis pars, & leuis materiæ in summã donũ euolat, & parietibus, tectis, forniciq; adhæresci: cõflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementũ capessens, glomusculis vellerũ simile redditur. Pondero sius auté in ima loca se recipit: sed hoc fornacib⁹ effũdit, illud dom⁹ pauiméto cohæret.

πιεῖται δὲ ὅτως· ἐν οἰκίᾳ διπλόᾳ κατασκευάζεται κάμινος, καὶ κατὰ ταύτην τοῖς τοίχοις ἐντομὴ σύμμετρος ἡ καὶ ἐκ τῶν ἄνωθεν μερῶν ἀνεωγμένη. ὁ δὲ τοῖχος τοῦ οἰκήματος ᾧ πλησιάζει ἡ κάμινος, πρᾶνῶ λεπτῷ τρήματι ἄχρις ἂν τῆς τοῦ χώνης εἰς παρεμβολὴν φυσοσπόρος· ἔχει δὲ καὶ θύραν σύμμετρον πρὸς εἴσοδον καὶ ἔξοδον καὶ τὸ σκευασμένον ὑπὸ τοῦ τεχνίτου· συνῴκηται δὲ τούτῳ τῷ οἰκήματι ἕτερος οἶκος, ᾧ αἱ φύσαι καὶ ὁ φυσοσπόρος ἐργάζεται· λοιπὸν ἄνθρακες ἐντίθενται τῇ καμίνῳ καὶ πυροῦνται, εἶτα παρεδρεύει ὁ τεχνίτης ἐμπάσσει λεπτοκοπημένου τοῦ καδμείου ἐπὶ τοῦ κεφαλίου τῆς χώνης τόπου· ὁ ὑπὸ χεῖρά τε τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἅμα καὶ ἀνθρακιὰν παρεμβάλλει, ἄχρις ἂν ὁ παρεστὼς πλῆθος ἀναλώσῃ. ἐνδυμωμένης δὲ αὐτῆς, τὸ μὲν λεπτομερὲς καὶ κοῦφον, εἰς τὰ ἄνω ἀναφέρεται οἴκου, καὶ παρεμπίπτει τοῖς τοίχοις αὐτοῦ καὶ τῇ ὀροφῇ· τὸ δὲ σῶμα τὸ ποικίλμενον ὑπὸ τῶν σπινθηρομούσων, κατ' ἀρχὰς μὲν τῶν ἐπανισταμένων τοῦ ὑδάτων πομφόλυξιν ἐοικὸς γίνεται, ὕστερον δὲ τελείους τὰ αὐξήσεως συμβαινούσης ἐρίοις λοπάσιν ἀφομοιοῦται· τὸ δὲ βαρύτερον εἰς τὸν ὑπὸ πόδα χωρεῖ τόπους, καὶ παραχεῖται τοῦτο μὲν τῇ καμίνῳ, τοῦτο δὲ τῷ ἐδάφει τοῦ οἴκου·

Quod

ὃ δὲ φαυλότερον τὸ λεπτομερεῦς ἠντέον, ἀλλὰ τὸ γεῶδες καὶ ἔμφυλον ἀκαθαρσίας εἶναι ἐν τῇ συγκομιδῇ. τινὲς δὲ μόνως ὕπως οἴονται γίνεσθαι τὴν σποδιὴν μύλῳ ἀποδόν. ἀείστην δὲ ἠντέον τὴν κυπρίαν ἐν τῷ ὄξει φυσηθεῖσαν, ἀποφορὰν μὲν ἔχουσαν χαλκῆ, χρόαν δὲ ποιοῦσαν ποσῶς, ἐπὶ δὲ βοηθοείζουσαν ἐν τῇ χύσει· καὶ ἐπ' ἀνθρακος διαπύρου ὑπτιωθὲν ἄδολος, ὑπιζεῖ ἀδόκητος γινομένη. ὑπομελῶς δὲ σποδικτέον τοῖς σποδισημένοις κριτηρίοις. δολοῦται γὰρ ὑπό τινων τυρόκολλα ἢ πεύμοσιν ἀρνείοις ἢ θαλασσίοις ἢ κιχωμένοις ὀλωΐοις καὶ πισὶν ἄλλοις παραπλησίοις, εὐχερὲς ἢ τὸ διαγνῶναι· ἐδὲν γὰρ τῶν σποδισημένων ἐν τῇ δοκιμασίᾳ ὑπὸ τέτων εὐείσκεται. σμυτέον δὲ κοινῶς πομφόλυγα· τρόπον τοῦτον· ἐνδήσας ἀυτὸ ἐν καθαρῷ ὀδονίῳ μέσως ἔχοσαν ἀμαύσιτος, ἢ ξηρὸν ἢ ὕδατι πεφυραμμένῳ, κάθες εἰς λεκανίδιον ὕδωρ ἔχοσαν ὄμβριον. καὶ ἔσκλυζε ὧδε κἀκεῖσε διαφέρων τὸν ἔνδεσμον· οὕτω γὰρ τὸ μὲν ἰλυῶδες καὶ γόνιμον ἀυτῆς ἀποῤῥυήσεται, τὸ δὲ σύζαλον πᾶν ἐν τῷ ὀδονίῳ μενεῖ. εἶτα ἐάσας καταυῆναι, ἀπόθεσον τὸ ὕδωρ σὺν τῇ ἀποδῇ, καὶ πάλιν ἄλλο ὀπιχέας ἀνατάραξον καὶ ἀπόχει· καὶ

Quod tenuiore deterius existi mandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcitia in aceruatione referciatur. Sunt qui hoc modo tantũ fieri spodium arbitrantur, de qua antedictum est. Optima credi tur Cypria, quę accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cœni horrido: & si fraudem nõ experta flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attẽdendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur à taurino glutine, ouillo pulmone aut marino, aut crematis grossis, & quibusdã cõsimilibus, quod facile cognitu fuerit: quippe nihil in iis probandis inuenietur eorum quæ ante dicta sunt. Pompholygẽ in cõmune ita lauari oportet: Ligatã linteo mũdo modiceq; raro, aut siccã, aut aqua respersam, in labellũ demittito, quod imbrẽ contineat, & huc atque illuc fasciculũ deferẽs, immergito: ita enim limosa pars eius ac vtilis effluet, & omne sedimentũ in linteolo remanebit. Postea residere sinẽs, aquã cũ cinere colis incernito, & nouã infundẽs, agitato, & effundito:

mutatá tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil sidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur. deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colãt, & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumosum, quod traiectum est. & supernatat vasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad vsus recondunt. Quod vero resedit, sensim cribratum in aliud vas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat: rursus lapidosa sidere patiuntur, & in vas aliud excolant: hoc identidem faciũt, donec cinis merus & arenæ expers inuenia tur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillósque suo põdusculo degrauatos, pessum ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterùm cinerem medium separant, & in pilã conjectum, vt cadmiam, eluunt.

καὶ ταῦτα πολὺ ἀπιθῶν τε καὶ ἀποχέων, μέχρις ἂν μηδὲν ἀμμῶδες ὑφιζάνηλοιπὸν τὸ μὲν ὕδωρ ἐξίπτωσον, τὴν δὲ ποδὸν ξηραίνας ἀποτίθεσο. τινὲς δὲ ξηραίνοντες ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται, ταῖς χερσὶ λειαίνουσι μὴ ὕδατος, καὶ μελιτώδη τὴν σύστασιν ποιοῦσιν· ἐνθοῦσι δ' ὀθονίῳ ἐπιπτάσαντες αὐτὸ τὸ ὕσσωλέχεσθαι μέλλοντι· ἀλγεῖῳ, καὶ ἀποδόντες τὸ λίαν ἀποτανύσαι, ἐᾷς δὲ τὸ ῥᾳδίως διεξελθεῖν διαψιλὲς ὕδωρ ἐπιχέαντες τῷ ὀθονίῳ, ἀναταράσσουσι τὴν ποδόν· εἶτα τὸ διυλισθὲν καὶ ἐπιπηχόμενον αὐτῆς τῷ ἀγγείῳ ἀφροῦδες ὂν, αὐτόθεν μύσακι ἀναλαμβάνοντες, ἀποτίθενται εἰς ὀστράκινον κηρὸν ἀληθῆ. τὸ δὲ ἐγκαθήμενον ἐᾷσι διασῆσαντες μεταχέουσιν εἰς ἕτερον ἀληθῆ, ἀπολείποντες τῷ ἐν τῷ πυθμένι ἀμμώδες· πάλιν δὲ ἐάσαντες ὑποσῆναι τὰ λιθώδη εἰς ἄλλο ἀγγεῖον καθαρὸν, ἀπιθοῦσι καὶ τοῦτο πολλάκις ἕως ἂν καθαρὸν καὶ ἀμέτοχος ἄμμου γένηται καὶ ποδός. ἄλλοι δὲ ὡς ἔστιν ὁλομερῆ εἰς ὕδωρ κατ' ὀλίγον ἐμπάσσουσι τῷ θερμαινομένῳ, οἰόμενοι ἄμμον μὲν καὶ τὰ λιθώδη τῷ ἰδίῳ βάρει εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ἀγγείου καταῤῥύσεσθαι· τὴν χάρφη καὶ τὰ ὅμοια ἐπαωρηθήσεσθαι διὰ τὴν κουφότητα· λοιπὸν χωρίσαντες αὐτῶν τὴν ποδὸν ἐν μέσῳ οὖσαν καὶ εἰς δύο βαλόντες, πλύνουσιν ὡς καδμείαν· πλυθεῖσα

Quinetiã

πλύνεται δὲ καὶ οἴνῳ χίῳ τεθαλασσωμένῳ κατὰ τὸν προειρημένον τρόπον καὶ γίνεται συστικώτερα τῆς ὕδατι πλυνομένης. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ τερμόλυξ συστικήν, λυτικήν, ἀναπληρωτικήν, καθαρτικήν, θερμαστικήν, καὶ ποσῶς ξηραντικήν*. ἐὰν δὲ ὀπῷ σὺν τῷ ἀποδύσει, λεάνας ὀπιμελῶς αὐτὰ καὶ ἀναδεύσας ὕδατι, ποιήσας ζοχίσκους, θὲς ἐπ' ὄστρακον καινὸν, ὀπτήσει δὲ τοῦτο ὑπὸ λεπτὴν καὶ κύφλω ἀνθρακιάν, καὶ σφόδρα τὸν κυκλίσκους συνεχῶς, ἄχρις ἂν πυρροὶ καὶ ξηροὶ γένωνται. γνωστέον δὲ ὅτι ὅταν τὸ χρυσοῦν καὶ ἀργύρεον ἔτι δὲ καὶ μολύβδου γένηται ἀποδιὰ καὶ ἔστι μὴ τῶν κωφρίαν ἢ ὧν τὸ μολύβδου ἀείση.

Περὶ Ἀντιποδίου. Κεφ. ϟϛ'.

Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὰ ἀντίποδα ἱκανῶς εὐχρηστεῖ, ὑστερήσας πολλάκις ἀποδῶ, τὰ ἰσοδυναμοῦντα ἀναγκαῖον δοκεῖν ὑποδεῖξαι, τίνα τε ὑπάρχει καὶ ὃν τρόπον παρασκευαστέον. λαβὼν τοίνυν μυρσίνης τὰ φύλλα σὺν τοῖς ἄνθεσι καὶ τοῖς μύρτοις ἀώροις ἔτι οὖσιν, ἔμβαλε εἰς ὠμὴν χύτραν, καὶ θερμάσας τὸ πῶμα καταστέβνιόν συνεχέσιν ὀπαῖς, θὲς εἰς κάμινον καιομένην, ὅταν ἡ ὀπτηθῇ ὁ κέραμος, εἰς ἄλλην χύτραν ὠμὴν μεταφέρασον αὐτὸ, καὶ πάλιν κατοπτηθείσης καὶ δευτέρας, ἐξελὼν πλύνε καὶ ξηρῶν.

Quinetiã lauaſ vino Chio marina aqua diluto, modis quos ſuprà diximus: & ita reddit adſtringentior, quàm aquis elota. Vis pópholygis adſtringere, refrigerare, explere, purgare, obſtruere, & aliquãtum exiccare. Inter medicaméta numeratur, quę leniter cruſtas obducunt. Quod ſi ſpodó torrere libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua, colliges in paſtillos, fictiliq; nouo, ſubiectis leuibus prunis, orbiculos cõtinuò verſabis, dum aſsicati fuluescant Neq; ignorãdum, ex auro, argẽto, plumbóq; fieri ſpodion: verùm poſt Cypriũ, plũbeum maximè commendatur.

Antiſpoda. Cap. LXXXVI.

Quoniam ſpodos ſæpenumero deſideratur, neceſſe eſt oſtẽdere, quę ſimili virtute poſſeant, vt in ſpodij locum ſufficiant, antiſpoda vocant, quóque modo ſumi debeant. Folia itaque myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina habente, vruntur fornacib⁹ donec figlinum percoquatur: iterum in fictile aliud crudũ trãſferuntur, quod vbi peraſſatum fuerit, exépta lauãtur ad vſus.

Idem quoq; fit è termite syluestris oliuæ, si habeatur: si secus, satiuæ cū suis florib⁹, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est cādidis, in sole pri⁹ arefactis, aut terebintho, aut lētisco, œnāthe, aut mollibus rubi foliis, vel è buxi coma, vel pseudocypero cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alij taurinum gluten: alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas: quæ omnia in spodij vicem vsurpantur.

Æs vstum. Cap. LXXXVII.

ÆS vstum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imitetur: nigrum verò plusquam deceat, exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauiū, fictili crudo compositis: subsperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparsis, fictile, circūlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figilinum percoquatur. Quidā pro sulphure & sale alumē inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies vrunt. Alij sulphure solo vtuntur, fuliginem tamen excutiunt.

Alij

ὡσαύτως δὲ καὶ θαλλίαν σκευάσας παραλάμβανε. ἔστω δὲ τῆς ἀγρίας ἐλαίας· εἰ δὲ μὴ, τῆς ἡμέρου σὺν τοῖς ἄνθεσιν, ἢ δὲ μὴ μῆλα κυδώνια κατατετμημένα, καὶ ἐξοστεισμένα, ἢ κηκίδα, ἢ ῥακώλια, ἢ ἄωρα συκάμινα λευκὰ προεξηραμμένα ἐν ἡλίῳ, ἢ σχοῖνον, ἢ τέρμινθον, ἢ οἰνάνθην, ἢ βάτου τὰ ἁπαλὰ φύλλα, ἢ πύξου κόμας, ἢ τὸ λεγόμενον ψευδοκύπερον σὺν τῷ ἄνθει. τινὲς δὲ κράδας συκῆς προεξηραμένας ἐν ἡλίῳ, ὡσαύτως σκευάζουσιν· ἄλλοι δὲ ταυρείαν κόλλαν· οἱ δὲ, ἔρια οἰσυπηρὰ τραχέα πίσσῃ ἢ μέλιτι δεύσαντες, ὁμοίως σκευάζουσι*.

Περὶ κεκαυμένου χαλκοῦ. Κεφ. πζ

Ὁ δὲ κεκαυμένος χαλκὸς ἔστι καλὸς ὁ ἐρυθρὸς καὶ ἐν τῇ τρίψει κινναβαρίζων· ὁ δὲ μέλας πλέον ἢ δεῖ κέκαυται. σκευάζεται δὲ ἐκ τῶν ἥλων τῶν λελυμένων πλοίων, συντιθεμένων ἐν ὠμῇ χύτρᾳ, ὑποπασσομένου θείου μετὰ ἁλῶν ἴσων, καὶ ἐπιπασσομένων ἐναλλάξ, πωμασθεῖσα δὲ ἡ χύτρα καὶ ὑποχριθεῖσα πηλῷ κεραμικῷ, δίδοται εἰς κάμινον, ἄχρις οὗ τελείως ὀπτηθῇ. οἱ δὲ, ἀντὶ τοῦ θείου καὶ τῶν ἁλῶν στυπτηρίαν παρεμπάσσουσιν. ἔνιοι δὲ δίχα τοῦ θείου καὶ τῶν ἁλῶν συνθέντες ἐν χύτρᾳ, καίουσιν ἐφ' ἱκανὰς ἡμέρας. οἱ δὲ, τῷ θείῳ μόνῳ χρῶνται, ἀποσβολοῦνται μέντοι.

ἄλλοι

ἄλλοι δὲ χρίοντες τοὺς ἥλους σχιστῇ στυπτηρίᾳ μετὰ θείου καὶ ὄξους, καίουσιν ἐν ὠμῇ χύτρᾳ. ἄλλοι δὲ ἐν χαλκῇ χύτρᾳ ὄξει καταῤῥαίνοντες αὐτοὺς οὕτως ὀπτῶσι, μετὰ δὲ τὸ καῦναι πάλιν τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ἐπὶ τρεῖς, ἔπειτα ἀποτίθενται. πρωτεύει δὲ ὁ ἐν μέμφιδι καιόμενος· ἔπειτα ὁ ἐν κύπρῳ. δύναται δὲ στύφειν, ξηραίνειν, λεπτύνειν, καταστέλλειν, ἐπισπᾶσθαι, ἀνακαθαίρειν ἕλκη ἀπουλοῦν· σμήχει τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς, τήκει τὰ ὑπερσαρκοῦντα, νομὰς ἱστᾷ. κινεῖ δὲ καὶ ἐμέτους μετ᾽ ὑδρομέλιτος ποθεὶς ἢ ἐκλειχθεὶς σὺν μέλιτι, ἢ διαχριόμενος. πλύνεται δὲ ὡς ἡ καδμεία τετράκις τῆς ἡμέρας διαρασσομένου τοῦ ὕδατος, ἄχρι μηδεμία ἐφίστηται λάμπη. καὶ ἡ σκωρία δὲ αὐτοῦ ὡσαύτως πλυνομένη, τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, ἀσθενεστέραν μέντοι.

Περὶ Ἄνθους χαλκοῦ. Κεφ. πή.

Χαλκοῦ δὲ ἄνθος ὅ τινες τῶν παλαιῶν ἥλων ψῆγμα ἐκάλεσαν, ἄριστόν ἐστι τὸ εὔθρυπτον καὶ κατάπυῤῥον ἐν τῷ λεαίνεσθαι, κεγχροειδές τε τῷ ῥυθμῷ καὶ βραχὺ καὶ βαρὺ καὶ μέσως στίλβον, ἔτι δὲ ῥινισμάτων χαλκοῦ ἀμέτοχον οἷς δολοῦται. ἐλέγχεται δὲ πλατυνομένων αὐτῶν ταῖς τῶν ὀδόντων ἐπερείσεσι. γίνεται

Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in ænea olla aceto respersos, vrũt. & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimit, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emédat, excrescétia in carne consumit, nomas cohibet, vomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cum melle delinctum, illitúmve. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercúsve quam scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eãdem vim, sed imbecilliorem habet.

Flos æris. Cap. LXXXVIII.

Flos æris, qué nõnulli clauorum veterũ psegma quasi resegmé aut segmentũ, nominarũt, optimus est friabilis, in attritu fulvescens, milij effigie, & numero, breuis, pốderosus, modicè splédens, atq; cóstringés, q delimatá ęris scobé nó recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facile deprehéditur, cũ dentium illitu dilatantur ramenta.

Fit

Fit autem, cum es fornacibus fusum, in receptacula delabitur, per cola fistularum ad ea pertinentium: tum huic negotio addicti ministri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi proposito: itaque repentino concretu, ac addensatione, velut expuitur, & erumpit antedictus flos. Astringit, & excrescétia coërcet: offusam oculis caliginẽ emendat, sed magnopere mordet. Quaternûm obolorum pondere datus, crassum humorem extrahit: carnosa narium & sedis vitia absumit: eruptiones papularum cum vino cohibet. Candidus contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur: vuam, tonsillásque reprimit, farina eius cum melle admota.

γίνεται δὲ οὕτως, ὅταν ἐκ μεταλλικῶν χώνων ταχεῖς ὁ χαλκὸς εἰς τὰς δεξαμενὰς καταῤῥυῇ διὰ τῶν ἠθμῶν τῶν δικόντων σωλήνων, διακαθαίροντες τῷ ἀκριβεστάτῳ οἱ περὶ τούτοις ὄντες, ὕδωρ ἐπιχέουσιν ἀκραιφνέστατον αὐτῷ, ψύξει περιαιροῦμενοι· ὑπὸ οὖν τῆς αἰφνιδίου συγκρύσεως καὶ συναγωγῆς, ὥσπερεὶ ἐκπύεται καὶ ἐκπαθεῖ τὸ περιερρυὲν. σύφει δὲ καὶ τοῦτο καὶ κατασέλλει ταῖς ὑστεροχαῖς· καὶ σμήχει τὰ τῆς κόρης ὑποπεπωτότα δάκνον ἱκανῶς. ἔστι δὲ καὶ πάχος ἀγαλὸν πτερυγοβόλου πλῆθος διδόμενον· ἐπιτήκει δὲ καὶ τὰ ἐν μυκτῆρσι σαρκώματα· καὶ δακτυλίων ἐξανθήματα σὺν οἴνῳ σέλλει. καὶ πρὸς δυσάφους χρονίους τὸ λευκὸν ἐμφυσᾶται διὰ σίφωνος λεῖον· σέλλει δὲ καὶ μυίδας ἢ παιδόμια, λεῖον σὺν μέλιτι προσαποδόμενον.

Squãma æris. Cap. LXXXIX.

Squãma æris excussa ex Cypriis officinarum clauis, crassa quidẽ ipsa præstãtior quæ helitis, id est clauaris, nominatur. sed ex vili promiscuóq; ære, aut cãdido vitiosa intelligitur: quã, vtpote tenuẽ, & inualidã, damnamus, maximè approbantes crassam, rusam, præsertim si aceti respersu æruginẽ cõtrahat.

Περὶ Λεπίδος.

Κεφ. πθ'.

Λεπὶς δὲ ἡ μὲν ἐκ τῶν κυπρείων * χαλκουργικῶν ἥλων, παχεῖα καλουμένη δὲ ἡλῖτις, καλή. φαύλη δὲ ἡ ἐκ τοῦ χαλκοῦ λευκοῦ λεπὶς καὶ ἀδρυγὴς ὑπαρχρυσα, ἣν ἀποδοκιμάζομεν, ἐγκείνοντες τῷ παχεῖαν καὶ ἔγκυῤῥον, καὶ ὄξους ἐπῤῥανισμένον ἰουλιάζειν.

Δυνάμεις

Vim

Δύναμιν δὲ ἔχει σταλτικὴν, λεπτυντικήν· νομῶν ἐφεκτικὴν, σηπτικὴν, ἀπουλωτικήν· πινομένη δὲ μετὰ μελικράτου, ὕδωρ ἄγει. τινὲς δὲ φυρῶντες αὐτὴν μετ᾽ ἀλεύρου, ἐν καταποτίῳ διδόασι. μίγνυται δὲ καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσι, ξηραίνει γὰρ * τὰ βλέφαρα τὰ τραχέα ἀποτήκουσα, καὶ τὰ ῥεύματα. πλύνεται δὲ οὕτως· καθαρᾶς τῆς ξηρᾶς λεπίδος ἡμιμναῖον, βάλε εἰς θυΐαν μεθ᾽ ὕδατος διαυγοῦς, καὶ συνταράξας τῇ χειρὶ ἐπιμελῶς, ἄχρις οὗ ὑποστῇ ἡ λεπίς· ἀφαίρει τὰ ὑφεστῶτα, ἀποχέας τε τὸ ὕδωρ, ἐπίχει ὀμβρίου ὕδατος κύαθον α΄. πλατεῖα τε τῇ χειρὶ τρίβε εὐτόνως ἐν τῇ θυΐᾳ, οἱονεὶ ἀποψήχων· ἐπὰν δὲ ἄρξηται ἀνιέναι τινὰ γλισχρότητα, κατὰ μικρὸν ὕδωρ προσεπίχει ἄχρι κυάθων ς΄. τρίβων εὐτόνως· ἀναλαβών τε τὴν λεπίδα τῇ χειρὶ, ὡς πρὸς τὸ πλευρὸν τῆς θυΐας, τρίβε εὐτόνως· καὶ ἐξιπώσας ἄνελε τὸ ἀπορρυὲν εἰς πυξίδα ἐρυθροῦ χαλκοῦ. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὥσπερ ἄνθος τῆς λεπίδος καὶ εὔτονον τῇ δυνάμει, καὶ εὐτονοῦν εἰς τὰ ὀφθαλμικά. τὸ δὲ λοιπὸν, ἄτονον καὶ τὸ καταλειφθὲν ἐστὶν ὁμοίως, πλύνων, ἀναιροῦ μέχρις ἂν μηδεμίαν γλισχρότητα ἀποκρίνῃ, τὸ δὲ λοιπὸν σκεπάσαντα δεῖ ὀθονίῳ ἐᾶσαι ἀκίνητον ἐπὶ δύο ἡμέρας, εἶτα

Vim habet adſtrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem: nomas coërcet, vlcera ad cicatricem perducit: pota ex aqua mulſa, aquam trahit. Aliqui farina ſubactam, dant in catapotio. Additur ad oculorum medicaméta. quòd genarum ſcabritiam abſumit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo: Siccæ æris ſquammæ expurgatæ ſelibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quouſque peſſum ierit: abiicitur quod ſubſidit, & effuſa aqua, hemina cœleſtis imbris adiicitur, & diſtenta manu, ſquamma, quaſi deſtringenda ſit, vehementer confricatur: dúmque lentorem emittere cœperit, aqua ſenſim ad ſex heminas vſque ſuperinfunditur, terendo validé: ſquamma ad latus mortarij colligitur, ibíque apprimitur: quo facto, expreſſus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc eſt enim velut flos ſquammæ, valẽs viribus, & ad ocularia medicaméta cũ primis efficax. Inutile imbecillumque quod ſupereſt, lauatur donec nullam prorſus lẽtitiã excernat, & linteo apertũ biduo cǫquieſcere ſinitur, effu

effusaque extâte aqua, vbi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alii vt cadmiam lauant, & reponunt.

Stomoma. Cap. XC.

Squammæ ex acie aut mucronibus decussæ, quam vocant stomoma, eadem vis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moliendam alui deiectionem, inefficacior est.

Ærugo rasilis. Cap. XCI.

Ærugo rasa fit his modis: In cadum, aut aliud consimile vas acetũ quàm acerrimũ infundi tur: superponitur inde inuersum æneum vas, præsertim cõcameratum: sin minus, planũ: sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum, exempto, quo doliũ obturaueris opercu lo: decimum post diem insidẽs ærugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidẽ post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina vna pluréfve, vinaceis nõ recétib⁹, sed iã aceſcétibus cõduntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex delimata æris scobe æruginem facere licet, necnon è laminis, quibus bracteæ auri concluſæ malleo ducuntur: si quis

εἶτα ἀποχέαντας τὸ ἐφεψηκὸς ὕδωρ καὶ ξηράναντες ἀποτίθεσθαι εἰς πυξίδα. ἔνιοι δὲ καὶ ταύτην πλύναντες, ὡς τὴν χαλκάνθου ἀποτίθενται.

Περὶ Λεπίδος σμύρνης. Κεφ. ε'.

Λεπὶς δὲ σμύρνης δύναμις ὁμοία ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ τοῦ χαλκοῦ λεπίδι. καὶ πλύσις καὶ ἀπόθεσις ὁμοία· ἐν μόνῳ τοι τῷ πλύνειν κοιλίαν καθαίρειν λείπεται τῆς τοῦ χαλκοῦ.

Περὶ Ἰοῦ ξυστοῦ. Κεφ. ς'.

Ἰὸν δὲ ξυστὸν οὕτω σκευαστέον· εἰς πιθάκνιον ἢ ἄλλο ὅμοιον ἀγγεῖον ἐγχέας ὀξυμώτατον ὄξος· ἐπικατάστρωσον χαλκοῦν ἀγγεῖον, χαλὸν μὲν εἰ καμαρωτὸς· εἰ δὲ μή γε, ἰσόπεδον· ἔστω δ' ἐσμυγμένον καὶ διαπνοὴν μηδεμίαν ἔχον, διὰ δὲ ἡμερῶν δέκα ἀναιρούμενος τὸ πῶμα, ἀπόξυε τὸν ἐπιπέχοντα ἰόν. ἢ λεπίδα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ποιήσας χαλκοῦ, ἐγκρέμασον εἰς τὸ ἀγγεῖον, ἵνα μὴ ψαύσῃ τοῦ ὄξους, καὶ διὰ τῶν ἴσων ἡμερῶν ἀπόξυε. ἢ εἰς τὰ στόμωλα* μὴ σφόδρα τὰ ὄντα ὀξίζοντα ἐγκρύψας μάζαν ἢ λεπίδα μίαν ἢ καὶ πλείονας, ὡσαύτως ἀνάστρεφε. ἔνεστι δὲ καὶ ἐν ῥιγισμάτων ποιῆσαι ἢ λεπίδων, αἷς σφενδόμενα τὰ χρυσᾶ φύλλα ἐλαύνεται, ἐάν τι

ἐὰν τις αὐτὰ ὀπῤῥάνῃ ὄξει, ἀναχυθῇ τεὶς ἢ τετράκις, ἄχρις αὖ παντελῶς ἰωδῇ. χρυσᾶς δέ φασι τοῦτον τὸν ἰὸν καὶ ἐν τοῖς κυπριακοῖς μετάλλοις, τὸν μὲν, λίθοις τισὶν ἐπανθοῦσιν ἔχρισι τὸν χαλκόν· τὸν δ' ἐκ τινος σπιλάδος ζαζόντα ἐν τοῖς ὄρεσι κύανα καὶ μασὸν· καὶ τὸν μὲν ὀλίγον τε καὶ κάλλιστον εἶναι· τὸν δὲ ἐκ τοῦ σπιλάδους, δαψιλῆ μὲν ὀπῤῥεῖν καὶ εὐχρων, φαῦλον δὲ ὑπάρχειν διὰ τὸ πολλοῖς ἀναμεμίχθαι λιθώδεσι. δολοῦται δὲ καὶ ἄλλοις πολλοῖς μισγόμενος, μᾶλλον δὲ τούτοις· πυῖτι μὲν γὰρ κισήρει· οἱ δὲ, μαρμάρῳ, ἄλλοι δὲ χαλκαίθῳ κυκῶσιν αὐτόν. καταλαμβάνεται δὲ τῷ μὲ κίσηρι καὶ τὸ μάρμαρον, διὰ τοῦ νοτίσαι καὶ τὸν αὐτίχειρα τῆς ξυρυμένου χειρὸς καὶ τῷ ἑτέρῳ σφοδρίζειν τὸ μέρος ἰοῦ· συμβαίνει γὰρ τὸ μὲν, αὐτῆς διαχεῖσθαι, τὰ δ' ἀπὸ τῆς κισήρεως καὶ μαρμάρου μέρη ἀδιάχυτα μένειν, καὶ τέλος ἀπολευκαίνεσθαι τῇ ὀπιπλέον παραξύλει καὶ τῇ τῆς ὑγροῦ παραπλοκῇ. οὐμενοῦν, ἀλλὰ διὰ τῆς καὶ τῶν ὀδόντων ἐφαρμόσεως· λεῖον γὸ ὑποπίπτει καὶ οὐ τραχὺ τὸ ἀμιγές. τὸ δὲ χαλκαθον ἀπιλίγγεται τῷ πυρί· εἰ γάρ τις ἐμπλάσας τὸν οὕτω δεδολωμένον ἰὸν ὅτι λεπίδα ἢ ὄστρακον, καὶ τὸ ἕτερον τούτων ὀπτήσει ἐν θερμῇ τέφρᾳ ἢ ὅτι αὐθαξεί, μεταsi quis eas aceto respargat, & ter aut quater versét, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cypriis metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil æris habétibus, quibus ærugo effloresçit: adduntque per caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc spelunçis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed vitiosam, quòd lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant: aliqui pumice admisto, alij marmore, alij atramento sutorio. Sed deprehendemus pumicem aut marmor, dum pollice sinistræ manus madefacto, æruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat, marmoris autem pumicisque partes coëunt nó dissipatæ, demúmque tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin & dentium appressu: si quidem syncera cedit, lævis, & sine asperitate. Atramentum verò sutorium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamina, adulterata ærugine illinatur, & feruenti cinere aut carbonibus incalescat alterutrum, muta-

mutabitur, rubescetq; id quod atramentum sutorium accepe rit: quod id vstum suapte natu ra talem sortitur colorem.

Scolecia. Cap. XCII.

Æruginis quam vocant scoleciam, duo sunt genera quædam fossilis est, altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprij æris dimidiam heminam aceti albi acrisque, pistillo cupreo conterito, donec strigméti crassitudiné imitetur: deinde aluminis rotúdi drachmá vnam, cũ salis fossitij, trãsfluentis, aut marini quàm albissimi, solidíque, aut certè cũ nitri pari pondere terito in sole, æstuosissimis diebꝰ, sub sydus canicularæ, donec coloré æruginis cõtrahat, & cõcretu strigmentosum fiat: vbi autẽ se in vermiculorũ Rhodiacis similiũ specié coëgerit, recódito. Efficax & valde boni coloris redditur, si duas parteis vrinę veteris cũ vna aceti adieceris, & alia, quę dicta sunt, peregeris. Sũt q æruginé rasilẽ, gũmi misto digerãt in formas, & ita vẽdant: quod genus, vt vitiosum, improbatur. Fit & quædã ærugo ab aurifici bꝰ, mortario & pistillo Cyprij æris, cum vrina pueri impubis, qua

μεταβάλλεται, καὶ ἐρυθραίνεται τὸ χαλκανθῶδες· διὰ τὸ φύσει χαμόμυλον αὐτὸ τοιαύτην ἔχει χροιάν.

Περὶ Ἰοῦ σκώληκος.

Κεφ. ϛϚ'.

Τοῦ δὲ λεγομένου σκώληκος ἰοῦ διττὴν εἶδος ὑπάρχει· ὁ μὲν γὰρ ὀρυκτός ἐστιν, ὁ δὲ, σκευάζεται οὕτως· εἰς δυΐαν κυπρείου χαλκοῦ ἔχουσαν δὲ καὶ * δίδυμα ἀπὸ τῆς αὐτῆς πεπιεσμένου ὕλης, ἐγχέας ὄξους λευκοῦ, καὶ ἀλείμμως κοτύλης ἥμισυ, τείλε ἕως οὗ γλοιωδὴς· εἶτα ἔμβαλε συμπήκεις τροχίσκους * ϰ δ. καὶ ἁλὸς ὀρυκτοῦ διαφανοῦς, ἢ θαλασσίς ὡς ὅτι λευκοτάτου καὶ στερεοῦ, εἰ δὲ μή γε νίτρου τὸ ἴσον, εἶτα λίαν ἐν ἡλίῳ ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα χαύμασιν, ἕως τὴν μὲν χροιᾶς ἰώδης, τὴν δὲ συστάσει γλοιώδης γένηται· καὶ οὕτως αὐταπλάσας σκώληκας τοῖς ῥοδιακοῖς ὁμοίους, ἀποτίθεσο. ἐνεργὲς δὲ καὶ εὔχρους γίνεται ἄγαν, ἐὰν ὄξους μὲν λάβῃ μέρη δύο, τὰ δ' ἄλλα ὡς προείρηται. τινὲς δὲ τὸν ἀποτετυγμένον ἐν τῷ ξυστῷ κόμμει μίξαντες αὐταπλάσεσι, * ὃν παραιτητέον ὡς φαῦλον. ἔστι δέ τις καὶ ὑπὸ τῶν χρυσοχόων γινόμενος ἰὸς διὰ δυΐας καὶ δίδυμος κυπρείου χαλκοῦ, ἔτι δὲ ὕρᾳ παιδὸς, ᾗ τὸ

ᾧ τὸ χρυσίον κολλῶσιν. ἀναλογοῦσι δὲ κοινῶς οἱ προειρημένοι ἰοὶ κεκαυμένῳ χαλκῷ, μᾶλλον δ' ἐρρωμένοι περὶ τὴν ἐνέργειαν. ἰστέον δὲ ὅτι προέχει μὲν αὐτῶν ὁ ὀρυκτὸς σκώληξ· ἐχόμενος δέ ἐστιν ὁ ξυστός· εἶτα ὁ σκευαστός. δηκτικώτερος μέν τοι καὶ μᾶλλον στύφων οὗτος ὑπάρχει. ὁ δὲ τῶν χρυσοχόων ἀνάλογος τῷ ξυστῷ. Δύναται δὲ πᾶς ἰὸς στύφειν, θερμαίνειν, ἀποσμᾶν τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς καὶ λεπτύνειν, δάκρυον ἄγειν, νομὰς ἴσχειν, τραύματα ἀφλέγμαντα τηρεῖν. ἀπουλοῦν ἕλκη σὺν ἐλαίῳ καὶ κηρῷ· σὺν μέλιτι δὲ ἑψηθέντες, τύλους καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν ἀνακαθαίρουσιν· ἀμμωνιακῷ δὲ ἀναληφθέντες εἰς κολλύρια, σύριγγας καὶ τύλους ἐκτήκουσι. χρήσιμοι δὲ καὶ πρὸς ἐπουλίδας καὶ τὰς τῶν οὔλων ἐξοχάς. ἱκανῶς δὲ καὶ βλέφαρα λεπτύνουσι σὺν μέλιτι ἐγχριόμενοι· δεῖ δὲ πυριᾶν μετὰ τὴν ἔγχρισιν σπόγγῳ ἐξ ὕδατος θερμοῦ. ἀναληφθέντες δὲ ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ σὺν χαλκῷ ἢ νίτρῳ, λέπρας ἐξάγουσι. καυστέον δὲ ὃν ἂν ἐθέλῃς ἰὸν οὕτω, θλάσας αὐτὸν εἰς ὁλοσφυρέστατα μέρη, καὶ πηγαίῳ κεραμέῳ ἐπιθείς, ἀπερείσας ἐφ' ἀνθράκων διαπύρων, κίνει ἕως ἂν μεταβάλλῃ καὶ ὑποσποδίσῃ τῇ χρόᾳ· λοιπὸν δὲ ψύξας ἀπο-

qua aurũ ferruminãt. Antedicta æruginum genera, vsto æri omnino respondent, sed magis effectu valent. Sciendum fossilem scoleciam præstantissimã esse: derasam sequi: postremo loco factitiã. Mordacissima tamen est hæc, & magis adstringens. Aurificum autem ærugo rasæ respondet. Ærugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, lachrymas ciẽt, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuẽtur. Vlcera ex oleo ceráque ad cicatricẽ perducunt: callos & sordida vlcera purgant, cum melle coctæ: callum fistularũ erodunt, cum ammoniaco, collyrij modo in eas adactæ. Ad gingiuarũ autẽ excrescentias, & extuberationem vtiles. Magnopere extenuant genarũ crassitiem, cum melle illitæ: verùm post illitionẽ spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina exceptæ, cum ære & nitro lepras abigũt. Vritur ærugo, quancunq; velis, minutissimè fracta cõminutáq;, in fictili patina, flagrãtibus prunis superposita: versatúrque donec se mutet, & colorem cinereũ concipiat: postea refrigerata repo-

reponitur ad vſum, Sunt qui cruda olla eã vrant, vti dictum eſt: ſed non prorſus eundẽ colorem cremata reddit.

ἀποτίθεσο καὶ χρῶ. τινὲς δὲ ἐν ὠμῇ χύτρᾳ καίουσιν αὐτὸν ὡς προείρηται. οὐκ εἰς τὸ αὐτὸ δὲ πάντοτε καιόμενος μεταβάλλει χρῶμα.

Rubigo ferri. Cap. XCIII.

Rubigo ferri reſtringit: ſiſtit fœminarũ profluuia, admota, potúq; præſtat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus ſacris, & papularũ eruptionibus medetur. Perquàm vtilis ad ſcabritias genarũ, reduuias, & pterygia, condylomatis prodeſt, gingiuas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquáve in qua candens ferrum ſit reſtinctum, potu cœliacis, dyſentericis, lienoſis, cholera laborantibus, & diſſolutis ſtomacho auxiliatur.

Περὶ Ἰοῦ σιδήρου. Κεφ. ϛγ´.

Ἰὸς δὲ σιδήρου στύφει· ῥοῦν τε γυναικεῖον προστεθεὶς ἴσχει, πινόμενός τε ἀσυλληψίαν ποιεῖ. ἐπιχριόμενος δὲ σὺν ὄξει ἐρυσιπέλατα καὶ ἐξανθήματα ἰᾶται. πρὸς δὲ παρωνυχίας καὶ πτερύγια καὶ τραχέα βλέφαρα εὔχρηστος, καὶ κονδυλώματα καὶ οὖλα κρατύνει, ποδαγρικοῖς τε ὠφελεῖ ἐπιχριόμενος, καὶ ἀλωπεκίας δασύνει. σίδηρος δὲ πεπυρωμένος ἐνσβεσθεὶς ὕδατι ἢ οἴνῳ καὶ πινόμενος, ἁρμόζει κοιλιακοῖς, δυσεντερικοῖς, σπληνικοῖς, χολεριῶσι, καὶ στομάχῳ ἀναλελυμένῳ.

Scoria ferri. Cap. XCIIII.

Stercus ferri, quam ſcoriã vocant, eadẽ poteſt quæ rubigo, ſed inefficacius. Aconito, ex aceto mulſo potum, opitulatur.

Περὶ Σκωρίας σιδήρου. Κεφ. ϛδ´.

Ἡ δὲ σκωρία τοῦ σιδήρου δύναται ὅσα καὶ ὁ ἰὸς τοῦ σιδήρου, ἐπ' ἔλαττον δέ. βοηθεῖ δὲ ἀκονίτῳ μετ' ὀξυμέλιτος ποθεῖσα.

Plumbum elotum. Cap. XCV.

Lotura plumbi ſic fit: In mortarium plumbeum aquam iniiciens, piſtillo plumbeo terito, donec nigreſcat aqua, & limi modo craſſeſcat, aut lutulenta reddatur: linteolo deinde colato, aquam ſuperinfundens, quo

Περὶ Μολίβδου πεπλυμένου. Κεφ. ϛε´.

Σκευάζεται καὶ ὁ πεπλυμένος μόλιβδος τοῦτον τὸν τρόπον· βαλὼν εἰς μολιβδίνην * θυίαν ὕδωρ, τρίβε μολιβδίνῳ δοίδυκι, ἕως ἂν μελανθῇ τὸ ὕδωρ καὶ γένηται ἰλυῶδες· εἶτα διήθει αὐτὸ δι' ὀθονίου, προσεπιχέων τὸ ὕδωρ, ἵνα

ἵνα πᾶν τὸ διαλυθὲν ὑλισθῇ· καὶ ποίει τὸ αὐτὸ πάλιν ἄχρις ἄν σοι αὐτάρκως ἔχειν δόξῃ. εἶτα ἐάσας καταστῆναι τὸ πεπλυμένον, ἀποχέας τε τὸ ὕδωρ καὶ ἄλλο ἐπιχέας, πλῦνε ὡς τὴν καδμείαν, ἄχρις ἂν μηκέτι ἐφίστηταί τις μελανία· ἀναπλάσας δὲ τροχίσκοις ἀποτίθεσο. οἱ δὲ, καθαρὸν μόλιβδον ῥινήσαντες, τρίβουσιν ἐν λιθίνῃ θυΐᾳ δοίδυκι λιθίνῳ, ἢ ταῖς χερσὶ μεθ' ὕδατος ὑπὸ χεῖρα κατ' ὀλίγον ἐπιχέοντες τὸ μελαινόμενον· ὅπερ ἐάσαντες ὑποστῆναι καὶ ἀποχέαντες, ἀναπλάσσουσιν εὐθέως. τὸ γὰρ ἐφ' ἱκανὸν τριβόμενον, γίνεται ψιμμυθίῳ ὅμοιον. ἔνιοι δὲ προσεμβάλλουσι τοῖς ῥινίσμασιν ὀλίγην μολίβδαιναν, φάσκοντες βελτίονα εἶναι τὸν οὕτω πλυνόμενον μόλιβδον· Δύναται δὲ ψύχειν, στύφειν, παρεμπλάττειν, μαλάττειν, πληροῦν τὰ κοιλώματα, στέλλειν τὰ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ῥεύματα, καὶ τὰ ὑπερσαρκοῦντα τῶν ἑλκῶν. ἔστι δὲ καὶ ἴσχαιμος· καὶ πρὸς τὰ ἐν τῷ δακτύλῳ ἕλκη, κονδυλώματα, αἱμοῤῥοΐδας μετὰ ῥοδίνου· καὶ τὰ δυσκατούλωτα· καὶ καθόλου ποιεῖ ὅσα καὶ ἡ σποδὸς, δίχα τοῦ ἐσχαροῦν. ὁ δὲ ἀκέραιος μόλιβδος παρατριβόμενος βοηθεῖ τῇ τοῦ θαλασσίου σκορπίου καὶ δράκοντος πληγῇ.

Περὶ

quo facilius quicquid eſt reſolutum incerni poſsit. Hoc iterum facito, vſque dum ſatis tibi habuiſſe videatur. Vbi conſederit, priore aqua effuſa, nouam adiiciens, vt cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia: poſtea in paſtillos cogens reponito. Quidã ſcobem mundi plumbi lima quæſitam, mortario piſtillóque lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigreſcat: mox vbi id peſſum ierit, effuſa aqua colligunt in paſtillos. Nam tritum vehementer, ceruſæ ſimile redditur. Alij elimatæ ſcobi modicam plumbaginem adiiciũt, affirmantes ita elotum plumbum præſtantius eſſe. Poteſt refrigerare, adſtringere, inducere, mollire, explere caua, ſiſtere oculorum fluxiones, & vlcerum excreſcentia. Sanguinem ſupprimit: prodeſt contra ſedis vlcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex roſaceo: item ad ea quæ ægrè cicatricẽ ducunt: & in totũ ſpodij effectus præbet, niſi quod non obducit cruſtas. Syncerum plumbum affrictu, marini ſcorpionis draconíſq; plagis auxiliatur.

O Plum-

Plumbum vstum. Cap. XCVI.

Vritur plumbum sic: Super quamtenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito, additísque aliis rursus laminis, interiecto semper sulphure, vsquedũ vas expleueris, succédito: flagrante autem plumbo, ferrea rude versato, donec perfectè redigatur in cinerẽ, nihílq; è plumbo vstũ hæserit: tũ demũ, obstructis naribus, eximito: alioquin halitus plũbi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla sulphure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictum est, imponũt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, vrunt. Alii pro sulphure cerusam aut hordeum inspargunt. Alii integras laminas imponẽtes, acri igne vtuntur, & rudicula ferrea continuè mouent, dum in cinerem soluátur. Sed difficilis huiusmodi vstio, & si vehementius vratur, contrahit spumę argenti coloré. Magis tamen nobis placet prima vrẽdi ratio. Plumbum vstum lauatur vt cadmia, & recóditur. Eosdẽ effectus habet, quos plumbum elotum, sed multò acriores.

Scoria

Περὶ Μολίβδου κεκαυμένου. Κεφ. νε'.

Καίεται δὲ ὁ μόλιβδος οὕτω· λαβὼν μολίβδου ἐλάσματα ὡς ὅτι λεπιότατα, ἔπειτες εἰς χαλκῆ λοπάδα, καὶ ἐπιπάσας θείου, πάλιν ἕτερα ἔπειθες πέταλα, καὶ θείου ἐπίπασον, καὶ πάλιν ἕτερα, καὶ τοῦτο ποίει ἄχρις ἂν πληρώσῃς τὴν λοπάδα, εἶτα ὑπόκαιε· καιομένου δὲ τοῦ μολίβδου, κίνει σιδήρῳ ἄχρις ἂν ἀποτεφρωθῇ τελέως καὶ μηδὲν ἔχῃ μολίβδαινες· καὶ ἀναιρεῖν σκεπάσας τὸν ῥάθυμος· βλαβερὰ γὰρ ἡ ἀποφορά. ἡ ῥινίσματα μολίβδου βαλὼν μετὰ θείου εἰς λοπάδα οὕτω χαῦε· οἱ δὲ, εἰς χύτραν ὠμὴν βαλόντες τὰ πέταλα ὡς εἴρηται, καμίνῳ ἐπιθέασιν, ἢ ἐπ' ἐσχάρας θερμάναντες τὸ πῶμα καὶ ὀλίγον δόντες ἀναπνοὴν, καίουσιν. οἱ δ', ἡμιμέτρον παρεμπάττουσιν αὐτῇ τῆς θείου ἢ κριθάς. οἱ δ', ἀκεραίους τὰς λεπίδας ἐπιθέντες ὄξει, πυκνὰ χρῶνται, καὶ κινοῦσιν ἐπιτεταμένως σιδηρείῳ, ἄχρις ἂν ἀποτεφρωθῇ. ἔστι δὲ δυσχερὴς ἡ τοιαύτη χαῦσις, καὶ ἐπιπλέον δὲ χρεὶς, οὕτω λιθαργύρου λαμβάνει τὸ χρῶμα. ἡμῖν μὲν τοι ἀρέσκει ἡ πρώτη χαῦσις. δεῖ δὲ πλύνειν αὐτὸν ὡς τὴν καδμείαν καὶ ἀποτίθεσθαι. Δυώαμιν δὲ ἔχει ἴσῃ καὶ ὁ πεπλυμένος μόλιβδος, ἐυτονωτέραν δὲ μᾶλλον.

Περὶ Σκω-

Περὶ Σκωρίας μολίβδου.
Κεφ. ϛζ'.

Σκωρία μολίβδου, ἀείση ὄζει ἡ ψιμμυθιοφανὴς, πυκνὴ καὶ δύσθραυστος, μηδὲν ἔχουσα μολιβδώδες, μιλοειδὲς δὲ τῷ χρώματι καὶ ὑελίζουσα. δυώσεται δὲ τὰ αὐτὰ τῷ κεκαυμένῳ μολίβδῳ σύροντα μᾶλλον. πλύνεται δὲ ἐν ὀξυᾶ ὀπεχρωμένου ὕδατος· καὶ ἀπεχρωμένου τῶ ἐφιεμένου μιλίνου χρώματος· πολλάκις τὲ τοῦτο γίνεται ἄχρις αὖ ἀναλωθῇ ἡ σκωρία. τὸ λοιπὸν ἐάσαντες ὑποσῆναι αὐτὸν, ἀποχέομεν τὸ ὕδωρ, καὶ ὅπως αὐαπλάσωμεν.

Περὶ τοῦ μολιβδοειδοῦς λίθου. Κεφ. ϛή.

Καὶ ὁ μολιβδοειδὴς δὲ λίθος, ἀνάλογον ἔχει τὴν δυώαμιν τῇ σκωρίᾳ, πλύνεται δὲ ὁμοίως.

Περὶ Στίμμεως.
Κεφ. ϛθ'.

Στίμμι ἧ χράτιστον ὄζει τὸ στιλπνότατον, καὶ λαμπυρίζον, ἐν τῇ θραύσει πλακώδες, μηδὲν ἔχον γεώδες ἢ ῥυπαρὸν, εὐχερῶς τὲ θλώμενον, τοῦτο οἱ μὲν στίβι, οἱ δὲ πλατυόφθαλμον, οἱ δὲ λάρδασον ἐκάλεσαν. δυώαμιν δὲ ἔχει ἐκπαστικὴν, συπτικὴν, ψυκτικὴν, σαλτικὴν τῶν ὑπερσαρκούντων, ἀπουλωτικὴν ἑλκῶν καὶ κα-

Scoria plumbi.
Cap. XCVII.

Recrementũ plumbi, quod scoriã vocant, optimũ est densum, fractu cõtumax, cerusam planè repræsentans, nihil plumbosi habens, quod ad luteũ colorem accedit, & vitri splendorem imitatur. Eadẽ quæ plumbum exustũ potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortariis infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quę luteum colorem duxit: idque sæpius, dum recremẽtum absumatur. Dein vbi consederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

Lapis molybdoides.
Cap. XCVIII.

Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem excremento vim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium. Cap. XCIX.

Stimmi optimũ, quod splendidissimum est, modóque nitedularum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habẽs, friabile, quod stibi appellarunt, alii platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescentia in carne cohibere, vlcera ad cicatricẽ perducere,

sordes & vlcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & vt in vniuersum dicatur, vis vsto plumbo similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosas vlcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerusa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbũculetur crusta, exemptúmque restringuitur mulieris lacte, quæ marẽ peperit, aut vetere vino. Vritur etiã carbonib9 succẽsis efflatũ, quo ad igni deflagret: si enim paulò magis cõcremetur, plumbum fit. Lauatur, vt cadmia & æs. Sunt qui vt plũbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. Cap. C.

Molybdęna optima est flaua, argẽteæ spumę æmula, modicè splendẽs, cũ teritur rufa, cocta cũ oleo iocineris colorẽ trahit. Vitiosa est, quę aërẽ aut colorẽ plũbeũ refert. Gignitur ex auro & argẽto. Est etiã quędã fossilis, ad Sebastiam & Corycũ inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa nõ sit, aut recremẽtosa, sed nitens & flaua. Vim

καὶ καθαρτικὴν ῥυπαρῶν καὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἑλκῶν. ἐπέχει δὲ καὶ τὰς ἐκ μήνιγγος αἱμοῤῥαγίας· καὶ καθόλου δὲ ἐμφερής ἐστιν ἡ δύναμις αὐτοῦ τῷ κεκαυμένῳ μολίβδῳ. ἰδίως δὲ τὰ κατακαύματα οὐκ ἐᾷ ἐσχαροῦσθαι σὺν στέατι καταχρισθὲν νεαρῷ· καὶ ἀπουλοῖ τὰ ἐσχαροῦντα κηροῦ καὶ ὀλίγου ψιμμυθίου μιχθέντων. ὀπτᾶται δὲ στέατι περιπλασθὲν καὶ ἐγκρυβὲν εἰς ἄνθρακας, ἄχρις ἂν ἀνθρακωθῇ τὸ στέαρ, ἐξαιρεθὲν δὲ σβέννυται γάλακτι ἀῤῥενοτόκου γυναικὸς ἢ οἴνῳ παλαιῷ. καίεται δὲ ἐπ' ἀνθράκων ἐπιτεθὲν καὶ ἐμφυσηθὲν ἄχρι πυρώσεως· ἐὰν γὰρ ἐπιπλέον καῇ μολιβδοῦται. πλύνεται δὲ ὡς ἡ καδμεία καὶ ὁ χαλκός. ἔνιοι δὲ ὁμοίως τῇ τοῦ μολίβδου πλύνουσι σκωρείᾳ.

Περὶ Μολιβδαίνης. Κεφ. ρ΄.

Μολίβδαινα δὲ ἀρίστη ἐστὶν ἡ λιθαργυροφανὴς, ξανθὴ, ὑποστίλβουσα καὶ κιῤῥὰ ἐν τῷ λειοτριβεῖσθαι, ἑψηθεῖσα τε ἐλαίῳ, ἡπατοειδὴς τῷ χρώματι γίνεται. ἡ δὲ ἀερίζουσα ἢ μολιβδόχρους φαύλη. γεννᾶται δὲ ἐξ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ. ἔστι δέ τις καὶ ὀρυκτὴ κατὰ Σεβάστειαν καὶ Κώρυκον εὑρισκομένη. καὶ ταύτης ἐστὶ βελτίων ἡ μὴ σκωριώδης μηδὲ λιθώδης, ξανθὴ δὲ καὶ στίλβουσα. Δυνά-

Δυνάμιν δὲ ἔχει ὁμοίαν λιθαργύρῳ καὶ σκωρίᾳ μολίβδου. πλύσιν δὲ καὶ καῦσιν τὴν αὐτήν. μίγνυται δὲ ὑπὸ τηδεστέρου αὐτῇ, καὶ ταῖς λιπαρᾶσι καὶ ἀνεπιθύκτοις ἐμπλάστροις χρησίμως. οὖσα συρκωτικὴ καὶ ἀπουλωτική· τοῖς μὴ τελλικοῖς καὶ σηπτικοῖς οὐχ ἁρμόζει διὰ μασν.

Περὶ Σκωρίας ἀργύρου.

Κεφ. ρά.

Ἡ δὲ τοῦ ἀργύρου σκωρία καλεῖται ἔλκυσμα, ἢ ἔγκαυμα, τὴν αὐτὴν δὲ ἔχει δύναμιν τῇ μολυβδαίνῃ· ὅθεν ἐμπλάστροις φακοῖς μίγνυται καὶ ἀπουλωτικοῖς, συνεπικὴ οὖσα καὶ ὑποστατική.

Περὶ Λιθαργύρου.

Κεφ. ρβ.

Λιθάργυρος, ἢ μὴ τις ἐκ τῆς μολιβδίτιδος καλουμένης ἄμμου γινᾶται χωνευομένης ἄχει τελείας ἐκπυρώσεως. ἢ δὲ ἐξ ἀργύρου· ἢ δὲ ἐκ μολίβδου. διαφέρει δὲ ἡ ἀττική· δευτερεύει δὲ ἡ ἱσπανή· μεθ' ἃς ἡ ἐν Δικαιαρχίᾳ, καὶ ἐν καμπανίᾳ, καὶ σικελίᾳ· πλείστη γὰρ ἐν τοῖς δὲ τοῖς τόποις γινᾶται· μολιβδίνων ἐλασμάτων ἐκφλογουμένων. καλεῖται δὲ ἡ μὲν ξανθὴ ἢ γίλλουσα χρυσῖτις, ἢ τις ὄζει κρείττων· ἢ δὲ ἐν σικελίᾳ ἀργυρῖτις· ἢ δὲ

Vim habet ſpumæ argenti, aut recremẽto plũbi ſimilẽ. Vritur lauaturq; eodẽ modo. Miſcetur cõuenientiſsimè medicamẽtis, quæ liparas vocãt, atq; emplaſtris minimè mordẽtibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricẽ perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abſtergentibus non conuenit.

Argenti recrementum.

Cap. CI.

Recremẽtũ argẽti quod ſcoriã vocãt, aut helcyſma, aut encauma, molybdenę vim habet: quare emplaſtris quas phæas appellãt, additur, ac medicamẽtis quę cicatricẽ obducũt, vtpote cũ adſtringat, extrahatq;.

Spuma argenti.

Cap. CII.

Spuma argẽti quædã gignitur ex arena, quã molybditin vocãt, in fornacib⁹ cõflata, donec pfectè igni incãdeſcat. Altera ex argẽto: tertia ex plũbo. Probatiſsima eſt Attica: ſecũda, Hiſpanienſis: has ſequitur quæ fit Dicæarchiæ, id eſt Puteolis, Baiis, in Cãpania, & Sicilia: plurima enim hiſce locis è flagrãtibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore ſplẽdet, chryſitis appellatur, omniũ optima: quæ in Sicilia, argyritis:

quæ ex argento, calabritis. Vis aût adstringere, mollire, explere caua, excrescétia in carne reprimere, ad cicatricẽ ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argéti spuma, cófractis partib⁹ ad magnitudiné iuglandiû, prunæ superpositis: ita accésa follibus, vt conflagret, abstergitur insidens spurcitia, & recóditur. Aliqui ter aceto aut vino restinguétes, rursus vrunt, & eadem prosequuti, reponunt. Lauatur vt cadmia. Vt argyritidi nominatæ, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in parteis magnitudine fabarum cófracta, chœnicis atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi tritici pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo puro, raro, ansulis vasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat: deinde omnia in nouum crateré oris ampli transfunduntur: triticum abiicitur, spuma argenti veheméter manibus affricando infusa aqua lauatur, asiccatáque in Thebaico mortario teritur, affusa feruéte aqua, donec soluta fatiscat: excolata aqua, iterum tota die teritur, & vesperi infusa calida aqua sinitur: mane coiis excernitur,

alia

ἡ δ' ἐκ τοῦ ἀργύρου καλαυρῖτις. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικὴν, μαλακτικὴν, κοιλωμάτων πληρωτικὴν, σταλτικὴν, τῶν ἐκσαρκούντων καὶ ἀπουλωτικὴν, ψυκτικὴν, παρεμπλαστικήν. καίεται δὲ αὐτὴν οὕτω· κατακόψας εἰς καρύων μεγέθη, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' ἄνθρακας, ἐκφυσήσας τε ἄχρι πυρώσεως, καὶ περιμάξας τὴν περικειμένην ἀκαθαρσίαν, ἀποτίθεσο. ἔνιοι δὲ ὄξει ἢ οἴνῳ σβέσαντες αὐτὴν ἐκ τρὶς, πάλιν καίουσι, καὶ ταῦτα ποιήσαντες ἀποτίθενται. πλύνεται δὲ ὡς ἡ καδμεία. λευκαίνεται δὲ οὕτω· λαβὼν τῆς ἀργυρίτιδος λεγομένης, εἰ δὲ μή γε τῆς ἄλλης, κατάθραυσον εἰς μεγέθη κυάμων, ὅσον χοίνικα ἀττικὴν, βαλὼν τε εἰς καινὴν χύτραν, ἐπίχει ὕδωρ, προσεμβάλλων πυρῶν λευκῶν χοίνικα, καὶ ἰδίᾳ ἐν ὀθονίῳ καθαρῷ ἀραιῷ κριθῶν δράκα δήσας ἀπὸ τῶν ὤτων τῆς χύτρας κρέμασον, ἕψε δὲ ἕως ἂν ῥαγῶσιν αἱ κριθαί· εἶτα κατεράσας πάντα εἰς κρατῆρα πλατύστομον καινόν. τοὺς μὲν πυροὺς ῥῖψον χωρίσας, τὴν δὲ λιθάργυρον πλῦνον ἐπιχέας ὕδωρ, βιαίως ταῖς χερσὶ προστρίβων ἅμα, εἶτα ἀνελόμενός τε αὐτὴν καὶ ξηράνας, τρίβε ἐν θυίᾳ Θηβαϊκῇ, ἐπιχέων θερμὸν ὕδωρ, ἕως ἂν διαλυθῇ, καὶ ἀπηθήσας τὸ ὕδωρ πάλιν τρίβε δι' ὅλης τῆς ἡμέρας, εἰς ἑσπέραν δὲ ἐπιχέας ὕδωρ θερμὸν ἔασον· καὶ πρωῒ ἀπηθήσας

ἄλλο

ἄλλο ἐπίχει καὶ ἀπίθει τῆς ἡμέρας τείς. τοῦτο ποίει ἐπὶ ἡμέρας ζ. εἶτα μίξας τῇ μνᾷ τῆς λιθαργύρου ἀλῶν ὀρυκτῶν < ἑ. θερμόν τι παρασχέων, λέαινε τεὶς τῆς ἡμέρας ἀπιθῶν καὶ μιγνὶς ὕδωρ. ὅταν δὲ λευκὴ γένηται θερμὸν ἐπίχεων, τὸ αὐτὸ ποίει ἄχρις αὖ μηδεμιᾶς ἔμφασιν ἀλυκότητος ἔχει. καὶ ξηράνας ὀξυτάτῳ ἁλίῳ, παρεκβάλλων τῷ ἱκμάδι ἀποτίθεσο. εἰ δὲ μὴ, μιᾶ μίαν λαβὼν τῆς ἀργυρίτιδος, λέανον ἐπιμελῶς. καὶ τείψας μίξον ἁλῶν τειπλάσιον, λείων, ὀρυκτῶν, καὶ βάλλε εἰς χανλιὼ χύτραν ἐπίχεας τὸ ὕδωρ, ὥς τε ὑπερέχειν αὐτὸ, κίνει ἐκάστης ἡμέρας πρωῒ καὶ δείλης προστιθεὶς ὕδωρ, μηδὲν τοῦ πρώτου ἀποχέων. καὶ ποίει τοῦτο ἐπὶ ἡμέρας λ'. μὴ κινουμένου δὲ ἀποφρυκοῦται. μετὰ δὲ ταῦτα ἀποχέας πρωΐας τῷ δηλίῳ ἐν θηβαϊκῇ θυΐα, τῷ λιθάργυρον λέαινε, καὶ βαλὼν αὐτῷ εἰς κεραμεᾶν ἀγγεῖον, ἐπίχεας τὸ ὕδωρ, κίνει τῇς χερσὶν ἐπιμελῶς, ἀποχέων τὸ πρῶτον καὶ ἐπίχεων τὸ ἕτερον, ἄχρις αὖ μηδεμίαν ἔμφασιν λευκότητος ἔχῃ. εἶτα ἀποχέας τὸ λευκὸν ἐκ λιθαργύρου εἰς δηλῷ ἀγγεῖον, ἀνάπλαττε προχύτοις καὶ ἀπόθου εἰς μολιβδίνην πυξίδα. οἱ δὲ καταθραύσαντες εἰς μεγέθη κυάμων τὴν λιθάργυρον, καὶ

alia infunditur, atq; ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet: postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaque calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cúmq; inalbuerit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus salsedinē resipiat. Demum ardentissimo sole siccata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum coniicitur, aqua infunditur, itavt superemineat: mouetur quotidie mane & vesperi, aquáque superinfunditur, priore nequaquam effusa. Hoc fit triginta diebus: nanq; nisi moueatur, crassescit, vsque in duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectáq; in fictile aquā continens, manibus diligenter agitatur, mutata subinde aqua donec nullū salsuginis indiciū præbeat. Deinde quod ex argēti spuma candidum apparet, in vas aliud trāsfertur, & redactū in pastillos, plūbea pyxide cōditur. Alij spumā argenti in fabarū magnitudines confractā,

in ventre ſuillo crudo ex aqua coquunt, dú viſcus eliqueſcens contabeſcat, exemptámq; cum ſale pari terunt, & vt ſuprà dictum eſt lauant. Sunt qui ſalis libram vnam, & ſpumæ argenti tantundem, in ſole terant, aqua continuè mutata, dú candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantam vis argenti ſpumam: vbi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentiũ repurgatarúmq; decoquito. Cumq; fabæ diſruptę dehiſcent, lanáq; non denigretur, exemptam argenti ſpumã, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens: eadé tertio, quę ſuprà, facito: in ſumma, tãtiſper, dũ lana iam non inficiatur. Inſuper trãsfundés in mortarium, ad ſingulas ſalis foſſitij libras, adiicito octogenas ſpumæ argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensque, nitri quamalbiſſimi cũ aqua diluti drachmas quadraginta ſeptem indito: iterum terito, donec ſatis candoris cótraxiſſe videatur. Ita autẽ fundens eã ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, vbi conſiderе deſierit, colato: tum nouam ſuper

καὶ βαλόντες εἰς χύρειον κοιλίας ὠμοῦ ἕλοιον ἐν ὕδατι, ἄχρις αὖ ταπερωθῇ τὸ πλάσχρον, εἶτα ἐξελόντες καὶ μηδ' ὅσον ἁλῶν τείψαντες, πλυύοισιν ὡς πρόσθεν εἰρηται. ἔνιοι δὲ ἁλῶν λίτραν μίαν καὶ λιθαργύρου τοσοῦτον, τείθουσιν ἐν ἡλίῳ μὴ ὕδατος σωτεχῶς ὑποχέοντες ἄχρις ἂν λευκὸν γένηται. ἢ καὶ ὅταν λαβὼν τῆς λιθαργύρου ὅσον θέλῃς, καὶ εἰλήσας ἐείοις λευκοῖς, καὶ θεὶς εἰς καρχαμέαν χύτραν χαυλιῶ, ὑπόδυσ τε ὕδωρ καὶ κυάμων καθαρῶν καὶ νέων δράκα μίαν ἕψε. ὅταν δὲ οἱ κύαμοι διαῤῥαγῶσι, τότ' ἔριον λευανθὲν ἐξελῶν πλὴν λιθάργυρον καὶ ἕτερον εἰλήσας ἐείῳ, ὡσαύτερον ἕψε, κύαμον ὑπόδυσ ὕδατος, κυάμων τὸ τὸ ἴσον πλῆθος, καὶ τὰ αὐτὰ πλεῖ τοῖς πρόσθεν ὠμοῖς ὡσαύτου· καὶ καθόλου ἕως τὸ ἔριον μηκέτι βάπτηται. καὶ τὸ λοιπὸν καταῤῥάσας εἰς δύϊαν πρὸς < π'. ἀττικὰς λιθαργύρου, μίξον ἁλὸς ὀρυκτοῦ λίτραν ἀ. καὶ λέαινε. διαλιπών τε ὑπόδυ νίτρου παύλου κατάτου διειλημμένα μὴ ὕδατος ὁλκὰς μζ'. καὶ πάλιν τείβε ἄχρις ἂν ἡ λιθάργυρος ἱκανῶς λευκὴ γένηται. οὕτω δὲ * καταντλήσας αὐτὸ εἰς καρχαμεοῦν πλατύστομον ἀγγεῖον, καὶ προσπηχὰς διαυλὲς ὕδωρ, ἐάσας τε καταστῆναι, τὸ μὲν ἀπόθεσον· ἕτερον δὲ ἐπι-

ὑπηδοῦς ὕδωρ καὶ τῆς χερσὶν ἀναταράξας, πάλιν ἐάσας καταστῆναι ἀπύθμενον. ἐναλλὰξ δὲ τοῖς προειρημένοις ποίει, ἕως ἂν καθαρὸν ἄγαν τὸ ἀποῤῥέον ὕδωρ, καὶ γλυκὺ καὶ ἀλυκότητος ἀμέτοχον γένηται. ὅπ πᾶσι δὲ καταῤῥάσας αὐτῇ εἰς λοπάδα κεραμέαν καινὴν, ἀπηθμένου παντὸς περάτος τῷ ὑγρῷ, θὲς ἐν ἡλίῳ ἡμέρας μ'. ἔπειτα κώα, καὶ ξηράνας χρῶ. δοκεῖ δὲ ἡ παλυνθὴν ἀρμόζειν εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, καὶ οὐλὰς ἀφαιρεῖς, καὶ ἐῤῥακωμένα περάτα· καὶ πίλων ἔμπλεα.

Περὶ Ψιμμυθίου. Κεφ. ργ'.

Ψιμμύθιον δὲ γίνεται ὧδε· εἰς πιθάκνιον πλατύστομον ἢ εἰς κεραμέαν γάστραν, ἐξ ἧς ἀριμύτατον ὄξος, ἀπέρειστον μολιβδίνιον πλίνθιον ἐπὶ τὸ στόμα τῆς κεραμέας, περιπεπαμμένα καλαμίνα ψιαθία· ἄνωθέν τε αὐτὰ ἐπήρτηται σκεπάσματα πρὸς τὸ μὴ διαπνεῖσθαι τὸ ὄξος, ὡσαν διαλυθῇ, καὶ συγκαταῤῥυεῖσα διαπέσῃ, καὶ τὸ μὲν ἐπιπολαιότερον καὶ καθαρὸν ὑγρὸν ἀπόθες, τὸ δὲ γλοιῶδες εἰς ἀγγεῖον ἐγχυτέον· καὶ ξηραντέον ἐν ἡλίῳ, εἶτα ἀλεστέον ἐν χειρομύλῃ, ἢ λεαντέον ἄλλως καὶ σητέον· καὶ κατὰ ταῦτα λοιπὸν τῷ σεριδίου λεπτοποιητέον, καὶ σητέον ἐναλλάξ τε τὰ αὐτὰ καὶ τρίτον καὶ τέταρτον ποιητέον. ἄμεινον

superadiiciés aquam, manibus probè versatam, finito vt consîdat, ac rursus per collum traiicito. Alternis eadé prosequere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullâ salsedinè præ se ferat. Postremò in fictile nouú trâslatam, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub caniculæ sydus exponito, & siccata vtitor. Elotâ autem constat ad oculorú collyria pdesse, & ad cicatricú fœditates tollédas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratásque, & macularum plenas.

Ceruſa. Cap. CIII.

Ceruſa fit hoc modo: Infuso in vrceum oris lati, aut fictile labellum quamacerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculú, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectísque velaminibus, ne halitum expiret acetú, vbi resoluta fuerit, defluénsque deciderit, humorem purú ad summa delatum colato, crassamétúmq; trâsfundito: debet quoque siccari in sole, mox trusatili mola teri, aut aliâs tritú cribrari. Postea quod supereſt duri, in tenues partes redigendú, cribrandúmque: vicisim eadem tertio quartoq; facienda.

Melior,

Melior, quę primò cribrata est, & medicamẽtis oculorum assumenda. Secúdum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes, in medio vase appendant, & deraso ceu situ impositó, ita vt acetum non contingat, inditóque operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem, laxato obturamẽto visunt: cúmque resoluta materia fuerit, reliqua, vt suprà diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos velit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Æstate tamen supradictũ opus obeundum est: ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, vrceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putát Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico, tritam cerusam imponito, & assiduè versato, cúmque cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & vti or. Est & aliud vrendi genus:

Trita

ἄμεινον δὲ ὅτι τὸ πρῶτον ἀποσπόδιν, ὃ καὶ εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς παραλαμβάνομεν δυνάμεις. δευτερεύει δὲ τὸ ἐχόμενον, καὶ κατὰ τάξιν τὰ λοιπά. τινὲς δὲ κατὰ μέσον τὸ ἀγγεῖον καταρείσαντες τὸ ῥίπτον ὀπισθίασιν ὡς μικρὸν χαύειν τὸ ὄξους, τὸ δὲ στόμα ἀυτῆ πωμάσαντες καὶ ἐπιχρίσαντες ἐῶσι. καὶ δι' ἡμερῶν ἀφαιρούμενοι τὸ πῶμα ἐπισκοποῦνται. ὅ τι δὲ διαλυθῇ, τὰ λοιπὰ ποιοῦσιν ὁμοίως τοῖς προειρημένοις. εἰ δὲ ἀναπλάσαι τις αὐτὸ ἐθέλει, ὀξεῖ δριμεῖ φυραστέον, καὶ ξηραντέον ἐν ἡλίῳ θέρους μέν τοι ἐργαστέον τὰ προειρημένα. ὅταν δὲ λευκὸν καὶ σύρῃς γίνεται. σκευάζεται δὲ καὶ χειμῶνος τῶν παλαιῶν καμάνων ἐπάνω ἵππων ἢ βαλανείων ἢ καμίνων πλησμόνων. ἢ δὲ αὔωσιν φερομένων θερμασία τὸ αὐτὸ δρᾷ τῷ ἡλίῳ. κάλλιστον δὲ ὑγιαίνειν τὸ ἐν ῥόδῳ σκευασθὲν, ἢ ἐν κοτύλῃ, ἢ ἐν λακεδαίμονι, δευτερεύει δὲ τὸ ἐν δικαιαρχίας. ὀπτᾶσθαι δὲ αὐτὸ τὸν τρόπον τοῦτον· ἐπ' ἀνθράκων πεπυρωμένων θεὶς ὄστρακον καινὸν καὶ μάλιστα ἀττικὸν, ἔμπλασσον λεῖον τὸ ψιμμύθιον, καὶ κίνει συνεχῶς, ὅταν δὲ τῇ χρόᾳ ἐναπογεύσῃ γλύπται, ἀνελόμενος ψύχε καὶ χρῶ. κιννάβαρι δὲ θέλων εἰς κοίλλιν λοπάδα λεῖον ἀπόδος,

ὀπισθεν

ἐπιθεῖς τε ὀπὶ τὸν ἄνθρακας, νάρθηκι κίνει ἕως ἂν τῷ χρόᾳ ἐοικὸς σανδαράχῃ γένηται· καὶ ἀνελόμενος χρῶ. τὸ δὲ ἔτος σκευαζόμενον, σανδὺξ ὑπό τινων λέγεται. πλύνεται δὲ τὸ ψιμμύθιον ὁμοίως τῇ καδμείᾳ. δύναμιν δὲ ἔχει ψυκτικὴν, ἐμπλαστικὴν, μαλακτικὴν, πληρωτικὴν, λεπτυντικήν· ἔτι τε φλεγμονὰς καταστελτικὴν ὑποχλόην, καὶ καταπλωτικήν. μιγνυμένου κηρωτοῖς καὶ λιπαρέσιν ἐμπλάστροις, καὶ προσχύσεσι· ἔστι δὲ καὶ τῶν ἀναιρετικῶν.

Περὶ Χρυσοκόλλης. Κεφ. ρλ'.

Χρυσοκόλλα δὲ διαφέρει ἡ ἀρμενιακὴ, τῇ χρόᾳ κατακόρως φοινίζουσα. δεύτερος δὲ ὁ μακεδονικὸς, εἶτα ἡ κυπρία, καὶ τούτων τῷ καθαρῷ χρηστέον· ἧττον δὲ γῆς καὶ λίθων ἔμπλεων ἀποδοκιμαστέον. πλυτέον δὲ φρυγομένην ὅπως κόλλας αὐτῷ ἔμβαλε εἰς δυίαν, καὶ ὀπιχέας ὕδωρ τείβε πλατείᾳ τῇ χειρὶ φοδὶ τῷ ἴγδιν ὑντίνως, εἶτα ἐάσας ἀποκαταζῆναι, ἀπόθεσον. καὶ ἔτερον ὀπιχέας ὕδωρ πάλιν τείβε· ταῦτα δὲ ποίει ἐναλλὰξ, ἕως καθαρὸν καὶ εἰλικρινὲς γένηται. λοιπὸν ξηράνας ἐν ἡλίῳ, ἀποτίθεσο, καὶ χρῶ. ἐὰν δὲ καῦσαι θέλῃς κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον, λεάνας αὐτὸ τὸ αὐταρκες, ὀπόθες εἰς τήγανον, καὶ ἀπόδου ἐπ' ἀνθράκων, καὶ

Trita patinis nouis supra prunas imponit, & ferulacea rude mouet, donec colore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad vsus ministratur. Quæ verò ita parata est, sandyx à quibusdã dicit. Lauat ceruſa cadmiæ modo. Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuare q; insup excrescentia leniter reprimere, & ad cicatricẽ pducere. Miscet ceratis, & emplastris, q̃ liparæ vocant, pastillisque: est autẽ letalis eius potus.

Chrysocolla. Cap. CIIII.

Chrysocolla laudatissima Armeniaca, colorem porri quãsimillimè reddens. Secundum locum sibi vendicat Macedonica, & proximnm Cypria, quo in genere præfertur pura: damnatur, quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam vehemẽter fricato, & statim quàm consederit, colato. Alterã infundens aquã, rursum terito: hæc vicissim prosequere: donec pura syncerãque spectetur. Dein ficcato in sole, et ad vsus recõdito. Quòd si vrere volueris, ex ea terens quod satis esse videbitur, patinis supra carbones adponito, & alia

& alia facito quæ ſuprà diximus. Dos chryſocollæ ad purgandas cicatrices: excreſcentem carnem coercet: adſtringit, purgat, excalfacit, & modicè corpus mordendo exeſt. Inter medicaméta intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre poſſunt.

Lapis armeni⁹. Cap. CV.

Armenius lapis præfertur lęuis, colore cœruleo, perquàm æquabilis, calculo carés, & friabilis. Eadem quæ chryſocolla præſtat, ſed inefficacius. Quinetiam vſum habet ad pilos in palpebris alendos.

Cœruleus. Cap. CVI.

COERVLEI origo ex ærariis metallis in Cypro: copioſior ex arena littorali: ſecundum quoſdam ſub cauatos ſpecus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt calcitis, lauatur vt cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem: cruſtas gignit, & exulcerat.

Indicum. Cap. CVII.

Indici duo genera, vnum ſua ſpóte naſcit, tanquá ſpuma, germinatione Indicis arúdinibus exiés. Alterũ infectoriç dát officinæ: & eſt ſpuma purpurea innatans

καὶ τὰ ἄλλα ποιεῖ ὡς προείρηται ἐπὶ τῶν ἀπὸ χρυσοκόλλης. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ χρυσόκολλα σμηκτικὴν οὐλῶν, καταπλαστικὴν σαρκωμάτων, καὶ ἀνακαθαρτικὴν, συμπικνόν τε καὶ θερμαντικὴν, σπληρικὴν δὲ προέως μὴ τὸ ἐπὶ πολὺ διδοῦσα. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἔμετον κινούντων καὶ ἀναιρεῖν δυναμένων.

Περὶ Ἀρμενίου λίθου. Κεφ. ρε'.

Ἀρμένιον δὲ προσκριτέον τὸ λεῖον καὶ τὸ χρῶμα κυάνεον, ὁμαλόν τε ἅμα καὶ ἄλιπον, εὐθρυπτες. τὰ αὐτὰ ποιεῖ τῇ χρυσοκόλλῃ, σβεστικὴν εὐτονίαν μόνον λειπόμενον αὐτῆς. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐν βλεφάροις τοὺς τριχῶν αὐξητικόν.

Περὶ Κυανοῦ. Κεφ. ρς'.

Κυανὸς δὲ γίνεται ἐν τῇ κύπρῳ ἐπὶ τῶ χαλκουργῶν μετάλλων· ὁ δὲ πλείων ἐν τῆς αἰγιαλίτιδος ἄμμου εὑρισκόμενος κατά τινας ἀπηλιωτικὰς ὑποσκαφὰς τῆς θαλάσσης, ὅπερ καὶ διαφέρει. παραληπτέον δὲ τὸν σφόδρα κατακορῆ. καυστέον δὲ ὡς χαλκῖτιν, καὶ πλυτέον ὡς καδμείαν. Δύναμιν δὲ ἔχει καταπλαστικὴν καὶ μετρίως σπληρικὴν, ἐξαρωτικήν τε καὶ ἑλκωματικήν.

Περὶ ἰνδικοῦ λίθου. Κεφ. ρζ'.

Τοῦ δὲ λεγομένου ἰνδικοῦ, τὸ μὲν αὐτομάτως γίνεται, οἷονεὶ ἔκβασμα ὂν τῶν ἰνδικῶν καλάμων, τὸ δὲ βαφικὸν ὄζει ἐπιθυμιὸς περφυρᾶς ἐπιωρύμενος

ἐπαιωρεύμενος τοῖς χαλκείοις, ὃν ἅπαντες ἔχοντες ξηραίνουσιν οἱ τεχνῖται. ἄριστον δὲ ἡγητέον εἶναι τὸ κυανοειδές τε καὶ ἔγχυλον, λεῖον. ἔστι δὲ τῶν συφόντων ἐλαφρῶς καὶ ῥωστόντων φλεγμονὰς καὶ οἰδήματα· ἀνακαθαίρει δὲ καὶ κατασέλλει ἕλκη.

Περὶ Ὠχρας, Κεφ. ρή.

Ὠχραν δὲ λιπαρὸν ἢ κυφοτάτην καὶ μηλίνην δόλιν. κατακοπεῖν δὲ καὶ ἄλισθον καὶ ἐυῤῥυβῆ, ἀπύρηνον δὲ τῷ ῥόῳ. χωστέον δὲ, καὶ πλυτέον καὶ ταύτην ὡς τὴν καδμείαν. δύναμιν δὲ ἔχει στ*ρ*υπτικὴν, σκεδαστικὴν φλεγμονῶν καὶ φυμάτων· κατασέλλει τε τὰ ἐπισαρκοῦντα· καὶ τὰ κοῖλα πληροῖ*σ*ωμὴ κηρωτῇ, καὶ πώροις ἐρύπτει.

Περὶ Κινναβάρεως. Κεφ. ρθ'.

Κιννάβαρι οἱόν τινες τὸν ὑπάρχειν τῷ καλυμβώπῳ* ἀμμίῳ, πλανώμενοι. τὸ μὲν γὰρ ἄμμιον σκευάζεται ἐν Ἰσπανίᾳ, ἐκ λίθου τινὸς μεμιγμένου τῇ ἀργυείπδι ψάμμῳ, ἄλλως δ' ἢ γινώσκειν. ἐν δὲ τῇ χώνῃ μεταβάλλει εἰς ὑγρὸν θέσιν καὶ φλογοειδέστατον χρῶμα· ἔχει δὲ τὴν ἀποφορὰν ἐν τοῖς μετάλλοις πνιγώδη. θεπίδενται γοῦν οἱ ὀπτῶντες τοῖς πρόσωποις φύσεις πρὸς τὸ βλέπειν μὴ ἀσφῆ δ' ἢ ἀέρα. χρῶνται δὲ αὐτῷ οἱ ζωγράφοι εἰς τὰς πολυτελεῖς τοίχων* ἐκκοσμήσεις. Τὸ

innatãs cortinis, quã detractã artifices siccant. Optimũ existimatur quod cœrulei speciem præbet, succũ suum sorbet, & læue. Inter medicamenta est q̃ læuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpũt: purgat, & reprimit vlcera.

Ochra. Cap. CVIII.

Ochrã læuissimã, & omnino luteã eligere oportet, saturatã, nõ lapidosam, friabilẽ, natione Atticã. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrescétia in carne reprimit: cauacum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Cinnabaris. Cap. CIX.

Hallucinantur qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in Hispaniis ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autẽ in florẽtissimum flagrãtissimúmq; colorẽ permutatur: in metallis verò strangulantem halitum eructat: itaq; facies incolæ vesicis obuelant, vt per illas spectent, nec respirando noxiũ aërẽ attrahant. Eo pictores ad sũptuosa parietum ornaméta vtũtur.

Cinnabaris

Cinnabaris verò ex Aphrica defertur, & magno cõstat: hacten⁹ inuenitur, vt vix versico loribus pictorũ lineis satisfaciat: intéto colore nec diluto p̃ditũ: quare quidã sanguiné esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandé: cõuenit ad oculorũ medicaméta, verùm efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. Ambustis igni, & papularũ eruptionibus cerato excepta medetur.

Argentũ viuũ. Cap. CX.

ARGENTVM viuum fit ex minio, quod abusiuè cinnabaris dicitur, patinis fictilibus, imposita ferrea cõcha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt: siquidem detersa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stagneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum vim pernicialé habet: suo enim pondere interna exest.

Remedio

σεως. Τὸ δὲ κιννάβαρι τοῦτο χωνεύεται μὲ ἀπὸ λεβύης, πυρεάσκεται δ' πολλῶ· καὶ τοσοῦτον θᾶττον ὡς μόλις ἐξαρκεῖν τοῖς ζωγράφοις εἰς τὸ ἐν ταῖς γραμμαῖς ποικιλίαν· ἔστι δ' καὶ βαρύχροον, ἢ βαθύχρουν· ὅθεν ὑπόμοιόν τινες αὐτὸ εἶναι αἵματι δράκοντος, Δυνάμιν δ' ἔχει τὸ κιννάβαρι τὸ αὐτὸ τῷ σύματι· ἢ μάλιστα εἰς ἐφθαλμικὰ, πλὴν ὑπιτετραμμένως· μᾶλλον γὰρ σύφον ᾶν καὶ ἧττον μυει, καὶ πυρίκαυτα καὶ ἐξανθήματα ἀναληφθὲν χειρωτὴ θεραπεύει.

Περὶ Ὑδραργύρου. Κεφ. ρι'.

Ὑδράργυρος δ' σκευάζε⁹ ἀπὸ τοῦ ἀμμίου λεγομένου, κατὰ χρῆσιν δὲ καὶ τούτῳ κιννάβαρέως λεγομένῳ, θέντες γὰρ ὑπὸ λοπάδος χαλκέας κόλχον σιδηρᾶν ἔχοντα κιννάβαρι, θερμαίνουσι πλῶ, εἶτα ὑποκαίουσιν ἀνθρακιᾶν· ἡ γὰρ θερμὸν οὖσα τῷ ἄμμῳ καὶ θάλπουσα ἀποζεσθεῖσα καὶ ἀποψυχθεῖσα, ὑδράργυρος γίνεται. εὐείσκε⁹ δὲ καὶ ἐν τῷ μεταλεύεσθαι τὸν ἄργυρον ἐν τῇ στέγῃ κατ' σταλαγμοὺς συναθροίζον. ἔνιοι δὲ ἰσοροῦσι καὶ καθ' ἑαυτὸ ἐν τοῖς μετάλλοις εὑρίσκεσθαι· ὑδράργυρον. φυλάττεται δὲ ἐν ὑελίναις ἢ μολιβδίναις ἢ καστιτερίναις ἢ ἀργυρέαις ἀγγείοις· πλὴν γὰρ ὕλης πᾶσαν διαβαίνει, καὶ ποιεῖ ἀποῤῥεῖν.

Δυνάμιν

Δυνάμιν δὲ ἔχει φθαρτικὴν τοῦ θείου· τῷ βάρει διαβιβρώσκουσα τὰ ἐντός. βοηθεῖται δὲ γάλακτι πολλῷ πινομένῳ καὶ ἐξεμουμένῳ, ἢ οἴνῳ σὺν ἀψινθίου, ἢ ὀρμίνου σπέρματι ἢ ὀρεγάνου, ἢ ὑσσώπου σὺν οἴνῳ.*

Remedio est lac multum subinde potum, & vomitionibus reiectum, aut vinũ cum absinthio, aut apij decoctũ, aut semen hormini, aut origanũ, vel hyssopũ cũ vino: auri limata, scobs, id est, ramẽtũ q̃ tenuissimũ epotũ mirabili est auxilio.

Πρὶ Μίλτου σινωπικῆς.

Κεφ. ριά.

Μίλτος σινωπικὴ κρατίστη ἡ πυκνὴ, καὶ βαρεῖα, ἁπαλίζουσα, λῖθος, ὁμόχροις, πολύχρους ἐν τῇ ἀγέσει. συλλέγεται δὲ ἐν τῇ καππαδοκίᾳ ἐν σπηλαίοις τισὶ, διυλίζεται δὲ καὶ φέρεται εἰς σινώπην καὶ παρεφάσκεται ὅθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχηκε. Δυνάμιν δὲ ἔχει ξηραντικὴν, ἐμπλαστικήν· διὸ καὶ ἐμπλάστροις τραυματικοῖς μίγνυται, καὶ προσχύσεσι ξηραντικοῖς καὶ στυπτικοῖς. ἴσχει δὲ καὶ κοιλίαν ἐν ὠῷ λαμβανομένη καὶ ἐγκλυζομένη· δίδοται καὶ ἡπατικοῖς.

Rubrica Sinopica.

Cap CXI.

Rubrica Sinopis maximè ꝓbatur grauis, dẽsa, ad iocineris imaginẽ vergẽs, calculorũ expers, cócolor, cũ diluit ípédio fusilis. Effoditur ĩ Cappadocia, speluncis q̃busdã, expurgataq; defert in Sinopẽ vrbẽ, ĩ qua vẽ dit: vnde cognomẽtũ accepit. Vim habet exiccatoriã, quasi inducendo obstruentẽ, & adstrictoriã: quapropter vulnerariis emplastris, & pastillis exiccãtibus, & adstrictoriis cõmisceri solet. Aluum sistit, in ouo sumpta aut clystere infusa: datur iocineris vitio laborãtib⁹.

Πρὶ Τεκτονικῆς.

Κεφ. ριβ'.

Ἡ δὲ τεκτονικὴ ἥπιον ὂν τὴν κατὰ πάντα τῆς σινωπικῆς. ἀείσει δὲ ἡ αἰγυπτιακὴ καὶ ἡ καρχηδονικὴ, λῖθος, εὐθρυβὴς. γίνεται καὶ ἐν τῇ πρὸς ἑσπέραν ἰβηρίᾳ, τῆς ὥρας καιομένης καὶ μεταβαλλούσης εἰς μίλτον.

Rubrica fabrilis.

Cap. CXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide ĩferior est. Optima Ægyptia, & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad occidẽtem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Πρὶ

Lemnia

Lemnia terra. Cap. CXIII.

Lemnia terra, cuniculoſo in ſpecu nata è Lemno inſula, paluſtri loco defertur, inibi electa, & caprino ſanguini permiſta: quam incolæ cogunt in paſtillos, et imagine capræ ſignãt: vnde & ſphragida ægos, hoc eſt, ſigillum capræ, appellauere. Vim antidoti habet contra pernicioſa venena ſingularem, pota cum vino, & præſumpta, euomi venena cogit. Contra ictus morſúsque animalium, quę exitiale virus eiaculantur, prodeſt. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad ſacrificia vtãtur: eſt & dyſenteriæ vtilis.

Atramentum ſutorium. Cap. CXIIII.

Atramentum ſutorium genere quidem vnum & idem eſt, molle & concretum: ſed in ſpecie differentias treis habet. Vnum nanque humoribus ſtillatim in cuniculos quoſdã collatis, concreſcit: quare ab iis qui Cypria metalla perficiunt, ſtillatitium appellatur. Peteeſius ipſum pinarion vocat: alij ſtalacticon, id eſt, ſtillatitium. Alterum ſimplici ratione fit in ſpeluncis: poſtea transfuſum in excauatos ſcrobes, cõcrementum

Πρὶ Λημνίας γῆς. Κεφ. ριγ'.

Ἡ δὲ λημνία γινωμένη γῆ, ἔστιν ἐκ τινος ὑπονόμου ἀνῳρυγμένη, ἀναφερομένη ἀπὸ λήμνης τῆς νήσου, ἐχούσης ἐλώδη τόπον, καὶ κεῖθεν ἐκλέγεται καὶ μίγνυται αἵματι αἰγείῳ· ᾧ οἱ ἐκεῖ ἄνθρωποι ἀναπλάττοντες καὶ σφραγίζοντες εἰκόνι αἰγός, σφραγίδα καλοῦσιν αἰγός. Δύναμιν δ' ἔχει ἀντίδοτον θανασίμων φαρμάκων ἔξοχον, πομένη σὺν οἴνῳ, καὶ προληφθεῖσα ἐξεμεῖσθαι ἀναγκάζει τὰ θηλυτήρια. ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς τὰς τῶν θανασίμων ἰοβόλων πλησὶς καὶ δήξεις. μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις. χρῶνται δέ τινες καὶ εἰς τελετὰς αὐτῆ· ἔστι δὲ καὶ δυσεντερείας χρήσιμος.

Πρὶ Χαλκάνθου. Κεφ. ριδ'.

Χάλκανθον τῶν μὲν ὀρύσσει ἐν καὶ ταυτὸν ὑπάρχει, ὑγρὸν γάρ ὅτι, πεπηγός· εἰ δὲ λιχὰς δὲ ἔχει διαφορὰς τρεῖς. τὸ μὲν, τὸ κατὰ σταλαγμὸν διϊσταμένων ὑγρῶν εἰς τινας ὑπονόμους συνίσταται· ὅθεν καὶ σταλακτὶς καλεῖται ὑπὸ τῶν τὰ κυπρικὰ μέταλλα ἐργαζομένων. Πετησίος δὲ αὐτὸ καλεῖ πινάριον· οἱ δὲ, σταλακτικὸν, πικτὸν, ἐφθὸν, ἀρακτὸν, λογχωτόν. τὸ δὲ ἁπλῶς ἐργαζόμενον ἐν παλαιοῖς ἔσται μεταχθόμενον εἰς βόθρους,

πλὴ

τὸ πῆξιν λαμβάνον... ὃ δὴ καὶ πηκτὸν ἰδίως ὀνομάζεται. τὸ δὲ τρίτον καλεῖται μὲν ἑφθὸν, σκευάζεται δὲ ἐν Ἰσπανίᾳ· σκευὴν δὲ ἔχει τοιαύτην* ἄχρηστόν τι καὶ ἀσθενέστατον ὑπάρχον. ὕδατι δεύσαντες αὐτὸ ἕψουσιν, εἶτα εἰς τὰς δεξαμενὰς καταῤῥάσαντες, ἐῶσι. τοῦτο δὴ πήγνυται τεταγμέναις ἡμέραις, εἰς πολλὰ διαιρούμενον κυβοειδῆ σχήματα, βοτρυδὸν ἀλλήλοις* προσεχόμενα. ἄριστον δ' αὐτοῦ ἡγητέον τὸ κυάνεον καὶ βαρὺ, πηκτόν τε καὶ διαυγές· οἷόν ἐστι τὸ σταλακτὸν, ὑπ' ἄλλων δὲ λογχωτὸν καλούμενον. ἐχόμενον δὲ τὸ * πηκτόν. τὸ δὲ ἑφθὸν πρὸς μὲν βαφὰς καὶ μελάσματα ἐπιτηδειότερον τῶν ἄλλων δοκεῖ εἶναι· πρὸς δὲ ἰατρικὴν, ἀσθενέστερον ἡ πεῖρα δείκνυσι. Δύναται δὲ στύφειν, θερμαίνειν, ἐσχαροῦν· ἕλμινθας πλατείας ἀναιρεῖν < α. βάρος καταπινόμενον, ἢ μετὰ μέλιτος ἐκλειχόμενον· ἐμέτους τε κινεῖ καὶ μύκητας λαβοῦσι βοηθεῖ σὺν ὕδατι ποθέν· κεφαλήν τε καθαίρει ἐντεῦθεν ὕδατι καὶ δι' ἐρίου ῥινεγχυτούμενον. καίεται δὲ ὡς ὑποδείξομεν αὐτίκα ἐπὶ τῆς χαλκίτεως.

Περὶ Χαλκίτεως. Κεφ. ριε.

Χαλκῖτιν προκριτέον τὴν χαλκοειδῆ καὶ εὔθρυπτον, ἄλιθόν τε καὶ οὐ παλαιὰν, ἔτι δὲ τὰς ἶνας ἐπιμήκεις

cõcrementũ capeſsit, quod pecton, id eſt cõcretitiũ, propriè nominaẽ. Tertiũ dicitur coctile, & in Hiſpania fieri ſolet: ſed inutile ac iualidiſsimũ eſſe cõſtat. Ratio parãdi hęc eſt: Aqua madefactũ decoquũt, mox in piſcinas trãsfundũt, & reſidere patiũtur. Hoc certis dieb⁹ coaleſcit, in complureis formulas digeſtũ, teſſerarũ ſpeciẽ reddẽtes, quæ racematim inter ſe cõhæreſcunt. Optimũ eſſe creditur, cœruleũ, graue, cõcretum, trãſlucẽs: cuiuſmodi ſtillatitiũ eſt, ab aliis lóchoton nominatum. Proximũ, cõcretitiũ. Coctile verò ad infectus & denigrationes, apti⁹ cæteris eſſe cõpertũ eſt: ſed ad medicinæ vſũ inualidius eſſe, experimẽta docẽt. Valet adſtringere, calfacere, & cruſtas inducere: latas vẽtris tineas necat, drachmæ põdere deuoratũ, aut cum melle linctũ: vomit⁹ ciet: aduerſ⁹ hauſta fungorum venena, ex aqua potũ auxiliatur: purgat caput, aqua dilutũ, & in vellere naribus inſtillatũ. Vritur, vt paulò poſt in mẽtiõe chalcitis oſtẽdemus.

Chalcitis. Cap. CXV.

Chalcitis præfertur ſimilis æri, friabilis, nec lapidoſa, nec inueterata, intercurſantibus

 oblõgis

oblongis venis, splédentibúsq;. Huic absterſoria vis est, excalfaciés, & cruſtas vlcerib⁹ obdu cens: purgat q̄ oculis & eorūdem angulis hærét. In genere leuiter exedétium est. Ad ignē ſacrū, & vlcera quæ ſerpūt, effi cax est. Sāguiné è vulua, & narib⁹ erūpenté, cum ſucco porri ſiſtit: gingiuarū vitia, depaſcétia vlcera, tōſillásq;, eius farina cōpeſcit. Vſta, & cum melle tri ta, oculorū medicamentis lōgè vtilior redditur. Callum genarum, & ſcabritiē abſumit, abſtergétque. Fiſtulas tollit, collyrij modo in eas adacta.

Pſoricum. Cap. CXVI.

Fit ex calcite medicamétum quod pſoricon vocāt, duabus eius partibus, cū vna Cadmiæ additis, et ex aceto tritis. Oportet autem in fictili obruere fimo, dieb⁹ quadraginta, p caniculæ ardores: ſic enim fit acri⁹. Idē quod chalcitis poteſt. Alij pares vtriuſq; portiones in vino terūt, & eadē pſequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonib⁹ ſuperpoſito. Modus aūt vſtionis in humidioribus est, dum ipſa chalcitis bullas excitare deſierit, & pfectè inaruerit: in reliquis verò, dum mutata ī floridū coloré fuerit, &

ὀπμώκεις καὶ ἀποσηβούσας ἔχουσαν. Δυνάμιν δὲ ἔχει * συπτικήν τε καὶ θερμαντικὴν, καὶ ἐκφρωτικὴν· ἀπογλαρτικὴν τ' ἐπὶ καυθοὶς ϗ ὄμματα. ἔστι δὲ ϗ τῶν μετρίως * συφόντων. πιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα, ἕρπητας. αἱμορραγίας τε ἐξ ὑστέρας ϗ μυκτήρων σὺν ῥοδίνῳ χυλῷ· ξηρὸν δὲ πρός τε ἐπουλίδας καὶ νομὰς καὶ παρείθματα. κοκκυμήνη δὲ πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ μᾶλλον χρησιμεύει λεῖα σὺν μέλιτι. τετυλωμένα μὴ βλέφαρα καὶ τραχέα ἀποτήκει καὶ σμήχει. σύεγγυς δὲ ἄγει ἐν κολλυρίου χύματι ἐπιθεμένη.

Περὶ Ψωρικοῦ. Κεφ. μς'.

Σκευάζεται δὲ ἐξ αὐτοῦ τὸ καλούμενον ψωρικὸν. διπλασίονος χαλκίτεως πρὸς ἁπλοῦν καδμείας μιγνυμένης, ϗ σὺν ὄξει λειοτριβούμενα· δεῖ δὲ ἐν καρεμίῳ ἀδηρίῳ κατορύσσειν ἐν κοιλίᾳ ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασιν ἡμέρας μ'. γίνεται δὲ ἀριμύτερον. διαφέρουσι δὲ ὅσα ϗ ἡ χαλκῖτις. ἔνιοι δὲ ἴσα μίξαντες οἴνῳ λειαίνουσι καὶ τὰ αὐτὰ ποιοῦσι. χωνεύεται δὲ αὐτὸ ἐν ὀστράκῳ καινῷ ἐπιθέντας, ϗ διαπύροις ἄνθραξιν ἀφεψομένους. μέλλον δὲ ἕστως τὸ καύσεως, ὁπόταν μὴ τὸ πολύχρων τὸ ἀπομφολύγωτον καὶ καλῶς ξηρὸν ᾖ δέσθαι· ὁπόταν δὲ τῶν λοιπῶν ἢ ὁπόταν τὸ ἐναντίστερον μεταβολὴ,

ὅταν

ὅταν δὲ μιλτώδης γένηται τῇ χρόᾳ κτ' βάθος, ἀναιρετέον αὐτῇ. τῇ δὲ σποδιᾷ μόλιβδος ἀκαθαρσίαν ἀποφυσητέον καὶ ἀποδοτέον. ὑπῆται δὲ ἐπ' ἀνθράκων ἐμφυσωμένων, μέχρι τοῦ ὑποχρόου αὐτῇ γένηται· ἢ ἐπ' ὀράκια καὶ διαπύρων ἀνθράκων σφαιρωμένη πυκνῶς, ἕως ἂν πυρωθῇ καὶ μεταβάλλῃ τὴν χρόαν.

Περὶ Μίσυος. Κεφ. ριζ'.

Μίσυ δὲ παραληπτέον τὸ χρύσιον, χρυσοφανές, σκληρὸν, καὶ ἐν τῷ θραυσθῆναι χρυσίζον, καὶ ἀποστίλβον ἀστεροειδῶς. Δυνάμιν δὲ ἔχει καὶ καῦσιν ἡ αὐτῇ τῇ χαλκίτιδι, διὰ τῆς τοῦ ψευσὶ κατασκευῆς· ἐν τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον διαφέρον. τὸ δὲ αἰγύπτιον, πρὸς μὲν τὰ ὄμματα διαφέρει ἐμπλαστικώτερον ὄν, πρὸς δὲ τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις, πολλῷ λείπεται τοῦ σφοδρυμένου.

Περὶ Μελαντηρίας. Κεφ. ριή.

Τῆς δὲ μελαντηρίας, ἡ μὲν τις τοῖς τῶν ὀρυγμάτων σωμίοις ἀφ' ὧν ἂν μεταλλευθῇ ὁ χαλκὸς ὑπάρχει· ἀλμυρίδος τρόπον. ἡ δὲ, ἐν τῷ αὐθαδεστάτῳ ὑπαφανείας τῶν σφοδρυμένων τόπων, ἥ τις καὶ γαώδης ἐστίν. εὑρίσκεται δέ τις καὶ ὀρυκτὴ ἐν κιλικίᾳ καὶ ἐν ἄλλοις ποὶ τόποις. διαφέρει δ' αὐτῶν ἡ θειοχρυσολείᾳ, ὁμαλὴ, καθαρὰ, καὶ ἐν τῷ δίγειν ὕδατος μιλανομένη ταχέως.

Δυνάμιν

& sanguineũ aut miniatũ colorem cõtraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiánum perflatis carbonib⁹, vsquedum luteo colore pallescat: aut ficti li subditis candentibus prunis subinde versata, donec igni cõ flagret, & colorem mutet.

Misy. Cap. CXVII.

Misy assumendũ natiõe Cyprium, auri simile, durũ quod friádo auri coloré imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vstionẽ cum chalcitide eandẽ, præterquã q⁹ psoricũ ex eo non cõficitur, excessus defectusq; ratiõe tantũ differés. Ægyptium autem cæteris præstat, vtpote qđ efficaci⁹ habeatur, sed ad ocularia medicamẽta multò supradicto inferius.

Meláteria. Cap. CXVIII.

Meláteria geminæ est originis: quædã in faueibus cuniculorũ q⁹ æs eruit, salis modo cõcrescit. Alia verò in sũma facie supradictorũ locorũ coit, q̃ terrena est. Quinetiã inuenitur in Cicilia, & aliis quibusdã regionibus, fossilis quędam. Præstat, quæ sulphuris coloré trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ cõtactu aquæ cõfestim nigrescit,

Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

Sory. Cap. CXIX.

Sory existimarũt aliqui melanteriã esse, aberrãtes, siquidẽ sui generis est sory, ei nõ absimile: verũ sorëi virus inest graue, & nauseã mouẽs. Inuenitur etiã in Ægypto, & aliis quibusdã regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Præfert Ægyptiũ, quodq; friãti nigrius apparet, ĩ multa foramina dehiscẽs, suppingue, insuper adstringẽs, & olfactu deuorationeq; magnũ virus olẽs, ita vt stomach⁹ in vomitiones effundat. Quod autem friatũ scintillas misyos modo nõ emittit, & alteri⁹ generis esse, & inualidũ cẽsendũ est. Vim & vstionẽ supradictis similẽ habet: dolori dentiũ, cauernis inditũ medetur, eósque labãtes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitũ cũ aqua, varos extinguit. Medicamẽtis admiscetur, quæ capillos denigrãt. Hæc aũt ferè omnia, & alia quæ vstionẽ experta nõ sunt, perustis validiora esse existimantur: prȩter salem, & vini fæcem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Combusta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges.

Δύναμιν δὲ ἔχει καυστικὴν τὴν αὐτὴν τῷ μίσυϊ.

Περὶ Σώρεως. Κεφ. ριθʹ.

Τὸ δὲ σῶρυ ἔνιοι ὑπέλαβον μελαντηρίαν πλανώμενοι, ἴδιον γάρ ἐστι γένος, οὐκ ἀφόμοιον· βρομωδέστερον δὲ τὸ σῶρυ καὶ ναυτίας ποιητικόν. εὑρίσκεται δὲ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ τόποις, ὡς ἐν Λιβύῃ καὶ Ἰσπανίᾳ καὶ Κύπρῳ. προκριτέον δὲ τὸ Αἰγύπτιον, καὶ ἐν τῷ θραυσθῆναι μελάντερον φαινόμενον, κατατετρήσεις τε πολλὰς ἔχον, καὶ ὑπολίπαρον, ἔτι δὲ στῦφον, καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν καὶ ὄσφρησιν βρομῶδες καὶ ἀναστρεπτικὸν στομάχου. τὸ δὲ μὴ λαμπυρίζον ἐν τῷ θραυσθῆναι ἐμφερῶς μίσυϊ, ἑτερογενές τι καὶ ἀσθενὲς οἰητέον εἶναι. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ καῦσιν τὴν αὐτὴν τοῖς προειρημένοις· ἰᾶται δὲ καὶ ὀδονταλγίας ἐντιθέμενον εἰς τὰ βρώματα, καὶ τοὺς ὑποσείοντας δὲ ὀδόντας κρατύνει· καὶ ἰσχιαδικοῖς βοηθεῖ μετ' οἴνου ἐγκλυζόμενον· ἴονθους τε σβέννυσι μεθ' ὕδατος καταχρισθέν. μίγνυται καὶ εἰς τριχῶν μελάσματα. κοινῷ δὲ τρόπῳ ἐπὶ τούτων σχεδὸν καὶ τῶν ἄλλων πάντων δυναμικώτερα τὰ ἄκαυστα τῶν κεκαυμένων ἡγητέον· πλὴν ἁλῶν καὶ τρυγὸς, καὶ νίτρου καὶ τιτάνου καὶ τῶν ὁμοίων, ὅσα ὠμὰ ὄντα ἀνίεται. καιόμενα γὰρ τὴν δύναμιν ἐμπρακτότερα γίνεται.

Περὶ

Περὶ Διφρυγοῦς. Κεφ. ρκ´.

Τοῦ δὲ διφρυγοῦς τρία ἡγητέον εἴδη. τὸ μὲν γὰρ μεταλλικόν ἐστιν, ὃ δὴ ἐν κύπρῳ μόνῃ γίνεται· πηλῶδες γὰρ ὂν ἀναφέρεται ἐκ βυθοῦ τινὸς τῶν ἐκεῖ τόπων* εἶτα ἀνενεχθὲν ξηραίνεται ἐν ἡλίῳ καὶ μετὰ ταῦτα φρυγάνοις κύκλῳ περιτεθειμένοις καίεται· ὅθεν καὶ διφρυγὲς ἐκλήθη, διὰ τὸ ὑπὸ ἡλίου καὶ τῶν φρυγάνων καίεσθαι, καὶ ξηροποιεῖσθαι, καὶ οἱονεὶ φρύγεσθαι. τὸ δὲ ἕτερον ἐστὶ τοῦ κατεργαζομένου χαλκοῦ ὥσπερ ὑποστάθμη τις καὶ τρὺξ ὑπάρχει· μετὰ γὰρ τὴν τοῦ ψυχροῦ ὕδατος περίχυσιν, ὡς ἀνωτέρω ἔφαμεν περὶ ἄνθους χαλκοῦ διαλεγόμενοι, μετὰ τὴν ἀναίρεσιν τοῦ χαλκοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ χώνῃ ἐγκείμενον τῷ πυθμένι αὐτῆς τὸ τοιοῦτον εἶδος, τήν τε στύψιν καὶ τὴν γεῦσιν χαλκοῦ ἔχον. τὸ δὲ τρίτον σκευάζεται οὕτω· λίθον τὸν λεγόμενον πυρίτην συνθέντες εἰς κάμινον οἱ πρὸς τούτοις ὄντες, καίουσιν ἐπὶ ἡμέρας ἱκανὰς τίτανον, ὅταν δὲ ἡ χρόα μιλτώδης γένηται, ἀνελόμενοι ἀποτίθενται. τινὲς δέ φασιν ἐκ μόνης τῆς τὸν χαλκοῦν λίθον ἀποτελούσης ὕλης γίνεσθαι τὸ προειρημένον· ὅταν ὀπτηθεῖσα ἐν ταῖς λεγομέναις ἅλωσιν*, ἀνενεχθῇ εἰς τοὺς βόθρους καὶ ἐνταῦθα καίηται. τόν τε γὰρ κύκλῳ τόπον τῶν βόθρων ἐπιλαμβάνει, καὶ μετὰ τὴν ἀναίρεσιν τῶν λίθων οὐδὲν ἧττον εὑρίσκεται. προ-

κριτέον

Diphryges. Cap. CXX.

Diphrygis tria genera esse. creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur: lutosum nanque extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. diphryges ideo vocatú est, quod & à sole, & à sarmentis vratur, arescat, & fermè torreatur. Alterum perfecti æris, quasi subsidens fæx est: siquidem post frigidæ aquæ offusionem, vt suprà retulimus, cum de flore æris dissereremus, sublato ære, fornacum ima parte cohærens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum æris habens. Tertium sic fit: Lapidem pyriten, vt calcem multos dies cremant in camino: cúmque colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia, quæ lapidem æris gignit fieri: quãdo in dictis arëis assata, & in scrobes trãslata peruritur. Túc enim ambienté scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidib⁹ nihilominus inuenitur.

 Pręfertur

Prefert quod saporé æris reddit, æruginisq;, adstringens, & vehemēter exiccans linguā: qđ sibi exusta ochra nō vendicat: quę cremata diphrygis vice venit. Vis eius adstringere perpurgare, extergere, siccare, excrescentia consumere, vlcera serpentia, & quę cacoēthe vocāt, ad cicatricem perducere. Suppuratiōes terebinthina aut cerato exceptum discutit.

Auripigmentū. Cap. CXXI.

Auripigmentū in eisdē metallis, quibus sandaracha gignitur. Optimū existimat crustosum, aureo colore micās, nulli materiæ permistū, in squámas fissile: quale in Mysia Hellespōti nascitur. Huius duo genera fluxerunt: Vnum supradictum est. Alterū glandis effigie, pallidū, & colore sandarachā imitans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia defertur: qđ etiā secūdum locū tenet. Torretur in testa noua viuis carbonibus subiectis, assiduoq; versāt, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratū, tritúmque recōditur. Vim habet adstrictoriā, & erodentē, crustas cum vehemēti vredine, & violēto morsu excitat: reprimit q excrescūt, & capillos euellit.

Sandaχριτέον δ' αὐτῦ τὸ τῇ γεύσει ἔγχαλκον. *ἧττον δὲ σύφον τὸ καὶ ἀναξηραῖνον ἱκανῶς τ γλῶσσαν. ὃ καὶ ἡ κεκαυμένη ὤχρα ἐκέκτηθ'. ἦν δὲ καίοντες αὐτὴ διφρυγοῦς πρεφόσκυσι. Δυώαμιν δὲ ἔχει συπτικὴν τ ἀναλαμπτικὴν ὀπτ τα μήνως, σμηκτικήν τ καὶ ξηραντικὴν καὶ καταλλικὴν ὑποσαρκώσεως, ἀπυλωτικὴν καὶ οὐθύνην καὶ ἐρπυστικῶν. διαφορεῖ καὶ ἀποσήματα ἀναλημθέν τερεβινθίνη ἢ κηρωτῇ.

Περὶ Ἀρσενικοῦ. Κεφ. ρκά.

Ἀρσενικὸν καθ' ἑαυτὸ γίνεται μέταλλα τῇ σανδαράχῃ. ἄριστον δὲ ἡγητέον τὸ φλογώδες καὶ χρυσίζον τῇ χρόᾳ, ταῖς τε πλάκας λεπιζομένας ἔχον ὡς ἀεὶ ὀπτικειμένας ἀλλήλαις· ἔστι δὲ ἀμιγὲς ἑτέρας φύσεως· τοιοῦτον δὲ ὄφι τὸ γλογώδμενον ἐν μυσίᾳ τῇ ἐν ἑλλησπόντῳ. ἔστι δ' αὐτῦ δύο εἴδη. τὸ μὲν ἓν οἷον σφαιρικόν. *τὸ δὲ ἕτερον βαλανοειδὲς καὶ ὠχροειδὲς καὶ σανδαραχίζον τῇ χρόᾳ. *ἐκ πέντε καὶ πεντήκοντα δραχμῶν φρύγομενον δευτερεύει τὸ τοιοῦτον. ὀπτᾶται δὲ ὅτως. *ἐν ὀστράκῳ καινῷ ἐσφραγισμένος αὐτὸ δὸς ἐπὶ διαπύρου ἄνθρακος καὶ στρέφε συνεχῶς, ὡς δ' ἂν πυρωθῇ καὶ μεταβάλλῃ, ψύξας καὶ λεάνας ἀποθέσο. Δυώαμιν δὲ ἔχει σηπτικὴν τ καὶ συπτικὴν καὶ ἐσχαρωτικὴν μετὰ πυρώσεως καὶ βιαίᾳ δήξεως· ἔστι δὲ καὶ τ ἀλλοίωσις, ψιλοῖ δὲ τρίχας.

Περὶ

Περὶ Σανδαράχης. Κεφ. ρλβ'.

Σανδαράχη ὑ πεπηγὸς ἢ καὶ ἀκρῶς, πυῤῥὰν, εὔθραυστον, ἰυλέαντόν τε ἢ καθαρὰν, κιννάβαρι ζουσαν τὴν χρόαν, ἔτι ὃ θειώδη ἀποφορὰν ἔχουσαν. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ὄπισθεν ἢ αὐτὴ τῷ ἀρσενικῷ· θεραπεύει ὑ ἡ λιθωπικὰς ἀναληφθεῖσα ῥητίνῃ, ἢ λεπρὰς ὄνυχας σὺν πίσσῃ ἀφίησι· ἢ πρὸς φθειριάσεις σὺν ἐλαίῳ πεπεῖ φύματά τε σὺν σταφιδαφορεῖ. ἁρμόζει δὲ ἢ πρὸς τὰ ἐν ῥισὶ καὶ στόμασιν ἕλκη, ἢ πρὸς τὰ λοιπὰ ἐξανθήματα σὺν ῥοδίνῳ· ἢ πρὸς κονδυλώματα. δίδοται ἢ ἐμπυϊκοῖς, σὺν οἰνομέλιτι. καὶ ὑποθυμιᾶται σὺν ῥητίνῃ ἢ πρὸς παλαιὰ βῆχα, διὰ σίφωνος ἑλκωμένῃ τῷ ἀτμῷ τῷ στόματι. φυλή τε ἀποκαθαίρει σκληρυνομένη σὺν μέλιτι, ἢ ἀθματικοῖς σὺν ῥητίνῃ καταπότιον δίδοται.

Sandaracha. Cap. CXXII.

Sandaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris virus redolens, Dos eadem & vstio, quæ auripigmento: explet alopecias, resina excepta, & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orísque vlcera, & cæteras pabularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, puruléta extusiétibus. Suffitur quoq; cum resina, aduersus veterem tusim, rapto per fistulam nidore: vocem expedit, cũ melle delincta susspiriosis cum resina in catapotio optimè datur.

Περὶ Στυπτηρίας. Κεφ. ρκγ'.

Στυπτηρίας δὲ χαλκῖτις εἶδος, ὅτι τῶν αὐτῶν ἐν τῇ αἰγύπτῳ μετάλλων σύεισιτεται· ἔστι δὲ χαλκὸς οἱονεὶ τῆς βωλίτιδος ἄνθος. χρυσᾶται δὲ καὶ ἐν ἄλλοις ποὶ τόποις, ἐν μήλῳ, ἐν μακεδονίᾳ, ἐν λιπάρῃσι, καὶ σαρδονίᾳ, καὶ ἱεραπόλει τῆς φρυγίας, λιβύῃ, ἀρμενίᾳ, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ τόποις πλείοσιν ὥσπερ ἡ μίλτος· ἔστι δὲ καὶ αὐτῆς εἴδη πλείονα.

Alumen. Cap. CXXIII.

OMNE aluminis genus ferè in Ægypto, & in eisdé metallis inuenitur: etenim scisile quoddam, quasi flos gleboſi in telligitur. Gignitur & in aliis quibusdam locis, in melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ. Aphrica, Armenia, & plerisque aliis regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species:

 verùm

verũ ad medẽdi vſum, ſciſsille, rotundũ, et liquidũ expetũtur. Optimũ eſt ſciſsile, præſertim recens, cãdidiſsimũ, guſtu perquàm adſtringẽs, graue olens, calculorũ expers, nec glebuloſe aut aſſuloſe cõpactũ, ſed ſigillatim in capillaméta quædã caneſcétia dehiſcens, quale eſt quod trichites, quaſi capillare nominãt, in Ægypto natũ. Reperitur quoq; lapis huic alumini perſimilis, qui guſtus iudicio dignoſcit, quod nõ adſtringat. Dánat in rotũdi genere, quod manu confictũ eſt. ſed ex figura deprehenditur. Aſsumendũ autem ſuapte natura rotundũ, bullis turgẽs, albo propius, atque validius adſtringens, præterea nónihil palloris cũ quadã pinguitudine præ ſe ferens, ſine arenis, friabile, natiõe Ægyptiũ, aut ex inſula Melo. Liquidi probatio, vt ſit lympidũ, lacteum, æquale, & ſemper ſucco madẽs, ſine lapidibus, atque quendã coloris igniculũ expirãs. Vim habent excalfaciendi ſtringẽdi, & expurgãdi, q̃ caliginẽ pupillis oculorũ offũdũt: genarũ carné, cæterásq; excreſcétias extenuãt. Sciſsile rotundo efficacius intelligitur. Vri et torreri chalcitidis mõ debent.

Putreſcétia

πρὸς δὲ ἰατρικὴν χρῆσιν λαμβάνεται ἡ ψαθὴ τε καὶ ἡ τροχύλη καὶ ἡ ὑγρά. ἀείση δὲ ὑπάρχει ἡ ψαθή, καὶ ταύτης ἡ πρόσφατος καὶ λευκὴ ἄγαν, καὶ ἄλιθος* καὶ βαρύοζος σύφωσά τε ἐυτόνως, ἔτι τε ἀπεπεσμένη βωληδὸν, ἢ ῥαδαμηδὸν, ἀλλ' ἐξασμένη κατὰ μόνδας πελαὶς θριξὶν ἐμφερῶς, οἵα ὄξιν ἡ λεπομιὴς τριχίτης, γινομένη δὲ ἐν αἰγύπτῳ. εὑρίσκεται δὲ καὶ λίθος ἐμφερὴς αὐτῇ ἄγαν, ὃν διακριτέον τῷ τῆς γεύσεως κριτηρίῳ μὴ σύφοντα. τῆς δὲ τροχύλης ἡ χειροποίητος ἀδόκιμος ὑπάρχει· γνωρίζεται δὲ ἐκ τοῦ σχήματος. παραλλαττέα δ' ἂν εἴη ἡ φυσικὴς τροχύλη καὶ πομφολυγώδης, ὑπόλευκός τε καὶ σύφουσα ἐῤῥωμένως, ἔτι δὲ ποσὸν ὠχρότητος ἅμα καὶ λιπαρείας ἔχουσα, πρὸς δ' τούτοις ἄλιθός τε καὶ εὐθρυβὴς, καὶ ῥᾳδίως μιλία ἢ αἰγυπτία. ἡ δὲ ὑγρὰς τὴν μάλιστα διαφανῆ πρὸς κρίσιν γαλακτώδη, ὁμαλῆ ἡ καὶ ὁλοχρώδη, ἔτι ἄλιθον καὶ πυρῆνας ἀποστέρουσαν. διώρυμεν δὲ ἔχουσι θερμαντικὴν, συμπτικὴν, ἀποχαθαρτικὴν τῶν ἐπισκοτούντων τῇ κόρῃ τὴν οὖσαν ἐν τοῖς ὀπτικοῖς βλεφάροις σάρκας καὶ τὰ ἄλλα ὑπερσαρκώματα. ἐνεργεστέραν δὲ τῆς τροχύλης τὴν ψηκτὴν ἡγητέον. καίουσι δὲ καὶ ὀπτῶσι ὡς χαλκῖτιν.

ἴχρισι

ἔχρισι δὲ καὶ σπόδους· αἱμορραγίας· οὖλα φλαδῶντα σέλλοισι· καὶ ὀδόντας σειομένους κραπύωσι σὺν ὄξει ἢ μέλιτι. ἄφθας δὲ ὠφελεῖ σὺν μέλιτι, καὶ ἐξανθήματα καὶ ῥεύματα ὠτὸς σὺν πολυγόνου χυλῷ· λέπρας δὲ ἀρμίζουσι σὺν κράμβης φύλλοις, ἢ σὺν μέλιτι ἐφιᾶσι· καὶ κνησμοῖς, ὄνυξί τε λεπροῖς καὶ πτερυγίοις καὶ χαλάζαις σὺν ὄξει τι καταλογούμενα. σὺν πηγεῖ δὲ ὄξους καταχειούμενα μετὰ κηκίδος ἴσης κεχαυμένης πρὸς φαγεδαίνικα, πρὸς δὲ νομὰς σὺν ἁλὶ ὑπολίς· φιτυειάσεις δὲ σὺν ὀρίζῃ καὶ πίσσῃ σμήχουσι καταχειόμενα· κονίδων τε καὶ φθειρῶν καὶ πνεικάτων σὺν ὕδατι καταχειόμενα, βοήθημα. * οἰδήμασί τε καὶ μαχαλῶν καὶ βουβώνων δυσοδίας καταχρίσει. ἡ δὲ μηλία καὶ πρὸς ἀσυλλαβίαν συνεργεῖ πρὸ τῆς συμόδου παρατεθεῖσα τῷ σώματι τῆς ὑστέρας· καὶ ἔμβρυα ἐκπιάσει· ἐπουλίσι τε καὶ σαφυλαῖς καὶ παιδιώμασιν ἐπιτήδειον· καὶ σώμασι καὶ πρὸς ὦτα καὶ αἰδοῖα ζωὴ μέλιτι ἐπίχρισον.

Περὶ Θείου, Κεφ. ρκδ'.

Θεῖον δὲ ἄριστον ἡγητέον, τὸ ἄπυρον καὶ λαμπυρίζον τῇ χρόᾳ, διαφανές τε καὶ δόιδυξ. τὸ δὲ πυρωμένου, τὸ χλωρόν τε καὶ ὑγιεινόν. γινᾶται

Putrescétia vlcera compescũt: sanguinis fluxiones inhibent: gingiuas humore prægnantes cõprimũt: motus dẽtiũ cũ aceto & melle firmãt. Prosunt cũ melle vlceribꝰ oris, eruptionibus papularũ, & fluxionibus auriũ, cum sanguinalis herbæ succo: lepris cõueniũt cũ brassicæ foliis aut melle cocta: ité pruritui, & vnguium scabritiis, pterygiis, & pernionibꝰ, asperſa cũ aqua. Valent cũ aceti fæce, & galla, pari põdere cremata, ad phagedænas vlcerum, & cũ salis duabꝰ partibꝰ, ad vitia quę pascũt: furfures cũ eruo et pice illita abstergũt: ad lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita auxilio sunt. Cõtra tumores, & graue alarũ inguinũque virꝰ, illinunt. Ex Melo aũt adue ctũ, mulieribus pręstat ne cõci piãt, ante coitũ ori vuluæ inditũ: partus quoq; extrahit: gingiuis, si caro excreuit, vuæ ac tõsillis accõmodãtur: ori, auribus & verẽdis cũ melle illinuntur.

Sulphur. Cap. CXXIIII.

Sulphur optimũ existimatur viuũ, quod apyron vocãt, nitedulæ modo splẽdidũ, perlucẽs, minimè lapidosum. Probaẽ in genere sulphuris ignẽ expti, qđ viret, ac præpingue spectatur.

Pluri-

Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum sulphur calfacit, discutit, & celeriter cõ coquit: prodest tussib⁹, suspirio sis, purulenta extussientibus in ouo sumptũ, aut suffitum: præterea partus, vsti nidore extrahit: lepras, lichenas, scabros vngues, cum resina terebinthina mistum, aufert: cum aceto autẽ illitum, ad lepras efficax est: vitiligines tollit: scorpionis ictibus, addita resina, medetur cũ aceto verò, draconis marini scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpétes, cum nitro detersum, sedat: regium morbum emendat, insparsum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptũ. Facit ad grauedinẽ, & destillationes: sudores quoq; conspersum inhibet: podagricis, cũ aqua & nitro illitum, conducit: grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat: lethargicos suffitu excitat: erumpétem vndecunque sanguinem sistit: contusis auribus, cum vino & melle illitum medetur.

γυνᾶται δὲ πλεῖσον ἐν μήλῳ ᾗ λιπάρᾳ. θερμαίνει δὲ τὸ προειρημένον καὶ διαφορεῖ καὶ πεπαίνει ταχέως· βῆχας τε καὶ ἐμπύους καὶ ἀθματικοὺς ὠφελεῖ ἐν ᾠῷ λαμβανόμενον καὶ ὑποθυμιώμενον· πρὸς δὲ τούτοις ἔμβρυα καταπᾶσα ὑποθυμιαθέν· καὶ λέπρας, ἔτι δὲ λειχῆνας ᾗ ὄνυχας λεπροὺς αἴρει τερεβινθίνῃ μιχθὲν ῥητίνῃ· σὺν ὄξει δὲ καταχριόμενον, πιεῖ μὲν ᾗ πρὸς λέπρας· αἴρει δὲ καὶ ἀλφοὺς· ἰᾶται καὶ σκορπίων πληγὰς μιχθὲν ῥητίνῃ· σὺν ὄξει δὲ ᾗ δρακοντίου θαλασσίου καὶ σκορπίου πληγὴν ἰᾶται. παύει ᾗ πόσι καθ' ὅλον τὸ σῶμα κνησμὸς ζωὸν ὄστρεον σμηχόμενον· ἀποκαθαίρει δ' ᾗ ἴκτερον, κοχλιαρίου πλῆθος ὀπισθοτόνου τῷ μετώπῳ, ἢ μὴ ὠὸν ῥοφητὸν λαμβανόμενον. ᾗ πρὸς κόρυζαν δ' ᾗ καταῤῥοὸν πιεῖ· ᾗ ἱδρῶτας στέλλει καταπατούμενον· ᾗ ποδαγρικοῖς ζωὸν ὄστρεον ᾗ ὕδατι καταχριόμενον συμβάλλεται· ᾗ δυσκοΐαν ὑποθυμιώμενον· διὰ σίφωνος θεραπεύει· ᾗ ληθαργικὸς ὑποθυμιώμενον· αἱμορραγίαν τ' ἴσχει· θλάσεις τε ὦτων σὺν οἴνῳ * καὶ μέλιτι καταχριόμενον ἰᾶται.

Pumex. Cap. CXXV.

Pumicis probatio, vt magnopere leuis, spongiosus, sciscilis, nec arenosus, item teri facilis, &

Περὶ Κισήρεως. Κεφ. ρκδ.

Κίσηρις δὲ πρόχριτόν τ' ἄναν κούφιον, ᾗ πολύκενον, ὀξυλιθῶ τι καὶ ἄλιθον, ἔπι δὲ ψαυσαί τε ᾗ

καὶ λευκήν. καυστέον δὲ ὕστατον λαβὼν αὐτῆς ὁπόσον αὖ θέλῃς, διαπύροις ἐγκρυφθὲν ἀνθραξίν, ὡς δ' αὖ ἐκπυρωθῇ, ἀνελόμενος σβέσον οἴνῳ εὐώδει· καὶ πάλιν πυρώσας σβέσον· τὸ δὴ τέτον αὖ γόμφος ἀνὴρ καθ' ἑαυτὸν, ἔα ψυχθῆναι, καὶ ἀπεδύμενος χρῶ. Δύναμιν δὲ ἔχει συπτικήν τε καὶ σμηκτικὴν οὖλον, ἀποκαθαρτικὴν τῶν ὑπισχνεμένων ταῖς κόραις μετὰ θερμαίνεσθαι· ἑλκῶν τε σηπεδονικὴν καὶ καρκινωτικήν· ἔτι δὲ καὶ καταπλαστικὴν ἀθροχόων, καὶ σμηκτικὴν ὀδόντων λεία. καὶ ἐμπλαστικὴν σώματος· καὶ εἰς ψίλωσιν τριχῶν ὑπτίδειον. Θεόφραστος δὲ ἱστορεῖ, ἐάν εἰς ζέοντά τις οἶνου πίδον καθῇ λίσσηρον, παύεσθαι παραχρῆμα τὸ ζέσιν τῆς οἴνου.

Περὶ Ἁλῶν. Κεφ. ρκς'.

Τῶν δὲ ἁλῶν εὐδοκιμέστερον μέν ἐστι τὸ ὀρυκτόν· τούτου δὲ κοινῶς μὲν τὸ ἄλιτον καὶ λευκὸν καὶ διαφανὲς, πυκνόν τε καὶ ὁμαλὸν τῇ συγκρίσει. ἰδίως δὲ τὸ ἀμμωνιακὸν τῷ ῥεῖν, εὔχυτόν τε καὶ εὐθείας τὰς διαφύσεις ἔχον. τοῦ δὲ θαλασσίου τὸ φυκιὸν παραλληπέον καὶ λευκὸν καὶ ὁμαλόν. κάλλιστον δὲ ἐν κύπρῳ καὶ κύπρου τῇ σαλαμῖνι γίνεται καὶ μεγάρεσι, καὶ ἐν σικελίᾳ καὶ λιβύῃ. ἐν τοῖς λαρυθμίοις δὲ καὶ τὰ μυκᾶα θεωρητέον. εὐτονώτατον

& candidus. Crematur flagrātissimis carbonibus obrutus, & vbi canduerit, extractus, vino restinguitur odorato: iterumque incensus extinguitur: & tertia vstione exemptus, & per se refrigeratus, ad vsus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere: purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt: explet vlcera, & ad cicatricem perducit: excrescentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrasti author est, si quisquam in bullientem vrceum vini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal. Cap. C X X V I.

Sal fossilis efficacior est: cōmuniter, si est candidus, calculis vacans, & perspicuus, densus, æquali compage. Peculiariter ammoniacus natione laudatur, si modo findi facilè possit, & in recta segmenta deduci. In marino sale eligendus est cādidus, æqualis, dēsus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multò validissimus

est Phrygius nomine tapeus, aut tritæus, aut gâtæus. Salis natura in commune perquâ vtilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimit, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, quod alius alio sit præstantior. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur medicamentis psoras abstergentibus. Excrescentia in oculis reprimit, & pterygia cõsumit, cæteráſq; carnis extuberationes tollit: clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur, doloréſq; in saccis fotu mitigat, & pruritus sedat, ex oleo & aceto infrictus ad ignem, donec sudent. Item lichenas, lepras, psoráſque. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat: tonsillis vuéque, cum melle tostus. Vlceribus in ore manantibus, gingiuis quas humor vexat, & phagedænis vlcerum, cum polenta crematus illinitur. aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerastem, cũ pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus, cum melle & aceto: aduer-

δὲ ἀυτῆς ὅτι τὸ φρύγιον, καλούμενον δὲ ταπαῖον. Δυύαμιν δὲ ἔχουσιν οἱ θερμοτεμπτικοὶ ἅλες κοινῶς πολύχρηστον, συπτικήν τε καὶ σμηκτικήν, καὶ ἀποκαθαρτικὴν καὶ διαχυτικὴν, ἔτι δὲ καταπλαστικὴν καὶ ἐκφρακτικήν. τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον διαφέροντες. εἰσὶ δὲ καὶ σπόδιον ἐφεκτικοί. καὶ σμήχεσι ψωρικαῖς μίγνυται. στέλλουσι καὶ ταῖς ἐν ὀφθαλμοῖς ὑπερσαρκώσεις, καὶ πτερύγια τήκουσι, καὶ ταῖς ἄλλας δὲ ὑπερσαρκώσεις αἴρουσι· καὶ κλυσμοῖς εὔθετοι· καὶ κόπου λυτήριοι, σὺν ἐλαίῳ χριόμενοι. καὶ θεῖς τὰ οἰδήματα τῶν ὑδρωπικῶν, πυέα τε ἢ δι' ἄυτῶν ἐν σακκίοις θερμαύντικὴν λήμματῶν, καὶ κινησιὸς ἢ παύσασι μετ' ὄξους συγχριόμενοι παρὰ πυρὶ ἄγχεις αὖ ἱδρώσωσι. ὁμοίως καὶ λιχῆνας καὶ ψώρας καὶ λέπρας. συναγχικοὺς † κουφίζουσι σὺν μέλιτι καὶ ὄξει καὶ ἐλαίῳ διαχριόμενοι. θεῖς δὲ παιδιόμια καὶ κυνίδας ζωὰ μέλιτι ὀπιοῦ καὶ ἄφθας καὶ ἕλκων πλάσθου καὶ πρὸς φαγεδαίνας ζωὰ ἀφρίτῳ κεκαυμένοι καταπλάσσουσι). θεῖς δὲ σκορπίων θλιπὰς σὺν λινοσπέρμῳ· πρὸς δὲ † ἔχεων ὄγματα σὺν ὀρίγανῳ καὶ μέλιτι καὶ ὑσσώπῳ· θεῖς δὲ κεράστου μετὰ πίσσης ἢ κεδρείας ἢ μέλιτος· θεῖς δὲ σκολοπένδρας ὄγμα σὺν μέλιτι καὶ ὄξει· θεῖς

πρὸς ὑ σφηκῶν πληγὰς ἢ τερηδόνας ἢ πρὸς ψυδράκια τὰ ἐν κεφαλῇ, θύμους τε ἢ φύμαλα σὺν σέσι τι μοχλείῳ ἀναμηθέντες· σὺν ταρίχῃ δὲ ἢ σέσαμι ὑείῳ ἢ μέλιτι, φλύκταινας διαφορῆσαι. ἢ ὄρχεων οἰδήματα, σὺν ὀρίγανῳ ἢ ζύμῃ θᾶττον πεπαίνει. ἢ κροκοδίλοις κτεινομένοις ἐνδεδέντες εἰς ὀδόντιον λεῖοι, ἢ βαπτόμενοι εἰς ὄξος συφομένων τ' ἰκτέων τοῖς ἐνδέσμοις. θηριδήκτοις τε βοηθοῦσι, ἢ πρὸς ὑπόπαχρωσιν σὺν μέλιτι. ἢ πρὸς ὀφθαλμίτιδος πόσιν, ἢ πρὸς μύκητας σὺν ἐξυμέλιτι πινόμενοι, πρὸς ὑ ῥήγματα σὺν ἀλεύρῳ ἢ μέλιτι· πρὸς πυρίκαυτα ὑ σὺν ῥοῷ ἐπιτιθέντες ὠφελοῦσι· φλυκταινώδεσι πρὸς ἀλγεινοῖς τι ὁμοίως ἐπιτίθενται, πρὸς ὠλγίαν τε σὺν ὄξει ἑρπητικοῖς κατά τ' ἢ ἔρπητας ἴσχιον μετ' ὄξους καὶ ἀχιδνέντες ἢ καὶ ἀπαλαθέντες σὺν ὑσσώπῳ καυτέον ὑ αὐλοῖς εἰς ὀστράκινον ἀγγεῖον ἐμβαλόντας ἢ ἐπιμελῶς πωμάσαντες, ἵνα μὴ ἐξιήσῃ), αὐθρακιᾷ τ' ἐγκρύψαντας ἄχρις ἂν πυρώσωσι. τινὲς δὲ τὸν ὀρυκτοῖς σαπὶ θερμαίνοντες εἰς αὔθρακας ὑποβιβάζουσι, ἐῶσιν ἄχρις αὖ τὸ σῶς κατακαῇ. ἔνιοι δὲ ἢ τὸν κοινὸν ἅλας τόπον τ' βάπτον καίειν. ἀποκλύσαι δὲ τοὺς ἄπαξ ὕδατι, ἢ ἐσθῆτας ξηρανθῆναι, ἔμβαλε εἰς χύτραν, ἢ πωμάσας ὑπόκαιε κονιῶν ἕως ἂν μηκέτι ἐξιήσῃ).

aduersus vesparum ictus, & teredines, albidasque capitis pustulas, thymos & tubercula, cum seuo vitulino: furunculos cum vua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus, in linteolo & intinctus aceto, ita vt vinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, fugillationes in facie, ex melle. Contra haustū opium & fungos, cū aceto multo bibitur. Luxatis imponitur cū farina, & melle: am bustis igni cū oleo impositus, pustulas erumpere nō patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto: ignes sacros, & vlcera quæ serpunt cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditúsque prunis, vsquedum efferuescat. Aliqui fosilem subacto polline obliniunt, & carbonibus subiiciunt, vsquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subito igne, moueturque, donec iam non exiliat.

Salis

Salis ſpuma.
Cap. CXXVII.

Spuma ſalis, ſpumoſi maris lanugo ſiue ramentum eſt, in exilibus petris inuentum, cui vis eadem quæ ſali.

Muria. Cap. CXXVIII.

Muria effectus ſalis præbet, abſtergítq; dyſenterícis infunditur, etiamſi nome inteſtina corripit: & iſchiadicis veteribus. Ad fotus, aquæ marinæ vſum præſtat.

Flos ſalis. Cap. CXXIX.

Flos ſalis flumine Nilo defluit: lacubus tamen quibuſdá innatat. Aſſumendus qui crocei coloris eſt, odore ingrato, ceu gari. Interdum longè magis virus olet, guſtúque morda citer, & pinguiter lentus. Fucatus autem rubrica, aut ſcrupuloſus, improbatur. Prętereaſyncerus non niſi oleo reſoluitur: adulteratus nõnulla ex parte, etiã aqua diluéte factitiũ colorẽ. Ad vlcera quæ cacoëthe vocãtur, & phagedęnas, genitaliũ nomas, & purulétas aureis, efficax eſt: oculorũ hebetudines, cicatrices, albuginéſque tollit. Emplaſtris vnguentíſq; coloris cauſa, vtroſaceo, miſcet: ſudorẽ cit: aluũ turbat, in vino aut aqua ſũptus: ſtomachũ male habet. Additur

Περὶ Ἅχνης ἁλός.
Κεφ. ρκζ'.

Ἅλος ἄχνη ἐπιψιγμά ἐστιν ἁλὸς ἀφρώδους, εὑρισκόμενον ἐπὶ τῶν πετρεδίων. Δύναμιν ὃ ἔχει τὴν αὐτὴν τοῖς ἁλσίν.

Περὶ Ἁλμης. Κεφ. ρκή.

Ἁλμη τὴν αὐτὴν τοῖς ἁλσὶν ἔχει ἐνέργειαν, σμηκτικήν· δυσεντερικοῖς τέ ἐστι τοῖς κατὰ νομὴν ἐγκλυσμα, καὶ ἰσχιαδικοῖς χρονίοις. θερός τε καταντλήσεις ἀμύζει ἐφ' ὧν θάλατταά ἐστι χρησίμη.

Πρὶ Ἄνθους ἁλός. Κεφ. ρκθ'.

Ἁλὸς δὲ ἄνθος καταῤῥεῖ μὴν τῷ νείλῳ ποταμῷ· ἐφίσταται δὲ λίμνῃσι ποτί. παραληπτέον δὲ τὸ χροιζον τῇ χρόᾳ ὑποδυσωδέστερον, ὥστε γάρος. ἐνίοτε δὲ ἢ δυσωδέστερον μᾶλλον καὶ τῇ γεύσει δηκτικώτερον καὶ ὑπολίπαρον. τὸ δὲ ἐμπλαστον ἢ δρόμβοις ἔχον, φαῦλον ἡγητέον. ἔστι τὸ ἀκίρωτον ἐλαίῳ σωαίνεται μόνον· τὸ δὲ δεδολωμένον δὲ ἐκ μέρους καὶ ὕδατος. ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ κακοήθη καὶ φαγεδαινικὰ ἕλκη, καὶ νομὰς τὰς ἐν αἰδοίοις, καὶ ὧτα συρρέοντα, καὶ ἀμελωπίας καὶ τὰς οὐλὰς αἴρει καὶ λευκώματα. μίσγονται καὶ ἐμπλάστροις καὶ μύροις εἰς χρῶσιν ὡς καὶ ῥοδίνῳ. ἔστι δὲ καὶ ἰδρώτων κινητικὸν· κοιλίας παραληπτικὸν· καὶ οἴνῳ καὶ ὕδατι ληφθέν· καὶ κοσμίαν ἔχον· μίσγε-

μίγνυται ἢ ἀκόπος ἢ σμήγμασι σὺν τοῖς τειχῶν * λευκασμόν· καὶ καθόλου ὅτι δριμὺ, πυρωτικὸν ὥσπερ οἱ ἅλες.

Περὶ Νίτρου. Κεφ. ρλ'.

Νίτρον προκριτέον τὸ κοῦφον, καὶ ῥοδωπὸν ἢ λευκὸν τὴν χρόαν, κατατετρημένον, οἱονεὶ σπογγῶδές τι, τοιοῦτον δὲ ὅτι τὸ ἐκ τῶν βουνῶν. Δύναμιν δὲ ἔχει μεταδυκριτικήν.

Περὶ Ἀφροῦ νίτρου.

Κεφ. ρλά.

Ἀφρὸς ἢ νίτρου, ἄριστος μὲν εἶναι δοκεῖ ὁ κουφότατος καὶ πλακώδης, εὐθρυπτὸς τε καὶ ἐμπέφυρος ἢ ἀφρώδης, ἔπι ἢ δακτικός· οἷος ὅτιν ὁ ἐκ φιλαδελφίας κομιζόμενος τῆς ἐν λυδίᾳ. δεύτερος ἢ ὁ αἰγύπτιος. γίνεται δὲ καὶ ἐν μαγνησίᾳ τῇ καλείᾳ. Δύναμιν δὲ ἔχει καθαρτικὴν οὗτος τε καὶ τὸ νίτρον ἁλσὶν ἐμφερῆ. ἐκ θείου δὲ τὸ νίτρον καὶ στρόφους παύει λεανθὲν μετ' ὑδρομέλιτος ἢ πεσὸν μετ' ὑδρομέλιτος ἢ μετὰ ὑφυμαλίου ἢ πηδὸς τῇ διαφορᾷ δυναμένων πνεύματα, οἷον πηγάνου ἢ ἀνήθου. ἔστι δὲ καὶ θειοδικῶν σύγχυσιμα πρὸ τῆς ἐπόψεως προσολῆς. μίγνυται καὶ διαφορητικῶς καὶ ὀπαστικῶς καὶ λεπριστικῶς ἐμπλάστροις καὶ λεπιωτικῶς. σὺν ὕδατι δὲ θερμῷ ἢ οἴνῳ ἐγχεόμενον ἐμπνευματώσεις τε καὶ ἄχλυς ὤτων ἰᾶται καὶ πυορροίας. καθαί-

bet. Additur acopis, & ſmegmatis, quæ albādi capilli gratia cō ponūtur: & in vniuerſum acris eſt, & feruētis naturæ, vt ſal.

Nitrum. Cap. CXXX.

Prçfertur nitrum leue, roſeo colore, aut cādido, in foramina dehiſcés, perinde quaſi ſpōgioſum quiddam, quale ex Bunis affertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt.

Spuma nitri. Cap. CXXXI.

Spuma nitri optima eſſe putatur, leuiſsima, gleboſa, friabilis, colore penè purpureo, aut ſpumoſa, & mordés: qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. Secunda eſt Ægyptia. Quin & in Magneſia Cariæ gignitur. Vim & vſtionē ſalis habet, tā nitrū, quàm ſpuma eius. Præterea nitrū tormina ſedat, ſi tritum cū cumino bibatur, in hydromelite, aut ſapa, aut aliquibus quæ inflationes diſcutere poſſunt, vti ruta, vel anetho. Febribus circuitu redeuntibus illinitur, ante ſuſpectam acceſsionem. Miſcetur emplaſtris, quę extrahunt, & diſcutiunt, extenuant, & lepras abſtergunt. Cum aqua autē calida aut vino infuſum, inflationes, purulētas aureis, & ſonitus earūdem ſanat, ſordes

sordes expurgat, cum aceto instillatum. Canum morsibus ex asinino adipe aut suillo medetur: resinæ terebinthinæ admistum furunculos aperit: aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: & venenis fungorũ, ex posca potũ: aut si bupresti s momorderit, ex aqua: iis verò qui taurinum sanguinẽ biberint, ex laserpitio: iisque qui cibum non sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisque iam remissioribus, & luxatis, cum cerato: in resolutione linguæ, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus vrũt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

Fæx. Cap. CXXXII.

ELIGENDA fæx maximè à vino vetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti viribus longè acrior est. Crematur vt alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo vrãt, vsque dum penitus incendatur. Alij viuis carbonibus fæcis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ vstionis, vt aerio nitore inalbescat. linguámq;

καθαίρει δὲ καὶ ῥῦπον σὺν ὄξει ἐγχεόμενον. κυνοδήκτοις τὶ ἰᾶται σὺν στέατι ὑείῳ ἢ ὑείῳ· αὐχμοῖ δὲ καὶ δυσθηλίας αὐλαφοῦν τερμινθίνης ῥητίνη· μὺς σὺκον δὲ ὑδρωπικῶν ὄζει κατάπλασμα· σὺν μέλιτι δὲ ἐγχριόμενον ὀξυδερκίες· καὶ πρὸς μύκητας σὺν ὄξυκράτῳ πυθὼν αἱρεῖ· πρὸς δὲ βουπράστεις ζωὸν ὕδατι· πρὸς ταῦρον ἢ αἷμα σὺν σιλφίῳ· ἀτροφίαι τε χρίσιμον καὶ πάπλασμα· παρεγκεφαλοῦσί τε ὀπισθοτονικοῖς πάθεσι σὺν κηρωτῇ καὶ ἐρέμμασι· μύγματι καὶ ἄρτῳ ὠφελίμως ἐπὶ τῶν ἀγλώττων παραλελυμένων. ἔνιοι δὲ κάουσι τὰ θερμαμμένα ἐπ' ἀνθράκων πεπυρωμένους ἀπρεσίμενοι, θερμοπεκεμένου χαλκοῦ ἐράκου, ἕως αὐ ἐκπύρωσῃ.

Περὶ Τεφρός. Κεφ. ρλδ'.

Τέφρα δὲ παραληπτέον μάλιστα μὲν πάντως ἀπὸ οἴνου παλαιοῦ ἰταλικοῦ· εἰ δὲ μὴ ἀπὸ ἄλλου ὁμοίου. ἡ γὰρ ἀπὸ ὄξους ἐπιτέτατται τῇ δυνάμει. καυστέον δὲ ὡς ἀλκυόνιον προεξηραμμένην ἐπιμελῶς. πινὲς δὲ ἐπ' ὀστράκων καινῶν θέντες καίουσι πυρὶ δαψιλεῖ, ἕως αὐ ἐμπυρωθῇ κατὰ βάθος. ἄλλοι δὲ εἰς ἀνθράκας πεπυρωμένους ἐγκρύψαντες βῶλον, τὸ ὅμοιον ποιοῦσι. σημεῖον δὲ τῆς δεούσης καύσεως ἡητέον, τὸ λευκὸν ἢ ἀεροχρουν τῆς χρώματος. καὶ τὸ

καὶ τὸ προσενεχθεῖσαν τῇ γλώσσῃ οἱονεὶ φλέγειν αὐτὴν. ὠσαύτως δὲ καὶ ἡ ἀπὸ ὄξους καύστου. Δυνάμιν δὲ ἔχει κωνικὴν σφοδρὰν, καὶ σμηκτικὴν, καταυλωτικὴν, συμπικλὴν, καὶ σκληρικλὴν, καὶ ξηραντικλήν. χρηστέον δὲ τῇ πρώτῃ προσφάτῳ κόμη. ταχὺ γὰρ διαπέπτωκεν· ὅθεν οὐδὲ ἀσκέπαστον, οὐδὲ χωρὶς ἄγγους αὐτὴν ἀποθετέον. θλύεται δὲ αὕτη ὡς πομφόλυξ. ἡ δὲ ἄκμασος στέλλει οἰδήματα καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ μυρσίνης· κοιλίαν τε καὶ σῶμα χον ῥευματιζόμενον καταπλασθεῖσα στέλλει· καὶ ῥοῦν γυναικεῖον κατὰ ἕδραν καὶ αἰδοῖα καταπλαττομένη, προσφύεται· καὶ φύγεθλα ἀπέλκωτα διαφορεῖ καὶ φύματα· μασοὺς τε ἀπαργῶντας ῥέοντας γάλα σβέννυσι σὺν ὄξει καταχριθεῖσα. ἡ δὲ κεκαυμένη λεπτομερὴς ἀφίσταται ὄνυχας σὺν ῥητίνῃ· καὶ μετὰ ἐλαίου συγχριθεῖσα νύκτα ὅλην, ἐὰν θὰς ποιεῖ τοὺς πέλας. θλυθεῖσα δὲ μίγνυται εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, ὡς ἀποδὸς· σμήχει τε οὐλὰς καὶ ἀχλῦς τοῖς ἐν ὀφθαλμοῖς ἢ τοιαύτη.

linguámq; tactu vrere videatur. Eadem vrendæ fœcis accti ratio. Vis ei supra modũ vrens, & abstergens: vlcera ad cicatricem perducit, adstringit, vehementer exest, siccátque. Sed recenti vtendum est, quoniam celeriter exanimatur: proinde non nisi in reconditorio, & vase aliquo reponi debet. Lauatur, vt pompholyx. Quæ vstionem experta non est, tumores & per se, & cum myrto cohibet: ventris stomachíque fluxiones illita sistit: muliebre profluuium, imo ventri aut genitalibus imposita, mitigat: panos discutit, nondum exulceratos, & tuberculas: rigentes mammas, suíque lactis impatientes, cum aceto peructa extinguit. Cremata verò, vngues scabros cum resina aufert: addito lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, vt spodos, adijcitur: cicatrices eorum & caligines eadem abstergit.

Περὶ Ασβέστου. Κεφ. ρλγ'.

Ἄσβεστος γίνεται οὕτως· τῶν θαλαττίων κηρύκων τὰ ὄστρακα λεανθέντα, ὅταν ἐγχριμφθῇ, ἢ εἰς κλίβανον διάπυρον καθεὶς ἄφες ἐννυκτερεῦσαι· τῇ δὲ ἐχομένῃ ἐὰν μὴ λευκότατα γένηται ἀνελοῦ· εἰ δὲ

Calx viua. Cap. CXXXIII.

Calx viua hoc modo fit: Marinorũ buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimittito: postera die, si cãdidissimæ fuerint, extrahito: si

sin aliter, iterum vrito, vsquedú vehementer inalbuerint. Dein vbi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile nouú cõiicito, & exactè pannis operiés, noctẽ vnam cõquiescere sinito: mane eá extrahés, vbi perfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è littoralibus calculis igne crematis, necnon è vili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in cõmune ignea, mordens, adurés, & crustas inducens: quibusdam aliis immista, vt adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit & dissipat: vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. Cap. CXXXIIII.

Gypsum vim habet adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones sudoresque cohibet: sed potum, strangulationis modo iugulat.

Sarmentitius cinis.
Cap. CXXXV.

Sarmentorum cinis vrendi vim habet: cum axungia autem vel oleo illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest: cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimit: serpen

εἰ δὲ μὴ, πάλιν ἢ ἄχρις οὗ ἱκανῶς λευκανθῇ. εἶτα ἀποβάλας αὐτὰ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ἔμβαλε εἰς χύτραν καινὴν, καὶ σκεπάσας αὐτὰ ῥάκεσιν ὀπιμελῶς, ἔασον ἐνταῦθα νύκτα μίαν· ὁ δὲ ἀνελόμενος ἀπόθου τὸ πᾶν εἰς τὴν κατεργασίας ἀποτίθεσο. σκευάζεται δὲ καὶ ἐκ λίθων κοχλάκων καμομένων, ἢ ἐκ τῆς χυδαίας μαρμάρου, ἥ τις ἢ προκείνεται τῶν ἄλλων. Δύναμιν δὲ ἔχει πᾶσα κοινῶς ἄσβεστος πυρωτικὴν, δηκτικὴν, καυστικὴν, ἐγαρωτικήν· μιγνυμένη δέ πῃ ἑτέροις ὡς τέταρτη ἢ ἐλαίῳ, γίνεται παχυντικὴ, μαλακτικὴ, διαπεπτικὴ, καταυλωτική. ἐνεργεστέραν δὲ αὐτῆς ἠκμαῖον τὴν προσφατον ἢ ἄβεστον.

Περὶ Γύψου. Κεφ. ρλδ'.

Γύψος δύναμιν ἔχει συσταλτικὴν, ἐμπλαστικὴν· αἱμορραγίας τε καὶ ἰδρώτων ἐφεκτικήν· πωθεῖσα δὲ πήγει τῷ κατὰ σπυρμὸν τρόπῳ.

Περὶ Τέφρας κλωματίνης.
Κεφ. ρλέ.

Τέφρα κλωματίνη δύναμιν ἔχει καυστικὴν· σὺν ὀξυγγίῳ δὲ ἢ ἐλαίῳ καταπλασθεῖσα, θλάσματα νεύρων καὶ ἄρθρων λυτίσματα καὶ συστροφὰς νεύρων ὠφελεῖ· σὺν νίτρῳ δὲ καὶ ὄξει σαρκώσεις ὀχέου στέλλει· κατα-

καταπλαδεῖσα δὲ σὺν ὄξει, ἰᾶται τὰ σήπτικὰ καὶ κυνόδηκτα ἰάτου ἐχαρωτικῆς τε μίγνυ. καὶ γίνεται ἡ ἐξ αὐτῆς κονία πρὸς πτώματα, καὶ ὠμότητας σὺν ὄξει καὶ ἁλὶ καὶ μέλιτι.

Περὶ Ἀλκυονίου. Κεφ. ρλς'.

Τοῦ δὲ ἀλκυονίου πέντε γνωστέον εἴδη ὑπάρχειν· τὸ μὲν γὰρ πυκνόν ὅτι καὶ σφυρὸν, καὶ τῷ ἰδεῖν ἀπογραδές, ἔτι δὲ βαρωμῶδες * καὶ βαρὺ, καὶ ἰχθύος ὄζον, ὃ δὴ πλεῖστον ὀπὶ τῶν λιθίνων εὑρίσκεται. τὸ δὲ ἐξῆς κατὰ μὲν τὸ ὄγμα πέρυγλῳ ὀφθαλμικῷ ἢ ἀπόγγῳ ἔοικε κοῦφόν τέ ὅτι καὶ πολύκενον, καὶ φυκώδη ἀποφορὰν ἔχον. τὸ δὲ τέτον σκληροειδὲς ὑπάρχει τῷ τύπῳ, καὶ τῇ χρόᾳ πορφυρώτερον, ὅ τινες μιλέσιον καλοῦσι. τὸ τέταρτον δὲ ἐρίοις οἰσυπηροῖς ὅμοιον, πολύκενον, κοῦφον. τὸ δὲ πέμπτον ἔοικε μὲν κατὰ ὄγμα ὠμότητι ἀνοσμόν τέ ὅτι καὶ τραχὺ, ἔνδοθεν μὲν κισσήρει κατά τι ἐοικὸς, ἔξωθεν δὲ λεῖον, ὑρμιῶ, ὅ πλεῖστον ἐν τῇ προποντίδι κατὰ τὴν καλουμένην βέσβικον νῆσον γίνεται, ὃ ἐπιχωρίως ἄλλος ἄχνιν καλοῦσι· τούτων τὸ μὲν πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον, εἰς σμήγματα παραλαμβάνε γυναικῶν, καὶ πρὸς φακὰς, λεντίγινάς τε καὶ λέπρας ἀλφούς τε καὶ μελανίας καὶ σπίλους τοὺς ὀπὶ προσώπου καὶ τοῦ λοιποῦ σώματος.

serpētiū canúmq; morsibus illitus ex aceto medetur: crustas obducētibus medicamētis admiscetur. Fit ex eo lixiuiū cōtra præcipitationes, & fungorū venena, cū aceto sale & melle.

Alcyoniū. Cap. CXXXVI.

Alcyonij quinque esse genera compertum est: vnum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in littoribus inuenitur. Alterū pinnulæ oculorum aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus, hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo pumicosum, foris læue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatum gignitur, patrio nomine halos achnen vocant. Duo priora in fœminarū smegmata assumuntur contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie reliquóque corpore.

Tertium iis qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est: in alia smegmata, psilothráque assumitur, cum sale mistum. Si quisquã alcyonium cremare velit, cum sale in crudũ fictile mittat, & obliniés vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur vt cadmia.

Adarces. Cap. CXXXVII.

Fit in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta salsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongiæ.

τὸ δὲ τρίτον εὐθετεῖ πρὸς δυσουροῦντας καὶ ἀμμώδη συλλέγοντας ἐν τῇ κύστει· καὶ πρὸς νεφρικούς, πρὸς ὕδρωπα, σπλῆνα. καὲν δὲ καὶ καταπλασθὲν σὺν οἴνῳ, ἀλωπεκίας δασύνει. τὸ δὲ ὕστατον ὀδόντας λευκαίνειν δύναται. παραλαμβάνεται δὲ καὶ πρὸς ἄλλα σμήγματα καὶ ψίλωθρα μιγνύμενον σὺν ἁλσί. καῦσαι δέ τι τούτων βουλόμενος, μεθ' ἁλῶν εἰς ὠμὴν χύτραν ἔμβαλε, καὶ περιαλείψας τὸ στόμα αὐτῆς πηλῷ, δὸς εἰς κάμινον, ὅταν δὲ ὀπτηθῇ ὁ κέραμος αὐτῆς, ἀνελόμενος ἀπόθου καὶ χρῶ. πλύνεται δὲ ὡς ἡ καδμεία.

Περὶ Ἀδάρκου. Κεφ. ρλζ΄.

Ὁ δὲ προσαγορευόμενος ἀδάρκης, γίνεται μὲν ἐν γαλατίᾳ· ἔστι δέ, ὥσπερ ἐπίπαγος ὑφαλμυρίζων, καθ' ὑγρῶν καὶ τελματωδῶν τόπων ἐν ξηρασίᾳ ἐπιγινόμενος, καὶ περιπηγνύμενος καλάμοις καὶ χορταρίοις, ἔοικε δὲ τὴν χρόαν ἄνθει ἀσίας λίθου, τῷ δὲ ὅλῳ τύπῳ ἀλκυονίῳ τῷ μαλακῷ, καὶ πολυκένῳ, καὶ ἔστιν οἱονεὶ λιμναῖον ἀλκυόνιον. εὐθετεῖ δὲ πρὸς ἐκδορὰν λεπρῶν καὶ ἐφηλίδων καὶ λειχήνων, καὶ φακῶν, καὶ τῶν ὁμοίων· καθόλου δ' ἐστὶ δριμύ. καὶ μετασυγκριτικόν, ὠφελεῖ καὶ ἰσχιαδικούς.

Περὶ

Περὶ Σπόγγων. Κεφ. ρλή.

Τῶν δὲ σπόγγων τοὺς μὲν ἄῤῥενας ἐκάλεσάν τινες λεπτοτρήτους καὶ πυκνοὺς ὄντας· ὧν τοὺς σκληροτέρους τραχήλους ὠνόμασαν. τοὺς δὲ θήλεις οἱ ἰατροὶ τοῖς φαρμακομμύοις διάκειν). χαῦσιν δὲ ἔχουσι τὴν αὐτὴν δήπουθεν. ὁ κονὸς δὲ καὶ ὑπνώδης, θαυμαλικός τε ὀδὴ καὶ οἰδήματα σέλλει· καὶ τὰ νεότροπα κολλᾷ σὺν ὕδατι ἢ ὀξυκράτῳ· σὺν μέλιτι δὲ ἐφθῷ παλαιοὺς κόλπους παρακολλᾷ. ὁ δὲ παλαιὸς ἄχρηστος. διαστέλλουσι δὲ καὶ μειωκότα ῥῆκα, καὶ τύλους ἀποδεσμούμενοι λίνῳ καὶ αὐτοὶ ἑκοὶ παρεμπιπτόμενοι ὥσπερ μύτα, τὰ δὲ ῥευματικὰ ὑπόνομα καὶ χοίνια ἕλκη, ἐξικμάζουσιν ὀπτώμενοι αὖκμοι νέοι καὶ κενοὶ ἐπίχρισιν δὲ καὶ αἱμορραγίαν. σὺν ὄξει δὲ κεκαυμένοι, πρὸς ἐρυσιπελατώδεις, καὶ ὅπου δεῖ σμῆξαί τι, ἢ σύναβρωτικὸν δὲ ποιοῦσι πολυθέντες εἰς τὰ ὀφθαλμικά. σὺν δὲ πίσσῃ χαίνοντας πρὸς αἱμορραγίαν ἀμύζουσι. λευκαίνονται δὲ αὐτῶν οἱ ἀπαλώτατοι ἐν τοῖς κυάμασι, βρεχόμενοι τῇ ὀπτῇ πεφθῶν σωισταμμένῃ ἁλὸς ἄχνῃ, καὶ ἡλιαζόμενοι, ὀπτλεπέτω δὲ τὸ μὴ κοῖλον αὐτῶν αὖω, κάτω δὲ ἡ ἀποτομή. εἰ δὲ εἴη αἰθρία θερεία καὶ ὑπὸ τὴν σελήνην πίπτοντα βρεχόμενοι ἁλὸς ἄχνῃ θαλάσσης, γίνονται δὲ λευκότατοι οἱ τοιοῦτοι.

Περὶ Κο-

Spongiæ. Cap. CXXXVIII.

E spongiis alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarũ duriores tragos nominarũt. Fœminas autẽ, quæ contrarias dotes habẽt. Vruntur eæ vt alcyoniũ. Recentes sine pinguetudine, vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recẽtia vulnera ex aqua poscáve cõglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungũt. Vetustæ autẽ inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigãtur, occlusa vlcera, callósq; laxant, siccę recentes & vacuæ senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim excedũt, impositu siccant: sanguinis profluuiũ sistũt. Crematarũ cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & vbi q̃d abstergere, aut adstrĩngere op⁹ est. Vtilius, in oculorũ medicamẽtis lauare cinerem. Omniũ cinis cũ pice crematarũ, profluẽtem sanguinẽ sistit. Cãdidę cura fiũt, è mollissimis recẽtes, per ęst⁹ tinctę salis spuma, quę petris cohæret: insolãtur inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectãte, & qua absciss̃ę fuerũt, deorsum. Si verò æstiua serenitate ad lunã sternanẽ, perfusæ salis spuma, aut maris aqua, maximũ cãdoré referẽt.

Coralliũ. Cap. CXXXIX.

Coralliũ, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinũ esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atq; emergit, tanquam offuso aëre protinus cõcrescat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in ꝑmontorio cui Pachyno nomẽ est. Laudatissimum, rubens, colore antherici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cedens, æquabili vsquequaque concremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quàm ramosissimũ, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autẽ in lapidis duritiã coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: excrescentia coërcet: oculorũ cicatrices abstergit: vlcerũ caua, & cicatrices explet: contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est, vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

Περὶ Κοραλλίου. Κεφ. ρλθʹ.

Τὸ δὲ κοράλλιον ὃ ἔνιοι λιθόδενδρον ἐκάλεσαν, δοκεῖ μὲν εἶναι φυτὸν ἐνάλιον, σκληρύνεσθαι δὲ ὅταν ἐκ τοῦ βυθοῦ ἐξαιρεθῇ, ἔξαλον γινόμενον, καὶ βαπτόμενον ἤτοι πηγνύμενον ὥσπερ ὑπὸ τοῦ περικεχυμένου ἡμῖν ἀέρος. εὑρίσκεται δὲ πλεῖστον ἐν τῷ κατὰ Συρακούσας ἀκρωτηρίῳ τῷ καλουμένῳ Παχύνῳ. ἄριστον δέ ἐστι τὸ πυῤῥὸν τῇ χρόᾳ καὶ ἐμφερὲς ἀνθερικῷ χρώματι, ἢ σάνδυκι κατακορεῖ, εὔτριβές τε ὡσαύτως, καὶ ὁμαλὸν δι' ὅλης τῆς συγκρίσεως, ἔτι δὲ ὀσμὴν βρυώδη καὶ φυκίοις ἐμφερῆ ἔχον. πρὸς δὲ τούτοις πολύοζον καὶ κινναμωμίζον τῷ τύπῳ τῶν θαμνίσκων. τὸ δὲ λιθῶδες τῇ συγκρίσει καὶ τῇ χρόᾳ ψαφαρὸν, σεσηραγγωμένον τε καὶ χαῦνον, φαῦλον οἰητέον εἶναι. στύφει δὲ τῇ δυνάμει καὶ ψύχει ἐπιεικῶς. καταστέλλει δὲ τὰ ὑπερέχοντα, καὶ οὐλὰς σμήχει τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς. πληροῖ δὲ καὶ κοιλώματα καὶ οὐλάς. πρός τε αἵματος ἀναγωγὰς ἱκανῶς ἐνεργεῖ, καὶ δυσουροῦσιν ἁρμόζει. καὶ σπλῆνα τήκει σὺν ὕδατι πινόμενον.

Antipathes, Cap. CXL.

Quod antipathes vocãt, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Περὶ Ἀντιπαθοῦς. Κεφ. ρμʹ.

Καὶ τὸ καλούμενον δὲ ἀντιπαθὲς, κοράλλιον οἰητέον ὑπάρχειν, εἴδει μὲν ἔχον διαφοράν. ἔστι δὲ τῇ μὲν χρόᾳ μέλαν, δενδρίζον δὲ καὶ αὐτὸ καὶ ὀζῶδες μᾶλλον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῷ προειρημένῳ.

Περὶ Φρυγίου λίθου. Κεφ. ρμά.

Λίθος φρύγιος, ᾧ οἱ βαφεῖς τὰ φρυγία χρῶνται, ὅθεν καὶ ὀνόμασται, γίνεται τὰ ἐν Καππαδοκίᾳ. ἄριστος δ' ἐστὶν ὁ ὠχρὸς καὶ μέσως βαρύς, οὐκ εὔτονος τῇ συγκρίσει τοῦ σώματος, ἔχων ἐν διαφύσεις λευκὰς ὡς καδμεία. καίεται δ' ὁ λίθος οὕτω· βρέξας αὐτὸν καλλίστῳ οἴνῳ, διαπύροις ἐγκλείσας ἄνθραξι, καὶ φύσῃ συνεχῶς, ἐὰν δὲ μεταβάλλῃ τὸν χρόαν κιρρότερος γινόμενος, ἐξελὼν αὐτὸν τῷ αὐτῷ * σθένει οἴνῳ. καὶ πάλιν εἰς τὸν ἄνθρακας ἀποβάπτων τὰ αὐτὰ ποίει. καῖε δὲ αὐτὸν ἐν πέτου, προσέχων μὴ θρυβῇ καὶ ἀπασβολωθῇ. δύναμιν δ' ἔχει ὠμός † καὶ κεκαυμένος συστικὴν ἐνεργῶς, ἔτι δὲ αἱματοθαρπτικὴν καὶ ἐμπλαστικὴν ποσῶς, καταπλασμάτων τε ἰατικὴν σὺν κηρωτῇ. σμύεται δὲ ὡς ἡ καδμεία.

Phrygius lapis. Cap. CXLI.

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia vtuntur, à qua nomẽ accepit, naſcitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non ſolida corporis compage, intercedentibus albis ſegmentis, vt in cadmia. Vritur autem vino optimo perfuſus, viuiſque carbonibus obrutus, perflatur aſſiduè follibus, donec mutato colore rufeſcat: rurſus extractus eodem vino reſtinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: attenden lum tamẽ, ne minutim cõfringatur, & in fuliginem euaneſcat. Vis crudo vſtóque adſtrictoria, expurgans: vlceribus cruſtas quadamtenus inducit, ambuſtis cum cerato medetur. Lauatur vt cadmia.

Περὶ Ἀσίου λίθου. Κεφ. ρμβ.

Ἄσιον δ' λίθον παραπλήσιον τὸν κισηρώδη τῷ χρόᾳ, χαῦνόν τε καὶ κοῖλον, ἔτι δ' εὐθρυβῆ καὶ διαφύσεις μιλίνας ἔχοντα διὰ βάθους. τὸ δ' αὐτὸ ἐστὶν ἡ ἐριζάνθεμα ἐπέξανθος ἀλωείς τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν λίθων, τῇ μὲν συσάσει λεπτὴ, τῇ δὲ χρόᾳ τὸ μὺτοι λευκόν ἐστι, τὸ δὲ πέτροις κισήρει, ἐπὶ τὸ μύλινον τεταμένον· προσαγόμενόν τε τῇ γλώττῃ δάκνει ποσῶς.

Asius lapis. Cap. CXLII.

Asius lapis aſſumi debet pumicis colore, leuis, fungoſus, item friabilis, ſciſsiles venas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, falſugo ſubflaua eſt, ſummo lapide inſidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in aliis pumici ſimili, ad luteũ vergente: admotus linguæ aliquãtum mordet.

Δύνα-

Vim habet vterque adſtrictoriam, & modicè erodentem: admiſtus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula diſcutit. Longe validior flos exiſtimatur. De cętero ſiccatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnantia ſanat: excreſcentia cohibet, tetráque vlcera & fungis ſimilia, cum melle expurgat: vlcerum caua explet, & expurgat cum melle: depaſcentiaque cum cerato ſiſtit. Fit cataplaſma ex eo podagris, miſto fabæ lomẽto: & lienoſis, ex aceto & viua calce. Prodeſt flos ex melle phthiſicis linctu. Podagrici iuuantur, pedibus in ſolio ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoque pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum craſsitiem abſumũt, cum vice nitri in balneo ſparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Δώναμιν δὲ ἔχει ἑκάτερον σμηπτικὴν, σπηπτικὴν κυνχῆ, καὶ διαφορητικὴν φυμάτων τερεβινθίνῃ ἀναλαμβανόμενον ῥητίνῃ ἢ ὑγρᾷ πίσσῃ. ἰσχυρότερον δὲ τὸ ἄνθος νομίζεσθαι. ἐκ μέλιτος δὲ τοῦτο ξηραινόμενον, τὰ παλαιὰ καὶ δυσκατούλωτα ἕλκη ἰᾶται· κατεσθίει δὲ τὰ ὑπερσαρκοῦντα καὶ ἀναλαμβάνει σὺν μέλιτι, τὰ μύκησιν ὅμοια καὶ θηριώδη· πληροῖ δὲ καὶ τὰ κοῖλα τῶν ἑλκῶν καὶ ἀναλαμβάνει ζὺν μέλιτι· καὶ τὰ νεμόμενα ἴσχει μεθ' ὑποκιρωτῆ. καὶ ποδαγρικοῖς ἐν καταπλάσμασι μετ' ἐρέγμου· καὶ πλευριτικοῖς μετ' ὄξους καὶ ἀσβέστου. ἐπιλειχόμενόν τι τὸ ἄνθος μετὰ μέλιτος φθισικοῖς ὠφελεῖ. κατασκευάζονται δὲ καὶ πῶλοι ἐκ τοῦ λίθου, εἰς οὓς οἱ ποδαγρικοὶ τοὺς πόδας ἐμβυθίζοντες ὠφελοῦνται. καὶ σαρκὶ σαρκοφάγοι γίνονται. ἰσχναίνουσι τὰ πολύσαρκα καὶ παχέα σώματα, κατάπλασσόμενοι αὐτὴ νίτρου ἐν βαλανείῳ. ἐὰν δέ τις θλῶσαι θέλῃ τὰ προγεγραμμένα, πλυνέτω ὡς πρὸ καδμείας.

Pyrites. Cap. CXLIII.

PYRITES lapidis genus eſt, à quo æs conflatur. Eligi debet æris ſimilitudine, facile ſcintillas ædens. Vritur ſic: Melle irrigatus molli pruna continuò flatur follibus, donec

Περὶ Πυρίτου λίθου. Κεφ. ριγ'.

Πυρίτης εἶδός ἐστι λίθου, ἀφ' οὗ χαλκὸς μεταλλεύεται· λεπτὸν μὲν τοι τὸν χαλκοειδῆ, εὐχερῶς ἀπηθμύρας ἀφιέντα. καυστέον δὲ πρό πως τοιούτῳ. μέλιτι δεύσας αὐτὸν, ἔνδυε εἰς αὐθρακιὰν μαλακὴν, καὶ φύ-

καὶ ῥίπτε συνεχῶς, ὡς ἂν τῶν χρειαὶ κιρρὸς γένηται. ἔνιοι δὲ εἰς πολλὰς ἡμ πυρωμένους ἀνθρακας ἀποτίθεν ἱκανῶς βεβρεμένον τῷ μέλιτι τὸν λίθον. ὅταν δὲ μέλλῃ βέπεσθαι ἐπὶ τὸ κιρρὸν ἀναλεσῶν καὶ ἀποφυσήσαντες ἀποδῶν, πάλιν καίουσι διάβροχον, ἕως ἂν ξηρώτερος γένῃ ὁμαλῶς· πολλάκις γὰρ μόνον ἐπικαίεται τῷ ἐπιφάνειαν. ἔστω δ' ἀποκαύσαντες καὶ ξηράναντες ἀποτίθενται. ἐὰν δὲ παλυμμένα χρεία ᾖ ἀπαρχῆς, πλυτέον ὡς καθ' μείαν. Δύναμιν δὲ ἔχει κεκαυμένος καὶ ὁμὸς θερμαντικὴν, σμηκτικὸν, ἀποκαθαρτικὸν τῶν ὑπόσκληρων τῶν τοῦς ὄφθαλμοῦς διαφορητικήν τε καὶ πεπτικὸν σκληρωμάτων. ἀναληφθεὶς δὲ ῥητίνην κατασκλᾷ τὰ ὑπερσαρκοῦντα μετὰ ποσῆς θερμασίας καὶ σύψεως. καλοῦσι δὲ ἔνιοι τὸν ἕτερον καίεντα διφρυγές.

donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiiciũt, & vbi ad fuluum colorem vergere cœperit, extrahunt: effratóque cinere, rursus madefactum cremant, donec æqualiter asicatus, friabilis reddatur: siquidem sæpe facies summa solùm vritur. Ita crematus, siccatúsque, reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet vt cadmia. Tam crudi quàm vsti vis est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias cõ coquere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne cohibet, sed calorem quédam & adstrictioné parit. Ita vstum nonnulli diphryges appellãt.

Περὶ Αἱματίτου λίθου.
Κεφ. ρμδ'.

Αἱματίτης ὁ λίθος ἄριστός ἐστιν ὁ εὐθρυπτος μὲν καὶ κατακοπὴς, ἤτοι μέλας, ἐν ἑαυτῷ δὲ σκληρὸς, καὶ ὁμαλὸς, ἀνεπίμικτος ῥυπαρείας τινὸς ἢ διαζωμάτων. Δύναμιν δὲ ἔχει συπτικὴν, θερμαντικὴν ποσῶς, καὶ λεπτυντικὴν καὶ σμηκτικὴν ὅλων τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ τραχωμάτων σὺν μέλιτι· σὺν δὲ γάλακτι γυναικείῳ πρὸς

Hæmatites. Cap. CXLIIII.

Hæmatites optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suopte ingenio æqualis, nulla sorde admista, nullóque zonarum discursu. Vim habet adstringenté, & excalfactoriam aliquãtum extenuantémque: oculorũ cicatrices, & scabritiã cum melle purgat, cum lacte autẽ muliebri, lippitudini,

lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit: bibitur cõtra difficultatem vrinæ, & fluxiones mulierum in vino: & ab iis qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coticulæ & collyria oculorum vitiis apta. Vritur vt Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sũt qui hæmatiten ita adulterãt. Densam glebam rotundámq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui feruẽtem cinerem contineat, condunt, paucáque interiecta mora eximunt, experiuntúrque si trita ad cotem hæmatitæ colorem reddat: quòd si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruunt, & subinde cõspicientes, periculum faciunt: siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confictus, primum scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hæmatites lõge secus se in colore habet: nanque hic floridum reddit: hæmatites verò saturatiorem, atq; cinnabarin imitantẽ. Inuenitur

πρὸς ὀφθαλμίας καὶ ῥήξεις, καὶ ὑφαίμους ὀφθαλμούς. πίνεται δὲ σὺν οἴνῳ πρὸς δυσουρίαν καὶ ῥοϊκὰς. καὶ πρὸς αἵματος πτύσεις σὺν χυλῷ ῥοιᾶς. γίνεται δὲ καὶ κολλύρια ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀκόνια πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς πάθη ἐπιτήδεια. καίεται δ' ἐμφερῶς τῷ φρυγίῳ λίθῳ τοῦ οἴνου περιῃρημένου. μέτρον δὲ ἔστω τῆς καύσεως τὸ γενέσθαι αὐτὸν μέσως κοῦφον καὶ πεπομφολυγωμένον. δολοῦσι δέ τινες τὸν προειρημένον οὕτω· λαβόντες βῶλον σχιστοῦ λίθου πυκνόν τε καὶ στρογγύλον, τοιαῦται δέ εἰσιν αἱ λεγόμεναι ῥίζαι αὐτοῦ, εἰς κεραμίαν γάστραν ἔχουσαν θερμοσποδιὰν θερμὴν ἐγκρύπτουσιν, εἶτα διαλιπόντες μικρὸν ἀναιροῦνται, καὶ ἐπ' ἀκόνης τρίβουσι δοκιμάζοντες, εἰ τὴν τοῦ αἱματίτου χρόαν ἀπείληφε· κἂν μὲν οὕτως ἔχῃ, ἀποτίθενται· εἰ δὲ μή, πάλιν ἐγκρύπτουσι, συνεχῶς ἐφορῶντες καὶ δοκιμάζοντες· ἀφεθεὶς γὰρ ἐπιπολὺ ἐν τῇ σποδιᾷ, μεταβάλλει τῷ χρώματι, ἔπειτα διαχεῖται. ἀπελέγχεται δὲ ὁ κακοτεχνημένος πρῶτον μὲν ταῖς διαφύσεσι· ὁ μὲν γὰρ εἰς κτήδονας ἐπ' εὐθείας ἀποκλᾶται. ὁ δὲ αἱματίτης οὐχ οὕτως ἔχει ἐν τῇ χρόᾳ· ὁ μὲν γὰρ ἐναυθῆ ἀνίησιν· ὁ δὲ αἱματίτης βαθυτέραν καὶ τῷ κινναβάρει ἐοικυῖαν, εὑρίσκεται

εὑρίσκεται δὲ καὶ ἐν τῇ σινωπικῇ μίλτῳ, καὶ ἐκ τῆς μαγνήτιδος πέτρας καιομένης ἐφ᾽ ἱκανὸν, κατασκευάζεται αἱματίτης. ὁ δὲ αὐτοφυὴς ἐν αἰγύπτῳ μεταλλεύεται.

Περὶ Σχιστοῦ λίθου. Κεφ. ρμέ.

Σχιστὸς δὲ λίθος γίνεται μὲν ἐν τῇ κατὰ τὴν ἑσπέραν ἰβηρείᾳ. ἄριστος δὲ εἶναι δοκεῖ ὁ παρακροκίζων τῇ χρόᾳ, εὔθρυβής τε καὶ εὔσχιστος ὡς ἐν ἑαυτῷ. ἔοικε δὲ τῆς συνθέσεως ἕνεκεν καὶ τῆς ἀλληλουχίας τῶν κτηδόνων αὐτοῦ ἀμμωνιακῷ ἁλί. Δύναμιν δὲ τὴν αὐτὴν τῷ αἱματίτῃ εἰσφέρεται, τῇ εὐτονίᾳ μόνον λειπόμενος αὐτοῦ. πληροῖ δὲ καὶ κοιλώματα γυναικείῳ διεθεὶς γάλακτι, καὶ πρὸς ῥήξεις καὶ προπτώσεις, ἔτι δὲ παχύτητας βλεφάρων καὶ σταφυλώματα λίαν ἐνεργεῖ.

Περὶ Γαγάτου λίθου. Κεφ. ρμϛ´.

Τοῦ δὲ γαγάτου προκριτέον τὸν ταχέως ἐξαπτόμενον, καὶ ἀσφαλτίζοντα τῇ ὀσμῇ· μέλας δὲ κοινῶς ὑπάρχει καὶ αὐχμηρὸς, ἔτι δὲ πλακώδης καὶ κοῦφος ἄγαν. Δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν καὶ διαφορητικήν. ἔστι δὲ καὶ ἐπιληπτικῶν ἔλεγχος ὑποθυμιαθεὶς, καὶ ὑστερικὰς ἀνακαλεῖται· διώκει δὲ καὶ ἑρπετὰ θυμιαθεὶς καὶ ποδαγρικαῖς καὶ ἀκόποις μίγνυται δυνάμεσι. γίνεται δὲ ἐν κιλικίᾳ κατά τινα ποταμοῦ εἰσρέον εἰς θάλασσαν ἐκχεομένου,

ἔστι

Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnete lapide, vehementer ambusto. In Ægypto ſponte naturæ cum metallis enaſcitur.

Schiſtus lapis. Cap. CXLV.

Schiſtus lapis in Iberia Hiſpaniæ gignitur. Probatur maximè qui croci colorem ęmulatur, friabilis, ſuapte natura fiſsilis, concremento & alterno cohærétium venarum diſcurſu pectinum modo, ammoniaco ſali ſimilis. Vim exhibet hæmatitæ, ſed ad omnia infirmiorem. Quin & caua replet muliebri lacte perfuſus: ad ꝑcidentia, rupta, item genarum craſsitiem, & vuas oculorum, magnopere efficax eſt.

Gagates. Cap. CXLVI.

IN Gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit: niger eſt plerunque, & ſquallidus, cruſtoſus, perquàm leuis. Vis ei molliendi, & diſcutiendi: deprehendit ſonticum morbum ſuffitus, recreátque vuluæ ſtrangulationes: fugat ſerpentes nidore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia naſci ſolet, qua influens amnis in mare effunditur,

proximè

sin aliter, iterum vrito, vsquedú vehementer inalbuerint. Dein vbi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile nouú cõiicito, & exactè pannis operiés, noctéq; vnam cõquiescere finito: mane eã extrahés, vbi perfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è littoralibus calculis igne crematis, necnon è vili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in cõmune ignea, mordens, adurẽs, & crustas inducens: quibusdam aliis immista, vt adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit & dissipat: vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. Cap. CXXXIIII.

Gypsum vim habet adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones sudoresque cohibet: sed potum, strangulationis modo iugulat.

Sarmentitius cinis. Cap. CXXXV.

Sarmentorum cinis vrendi vim habet: cum axungia autem vel oleo illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest: cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimit: serpen

εἰ δὲ μὴ, πάλιν ἢ ἄχρις οὗ ἱκανῶς λευκανθῇ. εἶτα ἀποβάλλας αὐτὰ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ἔμβαλε εἰς χύτραν καινὴν, καὶ σκεπάσας αὐτὰ ῥάκεσιν ὀπιμελῶς, ἔασον ἐν ταῦτα νύκτα μίαν· πρωΐ δὲ ἀνελόμενος ἀπόκλησον τὸ πᾶν τελὲς τῆς κατεργασίας ἀποτίθεσο. σκευάζεται δὲ καὶ ἐκ λίθων κοχλάκων καμμιῶν, ἢ ἐκ τῆς χυδαίας μαρμάρου, ἥ τις ἢ πρωκείνεται τῶν ἄλλων. Δυνάμιν δὲ ἔχει πᾶσα κοινῶς ἄσβεστος πυρωτικὴν, δηκτικὴν, καυστικὴν, ἐσχαρωτικήν· μιγνυμένη δὲ πίσσῃ ἑτέροις ὡς σέπι ἢ ἐλαίῳ, γίνεται πισσικὴ, μαλακτικὴ, διαπεπτικὴ, καταυλωτική. ἐνεργεστέραν δὲ αὐτῆς ἠγητέον τὴν πρόσφατον καὶ ἄβρεχον.

Περὶ Γύψου. Κεφ. ρλδ'.

Γύψος δυνάμιν ἔχει συστατικὴν, ἐμπλαστικὴν· αἱμορραγίας τε καὶ ἱδρώτων ἐφεκτικήν· ποθεῖσα δὲ πίνει τῷ κατὰ πνιγμὸν τρόπῳ.

Περὶ Τέφρας κληματίνης. Κεφ. ρλέ.

Τέφρα κληματίνη δύναμιν ἔχει καυστικὴν· σὺν ὀξυγγίῳ ἢ ἢ ἐλαίῳ καταπλασθεῖσα, θλάσματα νεύρων καὶ ἄρθρων λυόμενα καὶ συστροφὰς νεύρων ὠφελεῖ· σὺ δὲ νίτρῳ δὲ καὶ ὄξει σαρκώσεις ὀχέου στέλλει· κατα-

καταπλαθεῖσα δὲ σὺν ὄξει, ἐρπητόδηκτα καὶ κυνόδηκτα ἰᾶται· ἐφαρμοστικαῖς τε μίγνυ). καὶ γίνεται ἡ ἐξ αὐτῆς κονία πρὸς πλώματα, καὶ μύκητας σὺν ὄξει καὶ ἁλσὶ καὶ μέλιτι.

Περὶ Ἀλκυονίου. Κεφ. ρλϛ'.

Τοῦ δὲ ἀλκυονίου πέντε γενέσεον εἶδη ὑπάρχειν· τὸ μὲν πυκνόν ὅτι καὶ σφυρόν, καὶ τῷ ἰδεῖν σπογγώδες, ἔπι δὲ βρωμῶδες * καὶ βαρύ, καὶ ἰχθύος ὄζον, ὃ δὴ πλεῖστον ἐπὶ τῶν λίθων εὑρίσκεται. τὸ δὲ ἐξῆς κατὰ μὲν τὸ σχῆμα περυγίῳ ὀφθαλμικῷ ἢ σπόγγῳ ἔοικε κοῦφόν τέ ὅτι καὶ πολύκενον, καὶ φυκώδη ἀποφορὰν ἔχον. τὸ δὲ τέτταρτον σκωληκοειδὲς ὑπάρχει τῷ τύπῳ, καὶ τῇ χρόᾳ πορφυρώτερον, ὃ τινες μιλήσιον καλοῦσι. τὸ τέταρτον δὲ ἐείοις οἰσυπηροῖς ὅμοιον, πολύκενον, κοῦφον. τὸ δὲ πέμπτον ἔοικε μὲν κατὰ σχῆμα μύκητι ἄνοσμόν τέ ὅτι καὶ τραχὺ, ἔνδοθεν μὲν κισήρει κατά τι ἐοικὸς, ἔξωθεν δὲ λεῖον, δ'ριμὺ, ὃ πλεῖστον ἐν τῇ προποντίδι κατὰ τὴν καλουμένην βέσβικον νῆσον γίνεται, ὃ ἐπιχωρίως ἅλὸς ἄχνην καλοῦσι· τούτων τὸ μὲν πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον, εἰς σμήγματα παραλαμβάνει γυναικῶν, καὶ πρὸς φακὸς, λειχῆνάς τε καὶ λέπρας ἀλφούς τε καὶ μελανίας καὶ σίπλους τοὺς ἐπὶ προσώπου καὶ τοῦ λοιποῦ σώματος. τὸ

serpétiũ canúmq; morsibus illitus ex aceto medetur: cruſtas obducétibus medicamẽtis admiſcetur. Fit ex eo lixiuiũ cõtra præcipitationes, & fungorũ venena, cũ aceto ſale & melle.

Alcyoniũ. Cap. CXXXVI.

Alcyonij quinque eſſe genera compertum eſt: vnum enim ſpiſſum, acerbi ſaporis, ſpongioſa facie, item tetri odoris, ponderoſum, & piſcem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterũ pinnulæ oculorum aut ſpongiæ ſimile, fiſtuloſum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Mileſium quidam vocant. Quartum ſuccidis velleribus non diſſimile, multis inanitatibus, hians, leue. Quintum figura fungi, ſine odore, aſperum, parte interna quodam modo pumicoſum, foris læue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta inſulam Beſbicon appellatum gignitur, patrio nomine halos achnen vocant. Duo priora in fœminarũ ſmegmata aſſumuntur contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie reliquóque corpore.

Tertium iis qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est: in alia smegmata, psilothráque assumitur, cum sale mistum. Si quisquã alcyonium cremare velit, cum sale in crudũ fictile mittat, & obliniés vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur vt cadmia.

τὸ δὲ τέτον ἐυθετεῖ πρὸς δυσουρούντας καὶ ἀμμώδη συλλέγοντας ἐν τῇ κύστει· καὶ πρὸς νεφριτικοὺς, πρὸς ὕδρωπα, σπλῆνα. κἂν ᾖ καὶ καταπλαθὲν σὺν οἴνῳ, ἀλωπικίας διασώει. τὸ δ' ὕστατον ὀδόντας λευκαίνειν δύναται. παραλαμβάνεται δὲ καὶ πρὸς ἄλλα σμήγματα καὶ ψίλωθρα μιγνύμενον σὺν ἁλὶ. καῦσαι δέ τι τούτων βουλόμενος, μεθ' ἁλῶν εἰς ὠμιλῶ χύτραν ἔμβαλε, καὶ πειαλείψας τὸ στόμα αὐτῆς πηλῷ, δὸς εἰς κάμινον, ὅταν δὲ ὀπτηθῇ ὁ κέραμος αὐτῆς, ἀνελόμενος ἀπόθου καὶ χρῶ. σπλώεται δὲ ὡς ἡ καδμεία.

Adarces. Cap. CXXXVII.

Fit in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta salsilago, humidis & palustribus locis ficcitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Περὶ Ἀδάρκου. Κεφ. ρλζ'.

Ὁ δὲ θεσσαλορευόμενος ἀδάρκης, γίνεται μὲν ἐν γαλατίᾳ· ἔστι δὲ, ὥσπερ ἐπίπαγος ὑφαλμυρίζων, καθ' ὑγρῶν καὶ τελματωδῶν τόπων ἐν ξηρασίᾳ ἐπιγινόμενος, καὶ θειπηγύμενος καλάμοις καὶ χορταρίοις, ἔοικε δὲ τὴν χρόαν λίθου ἀσίας, τῷ δὲ ὅλῳ τύπῳ ἀλκυωνίῳ τῷ μαλακῷ, καὶ πολυκένῳ, καὶ ἔστιν οἱονεὶ λιμναῖον ἀλκυόνιον. ἐυθετεῖ δὲ πρὸς ἐκδορὰν λεπρῶν καὶ ἐφηλίδων καὶ λειχήνων, καὶ φακῶν, καὶ τῶν ὁμοίων· καθόλου δ' ὅτι δριμύ. καὶ μετασυγκριτικὸν, ὠφελεῖ καὶ ἰσχιαδικούς.

Spongiæ.

Περὶ

Περὶ Σπόγγων. Κεφ. ρλή.

Τῶν δὲ σπόγγων τοὺς μὲν ἄῤῥενας ἐκάλεσάν τινες λεπτοτρήτους καὶ πυκνοὺς ὄντας· ὧν τοὺς σκληροτέρους τράγους ὠνόμασαν. τοὺς δὲ, θήλεις οἱ ἐναντίως τοῖς προειρημένοις διάκειν(ται). καῦσιν δ' ἔχουσι τὴν αὐτὴν ἀλκυονίῳ. ὁ καινὸς δὲ καὶ ἄλιπης, τραυματικός τέ ἐστι καὶ οἰδήματα στέλλει· καὶ τὰ νεότερα τὰ κολλᾷ σὺν ὕδατι ἢ ὀξυκράτῳ· σὺν μέλιτι δὲ ἑφθῷ παλαιοὺς κόλπους παρακολλᾷ. ὁ δὲ παλαιὸς ἄχρηστος. διαστέλλουσι δὲ καὶ μεμυκότα ἕλκη, καὶ τύλους ἀποδεσμούμενοι λίνῳ καὶ αὐτοὶ ξηροὶ παρεντιθέμενοι ὥσπερ μότα, τὰ δὲ ῥευματικὰ ὑπόνομα καὶ χρόνια ἕλκη, ἐξικμάζουσιν ἐπιτιθέμενοι ἄνικμοι νέοι καὶ καινοί· ἐπέχουσι δὲ καὶ αἱμοῤῥαγίαν. σὺν ὄξει δὲ κεκαυμένοι, πρὸς ξηροφθαλμίας, καὶ ὅπου δεῖ σμῆξαί τι, ἢ στύψαι. βέλτιον δὲ ποιοῦσι πλυθέντες εἰς τὰ ὀφθαλμικά. σὺν δὲ πίσσῃ καέντες πρὸς αἱμοῤῥαγίαν ἁρμόζουσι. λευκαίνονται δὲ αὐτῶν οἱ ἁπαλώτατοι ἐν τοῖς* καύμασι, βρεχόμενοι τῇ ἐπὶ τῶν πετρῶν συνισταμένῃ ἁλὸς ἄχνῃ, καὶ ἡλιαζόμενοι, ἐπιβλεπέτω δὲ τὸ μὲν κοῖλον αὐτῶν ἄνω, κάτω δὲ ἡ ἀποτομή. εἰ δὲ εἴη αἰθρία θερεία καὶ ὑπὸ τὴν σελήνην τίθενται βρεχόμενοι ἁλὸς ἄχνῃ θαλάσσῃ, γίνονται δὲ λευκότατοι οἱ τοιοῦτοι.

Περὶ Κο-

Spongiæ. Cap. CXXXVIII.

E ſpongiis alias mares appellauere, tenui fiſtula, ſpiſſas: quarũ duriores tragos nominarũt. Fœminas auté, quæ contrarias dotes habẽt. Vruntur eæ vt alcyoniũ. Recentes ſine pinguetudine, vulnerariæ ſunt, & tumores reprimunt: recẽtia vulnera ex aqua poſcáve cõglutinant: veteres ſinus ex decocto melle iungũt. Vetuſtæ auté inutiles. Aridæ ligatæ lino, ſi penicilli modo adigãtur, occluſa vlcera, callóſq; laxant, ſiccę recentes & vacuæ ſenilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim excedũt, impoſitu ſiccant: ſanguinis profluuiũ ſiſtũt. Crematarũ cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & vbi q̃d abſtergere, aut adſtrĩngere op⁹ eſt. Vtilius, in oculorũ medicamẽtis lauare cinerem. Omniũ cinis cũ pice crematarũ, profluẽtem ſanguinẽ ſiſtit. Cãdidę cura fiũt, è molliſsimis recẽtes, per ęſt⁹ tinctę ſalis ſpuma, quę petris cohæret: inſolãtur inuerſæ, hoc eſt, parte caua ſurſum ſpectãte, & qua abſciſſę fuerũt, deorſum. Si verò æſtiua ſerenitate ad lunã ſternanť, perfuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximũ cãdoré referẽt.

Coralliũ. Cap. CXXXIX.

Coralliũ, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinũ esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atq; emergit, tanquam offuso aëre protinus cõcrescat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in ꝓmontorio cui Pachyno nomẽ est. Laudatissimum, rubens, colore antherici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cedens, æquabili vsquequaque concremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quàm ramosissimũ, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autẽ in lapidis duritiã coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: excrescentia coërcet: oculorũ cicatrices abstergit: vlcerũ caua, & cicatrices explet: contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est, vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

Περὶ Κοραλλίου. Κεφ. ρλθ'.

Τὸ δὲ κοράλλιον ὅ τινες ἔνιοι λιθόδενδρον ἐκάλεσαν, δοκεῖ μὲν εἶναι φυτὸν ἐνάλιον, σκληροποιεῖσθαι δὲ ὅταν ἐκ τοῦ βυθοῦ ἐξαιρεθῇ, ἔξαλον γινόμενον, καὶ βαπτόμενον ἤτοι πηγνύμενον ὥσπερ ὑπὸ τοῦ περικεχυμένου ἡμῖν ἀέρος. εὑρίσκεται δὲ πλεῖστον ἐν τῷ κατὰ Συρακούσας ἀκρωτηρίῳ τῷ καλουμένῳ Παχύνῳ. ἄριστον δέ ἐστι τὸ πυῤῥὸν τῇ χρόᾳ καὶ ἐμφερὲς ἀνθερικῷ χρώματι, ἢ σάνδυκι κατακορεῖ, εὔτριβές τε ὡσαύτως, καὶ ὁμαλὸν δι' ὅλης τῆς συγκρίσεως, ἔτι δὲ ὀσμὴν βρυώδη καὶ φυκίοις ἐμφερῆ ἔχον. πρὸς δὲ τούτοις πολύοζον καὶ κινναμωμίζον τῷ τύπῳ τῶν θαμνίσκων. τὸ δὲ λιθῶδες τῇ συγκρίσει καὶ τῇ χρόᾳ ψαφαρὸν, σεσηραγγωμένον τε καὶ χαῦνον, φαῦλον οἰητέον εἶναι. στύφει δὲ τῇ δυνάμει καὶ ψύχει ἐπιεικῶς. καταστέλλει δὲ τὰ ὑπερέχοντα· καὶ οὐλὰς σμήχει τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς πληροῖ δὲ καὶ κοιλώματα καὶ οὐλάς· πρός τε αἵματος ἀναγωγὰς ἱκανῶς ἐνεργεῖ, καὶ δυσουροῦσιν ἁρμόζει. καὶ σπλῆνα τήκει σὺν ὕδατι πινόμενον.

Antipathes. Cap. CXL.

Quod antipathes vocãt, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Περὶ Ἀντιπαθοῦς. Κεφ. ρμ'.

Καὶ τὸ καλούμενον δὲ ἀντιπαθὲς, κοράλλιον οἰητέον ὑπάρχειν, εἰδικὴν ἔχον διαφοράν. ἔστι δὲ τῇ μὲν χρόᾳ μέλαν, δενδρίζον δὲ καὶ αὐτὸ καὶ ὀζῶδες μᾶλλον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῷ προειρημένῳ.

Περὶ Φρυγίου λίθου. Κεφ. ρμά.

Λίθος φρύγιος, ᾧ οἱ βαφεῖς ἐν φρυγίᾳ χρῶνται, ἔθεν καὶ ὀνόμασται, γίνεται ἐν καππαδοκίᾳ. ἄριστος δ' ἐστὶν ὁ ὠχρὸς καὶ μέσως βαρύς, οὐκ εὔτονος τῇ συγκρίσει τοῦ σώματος, ἔχων ἢ διαφύσεις λευκὰς ὡς καδμεία. καίεται δ' ὁ λίθος οὕτω· βρέξας αὐτὸν καλλίστῳ οἴνῳ, διατρήσας ἔγκρυφον ἀνθρακιᾷ καὶ εἰσπίζε συνεχῶς, ἕως δὲ μεταβάλλῃ τὸ χρόαν κιρρότερος γινόμενος, ἐξελὼν αὐτὸν τῷ αὐτῷ * σθένοντι οἴνῳ. καὶ πάλιν εἰς τὸν ἀνθρακιὰν ἀποτίθεμενος τὰ αὐτὰ ποίει. καῦε δὲ αὐτὸν ἐν τέτρῳ, προσέχων μὴ θρυῇ καὶ ἀπαστολωθῇ. δύναμιν δὲ ἔχει ὠμὸς ἡ καὶ καυστικὸς συμπλικὴν ἐνεργῶς, ἔτι δὲ ἀναξηραντικὴν καὶ ἐκκαθαρτικὴν ποσῶς, καταπλασμάτων τε ἰατικὴν σὺν κηρωτῇ. πλύνεται δὲ ὡς ἡ καδμεία.

Phrygius lapis. Cap. CXLI.

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia vtuntur, à qua nomẽ accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, vt in cadmia. Vritur autem vino optimo perfusus, viuisque carbonibus obrutus, perflatur assiduè follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: attendendum tamẽ, ne minutim cõfringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo vstóque adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas quadamtenus inducit, ambustis cum cerato medetur. Lauatur vt cadmia.

Περὶ Ἀσίου λίθου. Κεφ. ρμβ'.

Ἄσιον ἢ λίθον παραπλήσιον τὸν κισηρώδη τῷ χρόᾳ, χαῦνόν τε καὶ κῶφον, ἔτι ἢ εὐθρυβῆ καὶ διαφύσεις μικίνας ἔχοντα διὰ βάθος. τὸ δ' ἄνθος ἀπὸ ὅτου ἐστὶν ἐφιζάνουσα ἐπίξανθος ἀλωεὶς τῇ ὄσφρησει λεπτὴ, τῇ δὲ χρόᾳ τὸ μὺτοι λευκόν ὅτι, τὸ δὲ πεποικὸς κισήρει, ὅτι τὸ μύλινον τεθραμμένον προσαλόμενόν τε τῇ γλώττῃ δάκνει ποσῶς.

Asius lapis. Cap. CXLII.

Asius lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles venas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, salsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in aliis pumici simili, ad luteũ vergente: admotus linguæ aliquãtum mordet.

Δύνα-

Vim habet vterque adſtrictoriam, & modicè erodentem: admiſtus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula diſcutit. Longe validior flos exiſtimatur. De cętero ſiccatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnantia ſanat: excreſcentia cohibet, tetráque vlcera & fungis ſimilia, cum melle expurgat: vlcerum caua explet, & expurgat cum melle: depaſcentiaque cum cerato ſiſtit. Fit cataplaſma ex eo podagris, miſto fabæ lométo: & lienoſis, ex aceto & viua calce. Prodeſt flos ex melle phthiſicis linctu. Podagrici iuuantur, pedibus in ſolio ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoque pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum craſsitiem abſumũt, cum vice nitri in balneo ſparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Pyrites. Cap. CXLIII.

PYRITES lapidis genus eſt, à quo æs conflatur. Eligi debet æris ſimilitudine, facile ſcintillas ædens. Vritur ſic: Melle irrigatus molli pruna continuò flatur follibus, donec

Δύναμιν δὲ ἔχει ἑκάτερον στυπτικὴν, σηπτικὴν ἡσυχῆ, καὶ διαφορητικὴν φυμάτων τερεβινθίνῃ ἀναλαμβανόμενον ῥητίνῃ ἢ ὑγρᾷ πίσσῃ. εὐτονώτερον δὲ τὸ ἄνθος ἡγητέον. ἐκ περισσοῦ δὲ τοῦτο ξηραινόμενον, τὰ παλαιὰ καὶ δυσκατούλωτα ἕλκη ἰᾶται· καταστέλλει δὲ τὰ ὑπερσαρκοῦντα καὶ ἀνακαθαίρει σὺν μέλιτι, τὰ μύκησιν ὅμοια καὶ θηριώδη· πληροῖ δὲ καὶ τὰ κοῖλα τῶν ἑλκῶν καὶ ἀνακαθαίρει σὺν μέλιτι· καὶ τὰ νεμόμενα δὲ ἵστησι μιγὲν κηρωτῇ. καὶ ποδαγρικοῖς ἐν καταπλάσματι μετ᾽ ἐρέγμου· καὶ σπληνικοῖς μετ᾽ ὄξους καὶ ἀσβέστου. ἐκλειχόμενόν τε τὸ ἄνθος μετὰ μέλιτος φθισικοὺς ὠφελεῖ. κατασκευάζονται δὲ καὶ πύελοι ἐκ τοῦ λίθου, εἰς ἃς οἱ ποδαγρικοὶ τοὺς πόδας ἐντιθέντες ὠφελοῦνται. καὶ σαρκοφάγοι γίνονται. ἰσχναίνουσι τὰ πολύσαρκα καὶ παχέα σώματα, καταπλαττόμεναι ἀντὶ νίτρου ἐν βαλανείῳ. ἐὰν δέ τις πλῦναι θέλῃ τὰ προγεγραμμένα, πλυνέτω ὡς τὴν καδμείαν.

Περὶ Πυρίτου λίθου. Κεφ. ρμγʹ.

Πυρίτης εἶδός ἐστι λίθου, ἀφ᾽ οὗ χαλκὸς μεταλλεύεται· ληπτέον μέν τοι τὸν χαλκοειδῆ, εὐχερῶς δὲ σπινθῆρας ἀφιέντα. καυστέον δὲ τρόπῳ τοιούτῳ. μέλιτι δεύσας αὐτὸν, ἔνθες εἰς ἀνθρακιὰν μαλακὴν, καὶ ῥι-

καὶ ῥίπζε συνεχῶς, ὡς ἂν τὸν χρόαν κιρρὸς χρόνται. ἔνιοι δὲ εἰς πολλὰς ἡμ πυρωμένους ἀνθρακας ἀποτίθενται ἱκανῶς βεβρεγμένον τῷ μέλιτι τὸν λίθον. ὅταν δὲ μέλλῃ βέπεσθαι ἐπὶ τὸ κιρρὸν ἀναιρεσῶν· καὶ ἀποφυσήσαντες ἀποδῶν, πάλιν καίουσι διάβροχον, ἕως ἂν φαιοτέρος γένηται ὅμαλῶς· πολλάκις δὲ μόνον ἐπικαίουσι τὸν ἐπιφάνειαν. ὕστερον δὲ ἀποκαύσαντες καὶ ξηράναντες ἀποτίθενται. ἰσχὺν δὲ πυρωμένου χρεία ὑπάρχει, πλυτέον ὡς καθαρείαν. δύναμιν δὲ ἔχει κεκαυμένος καὶ ὁμοῦ θερμαντικὴν, σμηκτικὴν, ἀποκαθαρτικὴν τῶν ἐπισκοτούντων τοῖς ὄμμασι, διαφορητικήν τε καὶ πεπτικὴν σκληρωμάτων. ἀναληφθεὶς δὲ ῥητίνῃ κατασέλλει τὰ ὑπερσαρκοῦντα μετὰ ποσῆς θερμασίας καὶ ξύσεως. καλοῦσι δὲ ἔνιοι τὸν ὕπτιον καίοντα διφρυγές.

donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiiciũt, & vbi ad fuluum colorem vergere cœperit, extrahunt: efflatóque cinere, rursus madefactum cremant, donec æqualiter asicatus, friabilis reddatur: siquidem sæpe facies summa solùm vritur. Ita crematus, siccatúsque, reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet vt cadmia. Tam crudi quàm vsti vis est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias cõ coquere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne cohibet, sed calorem quédam & adstrictioné parit. Ita vstum nonnulli diphryges appellãt.

Περὶ Αἱματίτου λίθου. Κεφ. ξμθ'.

Hæmatites. Cap. CXLIIII.

Αἱματίτης ὁ λίθος ἄριστός ἐστιν ὁ εὐθρυπτος μὲν καὶ κατακοπὴν, ἤτοι μέλας, ἐν ἑαυτῷ δὲ σκληρὸς, καὶ ὁμαλὸς, ἀνεπίμικτος ῥυπαρείας τινὸς ἢ διαζωμάτων. Δύναμιν δὲ ἔχει συστολικὴν, θερμαντικὴν ποσῶς, καὶ λεπτωτικὴν καὶ σμηκτικὴν ἕλκων τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ τραχωμάτων σὺν μέλιτι· σὺν δὲ γάλακτι γυναικείῳ πρὸς

Hæmatites optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suopte ingenio æqualis, nulla sorde admista, nullóque zonarum discursu. Vim habet adstringentẽ, & excalfactoriam aliquãtum extenuantémque: oculorũ cicatrices, & scabritiã cum melle purgat, cum lacte autẽ muliebri, lippitudini,

lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit: bibitur cótra difficultatem vrinæ, & fluxiones mulierum in vino: & ab iis qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coticulæ & collyria oculorum vitiis apta. Vritur vt Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sût qui hæmatiten ita adulterãt. Densam glebam rotundámq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui feruẽtem cinerem contineat, condunt, paucáque interiecta mota eximunt, experiuntúrque si trita ad cotem hæmatitæ colorem reddat: quòd si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruunt, & subinde cõspicientes, periculum faciunt: siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffundi-tur. Coarguitur malè confictus, primum scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hæmatites lóge secus se in colore habet: nanque hic floridum reddit: hæmatites verò saturatiorem, atq; cinnabarin imitantẽ.

Inuenitur

πρὸς ὀφθαλμίας καὶ ῥήξεις, καὶ ὑφαίμους ὀφθαλμούς. πίνεται δὲ σὺν οἴνῳ πρὸς δυσουρίαν καὶ ῥοϊκὰς. καὶ πρὸς αἵματος πτύσεις σὺν χυλῷ ῥοιᾶς. γίνεται δὲ καὶ κολλύρια ἐξ αὐτῆς καὶ ἀκόνια πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς πάθη ἐπιτήδεια. κρίνεται δ' ἐμφερῶς τῷ φρυγίῳ λίθῳ τῷ οἴνου στερημένου. μέτριον δὲ ἔστω τῆς καύσεως τὸ ἡδύνθαι αὐτὸν μέσως κεῦφον καὶ πεπεμφολυγωμένον. ἀλοῦσι δέ τινες τὴν θερμασμένην ὕστερον ἀσβόλην τῆς ξύλου χρυσοῦ λίθου πυκνόν τε καὶ στρογγύλον, τοιαῦται δ' εἰσὶν αἱ λεγόμεναι ῥίζαι αὐτῆς, εἰς κεκαυμένην χάραν ἔχουσαν θερμασθεῖσαν θερμὴν ἐγκρύπτουσιν, εἶτα διαλιπόντες, μικρὸν ἀναμενοῦσιν, καὶ ἐπ' ἀκόνης τρίβοντες δοκιμάζοντες, εἰ πρὸς τὸ αἱματίτου χρόαν ἀπείληφεν· ἂν μὲν οὕτως ἔχῃ, ἀποτίθενται· εἰ δὲ μὴ πάλιν ἐγκρύπτουσι, συνεχῶς ἐπορῶντες καὶ δοκιμάζοντες· ἀπειθεῖς γὰρ ὄντος τὸ ἀποδιῦ μεταβάλλει τῷ χρώματι, ἔπειτα διαχεῖται. ἀπολύεται δὲ ὁ κεκοτιγμένος πρῶτον μὲν ταῖς διαφύσεσι· ὁ μὲν γὰρ εἰς κτήδονας ἐπ' εὐθείας ἀποκλᾶται· ὁ δ' αἱματίτης οὐχ οὕτως ἔχει τὸ τῆς χρόα· ὁ μὲν γὰρ εὐανθῆ ἀνίησιν· ὁ δὲ αἱματίτης βαθυτέραν καὶ τῷ κινναβάρει ἐοικυῖαν,

εἰσέχει

εὑρίσκεται δὲ καὶ ἐν τῇ σινωπικῇ μίλτῳ, καὶ ἐκ τῆς μαγνήτιδος πέτρας καλουμένης ἐφ' ἱκανὸν, κατασκευάζει δὲ αὐτὸ τύπος. ὁ δὲ αὐτοφυὴς ἐν αἰγύπτῳ μεταλλεύεται.

Περὶ Σχιστοῦ λίθου. Κεφ. ϛμέ.

Σχιστος δὲ λίθος γίνεται μὲν ἐν τῇ κατ' ἐπάρατον ἰβηρίᾳ. ἄριστος δὲ εἶναι δοκεῖ ὁ παραφροντίζων τῇ χρόᾳ, εὐθρυπτὸς δὲ καὶ εὔχρηστος ὡς ἐν ἑαυτῷ. ἔοικε δὲ τὰ σωθέντα ἕνεκεν καὶ τὰ ἀλληλοχίας τῶν κτηδόνων αὐτῷ ἀμμωνιακῷ ἁλί. Δύναμιν δὲ τὴν αὐτὴν τῷ αἱματίτῃ εἰσφέρει, τῇ εὐτονίᾳ μόνον λείπόμενος αὐτοῦ. πληροῖ δὲ καὶ κοιλώματα γυναικεῖα διεθεῖς γάλακτι, καὶ ῥοὰς ῥήξις καὶ ἀποπώσεις, ἔτι δὲ παχύτητας βλεφάρων καὶ φαυλώματα λίαν ἐνεργεῖ.

Περὶ Γαγάτου λίθου. Κεφ. ϛμέ.

Τοῦ δὲ γαγάτου τὸ κριτίνον τὸν ταχέως ἐξαπτόμενον, καὶ ἀσφαλτίζοντα τῇ ὀσμῇ· μέλας δὲ κοινῶς ὑπάρχει καὶ αὐχμηρὸς, ἔτι δὲ πλακώδης καὶ κοῦφος ἄγαν. Δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν καὶ διαφορητικήν. ἔστι δὲ καὶ ὑπνωτικῶν ἔλεγχος ὑποδυόμενος, καὶ ὑστερικὰς ἀνακαλεῖται· διώκει δὲ καὶ ἑρπετὰ θυμιασθεὶς καὶ ποδαγρικῆς καὶ ἀκόπτοις μίγνυται. διαίνεται δὲ ἐν κιλικίᾳ κατά τινα ποταμοῦ εἴσριον εἰς θάλασσαν ἐκχεόμενον, ἔστι

Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnete lapide, vehementer ambusto. In Ægypro sponte naturæ cum metallis enascitur.

Schistus lapis. Cap. CXLV.

Schistus lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatur maximè qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno cohærētium venarum discursu pectinum modo, ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiorem. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus: ad pcidentia, rupta, item genarum crassitiem, & vuas oculorum, magnopere efficax est.

Gagates. Cap. CXLVI.

IN Gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit: niger est plerunque, & squallidus, crustosus, perquàm leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi: deprehendit sonticum morbum suffitus, recreátque vuluæ strangulationes: fugat serpentes nidore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proximè

sin aliter, iterum vrito, vsquedũ vehementer inalbuerint. Dein vbi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile nouũ cõiicito, & exactè pannis operiẽs, noctẽ vnam cõquiescere sinito: mane eã extrahẽs, vbi perfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è littoralibus calculis igne crematis, necnon è vili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in cõmune ignea, mordens, adurẽs, & crustas inducens: quibusdam aliis immista, vt adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit & dissipat: vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. Cap. CXXXIIII.

Gypsum vim habet adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones sudoresque cohibet: sed potum, strangulationis modo iugulat.

Sarmentitius cinis.
Cap. CXXXV.

Sarmentorum cinis vrendi vim habet: cum axungia autem vel oleo illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest: cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimit: serpen

εἰ δὲ μὴν, πάλιν ἡ ἄχνις αὖ ἰκανῶς λευκανθῇ. εἶτα ἀποβάλας αὐτὰ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ἐμβαλὲ εἰς χύτραν καινὴν, καὶ σκεπάσας αὐτὰ ῥάκεσιν ὀπυελῶς, ἔασον ἐν ταῦτα νύκτα μίαν· πρωΐ δ' ἀνελόμενος ἀπλυφῆσαν τὸ πυτυλὲς τῆς κατεργασίας ἀποτίθεσο. σκευάζεται δὲ καὶ ἐκ λίθων κοχλάκων καμμιγῶν, ἢ ἐκ τῆς χυδαίας μαρμάρου, ἣ τις ἢ προκείνεται τῶν ἄλλων. Δύναμιν δὲ ἔχει πᾶσι κοινῶς ἄσβεστος συρωτικὴν, δηκτικὴν, καυστικὴν, ἐσχαρωτικήν· μιγνυμένη δὲ ποτῷ ἑτέρους ὡς στέαπι ἢ ἐλαίῳ, γίνεται ποτικὴ, μαλακτικὴ, διαπεπτικὴ, καταυλωτική. ἐνεργεῖ δὲ αὐτῆς ἡ πρώτη τὴν προειρημένην ἢ ἄβεσχον.

Περὶ Γύψου. Κεφ. ρλδ'.

Γύψος δύναμιν ἔχει συστολικὴν, ἐμπλαστικήν· αἱμορραγίας τε καὶ ἰδρώτων ἐφεκτικήν· ποθεῖσα δὲ πνίγει τῷ κατὰ πνιγμὸν τρόπῳ.

Περὶ Τέφρας κλιματίνης.
Κεφ. ρλέ.

Τέφρα κλιματίνη δύναμιν ἔχει καυστικὴν· σὺν ὀξυγγίῳ δ' ἢ ἐλαίῳ καταπλασθεῖσα, θλάσματα νεύρων καὶ ἄρθρων λυγίσματα καὶ συστροφὰς νεύρων ὠφελεῖ· σὺν νίτρῳ δὲ καὶ ὄξει σαρκώσεις ὀχέου στέλλει· κατα-

καταπλαθεῖσα δὲ σὺν ὄξει, ἐρπητόδηκτα καὶ κυνόδηκτα ἰᾶται· ἐχαροπικῶς τε μίγνυ). καὶ γίνεται ἡ ἐξ ἀυτῆς κονία θερὸς πῶμα τε, καὶ ψύκτρας σὺν ὄξει καὶ ἁλσὶ καὶ μέλιτι.

Περὶ Ἀλκυονίου. Κεφ. ρλϛ'.

Τοῦ δὲ ἀλκυονίου πέντε γνωστέον εἴδη ὑπάρχειν· τὸ μὲν πυκνόν ὅτι καὶ σφυδνὸν, καὶ τῷ ἰδεῖν ἀσυγχώδες, ἔτι δὲ βρωμῶδες * καὶ βαρύ, καὶ ἰχθύος ἔζον, ὃ δὴ πλεῖστον ὅπῃ τῶν ἠιόνων εὑρίσκεται. τὸ δὲ ἐξῆς κατὰ μὲν τὸ σῶμα περυγίῳ ὀφθαλμικῷ ἢ στόγγῳ ἔοικε κοῦφόν τέ ὅτι καὶ πολύκωνον, καὶ φυκώδη ἀποφορὰν ἔχον. τὸ δὲ τέτταρτον σκωληκοειδὲς ὑπάρχει τῷ τύπῳ, καὶ τῇ χρόᾳ πορφυρώτερον, ὃ τινες μιλήσιον καλοῦσι. τὸ τέταρτον δὲ ἐρίοις οἰσυπηροῖς ὅμοιον, πολύκερον, κοῦφον. τὸ δὲ πέμπτον ἔοικε μὲν κατὰ σῶμα μύκητι ἄνοσμόν τέ ὅτι καὶ τραχὺ, ἔνδοθεν μὲν κωνίμει κατά τι εἰκὸς, ἔξωθεν δὲ λεῖον, δριμὺ, ὃ πλεῖστον ἐν τῇ θεσπεντίδι κατὰ τὴν καλουμένην βέσβικον νῆσον γίνεται, ὃ ἐπιχωρίως ἅλος ἄχνην καλοῦσι· τούτων τὸ μὲν θερῶτον καὶ τὸ δεύτερον, εἰς σημήματα γυναικεῖα γ) γυναικῶν, καὶ θερὸς φακὰς, λεκχῆναί τε καὶ λέπρας ἀλφούς τε καὶ μελανίας καὶ σπίλους τοὺς ὅπῃ θερσότητι καὶ † λοιπῇ σώματος.

serpétiũ canúmq; morsibus illitus ex aceto medetur: crustas obducétibus medicamétis admiscetur. Fit ex eo lixiuiũ cótra præcipitationes, & fungorũ venena, cũ aceto sale & melle.

Alcyoniũ. Cap. CXXXVI.

Alcyonij quinque esse genera compertum est: vnum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in littoribus inuenitur. Alterũ pinnulæ oculorum aut spongiæ simile, fistuloſum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus, hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo pumicosum, foris læue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatum gignitur, patrio nomine halos achnen vocant. Duo priora in fœminarũ smegmata assumuntur contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie reliquóque corpore.

Tertium iis qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est: in alia smegmata, psilothráque assumitur, cum sale mistum. Si quisquã alcyonium cremare velit, cum sale in crudũ fictile mittat, & obliniés vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur vt cadmia.

Adarces. Cap. CXXXVII.

Fit in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta salsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

τὸ δὲ πέπον εὐθετεῖ πρὸς δυσουρούντας καὶ ἀμμώδη συλλέγοντας ἐν τῇ κύστει· καὶ πρὸς νεφρικούς, πρὸς ὕδρωπα, σπλῆνα. καὶν ᾖ καὶ καταπλαθὲν σὺν οἴνῳ, ἀλωπεκίας δασύει. τὸ δ' ὕστατον ὀδόντας λευκαίνειν δύναται. παραλαμβάνεται δὲ ἐν πρὸς ἄλλα σμήγματα καὶ ψίλωθρα μιγνύμενον σὺν ἁλσὶ. καῦται δέ τι τούτων βουλόμενος, μεθ' ἁλῶν εἰς ὠμιλὺ χύτραν ἔμβαλε, ἐν πελειαλείψας τὸ στόμα αὐτῆς πηλῷ, δὸς εἰς κάμινον, ὅταν δὲ ὀπτηθῇ ὁ κέραμος αὐτῆς, ἀνελόμενος ἀπόθου καὶ χρῶ. πλύνεται δὲ ὡς ἡ καδμεία.

Περὶ Ἀδάρκου. Κεφ. ρλζ'.

Ὁ δὲ παρακορευόμενος ἀδάρκης, γίνεται μὲν ἐν γαλατίᾳ· ἔστι δέ, ὥσπερ ἐπίπαγος ὑφαλμυείζων, καθ' ὑγρῶν ἐν τελματωδῶν τόπων ἐν ξηρασίᾳ ἐπιγινόμενος, καὶ ἐμπηγνύμενος καλάμοις καὶ χορταίοις, ἔοικε δὲ πίνῃ χρόαν ἔχειν ἀσίας λίθου, τῷ δὲ ὅλῳ τύπῳ ἀλκυονίῳ τῷ μαλακῷ, καὶ πολυκύτῳ, καὶ ἔστιν οἱονεὶ λιμναῖον ἀλκυόνιον. εὐθετεῖ δὲ πρὸς ἐκδορὰς λεπρῶν καὶ ἐφηλίδων καὶ λειχήνων, καὶ φακῶν, ἐν τῶν ὁμοίων· καθόλου δ' ὅτι δριμύ. ἐν μεταγυκριτικὸν, ὠφελεῖ ἐν ἰσχιαδικούς.

Spongiæ.

Περὶ

Περὶ Σπόγγων. Κεφ. ρλή.

Τῶν δὲ σπόγγων τοὺς μὲν ἄρρενας καλέσαντί τινες λεπτοτρήτους καὶ πυκνοὺς ὄντας· ὧν τοὺς σκληροτέρους τραχέας ἀνόμασαν. τοὺς δὲ θήλεις οἱ ἰατροὶ τοῖς θερειναῖς μύσεσι διάκειν). καῦσιν δ' ἔχουσι καὶ αὐτὴν δηλωτικήν. ὁ κανὸς δὲ καὶ ἀδύπνους, τραυματικός τε ὢν καὶ οἰδήματα σέλλει· καὶ τὰ νεότρωτα κολλᾷ σὺν ὕδατι ἢ ὀξυκράτῳ· σὺν μέλιτι δὲ ἐφθῷ παλαιοῖς κόλποις παρακολλᾷ. ὁ δὲ παλαιὸς ἄζηκτος. διασέλλουσι δὲ καὶ μεμικότα ἔγκαυσι, καὶ τύλοις ἀποδεσμούμενοι λίνῳ καὶ αὐτοὶ ξηροὶ παραπιθέμενοι ὥσπερ μότα, τὰ δὲ ῥευματικὰ ὑπόνομα καὶ χρόνια ἕλκη, ἐξικμάζουσιν ὑπιθέμενοι αἴνικμοι νέοι καὶ κενοί· ἐπέχουσι δὲ καὶ αἱμορραγίαν. σὺν ὄξει δὲ κεκαυμένοι, πρὸς ἐπιφοραλμίας, καὶ ὅπου δεῖ σμῆξαί τι, ἢ σύλαι. βέλτιον δὲ ποιοῦσι πλυθέντες εἰς τὰ ὀφθαλμικά. σὺν δὲ πίσσῃ καέντες πρὸς αἱμορραγίαν ἁρμόζουσι. λευκαίνονται δὲ αὐτῶν οἱ ἀπαλώτατοι ἐν τοῖς *καύμασι, βρεχόμενοι τῇ ὑπὸ τῶν πέτρων σταζομένῃ ἁλὸς ἄχνῃ, καὶ ἡλιαζόμενοι, ὑπολεπτύνεται δὲ τὸ μὲν κοῖλον αὐτῶν ἄνω, κάτω δὲ ἡ ἀποτομή. εἰ δὲ εἴη αἰθρία θεία καὶ νοτὸ δὲ σελήνῃ πίπτοντι βρεχόμενοι ἁλὸς ἄχνῃ θαλάσσης, γίνονται δὲ λευκότατοι οἱ τοιοῦτοι.

Περὶ Κο-

Spongiæ. Cap. CXXXVIII.

E ſpongiis alias mares appellauere, tenui fiſtula, ſpiſſas: quarũ duriores tragos nominarũt. Fœminas autẽ, quæ contrarias dotes habẽt. Vruntur eæ vt alcyoniũ. Recentes ſine pinguetudine, vulnerariæ ſunt, & tumores reprimunt: recẽtia vulnera ex aqua poſcáue cõglutinant: veteres ſinus ex decocto melle iungũt. Vetuſtæ autẽ inutiles. Aridæ ligatæ lino, ſi penicilli modo adigãtur, occluſa vlcera, callóſq; laxant, ſiccę recentes & vacuæ ſenilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim excedũt, impoſitu ſiccant: ſanguinis profluuiũ ſiſtũt. Crematarũ cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & vbi q̃d abſtergere, aut adſtrĩngere op⁹ eſt. Vtilius, in oculorũ medicamẽtis lauare cinerem. Omniũ cinis cũ pice crematarũ, profluẽtem ſanguinẽ ſiſtit. Cãdidę cura fiũt, è molliſimis recẽtes, per q̃ſt⁹ tinctę ſalis ſpuma, quę petris cohæret: inſolãtur inuerſæ, hoc eſt, parte caua ſurſum ſpectãte, & qua abſciſſę fuerũt, deorſum. Si verò æſtiua ſerenitate ad lunã ſternant, perfuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximũ cãdoré referẽt.

Coralliũ. Cap. CXXXIX.

Coralliũ, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinũ esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atq; emergit, tanquam offuso aëre protinus cõeresçat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio cui Pachyno nomẽ est. Laudatissimum, rubens, colore antherici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cedens, æquabili vsquequaque concremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quàm ramosissimũ, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autẽ in lapidis duritiã coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: excrescentia coërcet: oculorũ cicatrices abstergit: vlcerũ caua, & cicatrices explet: contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est, vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

Antipathes, Cap. CXL.

Quod antipathes vocãt, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Phry-

Περὶ Κοραλλίου. Κεφ. ρλθ'.

Τὸ δὴ κοράλλιον ὃ καὶ ἔνιοι λιθόδενδρον ἐκάλεσαν, δοκεῖ μὲ εἶναι φυτὸν ἐνάλιον. στερροποιεῖσθαι δὲ ὅταν ἐκ τῆς βυθοῦ ἀνασπασθῇ, ἔξαυον γινόμενον, καὶ βαρύμενον ἤτοι πηγύμενον ὡς ἀπὸ τοῦ περιεχομένου ἠρῶν ἀέρος. ἐνεῖσθαι δὲ πλεῖστον ἐν τῷ λεγομένῳ συρακοσίῳ ἀκρωτηρίῳ τῷ καλουμένῳ πάχυνῳ. ἄριστον δέ ἐστι τὸ πυῤῥὸν τῇ χρόᾳ καὶ ἐμφερὲς ἀνθηρικῷ χρώματι, ὃ σαπύλυκι καταχορεῖ, εὐπειθές τε ὡσαύτως, καὶ δυσλὸν δι' ὅλης τῆς συγκρίσεως, ἔτι δὲ ἐσμὴν βρυώδη καὶ φυκίοις ἐμφερῆ ἔχον. πρὸς δὲ τούτοις πολύζον καὶ κινναμωμίζον τῷ τύπῳ τε θαυμάσιον. τὸ δὲ λιθῶδες τῇ συγκρίσει καὶ τῇ χρόᾳ ψαφερόν, στυφραγωγοῦν τε καὶ χαῦνον. φαῦλον οἰκτέον εἶναι. σύστασιν δὲ τῇ δυνάμει καὶ ἰδέαν ἐπικαῖς. καταστέλλει δὲ τὸ ὑπάρχοντα καὶ ὕλας συμπέχει τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς πληγὰς καὶ κοιλώματα καὶ ὕλας· αἱμάτων τε ἀναγωγὰς ἱκανῶς ἐνεργεῖ, καὶ δυσουρίαν αἱρεῖ. καὶ σπλῆνα πάσχει σὺν ὕδατι πινόμενον.

Περὶ Ἀντιπαθοῦς. Κεφ. ρμ'.

Καὶ τὸ καλούμενον δὲ ἀντιπαθὲς, κοραλλίου οἰκτέον ὑπάρχειν εἰδικὴν ἔχον διαφοράν. ἔστι δὲ τῇ μὲ χρόᾳ μέλαν, δενδρίζον δὴ καὶ αὐτὸ καὶ ἐζωδὲς μᾶλλον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῷ προγεγραμμένῳ.

Περὶ Φρυ-

Περὶ Φρυγίου λίθου. Κεφ. ρμά.

Λίθος φρύγιος, ᾧ οἱ βαφεῖς ἐν φρυγίᾳ χρῶνται, ὅθεν καὶ ὀνόμασται, γυνᾶται ἐν καππαδοκίᾳ. ἄριστος δ' ἐστὶν ὁ ὠχρὸς καὶ μέσως βαρύς, οὐκ εὔτονος τῇ συγκρίσει τοῦ σώματος, ἔχων ἢ διαφύσεις λευκὰς ἐς καδμείαν. κάεται δ' ὁ λίθος οὕτω· βρέξας ἀυτὸν καλλίστῳ οἴνῳ, διατρήσεις ἔγκυκλον ἄνθρακι, καὶ βίπτιζε συνεχῶς, ἐὰν δὲ μεταβάλλῃ τὴν χρόαν κιρρότερος γιγόμενος, ἐξέλκων αὐτὸν τῷ αὐτῷ * σβέσον οἴνῳ. καὶ πάλιν εἰς τὸν ἄνθρακας ἀποτίθεσο τὰ αὐτὰ ποίει. καῖε δὲ αὐτὸν ἐν τείτου, προσέχων μὴ ἐρυθρὸν καὶ ἀπασβολωθῇ. δύναμιν δ' ἔχει ὡμός τε καὶ κεκαυμένος συπτικὴν ἐνεργῶς, ἔτι δὲ αὐαντικὴν καὶ ἐκκαθαρτικὴν καὶ ἐκκαυστικὴν ποσῶς, καταπλασμάτων τε ἰατικὴν σὺν κηρωτῇ. σπλύεται δὲ ὡς ἡ καδμεία.

Περὶ Ἀσίου λίθου. Κεφ. ρμβ.

Ἄσιον ἢ λίθον παραλλήπτεον τὸν κισηρώδη τῇ χρόᾳ, χαῦνόν τε καὶ κοῖλον, ἔτι ἢ εὐθρυβῆ καὶ διαφύσεις μιλίνας ἔχοντα διὰ βάθους. τὸ δ' αὖθος αὐτοῦ ἐστιν ἡ ἐφιζάνουσα ὀπῇ ἄνθος ἀλυκὸν τῇ ὄπφα νείᾳ τῶν λίθων, τῇ μὲν συσάσει λεπτὴ, τῇ δὲ χρόᾳ τὸ μὲν ποτὶ λευκόν ἐστι, τὸ δέ τι ἔοικε κισήρει, ἐπὶ τὸ μίλτινον τεταμένον· προσαγόμενόν τε τῇ γλώττῃ δάκνει ποσῶς. Δύνα-

Phrygius lapis. Cap. CXLI.

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia vtuntur, à qua nomẽ accepit, naſcitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non ſolida corporis compage, intercedentibus albis ſegmentis, vt in cadmia. Vritur autem vino optimo perfuſus, viuiſque carbonibus obrutus, perflatur aſſiduè follibus, donec mutato colore rufeſcat: rurſus extractus eodem vino reſtinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: attendendum tamẽ, ne minutim cõfringatur, & in fuliginem euaneſcat. Vis crudo vſtóque adſtrictoria, expurgans: vlceribus cruſtas quadamtenus inducit, ambuſtis cum cerato medetur. Lauatur vt cadmia.

Aſius lapis. Cap. CXLII.

Aſius lapis aſſumi debet pumicis colore, leuis, fungoſus, item friabilis, ſciſsiles venas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, ſalſugo ſubflaua eſt, ſummo lapide inſidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in aliis pumici ſimili, ad luteũ vergente: admotus linguæ aliquãtum mordet.

Vim habet vterque adstrictoriam, & modicè erodentem: admistus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longe validior flos existimatur. De cętero siccatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnantia sanat: excrescentia cohibet, tetráque vlcera & fungis similia, cum melle expurgat: vlcerum caua explet, & expurgat cum melle: depascentiaque cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomēto: & lienosis, ex aceto & viua calce. Prodest flos ex melle phthisicis linctu. Podagrici iuuantur, pedibus in solio ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoque pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crasitiem absumūt, cum vice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Δώαμιν δὲ ἔχει ἑκάτερον συπλικὴν, σηπτικὴν ἰσυχῆ, καὶ διαφορητικὴν φυμάτων τερετζώδη ἐναναμβανόμβον ῥητίνῃ ἢ ὑγρᾷ πίσσῃ. ἐυτονώτερον δὲ τὸ ἄνθος ἠπτέον. ἐκ πλείονος δὲ τοῦτο ξηραινόμβον, τὰ παλαιὰ καὶ δυσκατούλωτα ἕλκη ἰᾶται· κατασθένει δὲ τὰ ὑπερσαρκοῦντα καὶ ἀναλαμβάνει σὺν μέλιτι, τὰ μύκητα ὁμοίως καὶ θηλειῶδη· πληροῖ δὲ καὶ τὰ κοῖλα τῶν ἑλκῶν καὶ ἀναλαμβάνει ζὺν μέλιτι· καὶ τὰ νεμόμβα ὑπὸ ἴσης μιχθὲν κηρωτῇ. καὶ ποδαγρικοῖς ἐν καταπλάσμασι μετ' ἐρέγμου· καὶ πλωσικοῖς μετ' ὄξους καὶ ἀσβέστου. ἐκλειχόμβου τι τὸ ἄνθος μετὰ μέλιτος φθισικοῖς ὠφελεῖ. κατασκευάζονται δὲ καὶ πύελοι ἐκ τοῦ λίθου, εἰς ἃς οἱ ποδαγρικοὶ τοὺς πόδας ἐνπηδῶντες ὠφελοῦνται. καὶ σαρκὸς σαρκοφάγοι γίνονται. ἰχναίνουσι τὸ πολύσαρκα καὶ παχέα σώματα, κατάπλασσόμβαι αὐτὴ νίτρου ἐν βαλανείῳ. ἐὰν δέ τις πλύνασθαι θέλῃ τὰ σεσηγμαμμένα, πλυνέτω ὡς πρὸς καδμείαν.

Pyrites. Cap. CXLIII.

PYRITES lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continuò flatur follibus, donec

Περὶ Πυείτου λίθου. Κεφ. ρμγ'.

Πυείτης εἶδός ἐστι λίθου, ἀφ' οὗ χαλκὸς μεταλλεύεται· λιπῆσον μὲν τοι τὸν χαλκοειδῆ, εὐχερῶς ὑπνοβῆρας ἀφιέντα. καυτέον δὲ πρόπυ τοιούτῳ. μέλιτι δεύσας αὐτὸν, ἔνδες εἰς αὐθρακιὰν μαλακὴν, καὶ φύ-

καὶ ῥίπτε σωτερῶς, ὡς ἂν τῷ χροιὰν κιρρὸς γένηται. ἔνιοι δὲ εἰς πολλὰς ἡμ πεπυρωμένους ἀνθρακας ἀποτίθενται ἱκανῶς βεβρεγμένον τῷ μέλιτι τὸν λίθον. ὅταν δὲ μέλλῃ βέπεσθαι ὑπὸ τὸ κιρρὸν ἀναζέσωσι. καὶ ἀποσυσσαντες τὸν λίθον, πάλιν καίουσι διάκροκον, ἕως ἂν ψαυστώτερος γένηται ὁμαλῶς. πολλάκις δὲ μόνον ὑπικαίεται τῷ ὑπιφανείαν. ὕστερον δὲ ἀποκαύσαντες καὶ ξηράναντες ἀποτίθενται. ἐὰν δὲ πεπυρωμένον χρεία ὑπάρχῃ, πλυτέον ὡς καλ μέλιτος. δύναμιν δὲ ἔχει κεκαυμένος καὶ ὁμῶς θερμαντικὴν, σηπτικὴν, ἀποκαθαρτικὴν τῶν ὑπισολύντων τὰς ὄψεσι, διαφορητικήν τε καὶ πεπτικὴν σκληρωμάτων. ἀναλυθεὶς δὲ ῥητίνῃ καταστέλλει τὰ ὑπερσαρκοῦντα μετὰ τροφῆς θερμασίας καὶ ξύλεως. καλοῦσι δὲ ἔνιοι τὸν ὕστερον καέντα διφρυγές.

donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiiciũt, & vbi ad fuluum colorem vergere cœperit, extrahunt: efflatóque cinere, rursus madefactum cremant, donec æqualiter asicatus, friabilis reddatur: siquidem sæpe facies summa solùm vritur. Ita crematus, siccatúsque, reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet vt cadmia. Tam crudi quàm vsti vis est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias cõ coquere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne cohibet, sed calorem quédam & adstrictioné parit. Ita vstum nonnulli diphryges appellãt.

Περὶ Αἱματίτου λίθου.
Κεφ. ϛμδ'.

Hæmatites. Cap. CXLIIII.

Αἱματίτης ὁ λίθος ἄριστός ὅταν ᾖ εὐθρυβὴς μὲν καὶ κατακορὴς, ἅπτοι μέλας, ἐν ἑαυτῷ δὲ σκληρὸς, καὶ ὁμαλὸς, ἀνεπίμικτος ῥυπαρείας τινὸς ἢ διαζωμάτων. Δύναμιν δὲ ἔχει συστικὴν, θερμαντικὴν τοσοῦτος, καὶ λειπωτικὴν καὶ σηπτικὴν ὕλων τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ τραχωμάτων σὺν μέλιτι· σὺν δὲ γάλακτι γυναικείῳ

Hæmatites optimus habetur friabilis, faturato colore niger, durus & suopte ingenio æqualis, nulla sorde admista, nullóque zonarum discursu. Vim habet adstringentẽ, & excalfactoriam aliquãtum extenuantémque: oculorũ cicatrices, & scabritiã cum melle purgat, cum lacte autẽ muliebri, lippitudini,

lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit: bibitur cótra difficultatem vrinæ, & fluxiones mulierum in vino: & ab iis qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coticulæ & collyria oculorum vitiis apta. Vritur vt Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sút qui hæmatiten ita adulterát. Densam glebam rotundámq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui feruétem cinerem contineat, condunt, paucáque interiecta mora eximunt, experiuntúrque si trita ad cotem hæmatitæ colorem reddat: quòd si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruunt, & subinde cóspicientes, periculum faciunt: siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confictus, primum scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hæmatites lóge secus se in colore habet: nanque hic floridum reddit: hæmatites verò saturatiorem, atq; cinnabarin imitanté. Inuenitur

πρὸς ὀφθαλμίας καὶ ῥήξεις, καὶ ὑφαίμους ὀφθαλμούς. πίνεται δὲ σὺν οἴνῳ πρὸς δυσουρίαν καὶ ῥοϊκάς. καὶ πρὸς αἵματος πτύσεις σὺν χυλῷ ῥοιᾶς. γίνεται δὲ καὶ κολλύρια ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀκόνια πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς πάθη ἐπιτήδεια. καίεται δ' ἐμφερῶς τῷ φρυγίῳ λίθῳ τοῦ οἴνου περιῃρημένου. μέτρον δὲ ἔστω τῆς καύσεως τὸ γενέσθαι αὐτὸν μέσως κοῦφον καὶ πεπομφολυγωμένον. δολοῦσι δέ τινες τὸν περιῃρημένον οὕτω· λαβόντες βῶλον σχιστοῦ λίθου πυκνόν τε καὶ στρογγύλον, τοιαῦται δέ εἰσιν αἱ λεγόμεναι ῥίζαι αὐτοῦ, εἰς κεραμίαν γάστραν ἔχουσαν θερμοσποδιὰν θερμὴν ἐγκρύπτουσιν, εἶτα διαλιπόντες μικρὸν ἀναιροῦνται, καὶ ἐπ' ἀκόνης τρίβουσι δοκιμάζοντες, εἰ τὴν τοῦ αἱματίτου χρόαν ἀπείληφε· κἂν μὲν οὕτως ἔχῃ, ἀποτίθενται· εἰ δὲ μὴ, πάλιν ἐγκρύπτουσι, συνεχῶς ἐφορῶντες καὶ δοκιμάζοντες· ἀφεθεὶς γὰρ ἐπιπολὺ ἐν τῇ σποδιᾷ, μεταβάλλει τῷ χρώματι, ἔπειτα διαχεῖται. ἀπελέγχεται δὲ ὁ κακοτεχνημένος πρῶτον μὲν ταῖς διαφύσεσι· ὁ μὲν γὰρ εἰς κτήδονας ἐπ' εὐθείας ἀποκλᾶται. ὁ δὲ αἱματίτης οὐχ οὕτως ἔχει ἐν τῇ χρόᾳ· ὁ μὲν γὰρ εὐανθῆ ἀνίησιν· ὁ δὲ αἱματίτης βαθυτέραν καὶ τῷ κινναβάρει ἐοικυῖαν, εὑρίσκεται

εὑρίσκεται δὲ καὶ ἐν τῇ σινωπικῇ μίλτῳ, καὶ ἐκ τῆς μαγνήτιδος πέτρας καιομένης ἐφ' ἱκανὸν, κατασκευάζεται αἱματίτης. ὁ δὲ αὐτοφυὴς ἐν αἰγύπτῳ μεταλλεύεται.

Περὶ Σχιστοῦ λίθου. Κεφ. ρμέ.

Σχιστὸς δὲ λίθος γεννᾶται μὲν ἐν τῇ κατὰ τὴν ἑσπέραν ἰβηρείᾳ. ἄριστος δὲ εἶναι δοκεῖ ὁ παρακροκίζων τῇ χρόᾳ, εὔθρυβής τε καὶ εὔσχιστος ὡς ἐν ἑαυτῷ. ἔοικε δὲ τῆς συνθέσεως ἕνεκεν καὶ τῆς ἀλληλουχίας τῶν κτηδόνων αὐτοῦ ἀμμωνιακῷ ἁλί. Δύναμιν δὲ τὴν αὐτὴν τῷ αἱματίτῃ εἰσφέρεται, τῇ εὐτονίᾳ μόνον λειπόμενος αὐτοῦ. πληροῖ δὲ καὶ κοιλώματα γυναικείῳ διεθεὶς γάλακτι, καὶ πρὸς ῥήξεις καὶ περιπτώσεις, ἔτι δὲ παχύτητας βλεφάρων καὶ σταφυλώματα λίαν ἐνεργεῖ.

Περὶ Γαγάτου λίθου. Κεφ. ρμς'.

Τοῦ δὲ γαγάτου προκριτέον τὸν ταχέως ἐξαπτόμενον, καὶ ἀσφαλτίζοντα τῇ ὀσμῇ· μέλας δὲ κοινῶς ὑπάρχει καὶ αὐχμηρὸς, ἔτι δὲ πλακώδης καὶ κοῦφος ἄγαν. Δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν καὶ διαφορητικήν. ἔστι δὲ καὶ ἐπιληπτικῶν ἔλεγχος ὑποθυμιαθεὶς, καὶ ὑστερικὰς ἀνακαλεῖται· διώκει δὲ καὶ ἑρπετὰ θυμιαθεὶς καὶ ποδαγρικοῖς καὶ ἀκόποις μίγνυται δυνάμεσι. γεννᾶται δὲ ἐν κιλικίᾳ κατά τινα ποταμοῦ εἰσρέον εἰς θάλασσαν ἐκχεομένου,

ἔστι

Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnete lapide, vehementer ambusto. In Ægypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

Schistus lapis. Cap. CXLV.

Schistus lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatur maximè qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno cohærétium venarum discursu pectinum modo, ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiorem. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus: ad procidentia, rupta, item genarum crassitiem, & vuas oculorum, magnopere efficax est.

Gagates. Cap. CXLVI.

IN Gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit: niger est plerunque, & squallidus, crustosus, perquàm leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi: deprehendit sonticum morbum suffitus, recreátque vuluæ strangulationes: fugat serpentes nidore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur,

proximè

proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

ἔστι δὲ πλησίον τῆς λεχριμψίης πολιχνείου. καλεῖται δὲ ὁ τόπος καὶ ὁ ποταμὸς γάγας, παρ' οὗ τῷ σώματι εὑρίσκονται οὗτοι οἱ λίθοι.

Lapis thracias. Ca.CXLVII.

LAPIS thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scytiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accédi, & oleo restingui: quod in bitumine accidit.

Περὶ Θρακίης λίθου. Κεφ. ρμζ'.

Ὁ δὲ λεχρίμψιος Θρακίας, γίνεται μὲν ἐν σκυθίῃ ἐν ποταμῷ τῷ λεχριμψίῳ πόντῳ. Δοκιμάζεται δὲ τὰ αὐτὰ τῷ γαγάτῃ. ἰσχναίνει δὲ ἐκκαίεσθαι μὲν αὐτὸ ὕδατι, σβέννυσθαι δὲ ὑπὸ ἐλαίου· ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἀσφάλτου γίνεται.

Magnes. Cap. CXLVIII.

Magnes lapis optimus est, qui ferrum facilè trahit, colore ad cœruleum vergente, densus, nec admodum grauis. Datur cum a qua mulsa, triũ obolorum pondere, vt crassos humores eliciat. Sũt qui magneté crematũ pro hęmatite vendãt.

Περὶ Μαγνίτου λίθου. Κεφ. ρμή.

Τοῦ δὲ μαγνίτου λίθου ἄριστός ἐστιν ὁ τὸν σίδηρον εὐχερῶς ἕλκων καὶ τῷ χρόᾳ κυανίζων, πυκνός τε καὶ οὐκ ἄγαν βαρύς. Δοκιμάζεται δὲ ἔχει πάχος ἀργυροῦν, διδόμενος μὴ μελικράτου πεπωκόλα βάρος. ἔνιοι δὲ τοῦτον καίοντες ἀντὶ αἱματίτου πιπράσκουσιν.

Arabicus. Cap. CXLIX.

Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat: eius cinis dentifricio optimus.

Περὶ Ἀραβικοῦ λίθου. Κεφ. ρμθ'.

Ὁ δὲ ἀραβικὸς λεχρίμψιος λίθος ἔοικεν ἐλέφαντος ὀστῷ. ὅτος λεῖος καταπλασθεὶς αἱμορροΐδας ἀποξηραίνει· ὀδόντων δὲ σμῆγμα γίνεται χρηστός.

Galactites. Cap. CL.

Galactites appellatur, quòd lacteum succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorũ fluxiones & vlcera cõueniéter illinitur. Oportet autem in aqua tritũ, pyxide

Περὶ γαλακτίτου λίθου. Κεφ. ρν'.

Ὁ δὲ γαλακτίτης ὀνόμασται, ἀπὸ τοῦ γάλακτος ὠδῆς ἀνίεναι. ἔστι μέν τοι τὸ χρῶμα ἐντροφὲς τοῦ χρόα, γλυκὺς δὲ τὸν γεῦσιν· ἁρμόζει δὲ πρὸς ὀφθαλμῶν ῥεύματα καὶ ἕλκεα ἐγχρίεται δὲ ὁμοίως· δεῖ δὲ βληθέντος αὐτοῦ ὕδατι ἀποπη-

πι ἀποπίθεσθαι ἐν πυξίδι μολιζδίνῃ διὰ τὸ δεῖ αὐτὴ κολλᾶσθαι.

Περὶ Μελιτίτου λίθου. Κεφ. ργά.

Ὁ δὲ μελιτίτης κατὰ πάντα ἔοικε τῷ γαλακτίτῃ· διαφέρων ἐν τῷ γλυκύτερον ἀγιέναι καὶ χυλόν. ποιεῖ δὲ πρὸς ἃ καὶ ὁ γαλακτίτης.

Περὶ Μορόχθου λίθου. Κεφ. ργβ'.

Λίθος μόρυχθος, ὃν ἔνιοι γαλαξίαν ἢ λευκογραφίδα ἐκάλεσαν, ἐν αἰγύπτῳ γινόμενον· ᾧ οἱ ὀθονοποιοὶ πρὸς λεύκωσιν τῶν ἱματίων χρῶνται μαλακτῷ καὶ ὑγιεινῷ ὄντι. δοκεῖ δὲ παρεμπλάσσειν, ἀρμόζων ὑπὸ μοσχοποιῶν, καὶ κοιλιακῶν, καὶ κύστεων ἀλγήματα σὺν ὕδατι πινόμενος· καὶ ῥοϊκαῖς ὁμοίως, καὶ ἐν περιδέσμασι. εἰς τε τὰ μαλακὰ ὀφθαλμικὰ μίγνυται· πλεονεῖ γὰρ κοιλώματα, καὶ ῥεύματα ἴσχει. σὺν δὲ κηρωτῇ ἀναληφθεὶς τὰ τραυματικὰ τῶν ἑλκῶν ἀναπωλοῖ.

Περὶ Ἀλαβαστρίτου λίθου.

Κεφ. ργγ'.

Λίθος ἀλαβαστρίτης ὁ καλούμενος ὄνυξ, ἀναληφθεὶς κεκαυμένος ῥητίνῃ ἢ πίσσῃ, διαφορεῖ σκληρίας στομάχου ᾗ ἀλγήματα μετὰ κηρωτῆς παρηγορεῖ, σέλλει δὲ καὶ οὖλα.

Περὶ Θυίτου λίθου. Κεφ. ργδ'.

Λίθος ὁ καλούμενος θυίτης, γινόμενος ἐν τῇ αἰθιοπίᾳ, ἔστι δὲ ὑπόχλωρος, ἰασπίζων· ἐν δὲ τῷ ἀνιέναι,

pyxide plúbea recondere, propter vim glutini: qđ ei obhęret.

Melitites. Cap. CLI.

Melitites omnia galactitę similis hoc tantú intereſt, q dulciorem ſuccum remittit. Eiuſdem vt galactites effectus.

Morochthus. Cap. CLII.

Morochthus lapis, quę aliquí galaxiã, aut leucographida vocauerunt, in Ægypto naſcitur: quo, vtpote molli, & facilè liqueſcẽte, linteones dealbandis veſtibus vtũtur. Spiracula corporis obſtruere videtur, cõueniés iis q̃ ſanguiné expuũt, cœliacis, & veſicæ dolorib⁹, cũ aqua potus: itidé fluxionib⁹ vuluæ, & impoſit⁹ velleri. Mollib⁹ oculorũ collyriis miſcet: explet enĩ caua, atq; delachrymatiões ſiſtit. Idé cerato exceptus, vlcera q̃ fiũt in teneris partib⁹ corporis, ad cicatricem perducit.

Alabaſtrites. Cap. CLIII.

Alabaſtrites vocatus onyx, crematus, reſina aut pice aſſũpta duritias diſcutit: ſtomachi dolores cum cerato leuat, & gingiuas comprimit.

Thyites. Cap. CLIIII.

Lapis nomine thyites, in Æthiopia gignit̃, ſubuiridi colore iaſpidé imitatus: cum diluitur tamen

tamen lacteum succum reddit. Veheméter mordet: tenebras, quę pupillis obuersantur, expurgat.

Lapis iudaicus. Cap. CLV.

Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glădis effigie, cădidus, scita admodŭ cõfiguratione, lineis æqualiter inter se distantibus quasi industria detornatis: solutus nullă qualitatẽ manifestam gustui repræsentat. Potest cicer is magnitudine tritus ad cotẽ, vt collyriŭ, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ auxiliari, & calculos in vesica comminuere.

Amiantus. Cap. CLVI.

AMIANTVS lapis in Cypro nascitur, sciſſo alumini similis: quo, vtpote flexili, telas & vela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardẽt quidem, sed flammis inuicta splendidiora exiunt.

Sapphirus. Cap. CLVII

SAPPHIRVS lapis, percusis à scorpione, potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excrescentia in oculis, vuásque & pustulas inhibet, & ruptas membranas cogit.

Méphites

Πρὶ ἰουδαϊκῆ λίθ. Κεφ. ρνέ.

Ὁ δὲ ἰουδαϊκὸς λίθος γίνε-
ται μὲν ἐν τῇ ἰουδαίᾳ, τῷ χρώ-
ματι βαλανοειδὴς, λευκὸς, εὐρυ-
θμος ἱκανῶς, ἔχων ἐν γραμμὰς
παραλλήλους, ὡς ἀπὸ τόρνου· ἀ-
νέμυθος δ' ὅλην ἄπτιος ἐν τῇ γεύ-
σει. λιώδατα δὲ ἐρεθισθαῖον μέ-
γεθος διδὲν ὡς κολλύριον ἐπ'
ἀκόνης σὺν ὕδατος θερμοῦ κυά-
θοις τρισὶ καὶ πιθὲν δυσουρίας
βοηθεῖν, καὶ τὰς ἐν κύστει λίθους
θρύπτειν.

Πρὶ Ἀμιάντου λίθ. Κεφ. ρνς'.

Λίθος ἀμίαντος γίνεται μὲν
ἐν Κύπρῳ, συσπιεία ὁμοίᾳ ἰοικὸς·
ὃν ἐργαζόμενοι ὑφάσματα ποιῶ-
σιν ἐξ αὐτῶ ὄντος ἰμαντώδους
πρὸς θέαν, ἃ βληθέντα εἰς πῦρ
φλογοῦται μὲν, λαμπρότερα δὲ
ἐξέρχονται μὴ κατακαόμενα.

Πρὶ Σαπφείρου λίθου.

Κεφ. ρνζ'.

Λίθος σάπφειρος δοκεῖ ἀφε-
λεῖν σκορπιοπλήκτους πινόμενος·
πίνεται δὲ κὴ πρὸς ταὶ ἐντὸς ἕλ-
κώσεις, καὶ πρὸς ταὶ ἐν τοῖς ὀφ-
θαλμοῖς δὲ ὑπερσαρκίας, καὶ σα-
φυλώματα, καὶ φλυκταίνας στέλ
λει, καὶ τὰς ῥήξεις τῶν ὑμένων
σωμάγει.

Πρὶ

Περὶ Μεμφίτου λίθου.
Κεφ. ρνή.

Λίθος μεμφίτης εὑρίσκεται ἐν αἰγύπτῳ κατὰ μέμφιν, ἔχων ψηφίδων μέγεθος, λεπτὰς καὶ ποικίλους. ὅτος ἱστορεῖ κατακριθεὶς λεῖος ὅπου τῶν μελλόντων τέμνεσθαι ἢ καίεσθαι τόπων, ἀναισθησίαν ἀκίνδυνον ὑποφέρειν.

Περὶ Σελενίτου λίθου. Κεφ. ρνθ'.

Λίθος σελενίτης, ὃν τινες ἀφροσελινον ἐκάλεσαν διὰ τὸ εὐείσπεσθαι αὐτὸν νυκτὸς μεσοῦν ἐν τῇ τῆς σελήνης παραυξήσει. γλυκαίνεται δὲ ἐν ἀμφίᾳ. λευκὸς, διαυγὴς, κῆφος. τοῦτον ὑποζύσαντες, διδόασι πόμα ὑπολιπομοῖς. ἐν ἀντὶ φυλακτηρίου δὲ περιάμματι αὐτῷ αἱ γυναῖκες χρῶνται. δοκεῖ δὲ καὶ δύνδεσι περιδεδεῖς, καρποφόρους εἶναι.

Περὶ ἰάσπιδος λίθου. Κεφ. ρξ'.

Λίθος ἴασπις, ὁ μὲν τις ἐστὶ σμαραγδίζων· ὁ δὲ κρυσταλλώδης, ἐοικὼς φλέγματι· ὁ δὲ ἀερίζων· ὁ δὲ καπνίᾳ, ὡσπερεὶ κεκαπνισμένος· ὁ δέ τις ἐν διαφύσεις ἔχων διαλεύκους, ἐν ἀποσιλβέσας ἀσύριος καλέσθαι· ὁ δέ τις περεβινθίζων λέγεται· καλλαΐνῳ χρώματι περιόμοιος. λέγονται δὲ πάντες εἶναι φυλακτήρια ἀσφαλῆ καὶ ὠκυτόκια μηρῷ περιαπτόμενα.

Περὶ

Lapis Memphites.
Cap. CLVIII.

Memphites in Ægypto iuxta Memphin inuenitur, calculorũ magnitudine, pinguis, versicolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt non sentiant cruciatum.

Lapis Selenites. Ca. CLIX.

Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarũt, quoniã noctu inuenitur lunæ imaginé reddere, quę cum ea quidem augetur & decrescit. Nascitur in Arabia, candidus, trãslucens, leuis, Huius raméta comitialibus in potu dari iubẽt. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres vtuntur. Arbores adalligato eodẽ frugiferæ reddũtur.

Lapis Iaspidis. Ca. CLXXX.

Iaspidũ quędã smaragdũ imitatur, alia crystallũ, colore simili pituitę: alia nõ dissimilis aëri, ob id vocat aërizusa: alia veluti fumo infecta, q̃ capnias ex arguméto vocãt: quædã lineis albis & resplendẽtibus præcingitur. Asyrios appellata: alia terebinthinæ similis, q̃ terebinthizusa dicitur: alia colore callaida gẽmã æmulatur. Omnes amuleta esse tradũtur, & accelerare partũ femoribꝰ appẽsæ.

Aëtites,

Aëtites. Cap. CLXI.

Aëtites lapis est veluti prægnans, cum quatitur, alio in vtero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt vuluæ & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturiëtibus è brachio amoueatur, & feminibus alligetur, vt sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excalfaciente, comitiales magnificè iuuat.

Πρὶ Αετίτυ λίθυ. Κεφ. ξβ΄.

Αετίτης λίθος ὁ ἐν τῷ κυεῖσθαι ἦχον ἀποτελῶν, ὡς ἑτέρου ἐγκύμων λίθυ ὑπάρχον. κατέχον ἐμβρύων ἐστὶν, ὅταν ὀλισθραὶ ὦσιν αἱ μῆτραι, θειαπόμυος ἀειστερῷ βραχίονι· ἐν δὲ τῷ χαμρῷ τὸ ἀποτέξεως, ἄρας ἐκ τ βραχίονος, περιαπτε τῷ μηρῷ, ἢ ἐκτὸς ὠδίνων τέξῃ. ἔστι δ κλεπτελεγχος, εἰ ἐπιδεῖη τὶς εἰς τ θερσορόμυον ἄρτον· ὁ γὰρ κλέψας οὐ δυνηθείη καταπεῖν τὰ μασηθέντα. φασὶ δ ὅτι ἢ συνεφόμενος ὁ ἀετίτης τοῖς ἐδέσμασι, κλεπτελεγχος γίνεται· οὐ γὰρ δυνήσεται ὁ κλέψας καταπεῖν τὰ συνεφόμενα αὐτῷ. λιωθεὶς δὲ ἢ ἀναλαμβανόμενος κηρωθὲν σὺν ἀσθένοσι διὰ κυρτίνης ἢ γλευκίνου ἢ τινὸς ἑτέρου τῶν θερμαινόντων, ὠφελήσει μεγάλως ἐπιληπτικούς.

Lapis ophites. Cap. CLXII.

Ophitæ genera multa: quidã póderosus & niger: alter cinereo colore spectatur, pũctis distinctus: tertius lineis quibusdã cãdidis intercinctꝰ est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentiú ictus ꝓsunt. Feruntur q lineas habent, lethargo, & capitis doloribꝰ auxiliari.

Πρὶ Οφίτυ λίθυ. Κεφ. ξβ΄.

Λίθος ὀφίτης· ὁ μὲν, πος δὲ βαρὺς, ἢ μέλας· ὁ δὲ, ἀποδοφὶς τ χρόαν καὶ κατεσπιλμένος· ὁ δέ τις γραμμὰς ἔχων λευκάς. πάντες δ' ἐνχρηστοῦσι θειαπόμυοι ὀπὸ ὀφιοδήκτων ἢ κεφαλαλγούντων. ὁ δὲ τὰς γραμμὰς ἔχων, ἰδίως ἰσοφέρει λιθαργύρῳ, ἢ κεφαλαλγίαις βοηθεῖν.

Lapides qui in spongiis inueniuntur. Ca. CLXIII.

Lapides in spongiis inueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt,

Πρὶ τῶν ἐν τοῖς σπόγγοις λίθων. Κεφ. ξγ΄.

Λίθοι οἱ ἐν τοῖς σπόγγοις εὑισκόμενοι, σὺν οἴνῳ πσθέντες τὸν

τὸν ἐν κύστει λίθους ῥήγνυσιν.

Περὶ Λιθοκόλλης. Κεφ. ρξδ'.

Ἡ δὲ λιθοκόλλα μίγμα οὖσα μαρμάρου ἢ λίθου παρίου καὶ ταυροκόλλης. λύεται διὰ ὑπλωτίδος πεπυρωμένης, τείχας ἀνακολλᾷ ταῖς ἐν ὀφθαλμοῖς.

Περὶ ὀφρακίτου λίθου. Κεφ. ρξε'.

Λίθος ὀφρακίτης ὁμοιός ἐστιν ὀφράκῳ φλακώδης καὶ εὔχροος, ᾧ χρῶνται αἱ τὰ κιστήρεως θρὶξ τειχοῦσαι ἄφορα αἱ γυναῖκες. ἴσχει δὲ καταμιγνύμενος πυόμενος σὺν οἴνῳ < ά. φλοῦς. δυοῖν δὲ < βάρεσι ἐὰν πίνῃ τις ἐφ' ἡμέρας δ'. μετὰ τὸν ἄφεδρον, ἀσυλλήψιαν ποιεῖ· σὺν μέλιτι δὲ ὀπισθόμενος, φλεγμαίνοντας μαστοὺς παραιρεῖ καὶ νομὰς ἴσησι.

Περὶ Σμύριδος.

Κεφ. ρξς'.

Σμύρις λίθος ἐστίν, ᾧ τοὺς ψήφους οἱ δακτυλογλύφοι σμήχουσι, χρησάμενοι εἰς * σπάθας καὶ καυστικὰ καὶ πρὸς οὖλον φλάδον καὶ ὀδόντων σμῆξιν.

Περὶ Ἀμμου.

Κεφ. ρξζ'.

Ἄμμος ἡ παρὰ τοῖς αἰγιαλοῖς πυρωθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ἐξικμάζει τὰ ὑδερώδη σώματα θερμαινόμενα δίχα κεφαλῆς. φώγυται δὲ καὶ εἰς τὰς ξηρὰς πυρίας ἀντὶ κέγχρου ἢ ἁλῶν.

rumpunt, in vino poti.

Lithocolla. Ca. CLXIIII.

Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur: conflatur autem ex marmore, lapide Pario, & taurino glutine. Potest candēte specillo admotū, incōmodos oculis pilos replicare.

Ostracites. Cap. CLXV.

Ostracites testæ similitudinē habet, crustosus, & in lāminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro punice vtuntur. Mensēs drachmæ pondere potus ex vino, sistit. Si quatuor diebꝰ à purgatione bibatur sicilici pōdere, fœminis præstat ne concipiant. Cum melle autem impositꝰ, mammarum inflammationes lēnit, & nomas cohibet.

Smyris. Cap. CLXVI.

Smyris lapis est, quo annularij sculptores lapides expurgāt ad erodendū & vrendū vtilis: gingiuis, quas humor vexat, pdest: dentifricio cōmendatur.

Arena ex littoribus.

Cap. CLXVII.

ARENA è littoribus sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, si capitéte nus, in ea obruantur. Torreri solet ad aridos fotus, pro milio aut sale.

Naxia è cote. Cap. CLXVIII.

E cote Naxia, quod exacuẽdo ferro deterit, illitũ alopecias ad pilũ reducit: virginũ mãmas cohibet, nec ĩcrescere patitur. potũ ex aceto, liené absumit, & comitialibus prodest.

Περὶ ἀκόνης. Κεφ. ρξή.

Ἀκόνης ναξίας τὸ ἀπότειμμα τοῦ πρὸς αὐτὴν ἀκονηθέντος σιδήρου ἐγχριθὲν, ἀλωπεκίας τριχοῖ. καὶ μαστοὺς παρθένων κωλύει αὔξεσθαι. ποθὲν δὲ μετ' ὄξους, σπλῆνα τήκει καὶ ἐπιληπτικοὺς ὠφελεῖ.

Geodes. Cap. CLXIX.

Geodes lapis, adstringit, siccat, caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, testium mammarúmque inflammationes sedat.

Περὶ Λίθου γεώδους. Κεφ. ρξθ'.

Λίθος γεώδης στύφει, ξηραίνει, ἀποκαθαίρει τὰ ἐπισκοτοῦντα τοῖς ὀφθαλμοῖς. καταχριθεῖσα δὲ μεθ' ὕδατος, μαστῶν καὶ ὄρχεων παύει φλεγμονάς.

Terra. Cap. CLXX.

Omnis terra ad medẽdi vsum recepta, summã & primã vim habet refrigerandi, meatúsque obducẽdi, occludẽdiq;: sed specie distat, cũ alia adiũctis quibusdam ad alia sit vtilis.

Περὶ γῆς. Κεφ. ρό.

Γῆ πᾶσα ἡ πίπτουσα εἰς ἰατρικὴν χρῆσιν, τὴν μὲν ἀνωτάτω δύναμιν ἔχει ψύχουσαν καὶ παρεμπλάττουσαν· κατ' εἶδος δὲ διαφέρει, ἄλλης εἰς ἄλλα μετά τινος σκευασίας χρησιμευούσης.

Eretriades. Cap. CLXXI.

Eretriades duæ sunt, vna vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem vergés, perquàm mollis, quæ si per æramenta tractum ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur vt cerussa, aut hunc in modum. Teritur seorsum, & cum aqua, & vbi pessum ierit, humor leuiter excolatur: siccata solib⁹, iterum teritur interdiu, adiecta aqua, vt vespere considat: antelucanis colo excernitur, &

Περὶ Ἐρετριάδος γῆς. Κεφ. ροά.

Γῆς ἐρετριάδος γῆς, ἡ μέν ἐστι λευκὴ ἐπιτεταμένως, ἡ δὲ, σποδοειδής. ἀρίστη δὲ ὑπάρχει ἡ τῇ χρόᾳ σποδίζουσα καὶ μαλακὴ λίαν, πρὸς τὰ χαλκώματα ἑλκυσθεῖσα γραμμὴν ἰώδη ἀποφερομένη. πλύνεται δὲ ὡς ψιμύθιον· ἢ οὕτω λεάνας αὐτῆς ὅσον ἂν θέλῃς κατ' ἰδίαν τε καὶ σὺν ὕδατι, ἔασον καταστῆναι, εἶτα τὸ μὲν ὑγρὸν ἐλαφρῶς ἀπήθησον· τὴν δὲ γῆν ἐν ἡλίῳ ξηράνας, πάλιν τρῖβε ἐπὶ ἡμέρας ἐπιδοὺς ὕδωρ, ἑσπέρας δὲ ἐάσας ὑποστῆναι, περὶ τὸν ὄρθρον ἀπήθησον, καὶ

καὶ λεάνας ἐν ἡλίῳ ξηράνας ἀνάπλαττε ὡς βούλεται. ἔστι δὲ καὶ ὠφελούσης χρεία ὑπαρχῇ. λαβὼν ἱερείου θαῦμα μεγέθει τῆς δὸς εἰς ἀγγεῖον χαλκοῦν καταβαλὼν μόνον, πωλήσας τὸ τὸ σῶμα ὅπως ἔνθες εἰς διαπύρους ἄνθρακας, καὶ ῥίπιζε συνεχῶς. ὅταν δὲ ἡ σποδὸς αἰθαλώδη ἦτοι ἀβρώδης μᾶλλον ᾖ καὶ χρόαν, ἀνελόμενος ἀπόθου. Δύναμιν δὲ ἔχει συστελλικὴν καὶ ψυκτικὴν, κούφως μαλακτικὴν καὶ κοιλωμάτων πληρωτικὴν, καὶ σαρκῶν κολλητικήν.

Περὶ Σαμίας γῆς. Κεφ. ρβ'.

Τῆς δὲ σαμίας γῆς ἡ ἄγαν λευκὴν ἀποκριτέον, καὶ ἐλαφρὰν. καὶ ἐν τῷ δύνειν πῇ γλίσχρα, κρατουμένην ἐχέκολλος, ἐπὶ τὲ σύγχυλον καὶ μαλακὴν καὶ ὑδρώδη, οἵα ἐσὶν ἴλυῖ τινες κολλύριον καλοῦσιν. ἔστι γὰρ ἄμμῳ δύο εἴδη· τό, τε ἀποκρεμένον· καὶ ὁ καλούμενος ἀστὴρ, πλακώδης ὢν καὶ πυκνὸς, ὡς ἀχόνη. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ καῦσιν καὶ πλύσιν ἐμφερῆ ἐρετριακῇ. ἵσταται δὲ αἵματος ἀναγωγὴ, καὶ ῥοϊκαῖς δίδοται γυναιξὶ σὺν βαλαυσίῳ. καὶ ὄγχων καὶ μαστῶν φλεγμονὰς καταχριομένη σὺν ὕδατι καὶ ῥοδίνῳ παύει· σέλλει καὶ ἰδρῶτας· καὶ θηριοδήκτοις καὶ θανασίμοις ἀρήγει σὺν ὕδατι πινομένη.

Περὶ τοῦ σαμίου λίθου. Κεφ. ργ'.

Εὑρίσκεται δέ τις ἐν τῇ σαμίᾳ γῇ

& demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quòd si tosta desideretur, pastili magnitudine ciceris in fictile perforatū cōiiciunt, oreq; vasis diligēter obturato, supra carbones candētes cōtinenter follibus perflātur: vbi verò cinis in fauillas se conuertit, aut aërcum coloré cōtraxit, exépti recondūtur. Vim habet adstringentē, & refrigeratoriā, leuiter mollientē: caua explet, & sanguinolenta conglutinat.

Terra Samia. Cap. CLXXII.

Samia præfertur cādida, leuis, tangēti linguæ glutinis modo adhærescēs, mollis, succosa, friabilis: cuiusmodi est quā aliqui collyrion vocāt. Duę enim species eius: vnā, antè diximus: altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauat vt eretria, vímque consimilē habet: sanguinis reiectiōes sistit, & fœminis fluxione vuluæ laborātibus, cum flore syuestris puniçe dat. Testium & māmarū inflāmationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arcet: cōtra serpentium morsus & venena, pota ex aqua auxiliatur.

Lapis Samius. Ca. CLXXIII.

Samius lapis, in Samia terra

inuenitur, quo artifices vtuntur poliendo auro, vt resplendeat. Probatur candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans: prodest stomachicis potus: sensus hebetat: verùm ad fluxiones oculorum & vlcera, cum lacte efficax est partus, vt tradunt, adligatus accelerat, & conceptus fœminarum custodit.

Terra chia. Cap. CLXXIIII.

Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum, Samiæ similis: est autem crustosa, albáque, sed fictitiis formis differens. Vis eadem quę & Samię, extēdit faciem, & erugat, atq; splendidā reddit: coloré in facie & corpore toto cōmēdat: in balneis pro nitro deterget.

Terra Selinusia.

Cap. CLXXV.

EADEM præstat Selinusia: maximè laudatur, quæ vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima.

Cimolia. Cap. CLXXVI.

Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinās. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactúque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, &

γῆ λίθος, ᾧ οἱ χρυσοχόοι χρῶνται πρὸς τὸ λευαίνειν καὶ στιλβοῦν. διαφέρει δὲ ὁ λευκὸς καὶ στιβαρός.

Δύναμιν δὲ ἔχει συγκλειστικὴν, ψυκτικήν· ὠφελεῖ στομαχικοὺς ἐν ποτῷ· ἀμβλυωπικοῖς τοῖς αἰσθητικοῖς· πιεῖ πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ῥεύματα καὶ ἕλκη συὺ γάλακτι· δοκεῖ δὲ καὶ ἀκυτόκιος εἶναι καὶ φυλακτήριος τῶν συλλημφθέντων πρὸς ἀποβολήν.

Περὶ Χίας γῆς. Κεφ. ροδ'.

Καὶ ἡ χία ἡ λευκὴ καὶ ὑποπύρρου παραπλήσιον, καὶ τῇ σαμίᾳ ἐμφερῆ· πλακώδης δὲ ὅτι καὶ λευκή, τοῖς δὲ χρώμασι καὶ ἀναπλάσεως διαφέρουσα. Δύναμιν δ' ἔχει ἡ αὐτὴ τῇ σαμίᾳ· πιτυοῖ δὲ καὶ στίλβον ἐπὶ δὲ εὔχροιαν τὸ πρόσωπον καὶ ὅλον τὸ σῶμα ἀποτελεῖ· σμήχει δὲ ἀντὶ νίτρου ἐν βαλανείῳ.

Περὶ Σελινουσίας.

Κεφ. ροέ.

Τὰ αὐτὰ δὲ ποιεῖ καὶ ἡ σελινουσία γῆ· ἀείστι δέ ὅτι ἡ ἄχαρις στίλβουσα καὶ λευκή, εὐθρυπτος δὲ καὶ ταχέως ἄχαρι χυλωθῆναι ἐπιδιὰ ὑγρὸν λάβῃ.

Περὶ Κιμωλίας γῆς. Κεφ. ροϛ'.

Τῆς δὲ κιμωλίας ἡ μὲν ὅτι λευκή· ἡ δὲ ἐμπόρφυρος καὶ λιπαρία πινὰ ἔμφυτον κεκτημένη, πρός τε τὴν ἁφὴν κατάψυχρος, ἣν ἀείστι ἡγητέον. ἑκάτερα δὲ διαφορῶσιν ὄξει διειλημένα, παρωτίδας καὶ

καὶ τὰ ἄλλα φύματα· πρὸς δὲ τὰ πυρίκαυτα ποιοῦσιν ἐπιχριόμεναι παραχρῆμα, ὥστε ἀφλύκταινα διατηρεῖν τὰ πεπονθότα μέρη· καταστέλλουσι δὲ καὶ διδύμων σκληρείας καὶ φλεγμονὰς τὰς περὶ ὅλον τὸ σῶμα· ἔτι δὲ ἐρυσιπέλασιν ἐνίσανται. καθόλου δὲ πολύχρηστοί εἰσιν αἱ γνήσιοι ἐὰν μὴ νόθοι παραλαμβάνονται.

& alia tubercula diſcutit: ambuſta igni, ſi ſtatim cimolia oblinantur, puſtulas non ſentient: teſtiũ duritias, & totius corporis collectiões cohibet: igni ſacro imponitur. In ſumma, vtraque multum in medicina commendatur, ſi incorruptæ originis nec ſpuria aſſumatur.

Περὶ Πνιγίτιδος γῆς. Κεφ. ροζ΄.

Ἡ δὲ λεγομένη πνιγῖτις γῆ, τῇ χρόᾳ ἔοικέ πως τῇ ἐρετριάδι, ἔστι δὲ ἁδρόβωλος· ψυκτικὴ πρὸς τὰς τῶν χειρῶν ἐπιβολάς· τῇ τε γλώσσῃ μάλιστα κολλᾶται ὡς ἐκκρεμᾶσθαι. δύναμιν δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει τῇ κιμωλίᾳ, βραχὺ τῆς εὐτονίας ὑστεροῦσα· ταύτην ἀντὶ ἐρετριάδος τινὲς πιπράσκουσι.

Pnigitis. Cap. CLXXVII.

QVÆ pnigitis dicitur, colore ferè eretriæ ſimilis eſt, grandioribus tãtum glebis: manum ſi quis admoueat, refrigerabit: tactu linguæ, vſqueadeò glutinoſa, vt penſilis hæreat. Cui effectus idem qui cimoliæ, paulò tamen infirmior. Hãc aliqui pro eretriade vendunt.

Περὶ Ὀστράκων. Κεφ. ροη΄.

Ὄστρακα δὲ τὰ ἐξ ἰπνῶν τὰ λίαν κατοπτα, ἐσχαρωτικά· ὅθεν ἐπιχριόμενα σὺν ὄξει, κνησμοὺς καὶ ἐξανθήματα ἰᾶται, καὶ ποδαγρικοὺς ὠφελεῖ· ἀναληφθέντα τε κηρωτῇ χοιράδας διαφορεῖ.

Teſta fornacea. Cap. clxxviij.

Fornaceæ teſtæ vehementer toſtæ, cruſtas vlceribus obducunt: quare prurigini & papularum eruptionibus medẽtur. Podagricis ꝓſunt: ſtrumas diſcutiunt, cerato exceptæ.

Περὶ τῆς ἐκ τῶν καμίνων γῆς. Κεφ. ροθ΄

Καὶ ἡ ἐκ τῶν καμίνων δὲ κατοπτος γῆ πυῤῥά, τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τοῖς ὀστράκοις.

Terra fornacum. Cap. CLXXIX.

Fornacum terræ, quæ retorrida fulueſcit, eiuſdem cum teſta effectus.

Περὶ Μηλίας γῆς. Κεφ. ρπ΄.

Ἡ δὲ μηλία τὴν μὲν χρόαν καὶ αὐτή ἐστιν ἐμφερὴς ἐρετριάδι τῇ σποδοειδεῖ

Melia. Cap. CLXXX.

MELIA COLORE cineream eretriam imitatur,

aſpera tactu: ea digitis friata, derasi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosã, sed remissiusculã, id quod gustu deprehẽditur: nã modicè linguã siccat: purum corpus reddit, & colorem cõmendat: pilos extenuat. vitiligines, & lepras abstergit. Pictoribꝰ vsum præbet, vt colores diutius perennent: emplastris viridibus, quæ chlorꝫ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra, & omni alia in vniuersũ, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facilè resoluatur.

Terra ampelitidis.

Cap. CLXXXI.

Ex ampelitide terra, quę pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ longos carbones referens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur cãdida, & cinerea, quę in liquoré non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad callibephara additur, tingendis capillis idonea. Vsus eius ad illinẽdas vites sub germinationis tempus, vtpote cum innascentes vermiculos enecet.

Fuligo

δεῖ ἀνθρακὶς δὲ ἡ παραβρεχομένη τοῖς δακτύλοις, ὡς ψυθρισμόν τινα ἀποτελεῖν ὅμοιον ψυχομένη κονήρει. τῇ δὲ δυνάμει συμπηρίδος ἐστὶν, ἀνεμιθύως δὲ μᾶλλον ὁ δὲ ἡ διὰ τ γεύσεως ἐμφαίνει· ἀναξηραίνει δὲ ἡ γλῶσσαν φαγέδαινας· δυνάμει δὲ καθαρτικὴ ἡ σῦκον ἀποτελεῖν τὸ σῶμα· λεπτύνει ἡ τὰς πέτρας ἡ λήθρας ἡ λέπρας σμήχει. χρησιμεύει δὲ ἡ ζωγράφοις πρὸς πλείονα παρασκευὴν χρωμάτων· ἡ χλωρίδας δυνάμεσι συνδεῖ. ἡ ταύτης δὲ κοινῶς ἁπάσης γῆς ἡ δῆτον ἐκ λεκτέον καὶ πρόσφατον μελανίαν τε ἡ εὐθρυβῆ, ἡ εὔλυτον ὅταν ὑγροῦ θίγῃ.

Περὶ ἀμπελίτιδος γῆς. Κεφ. ρπά.

Τῆς ἡ ἀμπελίτιδος γῆς, ἣν τινες φαρμακῖτιν καλοῦσι γινομένης ἐν σιλευκείᾳ τῇ κατ' συρίαν, ἡ μέλαιναν πρόσκριτέον, ἡ πευκίνοις ἀνθρακὶς μικροῖς ἐμφερής ἐστιν, ὑποχαλκώδης τε ἡ σίλικα ἔχουσα ἴσως, ὅτι ἡ ὑδρὶ βραδέως τήκομένη, ὅταν λειανθείσῃ ὀπτηθῇ πρὸ τοῦ ἔλαιον. ἡ ἡ λευκὴν ἡ τιφρώδη ἡ ἄτηκτον, φαύλην ἡγητέον. Δύναμιν δὲ ἔχει διαχυτικὴν ἡ ψυκτικήν· παραλαμβάνεται δὲ ἡ πρὸς καλλιβλέφαρα ἡ βαφὰς βοτρύων. καὶ τὰς τ ἀμπέλων χείσεις πρὸς τ τῆς ἐκβλαστήσεως ὥραν, κλείουσα τοὺς ἐπιγομένους σκώληκας.

Περὶ

Περὶ Ἀσβόλης.

Κεφ. ρπβ'.

Ἀσβόλη ᾗ οἱ ζωγράφοι χρῶνται, λαμβάνεται μὲν ἐκ τῶν ὑελουργῶν. διαφέρει δὲ αὕτη. Δύναται δ' ἔχει σπιθικὴν, συπικήν· ἀπουλοῖ δὲ καὶ κατάγματα σὺν ῥοδίνῳ κηρωτῇ.

Περὶ Μέλανος.

Κεφ. ρτγ'.

Μέλαν ᾧ γράφομεν, συνάγεται ἐκ λιγνύος συναγομένης ἐκ δαδίων. μίγνυται δὲ πρὸς τὴν λίτραν τῆς κόμμεως οὐγγίας ξ' ἐῆς λιγνύος, σκευάζεται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ῥητίνης λιγνύος καὶ τῆς προειρημένης ζωγραφικῆς ἀσβόλης. δεῖ δὲ τῆς μὲν ἀσβόλης μνᾶν μίαν λαμβάνειν, κόμμεως δὲ λίτραν μίαν ἥμισυ, τραγακάνθου οὐγγίαν μίαν ἥμισυ, χαλκάνθου ὀβολὸν μίαν ἥμισυ. ἁρμόζει δὲ εἰς τε σύπας. καὶ πυρίκαυστα κατασχιόμενον μὲθ' ὕδατος πολλοῦ, καὶ ἐώμενον ἄχρις ἀπουλώσεως· ἀποπίπτει γὰρ αὐτόματον ὑγιαθέντων τῶν ἕλκων. Καὶ δὲ χρόνου ἐφ' ὅσον ἰσχύειν ἐδόξαμεν ὦ φίλτατε ἄξειν ἄμα εἶναι καὶ μίκοις συντάξεως, καὶ πλήθους ὕλης τε καὶ βοηθημάτων ταμιεύσασθαι, ἅλις ἔχει.

Fuligo pictoria.

Cap. CLXXXII.

Fuligo qua pictores vtũtur, ex vitrariis officinis colligi solet: siquidé ei palma tribuitur. Vis ei ad astringẽdum & crodédũ efficax: fracta cũ rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium.

Cap. CLXXXIII.

Atramẽtum quo scribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ fuliginis vncię adiiciuntur. Fit etiã è resinarũ & pictoria fuligine, de qua paulò ante diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gũmis sesquilibra, glutinis taurini, atr améti sutorij, singulorum sescuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis: Ambustis, ex aqua commodè crasius illinitur, sed nõ antè soluatur, quàm cicatricem induxerit: sanatis siquidem vlceribus, sua sponte decidit. Cæterùm habes, amicissimè Areë, ferè qua tradenda duximus pro operis modo, quem destinaueramus, & materiæ auxiliorúmque medicinalium copia.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ.

QVINTI LIBRI FINIS.

PEDANII DIOSCORIDIS Anazarbei de venenis, quóque modo arceantur, vitentúrque, Liber Sextus.

ΠΕΔΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ Ἀναζαρβέως περὶ Δηλητηρίων φαρμάκων καὶ τῆς αὐτῶν προφύλακης βιβλίον ἕκτον.

SVPERIORibus amicissime Arēe libris, tradidim⁹ de aromatib⁹ oleis, vnguentis, arboribus, & earúdem fructibus, lachrymísque: item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, herbis, radicibus, liquamentis, vinis, metallísque. In hoc verò totius operis vltimo, facultates medicamentorum recensebimus, quæ prodesse nobis, aut officere possint. Vitata igitur orationis prolixitate, opus institutum prosequamur. Huiusce modi autem tractatus, cum bifariam distributus sit: in partem venena pręcauentem, ita vt ne fallant sumentes, aut si quando per imprudentiam dentur, vt tum quoque innoxia fiant, irritáque: & in rationem iis succurrendi, qui iam noxiam sentiunt: primum differam de præcauendi modo, quem

ΑΠΟΔΟΝΤΕΣ ἐν τοῖς προγεγραφεῖσι βιβλίοις φίλτατε Ἀρεῖε, τὰ περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν καρπῶν καὶ δακρύων· ἔτι τε ζώων καὶ μέλιτος, καὶ γάλακτος καὶ σέατος, καὶ τῶν λεγομένων σπερμῶν καὶ λαχάνων, ἔτι τε τὸν σύμπαντα περὶ ῥιζῶν καὶ βοτανῶν καὶ χυλισμάτων, καὶ οἴνων καὶ μεταλλικῶν λόγον. ἐν τούτῳ τελευταίῳ ὑπάρχοντι τῆς ὅλης πραγματείας καταλήξομεν, περὶ τῆς τῶν ὠφελεῖν ἡμᾶς δυναμένων φαρμάκων ἐνεργείας. Παρεμπεσάμενοι οὖν τὴν πολυλογίαν, ἐπαινέσομεν ὅτι τὸ προκείμενον. μεριζομένου δὲ τοῦ τοιούτου διχῶς· εἴς τε προφυλακὴν τοῦ μὴ δῆξαι τινὰ ἀρχὴν λαμβάνειν, ἢ εἰ καί ποτε λάθοι δεδόμενα, ἀνενέργητα γενέσθαι· καὶ εἰς τὸ βοηθητικὸν τῶν πεπωκότων. Πρῶτον δίεμαι περὶ τοῦ προφυλακτικοῦ τρόπου,

ἀγγεῖς

δυχερῶς ὄντος ὡς οἱ ἀρχαῖοι ὑπέλαβον, διὰ τὸ τὸν λάθρα διδόντας οὕτω μηχανᾶσθαι, ὡς ἂν τὸν ἐμπειροτάτους ἐξαπατῆν· τὰς μὲν γὰρ πικρίας ἐξαμβλύνουσι τῶν φθαρτικῶν φαρμάκων ταῖς μιγνυμέναις γλυκύτησι, ταῖς δὲ δυσωδίας ταῖς τῶν ἀρωμάτων καταμίξεσιν ἢ ταῖς τῶν ὑλῶν ἐπ' ὠφελείᾳ δοκουσῶν προσφέρεσθαι. μάλιστα δ' ἐν τοῖς ἀθενίαις ὡς ἀψινθίῳ ἢ τραγορειγάνῳ ἢ ὑσσώπῳ, ἢ θύμβρᾳ, θύμῳ τε καὶ σατορείᾳ ἢ ἀβροτόνῳ, ἢ ἴριδι ἢ κασσίᾳ, καὶ εἴ τι δοκεῖ κατάλληλον τοῖς καταρρυμένοις φαρμάκοις ἔχειν ποιότητα. ὁπόταν δὲ τῶν πινομένων ἐν οἴνοις σκληροῖς ἢ ζωμοῖς, ἢ ἐν γλυκεῖ, ἢ ἐν μελικράτῳ, ἢ ἐν γλεύκει, ἢ ἐν χυλοῖς, ἢ φακῷ, ἢ ἐν ἀλφίτοις· ἢ ἐν φαρμάκοις ἢ ἐν ἄλλοις τισὶ τῶν προσφερομένων συστοποιοῦντες. ὅθεν τὸν ὑποπλέοντα δεῖ προσγιτεῖσθαι τὰ κατηρτισμένα τῶν ἐδεσμάτων, καὶ πᾶσαν ὀπτεταμένην ποιότητα γεύσεων, ὅσαι εἰσὶ διὰ τῶν γλυκέων ἢ ἁλυκῶν ἢ ὀξέων διαφυλάττεσθαι καὶ τοὺς δεδιψηκότας ἢ πεινῶντας δ' ἐπιτάσεως, μὴ ἀθρόως πίνειν ἢ ἐσθίειν προσέχοντας τῇ ποιότητι τούτων, μάλιστα δὲ ψυχρὸν ὕδωρ προλαμβάνειν πίνοντας.

quem esse difficillimum plerique maiorũ arbitrantur, quod dantes clàm venena, ita insidias temperant, vt peritissimum quenque decipiant. Siquidem venena sua amaritudine, permistis dulcibus, spoliant, & graue odoris virus mistura odoramentorũ eximunt: aut medicamenta immiscent, quæ tuendæ sanitatis gratia dari putantur: & præsertim in valetudine, vt absinthium, tragoriganum, satureiam, aut hyssopum, quinetiam thymum, irim, origanum, abrotonum, castorium, aut si quid medicamentis purgatoriis cognatam habere qualitatem videatur. Aut potionibus inserunt: vt vinis asperis, iuribus, passo, mulsæ aquæ, musto, succis, vt in cremore lentis, polentis: aut medicaminibus, aut aliis quæ assumuntur edulij speciem referentibus. Quare qui in ea suspicione sunt, cõditos cibos vitare debent, omníq; intenso sapore dulcium, aut salsorum, aut acidorum, abstinere: nec sitibũdi affatim bibere, aut esu rientes voraciter comesse, sempérq; ad saporẽ horum diligẽter attendere, præsertimq; potu frigidam aquam præsumere.

Satiato

Satiato enim appetitu, qualitates ægerrimè postea concoquuntur. In ægris quidem facile cauemus potiones auxilij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi veneficiorum: artifices: itaque ob id laborantes morbo non perinde audentium iniuriis patent. Et hæc quidem ne facile incauti seductíque homines capiantur dolis veneficorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest expeditior, vt suspicioſi aliqua præsumant, quæ venenorum vires hebetent, & ineffi caces irritásque reddant: cuiusmodi caricæ sunt cum iuglandium nucibus manducatæ, & quæ cedromela vocant, id est citria, seminísque napi drachma cum vino. Item folia calaminthæ, aut creta quæ Lemnia sphragis appellatur, pondere pari cum vino: aut rutæ folia & nucis iuglādis nucleum: aut caricas duas, & salis callū ieiuni sumant, & nullo veneni genere lædentur. Antidota ex vino sumpta eūdem effectum præbent: inter quæ intelligitur magnū Mithridatium, & quod scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæpe venenis obsistunt peculiares quidá corpo

ἀποπληρωθείσης γὰρ τῆς ὀρέξεως, ἀπεπτότατοι γίνονται τὸ λοιπὸν αἱ ποιότητες· καὶ ὅπου μὲν τῶν ἀδεγοώντων, ῥᾳδίως παραιτούμεθα ταῖς * παρὰ τῶν ἐσθιόντων ὠφελείᾳ δίδοσθαι φαρμάκων πίσεις, αἷς εἰσφέρουσιν οἱ κακουργόντες τὰ δηλητήρια· ὅς τε διὰ τοῦτο δυσεπιχείρητος γίνεται τοῖς νοσοῦσιν. καὶ ἡ μὲν φύσις τὸ μὴ ἐυχερῶς ἁλίσκεσθαι πλανωμένοις ἔφοδος, αὕτη. ἑτέρα, δὲ ἤ τις ἐστὶν ἀντικωτέρα, δεῖ τοὺς ὑποπτεύοντάς τι πιεῖν, προλαμβάνειν τι, καὶ ἀλύματα κατασκευάζειν τὰ φάρμακα· ὡς ταῖς τε ἰχάδας μασσομένοις μετὰ βασιλικῶν καρύων, καὶ τὰ καλούμενα δὲ κεδρόμηλα, βουνιάδος τε σπέρματος ὁλκὴν μετ' οἴνου, ἢ καλαμίνθης τῶν φύλλων ὁμοίως, ἢ μίλτου τῆς καλουμένης λημνίας σφραγίδος, τὸ αὐτὸ σθένος σὺν οἴνῳ· ἢ σικυάνου φύλλα καὶ καρύων βασιλικῶν τὸ ἐντὸς, ἢ ἁλῶν χόνδρον καὶ ἰχάδας δύο νήστεις προσφερέσθωσαν, καὶ ὑπ' οὐδενὸς ὑποῦ βλαβήσονται φαρμάκου. καὶ αὐτήδοτοι δὲ προσλαμβάνονται μετ' οἴνου τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν· ὧν ἐστὶ ἡ διὰ τοῦ σκίγκου, καὶ ἡ διὰ τῶν αἱμάτων, καὶ ἡ καλουμένη μεγάλη μιθριδάτιος. αὐτὶ πάσχεσι δὲ πολλάκις ἰδιοσυγκρίσεις σωμά-

σωμάτων αἱ φθοραὶ διαθέσεις. διὰ τίνας βρωμάτων ἢ πομάτων ποιότητας, ἢ πλῆθος οἴνου· ἐκλύουσι γὰρ τὰς ἐνεργείας τῶν ἐπιπεφορημένων φαρμάκων, καὶ τῷ ἀνάδοσιν αὐτῶν κωλύουσι πεπληρωμένων τῶν πόρων ὑπὸ τῆς προληφθείσης τροφῆς. Ἐπειδὴ δὲ καὶ βραδύτητες τινὲς ἐν ἀποδημίᾳ δίχα ἐπιβουλῆς πολλάκις ἐπιφέρουσιν ὁμοίους κινδύνους, ἀναλεκτέον ὑπολαμβάνω καὶ περὶ τούτου διαλαβεῖν. δήσει γὰρ πρῶτον μὲν ἐν ὑπαίθροις τόποις, ὡς δυνατὸν ἔλαττον ἔχειν. καὶ ἑτοιμάζειν τὰ πρὸς βρῶσιν καὶ πόσιν. δεύτερον δ' ἐν ὑποστέγῳ· ἐπιμελῶς καταμανθάνειν τὰς ὀροφάς. πολλάκις γὰρ ἐν τῶν ὑπερκειμένων πίπτει ζωύφια φθοροποιὰ, ὥσπερ φαλάγγια. καὶ ἄλλα πολλὰ ἑρπετά. καὶ ὁ καλούμενος ἀσκαλαβώτης. καὶ τοῖς πρεσβύτοις δὲ τὸν οἶνον ἀγγείοις ἐπαργῶς καὶ ἐπιμελῶς προσέχειν δεῖ. ἕλκεται γὰρ ὑπὸ τῆς ὀσμῆς τοῦ οἴνου τὰ ἑρπετὰ, ἃ πολλάκις πιόντα μὲν τὸν ἴδιον ἀπώλεσαν, ἐμπεσόντα δὲ ἀπέθανον, καὶ ἀπωλείας ἐγίνοντο αἴτια τοῖς προσενεγκαμένοις. Περὶ μὲν τὸ ἀνεπιβούλευτον εἶναι, καὶ προφυλάττεσθαι, ταῦτα εἰρήσθω. εἰ δέ τινες ἐποικίαι γνώμῃ προσηγάγοντο, ἢ καὶ ἐξ ἐπιβουλῆς τινων

corporũ affectus certo quodá modo cõstitutorũ cũ quadá cibi potúsq; qualitate, tũ vini copia ita téperatorũ, vt cũ venenis dissentiãt: siquidé ingesti veneni vires frangũt, atq; iã priore alimento farctis præclusisq; meatibus, obstãt ne membratim per digestionem insinuetur. Verumenimuerò, quoniá fortunæ necessitas interdũ similia discrimina peregrè agentibus affert, absque vllis insidiis hominũ, nónihil differendum mihi de hac re necessariũ duco. Iam primũ igitur culinã apparare loco subdiali cõuenit, cibósq; & potus in huiusmodi loco struere. Si id fieri cómodè nequit, secunda erit cõditio hæc, apparãdi apponẽdiq; sub tecto. Sed tũ diligẽter laquearia animaduertẽda: frequenter enim à superioribus cõtabulamẽtis animalia decidũt, exigua quidé, sed quę nõ modicã perniciem moliantur, vt phalãgia, stelliones, & alia quædã reptilia. Porrò vinaria vasa diligẽter intuerit oportet: nanq; reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdũ sorbendo, noxiũ virus eructarũt, interdũ verò delapsa immersaq; expirarũt, & exitij causas hauriẽtibus attulerunt. Sed

Sed hęc hactenus dicta sint, ne cauti & ꝓuidi ĩsidiis pateãt. ꝙ si q̃ sua spõte, aut ex quorundã ĩsidiis sũpserũt, auxiliari primo quoq; tpe oportebit: siq̃dẽ dũ comites singulorũ venenorũ notę expectãt, ĩmedicabile fit venenũ, & pauliſper neglectũ, medicamẽtis ęgrè cedit. Quare si q̃ ꝓ cõperto se virus sũpsisse intelligãt, & fateãt, aut eorũ q̃ aderãt testimonio cõstet, protinus ad idonea remedia trãseũtes, facilè peculari natiuęq; cõstitutiõi restituem⁹. Neq; enim iis assentimur, q̃ prorsus auxilia ĩ huiuscemodi frustrà adhiberi cõtẽdũt. Quo.n. modo morbi, quorũ causę cęcę latẽtésq; corporib⁹ insidẽt, medicinã admittũt, & q̃ forinsec⁹ incurrũt venena, medẽdi rationẽ aspernãtur? Æquè verò oẽs morbi pro causarũ ĩgruẽtiũ magnitudine, próq; antecedẽtib⁹ affectiõib⁹ qualitibúsq;, q̃b⁹ sit opportunũ corp⁹, vel medicabiles sunt, vel nullis cedũt medicamẽtis. ꝙ si q̃ forsan obmutescẽtes, aut temuléti, aut nolẽtes alioq̃ venenũ à se egeri, nullã nobis ei⁹ cognitionẽ prębeãt, tũ ꝓtin⁹ accedũ ad ea q̃ cũmuniter cpotis q̃busc̃q; venenis opitulari cõsueuerũt. Atqui nullũ magis

νων λάβοιεν, δηλόσει μηδὲν ἀναξιωμάτοις βοηθεῖν· εἰς γὸ τὸ πεισθῆναι τὰ παρακολουθοῦντα σημεῖα ἑκάστου τῶν φαρμάκων ἀνίσα τίν ὄντι, δυσοσθήτων αὐτῶν διὰ τὸν χρόνον γινομένων. ἐὰν μὴ ἕν οἱ προστενεγκάμενοι νοήσαντες ὁμολογήσωσι τὸ πεδὲν φάρμακον, ἢ τινες τῶν συμπαρόντων, παρεγχεῦμα ἐλαθόντες ὅπη τὰ κατάλληλα βοηθήματα, ῥαδίως εἰς τὸ κρ φύσιν καὶ οἰκεῖον ἄξομεν αὐτοὺς κατάστημα. οὐ συγκαταπδέμεθα τοῖς λέγουσιν ἐπ' αὐτῶν κατὰ πᾶν ἀθεράπευτα γίνεσθαι. πῶς γὰρ τὰ μὴ ὑπὸ τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων αἰτίων πάθη, θεραπείαν ὑπδέχεται, τὰ δ' ἔσω τῶν ἔξωθεν συμπίπτοντα φαρμάκων ἀθεράπευτα τύγχανε; ὁμοίως γὸ πάντα τὰ σὺν τὰ σώματα γινόμενα νοσήματα, θεραπευτά τε καὶ ἀθεράπευτα, κρ τὰ μεγέθη τῶν προσπιπόντων αἰτίων, καὶ ταῖς προδιαθέσεις καὶ ὑπτηδειότητας τῶν σωμάτων. εἰ δέ τινες αὐτῶν καταληφθέντες ἀφωνίαις ἢ παρωνίαις, ἢ ἄλλῳ διὰ τὸ μὴ βούλεσθ ἐξάγειν αὐτὸ ἀσυμφανὲς ἡμῖν ποιοῦσι τὸ φάρμακον, τό τε δεῖ ταχέως ἔρχεσθαι ὅπη τὰ κοινῶς ἀρμόποντα τοῖς οἱονδήποτε φάρμακον πεπωκόσιν. οὐδὲν δὲ δύναται κοινότερον βοήθημα δοθῆναι, τοῦ τὸ δεδὲν φάρμακον

πρὶν τοῦ ἐγχύται, διὰ τοῦ ἔγγιστα τόπου κενοῦν εἰς τὸ ἐκτός. ὅθεν μηδὲν ἀναβαλλομένους προσφέρειν δεῖ ἔλαιον θερμὸν, ἢ καθ' ἰδίαν ἢ μεθ' ὕδατος ἐμεῖν ἀναγκάζοντας. εἰ δὲ μὴ παρείη ἔλαιον τῶν τόπων μὴ φερόντων, βούτυρον ἀντὶ ἐλαίου μεθ' ὕδατος θερμοῦ ἢ μαλάχης, ἢ λινοσπέρμου ἢ τράγου, ἢ τήλεως, ἢ κνίδης σπέρματος, ἢ χόνδρου ἀφεψήματος. οὐ μόνον γὰρ κενώσει ταῦτα διὰ τῶν ἐμέτων εὐχερῶς χαλασμὸν καὶ ναυτίαν ἐμποιοῦντα, ἀλλὰ καὶ ὑπάξει τὴν κοιλίαν, καὶ ἐναντιωθήσεται τῇ κενώσει τῶν σωμάτων, ἀμβλυντικὰ τῶν δριμυτήτων καθεστῶτα. ἔστι δὲ ἐναργῶς καταλαβέσθαι τοῦτο· εἰ γάρ τις ἑλκῶσαι προαιρούμενος δι' ἀσβέστου, ἢ τρυγὸς ἢ κανθαρίδος ἤ τινος ἄλλου δριμέως τὸ σῶμα, ὑποχρίσει ἐλαίῳ, οὐχὶ ἑλκωθήσεται ὑπὸ τούτου. καὶ μὴν οὐδ' εἴ τις στύψαι θελήσει ἰσχυρῶς ἢ ψύξαι, δύναται προλιπαίνων. ἔστι μὴν ἔμετος οὐ μόνον καθ' ὃ κενοῖ καὶ ἀποκρίνει τὸ βλάπτον ὠφελεῖ, ἀλλ' ὅτι καὶ δείκνυσι τὸ ληφθὲν ἐνίοτε, ἔκ τε ὀσμῆς ἢ θρόμβων ἢ χρώματός τινος· ἐκ μὲν γὰρ τῆς ὀσμῆς, καὶ πικρίας, μηκώνειον· ἐκ δὲ χρόας ψιμύθιον ἢ γύψον· ἀπὸ δὲ θρόμβου, γάλα ἢ τὸ νεοσφαγὲς αἷμα ἀπὸ

in omnia valés auxiliũ dari potest,q̃ vt proximo loco vir⁹ foras exhauriatur,priusq̃ inualescat. Quare sine mora, calidũ oleũ ex aqua,aut seorsũ,vt vomitare cogãtur,dari conuenit. Aut si oleũ natura loci negat, butyrum cum aqua calida,aut malua,aut lini semine, aut trago,vrtica,fœnogręco,aut halicę decocto,vicé ei⁹ exhibebit. Hęc.n. nõ modò vomitionib⁹ exigent vi illa sua laxatrice,aut nauseã ciéte, sed aluum quoq; subducét,& corporũ inanitione ita aduersabũtur,vt acrimonias venenorũ hebetent.Id qđ euidéter huiuscemodi argumẽto deprehendere licet: Esto,vt quisq̃ viua calce vel fæce, aut cãtharidib⁹,aut alio quouis acri,corp⁹ exulcerare statuerit, is si ipsũ oleo leniter illinat,exulcerationé nõ accipiet. Atqui neq;veheméter adstrĩgi corp⁹, neq; refrigerari poterit, si antea perungat.Quinetiã vomit⁹ non ob id modò qđ vacuet,& noxiũ humoré excernet,iuuamẽtũ adfert,sed ꝙ assũptũ vir⁹ nónunq̃ odore,coagulatis grumis aut colore, ꝓdat: q̄ppe cũ odore & amaritudine, meconiũ: colore,cerusã, gypsũmve: grumis lac aut sangninem animalis.

malis recens iugulati oſtédat. Nam grauis odor regeſtorum, leporis marini, aut rubetæ veneficia deprehendit, ita vt nõnulla ab iis remedia peti poſſint, ad idonea ſingulorum auxilia trãſeuntibus. Oleo etiam maluæ decoctum admiſcetur, aut glauciũ, aut adeps anſerinus, aut pinguium carnium iura, aut lixiuium lignorũ cinere factum. Vbi verò vomitus diligéter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæſerunt inteſtinis reliquiæ, clyſtere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite ſumptum & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingnes piſces, vetuſtæ carnes pinguéſque, & quę adipe aut recenti butyro parantur. Aluum nanque ſubducũt, vti diximus: & ſtomachum reſoluétia, promiorem ipſum ad vomitionem reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obſtruentia, celerem virium penetrationé inhibent. Quinetiã medicamenta dantur, quæ communi dote proſunt: vt Lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngij, ſemen paſtinacæ, & calaminthæ, nardum gallicum, caſto-

ἀπὸ δὲ βρώμου καὶ ποιότητος τῆς ἐμουμένου καὶ ὀσμῆς, λαγωὸν θαλάττιον καὶ ὀρνιθίον, ὡς διὰ τοῦτο ἢ δι' ἕτερον ἔνια δύνασθαι βοηθεῖν, ἐρχομένους ἐπὶ τὰ ἐκείνων ἀρμόζοντα βοηθήματα. παρεμίγνυται δὲ τῷ ἐλαίῳ μαλάχης ἀφέψημα, ἢ γλαύκιον, ἢ σέαρ χοίρειον, ἢ ζωμὸς ἐκ λιπαρῶν κρεῶν γεγονὼς, ἢ κογχία ἢ διὰ τῶν ξύλων. κομισαμένους δὲ διὰ τῶν ἐμέτων ὀπωρελῶς, διὰ τὸ μηδὲν ὑπολείπεσθαι ἐν τῇ κοιλίᾳ, τὸ ἐμμεῖναν ἐν τοῖς ἐντέροις κλύσματι δριμεῖ κομούμεθα. πιεῖ δὲ καὶ τὸ νίτρον λεῖον σὺν ὑδρομέλιτι παραλαμβανόμενον, καὶ οἴνοι πολλοὶ καὶ παλαιοὶ ποτὸμμοι, καὶ ζωμοὶ ὀρνίθειοι, ἰχθύες λιπαροὶ, καὶ κρέα παλαιὰ καὶ λιπαρὰ, καὶ τὰ διὰ στέατος ἢ βουτύρου παρασκευάζοντα. ὑπάγοντα γὰρ πῶς κοιλίαν ὥσπερ εἴπεν καὶ τὸν στόμαχον ἀναλύοντα, ἐτοιμοτέρους κατασκευάζει τὸν στόμαχον πρὸς τὸν ἔμετον· ἀμβλύνει τὴ πῶς δριμύτητα αὐτῶν, καὶ παρεμπλοκὰς μὴ τοῖς πόροις κωλύει πῶς ὀξύτητα τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως. δίδονται δὲ καὶ ἀρμόζοντα φάρμακα κοινῶς· ὧν ὅτι ἡ λημνία γῆ λίπτος, ἀγαθικὸν, ἀβρότονον, ἐρύσιμον, ἠρυγγίου ῥίζα, σαφυλίνου σπέρμα καὶ καλαμίνθης, νάρδος κελτικὴ, κασ-

καστόρειον, νάρθηκος χλωροῦ ἐντεριώνη, ῥοδοδένδρου τοῦ καλουμένου ῥοδοδένδρου ἄνθος, πρασίου χυλὸς. σίλφιον, ἢ ὁ ὀπὸς αὐτοῦ, σαγάπηνον, ὀποπάναξ, πευκεδάνου ὀπὸς, καὶ ἡ ῥίζα * ἣν καὶ μανδραγόραν ἐκάλεσαν, ἀριστολοχία μακρὰ, πηγάνου ἀγρίου σπέρμα, κέστρου τῆς βετλονίκης καλουμένης τὰ φύλλα· δίδοται δὲ ἕκαστον σὺν οἴνῳ < ά πλῆθος. ποιεῖ καὶ πολίου ἀφέψημα * καὶ σέσελι καὶ πίσσα ὑγρὰ λεία ἐκλειχομένη. γενναιότατα δὲ βοηθοῦσι καὶ αἱ ἀντίδοτοι, ὧν τὰς σκευασίας ἐπὶ τέλει ἀναγράψομεν. κοινῶς δὲ βοηθητέον τούτοις τὸν τρόπον τοῦτον· δυνατὸν δὲ καὶ ἐκ τῶν παρακολουθούντων συμπτωμάτων, κοινὰ καὶ τὰ βοηθήματα συμπαραλαμβάνεσθαι. σχεδὸν γὰρ αἱ τῶν πλείστων φαρμάκων δυνάμεις, εἰς ὁμοιοτρόπους περιάγουσι τὸ σῶμα διαθέσεις. δι' ἣν αἰτίαν ἐπὶ τῶν πλείστων τὰ κοινὰ βοηθήματα ἀνύει· ποικίλα μὲν γὰρ τὰ δηλητήρια φάρμακα, κοιναὶ δὲ καὶ οὐ πολλαί αἱ ἐξ αὐτῶν γινόμεναι διαθέσεις. ἀδύνατον γὰρ πάντα τὰ συμπτώματα ἑνὶ παρακολουθῆσαι. εἰ γὰρ ἦν τοῦτο, περιεῖλκεν ἂν ἡ καθ' ἕκαστον φάρμακον διὰ τῶν βοηθημάτων παράδοσις. τό, τε γὰρ δήγειν στόμαχόν τε κοιλίαν καὶ ἔντερα ἧπάρ τε καὶ

castoriū, ferulę virentis medulla, flos rhododédri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenū, peucedani succus, aut panacis, & radix quam magudarim appellarūt, aristolochia longa, syluestris rutæ semé, & betonicæ, quā cestron nominät, folia: singula cū vino drachmę pondo sumi debét. Effectum præbet polij decoctū, & seseli, & liquida pix lincta. Magnificè ferūt opé antidota, quę in calce operis scripta reliquimus. Cōmunis ratio præstandi auxilij ita se habet. Cæterū ab iis quæ consueuerunt euenire, cōmunia remedia sumptitari possunt. Ferè enim vires venenorū quamplurimorū, in affectus consimiles corpus tandē redigūt. Quam ob causam plerisq; cōmunia conducūt auxilia: varia etenim sunt venenorū genera, cōmunes tamé nec multi iidé affect⁹ oriūtur. Neq; fieri potest, vt oés cōcurrétésq; casus quæ symptomata vocāt, vnū venenum sequātur. Alioquin superuacanea fuisset venenorū singulorū traditio cū suis remediis ab authorib⁹ descripta, Neq; verò in vno eodéq; promptū est inuenire, vt quis stomachi, alui, intestinorū, iecoris

iecoris,renũ, & vesicæ dolore veheméter crucietur,vt singultiat,erodatur,contremiscat,refrigeretur,obmutescat,cõuellatur,pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, veterno prematur,vertigo obuersetur,caligét sensus, strãguletur,sitiat,sãguis erũpat,febre cõflictetur, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur, crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore sugilletur,pallescat,desipiat,stertat,virib⁹ deficiatur,& pleraq; alia faciat,patiatúrque: singula enim in generales affect⁹ deducta,pauca numero,& communia ea demõstrát,quæ euenire cõsueuerũt. Quare in singulis quę suprà dixim⁹ nõ facile fuerit deuoratũ virus cognoscere. Nam oris & linguæ erosio,stomachi,vétris, vesicæ ac renum inflámatio,vehemés vrinę difficultas, & interdũ cruoris cũ eo exitus lácinatio,& in plurimis partibus quidá adustionis sensus,nó in cãtharidibus modò potis reperiũtur,sed in erucis quoq; pinorum, & bupreste, & salamandra. Porrò non modo eos qui meconium hauserũt, veterno aut sopore premi,stertere, liuore sugillari,torpere, refrigerari, stupescere, toto

καὶ νεφρεσὺς καὶ κύστιν, ἔτι δὲ λύζειν καὶ δάκνεσθαι καὶ τρέμειν, ἀφώνους τε εἶναι καὶ στενοχωρεῖσθαι, ἀποδύεσθαί τε καὶ ἀσφυκτιᾶν καὶ δυσπνοεῖν, καὶ καταφέρεσθαι καὶ σκοτοῦσθαι καὶ πίπτειν καὶ διψᾶν καὶ αἱμορραγεῖν, πυρέσσειν τε καὶ δυσουρεῖν, καὶ στροφοῦσθαι, καὶ ἐμεῖν πυκνὰ ἢ γαυπᾶν, ἐρυθραίνεσθαί τε καὶ πελιδνοῦσθαι καὶ ὠχριᾶν, παραφέρεσθαί τε καὶ ῥέγχειν καὶ παρείεσθαι, καὶ ἄλλα πολλὰ πάσχειν καὶ διάφορα πάσχειν· ἐνὶ μόνῳ δύσκολον εὑρεῖν παρεπόμενον, ἔκστασιν μεμεδὲν εἰς καθολικὰς διαθέσεις ὀλίγων ἀριθμὸν καὶ κοινῶν ὑποδεῖξαι συμπωμάτων. διὸ καὶ ἐφ' ἑνὸς ἑκάστου τῶν προειρημένων οὐκ εὔκολον τὸ εἰλημμένον φάρμακον γινώσκεσθαι. τὸ γὰρ δάκνεσθαι τὸ στόμα καὶ γλῶτταν, καὶ φλεγμαίνειν στόμαχον καὶ κοιλίαν τε καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, δυσουρεῖν τε ἰσχυρῶς, ἐνίοτε δὲ καὶ αἷμα δι' οὔρων προεύεσθαι καὶ λακιδοῦσθαι, διαπεπρῆσθαί τε πολλὰ μέρη τοῦ σώματος, οὐ μόνον ἐπὶ κυνδαλείων εὑρίσκεται παρακολουθοῦντα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πτυοχάμπης καὶ βουπρήστεως καὶ σαλαμανδρας. τό, τε καταφέρεσθαι ἢ καρῦσθαι ἢ ῥέγχειν, στιλιοῦσθαί τε καὶ νωθρίαν καὶ καταλύχεσθαι καὶ ναρκᾶν, αὐτανθεῖν τε καὶ ὀδα-

καὶ ὀδαξᾶσθαι τὸ ὅλον σῶμα, οὐ μόνον τοῖς τὸ μηκώνειον πιπτωκόσι παρέπεται, ἀλλὰ καὶ τοῖς μανδραγόραν ἢ κώνειον ἢ σικύην πεπωκόσιν. τό, τε παραφορεῖν, οὐ μόνον ὑοσκύαμος ἐπφέρει, ἀλλὰ καὶ τὰ τοξικὰ καλούμενα τῶν φαρμάκων· καὶ ἀκόνιτον δὲ, καὶ τὸ μέλι τὸ γλυκόμενον ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Ποντικῇ. καὶ τὸ πνίγεσθαι δὲ οὐ μόνον ἐπὶ ψυκτῶν ἐρᾶται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ αἵματος ταυρείου, καὶ γάλακτος καὶ ἀκονίτου καὶ γύψου καὶ ψιμυθίου. καὶ καθόλου δύσκολον ἂν δόξῃς εὑρεῖν σημεῖον δυνάμεώς τι τῶν πινομένων καὶ γλυκομένων φαρμάκων ἁπλῶσαι· καὶ μάλιστ' ὅτι κοινὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιγινομένοις πάθεσι παρακολουθεῖ ταῦτα. πλὴν ἐπὶ μὲν τῶν ὀξέως ἀναιρούντων, ἔστι που καὶ σημειώσασθαι τὸ βλεπόμενον ὡς παραδώσομεν. ἐπὶ δὲ τῶν χρονίας διαθέσεις παρασκευαζόντων, δύσκολον οὐδὲν πρὸς τὴν θεραπείαν τοῦ περὶ τὴν σημείωσιν δυχερείᾳ βλάπτοντος, ἐκφυγόντα γὰρ τὴν ὀξύτητα τῆς ἐνεργείας τὰ φάρμακα, καὶ μεταπεσόντα εἰς χρονίους, κοινῶς λαμβάνει τοῖς λοιποῖς πάθεσι τὰς κατασκευὰς, καὶ τὰς βοηθείας, τῆς ἰδιότητος τῶν πινομένων φαρμάκων μηκέτ' ἐνούσης. δια-

toto corpore pruritum sentire, sensu priuari cõstat, sed eos etiam qui mandragorã aut cicutam deuorarũt. Deliriũ non hyosciamus tantum infert, verumetiã quæ toxica appellantur: itidem aconitum, & mel quod in Heraclea Pontica gignitur. Stangulatio non minus in fungis, quàm in sanguine taurino, lacte, aconito, ceruſa, gypso conspicitur. In summa, difficile vnũ vni veneno proprium inuenire signum, quod haustum, gustatumque virus prodere possit: maximè quod hæc cæterorum etiam vitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in iis qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dũtaxat quod pertineat ad indicia noxæ, vtpote cum venena statim atque præsentaneam vim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus, cõmunia reliquorum vitiorum remedia, compositionésque flagitent, cum venefica proprietas non amplius insit.

Si verò longa sit affectio, in aliquod diuturnorũ morborum genus recidet, à quibus facilè fuerit medẽdi ratione assumere. Sed de iis quæ generaliter auxiliantur, hactenus. Consequenter quæ priuatim singulis prosunt, scriptis mãdabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficam vim sortiũtur, vt medicinæ studiosi ea cautè obseruẽt, quę ad rationẽ salutis scripta inueniuntur: q nonnulla eorũ quibus vtũtur, venenis sint commista. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe cõtinuo vsu eorũ, homo in pernicię agitur. Proinde animalia quæ exitiosã vim habẽt, hęc sũt: cãtharides, bupresti, salamãdra, pinorũ erucæ, lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuoratæ hirudines. Semina sũt: hyoscyamus, coriãdrũ cicuta, gith, psyllio. liquamẽta: meconiũ, opocarpasũ, thapsiæ succus, elateriũ, mandragoras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitũ, thapsia, veratrũ, ixia, agaricũ nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum vocant, quod in Colchide nascitur. Herbæ oleráque: smilax, quã aliqui tithymalũ appellãt, Roma-

διαθέσεως δὲ χρονίου κατεσκευασμένης ὑπ' αὐτῶν ἡ διάθεσις πεπτῶν εἰς ἓν τι γένος τῶν χρονίων ἐμπίπτει πασῶν, ἐφ' ὧν εὐχερές ὅτι ἂν τὴν θεραπείαν ἀναλαμβάνειν. καὶ τὰ μὲν κοινῶς βοηθοῦντα ταῦτ' ἔστιν. οἷς ἀκολούθως ἀναγράψομεν καὶ τὰ ἴδια ἑκάστοις ἀφορίζοντα προεκθέμενοι ὑφ' ἓν ὅσα φθαρτικὴν ἢ κακοτικὴν ἔχει δύναμιν ἑκάστης τάξεως, καὶ ἵνα προφυλαγμένως εἴ πινα τῶν πρὸς ὑγείαν ἀναγεγραμμένων φαρμάκων ἔχοιέν τινα τούτων μεμιγμένα φάρμακα οἱ φιλιατροῦντες οἷς χρῶνται. τὸ γὰρ ἀπειδισιεπὲς μεγάλας ὀπφέρει βλάβας, καὶ πολλάκις διὰ τὴν συνεχῆ χρῆσιν αὐτῶν, ἀπωλείας αἴτια γίνεται. ζῶα μὲν οὖν ὅτι φθαρτικὰ τά δε· καὶ θαλάσσης, βούκρανις, σαλαμάνδρα, πιτυοκάμπη, λαγὼς θαλάττιος, φρυνος ὁ λεῖος, βάτραχος ἕλειος ἄφωνος, βδέλλαι καταπεπωμέναι. σπερμάτων, ὑοσκύαμος, κόριον, κώνειον, μηλάνθιον, ψύλλιον. ὀπισμάτων δὲ μηκώνειον, ὀπὸς κάρπασον, θαψίας χυλὸς, ἐλατήριον, μανδραγόρας. ῥιζῶν δὲ χαμαιλέων, ἀκόνιτον, θαψία, ἑλλέβορος, ἰξίας, ἀγαρικὸν τὸ μέλαν, ἐφήμερον ὃ ἔνιοι κολχικὸν καλοῦσι διὰ τὸ ἐν κολχίδι γίνεσθαι. πόων δὲ καὶ λαχάνων, σμίλαξ, ἣν ἔνιοι* τιθύμαλον, ῥωμαῖοι

ῥωμαῖοι δὲ τάξιον ἢ τάξον καλοῦσι, στρύχνον μανικὸν ὃ καὶ δορύκνιον καλοῦσιν, ἤ τε σαρπηδόνιος πόα οὖσα βατραχίου εἶδος, μήκων, κερατῖτις, φαρικὸν, τοξικὸν, πήγανον ἄγριον, μύκητες. ἀπὸ ζώων δὲ αἷμα ταύρειον νεαρὸν, καὶ τὸ ἐμπυτιασθὲν γάλα, μέλι τε τὸ ἐν ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ γινόμενον. μεταλλικὰ δὲ, γύψος, ψιμμύθιον, τίτανος, ἀρσενικὸν, σανδαράχαι δύο, λιθάργυρος, ἀδάρκη, μόλιβδος, καὶ ἡ καλουμένη ὑδράργυρος. τῶν δὲ συμφύλων, οἶνος ἀθρόως ποθεὶς πολὺς ἀπὸ βαλανείου ἢ γλυκὺ, ἢ ψυχρὸν ὕδωρ ὁμοίως.

Περὶ Κανθαρίδων. Κεφ. α.

Τοῖς οὖν κανθαρίδας προσενηνεγμένοις, παρέπεται χαλεπώτατα σημεῖα. σχεδὸν γὰρ ἀπὸ τοῦ στόματος μέχρι κύστεως πάντα δάκνεσθαι δοκεῖ αὐτοῖς, καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν, πίσσῃ ἢ κεδρίᾳ ὅμοιόν τι ἐγγίνεσθαι· φλεγμαίνουσι δὲ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον καὶ δυσουροῦσι· πολλάκις δὲ αἷμα προΐενται δι᾽ οὔρων· φέρεται δ᾽ αὐτοῖς κατὰ κοιλίαν* ὅμοια τοῖς ἐπὶ δυσεντερικῶν· λειποθυμίαις τε καὶ ἄσαις καὶ σκοτοδινίαις περιπίπτουσιν· ἐπὶ τέλει δὲ παραφέρουσι τὴν διάνοιαν. δεῖ οὖν πρὸ τοῦ παρακολουθῆσαί τι τοιοῦτον, ἀναγκάζειν ἐμεῖν, διδόντας αὐτοῖς τὸ ἔλαιον, ἢ ἄλλο τι τῶν προειρημένων.

καὶ μετ

Romani taxum, ſolanũ manicũ, quod & dorycniũ dicitur: ſardinia herba, quæ ranunculi genus eſt, corniculatum papauer, pharicũ, toxicum, ruta ſylueſtris, fungi. Ab animalibꝰ, taurinus ſanguis recẽs, coagulatũ lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla: gypſum, ceruſa, calx, auripigmentum, duo ſandarachæ genera, ſpuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domeſticis: vinum abunde poſt balneas potum; aut paſſum; & frigida aqua ſimiliter.

Cantharides. Cap. I.

Quibus datæ ſunt cantharides, ſigna eueniunt grauiſsima. Ab ore enim ad veſicam vſque cuncta erodi ſentiũtur; picẽ aut ſimilem quiddam cedriæ reſipiunt, dextra præcordia inflammãtur: vrinam ægrẽ reddunt, & ſubinde cum lotio ſanguinem emittunt: ſtrigmẽta non ſecus atque dyſentericis, aluo deferuntur: faſtidia urgent: animo linquuntur, obortáq; vertigine concidunt: poſtremò mẽte abalienantur. Ergo antea quàm tale nõnihil accidat, dato oleo, aut ſupradictorũ aliquo, vomere cogãtur:

mox vbi vomtiõe plurima reiecerũt, halicæ aut orizæ, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctũ maluæ, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicũ althææ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, clystere infundatur. Præterea nitrũ eisdem dandũ, ex hydromelite, vt quę stomacho adhuc aut intestinis adhęrét, eluẽdo excernantur, ac descédant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluũ ex nitro aqua mulsa, vacuari debẽt. Detur deinde vinũ aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflãmatæ autẽ partes hordei farina cũ mulsa decocta perũgantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quòd citatus ab eis calor, illapsum virus ita remoratur, vt in principes se parteis insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflãmationibus opitulantur, vtpote quę dolores & permulceant & leniant. Tum vbi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in soliũ descẽdere oportet, ac lauare, vt per cutẽ summam quæ corpori noxia inhæserũt, etiam excernantur.

Et

κὴ μετὰ τὸ κομίσασθαι τὰ πλεῖστα διὰ τῶν ἐμέτων ἐπίεναι διὰ κλυσῆρος χυλὸν χόνδρου, ἢ ὀρύζης, ἢ πτίσάνης, ἢ πλατάνης, ἢ μαλάχης ἀφέψημα, ἢ λινοσπέρμου, ἢ τίλεως, ἢ τῶν ῥίζων τῆς ἀλθαίας, ἣν ἐβίσκον ὀνομάσουσι ῥωμαῖοι. ἐπιδιδόναι τε αὐτοῖς νίτρον σὺν ὑδρομέλιτι πρὸς τὸ καταβιβάσαι κὴ ἐκγίνεσθαι τὰ ἔτι παρακείμενα τῷ στομάχῳ καὶ ἐντέρεσιν. καὶ ἐὰν μὴ διακοπῇ, κινοῦν δεῖ μελίκρατον ἐπίεντας μετὰ νίτρου. κὴ ἐπιδιδόναι οἶνον ἢ γλυκύ, σωτερβιμμένων αὐτῷ προβίλων κὴ σικύων σπέρματος, ἢ γάλακτος ἢ μελικράτου, ἢ στέαρ χήνειον σωτηκὸς ἐν γλυκεῖ. τὰ δὲ φλεγμαίνοντα μέρη καταπλάσσοντας κριθῶν ἀλεύρῳ ἐψημένῳ μὴ μελικράτου. καταρχὰς μὲν οὖν παραλαμβανόμενα τὰ καταπλάσματα, βλάπτει διὰ τὸ ὅσον τῆς γιγνομένης θερμασίας κατέχεσθαι τὸ δοθὲν, ἐπὶ πλεῖον ἐπὶ τὸν τύπτοντα ὄντας κινείσθαι. χρονιζόντων δ' ὠφελεῖ τὰς χαλεπωτάτας φλεγμονάς, παραμυθούμενα καὶ παρακοιμώμενα τὰς ἀλγηδόνας. ἐν ᾧ τόπῳ τῷ καιρῷ ἁρμόζει προλιπαίναντας, ἐλαίῳ θερμαντικῷ τὸ σῶμα λύειν, καθιέντας εἰς ἔμβασιν, ἐκάστῳ δ' ἡ ἰατρεία, διὰ τῆς ἐπιφανείας τὰ ἐπιβλαβῆ παραπιθέντα τῷ σώματι ἐκκρίνεσθαι.

κὴ

καὶ καθόλου παντοίως δεῖ κινεῖν ταὶς ἐκκρίσεις, ὡς ἐς τὸ μὴ ἔμμονον κατασκευλῶ λαμβάνειν τὸν διάθεσιν. διδόναι δὲ καὶ κρέα ὀρνίθια καὶ ἀφύα ἐλαφάκια καὶ ἐλέφα, λιπαρὰ δὲ ταῦτα καὶ ἀπαλώτατα καὶ καθεψημένα σὺν λινοσπέρμῳ· ἐυκοίλια γάρ ἐστι καὶ ἀμελωπικὰ τῶν ἐντέρων. καὶ οἶνον γλυκὺν καὶ πολύ. ἁρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ λιβάνου φλοιὸς, καὶ γῆς τῆς καλαμώδους ἀστέρος, ἑκάστου ℥ δ'. μετὰ γλυκέος ℥ ἑ λαμβανομένου. γλήχων τε μὲθ' ὕδατος τεφθεὶς καὶ ἔπειτα ἢ ῥόδινον μῦρον μετὰ πηγάνου ἀφεψήσιμον, καὶ ἀμπέλου ἀκρέμονες ἁπαλοὶ λεῖοι μετὰ γλυκέος. δυνατώτατα δὲ πάντων βοηθοῦσιν αἱ αὐτίδοτοι πινόμεναι σὺν μελικράτῳ πλῆθος ℥ δ'.

Περὶ Πτυσμάτων. Κεφ. β'.

Τοῖς δὲ πτυσμάτων λαβοῦσιν ἐυτόνως πόνος περὶ τὸ στόμα καὶ τὸν ἀρυγγίσκον παρακολουθεῖ· φλεγμονή τις ἰσχυρὰ γλώσσης καὶ στομάχου καὶ κοιλίας· καὶ ἐντέρων πόνος ἰσχυρὸς μετὰ τῶν δηκτῶν ὀδάξεως τὰ ἐντός· πύρωσίς τε καθ' ὅλον τὸ σῶμα. τούτοις βοηθητέον ὁμοίως τοῖς ταὶς καυθαρίσι πεπωκόσιν. ἰδίως δὲ ἐπ' αὐτῶν παραλήψεται αὐτὶ ἐλαίου τὸ λιτοῦ καὶ ἐείνου τὸ μήλινον, κατασκευαζόμενον ἐκ μήλων κυδωνίων καὶ ἐλαίου.

Et deiectiones multifariā moliri oportet, ne affectus infigatur, & ſtabilitatē capeſſat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut ſuillis catulis, maximè pinguibus & tenerrimis, ac cū lini ſemine coctis, veſci debent: ſiquidē aluū cient, atq; venenorū acrimonias hebetant. Vinū dulce liberalius ebibatur. Prodeſt thuris cortex, & ſamia terra, quæ aſter appellatur, ſi quaternæ ſingulorū drachmæ cū paſſo ſumantur. Item pulegiū ex aqua tritum, irinum aut roſaceum, cum rutę decocto, recentes vitis ramuli, cum paſſo detriti. Longè omnium potentiſsimè, antidota auxiliantur, cum aqua mulſa, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ. Cap. II.

Iis qui erucas pinorū hauſerūt, illico dolor in ore & palato exorīt vehemēs alui, linguæ ac ſtomachi iflāmatio torquet: inteſtina dolor excruciat, ita vt pruriginē ſentire videātur: cor pus totū exæſtuat: faſtidiū vrget. Quibus eſt ſuccurrēdū remediis, quæ deuoratis canthāridibus dantur. Peculiariter tamē pro ſimplici oleo & irino melinū quod è cotoneis pomis & oleo tēperatur, accipiemus.

Bupreſtis. Cap. III.

Qui bupreſtin biberunt, nõ diſsimile nitro virus ſapiũt: ſtomachi ventriſq; vehemens dolor inſequitur: tam vẽter quàm ſtomachus mirum in modum, vt in aqua inter cutem, diffla-tus, intumeſcit. Vniuerſa corporis facies contenditur: vrina ſupprimitur. Quibus eadẽ quæ potis cantharidibus auxiliãtur. Priuatim poſt vomitus & vacuationes quas clyſteribꝰ molimur, aridæ ficus proſunt: item earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulſo aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiam-num omne genus eſſe, & lac humanum bibere, conuenit.

Περὶ Βυπρήστεως. Κεφ. γ'.

Τοῖς δὲ βούπρηστιν πεπωκόσι, δοκεῖ κατὰ τὴν γεῦσιν ὅμοιόν τι βρωμώδει γίγνῳ· παρακολουθεῖ δὲ ἄλγημα στομάχου καὶ κοιλίας σφοδρόν· ὄγκος τε στομάχου καὶ κοιλίας σφοδρὸς ὁμοίως ὑδρωπικοῖς. καὶ περιτείνεται αὐτοῖς ἡ ἐπιφάνεια ὅλου τοῦ σώματος· τά τε οὖρα ἐπέχεται. βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς ὅσα καὶ τοῖς καυθαρίδας πεπωκόσιν. ἰδίως δὲ ἀφελοῦνται μετὰ τὸ τῶν ἐμέτων καὶ τοῦ κλυσῆρος κενωθῆναι σύκα ξηρὰ λαμβάνοντες· καὶ τὸ ἄφεψημα δὲ αὐτῶν σὺν οἴνῳ. παρακμάζοντος δὲ τοῦ κατ' ὀξύτητα κινδύνου, ὠφελοῦνται φοινικοβαλάνοις ἐδίοντες, ἢ λελασμένας ζωὸ οἰνομέλιτι, ἢ γάλακτι πίνοντες. ἢ καὶ ἀπίων ἅπαν τὸ γένος ἐδίοντες καὶ γάλα γυναικεῖον πίνοντες.

Salamandra. Cap. IIII.

Si ſalamandram hauſerunt, linguæ inflãmatio cõſequitur, mẽs & ſermo præpeditur, tremor cum torpore aut horrore quodã ac exolutione accedit: partes nõnullę corporis liuoribus circunquaq; ſugillantur: ſæpéque, diutius immorante veneno putreſcẽtes defluũt. Quibus præſtabimus cũcta quæ potis cantharidibus.

Περὶ Σαλαμάνδρας. Κεφ. δ'.

Τοῖς δὲ σαλαμάνδραν λαβοῦσι, παρέπεται γλώσσης φλεγμονὴ, καὶ διανοίας ἐμποδισμὸς καὶ τρόμος μετὰ ναρκώσεως ἢ φρίκης πόνου καὶ συλύσεως· πελιοῦνται δέ τινα μέρη κυκλοτερῶς αὐτοῖς τοῦ σώματος· ὧν πολλάκις ἐμμεινάντων ὑπὸ φαρμάκου, σπόμβυα ἀποῤῥεῖν, ἐφ' ὧν πάντα ποιεῖ σάμβοι ὅσα καὶ ἐπὶ καυθαρίδων.

Pecu-

ἰδιαίτε-

ἰδιαίτερον αὐτοῖς προσφέρομεν φάρμακον ῥητίνην τὴν πτυΐνην, ἢ χαλβανίδα σὺν μέλιτι αὐτὴ ἐκλειχθεῖσα, ἢ καὶ πίτυος ἀφέψημα συνεκλεανθέντων αὐτῷ τροχίλων· ἢ κέδρος φύλλα σὺν ἐλαίῳ ἑφθέντα χρίνων μετ' ὄξους. ποιεῖ δὲ ἐπ' αὐτῶν καὶ θαλασσίας χελώνης ἢ χερσαίας ὠὰ, ὁ ποῖα αὖ ἦν ἐφθὰ καὶ βατραχῶν ζωμὸς, συγκαθεφθεῖσης αὐτοῖς ἡρυγγίου ῥίζης.

Peculiaria verò remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle linctum, & aiugæ decoctũ, in quo nuclei pinei conterantur: vrticæ quoq; folia, cũ liliis & oleo decocta. Prosunt etiam oua testudinis marinæ aut terrestris, cocta: item ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

Περὶ Ἐφημέρου. Κεφ. ε.

Τοῖς δὲ ἐφήμερον λαβοῦσιν, ὃ ἔνιοι καλοῦσι κολχικὸν ἢ βολβὸν ἄγριον, παρακολουθεῖ κνησμὸς καθ' ὅλον τὸ σῶμα, ὡς ὑπὸ σκίλλης ἢ κνίδης ἐρεθιζομένοις· τὰ δ' ἐντὸς αὐαδάκνηται· καυσοῦνται δὲ τὸν στόμαχον μετὰ βάρους ἰκανοῦ. ὀπιζύοντος δὲ τοῦ πάθους, κατὰ κοιλίας φέρεται αἱματώδη, ξύσμασι μεμιγμένα. οἷς βοηθητέον καθάπερ καὶ τοῖς σαλαμάνδραν πεπωκόσι, διά τε ἐμέτων καὶ κλυσμάτων· πρὸ δὲ τοῦ ἐνισχύσαι τὸ φάρμακον, μεταδοτέον αὐτοῖς δρυὸς τῶν φύλλων ἢ βαλανίων ἢ σεσίων ἀφέψημα· ἢ ἐρπύλλου σὺν γάλακτι πίνειν· ἢ πολυγόνου χυλὸν ἢ ἀμπέλου ἀχρεμόνων, ἢ βάτου ἢ καρδάμου ἁπαλοῦ τῆς ὀπτεριώνης, ἢ μύρτου μεθ' οἴνου. αὐτὰ δὲ τὰ μύρτα λεῖα κοπέντα καὶ ἀποβραχέντα ἐν ὕδατι, βοηθεῖ τὸ ἐξ αὐτῶν ὑγρὸν λαμβανομένου. ποιεῖ

Ephemerum. Cap. V.

Sumpto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut sylvestrẽ bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, nõ secus atq; iis qui vrtica aut scilla lacessuntur: interna rosionem sentiunt: stomachus cũ ingenti grauitate exæstuat. Cæterũ inualescente morbo, cruor strigmẽtis admistus, per aluũ exigitur. Quibus, vt iis qui salamandram hauserũt, vomitione aut clysteribus auxiliari cõueniet: sed antea q̃ venenũ inualescat, dandũ est decoctũ frondium quercus, aut glãdiũ, aut malicorij: lac bibere prodest, in quo serpillũ sit decoctũ: itẽ succum sanguinalis herbæ, aut ramorũ vitis, aut rubi, aut medullę recẽtis ferulæ, aut myrti cum vino. Baccæ autem myrti tusæ tritæque, & aqua maceratæ, vt liquor inde sumatur, opẽ ferũt.

Media caſtaneárú tunicula, ſimilem effectum præbet, ſi cruda in aliquo ſupradictorum ſucco ſumptitetur: origanum quoque cum lixiuio epotum: eximiè iuuantur aſinini lactis aut bubuli calidi potu, etiam ſi in ore contineant: ita vt quibus copia lactis huius adſit, nõ aliud deſideretur.

πιεῖ δὲ ὡσαύτως καὶ ὁ τῶν σαρδονίων βαλανίων ὑμὸς μέσος, ὠμὸς λαμβανόμενος μετά τινος τ' σεσειρημένων χυλῶν· ὀρίγανός τε σὺν χονίᾳ πυθεῖσα· ἀκριβῶς δὲ βοηθοῦσι οἱ τὸ ὄγλον ἢ βόειον γάλα θερμὸν πίνοντες καὶ κατέχοντες ἐν τῷ στόματι· ὥς τε τοὺς ἐμπαρίσαντας τούτου, ἄλλου μηδενὸς χρήζειν βοηθήματος.

Dorycnium.

Cap. VI.

Dorycnion, quod aliqui manicon ſolanum appellarunt, epotum, lactis ſaporem in guſtu refert: continentes ſingultus ciet, humor linguam vexat, ſanguis confertim reiicitur: mucoſa quædam perinde quaſi dyſentericis, aluo egeruntur. Itaque antequam aliquid ex iis eueniat, auxilio ſunt antedicta, vomitus, clyſter, & quæcunque potum venenum expellere poſſunt. Priuatim iis opitulatur, aqua mulſa, lac caprillum, aut aſininum, dulce vinum, quod tepidum cum aniſo bibatur, amygdalæ amaræ, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchylia omnia, tam cruda quàm toſta eſſe ſalutare eſt. Conueniunt & locuſtæ marinæ, & gammari, & pota eorundem iuſcula.

Περὶ Δορυκνίου.

Κεφ. ϛ'.

Δορυκνίου δὲ ποθέντος ὁ ἔνιοι στρύχνον μανικὸν ἐκάλεσαν, παρακολουθεῖ ὥσπερ γάλακτος ποιότης ἐν τῇ γεύσει, καὶ λυγμοὶ συνεχεῖς, γλώσσης τε ὑγρότης, καὶ αἵματος ἀναγωγὴ ἀθρόα· κατὰ κοιλίαν δὲ αὐτοῖς μυξώδη φέρεται ὡς ἐπὶ δυσεντερικῶν. οἷς βοηθεῖ πρὸ τοῦ τούτων τι παρακολουθῆσαι, ἃ καὶ τοῖς σεσειρημένοις ὅ, τε ἔμετος καὶ τὸ κλύσμα, καὶ ὅσα δύναται τὸ ποθὲν ἐκκρίναι φάρμακον. ἰδίως δ' ἐπ' αὐτῶν βοηθεῖ τὸ μελίκρατον ἢ ὄνειον ἢ αἴγειον γάλα, καὶ γλυκὺς οἶνος χλιαρὸς μετ' ἀνίσου πινόμενος, καὶ ἀμύγδαλα πικρά, στῆθη τε ὀρνίθεια καθεψημένα. καὶ πάντα τὰ κογχύλια ὠμά τε καὶ ὀπτὰ ἐδώδιμα, καὶ κάραβοι, καὶ ἀσακοί, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ζωμὸς πινόμενος.

Aconi-

Περὶ

Πρὶ Ακονίτου. Κεφ. ζ'.

Τὸ δὲ ἀκόνιτον εὐθέως ἅμα τῷ πίνεσθαι γλυκαίνει πὼς γλῶσσαν κατά τινος σύψεως· εἶτα ἀπὸ τῆς γλυκασμοῦ σκοτοδινίαν, καὶ μάλιστα ἐν τῷ ἐξανίστασθαι, καὶ ὑγρότητας ὀφθαλμῶν ἐπιφέρει· βάρος τε στόματος, καὶ ὑποχονδρίου μετὰ πολλὰ πνεύματα ἀποδίδοσθαι. ἐφ' ὧν δὲ δι' ἐμέτων ἐκκομιδῶσι δεῖ τὸ φάρμακον, ἢ καὶ διὰ κλυσμάτων καθαρθῶσι τὴν κοιλίαν. χρησόμεθα προποσμῷ ὀρίγανον, ἢ πηγάνῳ, ἢ πράσῳ. ἢ ἀψινθίῳ ζέματι μετ' οἴνου ἀψινθίτου, ἢ ἀειζώου, ἢ ἀβροτόνου, ἢ χαμελαίας, ἢ χαμαιπίτυος. ἁρμόζει δ' αὐτοῖς καὶ ἀποβαλσάμου δραχμὴ < ά. σὺν μέλιτι ἢ καὶ κασταρείου καὶ πιπέρεως καὶ πηγάνου ἴσης δραχμῆς σὺν οἴνῳ. καὶ πτύα ἐρίφου, ἢ λαγωοῦ ἢ νέβρου σὺν ὄξει, καὶ σήθρου σκωρία, ἢ αὐτὸς ὁ σίδηρος, ἢ χρυσὸς, ἢ ἄργυρος διάπυρος ἐν οἴνῳ σβεσθέντα, τῷ ὑγροῦ λαμβανομένῳ κοινάτι σὺν οἴνῳ, καὶ ὄργι δι καθαφθεῖσα, ἢ κρεῶν λιπαρῶν βοείων ζωμὸς λαμβανόμενος σὺν οἴνῳ. λέγει δ' καὶ ἡ χαμαιπίτυς ἰδίως ἐπ' αὐτῶν ἁρμόζειν.

Aconitum. Cap. VII.

Aconitum ſtatim in lingua inter bibendum, cum adſtrictione quadam dulceſcit: & ſubinde potiſsimum cum exurgere conátur, vertigines offundit: lachrymas ciet: grauitatem pectori, & præcordiis adfert, ſimúlque crebri ſpiritus deflantur. Quare venenum vomitione abigi, aut clyſtere per aluum egeri opus eſt. Vtimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, vel abſinthij decocto, cum vino abſinthite, vel ſemperuiuo, vel abrotono, vel chamelæa, aut aiuga. Prodeſt etiamnum opobalſami drachma, cum melle aut lacte, cum caſtorio, pipere & ruta, æquis póderibus ex vino. Coagulũ hœdi, leporis, aut hinnuli cũ aceto, ferri quoque ſtercus, ité vinum in quo aurum, ferrũ, argentúmve candens reſtinguatur, potum: lixiuiaq; cum gallina & vino decocta, aut carnium bubularũ præpinguium iura, cum vino ſumpta. Fertur & aiuga priuatim ipſis ſubuenire.

Πρὶ τοῦ ἐν Ἡρακλείᾳ μέλιτος. Κεφ. η'.

Μέλι τὸ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Ποντικῇ ἐν ᾗ καὶ τὸ ἀκόνιτον γίνεται, ἐθήνησι

Mel Heracliæ. Cap. VIII.

MEL in Heraclia Ponti, vbi aconitum gigni ſolet, inuenitur:

inuenitur: quod qni edunt bibúntve, non ſecus afflictantur, quàm qui aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ poto aconito conueniunt: adiuuantur in primis cõtinuò vini mul ſi potu, cui rutæ folia ſint adiecta.

Coriandrum. Cap. IX.

Coriandrum ob odoré latêre non poteſt: epotum autẽ vocem exaſperat, inſaniã adfert, à temulẽtijs non abhorrẽtem. Qui ſumpſerunt, pudenda dictu blaterant, totiúsq; corporis odore venenũ fatẽtur. Quibus poſt vomitionẽ irino oleo concitatam, vti retulimus, merũ & per ſeſe, & ex abſinthio potum auxiliatur. Item oleum, nec ſecus oua in eodem exinanita, ſi liquefacta in muria ſorbeantur: & epota muria, & ius ſalſum ex gallina & anſere paſſum quoq; cũ lixiuia ſumptũ.

Pſyllium. Cap. X.

Pſyllion epotũ, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mœrore quodam affert: ita vt animum deſpondeant. Cui omnia quæ exhauſto coriano auxiliantur.

Cicuta. Cap. XI.

Cicuta pota vertiginé excitat, oculisq; caliginẽ offundit, ita vt

νησι δ' ἰωνία καλεῖ), ἐν εὐβοίᾳ σπ
δηεῖτις. ὁμοίως δὲ πάσχουσι καὶ οἱ
ἐν ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ τὸ ὑέλι
ηλιώνιμον φαγόντες, ἢ πόντες. ἐφ'
ὧν αἱ μόζει τὰ αὐτὰ τῷ ἀκονίτῳ·
εἰσὶ δὲ εὐβοήθητοι μάλιστα ἀφε-
λόμενοι ὑπὸ οἰνομέλιτος συνεχῶς
αὐλὸ πίνοντες, μιγνυμένων αὐτῶν πα
γαΐα φύλλων. Περὶ κορίου. Κε. θ'.

Τὸ δὲ κόριον λαθεῖν μὲ ὃ δύ-
νατται διὰ τὴν ὁσμὴν, πεθὲν δὲ
τὴν φωνὴν διασπᾷ, καὶ μανίαν
ὁποίᾳ ὁμοίαν τοῖς διὰ μήδου
βλαβεῖσι μετ' αἰσχρολογίας, καθ'
ὅλα δὲ τὸ σώματος αὐτῶν, ἡ ὀ-
σμὴ διαφαίνει. τῷ κορίῳ. βοηθεῖ
δ' αὐτοῖς μὴ τὸ ἐξαιρεθῆναι διὰ
τοῦ ἰείνου ἐλαίου ὡς σεσείσῃ), ἔ-
λαιον σὺν ἀψινθίῳ πινόμενον ἢ
καθ' ἑαυτό. ἢ ἔλαιον ὠά τε κενω
θέντα ὀπὸ αὐτὸ ἢ χλιαινθέντα
σὺν ἅλμῃ ἢ ῥοφήματα· ἢ ἄλμη
δὲ πινομένη καὶ ζωμὸς ἀλωπεκῆς
ἔκ τε ὄρνιθος ἢ χηνὸς γλυκύς τε
σὺν κενίᾳ παραλαμβανόμενος.

Περὶ Ψυλλίου. Κεφ. ι.

Καὶ τὸ ψύλλιον δὲ καλού-
μενον πεθὲν, ὀπῳδεῖ ψύξιν ὅλου
τοῦ σώματος, καὶ νάρκωσιν μετ'
ἐκλύσεως καὶ ἀθυμονίας. ᾧ βοη-
θεῖ πάντα ὅσα τοῖς κόριον πε-
πωκόσι.

Περὶ Κωνείου. Κεφ. ια.

Κώνειον δὲ πεθὲν ἐπιφέρει
σκοτώματα καὶ ἀχλῦ, ὥς τε
μὴ δ

μὴ δ' ἐπ' ὀλίγον βλέπειν· λυγμόν τε ἢ διανοίας παρφορὴν, καὶ ψύξιν ἄκρων· ὑπὸ τέλει δὲ ἀποῤῥιγοῦσι πίνοντα, φάσιν λαμβάνοντος τῆς κατὰ πλῶ ἀρτηρίας πνεύματος. καταρχὰς μὲν οὖν ὡς ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων διὰ τῶν ἐμέτων αὐτὸ κομιούμεθα· ἔπειτα κενώσαντι χρησόμεθα, τὸ εἰς τὰ ἔντερα παρελθὸν ἐκκριτοῦντι· καὶ τό τε ὡς ὑπὸ μύλον βοήθημα ὑπὸ πλῶ ἀκρατοποσίαν παρασχόμεθα· διδόντες μεταξὺ διάσημα, ἐν οἷς πεῖν δὲ δώσομεν βοηθεῖ γάλα ὄνειον ἢ ἀψίνθιον μετὰ πιπέρεως ἢ οἴνου, καὶ κασσείου καὶ πηγάνου καὶ ὑδυόσμου σὺν οἴνῳ, ἢ καρδαμώμου ἢ σήσεγχος, ἢ πεπέρεως μετὰ σίδης σπέρματος σὺν οἴνῳ, ἢ δάφνης τὰ φύλλα, ὁμοίως † σλφίῳ ὑπὸς σὺν ἐλαίῳ ἢ γλυκεῖ, ἢ ὁ γλυκὺς οἶνος δὲ καθ' ἑαυτὸ πολὺς πνιγμὸς, ἱκανῶς ἀρμόζῃ.

Περὶ Σμίλακος. Κεφ. ιβ'.

Ἡ δὲ καλουμένη σμίλαξ, ὑπ' ἐνίων δὲ ὄμμον ἢ παρὰ ῥωμαίοις τάξον· ποθεῖσα ὑποφέρει ψύξιν καθ' ὅλου τοῦ σώματος, ἢ πνιγμὸν, ὀξύτητα τοῦ διαλογισμοῦ· οἷς βοηθεῖ πάντα ἃ ἢ τοῖς τὸ κώνῃον πεπωκόσι.

Περὶ Ὀποῦ καρπάσου.

Κεφ. ιγ'.

Καὶ ὁ τοῦ καρπάσου ὑπὸς ποθεὶς, κάρον ὑποφέρει καὶ πνιγμὸν ὀξύν· βοηθοῦν)

ita vt minimum cernatur: singultus ciet, mentē turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, vti in reliquis, cicutam vomitu excutiemus: postmodum deiectionē moliemur, vt quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendum, per interualla, in quibus proderit lac asininum, aut bubulum potui datum, aut absinthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amomi, cardamomi, aut styracis vncia, aut piperis cum semine vrticæ & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo, & passum per sese largius potū proficit.

Taxus. Cap. XII.

Smilax, à quibusdam tithymalum, à Latinis taxus appellatur: frigus vniuerso corpori strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicutæ conueniunt.

Carpasi succus.

Cap. XIII.

Epotus carpasi succ⁹ soporē, citamq; strāgulationē adducit.

Adiuuantur

Adiuuantur autem qui hauſerunt, epotæ cicutæ remediis.

Sardonia herba.

Cap. XIIII.

Sardonia ranunculi herbæ generi aſsignatur, quæ veſcentibus mentem adimit, & quadam neruorum diſtentione labia in rictum cõtrahit, vt riſus ſpeciem præbeant: à qua quidẽ affectione, de Sardonio riſu adagiũ in vulgus infausto omine manauit. Poſt vomitum peculiariter conuenit aqua mulſa & lac, liberalius epota: irrigatio, perũctioq; à pinguibus medicamẽtis, totũ corpus excalfaciẽtibus: in calidã aquam oleumq; deſcendãt, ſed tũ multum perfricare, & inũgere expedit: & in ſumma, curã omnẽ, quæ cõuulſioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoſciamus. Cap. XV.

Hyoſcyamũ potũ aut comeſum, ſimilẽ ebriis abalienationẽ mouet: ſed facilè medicamẽtis cedit. Auxiliaꝫ aquã multa copioſe data, lacq;, præſertim aſininũ, ſi id deſideraꝫ, caprillũ, vel bubulũ, vel aridarũ ficuum decoctũ. Faciũt ad id etiã nuclei pinei, aut cucumis ſemen ex paſſo ſumptum, & vinum ſalſum cum adipe ſuilla recẽti, paſſoq;

βοηθοῦνται δὲ καὶ οἵτινες ὑφ' ὧν καὶ οἱ τὸ κώνειον πιπωκότες.

Περὶ Σαρδονίας πόας.

Κεφ. ιδ'.

Ἡ δὲ σαρδόνιος λεγομένη πόα, βατραχίου εἴδος οὖσα, ποιεῖσα ἢ βρωθεῖσα, παραφθόραν διανοίας ἐπιφέρει καὶ ἀπάσματα μετὰ συνολκῶν χειλέων, ὥς τι γέλωτος φαντασίαν παρέχειν· ὑφ' ἧς διαθέσεως καὶ ὁ σαρδόνιος γέλως οὐκ εὐφήμως ἐν τῷ βίῳ κατωνόμασται. ἐφ' ὧν ἰδίως καὶ μετὰ τὸν ἔμετον, ἀρμόζει μελίκρατον πολὺ διδόμενον καὶ γάλα· ἐμβροχή τε καὶ λιπασμὸς ὅλου τοῦ σώματος διὰ θερμαντικῶν φαρμάκων, καὶ ἐμβάσεις δ' ὑδρελαίου θερμοῦ. ὑπαλείφειν μὲν γοῦν ἱκανῶς δεῖ καὶ ἀνατείνειν μετὰ πόνου ἔμβασιν αὐτούς. καθόλου δὲ ὡς πρὸς ἀπασμόν, ὅλως ἡ θεραπεία δεῖ ποιεῖσθαι.

Περὶ Ὑοσκυάμου. Κεφ. ιε'.

Ὑοσκύαμος δὲ ποθεὶς ἢ βρωθεὶς παραπλησίως τοῖς μεθύουσιν ὁμοίαν ἐπιφέρει ἕξιν. ἔστι δὲ εὐίατος. βοηθοῦμεν μελικράτῳ πολλῷ ποτιζομένῳ, καὶ γάλακτι μάλιστα ὀνείου, εἰ δὲ μή γε βοείου, ἢ σύκων ξηρῶν ἀφεψήματι· ποιοῦσι δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ τρόπιλοι, καὶ τὸ σικύου σπέρμα σὺν γλυκεῖ λαμβανόμενον καὶ ἀλμυρᾷ οἴνου σὺν σέσαμι ὑείῳ μαγῷ,

καὶ

καὶ γλυκεῖ σὺν ὕδατι, καὶ κνίδης σπέρμα ὁμοίως· ἢ νίτρον σὺν ὕδατι. ἀφόζει καὶ κιχώριον, καὶ νάπυ, καὶ καρδάμωμος καὶ ῥάφανον καὶ κρόμμυα, καὶ σκόροδα· ἕκαστον τούτων σὺν οἴνῳ λαμβανόμενον· ἱσυχάζειν δ' αὐτὸν ἀναγκάζειν δεῖ, ὥσαρ οἱ τὸν οἶνον πόντες*.

passõque: itidem vrticæ semé, aut nitrum ex aqua, & intubo erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium: & hæc singula cum vino sumantur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt, vt excoquant.

Περὶ Μανδραγόρου. Κεφ. ις.

Μανδραγόρου δὲ πιόντος ὑπνώσεις, κάρος ἐπακολουθεῖ καὶ ἔκλυσις καταφορά τε ἰχυρὰ καὶ μακρὸν διαφέρουσα πάσης τῆς λεχομένης ληθάργου, ᾧ σχεδὸν τῷ πί τέτων συμβῶσι, ἀφόζει ὅ, τε ἔμετος καὶ μιλίκρατον, καὶ μετὰ τῦτο καὶ νίτρον· καὶ ἀψίνθιον σὺν γλυκεῖ ἢ οἴνῳ γλυκάζοντι λαμβανόμενα. καὶ ἡ τῆς κεφαλῆς ἐμβροχὴ διὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους· καὶ διέγερσις δὲ καὶ κίνησις τοῦ σώματος. καὶ ἡ δι' ὀσφραντικῶν καὶ ἐυπατορίου καὶ πιπέρεως καὶ νάπυος, καστορίου καὶ πηγάνου ὄξει τριβομένων· καὶ πόσις ὑγρᾶς καὶ τῶν κεκαυμένων, καὶ ἐσθιομένων ἑλλυχνίων· δυσανακλήτως δὲ αὐτῶ ἐχόντων, καὶ παραμικρὰ ἐπάγειν. καὶ τοῖς ἀλλοις κοινοῖς βοηθήμασι χρῆσθαι καὶ ὅτι τούτων.

Mandragora. Cap. XVI.

Mandragora si bibatur, cõfestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternus, nihil temerè distans à lethargo. Cui, antequàm aliquid ex iis accidat, vomitus & aqua mulsa proderit: postea nitrum & absinthium, ex vino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatorij, & piperis, sinapis, castorij, & rutæ, tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. Quòd si ægrè ij reuocentur, sternutamenta mouere, aliísque communibus auxiliis vti conueniet.

Περὶ Μήκωνος. Κεφ. ιζ'.

Μήκωνος δὲ ὀπῦ πεπόντος, παρακολουθεῖν καταφορὰ μετὰ καλαλύσεως καὶ κνησμῦ ὀπτὰ μάλιστα ὡς πολλάκις ἐνισχύοντος τῦ φαρμάκου, ὀπτὰ γίνεσθαι τοσῦτον κνησμὸν,

Meconium. Cap. XVII.

Epoto papaueris succo, qué meconiõ vocãt, cõsequit veternus cũ perfrictione & pruritu vehementi, ita vt sæpe inualescente veneno, tanta erumpat prurigo,

prurigo, vt hominem excitet. Corpus id medicamentũ olet. Post citatam oleo vomitionẽ, acres clysteres auxiliãtur, acetúmque mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merũ cum absinthio aut cinnamomo, copiosum, aut calidum per sese acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixiuia aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, vino, & panace: pipérq; cum castorio & aceto mulso, vel cum satureiæ aut origani decocto, cũ vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pingium vsus, cum vino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

κνησμὸν, ὡς τι διεγείρεσθαι ὑπ' αὐτῶ· ὀσμή τε τῶ φαρμάκω δι' ὅλου τοῦ σώματος ἐνδίδοται. οἷς βοηθεῖ μετὰ τὸν τοῦ ἐλαίου ἔμετον, καὶ κλυσθῶσι δριμεῖ κλύσματι, οἷον μέλι σὺν ἅλατι πινόμενον ἢ μέλι σὺν ῥοδίνῳ θερμῷ. καὶ ἄκρατος πολὺς σὺν ἀψινθίῳ ἢ κιννα μώμῳ, ἢ ὄξος θερμὸν καθ' ἑαυτὸ νίζον τὸ σὺν ὕδατι καὶ ὀρίγανον σὺν κονίᾳ πιεσθὲν ἢ ἀγρίου σπέρμα σὺν πεπέρει καὶ οἴνῳ καὶ πάνακι, πίνεσί τε μετὰ κασσίας καὶ ὀξυμέλιτος, ἢ μετὰ σύμβερος ἢ θερμάντου σὺν οἴνῳ. δεῖ δὲ καὶ τούτοις διεγείρειν τοῖς ὀσφρητικοῖς καλυμμάτοις καὶ ἐμβιβάζειν εἰς θερμὸν καὶ πυριᾶν διὰ τὸν ἐπιγινόμενον κνησμόν. ὑγιάσει αὐτὸς καὶ μετὰ τὸ λουσθῆναι χρῆσθαι ζωμοῖς λιπαροῖς, μετὰ οἴνου ἢ γλυκέος· καὶ μυελὸς δὲ μετ' ἐλαίου πινόμενος.

Corniculatum papauer. Cap. XVIII.

Περὶ Μήκωνος κεφαλῆπος. Κεφ. ιη'.

QVOD corniculatum papauer appellant, & potu & cibo eadem inferre consuetuit, quæ papaueris succus: nec aliis expugnatur auxiliis.

Ἡ δὲ λεγομένη κεφαλῆπος μήκων, ἐν τῷ βρωθῆναι ἢ ποθῆναι τὰ αὐτὰ ὀπιφέρουσα τῷ ὀπῷ τῆς μήκωνος συμπτώματα· τοῖς αὐτοῖς βοηθήμασιν ὑποπίπτει.

Pharicum. Cap. XIX.

Περὶ Φαεικοῦ. Κεφ. ιθ'.

Quod pharicon vocãt, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionẽ neruorum potũ affert, cũ cõuulsiõe & delirio. Oportet autẽ post vacuatiões vinum

Τὸ δὲ καλούμενον φαικὸν, τῷ μὲν χεῦσαι πάσαν γὰρ δύναται ἀγρίαν ὁμοίαν. ὀπιφέρει δὲ παράλυσιν πόνων μετὰ παραφροσύνης καὶ σπασμοῦ. δεῖ δὲ μετὰ τὸ ἐξαγάσαι αὐτὸν, ποτίζειν

ποτίζειν οἶνον ἀψινθίτην, σὺν κινναμώμῳ ἢ σμύρνῃ ἢ νάρδῳ κελτικῇ ἣν ἔνιοι σερίνην ἐκάλεσαν· ἢ ναρδοστάχυος ὁλκὰς β΄. καὶ σμύρνης β΄. ὀβολοὺς μεμιγμένους σὺν γλυκεῖ ἢ ἶριν μετὰ κρόκου σὺν οἴνῳ· δεῖ δὲ καταπλάσσειν δὲ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ξυρήσαντας, κριθίνῳ ἀλεύρῳ σὺν πηγάνῳ λείῳ καὶ ὄξει.

vinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinē aliqui vocauerunt: aut spicæ nardi duas drachmas, & myrræ totidē obolos, cū passo, aut irim cum croco ex vino: derasúq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Περὶ τοξικοῦ. Κεφ. κ΄.

Τὸ δὲ τοξικὸν, δοκεῖ μὲν ὀνομάσθαι, ἐκ τοῦ τὰ τόξα τῶν βαρβάρων ὑπ᾽ αὐτοῦ χρίεσθαι. παρακολουθεῖ δὲ τοῖς πεπωκόσι χειλέων καὶ γλώττης φλεγμονή· μανία τε ἀκατάσχετος ποικίλαις ἐπιβάλλουσα φαντασίαις· ὡς καὶ διὰ τοῦτο δυσιάτους εἶναι ἐν ταῖς θεραπείαις· σπανίως δὲ καὶ σώζεσθαί τινας τῶν πεπωκότων. δεῖ μέντοι συνέχειν αὐτοὺς δεσμοῖς ἀναγκάζοντας καὶ βιαζομένους γλυκὺν οἶνον σὺν ῥοδίνῳ πίνειν, καὶ ἐξεμεῖν· τότε τῆς γογγύλης σπέρμα σὺν οἴνῳ. ἰδίως δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἁρμόζει καὶ ἡ τῆς πενταφύλλου ῥίζα, αἷμά τε τράγου, ἢ αἰγὸς ὁμοίως λαμβανόμενα, δρυός τε φλοιὸς ἢ φηγοῦ, ἢ πρίνου γάλακτι συνεκλεανθείς· καὶ μῆλα κυδώνια ἐσθιόμενα ἢ λεῖα σὺν γλήχωνι καὶ ὕδατι πινόμενα, ἄμωμόν τε καὶ βαλσάμου καρπὸς σὺν οἴνῳ. καὶ εἴ τινες αὐτοῦ φύγοιεν τὸν κίνδυνον, πολὺν χρόνον κλινοπετεῖς διαμένουσι, καὶ ἀναστάντες ἐπτοημένοι τὸν λοιπὸν χρόνον διάγουσι.

Περὶ

Toxicum. Cap. XX.

Toxicum ex eo nominari videtur, quòd barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflammatione torquētur: incoërcitus furor varias iis imagines obuersat: quare vix medicinæ locus est: raróq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, vt vinum dulce cū rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum vino. Priuatim iis cōuenit, quinque folii radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus: maláque cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet, amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & vbi surrexere, stupidi reliquum vitæ tempus degunt.

Ixia.

μὴ παρακοπῆς καὶ δυσεντερίας. οἷς ἁρμόζει μελίκρατον διδόναι ἢ σύκων ἢ μαλάχης ἀφέψημα, ἢ γάλα θερμὸν ἢ σίσαμον λεῖον μετ' οἴνου, ἢ κονίαν κληματίνην, ἢ ἀμαράκινον ἔλαιον ἢ ἴειον, ἢ περσικῶν τὰ ὀστᾶ. * δεύτερον δὲ ὠὰ σὺν λιβάνῳ ἢ κριθίνῳ ἀφεψήματι, ἢ κοκκυμήλοις, ἢ κόμμει πτελείας, ἢ τὸ ἐν τοῖς φύλλοις τῆς πτελείας ὑγρὸν μετὰ χλιαροῦ ὕδατος. * ἁρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ θαψίας χυλὸς, ἢ σκαμμωνίας ὀπὸς σὺν μελικράτῳ πινόμενα.

Περὶ Μυκήτων. Κεφ. κγ'.

Μυκήτων δ' οἱ μὲν τῷ γένει βλάπτουσιν, οἱ δὲ τῷ πλήθει· ἐπιφέρουσι δὲ πάντες * πνίγμους ἐποικοῦντας ἀσχόνους. οἷς εὐθέως βοηθεῖν δεῖ κοινῶς, ἀναστρέφοντας ἐμεῖν δι' ἐλαίου· θαυμαστῶς δ' ὀφελοῦνται πίνοντες κονίαν κληματίνην, ἢ ἐξ ἀχράδινα ξύλα, μετὰ ὀξυκράτου καὶ ἁλῶν ἢ νίτρου. καὶ συνεφόλμια δὲ αἱ ἀχράδες ἢ τὰ φύλλα τοῖς μύκησιν ἀφαιροῦσι τὸ πνιγῶδες αὐτῶν, ἐσθιόμεναι δ' ὠφελοῦσι. βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς ἀλεκτορείδων ὠὰ σὺν ὀξυκράτῳ πινόμενα μετὰ ἀριστολοχίας ὁλκῆς ά. ἢ ἀψινθίου σὺν οἴνῳ καὶ μέλιτι ἐσθιόμενον καὶ πινόμενον σὺν ὕδατι, μελισσόφυλλόν τι σὺν οἴνῳ παιωνίου τι ῥίζα, καὶ

mens labat, mẽbra torpescunt. Quib⁹ dare cõuenit aquã mulsam, aut ficuũ aut maluæ decoctũ, aut lac calidũ, aut sesamã ex vino tritã, vel lixiuiã ex sarmentis factã, amaricinũ oleum aut irinũ, persicorũ ossa cum hordei decocto: colũbina oua cũ thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gũmi qđ vlmus plorauit, aut humor quẽ vlmea folia reddiderunt, cũ tepida aqua: sed tũ quoq; vomãt. Cõuenit etiã thapsiæ succus, aut scãmoniæ, cũ aqua mulsa potus.

Fungi. Cap XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia lædunt: omnes tamen strangulatus suspendio similes concitant. Quibus confestim succurrendum: cõmuniter ex oleo vomere cogendi: mirificè iuuat lixiuia ex sarmentis, aut pyrastri surculis, epota cũ sale, posca & nitro. Fructus, aut folia pyrastri cum fungis decocta, strangulantem illam vim auferunt, esitatáque eisdem auxiliãtur. Aduersus fungos gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma: item absinthiũ cum vino melléque sumptum, & ex aqua potum apiastrum: ex nitro panacis radix,

& semen in vino, fæx vini cremata cum aqua, atramentum sutorium ex aceto: radix, vel sinapis, aut nasturtiũ esu, psunt.

Gypsum. Cap. XXIIII.

Lapidescens gypsum strãgulationem creat: quare eadem proferenda sunt, quæ mansis fungis, auxilia, & ad hęc maluę decoctum, quod etiam olei vicem pẽsat: vtpote cùm pingue sit, euomendo lubricas vias & faciles reddit, deradiq; corpora non sinit. Quod vbi duratur in lapidẽ, gypsum efficit. Quin etiam prodest oleum ex aqua mulsa, aut ficorũ decocto: & lixiuia è siculneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum aut thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo: hiq; decocto maluæ proluendi.

Sanguis taurinus.

Cap. XXV.

Tauri recẽs iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatũq; cõcitat: faucium tonsillarũq; meatus cũ neruorũ distẽtione præcludit: lingua rubescit: dentes inficiũtur, & quædam cõcreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restãt. Quare vomitũ vitabimus: sanguinis enim globi, attractu

ἢ καρπὸς σὺν οἴνῳ, τρύξ τε οἴνου κεκαυμένη μετ' ὕδατος, ἢ χάλκανθος σὺν ὄξει. ῥάφανός τε ἢ γάπυ ἢ καρδάμωμον ἐπιτίθυται.

Περὶ Γύψου. Κεφ. κδ'.

Καὶ ἡ γύψος πηγμὸν ὑποφέρει λιθουμένη· ὅθεν καὶ τούτοις ἁρμόζει διδόναι τὰ αὐτὰ τοῖς μύκησι βοηθήματα καὶ ὑπὲρ τούτων τὸ τῆς μαλάχης ἀφέψημα, ὃ παραλλήπτέον ἀντὶ τοῦ ἐλαίου· λιπαρὲν γὰρ ὂν καὶ ὑπὸ τῶν ἐμέτων ὀλισθαίνεσθαι ποιοῦν, οὐκ ἐᾷ καταξύεσθαι τὰ σώματα. λιθουμένη γὰρ ἡ γύψος ἐργάζεται τοῦτο. ἁρμόζει δὲ καὶ τὸ ἔλαιον σὺν μελικράτῳ ἢ σύκων ἀφεψήματι· καὶ κονία συκίνη ἢ κλήματίνη σὺν οἴνῳ πολλῷ πινομένη· καὶ ὀρίγανος ἢ θύμος σὺν κονίᾳ, ἢ ὄξει, ἢ γλυκεῖ· δεῖ δὲ πύτους ὑποκλύζειν τῷ τε μαλάχης ἀφεψήματι.

Περὶ Αἵματος ταυρείου.

Κεφ. κε.

Αἷμα δὲ ταύρειον νεοσφαγὲς πιθὲν, δύσπνοιαν ὑποφέρει καὶ πηγμόν· ἐμφράττον τοὺς περὶ τὰ παρέγχυμα καὶ τὴν κατάποσιν πόρους μετὰ ἀσφυξίου ἰσχυροῦ· σύρίσκεταί τι ἐπ' αὐτῶν ἢ γλῶσσα ἐρυθρά· καὶ ὀδόντες βεβαμμένοι, καὶ θρομβία μεταξὺ αὐτῶν, ἐφ' ὧν τὸν ἔμετον παραιτούμεθα, τῶν θρόμβων μᾶλλον

μᾶλλον ἐν τῷ στομάχῳ σφηνουμένων διὰ τὸ μετεωρίζεσθαι αὐτοὺς κατὰ τὴν ὁλκήν. δίδοται δὲ ὅσα δύναται τὴν πῆξιν διαλῦσαι τοῦ αἵματος, καὶ τὴν κοιλίαν ὑπάγειν. τούς τε ὀλύνθους πλήρεις ὄντας τοῦ ὀποῦ σὺν ὀξυκράτῳ, καὶ νίτρον δὲ καθ' ἑαυτὸ ὠφελεῖ· καὶ πιτύα ἅπαντα σὺν ὄξει καὶ σιλφίου ῥίζῃ ἢ τῷ ὀπῷ· ὁμοίως καὶ κράμβης σπέρμα, κονία τε συκίνη· καὶ κονύζης σπέρμα σὺν πεπέρει, καὶ βάτου χυλὸς σὺν ὄξει. δεῖ δὲ τὴν κοιλίαν ὑπάγειν. εἰώθει δὲ τοῖς σωζομένοις ἀποδίδοσθαι διὰ τῆς ἕδρας καὶ ῥοώδη. καταπλάσσειν δὲ καὶ στόμαχον καὶ τὴν κοιλίαν, ἀλεύρῳ κριθίνῳ μετὰ μελικράτου.

Περὶ Γάλακτος ἐμπυτιασθέντος. Κεφ. κς΄.

Καὶ τοῖς λαβοῦσιν ἐμπυτιασθὲν γάλα, ἀθρόως πολὺς πνιγμὸς γίνεται διὰ τὸ θρομβοῦσθαι. οἷς βοηθοῦντας προσφέρειν δεῖ ὥσπερ ἀντίδοτον πυτίαν σὺν ὄξει, πολλάκις ἀναγκάζοντας πίνειν. καὶ καλαμίνθης τὰ φύλλα ξηρὰ ἢ τὸν χυλὸν ὁμοίως· ἢ σιλφίου ῥίζαν ἢ τὸν ὀπὸν σὺν ὀξυκράτῳ· θύμον τε σὺν ὄξει, καὶ τὴν πηλοποιητικὴν κονίαν. ἁλυκὸν δὲ μηδὲν προσφερέσθω, μᾶλλον γὰρ πήγνυται καὶ τυροῦται τὸ γάλα. ἀλλ' οὐδὲ τούτους ἐμεῖν δεῖ· ἐνιστάμενον γὰρ ἐπὶ τὰ τοῦ στομάχου στενὰ τε θρομβούμενον πνίγει.

Περὶ

attractu illo in sublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiũt, & aluum subducũt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese, auxiliantur: nec secus coagulum omne cum aceto et laserpitij radice, aut lasere: itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyxæ folia cũ pipere, & rubi succus ex aceto. Aluus resoluẽda. Iis q̃ seruantur, stercorosa & fluida per sedem egeri consueuerũt. Stomachũ aluúmque hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

Lac coagulatũ. Cap. XXVI.

Eos qui coagulatũ lac hauserũt, frequẽs illico strãgulatio inuadit, quod ĩ globulos quosdã lac coalescat. Quib⁹ iuuandis ꝑ antidoto, coagulũ ex aceto dam⁹, & bibere sæpi⁹ cogimus. Dam⁹ & calaminthæ folia arida, itẽ succũ: aut laserpitij radicẽ, au lasercum posca: thymũq; ex vino, & cum luto suo lixiuiã. Sed nulla salsilago obiiciatur, quoniã magis lac coiret, & in caseũ densaretur. Neque illos vomere conuenit: siquidẽ cõcretũ lac sese in gulæ angustias insinuans, strãgulat.

Argẽti ſpuma. Cap. XXVII.

Spuma argenti pota, ſtomacho, vẽtri, & interaneis grauitatem cum magnis torminib⁹ adfert, & nonnunquá pondere ſuo inteſtina vulnerat, vrinámq; ſupprimit: corpus intumet, plúbeamq; deformitatem cócipit. Quib⁹ ſubuenit ſecúdũ vomitionẽ, potũ ſylueſtris hormini ſemen, myrrhæ drachmę octo, abſinthiũ, hyſſopũ, apij ſemen, aut piper, aut liguſtri flos ex vino: aridũ palúbis ſimum, cum nardo & vino.

Argentum viuum. Cap. XXVIII.

Argentum viuum potum eadem quæ ſpuma argenti infert, eiſdémque vtendum auxiliis. Lac copioſæ potum auxiliari conſtat: ſed poſtea euomant, qui hauſerunt.

Calx, ſandaracha, auripigmentum. Cap. XXIX.

Calx, ſandaracha, & auripigmentum, pota aluum, & inteſtina cum vehementi eroſione excruciant. Præbenda cuncta quæ ſuo admiſtu illorum acrimoniam hebetant, ac ſoluunt, & facilem lubricámque aluum reddũt, cuiuſmodi ibiſci & maluæ ſuccus eſt: natura enim vtrique perlubrica.

Dandum

Περὶ Λιθαργύρου. Κεφ. κζ'.

Λιθάργυρος δὲ ποθεῖσα βάρος ἐπιφέρει στομάχῳ καὶ κοιλίᾳ, καὶ ἐντέρων μετὰ στρόφων ἐπίτασιν, ὥστε δὲ καὶ πτῶσιν τὰ ἔντερα διὰ τὸ βάρος, καὶ ἐπέχει τὰ οὖρα· παρεισδὺν δὲ αὐτῶν τὸ σῶμα, καὶ μολυσμὸν ἀφορέτειαν λαμβάνει. ἐφ' ὧν ἁρμόζει μετὰ τὸν ἔμετον πυόμελι σὺν οἴνῳ ἡρμένον ἀγρίου ἀπίου, ἢ πίτυος, ἢ κύπρου ἄνθος σὺν οἴνῳ· πίτυος τε ἀγρίων ἄφοδος ξηρὰ μετὰ ναρδου καὶ οἴνου.

Περὶ Ψιμυθίου. Κεφ. κή.

Ψιμύθιον δὲ ποθεῖσα, τὰ αὐτὰ ἐπιφέρει τῇ λιθαργύρῳ, καὶ ἐπὶ τούτων δεῖ τοῖς αὐτοῖς βαπτίσμασι χρῆσθαι. δοκεῖ δὲ αὐτὸν ὠφελεῖν γάλα πυόμενον· ἐμείτωσαν δὲ καὶ ὕπτιοι.

Περὶ Τιτάνου. Κεφ. κθ'.

Τίτανος, σανδαράχῃ καὶ ἀρσενικὸν ποθέντα, τὰ αὐτὰ ἀλγήματα κοιλίας καὶ ἐντέρων ἐπιφέρει μετὰ δηγμοῦ σφοδροῦ. ὅθεν προσφέρειν δεῖ ἅπαντα ὅσα μετὰ τῆς κιννάβαρεως, δύναται τὸ ὑγιεμὲς, καὶ πρὸς τὴν κοιλίαν ὀλισθηρὸν παρέχειν, οἷός ἐστιν ὁ τοῦ ἐβίσκου καὶ τῆς μαλάχης χυλὸς, λίαν ὀλισθηρὸς ὑπάρχων.

παρέχειν

παρέχειν δὲ δεῖ ἢ ἀφέψημα λινοσπέρμου, ἢ ὁ τῆς πράσου καλυμμύνης βοτάνης καρπὸς, ἢ ὀρύζης, ἢ γάλα πολὺ σὺν μελικράτῳ, ἢ ξωμοὶ λιπαροὶ ἢ εὔχυμοι.

Πρὶ Λαγωοῦ θαλαττίου

Κεφ. λ'.

Λαγωοῦ δὲ θαλαττίου πεφθέντος παρακολουθεῖ χυῦσις ὁμοία ἰχθύσι βρωμώδεσιν· ἐν δὲ τῷ χρονίσαι, κοιλία τε ἀλγεῖ, ἢ οὖρα ἐπέχεται· εἴποτε δὲ ἐκκριθείη, πορφυρίζοντα τὴν χρόαν ὁρᾶται. ἀποστροφή τε καὶ μῖσος πρὸς πάντα ἰχθύς· καὶ ἱδροῦσι δυσώδη. παρέπεται δὲ αὐτοῖς καὶ ἔμετος χολώδης, ἐνίοτε αἵματι μεμιγμένος. οἷς δοτέον γάλα ὄνειον ἢ γλυκὺ συνεχῶς, καὶ μαλάχης ῥίζης καὶ τῶν φύλλων τὸ ἀφέψημα, ἢ κυκλαμίνου ῥίζαν λείαν σὺν οἴνῳ, ἢ ἐλλεβόρου μέλανος ἢ σκαμμωνίας ὀπὸν μὴ μελικράτου, ῥοῶν τε πυρίνων. ἢ καθαρσίας λείας μετ' οἴνου. ποιεῖ καὶ χυμὸς αἷμα πολὺν θερμόν. μὴ δυναμένοις δὲ οὗτοι ἰχθύας προσενέγκασθαι, μόνους τοὺς ποταμίους καρκίνους ἐφθοὺς ἐδίοισι, * καὶ πίνοισιν οἴνῳ μεμιγμένῳ ἐπ' αὐτῶν. τεκμήριον δ' ὅτι ἐπ' αὐτῶν σωτηρίας ὅταν ἄρξωνται ἰχθύας προσφέρειν.

Dádum decoctum seminis lini, vel semen tragi herbæ, vel oryzæ, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pinguia, & boni succi.

Lepus marinus.

Cap. XXX.

QVI leporem marinum biberunt, piscium virus olent: procedéte tempore, aluus dolore afficitur, & vrina sistitur: etsi quando eam reddere contingat, purpureum coloré referet. Omne piscis genus auersantur, & odio habent: fœtido ac graui sudore manant: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asininum, vel passum cõtinuè, aut radicis maluę foliorúmque decoctũ, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum aqua mulsa, punicíque mali acinis. Cedria contrita cum vino efficax est: anserinus sanguis, vt tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernéturque, solis fluuiatilibus cancris vesci possint, bibúntque eos admisto vino, adiutíque ab his percoquunt. Cúmque appetere et comesse pisces cœperint, suæ salutis indicium habent.

Πρὶ

Rubeta & paluſtris rana. Cap. XXXI.

Rubeta, aut rana paluſtris aſſumpta tumores ciet, pallor corpus veheméter decolorat, vt planè buxeum ſpectetur: ſpirãdi difficultas torquet, & grauis halitus oris, ſingultúsque & inuita interdum genituræ profuſio cõſequitur. Adiuuantur ſecundum vomitionẽ multo meri potu & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Breuiter, cogẽdi ſunt vt vehementi ambulationi & curſu ſe credant, ob torporem quo corripiuntur. Quinetiã quotidie lauãdi ſunt.

Hirudo. Cap. XXXII

Deuoratæ cum aqua hirudines, ſi ori ventriculi, adhærent, tractione partium, nonnullam ſuctionis imaginẽ præbent: eo enim argumento hauſta hirudo deprehenditur. Has muria ſorbitione excutit, & cyrenaicus ſuccus, aut laſerpitij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum poſca. Nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum ſutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, iniectæ lupinorũ farina, aqua

Πρὶ φρυνου. Κεφ. λά.

ΦΡΥΝΟΣ ἡ βάτραχος ἕλειος θερσευχθεὶς, ὀπφίρει οἰδήματα σώματος μετὰ ὠχρότητος ὀπτεταμένης, ὡς δοκεῖν πύξου ἐοικέναι· δυσπνοΐν τε καὶ δυσωδίαν ὀδωλέναι τὸ σῶμα, καὶ λυγμὸς αὐτοῖς ἕπεται, ἐνίοτε δὲ καὶ σπέρματος ἀκουσίους ἔκχρισις. ἐυζωΐαι δέ τι τυγχάνουσι μετὰ τὸν ἔμετον λαμβάνοντες ἄκρατον πολὺ, καὶ καλάμου ῥίζης < β'. ἢ κυπείρου τὸ αὐτό. δεῖ δ' αὐτὸν καὶ ἀναγκάζειν συντόνως θέρπατεῖν καὶ πρέχειν δι' ὃ ἐν αὐτοῖς ναρκῶδες. λύει τὸ καθ' ἑκάστην ἡμέραν.

Πρὶ βδέλλας. Κεφ. λβ'.

Βδέλλας ταῖς καταπινομένας σὺν τῷ ὕδατι καὶ θερσευομένας ἐν τῇ κατατόσει τῷ στόματι τῆς κοιλίας, ἑλκούσας τὰ μέρη, καὶ φαρμασίαν ἐκμιζούσας παρεχούσας· ὃ γὰρ καὶ σημεῖόν ἐστι τὸ βδέλλας καταπεπόθαι. ἀποβάλλει ἅλμη καταῤῥοφουμένη, καὶ ὀπὸς κυρηναϊκὸς ἢ φύλλα σιλφίου, ἢ τεύτλων σὺν ὄξει πινόμενα. ἀναγαγαίζεται καὶ τὸ νίτρον σὺν ὕδατι, καὶ χάλκανθον σὺν ὄξει ἀνεθέντα. ταῖς δὲ ἐν τῷ βρόγχῳ θερσευείσας ἐμβιβάσας εἰς ἔμβασιν θερμὴν,

δδ ἃ

δίδου ψυχρὸν ὕδωρ ἐν τῷ στόματι διακρατεῖν καὶ ἐξελαύνοντας. προσηκτέον δὲ καὶ τῶν ἐπ' ὠφελείᾳ διδομένων, ὅπως ἐρίνων δὲ πολλάκις κίνδυνος οὐχ ἧττονα τῶν ἄλλων φαρμάκων. ὡς ἐλλεβόρου λευκοῦ, καὶ θαψίας καὶ ἐλατηρίου, καὶ ἀγαρικοῦ τοῦ μέλανος· πτυσμὸν γὰρ ἐπιφέρει ταῦτα ἢ ὑπερκάθαρσιν. διεκπεύομεν δὲ ὡς προείρηται ἐπὶ μυκήτων καὶ τῶν ὁμοίων. ταῖς δὲ ὑπερκαθάρσεσι τοῖς διυγραμένοις ἐπίσχειν τὰς ἐκκρίσεις ἐθέλομεν. καὶ τῶν μὲν διακωλύοντων ἐπ' ὀλίγον βλάπτειν, ἐνίοτε δὲ κινδύνους ἐπιφερόντων, οὐκ ἀμελητέον. ὧν ἐστι τὸ ἄγειον πήγανον καὶ τὸ μελάνθιον καὶ οἱ ἀγρίαι παιωνίαι.

aqua frigida ore contineatur, & ad eā hirudines exiliēt. Prouidendū etiam iis, quæ etsi ferēdi auxilij gratia tradātur, nō minora tamē cæteris venenis pericula sæpi⁹ adferūt. Qualia sunt albū veratrū, tapsia, elateriū, agaricū nigrum: si quidē ea strāgulatus concitāt, aut immodicas deiectiones mouēt. Quib⁹ ea medētur, quę in fungorū mētione & similibus retulim⁹. Nimios autē deiectionū impet⁹ medicamētis q excremēta supprimūt coercebimus. Neq; negligēda quæ parū quidē nocere videtur: interim verò vitā in discrimina agunt. Quo ī numero sunt sylueſtris ruta, gith, nouæ glacies, pappi recentes.

Περὶ Ἄξους. Κεφ. λγ'.

Ἄξος, ἄνθος ἐστὶν ἀκάνθης τῆς καλουμένης ἄξου. ἐφ' ὧν ἔμετος μόνος παρελθὼν ἀποκαθίστησι τὸν λαμβάνοντας.

Flos spinæ cactos dictæ. Cap. XXXIII.

FLORES autem sunt eius spinæ, quæ cactos dicitur. Eos qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Περὶ ὕδατος ψυχροῦ. Κεφ. λδ'.

Καὶ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἀφθόνου ποθὲν ἢ ἄκρατος πολὺς καὶ γλυκὺς οἶνος ποθεὶς, μάλιστα ἀπὸ βαλανείου ἢ δρόμου καὶ τῶν ὁμοίων γυμνασίων, πτυσμοὺς καὶ ἀλγήματα ἐπιφέρει. ἐφ' ὧν φλεβοτομία ταχέως παρελθοῦσα,

Aqua frigida. Cap. XXXIIII.

Aqua frigida abundè pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehemēti exercitatione, strānlatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus,

& vacuatio, imminentia soluunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remediis, & cauendi modo, hactenus dicta sint, Subiungeremus etiam antidota necessaria quæ præclarè auxiliantur, quibus vtimur, quale Mithridatium est prçsertim, & quod sanguine, & quod scinco temperatur. Verùm quoniã aliis in locis diligentissimè scripta sunt, hîc ab eorũ descriptione supersedemus,

καὶ κενώσασα λύει τὴν ἐπικρεμῆ μόνον κίνδυνον. Καὶ περὶ μὲν τῶν σημείων τοῖς λαβοῦσι τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ τῆς ἁρμοζούσης αὐτοῖς θεραπείας, ἔτι δὲ προφυλακτικῶς ἀγωγῆς, ὑπὸ τοσοῦτον ἡμῖν εἰρήσθω. ὑποχάλκομεν δὲ καὶ τοὺς ἀντιδότους ἀναγκαιοτάτους καὶ χρησιμωτάτους βοηθούσας αἷς ἐχρήσαντο, τῇ τε μιθριδατείῳ, καὶ τῇ δι' αἵματος καὶ τῇ διὰ σκίγκων. ὡς διὰ τὸ ἐν ταῖς ἀντιδότοις ἀκριβέστατα ἀναγεγράφθαι, παρητησάμην ἀναχάφειν ἐνταῦθα.

LIBRI SEXTI FINIS.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΤΟΥ

PEDA-

ΠΕΔΑ-

ΠΕΔΑ- PEDANII

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.

DIOSCORIDIS ANAZARBEI, LIBER SEPTIMVS.

Περὶ ἰοβόλων, ἐν ᾧ καὶ περὶ λυσσώντος κυνός. Κεφ. α.

De venenatis, in quo & de cane rabioso. Cap. I.

ΠΕΡΙ μὲν περὶ τῶν ἰοβόλων ζώων καὶ θανασίμων φαρμάκων λόγον προτιθέμεθα διελθεῖν, εἰς συμπλήρωσιν τοῦ περιοδευτικοῦ τόπου· καὶ γὰρ οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἧσσον ἀναγκαῖόν ἐστι τοῖς ἰατρεύουσιν, ἐπειδὴ περ, καὶ κινδύνων καὶ περιοδυνῶν, καὶ ἀλγηδόνων, καὶ πλείστων ἄλλων κακῶν ἀπαλλάττειν τοὺς ἀνθρώπους συμβαίνει διὰ τῶν ἐν αὐτῷ παραδιδομένων. κατὰ δὲ τῶν αὐστάτων μερίζεται διχῇ καθάπερ ἐν ἀρχῇ προαναφώνηται. καὶ ὁ μὲν περὶ τῶν ἰοβόλων, θεραπευτικός ἐστι θηριακός· ὁ δὲ περὶ τῶν θανασίμων ἀλεξιφαρμακος· ὃν τάξαντες δὴ προδείξομεν τὰ εἰωθότα παρακολουθεῖν· τά τε δυνάμενα βοηθεῖν πρὸς ἕκαστον αὐτῶν.

DE bestiis quæ virus eiaculantur, & exitialibus venenis, ideò scribere aggredimur, vt tota curationis remediorúmq; ratio ad vmbilicũ perducatur: siquidem pars hæc non minus quàm cæteræ aliæ, necessaria est iis qui artem medicam exercent, vtpote cum adminiculo eorũ quæ inibi tradũtur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimísque aliis malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastidia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris virus inspuétibus sermo disserit, Theriacus dici solet: qui verò de amoliendis veneficiis, Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum quæ nonnihil auxilij ferũt.

Omnia

Omnia autē in promptu, & ad manū habere artificē oportet, ppter vrgētē sępenumero necessitatē: siquidē pauca è venenis & virulentis animantibus, tarda & graſſantia ſenſim pericula cient, ita vt dilationē admittāt: pleraq; verò præſentaneā pernicie afferunt. Hominū autē partim malè aliis cogitātes, ingenita prauitate maleficiū ita temperāt, vt ſpatium curanti liberum nō relinquāt: partim ſceleris admiſsi cōſcientia, aut triſti aliquo euentu oppreſsi, hauſto ſponte veneno, mortē ſibi conſciſcere conātur. Qui poſtea deprehenſi, aut reſipiētes, & vitæ cupidi, præſentaneā opē poſcūt. Non deſunt qui hoſtiles ſagittas illinētes, aut fontes aquáſque puteanas hac labe polluētes, certā & ſeuitabilē aduerſariis pnicie molliūtur. In qui b⁹ ipſis etſi maleficiū nō ſubitò, ſed aliquāto pòſt graſſari natura ſua cōparatum eſt, tñ niſi primo quoq; tpe coërceaſ, & remediis ſubinde excipiaſ, fruſtra tādē ſuccurritur, occupatis iā corporib⁹ exitiali vi veneni. Proīde nō vulgari induſtria diligētiáq; in ea re vtēdū eſt, vt qđ in aliis incōmodis ars cōſueuit, ī his quoq; ſalutē mortalibus prębeat. Quin & apud priſcos gen⁹ hoc vnū exiſtima-

δεῖ δὲ πάντα πρόχειρα τὸν τεχνίτην ἔχειν, διὰ τὸ κατεπείγειν πολλάκις τὴν χρείαν· ὀλίγα μὲν γὰρ καὶ τῶν ἰοβόλων καὶ τῶν θανασίμων χολαίους καὶ ἐξ αὐλοῦς φέρει τοὺς κινδύνους· τὰ πολλὰ δὲ εὐθέως. καὶ οἱ μὲν ἔμφυτον πονηρίαν ἐπιβουλεύοντες ἑτέροις, ἀνυπέρθετον τὸ κακὸν ἀσφαλίζεσθαι βούλονται· καὶ οἱ διὰ μοχθηρὰν συνείδησιν ἢ κακεπλὴν φεύγοντες ἢ μετανοήσαντες ὀξυτάτης δέονται βοηθείας. καὶ πολέμιοι δὲ τέχνῃ χείοντες βέλη καὶ φάρμακα καὶ πηγὰς δηλητηρίοις διαφθείροντες φαρμάκοις, ἀνυπέρθετον μηχανῶνται τοῖς ἐναντίοις τὸν θάνατον. ἐφ' ᾧ οὐχ εὐθὺς ἀλλ' ἐσύστερον ἀπαντᾷ τὸ κακὸν πέφυκεν, εἰ μὴ παραχρῆμα παραληφθείη τοῖς βοηθήμασιν, ἀνόνητος ἡ ἐπιδοσις ἐπικειρία, τ' φθοροποιοῦ δυνάμεως κατεδραξαμένης τῶν σωμάτων. διὸ δὲ οὐχ ὅπως ἔτυχε καὶ τὴν ἐν τούτοις πειρητέον ἐπιχείρειαν, ἵνα ὅπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῦτο καὶ ἐνταῦθα ὅλη ἡ τέχνη παρέχοι τοῖς ἀνθρώποις τὴν σωτηρίαν. παρὰ μὲν οὖν τοῖς ἀρχαίοις τὸ θεραπευτικὸν μέρος ὑπλαμ-

βάνετο

Ταύτο ὕπος ὁ πρόπος· αἱ δ' νεώτεροι ἀυτὸν ἐχώρισαν, πρόφυλακὴν καὶ προφυλακτικὸν ὀνομάζοντες, τῷ δὲ ὑγιεινῷ καὶ τῷ θεραπευτικοῦ μέσον τάξαντες, μικρᾷ καὶ παντάπασιν ὀπτολαίῳ πλανηθέντες πιθανότητι. φασὶ γὰρ γίνεσθαι τρεῖς καταστάσεις τοῖς ἀνθρωπίνοις σώμασι· μίαν μὲν, καθ' ἣν ὑγιαίνουσι· ἑτέραν δὲ καθ' ἣν νοσοῦσι· τρίτην δὲ μέσην ἑκατέρων. καθ' ἣν δοκοῦσι μὲν ὑγιαίνειν, * εὐεμπτώτως δὲ εἰς τὰ πάθη καὶ τοὺς κινδύνους ἔχουσι, διά τινα φθορεπτικὴν ἐγκαμψίλιν τοῖς σώμασι διάμιν· ὡς ὅπ τῶν ὑπὸ κινὸς λυομένων τὸ διδυγμένον θεωρεῖται καὶ μήπω * πεπτωκότων ὑδροφόβων. καὶ τῶν καθαρείδας εἰληφότων μήπω δὲ πεπεισθυωμένων ἢ δυσυρεγμότων. ἀγαλόγως οὖν τούτοις τοῖς περὶ καταστάσεσι, εἰς τρία διηρῆσθαι ἡ τέχνη. εἴς τι τὸ ὑγιεινὸν ἃ δὴ πρητικὸν ὄφι τῆς ὑγείας· καὶ εἰς τὸ προφυλακτικὸν, ὅσῳ κωλυτικὸν ὄφι τοῦ εἰς τὰς νόσους ἐμπτώσεως· καὶ εἰς θεραπευτικὸν, δι' οὗ λύεται τὰ πάθη. ῥητέον δὲ πρὸς αὐτοὺς ὅ τι πρῶτον μὲν κατὰ τοῦτο ὀπτζουλεῖ ταύτῃ, οὐχὶ τρεῖς καταστάσεις περὶ τὸ σῶμα, ἀλλὰ τέσσαρες εἶναι λέγοντας, ὡς γὰρ εἰσί τινες οἱ μήπω μὲν νοσοῦντες,

stimabatur esse ei⁹ partis, q̃ medicamẽtis pugnat: sed recẽtiores id ipsum discreuerũt, nominãtes præcautionẽ, & modũ præcauẽté, salubris sanantísq; mediũ statuẽtes, parua & leui supra modũ persuasione decepti. Siq̃dẽ treis in humanis corporibus cõstitutiones esse cõtendũt, vnã, qua sani degim⁹: alterã, qua siniſtra valetudine corpora laborãt: tertiã, quæ mediũ inter vtrasq; locũ sibi vẽdicat. In qua positi, sanitaté specie mẽtiũtur, faciléq; in morbos & pericula cõcidũt, ob vim corruptricẽ quæ corporibus nostris incũbit: quẽadmodũ in iis videre licet, quos exandescẽs rabie canis momorderit, necdum tamẽ aquã horrẽt. In iis quoq; q̃ cãtharidas hauserũt, sed nondũ vrinę torméto cruciãtur. Tripartito igitur artẽ digeri, triplicíque corporis cõstitutioni meritò respondere tradunt. Salubrẽ parté esse volunt, quæ sanitaté tuetur: præcauenté, eandéq; prohibẽté, quæ obstat quomin⁹ in morbos incidãt: & sananté, qua vitia discutiũtur. Quib⁹ ita respõderi potest, q̃ primũ ex ista ratiocinatione nõ treis corporis tantùm, sed quatuor haberi constitutiones fatẽdũ esse: quippe vt aliqui sunt, qui necdum morbo laborant,

rãt, morbo tamẽ maximè ob impendentẽ causam sunt obnoxij, ita sunt, qui iã priore morbo defuncti, nondũ tamẽ secũdæ valetudini restitui sunt: id quod in iis qui à morbo proximè sese recolligũt, cernere licet, qui viriũ recreationẽ & robur desiderãt. Sed quẽadmodũ curãdi ratio ad partẽ medicamentariã pertinet, ita præcautionẽ eidẽ subiici par est. Ad arcendas enim valetudines vehemẽtib⁹ vtimur auxiliis, altiore scarificatu, vstionib⁹, amputatione, derodẽtibus epithematis, potionib⁹ perniciei occurrẽtibus, & plerisq; aliis. Verumenimuero sunt usque eò rudes nõnulli vt ne remedia quidẽ appellẽt quæ morbos arceãt. Cui⁹ sententiæ inire rationẽ haud prõptũ est: etenim cùm verbũ ipsũ, præcauere, tũ agẽdi modus, omnino auxiliaré remediariãq; vim præ se ferũt. Mirũ verò nisi etiã sua illa distributione partiũ eos cõplectũtur q̃ in pestilẽtis cœli statu morbo nõdũ correpti sũt: pesti tñ, ꝑpter obuersantis aëris occasionẽ, opportuni, & in morbũ proni reddũtur. Dicere forsitã quis posset, salubris ĩstitutionis præcepta nõ aliud esse, q̃ arcẽdorũ morborũ rationẽ: quippe cũ firma reddere corpora, & minus

τες, ἐπιτηδείως δὲ πρὸς τοῦτο διακείμενοι διὰ τὴν ἐπικμένην αἰτίαν, οὕτως εἰσί τινες οἱ μηκέτι νοσοῦντες, μήπω δὲ τὴν ὑγείαν εἰληφότες· ὅσον οἶδεν ἕκαστον ἐπὶ τῶν ὑπογύως ἀπηλλαγμένων τῆς νόσου, ἀναλήψεως δὲ καὶ ῥώσεως δεομένων. ἀλλ' ὅν τρόπον ἡ ἐπιμέλεια ἡ θεραπευτικοῦ μέρος τῆς τέχνης ἐστὶ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ προφυλακτικὸν ὑπὸ τούτου τετάχθαι πρωτίστου. βοηθήμασι χρώμεθα καὶ τοῖς σοδροτάτοις ἐν τῇ προφυλακῇ, καταχάσμασι βαθυτέροις, καὶ καύσεσι καὶ φλεγμοπῇ καὶ δηκτικοῖς ἐπιθέμασι καὶ προποτισμοῖς, καὶ ἄλλοις πλείοσιν. ἀλλὰ γὰρ οὕτως εἰσί τινες ἀγροίκως, ὡς μὴ δὲ βοηθήματα καλεῖν τὰ προφυλακτικά. οὐ ῥάδιον εἰπεῖν καθ' ὅν τινα λόγον· καὶ τὸ ὄνομα μὴν αὐτὸ προφυλακή, καὶ ὁ τῆς ἐνεργείας ὁ τρόπος τοῦτο αὐτὸ παντὸς βοήθημα ἀποδείκνυσι, πῶς δὲ οὐκ ὑποτάσσουσι τῇ διαιρέσει καὶ τοὺς ἐν ταῖς λοιμικαῖς φθείραις, οὔπω μὲν ἐλαφρῶς πάσχοντας, διακειμένους δὲ πρὸς τοῦτο ἐπιτηδείως πως διὰ τὴν ἐν τῷ παρόντος ἀφορμήν. εἶτα εἰ μέν τις, καὶ τὴν τῶν ὑγιεινῶν παραγγελιῶν ἀγωγὴν, ἄλλο τι ἢ προφυλακτικὸν ὑπάρχειν ὁμολογῶν τὰ σώματα καὶ

περὶ παρασκευάζειν πειρώμεθα χάειν τὸ δυσάλυτα γλυκέως ταῖς νόσοις. τὸ δὲ κυριώτατον ῥητέον ἐστί, τὰ μέρη τῆς ἰατρικῆς, οὐχὶ τοῖς κατασκευαῖς τὸ σῶμα τοὺς αὐλοὺς δεῖν εἰρῆσθαι· ἀλλὰ φυσιολογεῖν δὲ τὸ σημειωτικὸν ἴδιά ἕκαστον τῶν μορίων, ὡς ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἐπιδείκνυμεν. πρὸς τούτοις μὲ οὖν οὐ πλείονα ῥητέον. ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον παρασημειωτέον, ὅτι καλεῖ μὲ αὐτοπολύτα τὰ ἀπὸ τῶν ἰοβόλων ζώων, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν θανασίμων συμβαίνοντα φαρμάκων, καὶ πρὸς ταῦτα βοηθεῖ· διὰ τοῦτό γε καὶ παρατηρητικῆς τυγχάνῃ αὐλοπτικῆς ἡ τέχνης προαποδούσης ἀπόρημα, ὡς δὲ ὁ λόγος πεπίστευται. ὁ δὲ γε ἐν τῇ καθάπαξ τοῦτο ὡς ἀληθές. ἀλλ' ἀεὶ τὸ παρέλκον καὶ ἀνδρεῖαν χρείαν ἐπί τινα τῶν ἔργων παρέχόμενον δυσόχρεον· εἰ καὶ τελέως αὐτοπολύτου ὑπάρχει κατὰ τὰς ἰδιότητας, τοῦτο δὲ ἐπὶ τῶν θανασίμων φαρμάκων καὶ τῶν ἰοβόλων ζώων εἰωθὸς ἀποβαίνειν. τὸ μὲν τοι * ἄχρηστον εἰς τὰ ἔργα, καὶ τὸ παρέχον ταῖς τοῦ θεραπεύειν ἀφορμαῖς, ὅτ' ἀκατάληπτον ὄντων οὔτ' αὐτοπολύτων· καὶ μᾶλλόν τις ὀρθώσηται ἂν ἀπὸ, πίστιν καὶ παῤῥησίαν ἔχειν διεβεβαιώσατο περὶ τῆς καταλήψεως τῶν

min⁹ vitiis obnoxia nitamur, vt inoffensa valetudine degãt, nec morbis cõflictétur. Neq; id silétio prætereundũ, quod maximè præcipuũ, & tanq̃ caput rei est, nó oportere medicinę partiũ distributioné, totidé corporis cõstitutionib⁹ respõdere: sed naturas singulorũ suis notis seorsum scrutari ac explorare, vt suis locis ostẽdimus. Cum iis igitur nó pluribus agẽdũ. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui à virulẽtis animalibus veneníque cõtrahũtur, vocari cæcos, id est, quorum ratio minimè iniri potest. Quin & ea quæ eisdé auxiliãtur, nulli pariter sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus obseruatoriæ artis, & ei⁹ quæ ratiõe fulciatur, annumerari solẽt. Neq; prorsus verũ deprehenditur, affect⁹ huiusmodi cæcos esse. Nã quod semper se ꝓtrahit, & nullũ in quibusdã necessariis vsum exhibet, haud facili cõiectura colligi potest: etsi naturę proprietate ꝓrsus cæcos eos affect⁹ cõcedim⁹, qui ab exitialib⁹ venenis, & animãtibus quæ viruléto morsu sęuiũt, cõtrahũtur. Nã qđ ad op⁹ nónullũ vsũ prębet, dátq; medẽdi occasioné, neq; imperceptibile, neq; cęcũ, nullíve causę obnoxiũ reputatur: sed magis ab ipso

ab ipso quis impulsus, demóstra tione se habere, & opinione de abditorú cognitione cõfirmare poterit. Nã etsi sępe minora sũt, q̃ vt sensib⁹ percipiãtur, euidéter tamẽ ex ipsis inter se collatis deprehẽdũtur. Diocles autẽ in eo cõmẽtario quẽ Pistarcho dicauit, satis modos pstrinxit, ad verbũ ita scribés: Nosse qs hoc potest cũ in aliis nó paucis, tũ in viperis, & scorpionibus & reliquis id genus, secũ animo reputás, vt q̃is exiguo sint corpore, vixq; cõspectui subiiciãtur, magnorũ tamẽ discriminũ ac dolorũ causas inferũt: quorum nihil præter quádã corporis exiguitatẽ, vímq; pręceteris animãtib⁹ datã illis, facile fuerit spectare. Quãta enim ea moles corporis est, quę à scorpij ictu, & aliorũ id genus venenatorũ quę nos morsu cõficiũt, attingitur? quorum aliqua vehemẽtes cruciat⁹ excitãt, alia erodũt & putredines cient, nec desunt q̃ pręsentaneã pnicié molianť. Aut quãtulũ est qđ à phalãgij morsu ingerit, & vniuersum corp⁹ excruciat? neq; enĩ qs magnitudinẽ ipsorũ deprehẽdere posset, cũ prorsus exigua mole constẽt. Ergo q̃ hęc ad affect⁹ referãtur cõstitit inter oés. Verũ quod exactè deprehẽsum sit, vim quãdã ipsis

τῶν ἀδήλων διαφέρεσι μὲν γὰρ
τοῖς αἰσθήσεσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων
διὰ σμικρότητα καταλήψεως ἧ
ἐναργοῦς ἐξ ἀλλήλων τυγχά-
νουσιν ἰκανῶς δὲ ἐφώδευσε τὸν
τρόπον διοκλῆς ἐν τῷ πρὸς 5
πτολεμαῖον ὑπομνήματι, γρά-
φων ταῦτα κατὰ λέξιν γινώ-
σκοι δ' ἄν τις τοῦτο καὶ ἐπ' ἄλλων ὡς ὀ-
λίγων, καὶ ὅτι τῶν ἐχιδνῶν καὶ
σκορπίων καὶ ἑτέρων τοιούτων ἀ-
τενίσας δὲ ὡς ἄδηλα καὶ μικρὰ 10
τὸ γένος ὄντα, μεγάλων αἴτια
κινδύνων καὶ πόνων γίνεται· ὧν
οὐδὲ ἰδεῖν ἔνια ῥᾴδιον παρὰ πη-
να σμικρότητα καὶ ἰσχνὰ ἀπολή-
πτομμένα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἄλ-
λων θηρίων. ὁπλίκον γάρ τι νο- 15
μίζειν τὸ μέγεθος, ὅσον ἀπὸ φ
ἁλαγγίου, τοῦ σκορπίου καὶ τῶν
ἄλλων τῶν τοιούτων τῇ σαρκὶ λυ
μαινομένων; ὧν τὰ μὲν ὅτι πτει-
νοῦντα πόνον ἰσχυρὸν, τὰ δὲ, σήπο-
ντα, τὰ δὲ, κτείνοντα συν- 20
τόμως. ἢ τὸ διὰ τοῦ φαλαγ-
γίου δήγματος ἐνέμμονον, καὶ ὅ-
λον τὸ σῶμα διαπεπυόμενον;
οὐδὲ γὰρ αὖ διαγῶναι τὸ μέ-
γεθος ἀυτῶν δυνατόν τις, διὰ
τὸ παντάπασιν εἶναι μικρόν. ὅτι 25
μὲν οὖν πρὸς τὰ διαθέσεις
ταῦτά ἐστιν, ὡμολόγηται πα-
ρὰ πάντων. ὅτι δὲ καὶ ἀκριβῶς
κατειλῆπται τῷ τῶν δυνάμεων
αὐτῶν γνωσικόν τινα φθοροποιὸν,
ἢ τις

ἤ τις καταμηνυθήσεται τοῖς σώμασιν αἰτία τῶν συμβαινόντων κακῶν γίνεσθαι συγχωρήσεται, καὶ τοῦτο πεπίστευται. καὶ οὐδεὶς ἂν οὕτως εὐρεθείη φιλόνεικος, ὡς ἄλλοθεν φῆσαι τὰς ὀχλήσεις καὶ οὐχὶ δι' ὕλης φθορᾶς τοιοῦδε καθαπτομένης τῶν σωμάτων μόνων ἀπὸ μέρους συμπίπτειν. τοῦτο δὲ ἴσως τὸ περὶ τὰ ἔργα τῆς τέχνης χρησιμεύοντα, κατὰ παῦ ἔργον, τὸ ἔργον τοῦτο ποιοῦμθον ὑπαγορεύειν ὥς τε ἡμᾶς μηδὲ βλάπτεσθαί τι κατὰ παῦτα ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν ἰδιότητα ἀκαταληψίας τῆς κοινῆς αἰτίας· ἢ τό τε ἐνδέχυσθαι δυναμένης βεβαίως κατειλημμένης. διὸ καὶ ὁ Ἐρασίστρατος ὑπονοῶν τὴν αὐθάδειαν τῶν ἐμπειρικῶν, αἰτίαν τοῖς αὐταπολογήτοις αὐθήκειν, οὐ συγχωρῶν αὐτοῖς τὴν αἰτίαν τὴ ἐπαναβεβηκέναι ἢ καθολικήν, ἄλλοθεν ὑπὸ τῆ νόσῳ ὑπάρχειν· τῆ δὲ αἰτίῳ χρᾶσθαι τοῦτον διαλευκαίνων, τῶ τε μὴ λέγειν ὑπὸ τίνων ἀρκούμεθα τῆ τετειμμένη θεραπείᾳ οἷον ὑπὸ τῶν θηριοδήκτων καὶ θανασίμων καὶ ὑπὸ τῶν λοιπῶν, ἀρκεθησόμεθα τῆ παρατηρήσει τῆς τῶν αἰτιῶν περιλήψεως χρειζόμθοι τελέως. πρῶτον μὲν γὰρ κατὰ γένος οὐ ἀκατάληπτά εἰσιν. ὅτι μὲν γὰρ δυνάμις ὑπάρχει φθαρτικὴ, καὶ τ

dã ipſis ineſſe mortiferã, quæ inſinuata corporibꝰ moleſtiarũ, quæ exoriũtur nobis cauſa ſit, in cõfeſſo eſt, & omniũ cõſenſu perſuaſum. Nec quiſq̃ inuenietur vſqueadeò cõtẽtionis ſtudio flagrãs, qui aliũde exoriri moleſtias aſſeuerer, q̃ à materia mortifera parte corporis attingẽte. Porrò id erat qđ inter vtilia artis opera ſi oſi opere dicere oportuit, quæ nã res opꝰ hoc efficiat, vt nihil ꝓrſus nos lædat, ſi cõprehẽſa cõmunis cauſæ q̃ ꝓpriis ineſt ratio: qñquidẽ tũ euidenter indicari poſsit cũ deprehẽſa eſt. Ideo Eraſiſtratꝰ empiricorũ ꝑtinaciã graui cauillatione inceſſens, cæcis affectibꝰ cauſas aſsignauit, inficiatꝰ his cõmunẽ, & ſupremã morborũ cauſam incõprehẽſibilẽ eſſe: & hãc in eo quẽ de cauſis ſcripſit commẽtario aptiſsimè ꝓdidit: cãdido ſignatã lapillo. Nec ferẽdos eoseſſe cẽſuit, qui ſe dicant in quibuſdã, vt in venenis, ſerpentiũ ictibus, & cæteris id genus trita medẽdi ratione cõtentos eſſe. Neq; ſatisfacturã ſibi obſeruationẽ, eã quæ à cauſarũ cõprehenſione ſeparata eſt. Primum enim genere comprehendi facile poſſunt. Quod autẽ ſit letifira vis,

corpo

corporáq; permutás, ita vt perimat, ex iis quæ per genus, nõ per ſpecié vagantur, curatiõnem indicat, qua hæc hebetare, & prorſus expugnare liceat. Cũ verò ſubiungit: Ad aquam dulcé, & potui idoneam venit quis, & ante obſeruationé ad vomitũ, ad vulneris dilatationé, ad demorſæ partis ſuctũ, cucurbitula sadfixit, parté incîdit, vrétia medicaméta, aut ea quę vim eandé adipiſcuntur admouit, poſtremò partem amputauit: ſecũ reputauit medicamina, quæ per ſummá cutim ferre, & applicari ſolita, immiſſæ ad intima perniciei repugnarent. Hæc itaque quæ diſſeruit Eraſiſtratꝰ, veritati cõſentanea ſunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferá vim corporibus illapſam negotiorũ, quæ ipſa faceſsit, eſſe cauſam diffiteantur, verũ rudiuſculè nomini attendũt. Nã apud ipſos palàm immiſſa vis φθορεστικὸς, id eſt mortifera, nominatur: φθορεστικὴν autẽ nullius officij alius eſſe poteſt, quàm cauſæ. Aiunt hęc nomina, μάρσιπος, & ἀνακαλύπτειν, eſſe reliquis omnibus ſimilia, in quibus partes quædam dictionũ nõ pro virtute, ſed

ἢ τῶν ὑποκειμένων ἀλλοιωτικὴ, ὥς τε αἰωρεῖν ἐκ τῶν κατὰ γένος οὐμιᾷ κατ' εἶδος, ὑποχράφει θεραπείαν, διὸ ταῦτα ἀμβλυντέον καὶ κατεργαστέον. ὅτι δὲ φησὶν· ἤλθέ τις ἐφ' ὕδωρ γλυκὺ καὶ πόιμον, καὶ πρὸ τῆς παρατηρήσεως ὑπ' ἔμετον* διὰ τὰ σιν τῆς πληγῆς, ἢ δεδηγμένου μέρους ἀποθλασμὸν, συκύας προσκολλῶ, ἐντομὴν καυτηρίων, φαρμάκων τὸ αὐτὸ δυναμένων ὑπίστιον, τὸ τελευταῖον ἀποκοπὴν τοῦ μέρους· ἀνελογήσατο τῶν πεφυκότων φαρμάκων εἰς τὴν ὑποφόνγιαν φέρεσθαί τινα, τὴν ἐνιεμένην εἰς τὰ κατὰ βάθος ἐναντιοῦσθαι φθορᾷ. ταῦτα μὲν οὖν δὴ ὧν εἴρηκεν. Ἐρασίστρατος πάντα εἴρηκε καλῶς καὶ τοῖς ἔργοις ἀκολουθοῦντα. θαυμάζειν δὲ ἔστιν ὑπὸ τῶν μεθοδικῶν, οἵτινες οὐ συγχωροῦσιν αἰτίαν εἶναι τὴν φθορεστικὴν ἐνιεμένην δύναμιν ἐκ τοῦ ἀπ' αὐτῆς γινομένων ὀχλήσεων, ἀλλὰ τόπον μὲν αὐτοῖς ὅτου τῷ ὀνόματι προσέχουσι. φθορεστικὸς γὰρ ἢ παρ' αὐτοῖς αὖπικρος ἡ ἐνιεμένη δύναμις προσαγορεύεται. τὸ δὲ φθοροποιὸν εἶναί τι αἰτίας ἐκ τινὸς ἔργου δηλοῦσθαι φασὶ τὸ μὲν ὄνομα τὸ μάρσιπος ἢ τὸ ἀνακαλύπτειν, τοῖς λοιποῖς πᾶσι παρεμφαίνειν ὑπάρχειν, ἐφ' ὧν μέρη τινὰ τῶν λέξεων οὐχ ὅτι κατὰ δύναμιν, ἀλλὰ

ἀλλὰ κατὰ ψιλὴν περιείληπται τὴν ἐκφοράν. ἔν τε γὰρ τῷ μάρσιππος καὶ τῷ ἀνακαλύπτειν, ὡς τὰς κυρίας καὶ προηγουμένας οὐκ ἔχει σημασίας· οὕτω καὶ ἐν τῷ φθοροποιεῖν παρελκόντως καὶ οὐ κατὰ δύναμιν ἐντέτακται. μεταβαίνουσι δὲ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰς τῶν αἰτίων διαφοράς, καὶ λέγουσιν ὅτι τῶν αἰτίων, τινὰ μὲν ἐστι τὰ προκατάρξαντα, ἃ ποιήσαντα πάθος χωρίζεται· οἷον, κόπος καὶ ψύξις, ἔγκαυσις, καὶ τὰ παραπλήσια. τὰ δὲ, συνεκτικὰ διὰ τὸ ποιεῖν τε πάθος καὶ παραμένειν, τουτέστιν ὧν μὲν παρόντων τὰ ἀποτελέσματα πάρεστιν· αὐξανομένων δὲ αὔξεται· καὶ μειουμένων μειοῦται· καὶ παυσαμένων παύεται· καὶ αὐτοτελῆ δύναται εἶναι καθ' ἑαυτὰ παραγινόμενα τῶν ἀποτελεσμάτων. καὶ τοιαῦται μὲν τῶν αἰτίων αἱ δοκιμώταται διαφοραί, τὸ δὲ φθοροποιὸν οὐδεμιᾷ τούτων ὑποτάσσεσθαι πέφυκε. προκαταρκτικὸν μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν, ἐπειδήπερ τὸ πάθος αὐτὸ παραμένει καὶ τοῦ σώματος οὐ χωρίζεται. συνεκτικὸν δ' οὐκ ἂν λέγοιτο, πλεῖστον μὲν γὰρ τοῦτο πάρεστι καὶ καθάπερ ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς δεδηγμένον γίνεται. εἰ δὲ μὴ προκαταρκτικὸν γίνεται μὴ δὲ συνεκτικόν, οὐδὲ αὐτοτελές, οὐδὲ συναίτιον ἂν εἴη. εἰ δὲ ἐν μηδεμιᾷ διαφορᾷ τῶν αἰτίων ἄγειν

ſed nuda enũtiatione cõprehẽdũtur. Enimuero quéadmodũ in his vocib⁹ *μάρσιππος* & *ἀνακαλύπτειν*, partes neq; certos neque principes retinét ſignificatus: ſic in hoc verbo *φθοροποιεῖν* partes ꝑductionis gratia, nó ꝑ virtute coaluerũt. Hinc ad cauſarũ differentias trãſeũt, affirmãtq; cauſarũ aliquas euidétes eſſe quę dũ aduerſã valetudinẽ crearũt, ſeparantur: cuiuſmodi ſunt frigus, labor, ęſtus, & ſimilia. Quaſdã cõtinétes, quæ permanét poſtquã morbũ excitarũt, hoc eſt, quib⁹ præſentibus, & effect⁹ eorũ adſunt: increſcẽtib⁹, effect⁹ augétur, decreſcẽtibus, minuũtur: & cũ deſinunt, iidé finiũtur: q̃b⁹ ſolis ac per ſe manétibus, effectus quoq; ipſi manét. Talia quidé receptiſſima ſunt cauſarũ diſcrima, quorũ nulli phthoropœon ſubiici poteſt. Euidés enim cauſa non eſt, quoniã morb⁹ ipſe permanet, nec ipſa à corpore ſeparat. Nec cõtinés cauſa dici poteſt, cùm magna ex parte hic adſit: quéadmodũ accidit iis, q̃ à rabioſo cane ſũt demorſi. Quòd ſi neq; euidés cauſa neq; cõtinés fuerit, neq; per ſe, neq; alteri⁹ cõſortio cauſa erit. Quòd ſi à nulla cauſarum differentia

V phthoro-

phthoropœõ deducere possum⁹ cósequitur, vt neq; causam esse fateamur. ꝙ aút asserút, vocabula quædã in se nó habere parteis rerú significatrices, sed nuda, & simplici ꝓnútiatióe ficta esse fateri necesse est. Verũ nó oía, sed ppauca talé nãcisci cõditioné existimádú est: neq; enĩ ποιεῖν in hoc noíe φθοροποιὸν perinde atq; assumptitia ꝓfertur, sed longè principé obtinet significationé. Quéadmodũ enim φθορεᾶς, id est corruptiõis, nomẽ mutationé in pei⁹ significat, sic hoc verbũ ποιεῖν, sumi debet, vt nihil ampli⁹ ex eo qđ hãc dictioné φθορὰ secũ habeat declaret: neq; ꝓrsus id significat, quod oés palã audiũt, & huic similiter reddĩt, πυδὶ ἔχειν δίψος. Si dãt corruptione sanis fieri morbũ, cócedút vtiq; vim ĩ huiusmodi verbo ποιεῖν subesse, siqdé aliqd est qđ corruptionéefficiat. Oé aút qđ aliqd efficit, ostédĩt persingulas causas q̃ corporib⁹ subiiciũt, idq; tã in lętalib⁹ venenis, q̃ ĩ iis q̃ corpori b⁹ ingerút. Verũ nónihil subiacere causarú differétiis ꝓdunt. Quinetiá aberrarút, nó exactã diuisioné assumétes. Qui verò se dogmaticos profitétur, causã esse partim ꝓparáté, partim cõtinenté ἄγειν δυνησόμεθα τὸ φθοροποιὸν, συγχωρεῖμεν αὐτὸ μὴ δὲ αἴτιον ὑπάρχειν. τοικτῶν δὲ λεγομένων καὶ ὄντων, τὸ μὲ πνὰ τ ὀνομάτων ἐν αὐτοῖς μὴ ἔχειν μέρη σημαντικὰ τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ κ' ψιλὴν τ ἐπφορὰν πεποιημένα, συγχωρητέον. ὅτι δὲ μὴ πάντα ὑσολιπτέον τοιαῦτα ὑπάρχειν, ἀλλὰ πιστελῶς ὀλίγα· οὐδὲ τὸ ποιεῖν ἐν τῷ φθοροποιῷ παρεπλησίως τοῖς ὑσολειφθεῖσιν ἐξενήνεγκται, κυριωτάτην ἔχει τ σημείωσιν. ὡς γὰ τὸ τ φθορᾶς ὄνομα τῆς ὀπὶ τὸ χεῖρον μεταβολῆς σημαντικόν ἐστι, ὥτω καὶ τὸ ποιεῖν παρεπλησίως, μηδὲν ἐν τῷ φθορὰν ἔχειν ὑλικοῦ· τοῦτο δ' οὗ πᾶς ἐξακούουσι παῖδες, τελέως ἄσημον γίνε) τὸ ὄνομα, καὶ παρεπλήσιον τῷ πυδὶ ἔχειν δίψος. εἰ δὲ δόσαν ἀπὸ τ φθορᾶς ἡγεῖ γίνεσθ τιὼ γόσον, συγχωρῆσαι ὑλικόν τι καὶ ὀπὶ τὸ ποιεῖν, καὶ μὴ ἀπεργαζόμενόν τι, καθ' ἕκαστον αὖπον δέκυυ) τ ὑποκειμένων ἐν τοῖς σώμασιν, ὀπί τε τῶν ἐνειμένων καὶ θανασίμων φαρμάκων. ἀλλὰ ὑσοπίπτειν τὶ φασὶ τ τ αἰτίων διαφορᾶς. πιπλανῆν) δὲ κἂν τοῦδα διαίρεσιν ἀκριβῆ οὐκ εἰληφότες. λέγεται δὲ καὶ παρὰ τοῖς δογματικοῖς αἴτιον ὑπάρχειν καὶ αὐτὸ, κατὰ μόνον τι παρασκευαστικὸν, κ' δέ τι συνεκτικόν.

ὡς βου-

ὡς βυβώνων ὄγκος καὶ βυβώνων πυρετὸς, καὶ τὸ συνεχιστικὸν τῷ ἀποτελεσματικῷ. χωριζόμενόν τε ὡς πῶμα καταίμαλος. καὶ καθόλου δὲ ὅταν τι κατ' ἰδίαν φύσιν αἴτιον ὑπάρχῃ μὴ θεωρῆται δ' ἐν τινι διαιρέσει μοχθηρὸν μὴ οὐχὶ δὲ καὶ αἴτιον τῶν ὁμολογουμένων θεωρεῖσθαι φύσεως. ὅτι δὲ τὸ φθοροποιὸν ὄντως αἴτιον, δῆλόν ἐστι μὲν καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος, δείκνυται δὲ σαφέστερον ὅτι τῶν συμβαινόντων. τί γὰρ αἴτιον ὑπολαβεῖν εἶναι μᾶλλον ἐν τῷ δακέτου πλησμονὴν, ἢ τὸ ἐπιγινόμενον ὑπὸ τοῦ ζώου δύναμιν, καὶ τὰ εἰς τὰ σώματα βαλλόμενον ἰόν; καὶ ἢ ψύξιν, καὶ ἢ ἔγκαυσιν, καὶ ἢ ἀκροπόνον, καὶ τε ἀπεψίαν, καὶ ἢ ἄλλό τι παραπλήσιον ἔχοντες αἰτιᾶσθαι. ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ διαφοραὶ χάριεσι τῶν αἰτίων, τὰ μὲν, καλοῦντες συνεκτικὰ, τὰ δὲ, προκαταρκτικὰ, λεκτέον αὐτοῖς ὅτι καθ' ἕτερον δὴ τούτων αἴτιόν ὅτι τὸ προκαταρκτικὸν, ῥηθήσεται δὲ ἀπὸ τοῦ προάγειν τὴν ἀποτελείσμαλος καὶ τὸ ἀεὶ ὑπόστασιν λαμβάνον τῶν σώματος. συνεκτικὸν δ' ἐπειδὴ τῶν παθῶν παρόντων καὶ αὐτὸ πάρεστι, καὶ χωρὶς ὄντες αὐτῶν, χωρίζεται καὶ τὰ συμβαίνοντα ἀεὶ αὐτό. περὶ τούτων μὲν οὖν ὁ παλαιὸς ῥητέον. ἀτὸν δ' ἔσωθεν ἐναρχόμενον φθοροποιὸν δύναμιν αἰτίαν εἶναι, καὶ τὸ προκείμενον σκοπὸν τοῦτον ποιητέον. καὶ πρὸ μὲν τῆς κατασκευῆς τῶν παθῶν,

tinétē asserũt: vt īguinũ vlc⁹, & inguinariā febrim, & q̄ effectui tũ assistat, tũ etiā separetur, vt à fractis præcipitatio. In summa, quoties quidpiā suapte natura causa fuerit, nec vlla diuisione cōprehēditur, vitiosum est, neque causæ adscribiī, eorũ quæ idē genus sortiuntur. Sed quòd phthoropœon, causa sit, nomē ipsum argumento est, & in iis quæ cōtingũt apertius ostēditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpētib⁹ ictũ, q̄ ex animāte vim, & illapsum in corpora virus? Neq; enim frigus, neq; æstum, neq; sectionē corporis, neque cruditatē, neq; aliud quicq̄ simile causari possũt. Verũ quoniā causarũ differētiis gaudēt, & aliquas cōtinētes, alias euidentes appellāt, ipsis dicēdum, vtroq; istorũ modorũ euidēté quidē causā esse, quod affectũ p̄cedit, & quod corporis substātiam præoccupat: cōtinentē verò, quod morbis præsentib⁹ adest, qua separata recedunt, quæ cũ ipsa euenerant. Sed de iis hactenꝰ. Statuēdũ itaq; mortiferā vim intrinsecus manifestissimā esse causam, ipsamque principē facere scopũ oportet. & anteq̄ ad ima decũbāt mor

bi, variis modis est certādum, donec vis tota corporibus excutiatur. Modò enim reuocari decet ea parte, qua pestis intrauerit: modò alia, præsertim principatū non obtinēte, antè coërceatur, q̄ altius irrepēs viscera tangat: aut eius pernicies eluatur, retūdaturq;, cū iā mēbratim peruagatura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris vomitionib⁹: si morsu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circūscriptione, nónunq̄ amputatione extremę partis, euocantur. Retinētur verò infusione, & impositu medicamētorū acrium cohibētur. Hæc simul vtiq; arcere vir⁹, & eluere possunt. Restinguūtur, & euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel cótrariorū esu, quę acrimonia sint prædita. Postremo deiectio alui, euocat⁹ sudor, & alia quędā in cómune, q̄ mēbratim demóstrabim⁹, auxiliāt. Verūenimuero nō leti ferā modo materiā, sed & magnitudinē, & tép⁹, p scopo cósiderare oportet. Etenim ab iis remedia q̄ plurimū discrimen capessūt. A magnitudine q̄dē, cū nónulla ex venenis, et virosis animalib⁹ pericula minātur: alia

παθῶν, ποικίλως διαγωνιστέον μέχρι τ παντελῶς αὐτ ἀποσκευασθῆναι τ σωμάτων. τοῦτο μὲ ὑπεξαιρουμένη δ' ὧν εἰσήει μερῶν· τοῦτο δ κρατυνθὲν πρὸ ἐνὶ μ μάλιστα οὐ κυρίῳ τόπῳ, πρὶν εἰς τὸ βάθος ἀπιλθεῖν μ ἀπολάχων ἄλλα δ· τοῦτο δ ἀποπλυνόμενον ἢ ἐπικρυωθὲν, ἐπειδὰν φθάσῃ χωρεῖν διὰ τ σωμάτων. ὁ τὲ μὴ ἐν ὑπάρξεσι αὐλοῖς κομιδῆ ὅπῃ τ θανασίμων φαρμάκων δ' ἐμέτων γίνεται· ἐπὶ δ τ ἰοβόλων διὰ τ καταγασμῶ, μ σικυῶν προσβολῆς, ἐκπυήσεως μ ἀποσφυσμῶ, ὁ τὲ δ' ἀφωπλιασμοῦ. ἡ δὲ κατοχὴ καὶ διακράτησις, διὰ κλύσεων μ διὰ δριμέων ὑπθέσεως φαρμάκων. ταῦτα δ' κρεῖττον ὁμῶ μ ἀποπλύγειν δύναται τὸν ἰόν. ἡ σβέσις δ μ ἡ κράτησις δ' ἀκρατοποσίας ἀκράτου τὲ μ γλυκέως, ἢ μ ὀξ τ ἐναντίων δριμυφαγίας. ὅπῃ τέλει δὲ συνεργεῖ τούτοις μ κάθαρσις κοιλίας, καὶ ἱδρωτοποιία, καί πνα ἄλλα κοινῶς, καθὼς κατὰ μέρος ἐπιδείξομεν. δεῖ δὲ οὐ μόνον τὴν φθορποιὸν ὕλην πιεῖσθαι σκοπὸν, ἀλλὰ μ τὸ μέγος αὐτῆς καὶ τὸν χρόνον. καὶ μὴ παρὰ ταῦτα πλεῖστον ὅσον διαφορεῖν τὰ βοηθήματα λαμβάνει. παρὰ μὲν τὸ μέγεθος, ἐπειδὴ τῶν δηλητηρίων μ τῶν ἰοβόλων, τὰ μὲν, διεκτικὰ κινδύνων γίνεται. τὰ δὲ,

τὰ δ', σπασθόνων βαθυλέρων ἢ ἐπιπολαιοτέρων· τὰ δὲ, φλεγμωνιῶν σφοδροτέρων. ἢ ἀμυδροτέρων· τὰ δὲ ἀλγῶν δυσεγκμάτων, ἧσσον ἢ μᾶλλον ὀχλούντων. δεῖ δὲ πρὸς τὰ κίνδυνον ἔχοντα, διὰ τῶν ἀγωνιστικωτέρων ἀγωνίζεσθαι βοηθημάτων· πρὸς δὲ τὰ ἥσσονα χαλεπὰ διὰ τῶν ἐπιεικεστέρων. ἄτοπον γὰρ ἐπὶ μὲν τῶν μείζόνων ἰσχυροτέροις αὖ ἔπεσθαι τύχη χρώμενον τοῖς βοηθήμασι, κινδύνῳ δὲ θεραπεύμενον φλεγμόνην· ἐπὶ δὲ τῶν μικροτέρων δι' ἀπρόσμικτα βοηθείας μάτην αἰκίσασθαι τὸ σῶμα. πρόχειρος δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ χρόνου ἐστὶν ὁρισμός· ὁ μὲν γὰρ ὀξέως καὶ παραχρῆμα, καὶ τὰς ὀχλήσεις καὶ τοὺς κινδύνους ἐπιφέρει, ὁ δι' ἐξ αὐβολῆς καὶ χρόνου πλείονος ἢ βραδύτερος. προσήκει τοίνυν τοῖς μὲν ὀξέσι, καταπεπυμμένως βοηθεῖν καὶ διὰ πολλῶν ὁμοῦ· τοῖς δὲ, χρονιωτέροις. ταυτὶ μὲν οὖν ὡς ἐν τεχνολογίᾳ μεθόδου εἴρηται. προσάγωμεν δὲ ἐξῆς ὡς ἐπὶ τὰ μέρη.

alia putredines altas aut exteriores excitãt: alia vehemẽtiſsimos dolores aut cœcos ciẽt: alia vix medicamẽtis cedunt, & magis minúſve moleſtias excitãt. Oportet aũt ea q̃ pericula ferũt, peruicacioribus auxiliis expugnari: & minꝰ infeſta, mitioribꝰ. Quippe abſurdũ fuerit in grauioribꝰ, ſegnioribus medicamentis hoſtes in diſcrimen adducere: in minoribꝰ verò, ve hemẽtiũ auxiliorũ iniuria corpus laceſſere. Finitio à tẽporibꝰ in prõptu eſt: hoc enim ſubitò in pericula, & preſentes moleſtias adducit, illud verò ſenſim, & dilatas in diẽ longã aut breuioré producit. Itaq; in acutis quidé cõfeſtim multa ſimul auxilia repreſentari oportet: reliquis, paulatim. Hęc quadã artis formula breuiter definita ſint. Iá mẽbratim rẽ proſequamur.

Σημεῖα κυνὸς λυσσῶντος καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ δεδηγμένων. Κεφ. ϛ'.

Signa rabioſi canis, & demorſorũ ab eo.

Cap. II.

Τὸν δὲ τῶν λυσσοδήκτων λόγον προετάξαμεν τῶν ἀλγῶν, ἐπεὶ καὶ τὸ ζῶον πολύ τε καὶ σύνηθές ἐστι, καὶ συνεχῶς ἀδικεῖ τῇ λύσσῃ ὁ κύων καὶ ἀπόλλυσι, καὶ δυσφύλακτον καθέστηκε· καὶ ὁ ἀπ' αὐτοῦ κίνδυνος ἀπαραίτητός ἐστιν εἰ μὴ πολλοῖς χρήσαιτο τοῖς βοηθήμασι. λυσσᾷ δὲ ὁ κύων ὡς

De rabioſi canis morſu ſermoné aliis præpoſuimus, quod id animal domeſticum ac frequẽs eſſe cõſueuit, & in rabié ſæpius agitur, ac perit, ab eóq; caueri difficile: inde periculum ineuitabile hominé manet, niſi multis vtatur auxiliis. Canis ple

rũq; flagrãtissimis æstib⁹ in rabiẽ efferaſ interdũ quoties frigora inceſſerũt. Rabioſus autẽ potũ, & eſcã auerſaſ: largã ſpumãtemq; pituitã narib⁹, & ore proiicit: toruè & ſolito triſtius intuetur: in oẽs paſsim ſine latratu irruit, & æquè feras homineſque, tã familiares, q̃ ignotos mordet: nec ꝓtin⁹ infeſtũ quicq̃ infligit, niſi, vt vulnus, doloré: exinde morb⁹ ille, qui ab aquę metu hydrophobicus graia eſt voce appellat⁹, cótrahitur. Euenit aũt cũ diſtẽtione neruorũ, totiuſq; corporis rubore, ꝑſertim faciei, cũ ſudore, & lãguore quodã. Aliq̃ aurę ſplẽdoré fugiũt: alij ſine vlla doloris ĩterca pedine vexanť. Sũt etiã q̃ canũ more latrant⁹ ędãt, & obuiã factos morſu adoriũt, ac mordẽdo ſimili vitio labefactãt. Proíde ex iis q̃ hoc vitiũ ſẽſerit neminẽ ſeruatũ vidim⁹, niſi forſitã ex hiſtoria vnũ aut alterũ euaſiſſe audiam⁹: ſiq; dẽ Eudem⁹ ſuperaſſe quẽdã affirmat. Themiſonẽ aliq̃ demorſũ ĩ húc furoré ĩcidiſſe, & euaſiſſe fatẽtur. Alij ipſũ cũ amico aquã expaueſcẽti moré gereret, & officiũ exhiberet, quadã naturarũ cõcordia ſimilẽ contraxiſſe affectũ: ſed poſt multos tãdẽ crucia

tus ſeruа-

κύων ὡς ἐπίπαν δὲ ἐν τοῖς σφοδροτάτοις καύμασιν. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐφεστῶσι κρύεσι. λυσσήσας δὲ ἀποβλέπει καὶ βρῶσιν καὶ πόσιν· καὶ φλέγμα πολὺ ἀφορᾷ δι' ὅλου τοῦ σώματος καὶ τὰ ῥινῶν ἀφοδεύει. καὶ πονηρὸν βλέπει καὶ συγκότερον τῶν συνήθων· ἐφορμᾷ δὲ χαλεῖς ὑλακῆς πᾶσιν ὁμοίως καὶ θηρίοις καὶ ἀνθρώποις πᾶσί τε συνήθεσι καὶ ἀγνώστοις δάκνων· καὶ παραχρῆμα μὲν οὐδὲν ὀχληρὸν ἐπιφέρει, πολλῷ δὲ ὕστερον ὑδροφοβικὸν τὸ πάθος τὸ καλούμενον. συμπίπτει δὲ μετὰ ἀσαμίων καὶ ἐξυδηκμάτων ὅλου τοῦ σώματος, μάλιστα δὲ ὅλου τοῦ προσώπου, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἱδρώσεως καὶ ἀπορείας. καὶ τινὲς μὲν φεύγουσι τὴν αὐγήν· τινὲς δὲ πτύχονται σιωπηλῶς. ἔνιοι δὲ ὑλακτοῦσιν ὥσπερ κύνες, καὶ δάκνουσιν ἐπίοντες, καὶ δάκνοντες, αἴτιοι τῷ ἀυτῶν πάθους κατέστησαν, εἰ μὴ καθ' ἱστορίαν παρειλήφαμεν πεπεῖσθαι ἕνα ἢ δεύτερον· καὶ ὁ εὔδημος πεπεῖσθαι φησὶ πινὰ φησί. καὶ θεμίσωνα οἱ μὲν, λέγουσι τῷ πάθει δηχθέντα πεπεισθῆναι καὶ σωθῆναι. οἱ δὲ, φίλωνα ὑδροφοβιῶντα προσκαλέσαντα προθύμως καὶ συμπαθῶς, εἰς τὴν ὁμοίαν ἐμπεσεῖν διάθεσιν. καὶ πολλὰ κακοπαθήσαντα σωθῆναι.

τὸ μὲ

τὸ μὲν οὖν πάθος ἐστὶν ἀργαλέον, περὶ δὲ τῆς πείρας αὐτοῦ, πολλοὺς καὶ αὐτοὶ περιεσώσαμεν. καὶ ὑπὸ ἄλλων ἰατρῶν σωθέντας ἔγνωμεν.

Θεραπεία τοπικὴ τῶν ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς δηγμάτων. Κεφ. γ΄.

Τῆς θεραπείας ἡ μέν ἐστι κοινὴ καὶ χρηστέον αὐτῇ ἐπὶ πάντων τῶν ὑπό τινος ἰοβόλου ζώου δεδηγμένων· ἡ δέ τις ἰδία τῶν λυσσοδήκτων· τοῖς μὲν γὰρ ἄκρως ὠφελεῖν εἰθισμένη· τοῖς δὲ ἀπὸ πολλοῦ δηχθεῖσιν ἀνάρμοστος, καὶ πρῶτόν τε αὐτὴν ἐκθέμενοι, μετὰ τοῦτο καὶ τὴν κοινὴν ἐκτροχάσομεν. δεῖ τοίνυν καρκίνους ποταμίους ἐπὶ κληματίδος λευκῆς ἀμπέλου καῦσαι, καὶ τὴν τέφραν αὐτῶν λεπτοτριβήσαντα ἔχειν ἀποκειμένην· ὁμοίως δὲ καὶ ῥίζαν γεντιανῆς ἀποθέσθαι κεκομμένην καὶ σεσησμένην. ὁπότε δέ τις δηχθείη ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς, εἰς οἴνου ἀκράτου κυάθοις δ΄. ἐμβληθήτω δύο μὲν κοχλιάρια τῆς τῶν καρκίνων τέφρας, ἓν δὲ κοχλιάριον τῆς γεντιανῆς· καὶ ἐγκυκήσαντας ὡς ἐν διφίτῳ δεδευμένῳ, πινέτω ἀπὸ τῆς α. ἡμέρας, μέχρι τεσσάρων ἡμερῶν. ἀπαρχῆς μὲν οὖν διδόμενον τὸ φάρμακον, τοῦτον προσφερέσθω τὸν τρόπον. εἰ δὲ ἡμέραι παρεληλύθασι δύο ἢ τρεῖς ἀπὸ τῆς δήξεως, ἐγχει-

tus seruatū extitisse. Molestissimū itaque genus morbi, à quo multos, anteq̃ ipsã experirent, vindicauimus: & complures ab aliis medicis seruatos nouim⁹.

Remedia demorsorum à cane rabioso. Cap. III.

Ratio medēdi duplex: vna cōmunis, qua vtēdū in oēs morsus, quos virulētę animātes impresserūt: alia peculiaris priuatáq;, eorū dūtaxat quos rabiosi canes momorderint: q̃ nōnullis q̃dē summā opē ferre cōsueuit: aliis verò ĩutilis maximè q̃ ex multo iā tempore ictū acceperūt. Quæ ad hāc pertinēt, primū exponem⁹, deinde cursim pstringem⁹, q̃ ad cōmunē medēdi rationē pertinēt. Cācros itaq; fluuiatiles in sarmētis albę vitis cremare oportet, & cinerē eorū q̃ minutissimè tritū habere recōditū: itidē gētianæ radicē tusã cribratáq; reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci vini, bina cineris cancrorū cochlearia, vnūq; gētianę cōiiciātur: hęc ĩ polētę dilutioris modū subacta, quatriduo bibātur. Inter principia medicamētū hoc modo detur. Atq; si ab illato morsu bini ter-

níve dies fluxerint, curationé auſpicabimur à triplicato pon dere, ſupra id quod ab initio retulimus. Optimũ hoc aduer ſus rabioſorũ morſus auxiliũ, quod & pleriſq; vnum ſatisfecit, eóq; cũ fiducia vti licet. Sed vt aliis etiamnum auxiliis con tra ineuitabile periculum muniamur, nihil cæteris vti prohi bet. Satius autem multò fuerit etiamſi in vanũ recidat, medicamẽtorũ inhumanos tolerare cruciatus, q̃ per inertiã ac deſi diam in diſcrimen adduci. Nec ita in demorſis à rabioſo animali maiora vulnera vereri oportet, vti minora, & vlcuſculis cutis ſimilia: quippe maiori vulnere cõfertim copioſus ſanguis emanãs, poteſt nónihil viruléti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à maioribus abſcedentes carnes hinc auferre, & labia acie ſcalpelli circũſcribere, & præhẽſam hamulo aut vulſella carné amputare oportet. In vtriſq; e circũſtãtia loca altioribus vlſculis ſcarificãda, vt copioſior ſanguinis vacuatio arceat, ne venenũ mẽbratim inſinuetur. Cucurbitulæ cũ multa flamma agglutinatæ id iuuaméti præſtant, vt veneni vis extrahatur.

ἐγχειρεῖν τῇ θεραπείᾳ, πει-
πλάσιον δεῖ διδόναι ὅσον ἐξαρχῆς
εἰρήκαμεν. τὸ μὲν ἄριστον ὅτι τῶν
λυσσοδήκτων βοήθημα, ὁ δὴ καὶ
μόνον ἐνίοις ἤρκεσε τοῦτο ὄζει, καὶ
χρηστέον αὐτῷ μᾶλλον πεποιθόσιν. ς
ἕνεκα δὲ τοῦ καὶ δι' ἄλλων ἀσφα-
λείας πρὸς ἄφυκτον δοκοῦντα κίν-
δυνον, οὐδὲν τὸ κωλύον ὅτι καὶ τοῖς
λοιποῖς χρήσασθαι, αἱρετώτερον ἢ
διακινῆς αὖ πάντων τύχῃ, τὸ βοηθημά
των τὸ ἀπαθέρωπον ὑφορμεῖναι, ἢ 10
διὰ τὴν ὀλιγωρίαν κινδύνῳ πε-
ριπεσεῖν. οὐχ ὅπως δ' ἐυλαβητέον
τὰ μεγάλα τραύματα ὑπὸ τῶν
λυσσοδήκτων, ὡς τὰ μικρὰ καὶ
τοῖς ἀμυχαῖς ἐμφερῆ· διὰ γὰρ τὸ
μειζόνων ἄφθονον καὶ πολὺ αἷμα 15
προσχεόμενον, δύναταί τι καὶ τοῦ
ἰοῦ συναποκλύζειν· διὸ καὶ τὰ μι-
κροτέρων οὐδαμῶς· καὶ ἐκ μὲν τῶν
μειζόνων τὰς ἀφιεμένας σάρκας
ἀνιτέον ἀφαιρετέον, καὶ τὰ χείλη
περιγλυπτέον διὰ τῆς ἀκμῆς, ἀ- 20
γατθέσης δὲ τῆς σαρκὸς ἀγκί-
στρῳ ἢ μύδρῳ, ἢ ἐντομῇ ἀπο-
τελεστέον. ὑπὸ ἀμφοτέρων δὲ τὰ
ἐν κύκλῳ βαθυτέρας ἀμυχὰς
καταξεστέον * ὅπως ἡ τοῦ αἵμα- 25
τος παραπλησιωτέρα γιγνομένη
κένωσις, ἐναπλησθήσεται τὰ σώμα-
τα τῇ τοῦ ἰοῦ διαδύσει. πολλῷ δ'
ἂν ἡ συκία κολληθεῖσα μετὰ πολ-
λῆς φλογὸς παράχρι ὠφέλειαν,
ὡς ἔστι λύσαι τοῦ ἰοῦ τὴν δύναμιν.

Contra

H δὲ

Ἡ δὲ καῦσις ἀνυσιμώτατον ἐπὶ τῶν ἰοβόλων ἐστὶ βοηθημάτων, τὸ γὰρ πῦρ πάσης δυνάμεως εὐτονώτερον ὑπάρχον, ὁμοῦ μὲν κρατεῖ καὶ κωλύει φέρεσθαι τὸν ἰὸν ἐσωτέρω, ὁμοῦ δὲ τὸ κρατηθὲν αὐτοῦ μέρος τῆς ἐφεξῆς θεραπείας, καταβολὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐργάζεται, παραμενούσης τῆς ἑλκώσεως ἐπιπλέον. τὴν μὲν γὰρ ἔκπτωσιν τῆς ἐσχάρας μάλιστα ἐκ τούτου φροντιστέον, ὅπως μὴ τάχιον τὰ μέρη συγκλεισθείη. ἀλλ' εἰ δυνατόν ἐστι πολὺ τῆς προθεσμίας τὰς ἑλκώσεις τηρητέον. καὶ ἐπὶ φλεγμαινούσας καὶ ἐπὶ ῥυπαινομένας. παρέξει δὲ αὐταῖς τὸ τοιοῦτον τάριχος ἐπιτιθέμενος, καὶ σκόροδον ἄγριον λεοτριβόμενον· κρόμμυά τε ὡσαύτως, ὀπὸς μὲν οὖν μάλιστα ὁ κυρηναϊκὸς ἢ ὁ καλούμενος μηδικὸς ἢ παρθικός. κόκκοι δὲ πυρῶν ἐπιτιθέσθωσαν καὶ μεμασσημένοι καὶ ἀμάσσητοι· διαφυρώμενοι μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἐμβροχῆς ἀνευρύνουσι τὰ τραύματα. τινὲς δὲ οἴονται τοὺς μεμασσημένους ἀντιπαθές τι ἔχειν ἀπό τῆς τῶν μεμασσηκότων νηστείας· οὐ μὴν τοῦτο βέβαιόν ἐστιν. ἀλλὰ εὐκαίρως αὐτοῖς χρηστέον. εἰ δὲ ὃ δὴ γίνεται πολλάκις, καὶ οὐλαὶ συμβχόμεναι φθάνωσι πρὸ τῶν ἡμερῶν, διὰ χειρὸς ἀναξαίνειν προσήκει·

προ-

Contra virulentos ictus, vstio expeditissimũ est auxilium, vt pote cum ignis cætera viribus præstet, simul quod virus domet, & ferri penitius nó patiatur, simul quod pars ignem experta, postea non vulgare fundamétũ curationi futuræ præbeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tépore cum crustæ decidét, ne vlceris ore coalescant, & cicatrice induãtur, sed si fieri potest ad multũ, idq; præstitutum tempus, vlcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditũ iis salsamentum optimè præstabit, & syluestre allium detritũ: item cepæ, succúsque præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, q̃ non mansa imponantur: si quidé subacta pistáue à perfusione vulnera dilatãt. Sũt qui à mandétium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verùm id certum nó est. Cæterũ tempestiuus eorũ vsus minimè est contènendus. Si verò quod persæpe accidit, ante dies pręfinitos cicatrices coirét, cómitterentúrq;, manũ postulabunt:

nan q

nanque eas didicere carnémque scalpello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi verò propositum tépus præteriit, vlcus ad cicatricem ducendũ, & emplastro quod è salibus conficitur locus comprehendendus: nec multò post sinapismo vtendum.

Ratio victus in morsu rabiosi canis. Cap. IIII.

QVÆ ad partem istã pertinent præsidia, ita se habent. Cæterùm victus rationem ex iis quæ veneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet, simul vt veneni vires hebetet, restinguátque, simul vt arceat, quo min⁹ ad intima pernicies illabatur. Etenim assumpta pernicioſarum virium penetrationi resistũt. Quorum vtrunque præstare potest vini meracioris, passi, & lactis potus: quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil veneno obiiciunt, quod omnem eius acrimoniam obtũdat. Simili modo aliorum, porrorũ, cœparúmque cibos: quod ea difficulter cõficiantur, víxque aboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanẽt, quo tempore nec euincũtur, nec permutant à mortifera vi, sed

σὺν σαρκίζοντας καὶ τέμνοντας, ἢ καὶ ὀπτεύοντας πάλιν ἐπὶ οὖτον πύῳ. παρελθούσης δὲ τῆς περικαιομένης σφοδρότητος, ἀφετέον μὴ ἀπουλωθῆναι τοῖς ἕλκεσιν, ἐμπλάστρῳ δὲ τῇ διὰ τῶν ἁλῶν ὅλον τὸν τόπον καταλαπτέον· μετὰ ὀλίγας δὲ ἡμέρας καὶ σιναπιστέον.

Περὶ Διαίτης τοῦ ὑπὸ κυνὸς λυσσώντος δηχθέντος. Κεφ. δ'.

Ἡ μὲν οὖν τοπικὴ θεραπεία τῶν λυσσοδήκτων, τοιαύτη τίς ἐστι. δεῖ δὲ καὶ τὴν δίαιταν ἐπιτηδείαν τοῖς οὕτω διακειμένοις, ἵνα ὁμοῦ μὲν ἀμβλυόμενα καὶ σβεννύσι τὰ δυνάμεις, ὁμοῦ δὲ κωλύῃ τὴν εἰς βάθος φοράν. καὶ ἀλαμβανόμενα γὰρ ἀντιπίπτει τῇ παρεισδύσει τὰ φθοροποιὰ δυνάμεως. δύναται δὲ τούτων ἐκάτερον παρέχειν τοῦτο, οἶνος ἀκρατὺς ζωρότερος πόσις καὶ γλυκέος καὶ γάλακτος· οἱ γὰρ ταῦτα πάντα λαμβάνοντες πρὸς τὴν ὀπυίλεσιαν, ἐπίσασταί πῃ, καὶ πᾶσαν αὐτὴν τὴν δριμύτητα ἀμυκάει. ὡσπύτος δὲ καὶ σκορόδων καὶ πράσων καὶ κρομμύων ἐδωδή· καὶ ταῦτα γὰρ τὸ ὅλον δυσμετάβλητα καὶ δυσεξίτηλα. παραμύθιοι γὰρ αὐτῆς αἱ ποιότητες ὀπὶ πλείους ἡμέρας, ὀπόταν οὐ νικᾶται οὐδὲ πέπτ[ω]ται ὑπὸ τῆς φθοροποιοῦ δυνάμεως,

ὅπ

ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων κρατεῖν αὐτῆς πέφυκεν. εἰς τοῦτο δὲ καὶ τῶν ἀντιδότων ἡ χρεία, καὶ τῆς θηριακῆς, καὶ τῆς εὐπατορείου λεγομένης. καὶ τῆς μυρρινίτου καὶ πάσης ἄλλης ἥ τις ἐκ πλειόνων ἀρωμάτων εἴληφε τὴν σύστασιν. δυσμετάβλητα γὰρ τῇ συστάσει πάντα τὰ ἀρώματα καὶ δυνάμεσι καὶ ταῖς οὐσίαις· διὸ καὶ κρατεῖ μᾶλλον τοῖς σώμασι. τοιοῦτος μὲν οὖν καὶ ὁ τῆς διαίτης τρόπος· δεῖ δὲ γινώσκειν ὅτι ἡ τοῦ ὑδροφοβικοῦ πάθους ἐκκάτασκεψις, οὐδὲ ἀκριβῶς ἔχει προθεσμίαν. ὃν ὀπτοπλεῖσον γὰρ ἕως τεσσαρακοστῆς ἡμέρας εἰωθός, τοῖς ἀμελεστέροις καὶ δι' ἐξαμήνου ἐνίοις ἀπλώτησε. καὶ δι' ἐνιαυτοῦ, καὶ ταῦτα ἡμῖν ἐώρακται. ἰσορεῦσι δέ τινες μετὰ ἑπταετίαν ἐνίοις ἐνδιδόντα τῷ πάθει. καὶ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς τῆς λυσσοδήκτου ἡ θεραπεία, τοιαύτη ἔστιν. ἐὰν δὲ ὁπωσοῦν διαπτοηθῇ ἐν ταῖς πρώταις ἡμέραις μὴ προληφθῇ τὰ προσφερόμενα βοηθήματα, τὸ μὲν παρεκχέειν καὶ καίειν, παραλειπτέον. καὶ γὰρ ἱκανῶς εἰς τὸ παρελκυσθὲν μετάγειν δύναται. οὐδεμία γὰρ ὄκνος τῆς ὀπτοσολῆς, ἀλλὰ διακενῆς τὰ σώματα ταῖς ὀδύναις βλαβηθήσεται, βόπος δὲ τῆς θεραπείας ἔτερος ἀγέδω. κάθαρσις ἡ καὶ μέγα ὄφελος

sed contrariis illa vis expugnatur. Cui rei antidotorum vsus accommodatur, & theriaces, Mithridatij, & eius quod eupatorio temperatur. Deniq; omnium quę magnam aromatum partem sibi vendicant: quippe aromata omnia viribus & substantiis ægrè permutãtur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nosse conuenit, pauoré aquæ non stato definitóque tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimum vsque dié neglectis differri consueuit. Post semestre etiam nónullos inuadit: quędam post annum aquã horruisse constat. Quæ nobis visu cõperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aqua metu fuisse tentatos. Inter principia demorsorũ à cane rabiosa curandi ratio talis est. Verũ enimuero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalpro carnem circinare, nec vstionẽ experiri operæpretiũ est. Nó enĩ quod iá pertrãsiit, satis euocare possent. Nulla vtiq; istius rei occasio aut vtilitas, sed incassum corpora dolorib⁹ sternentur. Alter verò curationis modus accedat. Deiectio magnũ

præbet

præbet iuuamétum, vtpote cũ mouendo, corporis habitum trãſmutet, & quæ colocynthidem recipit hiera. Ité lac ſchiſtum, quod ſimul deiectionem moueat, & venenum domare poſsit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie ſumi debent. Cæterùm ſudores ante cibos, & poſt etiã ciendi. Dropaciſmi ſinapiſmiq; alternatim per corpus totum adiiciendi. Sed longè omnium efficaciſsimum auxilium helleboriſmus cognoſcitur, quo cum fiducia nõ ſemel atque iterum, ſed frequentius ante quadrageſimum diem, vel poſt hoc tempus vti licet. Tantam enim vehemétiam hoc auxiliũ habere fertur, vt quidã qui iam aquæ metum ſentirent, ſumpto helleboro, ſimul ac primum morbi impetũ experirétur, fuerint ſeruati. Nam & iam vitio tentatos nemo vnquã ſeruare poteſt. Itaque primũ curã contra rabioſi canis morſus breui ſermone expoſuim⁹: iam ad alia, quæ venenatis morſib⁹ ſæuire conſueuerũt, trãſeundũ. Notas vno cõtextu, deinde cõmuné medendi modũ, qui omnibus cõuenire poſsit, explicabimus. Curſim

ὄφελος ἐμπαρέχειν δυνάμενον, συμμεταποιεῖ γὰρ τὴν ἕξιν κινοῦσα· ἥ τε διὰ τῆς κολοκυνθίδος ἱερὰ δόσις. καὶ δὴ καὶ τὸ γάλα τὸ σχιστὸν, ἅμα κάθαρσιν καὶ ἐπικράσεις παρέχειν δυνάμενον. αἵ τε δριμυφαγίαι καὶ ἡ τοῦ ἀκράτου πόσις, παραλαμβανέσθωσαν καθημέραν, ἀμβλύνειν δυνάμεναι τὸν ἰόν, καὶ πρὸς τούτοις ἱδρωτοποιΐα, καὶ πρὸ τροφῆς καὶ μετὰ τροφήν. δρωπακισμός τε καὶ σιναπισμὸς κατὰ μέρος ἐφ' ὅλου τοῦ σώματος. πάντων δὲ ἀνυσιμώτατον ἀπὸ τούτων ὁ ἐλλεβορισμὸς ἐγνώσθη, καὶ χρηστέον τεθαῤῥηκότως τῷ βοηθήματι, οὐχ ἅπαξ, οὐδὲ δὶς, ἀλλὰ καὶ πλειστάκις πρὸ τῆς τεσσαρακοστῆς ἢ καὶ μετὰ ταῦτα. τοσαύτην γὰρ τὴν ἰσχὺν προσφέρεται τὸ βοήθημα, ὥς τε τῶν ἤδη συνηθημένων τῷ ὑδροφόβου, διασωθῆναι τινὰς λαβόντας ἐλλέβορον εὐθὺς ἐν τῷ πρώτῳ καταπειρασμῷ τοῦ συμπτώματος. τοὺς γὰρ ἤδη κατειλημμένους, οὐδὲ αὐτός τι περιποιῆσαι δύναται. τὴν μὲν οὖν τῶν λυσσοδήκτων ἐπιμέλειαν προτέραν ἐξεθέμεθα, δι' ὃν ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν ἐπιλογισμόν. μεταβαίνοντες δ' ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἰοβόλων. προτάττοντες τὰς σημειώσεις αὐτῶν, ὑπὸ μίαν ἐκθησόμεθα περίφρασιν. μετὰ δὲ τοῦτο, κοινὴν τὴν θεραπείαν πᾶσιν ἁρμόσαι δυναμένην ὑπο-

ὑποδραμόντες δὲ ἑξῆς ὑποδείξομεν, εἴ τινα κατ' ἰδιότητα ἐνίοις προσωφελεῖν πέφυκεν. ὁμοίως καὶ τὰ τελείως ἀβοήθητα παρασημειωσόμεθα.

Curſim deinceps ſubiungemus ea, quæ ſua ꝓprietate nõnullis auxilium præſtare poſſunt. Poſtremo ſubnectétur etiã venenata, q̃ nullis cedũt remediis.

Περὶ φαλαγγίων. Κεφ. ε.

Τοῖς μὲν ὑπὸ φαλαγγίων δεδηγμένοις, αὐτὸς μὲν ὁ τόπος ἐνερευθὴς ἐστὶ καὶ ὅμοιος κεντήμασιν οὔτε οἰδηματώδης οὔτε περίθερμος, ἀλλὰ μετρίως μὲν ὑπέφυδρος· ἐν δὲ τῇ τῶν ἐναντίων κατεψυγμένος, παρακολουθεῖ δὲ τρόμος δι' ὅλου τοῦ σώματος, καὶ ἐντάσεις περὶ τοὺς βουβῶνας, καὶ τὰς ἰγνύας προσεοικυῖαι σπασμῷ. περὶ τὴν ὀσφὺν σύλλημμα καὶ συνεχὴς πρὸς οὔρησιν ἐρεθισμός. δυσκολία πολλὴ περὶ τὴν ἔκκρισιν τοῦ περιττώματος· ὁμοίως δὲ τούτοις καὶ ἱδρὼς ψυχρὸς καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν ἐκκρίνεται· τά τε ὄμματα δακρύει καὶ ποσῶς ἀμαυροῦται.

De phalangiis. Cap. V.

De morſis à phalangiis locus quidem ipſe, quaſi ab impacto aculeo rubet, non intumeſcens, nec per ambitum calidus eſt, ſed mediocriter humeſcit: vbi verò contrariorum occurſu refrixit, conſequitur corpore toto tremor, diſtentiones poplitum & inguinum, conuulſionibus non diſsimiles. In lumbis collectio exoritur, & perpetua vrinæ libido laceſsit, multáque reddẽdis excremẽtis colluctatio. Vniuerſa cute frigidus ſudor emanat: collachrymant oculi, offuſiſq; nebulis caligant.

Περὶ Σκολοπένδρας. Κεφ. ς.

Τοῖς δὲ ὑπὸ τῆς καλουμένης σκολοπένδρας ἢ ὀφιοκτένης δεδηγμένοις, ὁ μὲν ἐν κύκλῳ τόπος τοῦ δήγματος, πελιοῦται, καὶ περισήπεται· καί ποτε τρυγώδης κατὰ τὸ σπάνιον καὶ ἐνερευθὴς φαίνεται. ἑλκοῦται δὲ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ δήγματος λαμβάνων τὴν ἀρχὴν, ἑλκωσίν τινα ἐπίπονον καὶ δυσαλθῆ· πρὸς δὲ τούτοις περὶ ὅλον τὸ σῶμα συναίσθησις γίνεται κνησμώδης.

Περὶ

Scolopendra. Cap. VI.

Si ſcolopendra aut dicta ophioctene morſum intulit, locus per ambitum liuore ſugillatur, & computreſcit: interdúmque, licet raró, fæculentus atq; ruber cernitur. A morſu ipſo exulcerari locus incipit, vlcúsque id negotium exhibet, ferè remediis inuictum: præterea toto corpore prurigo ſentitur.

Scorpio

Scorpio. Cap. VII.

Scorpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indurescit, ac intentus rubet, vicissimque dolore premitur. Modò siquidem exęstuat, modò frigore occupatur. Labor repentè fatigat, & aliquando meliusculę habet, aliquando verò recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, palor membra decolorat & dolor, tāquam ex pungente acu, per vniuersam cutem sentitur.

Πρὶ Σκορπίε. Κεφ. ζ.

Τοῖς δὲ ὑπὸ σκόρπιου δηχθεῖσιν, ὁ μὲν τόπος ἐυθέως ἄρχεται φλεγμαίνειν, σκληρὸς καὶ ἐνερευθὴς καὶ πεπαθὴς, σὺν ὀδύνῃ γινόμενος ἐνταῦθα. ὁ τε μὴ τὸ πύρωσις, αὖθις ὑπ' ψύξις ἐπιλαμβάνεται. καὶ πόνος ἐξαπίνης, καὶ ποτὲ μὲ ραΐζῃ, ποτὲ ὑπιτείνεται. παρέπεται δ' αὐτοῖς ἱδρὼς καὶ φευκώδης ἀΐδησις, καὶ τρόμος. καὶ πεῖ-ψυξις ἀκρωτηρίων, καὶ βουβώνων ἔπαρσις, φύματα διὰ τῆς ἕδρας, ὀρθοπεισία τε, καὶ δύσχροια, ἐπαλγὴς πεῖ πλὴ ὑπφανείαν τῆς αἰδήσεως, καθάπερ ἀπὸ βελόνης κεντημάτων ὀδυνώμενος.

Prastinaca marina. Cap. VIII.

Si marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assiduæ conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas. Mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum vi cinis partib⁹ denigratur, & ita obstupescit, vt tāgentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & malè olés excernitur.

Πρὶ Τρυγόνος θαλασσίας. Κεφ. η.

Τοῖς δὲ ὑπὸ τρυγόνος θαλασσίας δηχθεῖσι, παραυτίκα μὲν πεισωδωίαι συμβαίνουσι δυσπαυστάγαστοι, ἀσταθμοὶ † συνεχεῖς καὶ πόνος, καὶ ἀπονία, καὶ διανοίας παραφορὰ, μετὰ δὲ τοῦτο ἀφωνία καὶ σκοτασμὸς ὀφθαλμῶν. αὐτὸς δὲ ὁ πληγεὶς τόπος, *μέλας γίνεται κύκλῳ, καὶ τὸ πλησίον αὐτῆ μέρη, καὶ περὶ τὰ ἀφωὶ ἀναιδητεῖ. ἐπὰν δέ τις αὐτὸ ἀποθλίψῃ, ἰχὼρ ἐξ αὐτῆς μέλας, παχὺς, δυσώδης ἐκπρίνεται.

Mus araneus. Cap. IX.

A mure araneo percussis, circa

Πρὶ Μυγαλῆς. Κεφ. θ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ μυγαλῆς δηχθεῖσι, κύκλῳ

κύκλῳ μὲν περὶ τὸν τόπον τῆς δήξεως γίνεται φλεγμονή, φλυκταὶ δὲ ἐπανίστανται μέλαιναι, μεσὴ ἰχῶρος ὑδατώδους· καὶ τὰ πλησίον πάντα πελιδνοῦται. ῥαγείσης τε τῆς φλυκταίνης, νομὴ παραλαμβάνει παρανιστάμενα ἀπὸ τῶν ἑρπυστικῶν. συμβαίνει τούτοις δὲ παρέπεται καὶ σφόδρα περὶ τὰ ἔντερα, καὶ δυσουρία, καὶ ψυχρᾶς γονόρροος περίχυσις.

circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigráque pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ partes liuét. Rupta pustula, depascés vlcus, nó ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum quoq; tormina, difficultas vrinæ & frigidæ aspersionis offusio consequuntur.

Περὶ Ἐχίδνης. Κεφ. ἰ.

Τοῖς δὲ ὑπὸ ἐχίδνης δηχθεῖσιν, οἰδεῖ καὶ ἐφ' ἑκανὸν τὸ σῶμα ξηραίνεται, πλὴν χροιὰ δὲ ὑπόλευκον ἔχει. ἰχὼρ δ' ἀπὸ τοῦ βράγματος περιχεῖται, τὸ μὲν πρῶτον ὑπολίπαρος, μετὰ ταῦτα δὲ αἱματώδης· φλυκταινῶν τε ἐπανάστασις, καθάπερ ὑπὸ τῶν πυρικαύστων ἕπεται· καὶ νομὴ παραλαμβάνει περιχέουσα ὑπὸ τὸ παρακείμενα πάντα πλησίον, οὐ μόνον ὑπόπλαυσις· ἀλλὰ καὶ διὰ βάθους· αἱμάσσει δ' αὐτοῖς καὶ τὰ οὖλα· καὶ πέπαρ συίσκεται φλεγμονή· σφόδρα τε καὶ χολώδεις ὑπομβαίνουσιν ἔμετοι. προσγίνεται δὲ αὐτοῖς ἔμετος καὶ κάρος, καὶ δυσουρία, καὶ ψυχρὰ περίδρωσις.

Vipera. Cap. X.

Si vipera momordit, corpus intumet, vehementer arescit, subalbidúmque colorem cócipit. Sanies à vulnere profunditur, primum suppinguis, mox cruenta: pustulæ adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modo corporis, sed intima quoque corripit: gingiuæ iis cruore suffunduntur: inflámatio circa iecur erumpit: tormina & bilioſi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & vrinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur.

Περὶ Ἀμφισβαίνης. Κεφ. ιά.

Παρασκήπτει δὲ συμβαίνει καὶ τοῖς ὑπὸ τῆς περσαρρεομένης σκυτάλης ἢ ἀμφισβαίνης δηχθεῖσι, βοηθεῖ δὲ σχεδὸν ἤδη τὰ αὐτά· διὸ περ ἰδίας ἀναγκαίως ἔπι

Cæcilia. Cap. XI.

Consimilia eueniút iis qui à cęcilia nomine, aut amphisbęna demorsi sunt, eadémq; ferè auxiliantur: quare hoc venenú priuatá descriptioné sortitum non

nō est, neq; visum est dignum, quod alio genere cōprehēdat.

Dryinos. Cap. XII.

A DRYINO morsis pustulæ molestíque dolores incidunt, præsertim quà dilutæ saniei emissarium subest: quinetiam erosio, tormináque cōsequuntur.

Hemorrhoos. Cap. XIII.

Ab hæmorrhoo ictis vehementes cruciatus accidūt, qui angusta contractáque corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus cruor effluit, & quacunq; parte corporis cicatrix vlla fuerit: ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eiiciuntur, profluésq; sanguis in globos coiit. A pulmone sanguinē extussiunt, & in vomitiones effusi sine remedio commoriuntur.

Dipsas. Cap. XIIII.

Quos dipsas percussit, solut⁹ ac nō cōstrict⁹ tumor premit, sitisq; vsq; eo ꝑtinax, vt satiari nō possit, ac sine vlla intercapedine excruciet: etsi potū pleno ore affatim trahāt, illico in eandē sitim relabunt: ꝓinde toto habitu similes sunt iis q antea pot⁹ nihil hauserint. Quare ꝓpter cōtinuā sitim, & prester, & causon, aut dipsas appellat.

Natrix

οὔτε τε τύχηκεν, οὔτε ἠξιώθη τὸ εἶδος τοῦτο.

Περὶ Δρυΐνου. Κεφ. ιβ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ δρυΐνου δηχθεῖσιν, ἰσχυραὶ περιωδυνίαι ἐμπίπτουσι, καὶ φλυκταινώδεις ἐν τῷ οἰκείῳ μέρει, ὅπου δὲ καὶ ὑδατώδους ἰχῶρος ἔκχυσις· ἐπακολουθεῖ δὲ καὶ δηγμὸς καὶ στρόφος.

Περὶ Αἱμόρρου. Κεφ. ιγ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ αἱμόρρου δηχθεῖσιν, ἰσχυραὶ περιωδυνίαι ἐμπίπτουσι, βραχέα δὲ καὶ στενὰ παντελῶς παρέχουσι τὰ σώματα ὑπὸ συντυχίας τῶν ἀλγημάτων. ἐκ δὲ τοῦ δήγματος ἔκκρισις γίνεται πολλή, κἂν οὐλὴ καθ' ἕτερον μέρος τοῦ σώματος ὑπάρχῃ, παρέχει αἱμορροεῖν· τὰ δὲ διαχωρήματα αἱματώδη ἐκκρίνεται, καὶ τὸ ἀπορρεόμενον ἀπ' αὐτοῦ αἷμα τεθρομβωμένον ἐστί. βήσσοντές τε ἀπὸ πνεύμονος, αἷμα ἀνάγουσι, * καὶ ἐξεμοῦσιν ἀβοηθήτως.

Περὶ Διψάδος. Κεφ. ιδ'.

Τοῖς δὲ δηχθεῖσιν ὑπὸ διψάδος, ἄστεγνος ὄγκος ἐφίσταται, καὶ δίψος ἐπιτεταμένον ἰσχυρῶς ὥς τε ἀπλήρωτον καὶ ἀδιάλειπτον εἶναι· καὶ τὸ ποτὸν χανδὸν ἕλκειν, κἂν τῷ αὐτῷ καθίστασθαι. τῷ δὲ μὴ τὴν ἀρχὴν εἰληφότι τὸ ποτὸν, παραπλήσιόν τι ὅλου τοῦ συγκρίματος ἀκολουθεῖ. διὰ τὴν συνεχῆ τοῦ πώματος εἰσφορὰν, ὅθεν πρηστὴρ τε καὶ καῦσος προσαγορεύεται ἡ διψάς.

Περὶ

Περὶ ὕδρου. Κεφ. ιέ.

Τοῖς δὲ ὑπὸ ὕδρου δηχθεῖσι, τὸ ἕλκος σκατώδες καὶ μέγα γίνεται πολύμυον. ἰχὼρ τε ἐξ αὐτῆς μέλας καὶ πολὺς καὶ δυσώδης οἷον ἀπὸ τομῆς ἐκρίνεται.

Natrix. Cap. XV.

Ab natrice demorsis vlcus dilatatur, & liuidũ ac ingẽs euadit. Sanies ex eo multa, & atra, & malè olens, nõ secus atq; iis quæ serpunt vlceribꝰ, expuitur.

Περὶ Κίγχρου. Κεφ. ις'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ κίγχρου δηχθεῖσι, τὸ μὲν δῆγμα ὅμοιον τοῖς ἀπὸ τῆς ἐχίδνης, σηπεδὼν δὲ παραγκολουθεῖ. καὶ σαρκῶν ἐξουδήσασαι πρότερον ὡς ὑπὸ ὕδρωπος. λήθαργοί δεις τε γίνονται καὶ καταφοραὶ αἴτιοι. Ἐρασίστρατος δὲ φησιν αὐτοὺς πεπονθέναι τὸ ἧπαρ καὶ τὴν νῆστιν καὶ τὸ κῶλον· ἀναλωθέντων γὰρ αὐτῶν διεφθαρμένα πως εὑρίσκεται πάντα τὰ μέρη.

Cenchri morsum, qui viperino ictui similis est, putridum vlcus sequitur. Carnes antea, vt in aqua inter cutem, prætumidæ, defluũt. Lethargo corripiũtur, & veterno pressi somnos captãt. Erasistratꝰ eos iocinere, intestino ieiuno, colóque conflictari autor est. Quippe dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur.

Περὶ Κεραστοῦ. Κεφ. ιζ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ κεράστου δηχθεῖσιν, ὁ μὲν τόπος ἐπαίρεται μετὰ σκληρίας καὶ φλυκταινώσεως. ῥεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ δήγματος ἰχὼρ ποτὲ μὲν μέλας, ποτὲ δὲ ὑπόχρους· κιρρότερος δὲ γίνεται πρὸς τὸ σύγκριμα ὅλον· καὶ τὸ μὲν αἰσθητὸν τείνεται. ἡ δὲ διάνοια ἐξίσταται, ὀφθαλμῶν τε ἀμαύρωσις ἐπιγίνεται· τέλος δὲ ἀπόλλυται κατὰ μῆνας τεσσάρων.

Ceraſtes. Cap. XVII.

A ceraſte percuſsis locus attollitur, cum duritia puſtuloſus. E plaga ſanies profluit, modo atra, modo pallidior: ſed toto concretu varicoſus intumeſcit: genitale intenditur: mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore neruorũ diſtẽti commoriuntur.

Περὶ Ἀσπίδος. Κεφ. ιή.

Τοῖς δὲ ὑπὸ ἀσπίδος δηχθεῖσι, τὸ μὲν δῆγμα ὅμοιον τοῖς ὑπὸ βελόνης κεντήμασι μικρὸν παντελῶς φαίνεται χωρὶς τῆς ἐπαρσεως· καὶ αἱμάτιον ὀλίγον καὶ πολύ, ἀλλὰ

Aſpis. Cap. XVIII.

Ab aſpide ictis, vulnus exiguum prorſus, quaſi ab adacta acu citra tumorem conſpicitur: ſanguis exiguus ille quidẽ, ſed

ſed ater diſtillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis & non ſine voluptatē conſequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit: At vir perit, abſque labore, virens atque diſcolor: mediocris ſtomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellitur: genæ contremiſcũt, quaſi ſine ſenſu in ſomno vacillent. Hos mors tollit, ad diei trientem non dilata.

Baſiliſcus. Cap. XIX.

Eraſiſtratus in libro quem de medicaminibus & venenis condidit, de vocato baſiliſco ſcitè ita refert: Cum baſiliſcus momorderit, vuln⁹ ad auri colorem efflaueſcit. Itaque in plurimis quæ virus eiaculantur, comites notæ ita ſe habent. Tranſeuutes vtiq; ad medendi rationem, primum, vt fieri poterit, de cõmunibus diſſerem⁹.

ἀλλὰ βραχὺ καὶ μέλαν ἀποστάζει· ταχεῖα δὲ ἀμαύρωσις ὀμμάτων καταλαμβάνεται· πόνος τε ὅλου τοῦ σώματος πολυειδής. παντάπασιν ἐλαφρὸς καὶ οὐκ ἄτερ ἡδονῆς παρακολουθεῖ. διὸ καλῶς ὁ Νίκανδρος πεφώνηκε· καμάτου δ' ἄτερ ὄλλυται ἀνὴρ, χρόαν ἀτρόπος καὶ χλοανθής· καρδιωγμὸς ὀλίγος. μέτωπον δὲ συνεχῶς ἀνασπᾶται· βλέφαρα κινοῦνται μετ' ἀναισθησίας ὁμοίως ὕπνῳ, κἂν τούτοις θάνατος συναίρει μὴ τὸ τρίτον ἡμέρας διαλιπών.

Περὶ Βασιλίσκου. Κεφ. ιθ.

Ἐρασίστρατος ἐν τῷ καλουμένῳ περὶ δυνάμεων καὶ θανασίμων περὶ τοῦ καλουμένου βασιλίσκου ῥητῶς οὕτω φησίν· ὅταν δὲ ὁ βασιλίσκος δάκῃ, πληγὴ ὑπόχρυσος γίνεται. Τὰ μὲν οὖν ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἰοβόλων παρακολουθοῦντα σημεῖα, τοιαῦτά ἐστι. μεταβαίνοντες δ' ἐπὶ τὸν τῆς θεραπείας, πρῶτον τὰ κοινὰ τῆς θεραπείας ὡς δυνατὸν παραδώσομεν.

LIBRI SEPTIMI FINIS.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ.

PEDA-

ΠΕΔΑ-

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ἀναζαρβέως περὶ θεραπείας τῶν ὑπὸ ἰοβόλων δεδηγμένων βιβλίον ὄγδοον.

Τίς κοινὴ τῶν ἰοβόλων θεραπεία. Κεφ. α.

ΠΡΟΣ πᾶσαν πληγὴν ἰοβόλου ἁρμόζει ἡ διὰ τοῦ στόματος ἐκμύζησις. δεῖ δὲ μὴ ἄσιτον εἶναι τὸν ἐκμυζῶντα, ἀλλὰ καὶ εἰληφέναι ῥοφὴν, καὶ διακλύζεσθαι οἴνῳ· ἔπειτα δὲ καὶ βραχύ τι ἐν τῷ στόματι ἐλαίου κατέχων, οὕτω τὴν ἐκμύζησιν ἐπιτελείτω. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ τόπος σπόγγῳ πυριάσθω, ἔπειτα δὲ ἐγκαταχαζέσθω· βαθυτέρας δὲ ἐμβάλλειν τὰς ἀμυχὰς προσήκει, ὅπως τὴν ὕλην ἐκ βάθους ἀναλαμβάνῃ. καὶ περισαρκισμὸς δὲ καὶ ἐκτομὴ, πλουσιώτερον καταχασμοῦ βοηθοῦσιν· ἴδια γὰρ ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ χρησιμεύοντα γίνεται. ἓν μὲν ὅτι αἴρεται ὁ ἰὸς ἐκ τοῦ τόπου. δεύτερον δὲ ὅτι τῷ αἵματι συνεκκρίνεται πολλῷ καὶ ἀθρόῳ τὸ φθάσαν ἔσω παρελθεῖν. εἰ δὲ ὁ τόπος τὸν περισαρκισμὸν οὐ προσδέχοιτο, σικύας χρὴ προσβάλλειν μετὰ φλογὸς πλείονος. περὶ δὲ καύσεως ἐπὶ τῶν λυσσοδήκτων προειρήκαμεν.

εἰ δ᾽

PEDANII DIOSCORIDIS Anazarbei De curatione ab animalib⁹ venenatis morsorum, LIBER VIII.

Cómunis curatio in omnes ictus virulétos. Cap. I

ADuersus quidem omnem animalis ictũ, quod venenũ vibrat, oris suctio conuenit. Sugentem verò oportet ieiunum non esse, sed & cibum sumpsisse, & vino os abluisse: postea exiguũ olei in ore continens plagam exugat. Locus ipse spongia fouendus, deinde scarificandus: sed vlcuscula alti⁹ imprimere expedit, quo virosa materies profundo euocetur. Circinatio autẽ carnis, & sectio, scarificatione lõgè potentius opitulantur: nãq; ab iis duo peculiaria præsidia fiunt. Vnum, quod virus è loco tollitur. Alterum, ꝙ eius veneni pars q̃ ad interiora grassaẗ, cũ multo copiosoq; sanguine excerniẗ. Quod si locus sectionem non admittat, cucurbitulæ cum largiori flãma adfigẽdę sunt. Sed iã de vstione suprá in rabiosorũ morsu disseruimus.

 Si veró

Si verò icta pars, vtpote extrema, eam sectionem commodè non respuat, præsertim in omnibus serpentiũ ictibus, vt aspidis, ceraſtæ, similiumq́; procul dubio amputanda est. Conuenientiora suprà dictis auxilia sunt, quæ epithemata vocant. Imponatur sermentitius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio stillatitio subactus, garo, & acri salsaméto: porri, cepæ, & allia modo minutissimè cõtrita illinũtur, modo cremata vulneribus iniiciuntur. Quinetiam dissecti gallinarum pulli, cum maximè tepent, percusso loco applicẽtur. Nec desunt qui hisce tanquam discordia quadã naturali pugnãtibus vtãtur: verùm huius ratioñe inire facillimũ fuerit. Gallinæ enim calida natura præditæ sunt, argumento, ꝙ deuoratum insigne virus cõficiunt, & aridissima queq; semina consumãt: item nõnunquã arenas lapillosq; ingluuie sua deuoratos dissoluunt. Itaq; animantis admoti calore adiutus spiritus, ab icta parte impetum capessens exiliésq; secum venenum exigit. Nec me fugit quid in Ægypto fieri soleat. Cũ spicas Ægyptij metũt, ollam picis paratã habẽt, & appẽsã fasciã: tunc

εἰ δ' εὐφυῶς ἔχει πρὸς ἀποκοπὴν τὸ μέρος τὸ δεδηγμένον, μάλιστα ἐπὶ πάντων θηρίων ἀνενδοιάστως ὁ ἀκρωτηριασμὸς ποιητέον, ὡς ἀσπίδος, καὶ κεράστου καὶ τῶν ὁμοίων. ὡς ἐπιτηδειότερα διὰ τῶν προειρημένων βοηθημάτων, ἄξια ἐπιθέματά ἐστιν. ἐπιτιθέσθω δὲ τέφρα κληματίνη ἢ συκίνη, μετὰ κονίας στακτῆς πεφυραμένης. γάρου, δριμέος ταρίχου· πράσα τε καὶ κρόμμυα, καὶ σκόροδα ποτὲ μὲν ὡς ἐκλεπτυνθέντα καταπλασσέσθω, ποτὲ δὲ καέντα προσβαλλέσθω τοῖς δήγμασι. καὶ οἱ τῶν ὀρνίθων νεοσσοὶ διαιρεθέντες καὶ θερμότατοι προσπτυσσόμενοι τῷ πεπληγότι τόπῳ. τινὲς μὲν ὡς ἀντιπαθέσιν αὐτοῖς ἐχρήσαντο· πρόχειρον δὲ ἔχει τὸν λόγον. φύσει γὰρ οἱ ὄρνιθες εἰσὶ θερμαὶ, διὸ καὶ ἐπίσημον τὸν ἰὸν καταπιοῦσαι, τεύχουσι, καὶ τὰ ξηρότατα δαπανῶσι τῶν σπερμάτων· ἐνίοτε, καὶ ψάμμοις καὶ λίθοις διαλύουσιν ἐμφαρυγξάμεναι. τοιγαροῦν πρὸς τὴν τοῦ ζώου θερμασίαν, τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ δεδηγμένου μέρους ὁρμὴν λαμβάνον, συνεξάγει τὸν ἰόν. ἔγνωμεν δὲ ἐπὶ τῆς αἰγύπτου τοιοῦτόν τι γινόμενον. ὁπόταν οἱ αἰγύπτιοι θερίσωσι τὸν στάχυν, χύτραν ἔχουσι κατεσκευασμένην πίσσης, καὶ σφήκωμα προσηρτημένον τῇ χύτρᾳ. τό τε

τὸ δ' γὰ μάλιστα δεδίασι τὰ θηρία, καὶ διὰ τοῦτο ὅταν, καὶ τῶν λαθραίων αὐτὰ κείμενα καὶ τῶν ὀπῶν τῶν ἐν ταῖς ἀρύσεσι σπόγγων τύμματα ὁμοῦ καὶ ὑπὸ τῆς δυσοσμίας τῶν χωρῶν. πολλὰ δὲ καὶ τὰ πεδία χαλεπώτερα τοῖς ἰοβόλοις ζώοις ἢ αἴγυπτος φέρει. ἐπειδὰν οὖν δηχθῇ τις πέδαι ἢ ἄλλο τι μέρος τοῦ χρωτὸς οἱ παραντυχόντες τὸ σφίγκωμα βάλλουσιν εἰς τὴν χύδαν τῆς πίττης, καὶ ἀφελοῦσιν ἅπαξ ἢ δὶς ἀφεὶ τὸ πῆχυν ἢ πλὴν κνήμιλλον, μικρὸν ὑπαίθρου τὸ δάσματος, καὶ ἀφισφίγγουσι δύο περιστῶντες ἰσχυρῶς, καὶ ἐντίμνοντες τὸ πόνον διὰ τὸ ἀφεδέσεως τὸ βρόχου, ἐπιχέουσι καὶ πίσσαν. ὅταν δ' αὐτάρκως ἔχειν δοκῇ, τὸ βρόχον ἐφαιροῦσι καὶ καταπλάσσουσι κρομμύοις, καὶ δι' ἄλλων τῶν προειρημένων. καὶ ἰδίων δὲ χρεὼν ὑγρὰ πίσσαι μὴ ἀλῶν λείων θρυμτίρων καταπλασσομένων, ἀφεδαίως βοηθεῖ, αὐτὴ καὶ ποιητέα συνεχέστερον. ὡσαύτως ἁρμόζει καὶ κέδρος, τά τ' ἀφειθια τῶν αἰγῶν ἐν οἴνῳ καθεψόμενα. ἀρήγει δὲ αὐτοῖς καὶ κατάπλασις δι' ὄξους θερμοῦ, καὶ καλαμίνθη ἑφωμένη δι' ὕδρου καὶ θαλάσσης ἢ ὁ ἅλμης. εἰσὶ δ' καὶ ἔμπλαστροι δριμύτατοι) δυνάμεναι τὸν ὀπὸν ἀφαιρεῖν καὶ διακρατεῖν καὶ διαφορεῖν. ὡς δ' ἁλῶν ἢ νίτρου καὶ σινάπεως καὶ κάγχρυος ἀφεσφιρόμενα ὧδε

tunc enim maximè ſerpétium iniurias expaueſcunt, tum propter ſpicilegij tépus, tum quòd opacis ſimul abditæ ſpeluncis & cauernis, denſoq; aruorum ceſpite deliteſcunt. Moleſtiſsima enim animalia & virus eructantia, Ægyptus in cápis ferre cóſueuit. Vbi ergo aut in pedem, aut parté aliam, morſum intulerunt, qui adſunt, faſciam in ollam picis coniiciũt, & ſemel aut iterum brachium aut crus paulum ſupra vulnus obligant, et arctiſsimè duo è præſentibus diſtringũt, locúmque ſecantes qua circũactus eſt laqueus, picem inſtillant. Cúmq; ſatis vulnus excepiſſe videtur, laqueum reſoluũt, & cæpis aliisq; ſuprà memoratis illiniũt. Præterea pix liquida cum ſale trito & feruéte illita ſpóngeo eſt auxilio, ſi iugiter inouetur. Cóuenit & cedria, & fimũ caprarum ex vino decoctũ. Locum aceto calido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri ſalutare eſt. Quinetiá nó deſunt empla ſtra vehemétiſsima, & calidiſsima, q̃ venenũ elicere, expugnare, & diſcutere poſsunt. Cuiuſmodi ſunt q̃ ex ſale, aut nitro, ſinapi, & cachrye cõponũtur:

de quibus cõsequẽter erit tractandũ. Erasistratus autem nõ iniusta reprehẽsione eos incessit, q incognitas ad hunc vsum facultates cõscripserũt, vt elaphãti fel, crocodili ve sanguinẽ ouaq;, testudinis, & consimilia. Nam cũ iuuantia quędã literis tradidisse vidẽtur, planè in hęc sola incidẽtibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cũ difficilè, nisi regia facultate, pueſtigari possint: neq;, quòd nostra fides iis obstringatur, frequẽti obseruatione, sufficiens experimentũ præstiterint. Quę autẽ ad cõmunẽ omniũ vsum pertinẽt, quæq; facile suppeditari, & omnibus à serpẽte percussis auxiliũ ferre queũt, subiungẽdi vidẽtur. Intubus itaq;, & erica, & astragalus, cũ aceto pota, cõtra omnes serpentium morsus auxiliãtur. Itẽ bitumẽ, & virentes platani pilulę in vino diluto coctæ, & paliuri decoctum: radix aristolochiæ, & eryngij: decoctę etiã lauri bacæ & denoratæ, piper largius esitatũ, ruta, anethũ, & cyclamin°: coma porrorũ priuatim ex pane, aut alliũ, aut cepæ, salsamẽtáq; quamacerrima: origani decoctum cum vino potũ, fœniculi, pulegij, calaminthæ, porrorũq;

ὥσπερ ἐξῆς ῥητέον. οὐκ ἀλόγως δὲ ὁ Ἐρασίστρατος ὑπεμέμφετο τοῖς ἀγνώστους δυνάμεις πρὸς τὴν χρείαν ἀναγκαιοφόρους, ὡς χολὴν ἐλέφαντος καὶ αἷμα χελώνης καὶ ὠὰ καὶ τὰ παραπλήσια. δοκοῦσι μὲν γάρ τινα πεποιῆσθαι παράδοσιν ὠφελούντων ἐξεπατήκασι δὲ αὐτοὶ μόνα τοὺς ἐντυγχάνοντας. ὅθεν τὰ μὲν τοιαῦτα παρωτητέον μή τε ῥᾳδίως εὑρεθῶσι δυνάμεια εἰ μὴ ὑπ' ἐξουσίας βασιλικῆς· μήτε διὰ τῆς ἀλόγου πεῖρας οἷαι εἰς τὸ πιστευθῆναι τὴν θεραπείαν παρεγγυῶσι. τὰ δὲ κοινωφελῆ, καὶ εὐπόριστα, ὡς δεικτέον, τὰ καὶ εἰς πάντα ἐν πᾶσι τοῖς θηριοδήκτοις δυνάμενα τὴν χρῆσιν παρέχεσθαι τοίνυν καὶ ἐρείκη καὶ ἀστράγαλος πινόμενα μετ' ὄξους, πᾶσι τοῖς θηριοδήκτοις βοηθεῖ. ὠσαύτως καὶ ἄσφαλτος καὶ πλατάνου χλωρᾷ σφαῖρα καθυφιεμένη ἐν κράματι. καὶ παλίουρου ἀφέψημα· καὶ ῥίζα ἀριστολοχίας καὶ ἠρύγκιον· καὶ δαφνίδες ἐφθαὶ κατεσθόμεναι καὶ πόα ἣν δαψιλέστερον βοῶ γόμφιον καὶ πήγανον καὶ ἄνηθον καὶ κυκλάμινον· θερίσαν τε ἡ κόμη ἰδία σὺν ἄρτῳ ἢ σκόρδα, ἢ κρόμμυα, καὶ τάριχος δριμύτατος· καὶ ὀρίγανου ἀφέψημα συὸς οἴνῳ πινόμενον. καὶ μαράθρου καὶ γλήχωνος καὶ καλαμίνθης,

καὶ πράσων χυλὸς σὺν μέλιτι καταρροφούμενος, ταῦτα μὲν ἐκ τῶν φυομένων. ἀπὸ ζώων δὲ λαμβάνεταί τινα ὠφελίμως, ἐγκέφαλοι μὲν ἀλεκτρυόνων ἐσθιόμενοι, πιτύα δὲ λαγωοῦ σὺν οἴνῳ πινομένη καὶ καστορίου οὐγγίαι β΄. τοῦ αὐτοῦ βάρους· λέγεται δὲ καὶ ὅτι χελώνης θαλασσίας οἱ ὄρχεις λαμβανόμενοι βοηθοῦσιν. ἔστι δὲ καὶ ἡ γαλῆ ἡ σκελετευθεῖσα τῶν βεβοηθημένων, εὑρίσκεται δὲ προτέρα ἡ πάντη χωρισθεῖσα τῶν ἐντὸς ἐκκριθέντων, σκελετεύεται δὲ ξηραινόμενον, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ δίδραχμον σὺν οἴνῳ πινόμενον. τοσαῦτα δὴ καὶ τὰ ἁπλᾶ τῶν προσφερομένων. ἁρμόζει δὲ τοῖς θηριοδήκτοις καὶ κάθαρσις διὰ κοιλίας, καὶ ἱδρωτοποιΐα, καὶ οὔρων πολλῶν ἔκκρισις. σκευαστὰ δὲ πόματα παραδίδοται καινοτέρως ὑπισχνούμενα βοηθεῖν, ὡς ὀπίου καὶ σμύρνης ἀνὰ ὀβολὸν, καὶ πεπέρεως < β΄. ταῦτα δὲ δεῖ μέλιτι ἀναλαμβάνειν, καὶ διδόναι κυάμου μέγεθος, αἰγυπτίου μετ᾽ οἴνου. ὁμοίως πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, μελανθίου, κυμίνου αἰθιοπικοῦ, χαλβάνης, ἀριστολοχίας, ταῦτα πάντα λεανθέντα καὶ φυραθέντα χυλῷ εὐζώμου, ἀναπλάσσονται βωλίσκοι δραχμιαῖοι· διδόναι δὲ ἐξ αὐτῶν μετ᾽ οἴνου ἡμικοτυλιαίου. ταῦτα μὲν περὶ τῶν κοινῶν βοηθούντων. τὰ δὲ ἴδια πρὸς ἕκαστον τῶν ἰοβόλων ἑξῆς εἴπωμεν.

Περὶ

porrorúq; ſuccus cũ melle deſorptus. Hæc quidẽ à plãtis cõquirũtur. Ab animãtibus verò quædã vtiliter peti ſolẽt, gallinaceorũ cerebella in cibo, leporinũ coagulũ cũ vino, itidẽ caſtorij ſextãs: teſtes marinę teſtudinis ſumpti multũ ꝓdeſſe tradũtur: muſtela ſale ĩueterata ĩter auxiliaria medicamẽta eſt. Cõmendat̃ in primis exenterata, q̃ ſale ſiccefcẽs inueteratur, ex qua binas drachmas cũ vino bibiſſe ſatis eſt. Sed de ſimplicibus quæ dari ſolẽt hactenus. Percuſsis à ſerpẽte prodeſt alui deiectio, diffluens ſudor, vrina copioſe reddita. Sũt & cõpoſitæ quædã potiones, q̃ mira remedia polliceri tradũtur, vt & opij & myrrhę ſinguli oboli, piperis ſicilicum: ea melle excipiũtur, & ĩſtar Ægyptiæ fabæ dãtur cũ vino. Itidẽ ſylueſtris rutę ſeminis, gith, cumini Æthiopici, ariſtolochiæ, galbani, ſingulorũ pares portiones tritæ, et cũ erucę ſucco ſubactæ, digerunt̃ in paſtillos, qui drachmæ põd⁹ æquẽt: dant̃ ex iis terni cyathi cũ vino. Hęc habui de cõib⁹ auxiliis q̃ dicerẽ. De peculiarib⁹ remediis contra beſtias quæ venena vibrãt, conſequenter eſt dicendum.

 Cura-

Curatio ab apibus & veſpis morſorum. Cap. II.

INTER ferientium venenatorum notas nihil de veſpis & apibus articulatim digeſsimus, quòd conſpicuæ omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his obſeruaretur: inter remedia tamen, earũ meminiſſe non fuit alienum. Igitur aduerſus vtrarunque ictus prodeſt illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in vulnus inſtillatum, à muria, aut maris aqua fotus.

Curatio à phalangiis morſorum. Cap. III.

Phalangiorum ictibus ficulneum cinerem, adiecto ſale trito & vino, imponere oportet, aut radicem ſylueſtris punicæ quamtenuiſsimè tritam, aut ariſtolochiam cum hordei farina & aceto ſubactam. Vlcera aqua maris proluéda, aut apiaſtri decocto, foliáque eiuſdem illinenda. Lauacris perpetim vtendum, & propinandum abrotoni ſemen, aniſum, ariſtolochiam, cicer ſylueſtre, cuminum Æthiopicum, cedrides tritas, platani corticem, &

Περὶ θεραπείας τῶν ὑπὸ σφηκῶν καὶ μελισσῶν δεδηγμένων. Κεφ. β'.

Ἐν τῇ σημειώσει περὶ σφηκῶν καὶ μελισσῶν οὐδὲν διηπόρησαμεν, εὔδηλα γὰρ πᾶσιν ἦν καὶ παράσημον ἔχει ἐξαίρετον οὐδ' ἐποιοῦμεν φυλακτόμενον· ἐν δὲ τῇ θεραπείᾳ, καὶ τούτων οὐκ ἄτοπον μνημονεῦσαι. πρὸς οὖν τὰς πληγὰς τῶν σφηκῶν καὶ μελισσῶν, ἁρμόζει μαλάχη καταπλασσομένη, καὶ κρίθινον ἄλευρον σὺν ὄξει, καὶ συκῆς ὀπὸς ἐπαλειφόμενος τοῖς δήγμασι, καὶ πυρία δι' ἅλμης ἢ θαλάσσης.

Περὶ τῶν ὑπὸ φαλαγγίων δεδηγμένων. Κεφ. γ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ φαλαγγίων δεδηγμένοις, τοῦτο ἐπιτηδεύειν δεῖ, τέφραν συκίνην σὺν ἁλὶ καὶ λέπεσι μετ' οἴνου πεφυραμένην, ἢ ῥίζαν ἀγρίας ῥόας λειοτριβημένην, ἢ ἀριστολοχίαν σὺν κριθίνῳ ἀλεύρῳ καὶ ὄξει δεδευμένην. καταπλάσσειν δὲ θαλάσσαν τὰ ἕλκη, ἢ μελισσοφύλλῳ ἀφεψήματι, τούτῳ δὲ τὰ φύλλα ἐπιπλάσσειν. λουτρῷ δὲ λίαν συνεχέστερον, καὶ ποτισμοῖς χρηστέον διὰ τούτων τὸ σπέρμα, ἄνισον, ἀριστολοχία. ἐρέβινθος ἄγριος, κύμινον αἰθιοπικὸν, κεδρίδες λεῖαι, πλατάνου φλοιὸς, καὶ

καὶ τὸ σπέρμα τῆς περιφύλλου πόας τέτταρα δὲ ἑκάστου δίδοται καθ' ἰδίαν < β' μετ' οἴνου* κοτύλης ἑ. δίδοται δὲ καὶ μυρίκης ὁ καρπὸς ὡσαύτως καὶ χαμαιπίτυος, καὶ τῶν χλωρῶν τῆς κυπαρίσσου σφαιρίων τὸ ἀφέψημα κεγάμενον μετ' οἴνου. φασὶ δέ τινες καὶ καρκίνου ποτάμιον χυλισθέντα μετὰ γάλακτος, καὶ θερμαλοῦντα συλλαμβάνειν σπέρμα* τῶν ὀχλικῶν ἀπαλλάττειν.

Περὶ τῶν ὑπὸ σκολοπένδρας δεδηγμένων.
Κεφ. δ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ σκολοπένδρας δεδηγμένοις, κατὰ μὲν τὸ πλῆγμα ἐπιθέσθαι δεῖ λειοτριβόμενον μετ' ὄξους ἅλας, ἢ πήγανον* ἄγριον. καταντλεῖν δὲ ἁλμυρὸν τὸν τόπον, πότιμα δὲ θερμὰ διδόναι ἀριστολοχίαν μετ' οἴνου, ἢ ἕρπυλλον ἢ καλαμίνθην, ἢ ἄγριον πήγανον.

Περὶ τῶν ὑπὸ σκορπίου δεδηγμένων.
Κεφ. ε'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ σκορπίου πληγεῖσι παραχρῆμα μὲν ἀκριβῶς βοηθεῖ συκῆς ὀπὸς εἰς τὸ τραῦμα τὸ ἐναχθείς. αὐτός τε ὁ πλήξας σκορπίος λειοτριβηθεὶς καὶ ἐπιτεθεὶς τῷ πληχθέντι τόπῳ, τῆς ἰδίας πληγῆς γίνεται βοηθὸς κατά πως ἀντιπάθειαν ὡς ἔοικε.

& trifoliæ herbæ semen: priuatim autem, singulorum ex iis binas drachmas dare cum vini hemina conuenit. Item myricæ fructus, & chamæpityos, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt qui fluuiatilis cácri expressi succum, cum lacte, assumpto apij semine, cófestim molestiis liberare prodant.

A scolopendra morsi.
Cap. IIII.

Si schopendra morsum infixit, sal quám leuissimè tritus ex aceto vulneri inspargédus, aut ruta sylueſtris superponenda. Locus acida muria fouendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpillum, aut calamintha, aut ruta sylueſtris.

A scorpione percussi.
Cap. V.

Percussis à scorpione, præsenti est auxilio ficulneũ lac in vulnus instillatũ. Scorpius ipse qui ictũ vibrauit, tritus & percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob cæcam quandam naturarum (vt constat) discordiã, quæ antipathia appellatur.

appellatur. Præterea tritus & impositus cum sale, lini semine, & althæa, scorpius conuenit. Sulphur ignem non expertũ, resina terebinthina exceptũ, & emplastri modo adiectum auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ tritum, & vulneri iniectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus vtendum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum vino, tusa gentiana, & pulegium decoctum, & baccæ lauri pauco numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum vino & ruta, nec secus ficulneum lac, laserpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani succo vtendum. Efficax est potus trifolij, & ocymi semen. Horum autem omnium vicem pensat iugis lauacri vsus, euocatus sudor, & dilutæ vini potiones.

ἔοικε. μετὰ δὲ τοῦτο ἁρμόζει λεῖος ἐπιπλέμβμος ὁ σκορπίος σὺν ἅλατι καὶ λινοσπέρμῳ καὶ τῇ ἀλθαίᾳ βοτάνῃ. βοηθεῖ δὲ καὶ θεῖον ἄπυρον ἀναλιφθὲν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ καὶ ὡς ἔμπλαστρον ἐπιῤῥιφέν. ὁμοίως δὲ καὶ χαλβάνη πλατυνθεῖσα σπληνίου τύπῳ, καὶ καλαμίνθη λεία καταπλασσομένη, καὶ ἁλμύνσις ἐν οἴνῳ σκευασθεῖσα, ἐν ἀφεψήματι πηγάνου. βοηθεῖ δὲ τὸ σπέρμα τῆς τειφύλλου πόας λεαινόμενον καὶ ὀπῤῥιπτούμενον. τοπικὰ μὲν οὖν ταῦτα. μετὰ δὲ τούτων καὶ ποτήμασι χρηστέον ὡς αὐστηροτάτοις, ἔστι δὲ ἀριστολοχίας δίδραχμον μάλιστα τῷ φλοιοῦ σὺν οἴνῳ, γεντιανὴ κεκομμένη, καὶ γλήχων ὀπτηθεὶς μύρῳ, καὶ δαφνίδες ἀριθμῷ βραχεῖ λειοτριβούμεναι, καὶ καλαμίνθη μετὰ ὀξυκράτου· δεῖ δὲ αὐτὴν ὀπτηλὺ ἑψῆσαι ἐν τῷ ὀξυκράτῳ· καὶ κυπάρισσος μετ' οἴνου ἢ πηγάνου, ὡσαύτως καὶ συκῆς ὀπὸς, καὶ σίλφιον εἰ παρείη· μὴ παρόντος δὲ, τῷ πευκεδάνου χρηστέον ὀπῷ. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ τῆς τειφύλλου καρπὸς σπόμβμος, τὸ καὶ τοῦ ὠκίμου σπέρμα. τούτοις * δὲ πᾶσιν αὐτιπαρατίθεται λουτρὸν συνεχῶς χρῆσις μετὰ πολλῆς ἱδρώσεως, καὶ οἰνοποσία μετὰ κράματος.

A pasti-

Περὶ τῶν

Περὶ τ ὑπὸ πυγόνος θαλασσίας δηχθέντων.

Κεφ. ε'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ πυγόνος θαλασσίας πληγεῖσιν, ἁρμόζει πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσον μικρὸν ὕστερον ὑπὸ τῶν ἐχιοδήκτων ἐρεῦμαι. * ἁρμόζει δὲ πρὸς τὰς πληγὰς αὐτῶν ποτισμὸς ἀψινθίου, ἢ ἐλελισφάκου, ἢ θείου σὺν ὄξει τετριμμένου. καὶ αὐτὴ δὲ ἀναπυηθεῖσα καὶ ἐπιπλασθεῖσα τοῖς τραύμασι, τῆς ἰδίας ἰάσατο πληγῆς.

A paſtinaca marina morſi.

Cap. VI.

Ei qui marina paſtinaca icitur, omnia quæ de viperarum morſu paulò poſt referem, ſimili modo conueniunt. Peculiariter aũt ictus à marino ſcorpione, & dracone inferuntur, qui moleſtos cruciatus ciẽt: interdum auté, ſed rarò, nomas excitant. Quibus abſinthij, ſaluiæ, aut ſulfuris ex aceto triti potio ſubuenit. Paſtinaca diuulſa & vulneri impoſita, ſui ictus medela eſt.

Περὶ τῶν ὑπὸ μυγαλῆς δηχθέντων.

Κεφ. ζ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ μυγαλῆς δηχθεῖσι, βοηθεῖ χαλβάνη σπληνίον ἐπιτεθὲν καὶ τὸ δήγματος ὡς φάρμακον μετ' ὄξους λιστεηνημένον, καὶ κρίθινον ἄλευρον μετ' ὀξυμέλιτος ἐπιπλασθέν. καὶ ἡ αὐτὴ δὲ ἡ δακοῦσα μυγαλὴ, ἀναπυουσομένη καὶ ἐπιπεθεμένη, τῆς ἰδίας πληγῆς αὐτοφαρμακόν ἐστι· καὶ γλυκείας ῥοιᾶς ἑφθὰ καταπλασθέντα κοκκία· καὶ πρασία ἑφθὰ καταπλασθέντα καὶ σκόρδα σωτηριμένα, καὶ ἡ διὰ τῆς θέρμης καταπλασις· τοπικὰ μὲν ταῦτα, ποτιζόμενον δὲ ἀρήγει ἀλεκτόρειον καὶ ἀψινθίου. εἶτα δ' οἶνου πρόσφορόν, ἕρπυλλος δὲ καὶ χαλβάνη καὶ εὔζωμον διεφθαρμένα οἴνῳ, καὶ κα-

A mure araneo morſi.

Cap. VII.

Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano ſpleniũ, per ſe vulneri exterius impoſitum, vt medicaméti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulſo illita. Quinetiá mus ipſe qui morſum intulit, ſi diſſectus apponatur, ictus ſui veneficia luit: reſiſtũt quoque acini dulcis punici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita, necnon aquæ calidæ fotus: ſed hæc ad locum pertinent. Prodeſt potum abrotoni decoctum, maximè ſi in vino detur. Præterea ſerpillũ, & galbanum, & eruca vino madefacta, recẽtes

cta recentes cupresi pilulę cũ aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrũ cũ vino, & & chamæleonis herbæ radix. Nec desunt qui literarũ monumentis tradiderunt, tritũ murẽ araneum contra suos ictus cõmodè bibi. Quã historiã apud alios inuẽtam, dignam duntaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij asseuerant demorsum non aliâs exulcerari, nisi prægnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt.

Percusi à vipera.
Cap. VIII.

Si vepera morsum impressit, fimum caprinũ cum vino, studiosè impositũ opitulatur. Item laurus, & abrotonum, & galbanum splenij loco superiectum, & origanũ viride inditũ. Pulli gallinarũ discerpti, & confestim admoti: erui farina vino subacta: radicis cortex vsque eo tusus, vt in puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritũ chamæmeli hordeaceæ farinæ cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus antè eo calido foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus rubus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt.

καὶ κυπαρίσσου τὰ ἁπαλὰ σφαιρία μεθ' ὄξους, καὶ κυκλάμινον μεθ' ὀξυμέλιτος, καὶ πύρεθρον σὺν οἴνῳ, καὶ χαμαιλέοντος τῆς βοτάνης ἢ ῥίζα. τινὲς δὲ ἀναγράφουσιν ὅτι καὶ αὐτὴ λιποτειχισθεῖσα ὑπὸ μυγαλῆς, πρὸς τὸ ἴδιον πλῆγμα ποτίζεται. τὴν δὲ ἰσχυρίαν ταύτην οἱ ἄλλοις κειμένην σύροντες, παρασημειώσεως μόνον ἠξιώσαμεν. ἔνιοι δέ φασι μὴ ἄλλως ἑλκοῦσθαι τὸν δηχθέντα, εἰ μὴ ἐντὸς ὑπὸ μυγαλῆς τυγχάνει· τό τε οὖν φασὶ βοηθεῖν.

Περὶ τῶν ὑπὸ ἐχίδνης δεδηγμένων. Κεφ. η'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ ἐχίδνης δηχθεῖσι βοηθοῦσι τὰ αὐτῶν αἰ πύραθοι μεθ' οἴνου αὐστηροῦ πεπυδιώσαι. καὶ δάφνη ὡσαύτως καὶ ἀβρότονον καὶ χαλβάνη ἀντὶ σπληνίου ἐπιπρίσμενα, καὶ δείγανος χλωρὰ ἀνεθεῖσα. καὶ τῶν ἀγρίδων οἱ νεοσσοὶ ἀναπεπυχθέντες καὶ παραχρῆμα ἐπιτεθέμενοι· ὀρύζινον δὲ ἄλευρον μεθ' οἴνου πεφυραμένον· καὶ ῥαφανὶς φλοιὸς ἰσχυρῶς κοπεὶς, ὥς τε λειότατον γλυφθῆναι, καὶ σίλλα ὀπτὴ καὶ χαμαίμηλον λελειωμένα, καὶ ὄμμυλύσις δ' ὀξυμέλιτος ἐσκευασμένη· πρὸς καταπλασμένου θερμοῦ. ταῦτα μὲν τοπικῶς ἐπιτιθέμενα. ὠφελεῖ δὲ τὸν ἐχιδνήκτους καὶ βάτος μετ' οἴνου. ἔνιοι δὲ ἄγχουσαν τὴν λεπτόφυλλον βοηθεῖν

ὠφε-

ἀφηγοῦνται. πίνεται δὲ καὶ λαγωοῦ τῆς πιτύας ὅσον τριώβολον καὶ πρασίου χύλισμα ὅσον κοτύλιον ἀκράτῳ, καὶ μελισσοφύλλου τῶν φύλλων ὁ χυλὸς, καὶ πήγανον ἄγριον. ταῦτα δὲ ἐν οἴνῳ δεῖ ποτίζειν. καὶ αὐτὴ ἡ οἰνοποσία συνεχῶς παραλαμβανομένη, σκόροδά τε ἐσθιόμενα καὶ κρόμμυα, καὶ πράσα ἁπαλὰ καὶ τάριχος δριμύτατος καὶ πολυτελέστατος. καὶ τὰ μὲν ἁπλᾶ ταῦτα. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ φάρμακον εὐδοκιμοῦν ἐπὶ τῶν * ὀφιοδήκτων, ὅπερ ἐστὶ σμύρνης, καστορίου, πεπέρεως, ἀνδράχνης ἄνθους καὶ σπέρματος ὀξυβάφου τὸ ἥμισυ· ταῦτα πάντα λέαινε ἐν γλυκεῖ κρητικῷ, ἢ ἑτέρῳ τινὶ τῶν σπουδαίων. Ἐρασίστρατος δὲ ἐν τῷ περὶ δυνάμεων ἀνεγράψατο καὶ ἄλλα τινὰ πλείονα βοηθεῖν δυνάμενα τοῖς ἐχιοδήκτοις.

Περὶ τῶν ὑπ' ἀμφισβαίνης δεδηγμένων.

Κεφ. θ'.

Περὶ ἀμφισβαίνης τοπικῶς ἐπεμνήσθημεν ὅτι πως ταῖς πρὸς τὰς ἐχίδνας ἀναγεγραμμέναις βοηθείαις, πέφυκε βοηθεῖσθαι ὁ ἐξ αὐτῆς πληγείς.

Περὶ τῶν ὑπὸ δρυΐνου δεδηγμένων.

Κεφ. ι'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ δρυΐνου πληγεῖσιν, ἁρμόζει ἀριστολοχία σὺν οἴνῳ πινομένη,

dunt. Leporini coaguli in vino terni oboli bibuntur, & porracei ſucci hemina in mero, & foliorum apiaſtri ſuccus, & ſylueſtris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum frequēter bibendum, alia mandenda, & cepæ, & porri recentes, ſalſamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc ſunt. Percuſsis à vipera pręclarè auxiliatur medicamentum, quod myrrhæ, piperis, caſtorij, floris portulacæ seminiſque, dimidio acetabulo conſtat: hæc omnia in Cretico paſſo teruntur, aut in alio probato. Eraſiſtratus in eo libro qui περὶ δυνάμεων, id eſt de viribus, inſcribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis ab vipera auxilium ferre poſſunt.

Ab amphiſbæna icti.

Cap. IX.

De amphiſbæna mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remediijs ad viperas ſcriptis, percuſsi ab ea adiuuari ſoleant.

Percuſsi à dryino.

Cap. X.

A dryino ictis conuenit ariſtolochia cum vino pota, trifolium

folium herba, radix haſtulæ regiæ ſimiliter aſſumpta, & fructus ex omni quercus genere, & tuſæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

Ab hæmorrhoo dipſadéque percuſsi. Cap. XI.

Hæmorrhoi dipſadíſq; morſus velut immedicabiles à pleriſque maiorum deplorati relinquebátur: quare ſi peculiaribus contra dipſadem remediis egeamus, communia experiri operæpretium erit. Protinus autem ſcarificatione vti, vſtionem facere, & ſi locus patiatur, extremorum amputatione opus erit: conſequenter quamacerrima cataplaſmata admouere, de quibus ſæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à ſalſamentis, vtiles eſſe. Meracæ potiones & lauacra proſunt, quæ ſubinde interiecto breui ſpatio aſſumēda ſunt, priuſquā morbi genus emerſerit, quo ſemel erumpente, opem ferre nō poteſt vlla medici opera. In ictu hæmorrhoi eadē proſunt. Inſuper quę in cómune opitulantur, ne ſcarificationes, vſtiones, acres cibi, meraci potus, & quæ

νομένη, ἢ πεύφυλλος πόα, ῥίζα τ ἀσφοδέλου παραπλησίως λαμβανομένη, ἢ δρυὸς πάσης ὁ καρπὸς πνόμυλος ἢ τῆς ῥιτίνου αἱ ῥίζαι κοπτόμεναι καὶ καταπλασσόμεναι, τοπικῶς παρηγοροῦσιν.

Περὶ τ ὑφ' αἱμόῤῥου ἢ δι-ψάδος δηχθέντων. Κεφ. ιά.

Αἱμόῤῥου δὲ καὶ δι-ψάδος τοῖς πλείστοις τ θεραπευομένων ἀπηγορεύθησ, ὡς ἀζωόθητοι αἱ δήξεις· διὸ ἢ τ κατ' ἰδιότητα θεὸς τὸ θεῖον τὴν δι-ψάδα ὠφελούντων ἀπορῶν, δεῖ μ ἢν ἀποπειρᾶσθ τ κοινῶν βοηθημάτων. παρέχεται ὑ τὸν καταχασμὸν παραλαμβάνειν, πίνειν τε καῦσον πιεῖν καὶ εἰ ὁ τόπος ἐγχωροίη τὸν ἀκρωτηριασμόν· ἐφεξῆς δὲ τοὺς τ ῥιμμένων καταπλασμάτων ὑποθέσεις, ὧν ὑ ὧν εἰρήκαμεν πολλάκις. χρησιμεύει οἶδα ἢ ῥιμνοφαγίας μάλιστα τὰς ἀπὸ τῶν ταριχηρῶν. ἀκρατοποσία τε ἢ λουτρὸν ὠφελεῖ, ταῦτα συνεχῶς ἐκ μικρῶν διαστημάτων, πλεονάκις καταληπτέον, πρὶν καταστῆναι τὸ τ νοσημάτων εἶδος, ἐκείνων ὑ ἅπαξ ἐπιφανέντων, ὃ δ' ὁπουοῦν παρὰ τ τῶν ἰατρῶν ἐπικειμένων ὀφθὸς γίνετ). ἐπὶ ὑ τῶν αἱμόῤῥυτα καὶ αὐτά. ἢ θεὸς τύποις τὰ ἐν τῷ κοινῷ τ βοηθημάτων· οἷον τὸν καταπασμοὶς ἢ ταῖς καύσεις ἢ ῥιμνοφαγίας ἢ ἀκρατοποσίας. ἢ ὅσα

καὶ ὅσα ἀείζωμον ἐπὶ δηλήσεως. ἔτι δὲ καὶ ἀμπέλου φύλλα ἰφθὰ σὺν μέλιτι λελειωμένα.

Περὶ τῶν ὑφ' ὕδρου δηχθέντων. Κεφ. ιϛ'.

Τοῖς ὑφ' ὕδρου δηχθεῖσιν ἁρμόζει ὀρίγανος λεία φυραθεῖσα ὕδατι, κονία τε ἐνεθεῖσα ἐλαίῳ ἢ ἀριστολοχίας ὁ φλοιὸς, ἢ ῥίζα δρυὸς λειοτριβηθεῖσα καὶ κρίθινον ἄλευρον σὺν ὕδατι μετὰ μέλιτος συντεθηκός. ποτίζεται δὲ καὶ ἀριστολοχίας δίδραχμον ἐν χρίσματι ὀξυκράτου κυάθων ἕξ. ἢ θερμοῦ χυλὸς, ἢ ἀφέψημα ὁποτέρου σὺν οἴνῳ. θερμαντέον τε κηρίον θερμοφορούμενον μετ' ὄξους.

Περὶ τῶν ὑπὸ κεγχρίδος δηχθέντων. Κεφ. ιγ'.

Τοῖς δ' ὑπὸ κεγχρίδος δηχθεῖσι, θριδακίνης ὁ καρπὸς μετὰ λιγυσπέρμου καταπλασσόμενος ἐσθιῆ καὶ ὑσσώπου, καὶ ἄγνου πήγανον, καὶ ἕρπυλλος σὺν ἀσφοδέλου * < β'. καὶ σὺν οἴνου κυάθοις γ' ἢ ἀριστολοχίας ῥίζα. ὡσαύτως καὶ καρδάμωμον, καὶ γεντιανὴ παραπλησίως.

Περὶ τῶν ὑπὸ κεράστου δηχθέντων. Κεφ. ιδ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ κεράστου δηχθεῖσι καὶ ἀπόδος, σωτόμως ὁ ἀκροτηριασμὸς ἅπας μιᾷ· διόδῳ ἀνυσθέντος ἀποκόπτειν δεῖ, ὅσον τὸ δηχθὲν

& quæ nunc in dipsade definiuimus. Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle trita.

Morsi à natrice.

Cap. XII.

Si morsum natrix adegit, prodest origanum tritum & aqua subactum, lixiuia cũ oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquata. Bibuntur etiã binæ aristolochiæ drachmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, vel decoctum alterius cũ vino. Fauus recens datur cum aceto.

A cenchridio percussi.

Cap. XIII.

Morsis à cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satureia trita, & sylueſtris ruta, & serpillum cum duabus hastulę regiæ drachmis, & tribus vini cyathis aut aristolochiæ radix, Item cardamomum & gentiana.

A ceraste percussi.

Cap. XIIII.

Si ceraſtes percusserit, cita partis amputatio suffragatur: quare sine mora ictã partẽ amputare, aut scalpro cõfestim circũcidere

cuncidere, & iis similia prosequi oportet. Vrentia insuper reliquiis admouenda: siquidem virus hoc veneno basilisci simile est.

Morsi ab aspide. Cap. XV

Iis qui ab aspide feriuntur, quæ de ceraste scripta sunt auxilia dari debent. Nam venenum hoc, quemadmodum basilisci, aut sanguinis bubulus, celerrimè in arteriis sanguinem cogit.

A basilisco morsi. Cap. XVI.

Ad basilisci morsum, vt Erasistratus author est, auxiliatur castorij drachma in vino pota: item papaueris succus. Ictuum remedia ita se habent.

δηχθῆ μέρος, ἢ ἀδιαφορίζειν τὰ μέρη παρεχρῆμα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια. εἶτα δὲ τὰ ὑσσωπίτμωμα τοῖς χωσικοῖς ἐπακτέον· καὶ γὰρ καὶ τούτοις ὁ ἴδιος οἶος ὁ τοῦ βασιλίσκου.

Περὶ τῶν ὑπ' ἀσπίδος δηχθέντων. Κεφ. ιέ.

Τοῖς δ' ὑπὸ ἀσπίδος δηχθεῖσιν, ὅσα καὶ τοῖς ὑπὸ κεράστου ὡς παραληπτέα προσεκτέον βοηθήματα. ὃν τρόπον γὰρ βοὸς αἷμα ὀξύτατα πήγνυσι τὸ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις αἷμα καὶ πήγνυται παρὰ τούτων ὁ ἴδιος, ὥσπερ καὶ ὁ τοῦ βασιλίσκου.

Περὶ τῶν ὑπὸ βασιλίσκου δηχθέντων. Κεφ. ις'.

Τοῖς δ' ὑπὸ βασιλίσκου δηχθεῖσιν, ὡς Ἐρασίστρατος φησὶ βοηθεῖ καστορίου < ά. πινομένη σὺν οἴνῳ· ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ τοῦ μήκωνος ὀπός· τοιοῦτος μὲν καὶ ὁ θηριακὸς τρόπος.

LIBRI OCTAVI FINIS.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ.

INTER DIOSCORIDIS VERBA hæc falso adscripta in quibusdam codicibus erant.

Folio 4.a. Versu 2. μετὰ τὸ, Ιεις.

οἱ δὲ ἶρις ἰλλυρικὴ, οἱ δὲ θελπίδη, οἱ δ' οὐρανία, οἱ δ' καθαίρων, οἱ δ' θαύμαστος, ῥωμαῖοι ῥάδιξ μάεικα, οἱ δὲ γλαδίολα, οἱ δὲ ὀφρεῖτος, οἱ δὲ κογσακράτειξ, αἰγύπτιοι ναρ.

4.b. 28. Ακορον,

οἱ δ' χόρος ἀφροδισίας, ῥωμαῖοι βενέρεα, οἱ δὲ ναυτικὴ ῥάδιξ, γάλλοι πιπερᾶκιεμ.

6.b. 6. καλοῦσι,

ῥωμαῖοι ἰουίκι ραδίκεμ, οἱ δὲ ἰουίκουμ.

8.a. 11. καλοῦσι,

θεσσαλοὶ αἷμα ἄρεως, ὀδαῦκης θύσαν, αἰγύπτιοι κερέβρα, ῥωμαῖοι περπέτσαμ, οἱ δὲ βάκχαρ, θοῦσκοι σύκκινουμ, οἱ δὲ, νάρδον ρούστικουμ, γάλλοι βάκκαρ.

8.a. 18. ῥίζαι.

ἐοικυῖαι τῇ ὀσμῇ κιννα μώμῳ· φιλεῖ τραχέα χωρία καὶ ἄνικμα. ταύτης ἡ ῥίζα, βοηθεῖ ῥήγμασι, ασάσμασι, ἴκτῳ χρονίῳ, δυσπνοίᾳ, δυσουρίᾳ· ἄγει καὶ ἔμμηνα. καὶ θηριοδήκτοις χρήσιμος σὺν οἴνῳ πινομένη. Τὰ δὲ φύλλα

post verbum, Iris,

ab aliquibus iris Illirica, ab aliis thelpide, ab aliis vrania, à nónullis cathæró, aut thaumastos, à Romanis marica radix, à quibusdam gladiola, ab aliis opertritos, ab aliis consecratrix, ab Ægyptiis nar appellatur.

Acorum.

aliqui choró aphrodisias, Romani venereã, aut radicé nauticã, Galli piperacium vocant.

appellant.

Romani iunci radicem, aut iuncum.

appellant.

Magi sanguinem Martis, Osthenes thesan, Ægyptij cerera, Latini perpensam, alij cacchar, thethrusci succinum, alij nardum rusticum, Galli baccar.

radices,

quibus odor inest cinnamomo proximus: asperú ficcúmque solum amat. Eius radix, ruptis, cõuulsis, in tusi vetere, & spirandi difficultate, & si vrina ægrè redditur, opifera est: menses ciet: contra serpentiũ ictus, eã in vino bibere salutare est.

Folia, vt quæ adſtringant, illita capitis doloribus, oculorum inflãmationibus, incipientibus ægylopiis, mammis tumẽtibus à partu, ignibus ſacris auxiliantur. Odor ſomnum gignit. Crateuas herbarius de eo ita ſcriptum reliquit. Aſarum,

Aſpalathus.

Alij ſphagnon, alij phaſganõ, Syri diaxylon,

Crocum,

ab aliquibus caſtor, ab aliis cynomorphos à magis ſanguis Herculis appellatur.

Helenium,

Symphyton aliqui vocant, alij perſicam, alij medicam, alij oreſtiũ, alij nectarion, alij cleoniam, alij Idęá baton, aut phlomum Idæã, Latini terminaliũ, aut enulam campanam, Ægyptij lenen.

minor.

Iuniperum paruam Græci arceuthida, aliqui mneſitheũ, alij acalidem, Aphri zuorinſipet, Ægyptij libium Romani iuniperum, Galli iupicellum vocant.

ſubueniunt.

Folia habẽt vtraq; iuniperus acria, ideóq; illita potaq; & ea, & earum ſuccus cum vino viperarum morſibus ſuccurrũt.

Cor-

φύλλα συπλικὰ ὄντα, καταπλασσόμενα, ὠφελεῖ κεφαλαλγίας, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, καὶ αἰγίλωπας ἀρχομένοις, καὶ μαστοὺς ἐκτόκων φλεγμαίνοντας, καὶ ἐρισιπέλατα. ἔστι δὲ καὶ ὑπνοποιὸς ἡ κόμη. καὶ Κρατεύας ὁ ῥιζοτομικὸς εἶπε τὸ αὐτό. Ασαρον.

14.b.9. ἀσπάλαθος,

οἱ δὲ σφάγνον, οἱ δὲ φάσγανον, σύριοι δὲ διάξυλον καλοῦσι.

16.a.16. Κρεκός,

οἱ δὲ κάστωρ, οἱ δὲ κυνόμορφος, περσῶν αἷμα Ἡρακλέους,

17.a.17. Ελένιον.

οἱ δὲ σύμφυτον, οἱ δὲ περσικὴν, οἱ δὲ μηδικὴν, οἱ δὲ ὀρέστειον, οἱ δὲ νεκτάριον, οἱ δὲ κλεωνίαν, οἱ δὲ βατὸν ἰδαίαν, οἱ δὲ φλόμον ἰδαῖον καλοῦσι, οἱ δὲ λίβυλα καμπάνα, αἰγύπτιοι λιβύης.

43.a.35. μεγάλη.

ἀρκευθὶς μικρὰ, οἱ δὲ ἀρκευθίδα, οἱ δὲ μνησίθεος, οἱ δὲ ἀκαταλίδα, ἀφρὶ ζουορινσίπετ, αἰγύπτιοι λιβιοῦμ, ῥωμαῖοι ἰουνιπέρουμ, γάλλοι ἰουπικέλλουσον.

43.b.15. ἀμύζει.

φύλλα δὲ ἔχει δριμέα. διὸ καὶ καταπλασσόμενα καὶ πινόμενα καὶ αὐτὰ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῶν μετ' οἴνου, ποιεῖ πρὸς ἐχιδήκεις.

ὁ δὲ

ὁ δὲ φλοιὸς καυθεὶς καὶ μετὰ ὕδατος καταχυσθεὶς, λέπρας ἀφίστησι. τὸ δὲ ξύσμα τῶ ξύλου καταπλᾶν, αὐαίνει.

Περὶ Ἀρκευθίδος μεγάλης. Κεφ.

ἀρκευθὶς μεγάλη, οἱ δὲ, κυπάρισσος ἀγρία, οἱ δὲ, μηκώνειος, οἱ δὲ ἀκαστέρα, ῥωμαῖοι ἰουνίπερον., ἔστι δὲ αὕτη γνώριμος τοῖς πλείστοις, ἐμφερὴς κυπαρίσσῳ, γινομένη ἐν τραχέσι δὲ παρὰ θαλασσίοις τόποις ὡς ὀπτοπλεῖστον. δύναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῇ προειρημένῃ.

43.b.17. Βαρέθρον.

οἱ δὲ βάρυτον, οἱ δὲ βάρυν, ῥωμαῖοι ἔρβα σαλίνα.

48.a.4. Ράμνος,

οἱ δὲ περσεφόνιον, οἱ δὲ λευκάκανθα, ῥωμαῖοι σπίνα ἄλβα, οἱ δὲ σπίνα κυρουλία, ἄφρεσι ἀταδίν.

48.a.25. Αλίμος.

οἱ δὲ δαμασώνιον, οἱ δὲ ἔρυμον, οἱ δὲ βριτανικὴν, οἱ δὲ ῥαβδίον, οἱ δὲ βασίλειον, περσέως ἑρμοῦ βάσις, ὁμοίως σαλοῖς, οἱ δὲ ὀσίριδος διάδημα, οἱ δὲ ἀλυσίφανος, οἱ δὲ ἱερὸς καυλὸς, Πυθαγόρας ἀνθήνορος, αἰγύπτιοι ἀσονπεὶ, οἱ δὲ ἄσφη, οἱ δὲ ἀσπαλουεὶ, οἱ δὲ ἀσπερσὶ, ῥωμαῖοι ἀλβούκιουμ, οἱ δὲ ἀμπελούκιαμ.

Cortex præterea crematus, & ex aqua inunctus, lepras pellit. cauenda tamen ligni rameta. hausta enim letalia sunt.

Iuniperus magna. Cap.

Iuniperus magna, quam aliqui syluestrem cupressum appellant, alij mnesitheum, alij acateram, Romani iuniperum, vulgò cognita est, cupresso assimilis: asperis maritimisque locis plerunque nascitur, easdem quas supradicta vires habens.

Sabina

aliis baryton, aliis baron, Latinis herba Sabina appellatur.

Rhamnus,

Sunt qui persephonion, qui leucacantham. Latini spinam albam, alij spinam cerualem, Aphri atadim.

Halimus.

alij damasonium vocant, alii erymon, alii britanicam, alii rhabdion, alii basilion, magi Mercurii basin aut osiridis diadema, alii elystephanon, aut sacrum caulem, Pythagoras anthenoros, Ægyptii asontiri, alii asphen, alii asealuri, alii asariphen. Latini albuciú aut ampeluciam.

51.a.

Rosa

Latini rosa.

Lygos.

aliqui agynon, alii lygon vocant, alii amictomiænon, alii tridactylon, magi semnon, alii hæmaideos. Ægyptii sum, Romani salicem marinam, alii piper agreste, alii lecristicum.

stomachi.

Eorum venter sale conditus, & in vmbra siccatus, cõtra eximias vacuationes medicamentorũ, trium drachmarũ pódere, præsenti est auxilio: quãdoquidẽ protinus deiectiones cohibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

Milium.

Latinis milium.

panicum

Latinis panicum.

Lolium

Latinis lolium.

Fœnigræci

alii carpon, alii buceron, alii ægoceron, alii ceraitidẽ, Latini fœnumgręcum appellant, Ægyptii itasin.

Linum.

Aliqui linocalamum vocant, alii annon, alii linon agrion, Romani linum, Pœni zeraphoes.

Iens

51.a.22. Ῥόδον,

ῥωμαῖοι ῥόσα.

54.a.17. λύγος,

οἱ δὲ ἄγνινον, οἱ δὲ λύγον, οἱ δὲ ἀμικτομίαινον, οἱ δὲ τριδάκτυλον, προφῆται σεμνὸν, οἱ δὲ αἱμαΐδεως. αἰγύπτιοι σούν, ῥωμαῖοι σάλιξ μαρίνα, οἱ δὲ πίπερ ἀγρέστε, οἱ δὲ λεκρίστικουμ.

78.b.17. στομάχοις.

οἱ δὲ κοιλία τούτων ταριχευθεῖσα καὶ ξηρανθεῖσα ἐν σκιᾷ, ἐπὶ ταῖς ὑπὲρ καθάρσεσι ταῖς ἀπὸ φαρμάκων κενωτικῶν, ὅσον γ΄. λαμβανομένη, βοήθημά ἐστιν ἄριστον. ἵστησι γὰρ παραχρῆμα τὴν κένωσιν. δεῖ δὲ τρίμμα ποιεῖν καὶ ἑνοῦν μετὰ ὕδατος καὶ διδόναι.

101.a.7. Κέγχρος,

ῥωμαῖοι μιλίουμ.

101.a.15. ἔλυμος

ῥωμαῖοι πανικούμ.

101.b.4. Αἶρα,

ῥωμαῖοι λόλιουμ.

102.a.21. Τῆλις.

οἱ δὲ τήλεως καρπὸς, οἱ δὲ βούκερως, οἱ δὲ αἰγόκερως, οἱ δὲ κεραΐτις, οἱ δὲ λωτὸν, ῥωμαῖοι φαίνουμ γραίκουμ, αἰγύπτιοι ἴτασιν.

102.b.10. Λίνον.

οἱ δὲ λινοκαλάμης, οἱ δὲ ἄννον, οἱ δὲ λίνον ἄγριον, ῥωμαῖοι λινουμερσούμ, οἱ δὲ λίνουμ ἀγρέστεμ, ἀφροὶ ζεραφοῖς.

104.b.

104.b. 11. φακὸς,
ῥωμαῖοι λέντεμ, οἱ δὲ λωτίκουλαμ.

105.b. 2. Ὄρυζος,
ῥωμαῖοι ὄρυζουμ.

106.a. 8. ὕμερος,
ῥωμαῖοι λούπινουμ, αἰγύπτιοι βρεχού.

106.b. 9. ἄγριος,
ὃν ῥωμαῖοι λούπινουμ ἀγρέστεμ καλοῦσιν,

106.b. 13. Γογγύλις.
οἱ δὲ γογγυλίδα, οἱ δὲ γολγόστον, ῥωμαῖοι ῥάπα.

107.b. 23. Ραφανὶς,
οἱ δὲ πολυείδος ἠρυγγίου, ῥωμαῖοι ῥάδιξ νοστρὰς, ἀφροὶ θόρπαθ.

ἐν τῷ ἄλλῳ.

οἱ δὲ ῥάφανον ὀρεινὴν, οἱ δὲ ἄπιον, οἱ δὲ ἰσχάδα, οἱ δὲ χαμαιβάλανον ἀγρέαν, οἱ δὲ λινόζωστιν, ῥωμαῖοι ῥάδιξ σιλυέστρις, ἀφροὶ θορφαθσαδὶ, κλωνία δύο ἢ τρία λεπτὰ ἔχει, λεπίδα, ἐρυθρὰ· φύλλα πηγάνῳ ἀγρίῳ ἐοικότα, ὀπωρικέστερα μᾶλλόν τι καὶ στενώτερα· καρπὸς μικρὸς· ῥίζα ἀπογλύκῳ παραπλησία, στρογγυλοτέρα, καὶ πρὸς τὸ τῶ ἀπίου σχῆμα μεσηὸπου, φλοιὸν ἔχουσα λευκόν· ταύτης τὸ μὲν ἄνωθεν μέρος τῆς ῥίζης ληφθὲν, δι' ἐμέτων ἄγει χολὴν καὶ φλέγμα· τὰ δὲ πρὸς τῇ ῥίζῃ κάτω

lens
Latini lentem, aut lenticulá vocant.

Eruum
Latini eruum vocant

lupinus,
Romani lupinum, Ægyptii brechfon vocant.

lupini,
quem Latini lupinum agreſtem appellant,

Rapum
alii gongylida, alii golgoſiũ. Romani rapum vocant.

Radix,
quidam polyides eryngium, Latini radicem noſtratem, Aphri thorpath appellant.

In alio codice.

Quidam raphanon montanam, alii apion, alii iſchadem, nonnulli chamæbalanon agreſtem, quidam linozoſtin, Latini radicem ſylueſtrem, Aphri torphathſadi, ramulos tenues, iunceos, duos ſiue tres ſpargit, rubentes: foliis rutæ ſylueſtris, oblongioribus, & anguſtioribus: ſemine paruo: radice albuci, rotundiore, turbinatione, pyri figura, candido cortice. Ea lacteo ſucco madet. Pars radicis ſuperior vomitione bilé pituitámque extrahit, inferior per aluũ,

 tota

tota susq; déque purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in fictili mergitur, & qui supernatat succus prima eximitur. Is sesquiobolo potus, vtraque parte purgat.

rhaphani

quam Latini armoracium vocant.

Lampsana.

Latini napiú, Ægyptii euthmæ vocant.

Blitum

Ægyptii echlotoripam appellant, alii riplam, Romani blitum, Daci bles.

MALVA,

hortensis, Latini maluã hortensem, Pythagoras anthema vocauit, Zoraستres diadesma, Ægyptii chocortẽ, magi lienem capræ, aut muris vrinam.

vocant

Latini atriplicem, Ægyptii ochi vocant.

Satiua,

alii cramben cepeam, Latini brasica.

brasica,

Latini brasícam rusticam vocant.

Beta,

magna, Latini betam siluaticam

τω καθαίρει, ὅλη δὲ λυθεῖσα, ἀμφοτέρως ταὶ καθάρσεις κινεῖ· ὀπίσω δὲ βουληθεὶς, κόψας ταὶ ῥίζας καὶ λαβὼν εἰς κεραμεᾶ ὕδατος, τὰ ῥαφανίδι, καὶ τὸν ἐφισάμυνον ὀπὴν, περῷ αὐγελῶν ξύλινε. τούτῳ τεία ἡμίω βόλια πιθέντα αὖω κ) κάτω καθαίρει.

107.b.22. ἀγεία,

ἰωῦ ῥωμαῖοι ἁρμοράκιον καλλοῦσι,

108.b.18. Λαμψάνη,

ῥωμαῖοι νάπυμ, αἰγύπτιοι εὔθμοι.

108.b.23. βλῆτον,

αἰγύπτιοι ἐχλωτοειπὰν, οἱ δὲ ῥιπλὰμ, ῥωμαῖοι βλίτυμ, δακοὶ βλής.

108.b 27. Μαλάχη,

κνπευτὴ, ῥωμαῖοι μάλβα ὀρτήνσις, Πυθαγόρας ἄνθεμα, ζωρεσάρης διάδεσμα, αἰγύπτιοι χωχορτίω, μεροφῆται αἰγὸς σπλῶ, οἱ δὲ οὖρα μυός.

109.a.24. γογ.

ῥωμαῖοι ἀτείπλικαν, αἰγύπτιοι ὠχεῖ.

109.a.34. ἡμέρος,

οἱ δὲ κράμβη κηπέα, ῥωμαῖοι βρέσσικα.

110.a. ἀγεία,

ῥωμαῖοι βρέσσικα βούστικα.

110.b.7. Τεῦτλον,

μέγα, ῥωμαῖοι βέτα σιλβατικά.

τικά.

III.a. 23. ἀγρία,
λεγομένη ἀείζωον ἄγριον, οἱ δὲ τηλέφιον, ῥωμαῖοι ἰλλέκεβραμ, οἱ δὲ πορτουλάκαμ, ἀφροὶ μοίμοιμ, δακοὶ λάξ, αἰγύπτιοι μοχμουτίμ.

III.b. 3. καύθα,
οἱ δὲ μύον καλοῦσι.

112.a. 2. Ἀρνόγλωσσον,
οἱ δὲ ἄρνειον, οἱ δὲ προβάτειον, οἱ δὲ κυνόγλωσσον, οἱ δὲ ἑπτάπλευρον, οἱ δὲ πολυνεύρον, προφῆται εὐρεχνεύμονος, αἰγύπτιοι ἀσόνθ, ῥωμαῖοι πλαντάγω μίνωρ, ταρβηλοδάθιον, ἱσπανοὶ θησαρικάμ, ἀφροὶ ἀτιρκόν.

112.b. 35. διαφορεῦσιν.
Οἱ δὲ σύροι τὸν τούτου ζωμὸν καὶ τῆς καλαμίνθης σὺν μέλιτι. φασὶ τοὺς πυρέτοις θεραπεύειν· διδόμενον δευτέρᾳ τετάρτῃ καὶ παρασκευῇ. τοῦτο ὡς μυστήριόν τι δέχου. ἔστι γὰρ ἀληθέστατον καὶ διὰ πείρας.

113.a. 2. ὕδασι.
οἱ δὲ ἀναγαλλὶς ἔνυδρος, οἱ δὲ σχῖνος ἀρωματική, οἱ δὲ δάρεν ἴον, οἱ δὲ λαουβέρδε.

113.a. 18. ἄγριον,
οἱ δὲ ἀφροδίτης στέφανον, ῥωμαῖοι κουστεράλις, οἱ δὲ ἱερὰ βοτάνη.

115.b.

ticam vocant.

fylueftris
quam aliqui aïzoon fylueftre vocant, alij telephium, Latini illecebram, aliqui portulacam, Aphri mœmœm, Daci lax, Ægyptij mochmutim.

ragus,
nonnulli myon vocant.

plantago.
alij arnion vocant, alii probation, alii cynogloffon, alii heptapleuron, alii polyneuron, Magi eurechnemona, Ægyptii afonth, Romani plantaginem Hifpani thefaricam. Pœni atiircon.

vtantur.
Syri ius plantaginis, & calaminthę, cum melle produnt iis mederi, quos vires defecerunt, datum die fecunda, & quarta, & parafceue, id eft, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experiẽtia compertum eft.

aquis.
aliqui aquatilem anagallida, alii fchinon aromaticã, alii daren ion, alii lauerde.

fylueftre
alii Veneris coronam, Latini eufteralem aut herbam veneream.

coronocopus

Aliquibus ammonos, aliis aſtrion, pœnis atirſite, Romanis catiatrix, aliis ſtilago, aliis ſanguinaria dicitur.

Sonchus

Sonchon aſperum aliqui cichoriũ vocant. Romani cicerbitam aſperam, Aphri gathuonem. Eius autem

Seris

Alii pierida appellãt, Ægyptii agon, Romani intubũ agreſtẽ.

ſatiuæ

Latini lactucam, Ægyptii embroſi vocant.

Lactuca

Magi ſanguinem Titani, Zoroaſtres pherumbrũ, Romani lactucam ſylueſtrem appellãt.

lepidion

Romani biſacutum, Ægyptii doriſatrum, Syri adorium, Aphri tiricta appellant.

Scandyx,

Romani herbam ſcanariam, aut aculam nominant.

daucum

Alii caucum, Alii myitin, Democritus brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedẽ pulli, Ægyptii ſeſelin vocant.

Eruca.

Romani Erucam vocant, Ægyptii ethrericẽ, Pœni aſuric.

Oro-

115. b. 35. κορωνόπους,

οἱ δὲ ἄμμονος, οἱ δὲ ἄστριον, ἀφροὶ ἀτιρσίπθη, ῥωμαῖοι κατιατρικεμ, οἱ δὲ στιλάγω, οἱ δὲ σαγγινάρειαμ.

114. a. 8. Σύγχου.

Τραχὺς, οἱ δὲ κιχώριον, ῥωμαῖοι κουκούρβιτα ἄσπερα, ἀφροὶ γαθουόνημ. τούτου δὲ

114. a. 32. Σέρις.

οἱ δὲ πικρίδα, αἰγύπτιοι ἄγον, ῥωμαῖοι ἴντιβυμ ἀγρέστεμ.

116. a. 5. ἥμερος,

ῥωμαῖοι λακτούκα, αἰγύπτιοι ἐμβροσί.

116. a. 23. θρίδαξ

ἣν προφῆται αἷμα τιτάνε, ζωροάστρης φέρυμβρος, ῥωμαῖοι λακτοῦκα σιλβέστρις καλοῦσιν,

116. b. 14. λεπίδιον

ῥωμαῖοι βισακούτουμ, αἰγύπτιοι δορυσατρού, σῦροι ἀδωρειού, ἀφροὶ τειρικτά.

116. b. 26. Σκάνδυξ.

ῥωμαῖοι ἕρβα σκανάρεια, οἱ δὲ ἀκουκλάμ.

116. b. 32. ἄγριον,

οἱ δὲ καῦκον, οἱ δὲ μυΐτις, δημόκριτος βεῖον, ῥωμαῖοι πέδεμ γαλλινάκεουμ, οἱ δὲ πέδεμ πούλλι, αἰγύπτιοι σέσελις,

117. a. 7. Εὔζωμον,

ῥωμαῖοι δὲ ἐρεῦκαμ, αἰγύπτιοι ἐθρεκικὴν, ἀφροὶ ἀσουρίκ.

117. b.

117.b.16. Ορεβάγχη.

οἱ δὲ, κυνομόριον, οἱ δὲ λέοντα, κύπριοι δὲ θυρσίνιν καλοῦσιν, ὃ κοινῶς λύκος ὀνομάζεται.

Orobanche.

Alij cynomorion appellant, à similitudine canini genitalis, alij leonem, Cyprij thyrsinen, communiter lycon.

118.b.33. κεφαλωτὸν,

ῥωμαῖοι πόρρουν.

Porrum,

Latinis porrum.

119.b.9. Κέφμυον,

οἱ δὲ πολύειδος, θεσφῆται καλαβωτὶς, ῥωμαῖοι κέπαμ.

Cepa.

Crómyó alio polyidos vocãt, magi calabotim, Romani cepã

121.a.15. Σκόροδον,

οἱ δὲ γήβοσκον, οἱ δὲ ἐλαφόβοσκον, ῥωμαῖοι ἄλλιουν.

Allium.

Alij goboſcon, alij elaphoſboſcon, Latini allium vocant.

120.b.31. νάπυ.

ῥωμαῖοι σινάπι.

Vocant.

Latini ſinapi.

121.b.4. Καρδάμον.

οἱ δὲ κυνοκάρδαμον, οἱ δὲ ἴβηρις, οἱ δὲ καρδαμιναῖκα, αἰγύπτιοι σήμβ, ῥωμαῖοι νασύρκιουμ.

Naſturtium.

Aliis cynocardamõ, aliis iberis, aliis cardaminaca, ægyptiis ſemeth, Romanis naſturtiũ dicĩt.

121.b.29. Θλάσπι,

οἱ δὲ θλασπίδιον, οἱ δὲ σίναπι ἄγριον, οἱ δὲ μυόπερον, οἱ δὲ δασμοφῶν, οἱ δὲ βίβρον, αἰγύπτιοι συνιτέμφον, ῥωμαῖοι σκανδάλακιν, οἱ δὲ κάψελλα, οἱ δὲ πέδεμ γαλλινάκιουμ.

Thlaſpi,

Aliqui thlaſpidion, alij ſinapi perſicũ, alij myiten, alij ſylueſtre ſinapi, alij daſmophon, alij myopterõ, alij bitrõ, Ægyptij ſuitempſum, Romani ſcãdulatium, alij capſellam, aut pedem gallinaceum vocant.

122.a.31. ΕΡΥΣΙΜΟΝ,

οἱ δὲ χαμαίσπλιον, θεσφῆται ἡρακλέους ἄλφητα, αἰγύπτιοι ἐρυθμοῦ, ῥωμαῖοι ἰερίουμ.

Eryſimon,

Aliqui chamepliõ, Magi Herculis alphita, Ægyptij erythmon, Latini irionem vocant.

124.b.4. Στρούθιον,

οἱ δὲ κέρδον, οἱ δὲ κάθαρσις, οἱ δὲ στρουθοκάμηλος, οἱ δὲ χαμαίῤῥυτον θεσφῆται

Struthium,

Ab aliquibus cordõ ab aliis catharſis, ab aliis ſtruthocamelus, à quibuſdam chamerriton, à magis

à magis callirrhyton, ab Ægyptiis œno, à Pœnis ſyris, à Latinis lanaria herba aut radicula appellatur.

προφῆ) χαλίρυτον, ῥωμαῖοι ῥάδιξ ἀνάρια, οἱ ἢ ἐρβαλάρια, αἰγύπτιοι οἰνώ. ἀφροὶ συεῖς.

Ciclaminus.

124.b.27.κυκλάμινος.

A quibuſdā ciſſanthemō, ab aliis ciſſo phylō, ab aliis chelonion, ab aliis ichthyotherō, ab aliis ſilene, à Zoroaſtre triūphalites, ab Oſthane aſpho, à magis miaſpho, Ægyptiis theſce, à Romanis rapū terræ, aut terræ vmbilicus, ab aliis arcar vocaẗ.

οἱ δὲ κισσάνθεμον, οἱ δὲ κισσόφυλλον, οἱ δὲ χελώνειον, οἱ δὲ ἰχθυόθηρον, οἱ δὲ χυλίνη, οἱ δὲ ζωροάστρις ἢ τριμφαλίτης, ὀσθάνης ἀσφώ, προφῆ) μιασφώ, αἰγύπτιοι θέσκε, ῥωμαῖοι ῥάπουμ τέρραι, οἱ δὲ οὐμβιλίκουμ τέρραι, οἱ δὲ ἀρκάρ.

Purgat.

126.a.5.ποθεῖσα.

Dracunculus.

Περὶ δρακοντίας μεγάλης.

Draguntium magnum aliqui aron, alii iſaron, alii iaron, alii hieracium, alii hiaron, alii armiagrion, alii ciperida vocant: in vmbroſis ſepibus gignitur. Caulem habet rectum, læuem, duûm cubitorum, baculi craſsitudine, verſicoloribus draconum maculis, purpurei tamen euincentibus: folia rumicis, inflexa: fructum ſummo caule facit, racemoſum coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum, & purpuram vergentis: radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui veſtitam. Colligiturr, & dum matureſcit, ſuccus exprimitur, ſiccatúrque in vmbra. Radix

Δρακοντία μεγάλη, οἱ δὲ ἄρον, οἱ δὲ ἴσαρον, οἱ δὲ ἴαρον, οἱ ἢ ἱεράκιος, οἱ δὲ βίαρον, οἱ δὲ ἀρμιάγριον, οἱ δὲ κύπερις, ῥωμαῖοι λυρυμέμ, οἱ δὲ μαυριαριάμ, οἱ ἢ στιγγιάλιος· φύε) ἐν συσκίοις περιφραγμοῖς. καυλὸν ἢ ἔχει λεῖον, ὀρθὸν ὡς διπηχυαῖον καὶ παχὺ ὡς βακτηρίαν, ποικίλον κτ̄ χρόνον ὡς ἐοικέναι δράκοντι, καὶ πλεονάζει μὲν ἐν τοῖς διαπορφύροις σπίλοις· φύλλα δὲ ὡς λαπάθου, σὺν ἀντεμπλεκόμενα. καρπὸν δὲ ποιεῖ ἐπ' ἄκρου τ̄ καυλοῦ βοτρυοειδῆ, σποδοειδῆ τῷ χρώματι τὸ πρῶτον, ἐν ἢ τῷ πεπανθῆναι κροκίζοντα καὶ φοινικοῦν. ῥίζαν ἐν μεγέθει στρογγύλην, λευκήν, φλοιὸν ἔχουσ̄ λεπτόν. συλλέγε) δὲ καὶ χυλίζε) ὅταν ἀκμάζῃ, καὶ ξηραίνε) ἐν σκιᾷ.

ἡ δὲ

ἡ δὲ ῥίζα ὀρύσσεται πυρὰ μητῶ, καὶ πλυθεῖσα κατατέμνεται, καὶ ἑψεῖται μὲν ἰμάτι, ξηραίνεται δὲ ἐν σκιᾷ. Θερμαντικὴ δὲ ὅτι μετ' συγκράματος· ποιεῖ δὲ ὅπῃ τι καὶ ἐφθὴ μετὰ μέλιτος ἐκλειχομένη, πρὸς ἐρυσιπελατώδεις, ἕλκη, ἀποσήματα, βῆχας, κατάῤῥοων· πεσθεῖσα δὲ μετὰ οἴνου, τὰς ὀπὴ συνεσίας ὀρμὰς κινεῖ· καθαίρει δὲ σὺν μέλιτι λεανθεῖσα ἢ ὀπτηλαθεῖσα τὰ κακοήθη τῶν ἑλκῶν, καὶ φαγεδαινικά· καὶ μετὰ λευκῆς ἀμπέλου μάλιστα· καὶ κολλύρια δὲ ἐξ αὐτῆς σὺν μέλιτι, πρὸς σύριγγας ἀναπλάττεται καὶ ἐμβρύων κομιδῇ· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἀλγὸς σὺν μέλιτι κατακριθεῖσα· πελύπους δὲ, καὶ καρκινώματα διαπαᾶ· ποιεῖ δὲ ὁ χυλὸς αὐτῆς καὶ εἰς ὀφθαλμικά, πρὸς νεφέλια, λευκώματα, ἀχλύ· ἡ δ' ὀσμὴ τῆς ῥίζης καὶ τῆς πόας τὰ ὄρτι συγκεκμηκένων, φθορεόν ἐστι. καὶ τὸ καρπὸν λ'. κόκκοι πεθέντες μετ' ὀξυκράτου. ἔνιοι δὲ τῷ χυλῷ τῷ τούτου, καὶ τὸν ὠτὰλγοῦντας ἐπέχυμα ποιοῦσι μετὰ ἐλαίου. τὰ φύλλα δ' ὡς σύφοντα τοῖς νεωτερωτοις ὑπέθεσαν· ἐφαμβόμενα δὲ ἐν οἴνῳ καὶ τοῖς χύτλα ἔχουσι. φασὶ δὲ καὶ τὸν διαπεφυκότας αὐτὰ ταῖς χερσὶν ἢ τὴν ῥίζαν ἀναιρουμένους, ὑπὸ ἔχεως μὴ δάκνεσθαι.

Radix quoque mesibus effoditur, elotáque particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccatur in vmbra. Cum diluta potione, crudam, coctáve, cum melle delingi prodest, contra orthopnœas, rupta, conuulsa, tusim, & destillationes: poto cum vino venerem stimulat: vlcera quæ cacoëthe vocantur atque phagedænica, expurgat, præsertim cum vitæ alba: ex ea & melle collyria ad fistulas, & partus euocãdos çomponuntur: ad vitiligines cum melle, efficaciter illinitur: polypos & carcinomata absumit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albuginésque effectum præbet: herbæ radicísque odor, teneros conceptus abortu vitiat: item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius succum cum oleo aurium doloribus infudere: quinctiam folia, vtpote quæ adstringãt vulneribus recentibus impositure, & cocta in vino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse à vipera feriri inficiantur.

127.2.

Vocitatum

Vocitatum,

Aliqui alimon, alij thymon, alij dracontiam, Cyprij colocasion dicunt.

Regia,

Alij narthecion, Romani albucum vocant.

Purgant,

Floret mesibus albucum. Quare æquinoctio verno, antequã semen adoleuerit, demetẽdum. Radicem aiunt potam, Veneris cupiditatem inhibere, quod herbarius Crateuas asse uerat: addidítque sanare poda græ dolores, si drachmæ pondere bibatur.

Neruos tentant.

Cocti cũ polenta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula velocissimè ad suppurationẽ perducũt ac rũpũt.

Capparis,

Aliq cynosbaton, alij capriã, alij corui malũ, alii ophioscorodon, alii phylostraphylõ, quidam thalliam, aut petræam, alij olophytõ, alii ioniten, nõnulli oligochloron, aut aconitõ, aut hippomanes, alii trichomanes, magi potera, alii pétheron, aut cor lupi, alii aloschorodũ, alii crinon, alii thlaspin, Romani persicon sinapi, aut inturim, Aphri herbiæathon.

Anemone.

127.a.3. λύφα,

οἱ μὲν ἄλιμον οἱ δὲ θύμον, οἱ δὲ δρακοντίαν, ὃ οἱ κύπριοι ἀπὸ κολοκάσιου λέγουσι.

127.a.31. Ασφόδελος,

οἱ δὲ ναρθήκιον, ῥωμαῖοι ἀλβούκιουμ.

128.a.6. κοιλίαν.

Ἀνθεῖ δὲ ἐν πυραιικτῷ. χρὴ δὲ τὴν λευκὴν ἀσφόδελον τέμνειν πρὶν ἢ ἰσημερίαν ἐν ἔαρι, πρὸ τοῦ τὸν καρπὸν αὐξηθῆναι. τὴν δὲ ῥίζαν πνομώδη, ἀνορέκτους φασὶ ποιεῖν πρὸς ἀφροδίσια, καὶ κραθύας δὲ ὁ ῥιζοτομικὸς τὰ αὐτὰ εἴπε. καὶ ὅτι θραπευτὴ ἡ ῥίζα πνομένη μελ᾽ οἴνου δραχμὴ μία πο δάγρας ἀγήματα. 128.b.11. νευρόσδος.

ἐφθὸς δὲ σὺν ἀλφίτοις καὶ τέρεντι χειρεῖῳ πρόσταθεὶς οἰδήματα καὶ φύματα σαπτὰ ποιεῖ καὶ διαρρύσεις.

129.b.26. Κάππαρις,

Οἱ δὲ κυνόσβατος, οἱ δὲ καπρία, οἱ δὲ κόρακος μῆλον, οἱ δὲ ὀφιόσκορδον, οἱ δὲ φυλοστάφυλον, οἱ δὲ θαλλίαν, οἱ δὲ πέτραίαν, οἱ δὲ ὀλόφυτον, οἱ δὲ ἰωνίτην, οἱ δὲ ὀλιγόχλωρον, οἱ δὲ ἀκόνιτον, οἱ δὲ ἱπποµανὲς, οἱ δὲ τριχομανὲς, πρόφῆται ποτήρια, οἱ δὲ πέτερον, οἱ δὲ καρδίαν λύκου, οἱ δὲ ἀλοσκόρδον, οἱ δὲ κρίνον, οἱ δὲ θλάσπιν, ῥωμαῖοι σίναπι πέρσικον, οἱ δὲ ἰνλύρης, ἀφροὶ ἐρυσιμαδούμ.

131.a

131.a.18. Ανεμόνη,

οἱ δὲ ἀγρίαν, οἱ δὲ μέλαιναν καλοῦσι καὶ ἀνεμώνη ἡ φοινική, οἱ δὲ ἠνέμιον, οἱ δὲ μηκώνειον, οἱ δὲ τραγόκερως, οἱ δὲ γῆς παῖνη, οἱ δὲ βαρβύλη. ὀσθάνης βηρύλιος. ὁμοίως ὄρνιος κεράνιος, πυθαγόρας ἀτρακτυλίς, φρυγῶται κνίκος ἀγρία, ῥωμαῖοι ὄρκι τωύϊκαμ, ἄρροι χρύσσοις.

132.a.5. Αργεμώνη,

οἱ δὲ οἰνάνη, οἱ δὲ ἀνθεμὶς, οἱ δὲ ὁμόνοια, οἱ δὲ ἄνθος πολύνου, ῥῶμαῖοι λοσοργία, οἱ δὲ κορδιάλις, οἱ δὲ περγαλία. γάλλοι κόρνα.

132.a.15. καταπλασμάτιον.

Κρατεύας ὁ ῥιζοτομικὸς εἰς τὸ αὐτὸ, ἀργεμώνη, αὕτη ἡ βοτάνη κοπεῖσα μὴ ὀξυγγίῳ, χειρόδας θαλύῃ. ποιεῖ δὲ πρὸς ἀλφούς, μὴ νίτρῳ δὲ θείῳ ἀπύρῳ ξηρὰ κοπεῖσα καὶ σειθεῖσα ἐν βαλανείῳ δὲ τοῖς χρωμένοις θεραπεύῃ προξηροῖ βιβιθέντας. ποιεῖ δὲ πρὸς φύσεις.

Περὶ ἑτέρας ἀργεμώνης.

Ἀργεμώνη ἑτέρα οἱ ἀρτεμώνη, οἱ δὲ, ἀρσελαὶ, οἱ δὲ, σαρκοκόλλα, ῥωμαῖοι ἀρτεμώνιαμ, καὶ αὕτη παρέοικε μὲν ἀγρίᾳ μήκωνι τοῖς φύλλοις. Δυώδειαν δὲ ἔχει αὕτη χλωρὰ βιβρωθεῖσα λεῖα καὶ ἐπιλειβομένη διακοπὰς θεραπεύει. καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς παύει, ἀμαύρωσιν καὶ δυσεντερικοῖς σὺν ὕδατι ποτιμοῦν.

Anemone.

Alii agriam, aut nigrā vocāt, alii anemonem phœnicā, alii enemion, nōnulli meconion, alii tragoceros, alii terræ parinem aut barbylam, Osthanes berilió, item ornios ceranion, Pythagoras atractilida, magi cnicum agriam, Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

Argemone.

Aliquib⁹ œnone vocatur, aliis anthemis, aliis homonœa, aliquibus flos cāpestris, Romanis concordialis, aut pergalia, aliis liburnia, Gallis corona.

compescunt.

Ea, vt herbari⁹ Crateuas author est, contusa cum axungia, strumas discutit, Cribrata eius farina cum nitro, & sulphure igné non experto contra vitiligines efficax est: eaq; sicco linteo anteà cōstrictas, in balneis sanat: facit & ad scabiem.

Altera Argemone.

Altera est Argemone, quam artemonen aliqui, alii arselam, aut sarcocollam vocant, Romani Argemoniam. Ea foliis sylvestri papaueri similis est. Recens trita intercisiones impositu sanat: oculorum inflāmationes mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur: vulnera

vulnera conglutinat: conuulsis,& vellicatib⁹ impositamedetur,inflammationibus vtilis, contra serpétium morsus cum vino bibitur.

Anagallis.

Anagallis purpurea, quibusdam aëritis aut agitis vocatur, aliis sauritis,magis oculi ságuis aut chelidonion, Romanis macia,Heruscis masytipos,Gallis sapana,Dacis cerceraphró. Anagallis cómunis, quibusdam corchoron, aliis halicacabon, aliis zeliaur⁹,magis nycteritis, Ægyptiis mecii,Romanis aneciaton,Aphris asirrisæ.

Hedera.

Aliquib⁹ citharó, aliis cissaró,aliis chrysocarpos,aliis poëtica,aliiscorymbethra,aliis cyssion,aliis dionysia,aliis ithythrió,aliis persis,aliis cemos,aliis asplenos, Romanis sylua mater,aliis hedera;Gallis suibites.

maius.

Nónulli pæoniam vocãt,alii cratæá, alii aubiũ, alii glauciá, alii pãdios radix, quidã philomedion,alii othonion, Romani fabiũ,Galli thonan,Ægyptii mothoth,Daci crustana.

extrahit.

Quinetiá radicib⁹ eius decoctum,mox cũ melle gargarissatum,

μλύη,κολλητικὴ δὲ βαυμάτων καὶ φλεγμονῶν ἐστιν εὔθετος· ὠσὶ πάντως ἐπιπλοκὴν μλύη,ἀποσμάτων καὶ πλυμάτων ὄζει θεραπευτικὴν, ἁρμόζει καὶ δηριοδήκτοις σὺν οἴνῳ πινομένη. 132.a.ἀναγαλλίδος.

Ἀναγαλλὶς ἡ φοινικὴ, οἱ δὲ ἀερῖτις,οἱ δὲ αἰγῖτις, οἱ δὲ σαυερῖτις,θεραπεῦται αἷμα ὀφθαλμοῦ, οἱ δὲ χελιδόνιον,ῥωμαῖοι μακία, θοῦσκοι μασιτίπους, γάλλοι σαπαία,δακοὶ καρκαφορὰν, ἀναγαλλὶς οἰκουνὴ,οἱ δὲ χόρχορον, οἱ δὲ ἁλικάκαβον, οἱ δὲ ζηλίσαυρος θεραπεῦται νυκτερίτις, αἰγύπτιοι μικιεὶ, ῥωμαῖοι μακίατο, ἄφροι ἀσίρρισοι.

132.b.9. κίσσος,

οἱ δὲ κίθαρον,οἱ δὲ κίσσιρον, οἱ δὲ χρυσόκαρπος, οἱ δὲ ποντικὴ,οἱ δὲ κορυμβήθρα, οἱ δὲ κύσσον,οἱ δὲ διονύσιον, οἱ δὲ ἰθυθύμνη.οἱ δὲ πέρσις,οἱ δὲ κῆμος,οἱ δὲ ἄσπληνος,ῥωμαῖοι σίλβα μάτηρ, οἱ δὲ ἔδερα, γάλλοι σουβίτης.

133.a.31.μέγα.

οἱ δὲ παιωνία.οἱ δὲ κρατειὰ.οἱ δὲ ἀόβιος.οἱ δὲ γλαύκιος, οἱ δὲ παίδιος ῥίζα.οἱ δὲ φιλομήδιον, οἱ δὲ ὀθόνιον, ῥωμαῖοι φαβιουνὶ, γάλλοι θῶνα, αἰγύπτιοι μοθὼθ, δακοὶ κρυσταίνη,κροκοδεῖς.

134.a.16.κεφαλῆς.

ὁμοίως καὶ τὸ παίτης ἀφέψημα σὺν μέλιτι ἀναγαργαριζόμενον,

μῦον, καφαλιὼ καθαίρει ῥυναίως ϗ παίτα τὰ ἐν θώρακος.

134.b.10.σύφλως.

Περὶ Μυὸς ὠτων.

Μυὸς ὦτα, οἱ δὲ ὠότον, οἱ δ' ἀνθύλλιον, οἱ δὲ ἀλσίνιν, οἱ δὲ μυόρθοχον, οἱ δὲ μυρτόσπλιον, ῥωμαῖοι μυῦεις ἀεικουλα, ἀφροὶ λαβαθολαβάτ. ὀνόμασαι δὲ ἀπὸ τῆ ἔχειν μυὸς ὠτίοις ὅμοια τὰ φύλλα. ἀλσίνη δὲ διὰ τὸ σκιερὸς καὶ ἀμμώδεις φιλεῖν τόποις. πόα ὁμοία ἑλξίνῃ, τα πεντοτέρα δὲ καὶ μικροφυλλοτέρα. Δυώαμιν ἔχει ψυτικὴν, ἁρμόζουσαν πρὸς φλεγμονὰς ὀφθαλμῶν, καταπλαπομένη μετὰ ἀλφίτων, καὶ πρὸς ὦτων πόνον ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνσταζόμενος. καὶ καθόλου δύναται τὰ αὐτὰ τῇ ἑλξίνῃ.

134.b.30.ἥμερος.

οἱ δὲ αὔγον, οἱ δὲ ἔγνη, πρωθῆται ἀερύσιον, ῥωμαῖοι ῥᾶπαμ.

135.a.7.ἀγρία.

οἱ δὲ ἔγνη μικρὰ, ῥωμαῖοι ῥοῦται μινόρεμ, οἱ δὲ ἀγρία ἱσάτης.

135.a.17.καταπλασσόμενον.

Επισατέον τὰ πρὸς ἱσάτιων ὅτι αἱ ἐκδόσεις αὗται τὸ ἰσφαλμόν ἔχουσι, τότε γὰρ μάλιστον ἄνθος καὶ τὸν λεπτοτέρους καὶ πολυμεδεῖς κλάδους καὶ τὰ ἐξ ἄκρου γλωτσοειδῆ θυλάκια, ἐν οἷς τὸ σπέρμα ἡ ἥμερος φέρει, ἐμπεί-

risſatum, caput cunctáque pectoris vitia purgat.

mordaci.

Auricula muris.

Myoſota alii myoton, alii alſinen, nonnulli myorthochon, alii myrthoſplenon, Latini muris auriculam vocant, Aphri labatholabat. nomen ideo accepit, quòd muſculorũ aures foliis imitetur. Lucos & fabuloſa loca amat, ideo alſine dicta eſt. Ea Helxinæ ſimilis, ſed humilior ac foliis minor. Vim refrigeratoriam habet, oculorũ inflammationibus conuenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus inſtillatus: in totum eadem poteſt quæ exine.

Glaſtum.

Aliqb⁹ augió, aliis egne, Magis auſió, Romanis gluſta aut glaſtũ dicit. glaſtum,

Quibuſdam igne parua, Latinis glaſtum minus, aliis ſyluęſtris iſatis dicitur.

Auxiliatur.

Sed ſciendum eſt, ne tradita errorem pariant, ſatiuũ glaſtum, luteũ florem, tenuiores, multifidoſq; ramulos proferre, in cacumine autem folliculos linguæ ſpecié repræſentantes, in quibus

in quibus semen continetur melâthio simile, collémque supra binûm cubitorum altitudinem attolli: syluestre verò nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiorem: florem purpureum, aut cęruleum, fructum cruciformé, asperum, in quo semé, foliis exilibus quinque partitò diuisum.

ἐμπεριέχεται δὲ τούτοις σπέρμα μέλαν ἐοικὸς μελανθίῳ, καὶ τὸν καυλὸν δὲ ὑπὲρ δίπηχυν, ἀλλ' οὐχ ὑπὲρ πῆχυν μόνον φέρει. ἡ δὲ ἀγρία μελάντερα ταύτης τὰ φύλλα φέρει, καὶ καυλὸν ἐλάττω καὶ παχύτερον· ἄνθος τε ἐμπόρφυρον ἢ κυανοῦν, καὶ καρπὸν σταυροειδῆ, τραχὺν ἐν οἷς τὸ σπέρμα φυλλαρίοις μικροῖς ἀνὰ πέντε ἴσοις οἱονεὶ διειλημμένον.

Telephium,

135.a.18. Τηλέφιον,

Aliqui syluestre semperuiuũ, alii portulacã syluestrẽ appellãt, Romani illecebrã, Ægyptii anoth, Aphri atirtopurin.

οἱ δὲ ἀείζωον ἄγριον, οἱ δὲ καὶ ταύτην ἀνδράχνην ἀγρίαν καλοῦσι, ῥωμαῖοι ἰλλέκεβραν, αἰγύπτιοι ἀνώθ, ἀφροὶ ἀτιρτίπουρειν.

Rha.

136.b.16. Ῥᾶ.

Aliqui rhiam, Latini rha Põticum vocant.

οἱ δὲ ῥίαν ῥωμαῖοι ῥᾶ πόντικουμ.

Gentianæ,

137.a.20. Γεντιανή,

Aliqui centauriã radicẽ, alii aloën Gallicã, alii narcem, alii chironiõ, Dardani aloitin, Romani genus aut cicédiam, alii ciminalem vocant.

οἱ δὲ κενταύρειος ῥίζα, οἱ δὲ ἀλόη γαλλική, οἱ δὲ νάρκη, οἱ δὲ χειρώνειον, δάρδανοι ἀλοῖτις, ῥωμαῖοι γένους, οἱ δὲ κικενδία, οἱ δὲ κιμιναλίς.

Dactylitis,

138.a.12. δακτυλῖτις,

Aliis melocarpos, aliis teuxinõ, Latinè aristolochia herba.

οἱ δὲ μηλόκαρπον, οἱ δὲ τεύξινον, ῥωμαῖοι ἕρβα ἀριστολόχια.

Inferior est.

138.b.23. στρογγυλῶν.

Appellatur à quibusdã ararisa, & melecaprum, ephestios, lestitis, pyxionyx, Dardanion, iontitis, Gallis theximon, Ægyptiis sophoeph, Siculis chamæmelon, Italis malum terræ, Dacis

Καλεῖται δὲ αὕτη καὶ ἀρἀρίζα καὶ μελέκαπρον, καὶ ἐφέσιος, καὶ λεστῖτις καὶ πυξιόνυξ, καὶ δάρδανον, καὶ ἰοντῖτις, γάλλοι δὲ χαυλοῦσιν αὐτὴν θέξιμον, αἰγύπτιοι δὲ σοφοέφ, σικελοὶ δὲ χαμαίμηλον, ἰταλοὶ τέρρα μάλα, δακοὶ

δακοὶ ἀψίνθιον χωειχὸν, γίνεται εἰς τόπους ὀρεινοὺς καὶ θερμοὺς καὶ ὁμαλοὺς ἢ τραχεῖς καὶ πετρώδεις. ποιεῖ δὲ πρὸς πυρετὸν βαρὺν οὕτως ἀριστολοχία ἐπ' ἀνθράκων κάπνισον τὸν πυρέσσοντα, καὶ παυθήσεται ὁ πυρετός· τραύματα ἐπιπλασσομένη ἰᾶται· μετὰ δὲ κυπείρου καὶ δρακοντίου σπέρματος καὶ μέλιτος, τοῖς ἐν ῥινὶ καρκινώμασι βοηθεῖ· μετ' ἐλαίου δὲ ἢ ὑείου στέατος ἑψηθεῖσα, ῥίγη συγχρισμένη θεραπεύει καὶ κρατεύας ὁ ῥιζοτομικὸς καὶ γάλλος τὰ αὐτὰ περὶ αὐτῆς εἰρήκασι καὶ ὅτι τοῖς ποδαγρικοῖς ὠφελεῖ.

138.b.25. Γλυκύρριζα.

οἱ δὲ ποντικὴ, οἱ δὲ γλυκύκερατον, οἱ δὲ σύμφυτον, οἱ δὲ λεοντίκα, οἱ δὲ γλυκύφυτον, οἱ δὲ σκύθιον, οἱ δὲ ἄδιψον, οἱ δὲ σύλιθρα, οἱ δὲ λιβυεστασὼ, οἱ δὲ ὁμοιονόμοιος, οἱ δὲ πενθαόμοιος, ῥωμαῖοι δοῦλκις ῥάδιξ.

139.a.19. γάρκων.

οἱ δὲ λιμνήσιον, οἱ δὲ μαρώνιον, οἱ δὲ πληκτρονίας, οἱ δὲ χειρωνιὰς, οἱ δὲ λίμνησις, προφῆται αἷμα ἡρακλέους, ῥωμαῖοι φιέρει, οἱ δὲ οὐνεφέρα, οἱ δὲ φελτέρραι.

139.b.33. μικρὸν,

οἱ δὲ λιμνήσιον, οἱ δὲ ἑλλεβορίτης, οἱ δὲ ἀμάραντον, προφῆται αἷμα ἡρακλέους, ῥωμαῖοι φεβριφούγιαμ, οἱ δὲ αὐρὰμ μέλτι ῥάδιξ,

δακοὶ

Dacis abſinthium ruſticum: naſcitur in mōtibus, & calidis locis, aut campeſtrib⁹, & petroſis. Ad grauem febrim efficax eſt, ſi nidore ſubditis carbonibus febricitans ſuffiatur, febris leuabitur: vulnera impoſitu ſanat: carcinomatis nariū, cum cypero, & dracunculi ſemine, & melle prodeſt: rigoribus medetur, cocta in oleo aut adipe ſuillo, illitáque. Crateuas herbarius, & Gallus, eadem de hac tradiderūt, & præterea podagricis eam auxiliari.

Radix.

Aliqui ponticam, alii glyceraton, quidam ſymphyton, alij leonticā, alii glycyphytō, aliq ſcythiō, alii adipſō, alii ſylithrā, alii libyeſtaſon, alii homœnomœō, alii peenthaomœon, Latini dulcē radicē appellauere.

Magnum,

Alii limneſeon, alii maronem alii plectroniam, alii chironiā, alii limneſtim, magi Herculis ſanguinem, Romani phieri, & vneferam, & fel terræ.

Centaurium.

Aliqui limneſion, alii helleborité, alii amarátó, magi Herculis ſanguiné, Latini febrifugiam, alii aurá, multiradicem.

Daci tulbelam appellant.

albus,

Quibusdā chrysisceptrō, aliis ixia, Romani cardᵘᵒ varinᵒ, Ægyptiis ɸher dicit, aliis ephthosechin.

niger,

Pācarpon aliqui, alii vlophonon, alii ixiā, alii cynomazon, alii ocimoides, alii cnidió coccon, alii cynoxylon, Latini carduum nigrū, aut vermilaginē, Ægyptii sobel vocant.

Dipsacum.

Aliqui crocodilion vocāt, alii chamæleoné, alii onacardion, alii Veneris lauachrū. Romani labrum Veneris, alii carduum Veneris, Ægyptii sesseneor, alii chir, alii meleta, Daci sciaram.

alba:

Aliq, agriocinnarā, alii donacitin, alii erysisceptrū vocāt, romani spinam albam aut regiā, alii cardum ramptarium.

spinam.

aliquibus acanthis, Latinè spina dicitur.

Carduus,

aliās ferula, aliās pyracantha nominatur, Latinis stiobilon, Ægyptii cnus.

Poterion,

Aliqui phrynió, aliqui acidotō.

Acanthus,

Quidam melamphyllon, aliqui

δακοὶ τυλβελά.

140.b.21. Λευκὸς,

οἱ δὲ χρυσόκκεφαλον, οἱ δὲ ἴξίαν, ῥωμαῖοι κάρδου σουαρίνας, αἰγύπτιοι ἐφὴν, οἱ δὲ ἐφθόσεχιν.

141.a.17. μέλας.

οἱ δὲ πάγκαρπον, οἱ δὲ ἁλόφωνον, οἱ δὲ ἴξίαν, οἱ δὲ κυνόμαζον, οἱ δὲ ὠκιμοειδὲς, οἱ δὲ κνίδιον κόκκον, οἱ δὲ κυνόξυλον, ῥωμαῖοι κάρδους νίγρα, οἱ δὲ ἐρυθιλαγώ, αἰγύπτιοι σοβέλ.

141.b.34. δίψακος,

οἱ δὲ χροκοδείλιον, οἱ δὲ χαμαιλέων, οἱ δὲ ὀνοκάρδιον, οἱ δὲ ἀφροδίτης λουτρὸν, ῥωμαῖοι λάβρυμ βένεριϛ, οἱ δὲ κάρδουμ βένεριϛ, αἰγύπτιοι σεσενεὸρ, οἱ δὲ χεὶρ, οἱ δὲ μελήτα, δακοὶ σκιαρή.

142.a.31. λευκὴ,

οἱ δὲ ἀγριοκινναρὰμι, οἱ δὲ δονακῖτις, οἱ δὲ ἐρυσίσκκεφον, ῥωμαῖοι σπίνα ἄλβα, οἱ δὲ ῥήγια, οἱ δὲ καρδὶς ῥαμπτάρεια.

142.b.20. ἀκανθικὴ,

οἱ δὲ ἀκανθὶς, ῥωμαῖοι σπίνα.

142.b.27. Σκόλυμος,

οἱ δὲ φέρυλα, οἱ δὲ πυράκανθα, ῥωμαῖοι τρύβελμ, αἰγύπτιοι χνοῦς.

143.a.6. Ποτήριον,

οἱ δὲ φρυγίου, οἱ δὲ ἀκιδωτόν.

143.b.3. ἑρπύκανθα,

οἱ δὲ μελάμφυλλον, οἱ δὲ πυρέθρα,

ρωτα, οἱ δὲ ἀκανθηςόπια, οἱ δὲ μαμμολάρια, οἱ δὲ κραύπυλα.

143.a.23. Ἀκανθίς,

Ακανθα ἀγρία ἣν ῥωμαῖοι σπίνα ἀγρέστιν.

144.a.19. Λευκάκανθα,

οἱ δὲ πολυγόνατον, οἱ δὲ φύλλον, οἱ δὲ ἰσχιάδα καλοῦσι, ῥωμαῖοι γαιακάρδους, θρῦσκοι σπίνα ἄλβα.

144.b.18. Ερύγγιον.

οἱ δὲ ἠρύγγιον, οἱ δὲ ἐρμινῆριε, οἱ δὲ κάρυον, οἱ δὲ γοργίνιον, οἱ δ' ἕρμιον, οἱ δὲ ὀρίγανον, χλούνιον, οἱ δὲ μυρακάνθον, οἱ δὲ μῶλυ, αἰγύπτιοι κρόβυσον, τραγῶται οἱ στρτος, ῥωμαῖοι καπιτυλὰμ μαρδοις, οἱ δὲ καρτερεὶ, δακοὶ σικυωνὲξ, ἱσπανοὶ κιοτουκαπτὰ, ἀφροὶ χερδὰ, οἱ δὲ ὀρείαν χλόην, οἱ δὲ χλδά.

145.a.16. Αλόη,

οἱ δὲ ἀμφίβιον, οἱ δὲ ἠρύγγιον, οἱ δὲ ἕρμινον, οἱ δὲ τραγόκερως, ῥωμαῖοι ἀλόαμ, παρὰ βαρβάροις ἀλοέ.

146.a.16. Αψίνθιον,

Αἰγύπτιοι σόμι, ῥωμαῖοι ἀψίνθιμ ῥύστικμ.

147.a.17. Θαλάσσιον,

οἱ δὲ σανδονίκιν καλοῦσι, οἱ δὲ σέριφον, ῥωμαῖοι σανδόνικμ.

147.b.13. Αβρότονον,

οἱ δὲ ἀβότονον, οἱ δὲ ἀψίνθιον, οἱ δ' ἡράκλειον, οἱ δ' χολοποιὸν· οἱ δὲ

aliqui topiariam, alii mamolariam, quidā crapulam vocant.

sylvestris,

Acantha sylvestris, quam Latini spinam agrestem vocant.

Leucacantha,

Quidam polygonaton, alii phyllon, alii ischiada vocant, Romani chiancarduum, Hethrusci spinam albam.

Eryggion.

Aliqui eryngen, alii erynerē, alii caryon, alii gorginion, alii hermion, alii origanum, chlounion, alii myracāthon, alii moly, Ægyptii crobyson, magi siserton, Romani capitulū Martis, Daci sicupnoëx, Hispani cētum capita, Aphri cherdam, alii oriam chloëm, alii chidā appellant.

Aloës,

Aliquibus amphibion, aliis herminion, aliis eryngion, aliis tragoceros, Romanis aloa, Barbaris aloë dicitur.

Absinthium,

Ægyptii somi, Latini apsinthium rusticum vocant.

Marinum,

sunt q̄ sandonicē, sunt q̄ seriphū, Romani sādonicū vocāt.

Abrotonum.

alii abutonon, alii absinthiū, alii heraclion, alii cholopœon,

alij absinthiomenon, alii thelyphthorion, alii procampylon, magi aëura phœnicos, alii cynanchitē, Romani absinthium ponticum, nonnulli thelythamnú, alii glycin ancona vocāt.

Hyssopum,

Latini hyssopū, alii later, alii casialam, Ægyptii pesalem.

Stachus,

Aliqui syncliopa, alii alcibiadem, alii pancration, nonnulli styphoniā, Ægyptii suphlo, Magi pythonis oculum, Romani sciolebinam vocitant.

Pulegium,

Alii blechron, alii arsencanthon, Latini pulegium vocant, Galli aluolú, Aphri apoleium, quidam galisopsim.

pulegium,

Aliis embactrō, aliis belouacos, alii artemedeion, aliis cretica, quibusdā ephemerō, nōnullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorcidion, aut helbuniō, Romanis vstilago rustica.

elisphacon.

Alii cioſmin, alii phagnon, Ægyptii becion, Romani saluiam vocant.

Mentha.

Latini mentham vocant, alii nepetam, Ægyptii tis, alii pherthrumerthumonthu, alij perxo,

οἱ δὲ θηλυφθόριον, οἱ δὲ ἀψινθιόμενον, οἱ δὲ προκάμπυλον, πρασῶδες νεῦρα φοίνικος, οἱ δὲ κυναγχίτιν, ῥωμαῖοι ἀψίνθιον πόντικον, πινὲς δὲ αὐτὸ θηλύθαμνον, οἱ δὲ γλυκὺν ἄγκωνα καλοῦσιν.

148.a.14. Υσσωπος.

ῥωμαῖοι ὑσσώπιμ, οἱ δὲ λάτ ξ, οἱ δὲ καταίαλα, αἰγύπτιοι πισαλέμ.

148.b.8. Στοιχάς,

οἱ δὲ συγκλίοπα, οἱ δὲ ἀλκιβιάδην, οἱ δὲ παγκράτιον, οἱ δὲ συοφωνία, αἰγύπτιοι σουφλὼ, πρασῶδες ὀφθαλμὸς πύθωνος, ῥωμαῖοι σκιολεβίνα.

149.b.33, Γλήχων.

οἱ δὲ βλῆχρον, οἱ δὲ ἀφάνκαρδον, ῥωμαῖοι πολεῖμι, ἀφροὶ ἀπολείμ, γάλλοι ἄλοολον, οἱ δὲ γαλίσοψις.

150.a.29. ἀγείαν.

οἱ δὲ ἔλδαξον, οἱ δὲ βελόκακος, οἱ δὲ ἀρτεμεδήιον, οἱ δὲ κρητικὴ, οἱ δὲ ἐφήμερον, οἱ δὲ ἔλδιαν, οἱ δὲ βελοτόκος, οἱ δὲ δορκίδιον, οἱ δὲ ἐλβήγιον, ῥωμαῖοι οὐστιλάγο ῥούστικα.

151.a.15. σφαγνὸν.

οἱ δὲ κίοσμιν, οἱ δὲ φάγνον, αἰγύπτιοι βήκιον, ῥωμαῖοι ἀπουσὶ, οἱ δὲ κόσμον, οἱ δὲ σάλβια.

151.b.2. μίνθη.

ῥωμαῖοι μλύτα, οἱ δὲ νέπεταμ, αἰγύπτιοι τὶς, οἱ δὲ φερδουμερθεσυμονθοὺ, οἱ δὲ περξὼ,

φρξὼ, οἱ δὲ μακηδό.

perxo, alij maceto.

151.b.28. ἡ δύσμον,

ὃ ῥωμαῖοι μυντάστρουμ καλοῦσι.

mentha,

quàm Latini mentaſtrum nominãt.

212.b.6. Θυμος,

οἱ δὲ θύμος λευκὸς, οἱ δὲ κεφαλωτὲς. οἱ ὃ ὀπιθυμὶς, οἱ ὃ θυρσιον. ῥωμαῖοι θούμιμ, αἰγύπτιοι στεφάνη, δακοὶ μόζυλα.

Thymum.

quidã thymũ albũ, quidã cephalothõ, alii epithymida, alij thyrſion, Latini thymũ, Ægyptii ſtephanen, Daci moſulã.

153.a.10. Ερπύλλος,

οἱ δὲ ξυγὶς ἀγρία, οἱ δὲ πόλιον, αἰγύπτιοι μερουόπυος, ῥωμαῖοι σερπύλλυμ, οἱ δὲ χερμλατικούμ.

Serpyllum,

aliqui Zygin ſylueſtrem, alii polion vocant, Ægyptii meruopium, Latini ſerpyllum, aut cicer erraticum.

153.b.7. Σαμψύχον,

οἱ δὲ τεῖφυλλον, οἱ δὲ ἀμάρακον, οἱ δὲ ἀγαθίδες, οἱ δὲ κνήκιον, οἱ δὲ ἄκαπνον, Πυθαγόρας θραμβὶς, αἰγύπτιοι σοφὸ, ἀρμένιοι μύρεον, ἀεσοφῆται ὄνος ἴχρεως, οἱ ὃ ἡμίγονος ἴσιος, ῥωμαῖοι μαιζουράνα.

Sampſuchum,

aliqui triphyllũ, aliqui nominant amaracum, alii triphyllõ, alii agathides, alii cnecion, alii acapnõ, Pythagoras thrãbem, Ægiptii ſopho, Armenii myuron, magi ichrei aſinũ, aut hecigonẽ Iſidis, Latini maioranã.

154.a.16. ὑσόβριον,

οἱ δὲ ὀριγανίδα καλοῦσιν.

Marum,

ſunt qui origanida appellãt.

154.b.2. ἄκονος,

οἱ δὲ ἄχριον βασιλικὸν, ῥωμαῖοι ὠκιμάστρυμ.

aconos.

aliis ſylueſtre baſilicum, Latini ocimaſtrum.

155.a.4. ἄρεινον,

οἱ δὲ ῥυτὶν ὀρεινὴν, ῥωμαῖοι ῥοῦτα μοντάνα, πήγανον κηπευτὸν, ῥωμαῖοι ῥοῦτα ὀρτένσις, αἰγύπτιοι ἐφνοῦβον, σύρι ἁρμαλᾶ, οἱ δὲ βησσὰ, ἀφρὶ χουρμᾶ

montana,

aliqui rhytem montanã, Latini rutam montanam, peganũ cepeutum Latini rutam hortenſem, Ægyptii ephnubum, Syri harmala, alii beſſa. Aphri churma vocant.

156.a. 6. ὀπλαδὴς ὄζι.

abdicatur.

Περὶ

Sylueſtris ruta.

Rutam ſylueſtrem, aliqui appellant hypericon, alii androſæmon, alii coron, alii chamæpityn, Romani hederalem, aut centonalé, Aphri churma ſemmaced. odor ſeminis reſino-ſus eſt, ideo chamæpitys aliquibus noninatur. Frutex eſt furculoſus, rubeſcés, folia rutæ figura: flores lutei qui digitis triti ſanguineo ſucco manãt, vnde andoſæmon vocitarũt. Ramuli ſubhirſuti, ſiliquæ teretes hordei effigie, in quibus ſemen nigrum reſinam olens: gignitur in cultis & aſperis. Vrinam ciet, menſes appoſitu trahit, pota cum vino quartana liberat. Folia cum ſemine ambuſtis illitu medentur, & diebus quadraginta epota iſchiadicos ſanant.

Moly,

aliq ſylueſtre leucoïon appellant. Ligueſticum,

Alii panaceam, alii panaces vocant.

ſylueſtris,

Aliqui ceraſcomen vocãt, Latini carotam, alii paſtinacam ruſticam, Ægyptij babibyru, Aphri ſicham.

Maſsilie-

Περὶ πηγάνου ἀγρίου.

Πήγανον ἄγριον, οἱ μὲν ὑπέρικον, οἱ δὲ ἀνδρόσαιμον, οἱ δὲ κόρον, οἱ δὲ χαμαιπίτυν, ῥωμαῖοι δὲ ἑδεράλις, οἱ δὲ σεντωνάλις, ἀφροὶ χοῦρμα σεμακεδ. διὰ δὲ τὸ τὴν ὦδὲ τὸ σπέρμα ὀσμὴν ἐοικέναι πιτύϊνη ῥητίνη ὠνόμασαν χαμαιπίτυς. φύλλα ἔχει πηγάνου παραπλήσια, θαμνίον φρυγανοειδὲς ὑπόυδρον· ἄνθος κίτρινον, ὃ διαβιβὲν ἐν τοῖς δακτύλοις, αἷμα τῶν χυλὸν ἐκκρίνει· ὄθεν καὶ ἀνδρόσαιμον ἐκλήθη, κλωνάρια ὑποδάσια, σπερμάτιον ἐν τῷ σπυρδεῖ ὅμοιον κριθῇ. ἐν ᾧ σπέρμα μέλαν, ῥητίνης ὄζον φύει· ἐν ἐργασίμοις καὶ βαχέσι χωρίοις. Δυώμεων ἔχει διυρητικὴν, καὶ ἐμμήνων ἄγωγὸν, σὺν σιδήμῳ τεταρταίου ἀπαλλακτικὴν μετ' οἴνου πινόμενον. τὰ δὲ φύλλα σὺν τῷ σπέρματι καταπλασσόμενα, καταχρίματα ἰῶν· θεραπεύει δὲ καὶ ἰσχιάδας ἐφ' ἡμέρας τεσσαράκοντα πινόμενον.

156.b.19. Μῶλυ,

οἱ δὲ Λευκοΐαν ἄγριον καλοῦσι.

158.b.2. Λιγυστικὸν,

οἱ δὲ πανάκειαν καλοῦσι, οἱ δὲ πάνακες.

159.a.10. ἄγριος,

οἱ δὲ κερασκόμιλυ, ῥωμαῖοι καρόταμ, οἱ δὲ παστινάκα ῥούστικα, αἰγύπτιοι βαβιβυρύ, ἀφροὶ σιχάμ.

159.b.

159.b.3.μασσαλεωτικὸν,
οἱ δὲ σφάγνον,
Massilienſe.
ſunt qui phagnon vocant.

159.b.27.σέσελι.
οἱ αἰγύπτιοι κυόνων φρίκιον καλοῦσι.
ſeſeli,
Ægyptij cyonũ phricen appellant.

160.a.15.Τορδύλιον,
οἱ δὲ τόρδυλον,
Tordylion.
nonnullis tordylon.

160.b.5.Ανισον,
οἱ δὲ σῖον, ῥωμαῖοι ἄνισουμ.
Aniſum,
aliqui ſion, Latini aniſũ dicũt.

161.a.1.Ανήθου,
ἄνηθον τὸ ἐνθερόμενον, οἱ δὲ πόλγιδος, οἱ δὲ ἀνίκητον, θεσφῖται γόνος κυνοκεφάλης, ὁμοίως βλέφαρον κυνοκεφάλου, οἱ δὲ γόνος ἑρμοῦ, αἰγύπτιοι ἀφροῦχον, ῥωμαῖοι ἀνήθουμ, ἀφροὶ σικκίεια, δακοὶ πόλπουμ.
Anethum,
Anethum quod eſtur, aliqui polgida vocant, alii anicetum, magi cynocephali genituram, aut capillos, alii Mercurii ſemen, Latini anethum, Aphri ſicciriam, Ægyptii arachu, Daci pulpum.

161.b.3.ἄγειον,
ῥωμαῖοι κύμινυμ ἀγρέστεμ, οἱ δὲ κύμενυμ σιλβάτικουμ.
cuminum,
Latini cuminum ſylueſtre, ſeu cuminũ ſyluaticũ appellãt.

162.a.2.Αμμι,
ῥωμαῖοι ἄμμιμ ἀλεξανδρίνυμ.
Ammi,
Latini Ammiũ alexãdrinũ.

162.a.25.κοριάνον,
αἰγύπτιοι ὄχον, ἀφροὶ χοῖδι.
Corianum,
Ægyptij ochion vocãt, Aphri gœd.

162.b.12.μέγα.
οἱ δὲ σογχίτην, ῥωμαῖοι λαμπούκα, ἀφροὶ σιδιλέας.
Magnum,
aliis ſonchites, Romanis lãpuca, Pœnis ſithileas.

162.b.28.μικρὸν,
οἱ δὲ καὶ τὸ σογχίτην καλοῦσιν, οἱ δὲ ἔντιμον ἄγριον, ῥωμαῖοι ἴντιβουμ ἀγρέστεμ, ἀφροὶ σιδιλέσαδ.
paruum,
aliq; ſonchitẽ, alii entimon agrion, Romani intybum ſylueſtrem vocãt, pœni ſithilaſdem.

163.a.23.Ορεοσέλινον,
οἱ δὲ πιδίνον, οἱ δὲ ὑδροσέλινον ἄγριον, ῥωμαῖοι ἄπιουμ ῥούστικουμ.
Eleoſelinum,
à quibuſdam pedinon, ab aliis hydroſe linon agrion, Romanis Apiũ ruſticũ appellatur.

Oreoselinum.

Aliqui petroselinũ sylvestre, Latini apiũ, Ægyptii anonim. dicitur,

Latinis olus atrum.

Elaphoboſco, aliq elaphicõ, alii nephriõ, alii ophigenió, nõnulli ophioctonõ, aliq herpyẽ, alii lymen vocãt, romani cerui ocellũ, Ægyptii chemin, Aphri aſcaucau.

hippomarathrum.

aliqui marathin, alii marathrũ agriõ, Ægyptii ſampſoth, magi thymarnoliõ, Latini fœniculum erraticũ, aliqui mion, Galli ſiſtrameor.

Delphinium.

aliis diachyſis, aliis diachytos aliis paralyſis, aliis camarus, aliis hyacinthᵒ, aliis delphinias, aliis nerió, aliis neriadion, aut ſoſandron, aut croniõ, Romanis bucinus minor vocitatur.

Pyrethrum,

aliqui doryenió, alii pyrinõ, alii pyrotõ, aut pyrothrõ, alii arnonpyriten, magi pyriten, Romani ſaliuarem vocant.

Sphondylius,

aliqui arágé vocant, alii phalangion, alii aſterion, nonnulli neſyrim, aut ſphondylin, quidam chorodanon, aut œnanthen, Romani herbá rutinalé, Ægyptii

163.a.28. Ορεοσέλινον,

οἱ δὲ πετροσέλινον ἄγριον, ῥωμαῖοι ἄπιον ἄγριον ἀνώνιμ.

163.b.26. καλῶσι.

ῥωμαῖοι δὲ ὅλυς ἄτρον.

164.b.24. Ελαφόβοσκον.

οἱ δὲ ἐλαφικὸν, οἱ δὲ νέφριον, οἱ δὲ ὀφιγένιον, οἱ δὲ ὀφιοκτόνον, οἱ δὲ ἑρπυλλὸν, οἱ δὲ λύμη, ῥωμαῖοι κερδοκέλλιμ, ἀγρύπνιοι χεμὶς, ἀφροὶ ἀσκαυκάυ.

165.b.3. Ὑππομάραθρον.

οἱ δὲ μάραθρον ἄγριον, ἀγρύπνιος σαμψὼς, σεσφῆ θυμαρνόλιον, ῥωμαῖοι φανίκκλυμ ἐρρατικὸν, οἱ δὲ φανίκκλος, οἱ δὲ κύνες, οἱ δὲ μύμ, γάλλοι σισραμεόρ.

166.a.18. Δελφίνιον.

οἱ δὲ διάχυσις, οἱ δὲ διαχυτὸς, οἱ δὲ παρέλισις, οἱ δὲ κάμαρος, οἱ δὲ ὑάκινθος, οἱ δὲ δελφίας, οἱ δὲ νήριον, οἱ δὲ νηριάδειον, οἱ δὲ σώσανδρον, οἱ δὲ κρόνιον, ῥωμαῖοι βύκινος μίνορ.

166.b.7.

οἱ δὲ δορύκνιον, οἱ δὲ πύρεθρον, οἱ δὲ πύρεωτον, οἱ δὲ πύρεωθρον, οἱ δὲ ἀγρὸς πυρέτης, σεσφῆται πυρέτης, ῥωμαῖοι σαλίβαεις.

168.a.2. Σφονδύλιον,

οἱ δὲ ἀράγγιον, οἱ δὲ φαλάγγιον, οἱ δὲ ἀστέριον, οἱ δὲ νίσυεις, οἱ δὲ σφονδυλὶς, οἱ δὲ χοροδάνον, οἱ δὲ οἰναίνθη, ῥωμαῖοι ἕρβα ρυπνάλις, ἀγρύπνιοι

αἰγύπτιοι ἀλαφὶς, ϖερσῶται ὄσιρις.

168.a.32. Ναρδηξ,
ῥωμαῖοι φέρουλαμ

168.b.14. Πευκέδανος,
οἱ μὲν ἄγριον, οἱ δὲ ἀγριόφυλλον, ϖερσῶν ἀγαθὸς δαίμων, οἱ δὲ πανασγελὲμ, ῥωμαῖοι πατάριον.

169.b.6. Μελάνθιον,
οἱ δὲ καὶ τοῦτο μήκωνα ἄγριον καλοῦσι μέλαναν, ῥωμαῖοι παπάβερ νίγρουμ.

173.b.3. Ἀμμωνιακὸν,
πόα ἐστὶν, ὅθεν τὸ ἀμμωνιακὸν θυμίαμα, οἱ δὲ ἀγάσυλλον, οἱ δὲ κριόθειον, οἱ δὲ ἡλίουσρον, ῥωμαῖοι γούττα.

175.b.2. Ἄλυσσον,
οἱ δὲ ἀσπίδιον, οἱ δὲ ἁπλόφυλλον, οἱ ἀκκύσητον, οἱ δὲ ἀδύσετον,

175.b.17. Ἀσκληπιάς,
οἱ δὲ κισσὸν, οἱ δὲ κισσόφυλλον καλοῦσι.

175.b.13. Ἀτραξυλὶς,
οἱ δὲ ἄμυρον, οἱ δὲ κνίκος ἀγρία, οἱ δὲ ἀσπίδιον, ϖερσῶται ἄφεδρος. αἰγύπτιοι χηνὸ, ῥωμαῖοι ϖροσέπιουμ, οἱ δὲ φουσσύγχεστις, οἱ δὲ κλόνουκα ῥούστικα.

176.a.13. Πολύκνημον,
οἱ δὲ κλινοπόδιον, οἱ δὲ πολυγόνατον, οἱ δὲ διὸς ἠλακάτη, οἱ δὲ ἐχεά-

Ægyptii asapher, magi osirin.

Ferula
Latini ferula dicitur.

Peucedanum,
aliqui agrion vocant, alii agriophyllo, magi bonũ dæmonem, Romani satariam.

Gith
alij mecona agrion melana, Romani papauer nigrum appellant.

Ammoniacum.
herba est ex qua ammoniacum fit suffimen, quod thymiama vocant, aliqui agazylon, alij criotheum, alii heliustrum, Romani guttam.

Alysson,
aliqui aspidion, alii haplophyllon, alii accyseton, alii adyseton nuncupant.

Asclepias
aliqui cision, alii, cissophyllon.

Atrachylis,
aliqui amyron vocant, alii cnicon sylueſtré, alii aspidion, magi aphedron. Ægyptii chenon, Romani præsepium, aliqui fusum agrestem, alii colum rusticam.

Polycnemon,
quidã clinopedion, alii polygonaton, alii iouis colum, alii echeo-

echeonymon vocant.

bibitur.

Edocuit experientia contritos in vino albo ramulos, iis qui affectibus laborant, quæ violentiæ vocãtur, magno esse præsidio.

Clinopodium,

aliqui cleonicon, alii acimoides, alii zopyron vocant.

Leontopetalon,

aliquibus leontopodion, aliis leuceoron, aliis leontion, aliis doris, aut doricteris, aliis lychnis agria, aliis pardale, aliis thorybethron, aliis rhapeion, aliis cornutum papauer, aliis anemone, Romanis patabelclum, aut semen leoninum dicitur.

placet,

aliis teucris.

Chamædrys,

Latinis tripsago minor dicit.

coronaria,

aliqui athanaton vocant, alii acylonion, alii ballarion, alii geranopodion, quidã corymbion, aliqui taurion, alii septron, aut maloion, Ægyptii semeon, magi sanguinem apocathemenes, Romani geniculatem aut ballariam.

sylueſtris,

aliâs tragonaton, aliâs atocion,

ἐχεώνυμον, ῥωμαῖοι πευπαλοχορτρία.

176.a. 23. οἶνῳ.

ἐδίδαξεν ἡ πεῖρα, ὡς ἀποτεθλιμμένων τῶν κλωναείων αὐτοῦ οἴνῳ λευκῷ τοὺς ἐχομένους τοῖς λεγομένοις βιαιοτάτοις μέγα βοήθημα.

176.a. 25. Κλινοπόδιον,

οἱ δὲ κλεόνικον, οἱ δὲ ἀκιμοειδὲς, οἱ δὲ ζώπυρον καλοῦσι.

176.b. 7. Λεοντοπέταλον,

οἱ δὲ λεοντοπόδιον, οἱ δὲ λευκόιον, οἱ δὲ λεόντιον, οἱ δὲ δωρεὶς, οἱ δὲ δωρικτερὶς, οἱ δὲ λυχνὶς ἀγρία, οἱ δὲ παρδάλη, οἱ δὲ θορύβηθρον, οἱ δὲ ῥαπήϊον, οἱ δὲ μήκωνα κερατίτης, οἱ δὲ ἀνεμώνη, ῥωμαῖοι πατάβελκλουμ, οἱ δὲ σπέρμα λεόντιον.

176.b. 25. χαμαίδρυος,

οἱ δὲ τευκρίδα,

177.a. 4. Χαμαίδρυς

ῥωμαῖοι τριφάγο μίνορ.

177.b. 7. στεφανωματική,

οἱ δὲ ἀθανάτου, οἱ δὲ ἀκυλώνιον, οἱ δὲ βαλλάριον, οἱ δὲ γερανοπόδιον, οἱ δὲ κορύμβιον, οἱ δὲ ταύρειον, οἱ δὲ σκῆπτρον, οἱ δὲ μαλόιον, αἰγύπτιοι σημεῖον, θεσσαλοὶ αἷμα ἀποκαθημένης, ῥωμαῖοι γηνικουλάριν, οἱ δὲ βαλλάριαν.

177.b. 14. ἀγρία,

οἱ δὲ τραγάνατον, οἱ δὲ ἀτόκιον,

κιον, οἱ δὲ ἱερακοπόδιον, οἱ δὲ λαμπὰς, αἰγύπτιοι σεμοῦρα, θεοφῆτται ἀποκαθημένης ταῦρος, ῥωμαῖοι ἴντιβουμ ἀγρέστεμ, οἱ δὲ λάπαθον, καφαλουίνα, οἱ δὲ σέριδος.

177. b. 24. βασιλικὸν,

οἱ δὲ κρινάθιμον, οἱ δὲ καλλείριον, θεοφῆτται αἷμα ἄρεως, ὀδάξης αὖρα κροκοδείλου, αἰγύπτιοι συμφωφὸν, οἱ δὲ τίλιος, ῥωμαῖοι λίνεμ, οἱ δὲ ῥόσα ἰκόνης, σύροι σισᾶ, ἀφροὶ ἀζιζλαθον.

178. a. 29. θεῖον.

οἱ δὲ νοφθὰν, οἱ δὲ νοτιανοσκέμιν, οἱ δὲ νόσφαωσον, οἱ δὲ ναθθεᾶς, οἱ δὲ νοχελὶς, οἱ δὲ νοσελὶς, οἱ δὲ νῶφρις, οἱ δὲ γνώθουεις, οἱ δὲ γνοτέρα, ῥωμαῖοι ἄπνιμ, οἱ δὲ μέδαταμ, οἱ δὲ ἀλκερέεια, οἱ δὲ μαεούσιουμ, οἱ δὲ καθουείνουμ, αἰγύπτιοι ἄσφος, οἱ δὲ ἔσκε, θεοφῆτται αἷμα ἰσίωνος.

178. b. 12. καλοῦσι.

οἱ δὲ μελίφυλλον, οἱ δὲ μελίφυλλον, οἱ δὲ ἐρυθρὰ, οἱ δὲ τημελῆ, ῥωμαῖοι ἀπιωστροῦ, οἱ δὲ κιτρέαγα, γάλλοι μεεισιμόριον.

179. a. 2. Περσίον,

οἱ δὲ εὐπατώριον, οἱ δὲ φυλλόφαρες, οἱ δὲ τειπέδιλον, οἱ δὲ καμηλοπόδιον, οἱ δὲ φιλόφαρες, αἰγύπτιοι ἀστερόπη, θεοφῆτται αἷμα ταύρου, οἱ δὲ ἄφεδρος, γόνος ὄφεως, ῥωμαῖοι μαβρούσιουμ, οἱ δὲ λαβεώνια

cion, aliâs hieracopodion, aut lampas vocatur, AEgyptiis semura, Magis apocathemenes taurius, Latinis intibum agreste, aliis lapathum, aliis steris.

Lilium,

Crinon basilicon, alii crinăthemon vocant, alij gallirion, Magi Martis sanguinẽ, Osthanes aurem crocodili, Ægyptij symphæphon, quidã tialon, Latini liliũ, aliqui rosam iconis, Syri sasa, Aphri abiblabon.

Vocant.

aliqui nophtan, alii notianoscemin, alii nospraſſon, alii nothera, alii nochelim aut nostelin, alii nophryn, alii gnotorim, alii gnotera, Romani apnium, aut medatam, aut vlcerariã, aut marrubiũ nigrum, alii cãthurinũ, Ægyptii asphon, magi Isionis sanguinem.

apiastrum,

alii melitæon, alii meliphyllon, alii erythran, alij temele, Latini apiastrum aut citraginẽ, Galli merisimorion vocant.

Marrubium,

alii eupatorion, alii phyllophares, alii tripedilon, alii camelopodion, Ægyptii asteropen, magi tauri sanguinẽ, aliqui aphedron, alii Horu genituram, Latini marrubiũ, aliqui labeo-

labeoniã, Aphri atierberziam.

Phyllitis,

aliqui phyllin, alii acauló, alij ſylueſtre lapathum vocitant.

Aſphaltium,

Latini trifolium, aut trifoliũ acutum odoratum.

Polium.

montanum, aliqui teuthrion, alii pheuxaſpidion, alii achamenin, alii ebenitin, alii meloſmon, nonnulli belion, quidam leonthocharon vocant.

SCORDIVM,

aliqui ſcorbion, alij pluritin, alij dyſoſmon, alii ſylueſtré calaminthé, quidã chamędryn, alii mithridanion, magi Podotis ſanguinẽ, Ægyptii apho, Romani triſaginẽ paluſtré appellant.

Tuſsilagini,

Bechion quidã rhichion, alii petrinã vocãt, alii peganon, alii pithion, alii pagonaton, alii chamæleucen, alii procheton, alii arcophyton, chamęgeron, Ægyptii ſaarthan, Latini tuſsilaginem, quidam pharphariã aut puſtulaginem, Beſsi aſa.

Artemiſia

quibuſdam polyclonos aliis monoclonos, aliis toxiteſia, aliis epheſia, aliis anactorios, aliis ſozuſa, aliis leia, aliis licophryx, magis hominis ſanguis, aliis

λαζωνία, ἀφεσὶ ἀπεργέριζα.

179.b. 14. Φυλλίτης,

οἱ δὲ φύλλις, οἱ δὲ ἄκαυλον, οἱ δὲ λάπαθον ἄγριον καλοῦσι.

180.a. 14. τριῖον,

ῥωμαῖοι τειφόλιουμ, οἱ δὲ τειφόλιμμ ἀκέντρωμ ὀδοράτωμ.

180.b 17. Πόλιον,

τὸ ὀρεινὸν, οἱ δὲ τεύθριον, οἱ δὲ φευξαπίδιον, οἱ δὲ ἀχαμενὶς, οἱ δὲ ἐβενίτις, οἱ δὲ μελόσμιον, οἱ δὲ βέλιον, οἱ δὲ λεοντόχαρον.

181.a. 2. Σκόρδιον,

οἱ δὲ σκόρβιον, οἱ δὲ πλευρῖτις, οἱ δὲ δύσοσμον, οἱ δὲ καλαμίνθη ἀγρία, οἱ δὲ χαμαίδρις, οἱ δὲ μιθριδάτιος, ῥεοφῶται αἷμα πόδοτος, αἰγύπτιοι ἀφὼ, ῥωμαῖοι φεξάγω παλούστρις.

181.b. 2. Βήχιον

οἱ δὲ ῥίχιον, οἱ δὲ πετρίνη, οἱ δὲ πήγανον, οἱ δὲ πίδιον, οἱ δὲ παγώνατον, οἱ δὲ χαμαιλεύκη, οἱ δὲ πρόχετον, οἱ δὲ ἀρκόφυτον, οἱ δὲ χαμαίγειρον, αἰγύπτιοι σααρδὰ, ῥωμαῖοι τουσιλάγω, οἱ δὲ φαφφάριαμ, οἱ δὲ πουστυλάγω, βέσσοι ἀσᾶ.

181.b. 23. Ἀρτεμισία

οἱ δὲ πολύκλωνος, οἱ δὲ μονόκλωνος, οἱ δὲ τοξίτης, οἱ δὲ ἐφεσία, οἱ δὲ ἀνακτόριος, οἱ δὲ σώζουσα, οἱ δὲ λεία, οἱ δὲ λυκόφρυξ, ῥεοφῶται αἷμα ἀνθρώπου,

οἱ δὲ

οἱ δὲ χρυσάνθεμον, ῥωμαῖοι ἐαλέντια, οἱ δὲ σερπίλλουμ, οἱ δ' ἕρβα ρέγια, οἱ δὲ ῥαπίνμ, οἱ δὲ τερτανάγετα, οἱ δὲ ἀρτεμίσιαμ, γάλλοι πονὲμ, δακοὶ ζουόστ.

182.b. 3. Ἀρτεμισία,
ῥωμαῖοι κάπρουμ σιλβάτικουμ, οἱ δὲ ἄπουμ ῥύστικουμ, αἰγύπτιοι μερστεώ.

182.b. 29. Γεράνιον
οἱ δὲ πελωνῖτις, οἱ δὲ τέτρα, οἱ δὲ γερανογέρων, ῥωμαῖοι σύχνα στρουμ, ἀφρικὶ ἰέσκε.

182. β. 35. γεράνιον,
οἱ δὲ μυρτεύξ, οἱ δὲ ὠξύφυλλος, οἱ δὲ καρδάμωμον, οἱ δὲ ὀρίγανον, ὑφ' ὧν τινες ἱερόβρυγκας, ῥωμαῖοι πουλμωνία, οἱ δὲ κικοτρία, οἱ δὲ γρουΐνα, ἀφρικὶ ἰέσκε.

183.a. 8. Γναφάλιον,
οἱ δὲ ἱρὶς, οἱ δὲ ἀμπέτοκος, οἱ δὲ ἀνάξιτον, οἱ δὲ ἀναφαλὶς, αἰγύπτιοι σιμεών, γάλλοι γελασονὲν, ῥωμαῖοι κέντουλουμ, οἱ δὲ τουκούλαεις, οἱ δὲ ἀλβίνους.

183. b. λεύκιον,
οἱ δὲ χαμαιπίτυος.

133.b. ἁμόζει.
Περὶ κονύζης μεγάλης. Κεφ.
Κόνυζα μεγάλη, οἱ δὲ κυνοζεματῖτις, οἱ δὲ δανάϊς, οἱ δὲ ταναχίον, οἱ δὲ φύκος, οἱ δὲ ἰσχὺς, οἱ δὲ δύσπνοος, ὑφ' ὧν τινες βρεφοκτόνος, οἱ δὲ ἀνουβίας, οἱ δὲ ὑδρεμίας,

aliis chrysanthemon, Romanis valentia, aut serpillum, aut herba regia, aut artemisia, aliis rapium, aut tertana, Gallis pona, Dacis zuoste dicitur.

Ambrosia,

Latini caprum syluaticum, alii apium rusticum, Ægyptii merseon.

GERANION,

aliqui Pelonitin, alii tricā, alii geranogeronta, Romani vchinastrū, Aphri iescen appellant.

alterum,

aliqui mertryga, alii myrrhin, alii oxyphyllon, alii cardamomon, alii origanū vocāt, magi hierobryncas, Latini gruinam, aut pulmoniā, aut cicotriam.

GNAPHALII,

alii hires, alii ampetocon, alii anaxiton, alii anaphalim, Ægyptii semeon, Galli gelasonen, Latini centumculum vocant, quidam tucularem, alii albinum.

OENANTAE,
alii cerascomium vocant.
conuenit.

conyza magna. Cap.
Conyza magna, aliqb⁹ cynozematitis, aliis danais, aliis tanachiō, aliqbus phycos, aliis ischys, aliis dysnosmos, magis brephoctonos, quibusdā anubias, nōnullis hede-

nonnullis hedemias, Ægyptiis ceti. Romanis intybū, aut militaris, aut deliariū, aut febrifuga, aliis phragmosa, aliis musteros, aliis pissa nuncupatur.

sanat.

aliqui conyzam paruam, alij panion, alii libanotidem, magi cronon vocant.

HEMEROCALLIS,

alij hemerocatalacton, alij crinon agrion, alii crinanthemon, alii porphyrātes, alij bulbum hæmaticon, alii anticantharon, Ægyptii iocri, Romani bulbum, aut lilium syluestre, aut marinū, Aphri abiblabon vocant.

Leucoion,

aliqui basilion vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

erythralcon,

alii melion aqueum, alii entaticon, alii priapicon, aut satyriscon, aliqui satyri testiculum appellāt, Latini molorticulum Veneris.

HORMINON,

Latinis geminalis, Dacis hormia dicitur.

altera.

Nymphæam aliam sunt qui nym-

ἡμίας, αἰγύπτιοι κέπι, ῥωμαῖοι ἴντιβουμ, οἱ δὲ μιλιτάρεις μίνα, οἱ δὲ ἑλλιάριον, οἱ δὲ φεζεφύγγα, οἱ δὲ φραγμώδη, οἱ δὲ μουστεγί, οἱ δὲ πισάν.

184.a.12. ἰᾶται.

οἱ δὲ κόνυζα μικρὰ, οἱ δὲ πάνιος, οἱ δὲ λιβανωτὶς, θεσσαλικὸν χρόνος.

184.a.22. Ημεροκάλλις,

οἱ δὲ ἡμεροκατάλακτον, οἱ δὲ χρῖνον ἄγριον, οἱ δὲ κρινάνθεμον, οἱ δὲ πορφυρανθὲς, οἱ δὲ βολβὸς ὁ αἱματικὸς, οἱ δὲ ἀντικάνθαρον, αἰγύπτιοι ἰοκροὶ, ῥωμαῖοι βούλβουμ, οἱ δὲ ἕλειουμ ἀγρέστεμ, οἱ δὲ ἕλειουμ μαείνουμ, ἀφρικὴ ἀβίβλαβον.

184.b.5. Λευκόϊον,

οἱ δὲ βασίλειον, ῥωμαῖοι ὁπτουλα ἄλβα, οἱ δὲ βίολα ἄλβα, οἱ δὲ ἀυγουστία, οἱ δὲ βίολα ἀπατρωνάλεμ, οἱ δὲ παστερίνα, οἱ δὲ πλύφουρα.

186.a.20. ἐρυθρᾴϊκὸν

οἱ δὲ μήλιον τὸ ἐν ὕδασιν, οἱ δὲ ἐντατικὸν, οἱ δὲ πριαπικὸν, οἱ δὲ σατυρίσκος, οἱ δὲ ὄρχις σατύρου, ῥωμαῖοι μολορτίκουλουμ Βένεριος.

186.a.33. ὄμμεγν,

ῥωμαῖοι γεμινάλις, δακοὶ ὁρμία.

187.b.12. ἄλλη.

Νυμφαία ἄλλη, οἱ δὲ νυμφαία

να καλοῦσι.

187.b.24. Ανδρόσακες,

οἱ δὲ πικράδα, οἱ δὲ λεύκιον, οἱ δὲ θαλασσίαν καλοῦσι.

188.a. 4. πέρυξ,

οἱ δὲ λογχῖτις, οἱ δὲ ἀτούριος, οἱ δὲ φρυγία, οἱ δὲ φρυγῖτις, οἱ δὲ φιλτροδότης, μαγοῦται αἷμα γάλης.

188.a. 35. Ανθυλλὶς,

οἱ δὲ ἀνθυλλον, οἱ δὲ ἀνθεμίδα, οἱ δὲ ἐραίνθεμις, οἱ δὲ λευκάνθεμον, οἱ δὲ σωρανθὶς, οἱ δὲ αὐθος πεδινὸν, ῥωμαῖοι σωλάστρουμ καλοῦσι.

180.b. 27. καλλίαν,

ῥωμαῖοι μάλιυμ, ἀφρεσὶ ἀσπρτφὴν, ἕτεροι δὲ χρυσοκόμιον.

189. b. 3. λευκάνθεμον,

οἱ δὲ ἀνθεμὶς, οἱ δὲ χαμαίμηλον, οἱ δὲ χρυσόκαλις, οἱ δὲ μελάβαθρον, οἱ δὲ αὐθος πεδινὸν, ῥωμαῖοι σώλις σπρουλουμ, οἱ δὲ μιλλεφόλιουμ, θοῦσκοι καυταὶ, ὠφρεσὶ θαμακθ.

189.b. κάχλαμ,

οἱ δὲ βαλσαμίδην, μαγοῦται αἷμορῥόα, οἱ δὲ γόνος ἑρμοῦ, οἱ δὲ γόνος ἄφθιτος, οἱ δὲ μνησίθεος, ῥωμαῖοι καππακορανία, ἀφρεσὶ ναρὰτ.

189.b. 35. πεντόβορον,

πυωγία ἄῤῥιν, οἱ δὲ ὀροβέλιον, οἱ δὲ ὀροβὰξ, οἱ δὲ αἱμαγωγὸν, οἱ δὲ

nymphonem appellant.

ANDROSACES,

sunt qui picrada appellent, alii leucen, alii thalassiam.

Hemionium,

alii lonchitim, alii aturion, alii phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtrodoten, magi mustelæ sanguinem.

ANTHYLLIS,

quidam anthyllon, alii anthemida vocant, alii eranthemin, alii leucanthemon, alii soranthin, alii campestrem florē, Romani solastrum.

Anthemidis,

quam Romani maliū. Aphri astertiphen appellant.

vocant,

alii anthemida, alii leucāthemō, alii chamæmelon, alii chrysocalin, alii melabathron, nōnulli campestrem florem, Latini solis seculum, aliqui millefolium, Hetrusci cautan, Aphri thamath.

cachlam,

Alii balsamenam, Magi hæmorrham, alii Mercurii geniturā, alii aphthitis semen, aut mnesitheum, Romani cappacoraniam, Aphri narat.

dicitur,

aliis orobelion, quibusdam orobax, aliis hæmagogon, aliis

liis pæsæden, aliis monogenion, aliis meonion, aliis pæonion, aliis panthiceratos.

dactylos,

aliis aglaophotis, aliis theodonion, aliis selenion, magis selenogonon, aliis phthisis. Romanis casta.

Lithospermon,

alii leontion, alii leoninum lapidē, alii gorgonion, alii tantalitin, alii diosporon, Romani columbam, Daci gonoletam.

Erythrodanum.

Aliqui euthrion, alii dracanon, alii cinnabarim, Latini rubiam, Hetrusci lappam minorem, AEgyptii sophobi vocant.

Lonchitis,

aliâs cestron aut meduſa dicitur, Latinè venerea aut lanceola.

dicunt,

Latini longinā, aut calabrinā.

vocant,

quidam althiocon vocant.

satiua,

aliqui cannabion, alii schinostrophon, alii asterion appellarunt.

cannabis,

aliqui hydrastinam, Latini terminalem, alii cannabem vocant.

Ana-

οἱ δὲ παιτάδιον, οἱ δὲ μογοχίμενον, οἱ δὲ μιλίον, οἱ δὲ παιόνιον, οἱ δὲ πανδικέρατος.

189.b. 35. δακτύλος,

οἱ δὲ ἀγλαοφώτιδα, οἱ δὲ διόδωνον, οἱ δὲ σεληνίον, τερεφῶτα σεληνοῦχον, οἱ δὲ φθίσι, ῥωμαῖοι κάστα.

190.b. 7. ἐξώνυχον,

οἱ δὲ λεόντιον, οἱ δὲ λίθος λεοντικὴ, οἱ δὲ γοργόνιον, οἱ δὲ ταντιλίτις, οἱ δὲ διόσπορον, ῥωμαῖοι κολύμβαμ, δακοὶ γονολήτα.

191.a. 2. ἐρευθόδανον,

οἱ δὲ ἐρυθρόδανος ῥίζα, οἱ δὲ δράκαινα, οἱ δὲ κιννάβαρις, ῥωμαῖοι ῥουβία σανγίνα, δοῦσκοι λάμπα μίνωρ, αἰγύπτιοι σωφοβί.

191.b. 2. Λογχῖτις,

οἱ δὲ κίστον, ἢ μεδοῦσα, ῥωμαῖοι βενέρεα, οἱ δὲ λογχέολα, πλατυκέρατος.

191.b. 22. τραχεῖαν,

ῥωμαῖοι λογγινὰ, οἱ δὲ καλαβρίνα.

191.b. 30. καλὸν,

οἱ δὲ ἀλθίοκον,

192.b. 17. Κανάβις,

οἱ δὲ κανάβιον, οἱ δὲ σχινοστρόφον, οἱ δὲ ἀστέριον, ῥωμαῖοι κάνναβιμ.

192.b. 28. ὑδρασ-

τίνα,

οἱ δὲ ὑδράστινα, ῥωμαῖοι τερμίναλις, οἱ δὲ κάνναβις.

193.a.

193. a. 9. ἄκοπον,
οἱ δὲ ἀγριάκοπον.

193. b. 27. Ονοβρυχὶς,
οἱ δὲ ὀνοβρόχειλος, οἱ δὲ ἐχασμήνη, οἱ δὲ ὑπερικὸν, οἱ δὲ κόριον, οἱ δὲ χαμαιπίτυν, ῥωμαῖοι ὀπάκα, οἱ δὲ βριχλατὰ, οἱ δὲ λόπα, οἱ δὲ ἰσκιναλὲν, δακοὶ ἀνιασσεξέ.

195. a. 13. Χαμαιπίτυς,
οἱ δὲ πιτυόρυσον, οἱ δὲ ὀρέζηλον, οἱ δὲ βριονίαν ἀγρίαν, περσῶται αἷμα ἀθλωᾶς, ῥωμαῖοι κυπρεπῦμ, δακοὶ δοχελᾶ.

197. b. 8. Ἄρρεν,
οἱ δὲ πολυγόνατον, οἱ δὲ κυνοχάλιν, οἱ δὲ ἡρακλειαν, οἱ δὲ ἄσφαλτον, οἱ δὲ χιλιόφυλλον, οἱ δὲ κλῆμα, οἱ δὲ πολύκαρπον, οἱ δὲ καρκίνηθρον, οἱ δὲ πευθαλίδα, οἱ δὲ μυρτοπέταλον, οἱ δὲ κνωπόδιον, οἱ δὲ ζαριτέα, οἱ δὲ πεδάλιον, αἰγύπτιοι τεφὶν, οἱ δὲ στεμφὶν, περσῶται γόνος ἥρωος, οἱ δὲ ὄνυξ μυδὸς, ῥωμαῖοι στυπάλις, οἱ δὲ στοπάκα, ἀφρικὴ χουλοῦ.

198. a. 3. Θῆλυ,
ῥωμαῖοι στυπάλις,

198. a. 31. πολυγονοειδὲς,
οἱ δὲ φιλεταίειον,

198. b. 12.

Anagyris,
quidam agnacopũ vocant.

Onobrychis,
aliqui onobrochilon, alii eschasmenen, alii hypericon, alii corion, alii chamæpytin, Romani opacam, alii brichilatam, alii loptam, alii iocinalem, Daci aniassexe appellant.

Aiuga.

aliis pityforyfis, aliis orizelon, iis qui Pontum incolunt olocyron, aliis bryonia fylueſtris, magis Mineruæ ſanguis, Latinis aiuga aut cypripum, Dacis dochela appellatur.

mas,
aliqui polygonatum appellant, alii cynochalam, alii heraclia, alii aſphalton, alii chiliophyllon, alii clema, alii polycarpon, alii carcinethron, alii teuthalida, alii myrto petalon, alii cnopodion, alii zaritheam, alii pedalion AEgyptii tephin, alii ſtemphin, Magi genituram herois, alii vnguem muriſo, Latini ſeminalem, alii ſtopinacem vocant, Aphri chulum,

fœmina,
Latinis ſeminalis dicitur.

Clematis,
aliqui philetorium vocant.

terrenis.

Clematis altera. Cap.

clematidā alterā, sunt qui epigetida vocēt, Ægyptii phylacuon, Latini ambuxū. Viticulā ex se mittit rubentem, vitiliū modo lētā. Foliū habet quod acer rimū in gustu sit & exulceret. Circūuoluit se, scandetq; arbores, hederæ quā smilacē vocāt modo. Tritū semē eius in aqua mulsāve aqua potū, per inferna bilem & pituitā trahit. Pellunt lepras folia, emplastri modo ípolita. Ipsa sale cū lepidio conditur & seruatur ad cibos.

pecton,

Latini soldaginem.

Stœbe,

quidā tobion, Latini stipam appellant.

Clymenum,

Alii calycanthemon, alii periclymenon, alii heliophyes, nonnulli hepatitim, alii misacen, alii anatolicon, alii dyticon, alii merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Ægyptii oxyui, alii clymenon, alii clymenion, quod & agonon nuncupant.

Periclymenon,

Aliqui Æginā, alii clymenon, alii carpathō, alii splenion, alii epætitim, alii axinam maioré, non-

198.b. 12. χέρσις.

Περὶ κληματίδος ἑτέρας. Κεφ.

Ετέρα κληματὶς, οἱ δὲ ὀπωγῶπις, αἰγύπτιοι φυλάκουον, ῥωμαῖοι ἀμβουξοῦ, κλῆμα ἀνίσην ἐρυθρον, λυγώδες, φύλλον δεινὸν λίαν γευσαμένῳ καὶ ἑλκωτικὸν, περιελίπεται δὲ τοῖς δένδρεσιν ὡς σμίλαξ, ταύτης ὁ καρπὸς λεῖος μετ' ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος ποθεὶς, ἄγει κάτω φλέγμα καὶ χολὴν, τὰ δὲ φύλλα καταπλασθέντα λέπρας ἀφίστησι. παρεχύεται δὲ μετὰ τοῦ λεπιδίου εἰς βρῶσιν.

199.a. 28. πεκτὶν,

ῥωμαῖοι σολδάγινεμ.

199.b. 31. Στοιβὴ,

οἱ δὲ τόβιον, ῥωμαῖοι στίπαμ,

200.a. 4. Κλύμενον,

οἱ δὲ καλυκάνθεμον, οἱ δὲ περικλύμενον, οἱ δὲ ἡλιοφυὲς, οἱ δὲ ἡπατῖτις, οἱ δὲ σμίλαξ, οἱ δὲ ἀνατολικὸν, οἱ δὲ δυτικὸν, οἱ δὲ μεργίνη, ῥωμαῖοι οὐόλουκεσυμ, οἱ δὲ οὐόλουκεσυμ μάϊους, αἰγύπτιοι ὀξιούϊ, κλύμενον, οἱ δὲ κλυμένιον, ὃ καὶ ἄγωγον καλοῦσι.

200.a. 22. Περικλύμενον,

οἱ δὲ αἴγινη, οἱ δὲ κλύμενον, οἱ δὲ κάρπαθον, οἱ δὲ σπλήνιον, οἱ δὲ ἐπαιτῖτις, οἱ δὲ ἀξίνη μείζων,

οἱ δὲ

οἱ δὲ κλιματῖτις, οἱ δὲ μυρσίνη, οἱ δὲ καλυκάνθεμον, Θεσσαλοὶ πόλιον ἀφροδίτης, αἰγύπτιοι τυῦρκον, ῥωμαῖοι οὐόλκερυμ μαίους, ἀφροὶ λανάθ.

200.b.14. τρίβολος,

οἱ δὲ βουκέφαλος, οἱ δὲ ταυροκέρως, ῥωμαῖοι τρίβολυμ ἀκρόπτερυμ.

201.a.12. ἄρυς.

Περὶ Σαξιφάγου. Κεφ.

Σαξίφαγον, οἱ δὲ σαξίφραγγον, οἱ δὲ ἔμπετρον, ῥωμαῖοι σαξιφράγα. Θάμνος ὀξὺ φρυγανώδης ἐν πέτραις καὶ τραχέσι τόποις φυόμενος ἐμφερὴς. Δύναμιν δὲ ἔχει ἐφθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ πινομένη πυρέττουσι βοηθεῖν, στραγγουρίᾳ τε καὶ λυγμῷ· λίθους τε τοὺς ἐν κύστει θρύπτειν καὶ οὖρα ἄγειν.

201.a.14. γογγυλίδες,

οἱ δὲ ποταμογείτων, οἱ δὲ λογχῖτις, οἱ δὲ ῥαπονγκίου, μυσὸς μυθδεστὰ, σύροι μεούδα, οἱ δὲ λυκοσέμφυλλον, οἱ δὲ ἑλλεβοροσήματα, οἱ δὲ σκύλλιον, Θεσσαλοὶ λύκου καρδίαν, ῥωμαῖοι βιάρτουμ νίγρουμ, οἱ δὲ πυτίναξουμ τέρρας, γάλλοι ἰαμβαροῦμ, δακοὶ δάκινα.

201.a.27. Λαγώπους,

οἱ δὲ λαγωὸς κύμινον καλοῦσι.

201.a.33. Μήδιον,

οἱ δὲ μηδικὴ, οἱ δὲ τρίφυλλον, οἱ δὲ κλη-

nónulli clematitim, alii myrsinē, alii calycāthemon, magi polion Veneris, Ægyptii turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

TRIBVLI,

aliquibus bucephalus, aliis tauroceros, Romani tribulus aquaticus dicitur.

faciunt.

Sarxiphagon. Cap.

Sarxiphagon, aliqui sarxiphrangon, alii empetron, Romani saxifragiam vocāt: frutex est furculosus, in petrosis & asperis locis nascens, epithymo similis. Cocta in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur, stranguriæ prodest: singultum sedat: calculū in vesica frangit, & vrinam ciet.

Limonium,

Aliquibus potamogiton appellatur, aliis lonchitis, aliis rapionion, Mysis mēdruta, Syris meūda, aliis lycosemphyllon, aliis helleborosemata, aliis scyllion, magis lupicor, Romanis viartum nigrū, quibusdam tintinabulū terræ, Gallis iumbarum, Dacis dacina.

Lagopus,

aliqui leporis cuminū vocāt.

MEDION,

aliqui medicā appellant, alii

triphyllon, alii clematon, nō-
nulli osmon, quidā trigonon,
alii cybellion, alii polyphyllō,
Romani trifolium odoratum,
Ægyptii epaphon.

Epimedium,

ab aliis erineos, ab aliis thry-
as, à nonnullis pollyrrhizon, à
Romanis vindicta nominatur.

machæronion,

aliqui anactorion, alii phas-
ganon, alii machæronion, alii
arion vocant, Romani gladio-
lam, quidam genitalem.

Sparganion,

aliqui xiphidion, alii bolon
appellant.

XYRIS,

ab aliquib⁹ iris agria, ab aliis
cacos, à Romanis gladiolus, aut
iris agrestis, à Dacis apr⁹ dicit.

onocleia,

aliqui catanchusam vocant,
alij libycam, alii archibellion,
alii alcibiadiō, alii onophyllō,
alii porphyrida, alii myduſam,
alii ſalyca, alii noneam, Aphri
buineſath.

ECHION.

Latinis alcibacum dicitur.

vocant,

ſunt & qui echion appellāt,
alii ſcorpiuron, alii ſparganon,
alii althæam, alii amaranthi-
dem, alii probatæum, alii ela-
phium,

δὲ κνημάπιον, οἱ δὲ ὀσμὸς, οἱ δὲ τρίγωνος, οἱ δὲ κυβέλλιον, οἱ δὲ πολύφυλλον, ῥωμαῖοι τριφόλιουμ ὀδοράτουμ, αἰγύπτιοι ἐπάφου.

201.b. 11. Επιμήδιον,

οἱ δὲ ἐρινεὸς, οἱ δὲ θρυαὶ, οἱ δὲ πολύῤῥιζον, ῥωμαῖοι οὐιν-δίκτα.

201.b. 23. μαχαιρώνιον,

οἱ δὲ ἀναικτόριον, οἱ δὲ ἄρειον, ῥωμαῖοι γλαδίολαμ, οἱ δὲ γβιτάλεμ.

202.a 20. Σπαρ-
γάνιον,

οἱ δὲ ξιφίδιον, οἱ δὲ βῶλον καλοῦσι.

202.a. 27. Συεὶς,

οἱ δὲ ἶριν ἀγρίαν, οἱ δὲ κακὸς, ῥωμαῖοι γλαδίολουμ, οἱ δὲ ἴριμ ἀγρέστεμ, δακοὶ ἄπρις.

202.b. 20. ὀνόκλειαν.

οἱ μὲν κατάγχουσαν, οἱ δὲ λιβυκὴν, οἱ δὲ ἀρχιβέλλιον, οἱ δὲ ἀλκιβιάδιον, οἱ δὲ ὀνόφυλλος, οἱ δὲ πορφυρὶς, οἱ δὲ μύδουσα, οἱ δὲ σάλυξ, οἱ δὲ γωνεὰν, ἀφρὶ βυνεσάθ,

203.b. 19. κίχιάδιον,

ῥωμαῖοι ἀλκιβίαχουμ.

204.a. 5. φιλεταίριον,

Οἱ δὲ καὶ ταύτην ἔχιον καλοῦσιν, οἱ δὲ σκορπίουρον, οἱ δὲ σπάργανον, οἱ δὲ ἀλθαίαν, οἱ δ' ἀμαραντίδα, οἱ δὲ προβαταῖαν, οἱ δὲ ἐλά-

οἱ δὲ ἐλάφιον, οἱ δὲ ἀντίμιμον, οἱ δὲ πορφυρίδα, οἱ δὲ αὐγίον, οἱ δὲ νεμέσιον, οἱ δὲ ὑαινόφολον, οἱ δὲ θυρσίτιν, οἱ δὲ θερμοῦτιν, οἱ δὲ μισόπαθος, ῥωμαῖοι ὠκιμάστρουμ.

204.a. 18. Ερινος,

οἱ δὲ ὠκυμοειδὲς, οἱ δὲ ὑδρηλὸν, ῥωμαῖοι ὤκιμουμ.

204.a. 32. Αγρωστις,

οἱ δὲ αἰγικὸν, οἱ δὲ ἀμαξίτις, αἰγύπτιοι ἀνουφὶ, ῥωμαῖοι γράμμ, οἱ δὲ ἀσυφύλλουμ, οἱ δὲ σαγγουινάλεμ, οἱ δὲ οὐνίολαμ, ἱσπανοὶ ἀπαρία, δακοὶ κοτίατα, ἀφροὶ ἰεβάλ.

205.a. 5. ἱερακλεια,

θεσσῆται γόνυ, οἱ δὲ αἷμα τιτᾶνος, οἱ δὲ οὐρὰ σκορπίου, Πυθαγόρας πάρμιρον, ἀνδρέας ξανθοφανέα, ὀσθάνης βούφθαλμον, αἰγύπτιοι σενδιονὰρ, ῥωμαῖοι οὐερτούμνουμ, οἱ δὲ σολεάστρουμ, ἀφροὶ ἀδήδονιν.

205.b. 15. σιδηῖτις,

οἱ δὲ μυριόμορφον, οἱ δὲ χιλιόφυλλον, οἱ δὲ στρατιωτικὸν, οἱ δὲ ἡρακλεον, ῥωμαῖοι συνσερίλιαμ βένερεις, οἱ δὲ ἄκρυμ σιλβάτικουμ, οἱ δὲ μιλιτάρεμ, οἱ δὲ μιλλεφόλιουμ, ἀφροὶ ἀστὴρ χιλλός.

205.b. 34. Βάτος,

οἱ δὲ κυνόσβατον, οἱ δὲ σιλυνοείτιον, οἱ δὲ ἀσυντρόφον, θεσσῆται αἷμα πτάου, οἱ δὲ αἷμα ἴδεως

phium, alii antimimon, alii porphyridem, alii augion, alii nemesion, alii hyænosopsolon, alii thyrsitem, alii thermutim, alii misopathon, Latini ocimastrum.

Erinus,

aliqui ocymoides, alii hydreron, Latini ocimum vocant.

GRAMEN,

aliqui ægicon, alii amaxitin, Ægyptii amphi vocant, Latini gramen, aliqui asuphyllion, alii sanguinalem, alii vniolam, Hispani apariam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

hieracleam,

Magi genituram, aut sanguinem Titani, alii scorpionis vrinam, Pythagoras parmirũ, Andreas xãthophanea, Osthanes boephthalmon, Ægyptii sendionor, Romani vertemnũ, alii soleastrum, Aphri vdedonin.

sideritis,

Aliqui myriomorphon nominant, alii chiliophyllon, alii stratioticon, alii heracleon, Latini superciliũ Veneris, alii acrõ syluaticon, alii militaré, alii millefolium, Aphri stellam chilli.

Rubus,

ab aliis cynosbatos, ab aliis selinorition, ab aliis asyntrophos, à magis Titani sanguis, ab

aliis ibidis sanguis, à Romanis rubus, ab aliis sentes, à quibusdam mora baticana, à Dacis mantia, ægyptiis hæmoos, aliis ametros appellatur.

Helxine,

sunt qui elitin, qui canocersę̃, qui amelxiné, qui eusinem, qui amorginé, qui scuthacon, qui psychuacon, q̃ melãpelõ, qui cittampelõ, qui cissanthemon, qui anatetamenõ, Latini bulutulaparu, q̃ parthenió, qui sideritim, qui heracliã, qui agriã, Ægyptii hapap, qui clibodion, qui polyonymon vocẽt. Nascitur in septis, parietibus & vinetis. Coliculos habet aliquo rubore coloratos. Folia mercuriali herbæ similia & hirsuta. circa caules veluti exigua semina, aspera, vestibus hærẽtia. Habẽt folia refrigerãdi & adstringẽdi vim. Eapropter sacris ignibus emplastri modo imposita medẽtur: ambustis itidẽ, condylomatis, incipiẽtibus furũculis, humoribus, & imflammationibus cũctis. Inunguntur etiam succo eius vtiliter addita cerussa ignes, & quę Græcè vlcera herpetas vocãt. Idẽ hircino adipe subacto aut ligustrino vnguẽto coacta cera podagris vtilis est. Quinetiã cõtra diutinas tusses cyathi

ἴβεως, ῥωμαῖοι σέντες, οἱ δὲ ῥούβους, οἱ δὲ μόρα βατικάνα, δακοὶ μαντεῖα, αἰγύπτιοι αἷμοος, οἱ δὲ ἄμετρος.

206. b. 2. Ελξίνη,

οἱ δὲ ἐλεῖτην, οἱ δὲ κανοκερσίαν, οἱ δὲ ἀμελξίνην, οἱ δὲ εὐσίνην, οἱ δὲ ἀμοργίνην, οἱ δὲ σευκόταχος, οἱ δὲ ψυχόυακος, οἱ δὲ μελάμπελον, οἱ δὲ κιττάμπελον, οἱ δὲ κισσάνθεμον, οἱ δὲ ἀνατεταμένον, ῥωμαῖοι βουλκτιλαπάθιν, αἰγύπτιοι ἄπαπ, οἱ δὲ παρθένιον, οἱ δὲ σιδηρῖτην, οἱ δὲ ἡρακλειαν, οἱ δὲ ἀγρίαν, οἱ δὲ κλιβώδιον, οἱ δὲ πολυώνυμον καλοῦσι. φύεται ἐν φραγμοῖς καὶ τοίχοις καὶ ἀμπελῶσι, καὶ σίτῳ, καυλία δέ ἐστιν ὑποῤῥυθρα. φύλλα ὅμοια λινοζώστει δασέα, περὶ δὲ τῶν καυλοὺς οἱονεὶ σπερμάτια πεφυκέναι ὑπολαμβανόμενα τῶν ἰματίων. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ψυκτικὴν, συμπικλῶ. ὅταν καταπλασθῇ μὰ ἰᾶται ἐρυσιπέλατα, καταχύματα, κονδυλώματα, φύγεθλα ἀρχόμενα, καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν καὶ οἰδήματα. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς μιγεὶς ἀμμιδίῳ ἐρυσιπέλατα ἢ ἕρπητας ὠφελεῖ καταχριόμενος, καὶ πεδάγρας σὺν κηρωτῇ κυκεῶνι ἀναλφθεὶς ἢ πεφυκέναι σίαπι. ὠφελεῖ δὲ βήσσοντας χρονίους ὁ χυλὸς καταῤῥοφούμενος ὄσον κύα-

θος

θος ἢ παιδιόμοις φλεγμαίνουσιν αὐ ἀγαρχάισια καὶ διάχρισμα ὠφέλιμόν ἐστι, καὶ ὠταλγίαν σὺν ῥοδίνῳ ἐγχεόμενον ὠφελεῖ.

206. b. 22. Εὐπατώριον,

οἱ δὲ ἡπατώριον, οἱ δὲ ἡπατῖτις, ῥωμαῖοι δὲ ὅλως κρυμαίους.

207. a. 12. Πεντάφυλλον,

οἱ δὲ πενταπέτες, οἱ δὲ πενταπέτομον, οἱ δὲ πενταδάκτυλον, οἱ δὲ ψευδοσέληνον, οἱ δὲ καλλιπέταλον, οἱ δὲ ξυλόλωτον, οἱ δὲ ξυλοπέταλον, οἱ δὲ ἄσφαλτον, οἱ δὲ πενταπέτανον, οἱ δὲ θυμιατῖτις, αἰγύπτιοι ὀρφιτεβεώκη, οἱ δὲ ἔνωτον, σκεφῶται ἰβεως ὄνυξ, οἱ δὲ πτερὸν ἰβεως, οἱ δὲ ἑρμοδάκτυλον, ῥωμαῖοι κυγκαφόλιμμ, γάλλοι πεμπέδουλα, δακοὶ σκεφπεδουλά.

207. b. 26. ἀγχάνωπα,

οἱ δὲ φοινικόπτερον, οἱ δὲ ῥοῦν στάχυος, οἱ δὲ ὀφθάλμη, ῥωμαῖοι παλολευκοπίνημ, αἰγύπτιοι ἄθνον.

208. a. 16. Ροδία,

οἱ δὲ ῥοδίδα,

208. a. 25. Ἱππουρις,

οἱ δὲ τριμάχιον, οἱ δὲ ἀνάβασις, οἱ δὲ χερέδρανον, οἱ δὲ φαίδραν, οἱ δὲ ἰτιανδρένδρον, οἱ δὲ γῆς, οἱ δὲ σχοινόστροφον, αἰγύπτιοι φερφρᾶ, σκεφῶται κρόνου τροφὴ, ῥωμαῖοι ἐκωάλις, οἱ δὲ σάλιξ ἐκωάλις, οἱ δὲ ἀνάβασιον, οἱ δὲ ἔφυδρον καλοῦσι.

208. b. 15.

cyathi pondere vtiliter sorbetur. Contra inflammatas tonsillas etiã gargarissatur, forisq; inungitur: & aurium doloribus cum rosaceo instillatur.

Eupatorium,

Alii hepatoriũ, aut hepatitis, Romani volucrum maius.

Quinquefolium,

aliq pétapetes, alii pétatomõ, alii pétadactylõ, alii pseudoselinũ, alii callipetalõ, alii xylóloton, nõnulli xylopetalõ, alii asphaltõ, alii pétacœnõ, alii thymiatitin, Ægyptii orphitebeocen, alii enotrõ, magi ibidis vnguế, alii ibidis pénam, alii hermodactylõ, Romani quinquefolium, Galli pempedulã, Daci propedulam appellant.

Phœnix,

alii phœnicopterõ, alii rhon stachyos, aliis osthalen, Ægyptii athnon nominant.

Rhodia,

alii rhodida nominant.

Equisetum,

alii trimachion, alii anabasin, alii cheredranon, alii Phædran, alii itiandendron, alii gis, alii schœnioστrophon vocant, Ægyptii pherphram, magi Saturni cibum, Romani equinalem, alii equi salicem, aut anabasion, alii ephydron.

equiſetum,

aliqui equition,alji chedran, alii gynó,romani ſalicé equinã appellãt. tragium,

aliqui tragum, aliqui tragoceron,alii ſcorpion,alii garganon,Romani cornulacam, alii bituenſa,Daci ſaliam, Ægyptii ſober,Aphri achœoſim.

Iunci,

aliquibus ſchœnos leuis,aliis oxypternos,aliis ſolis ſupercilium,Romanis iũcus marinus, aut manualis,Aphris chudua.

Paronychia,

aliquibus adocetus,aliis neuras,aliis phynion, Latinis buinalis dicitur.

Chryſocome,

aliis chryſitis , aliis chryſanthemon, nonnullis amaráton, aliis dioſpogon , Latinis Iouis barba,Aphris dubath,aliis burchumath dicitur.

Chryſocome,

aliqui chryſoſpermon vocãt, alii daſpin,alii origanũ,alii arcophthalmon,Latini arilariã.

buphthalmos,

aliqui chalchin vocant, alii chalcanthon, alii chalcanthemon,Romani acanthã,Hetruſci garuleũ,Aphri churſeten.

Verbenaca,

alii trigonion,alii bunió,alii hiero-

208.b. 15. ἱπτέα.

οἱ δὲ ἐκῖπον, οἱ δὲ χέδραν,οἱ δ' γιῶον,ῥωμαῖοι σάλιξ ἐκινάλις.

209.a. 22. ἄγρυ,

οἱ δὲ τράγος, οἱ δὲ τραγόκερως, οἱ δὲ σκορπίον, οἱ δὲ γάργανον,ῥωμαῖοι κορνικλάκα, οἱ δὲ βιτουένσα , δακοὶ σαλία , αἰγύπτιοι σοβέρ,ἀφρεσὶ ἀχωσίμ.

209.b. 4. Σχῖνος,

οἱ δὲ σχῖνος λεία,οἱ δ' ὀξύπτερος,οἱ δὲ ἀφρικῆ πλίν.ῥωμαῖοι ἰουνίκουμ μαρίνουμ, οἱ δὲ ἰουνίκουμ μανικάλεμ,ἀφρεσὶ χούδουα.

210.a. 13. Παρωνυχία,

οἱ δὲ ἀδόκητος, οἱ δὲ νευρὰς, οἱ δὲ φρυνίον , ῥωμαῖοι βυϊνάλις.

210.a. 20. χρυσοκόμη,

οἱ δὲ χρυσῖτις, οἱ δὲ χρυσάνθεμον, οἱ δὲ ἀμάραντον , οἱ δὲ διὸς πώγων, ῥωμαῖοι ἰόβις βάρβα , ἀφρεσὶ δουβάθ , οἱ δὲ βουχουμάθ.

210.a. 20. Χρυσοκόμη,

οἱ δὲ χρυσόσπερμον , οἱ δὲ δάσπιν,οἱ δ' ὀρίγανον,οἱ δὲ ἀρκόφθαλμον.ῥωμαῖοι ἀειλά-εια.

210.b. 32. βόφθαλμον,

οἱ δὲ χαλκῖτιν,οἱ δὲ χάλκανθον,οἱ δὲ χαλκάνθεμον,ῥωμαῖοι ἄκανθαν, θοῦσκοι γαρύλευμ, ἀφρεσὶ χουρζῖτα.

211.a. 25. Περιστερεών,

οἱ δ' πυγώνιον,οἱ δ' βάνιον,οἱ δ' ἱερὰ

ἱερὰ βοτάνη, οἱ δὲ φιλτροδότις, αἰγύπτιοι πεμφεμπέ, σεφῶ ἥρας δάκρυον, οἱ δὲ αἷμα γαλῆς, οἱ δὲ αἷμα ἑρμοῦ, ῥωμαῖοι κρίστα γαλλινάκεα, οἱ δὲ φέρια, οἱ δὲ τειξαλὶς, οἱ δὲ ἐξούπερα, οἱ δὲ ἕρβα σαγουϊνάλις.

hierobotanē, alii philtrodoté, Ægyptij pésempte, magi Iunonis lachrymā, nōnulli mustelæ sanguinē, alij sanguinē Mercurij, Romani cristā gallinaceā, alij pheriā, alii trixalidem, alii exuperā, aliq herbā sāguinalē.

211.b.8. σκάλεσαν.

Nominatur,

οἱ δὲ ἰνεγλύιον, οἱ δὲ χαμαίλυκον, οἱ δὲ σιδηρίτην, οἱ δὲ κυρῖτην, οἱ δὲ φερσεφόνιον, οἱ δὲ δὶς ἠλακάτῳ, οἱ δὲ δίχρωμον, οἱ δὲ κάλλιστον, οἱ δὲ ἱππάρισον, οἱ δὲ δημητριάδα, αἰγύπτιοι πεμφενφθάμ, Πυθαγόρας ἐρυσίσκηπτρον, ῥωμαῖοι κιγκινάλλις.

alii irigenion, alii chamælycon, alij sideritin, quidam curitin, alii perſephonion, alii Iouis colum, alii dichromon, alij calleſin, alii hipparisſon, nūnulli demetriada, Ægyptii pēphthenphtham. Pytagoras erysiſceptron, Romani cincinnalem vocant.

212,a.2. Ἀστράγαλος,

Aſtragalus,

οἱ δὲ χαμαισύκη, οἱ δὲ ὄνυξ, οἱ δὲ γατάλης, ῥωμαῖοι πίνουμ τρίβιουμ, ὁμοίως φίκουμ τέρρας, οἱ δὲ γλαύδουλαμ, οἱ δὲ τοῦμ, οἱ δὲ νωνάριαν.

aliqui chamæſycen, alii gatalen, alii onycha vocant, Romani pinum triuiā, aut ficum terræ, aliqui glādulā, alii tium, alii nonariam.

212.a.21. Τάκινθος,

Hyacinthus,

οἱ δὲ ἑλωνιὰς, οἱ δὲ πορφυραντὲς, ῥωμαῖοι βάκκουμ, οἱ δὲ οὐλκίνουμ.

aliqui heloniam, alii porphyrantes, Romani vaccinium, alii vlcinum vocant.

212.b.3. ῥοιὰς,

erraticum,

οἱ δὲ ὀξύτονον, ῥωμαῖοι παπαβεράλις, αἰγύπτιοι ναντί.

nōnulli oxytonō, Romani papaueralē, Ægyptii nati vocāt.

212.b.27. ἥμερος,

papaueris,

οἱ δὲ χειμαισύκλω, οἱ δὲ μήκων ῥοιὰς, οἱ δὲ ὀξύτονον, ῥωμαῖοι παπάβερ, αἰγύπτιοι ναντί.

aliqui chameſycen, alii papauer rhœada, alii oxytonon appellant, Romani papauer, Ægyptij nanti.

214.b. Cornícula-

Corniculatum,
Latini fabulum marinum, Aphri ſiſimacam vocant.

cognationé.

Qui hoc papauer hauſerit, non alia accident, quàm qui opium ebiberit. Cui eiſdé ſuccurritur auxiliis. Semen æſtate dum ſiccum eſt, colligitur. Decoctú radicis bibitur cum vino, ſanátque dyſenteriam.

Hyoſcyamus,
quidam dioſcyamon, alii pythonion, aliqui dioſcyamon vocant, alii adamanta, alii adamenon, alii hypnoticon, alij emmanes, alii atomon, nónulli dithiambrion, magi, Pythagoras, & Oſthanes, xeleo, Zoroaſtres tiphonion, magi rhaponticá, Romani inananoëntariam aut apollinarem, Ægyptii ſaphtho, Hetruſci fabulú, Galli bilinũciú, Daci dieliam.

Pſyllion,
Aliqui cataphryſin, alii cynocephalion, alii chryſtalion, alij cynomyã, alii pſyllerin, alii ſicelioticó, Siculi comidiin, Romani herbá puliaré, aut ſilbaciú, Aphri vargugum appellát.

Solanum,
Latini ſtrumum vocant, alij cacubalum, Ægyptii alleio,

214.b.14. Ζαλάσπον,
ῥωμαῖοι φάβυλουμ μαρίνυμ, ἀφροὶ σπιμάχα.

215.a.5. ἐμφέρειαν.
ἐν δὲ τῷ βρωθῆναι ἢ ποθῆναι τούτων ἢ κερατῖνην μύκωνα, ἐμφέρεσθ ὅσα καὶ τῷ ὀπίῳ ἡ μήκωνος συμπτώματα. καὶ τοῖς αὐτοῖς ὑπαντήσῃ βοηθήμασι. σωμάζεσθ ὁ καρπὸς ἐν θέρει ξηρός. τὸ δὲ ἀφέψημα ἡ ῥίζης πίνεται μεθ' οἴνου, καὶ θεραπεύει δυσεντερίας.

215.a.31. Τοσκύαμος,
οἱ δὲ διοσκύαμος, οἱ δὲ πυθώνιον, οἱ δὲ ἀδάμαντα, οἱ δὲ ἀδάμβυον, οἱ δὲ ὑπνωτικὸν, οἱ δὲ ἐμμανὲς, οἱ δὲ ἄτομον, οἱ δὲ διθιάμβριον. Πυθαγόρας, θεσσαλοὶ, ὀσθάνης ξελέαν, ζωροάστρης τυφώνιον, ῥωμαῖοι ἰνανασεντάρεια, οἱ δὲ ἀπολλινάρεις, θεσσαλοὶ ῥάπεντικὴν, αἰγύπτιοι σαφθὼ, δουσκοι φαβουλώγαν, γάλλοι βιλινουμτίαν, δακοὶ δίλειαν.

216.b 2. Ψύλλιον,
οἱ δὲ καταφρισις, οἱ δὲ κυνοκεφάλιον, οἱ δὲ χρυσάλιον. οἱ δὲ κυνόμυια, οἱ δὲ ψύλλεριν, οἱ δὲ σικελιωτικὸν, οἱ δὲ σικελοὶ κονιδίν, ῥωμαῖοι σιλβάκιυμ, οἱ δὲ ἄφρικα πυλικάρεια. ἀφροὶ οὐαργουγάμ.

216.b.34. κνπάρος,
οἱ δὲ ἕτερον, ῥωμαῖοι φέμινις, οἱ δὲ καικβαλὸν, αἰγύπτιοι αλλω,

λῶ, γάλλοι σκούϐουλουμ, ἀφροὶ ἀστρισμουνίμ.

217.b.11. ἁλικάκαϐον,

οἱ δὲ δίρκιον, οἱ δὲ στρύχνον μανικὸν, οἱ δὲ δορύκνιον, οἱ δὲ καλλιάδα, ῥωμαῖοι ἀπολλινάρις μίνορ, οἱ δὲ ἕρϐα οὐλτικαρία, οἱ δὲ ὀψάγινεμ, δακοὶ κυκωλίδα, ἀφροὶ κακαϐούμ.

218.a.12. θρύον,

οἱ δὲ ἄνυδρον, οἱ δὲ πεντάδρυον, οἱ δὲ ἔνορον, οἱ δὲ ὀρθόγυιον.

218.b.25. κιρκαίαν.

οἱ δὲ κίρκαιον, οἱ δὲ ξηράνθη, οἱ δὲ ἀντίμνιον, οἱ δὲ ἀντίμιον, οἱ δὲ βομϐόχυλον, οἱ δὲ μῖνον, αἰγύπτιοι ἀπεμούμ, Πυθαγόρας ἀνθρωπόμορφον, οἱ δὲ ἀλοίτην, οἱ δὲ θριδακίαν, οἱ δὲ κάμμαρον, ζωροάστρης διάμονον ἢ ἀρχίνην, προφῆται ἡμιόνους, οἱ δὲ γονογεῶνος, ῥωμαῖοι μάλα καννίνα, οἱ δὲ μάλα τερρέστρια.

220.b.18. λυκοκτόνον,

οἱ δὲ κύαμον λευκὸν, ῥωμαῖοι κολομέστρουμ.

220.b.35. κώνειον,

οἱ δὲ αἴγινος, οἱ δὲ ἤθουσα, οἱ δὲ ἀπολήγουσα, οἱ δὲ δολία, οἱ δὲ ἀμαύρωσις, οἱ δὲ παράλυσις, οἱ δὲ ἄφρων, οἱ δὲ κρηΐδιον, οἱ δὲ κοίτην, οἱ δὲ κατεχομένιον, οἱ δὲ ἀϐίωτον, οἱ δὲ ἀψευδὲς, οἱ δὲ ἀγεόμωρον, οἱ δὲ τιμωρὸν, οἱ δὲ πολυανώδυνος, οἱ δὲ

lo, Galli ſcubulum, Aphri aſtriſmunim.

halícacabon,

aliqui dirció appellát, alii ſtrychnó manicó, alii dorycnion, alii calliada, Romani apollinarem minoré, alii vlticaná herbam, aut opſaginem, Daci cycolidem, Pœni cacabum.

thryon,

alij anydró, alii pétadrió, alij enoró, quidá orthogyió vocát.

Circæam,

alij circæon, alii xeranthes, aliqui antimnió aut antimion, alii bóbochyló, nónulli minó, Ægyptii apemum, Pythagoras anthropomorphó, alii alœten, alii thridaciá, alii cámaron, Zoroaſtres diamonó, aut achiné, magi hemionos, aliqui gonogeonas, Romani caninum mâlum, alii terreſtre mâlum.

Licoctonon,

alij cyamon leucon, Latini colomeſtrum.

Cicula,

Conion, aliquibus æginos, aliis ethuſa, aliis apoleguſa, aliis dolia, aliis amauroſis, aliis paralyſis, nónullis aphró, quibuſdá creidion, aliis cœté, aliis catechomenion, aliis abioton, aliis apſeudes, aliis ageomoró, aliis timoron, aliis polianodynos, aliis

aliis dardanis, aliis catapsyxis, Osthani babathy, egyptiis apē phi, Rom. cicuta appellatur.

cynocrambe,

aliqui cynāchon appellāt, alii pardaliāches, alii cynomoron, alii cynoctonō, alii phaleō, alii cynāchen, alii oligorō, alii hippomanes, alii onistin, alii ophioscorodon, alii cynaricam, alii elaphocorodon, magi paralysin, Romani brasicam rusticā, aut caninam.

rhododendron,

Alii spōgiō, alii hæmostarin, Romani rhododēdrō, Lucani icmanem, Ægyptii schimphē, Pœni rhododaphnen dicunt.

bulbum,

Latinis bulbus agrestis.

Helpine,

Aliqui elitim vocāt, alii canocersea, alii amelxinē, alii eusinē alii amorginē, alii sucotachos, alii psychuacos, alii melāpelō, alii citāpelō, alii cissamethon, alii anatetamenon, Rom. volutum laparon, Ægyptii apap.

ota,

alii anthyllion, alii myortochon, alii myortosplenon, Latini muris auriculam, Aphri la botholabat.

palustris,

alii agriāphacō, alii epipherō, Latini

οἱ δὲ βαρδανὶς, οἱ δὲ καταμύξις, ὀσθάνης βαβάθυ, αἰγύπτιοι ἀπεμφὶν, ῥωμαῖοι κικοῦταμ.

221.b.14. κυνοκράμβη,

οἱ δὲ κυνοκτόνον, οἱ δὲ φάλεως, οἱ δὲ κυνάγχη, οἱ δὲ ὀλίγωσις, οἱ δὲ ἱππομανὲς, οἱ δὲ ὄνισις, οἱ δὲ ὀφιοσκόροδον, οἱ δὲ κυναρικὴν, οἱ δὲ ἐλαφόσκορδον, παραφθῖται παράλισις, ῥωμαῖοι βράσικα ῥύστικα, οἱ δὲ κανίνα.

221.b.32. ῥοδόδενδρον,

οἱ δὲ ἀσάγγος, οἱ δὲ αἱμοστατὶς, ῥωμαῖοι ῥοδαίδρεμ, λευκαίοι ἰκμανὴ, αἰγύπτιοι σκιφὴ, ἄφεσι ῥοδοδάφνη.

222.b.12. ἄγριον,

ῥωμαῖοι βόλβος ἀγρέσις.

223.a.18. πολυώνυμον,

οἱ δὲ ἐλεῖτιν, οἱ δὲ κακοχερσίαν, οἱ δὲ ἀμελξίνην, οἱ δὲ συκότραχος, οἱ δὲ ψυχόμακος, οἱ δὲ κυτάμπιλον, οἱ δὲ κυσάμεθον, οἱ δὲ ἀνατεταμὼν, ῥωμαῖοι βούλουτον λαπάθου, αἰγύπτιοι ἄπαπ.

223.b.6. ὦτα,

οἱ δὲ ἀνθύλλιον, οἱ δὲ μυόπτοχον, οἱ δὲ μυορτόσπλινον, ῥωμαῖοι μῦες ἀυρίκουλα, ἄφεσι λαβοθολαβάτ.

223.b.22. πελμάτιον,

οἱ δὲ φακὸς ἄγριος, οἱ δὲ ὀπίπτεγον,

πτερον, ῥωμαῖοι βιπεράλις, οἱ δὲ ἰκοσσμίγδονος.

223.b.33.μέγα,

οἱ δὲ ἀείθαλες, οἱ δὲ ἀμβρόσιον, οἱ δὲ χρυσόσπερμον, οἱ δὲ ζωόφθαλμον, οἱ δὲ βουόφθαλμον, οἱ δὲ στέργηθρον, οἱ δὲ αἰώνιον, οἱ δὲ ἀείχρυσον, οἱ δὲ ὁλόχρυσον, οἱ δὲ χρυσάνθεμον, οἱ δὲ πτερότογονον, οἱ δὲ βόρος, οἱ δὲ νότιος, προφῆται παρωνυχία, οἱ δὲ χρυσῖτις, ῥωμαῖοι κηριακούσπια, οἱ δὲ ἰόβις κάουλις, οἱ δὲ λεαπτὲς, οἱ δὲ σουδεμμοὺρ, αἰγύπτιοι παμφανής.

224.a.32.μικρὸν,

οἱ δὲ πετροφυὲς, οἱ δὲ βρότιον, οἱ δὲ θεοβρότιον, οἱ δὲ κρόβυσσον, οἱ δὲ χειμερινὴν, οἱ δὲ κεραυνία, ῥωμαῖοι βιτάλις, οἱ δὲ ἔρβα σέμπερ βίβα, αἰγύπτιοι ἐπιεικελτά.

224.b.7.προειρημένῳ,

Αείζωον τὸ λεπτόφυλλον, οἱ δὲ ἀείζων τὸ μικρὸν, οἱ δὲ πετροφυὲς, οἱ δὲ ἀείζωον ἄγριον, ῥωμαῖοι σέμπερ βίβουμ.

224.b.22.κυμβάλιον,

οἱ δὲ κῆπος ἀφροδίτης, οἱ δὲ γῆς ὀμφαλὸς, οἱ δὲ στιχὰς, οἱ δὲ στέργηθρον, ῥωμαῖοι οὐμβίλικουμ βένερις.

225.a.6.κηδόνος,

ὃ τινες κυμβάλιον καλοῦσι,

225.a.

Latini viperalem, alii iceofmig donon.

magnum,

aliqui aithales, alii ambroſiō, alii chryſiſpermon, alii zoophthalmon, alii bulophthalmon, alii ſtergethron, alii æonion, alii aichryſon, alii holochryſon, nōnulli chyſanthemon, alii ptogonon, alii boró, alii notiō: magi paronychiam, alii chryſitin, Romani ceriam cuſpiam, aut Iouis caulem nominant, alii leapetes, alii ſedum maius, Ægyptij pamphanes.

Paruum,

Alij petrophyes appellant, alii brotion, alii theobrotion, alii crobyſſon, alii chimerinē, alii ceauniam, Latini vitalem, alii herbam ſemper viuam, Ægyptii etieceltam.

ſunt,

Semperuiuū quod tenui cōſtat folio, aliqui aizoon paruū, alii petrophyes, alii aizoon ſylueſtre, Latini ſemperuiuū appellant.

Veneris,

aliis ortus Veneris, aliis terræ vmbilicus, aliis ſtœchis, aliis ſtergethron, Latinis vmbilicus Veneris dicitur,

eiuſdem,

quod aliqui cymbaliū vocant.

Vrticæ,

Vrticæ,
alij adicé, Latini vrticã, Ægyptii selepsion, Daci dyn appellát. Acalyphen etiam alteram, aliqui cniphen, Romani vrticã mollem vocant.

Galiopsis,
aliis galephos, Ægyptiis ętopi, Latinis vrtica labeo dicitur.

Senecion,
Erigerõ à latinis herbulũ, aut senecio vocatur, aliàs erechthites. Muscus,
aliqui ballarin, alii iranen, Latini gnomeusilon vocant.

Potamogeton.

aliàs stachyites, apud Ægyptios ethéchis, Latinè fatalis dicit.

Stratiotes,
Ægyptiis tibus, magis æluri sanguis.

Verbascum,
alii phlonon, Latini verbascum, alii pheminalẽ vocant.

Persona ta,
alii apariné, Latini personatam, aut lappam appellant.

helleborine,
alii borion vocant.

Fumaria,
Capnon, aliqui corydalion, aut corion vocãt, alii syuestre corydaliõ, alii capnõ ĩ hordeis, alii capniten, alij marmarité, alii

225.a.16. χνίδη,
οἱ δὲ ἀδίκην, ῥωμαῖοι οὐρτίκα, αἰγύπτιοι σελέμιον, δακοὶ, δηλ. ἀκαλύφην ἑτέραν, οἱ δὲ κνίδην καλοῦσι, ῥωμαῖοι οὐρτίκα μόλλις.

225.b.18. γαλεόψολον,
οἱ δὲ γάλεφος, αἰγύπτιοι αἴθοπι, ῥωμαῖοι οὐρτίκα λαβωνέμ.

226.a.18. Ηειγέρων,
οἱ δὲ ἐρεχβίτης, ῥωμαῖοι ἔρβυλλυμ, οἱ δὲ σενέκιμ.

226.b.18. Θαλάσσιον,
οἱ δὲ βδλλαεις, οἱ δὲ ἱερόνη, ῥωμαῖοι γνωμευσίλυ.

227.a.8. Ποταμογάτων,
οἱ δὲ ταχύτην, ῥωμαῖοι φατάλις, αἰγύπτιοι ἐθέγχις.

227.a.18. καλῦσι,
αἰγύπτιοι πόους, περσῶται αἷμα αἰλύρυ.

227.b.13. Φλόμος.
οἱ δὲ φλόνον, ῥωμαῖοι βερβάσκλυμ, οἱ δὲ φημιλαλί.

228.b.31. περσώπιον,
οἱ δὲ ἀπαείγλω, ῥωμαῖοι περσωνάκκαν, οἱ δὲ λάππαμ.

229.a.19. ἑλεβορείγλω,
οἱ δὲ βόειον,

229.a.24. καπνὸς,
οἱ δὲ κορυδάλιον ἢ κόριον, οἱ δὲ κορυδάλιον ἄγριον, οἱ δὲ καπνὸς, ὁ ἐν ταῖς κριθαῖς, οἱ δὲ καπίτης, οἱ δὲ μαρμαρίτης,

οἱ δὲ

οἱ δὲ καπνοράειον, οἱ δὲ χελιδόνιον μικρὸν, οἱ δὲ περιστέριον, οἱ δὲ καθαρὰς, οἱ δὲ καλλοκρὶ, ῥωμαῖοι ἄπιον, οἱ δὲ φυμάρια, αἰγύπτιοι κνῦξ, οἱ δὲ τῶκιν.

229.b.2.τρίφυλλον,

οἱ δὲ τριπόδιον, οἱ δὲ τριφόλιον καλοῦσι. 229.b.9.λίβυον,

οἱ δὲ τρίφυλλον, ῥωμαῖοι τριφόλιον μίνυς.

229.b.25.κύπτισος.

οἱ δὲ τηλίνιον, οἱ δὲ λωτὸν μέγαν, οἱ δὲ τρίφυλλον, ῥωμαῖοι τριφόλιον μαίους.

230.a.24.μυριόφυλλον,

οἱ δὲ μυλλόφυλλον, οἱ δὲ στρατιωτικὸν, οἱ δὲ ἀχίλλειος, ῥωμαῖοι μιλλεφόλιον, οἱ δὲ συνδρόχιον βένερις, γάλλοι βελιοκάνδας.

230.b.2.Μύρεις,

οἱ δὲ κονίλιον,

231.a.5.κίρσιον.

οἱ δὲ βύγλωσσον μέγα καλοῦσι, ῥωμαῖοι σπίνα μόλλις.

231.a.21.ἀτικὸς,

οἱ δὲ ἀστερίσκος, οἱ δὲ ἀστέριον, οἱ δὲ βυβώνιον, οἱ δὲ ὑόφθαλμον, ῥωμαῖοι ἐγγινάλις, δάκοι ῥαδίβιδα.

231.b.3.ὀδοντίτης,

Γίνεται δὲ μέσον πετρῶν καὶ τόπων τραχέων, ταύτης οἱ ἀστέρες ἐν νυκτὶ, λάμπουσιν, οἱ γὰρ μὴ εἰδότες ὅταν ἀυτοὺς ἴδωσι, νομίζουσι φάντασμα εἶναι. οὐείσιες)

alii capnogorgiô, alii chelidonion micron, alii peristerion, alii cãtharida, alii calcocri, Romani apium aut fumariã, Ægyptiis cnyx, alii tucin.

trifolium,

Alii tripodion, alii tribolion.

Lotus,

alii triphyllon, Latini trifolium minus vocant.

Cytissus,

Aliqui telinen, alii lotum magnum, alii triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

millefolium,

Alii melophyllô, alii stratioticẽ, alii achillió, Latini millefoliũ vocãt, aliqui superciliũ veneris, Galli beliocandas.

Myrrhis,

alii conilem vocant,

Cirsion,

alii bugloſſum magnũ vocãt, Latini ſpinam mollem.

Atticus,

alii aſteriſcum, alii aſterium, alii bubonium, quidam hyophthalmum, Latini inguinalem, Daci rhatibida vocant.

liberat,

Naſcitur inter petras & locis aſperis, ſtellares huius radii noctu ſplendent, quapropter qui ignari antea nó viderunt, eſſe inane ſimulacrum arbitrãtur.

Mediis

Mediis saxis & asperis exitinuenitur autem ab opilionibus. Crateuas rhizotomus hæc de ea refert: Si viridis cũ axungia vetere tundatur, contra rabiosorum morsus, turgétia guttura, proderit, suffitu quoque serpentes fugat.

Viola,

aliqui dasypodion, alii priapeion, alii ion sylueſtre, alii cybelion, Romani fetialin, aut murariam, aut violam purpuream vocant.

Bunium,

aliqui aton, alii actinen, alii anemosphoro vocãt, magi paradacry, Ægyptii erxoën, Romani scopam regiam, Aphri zigar, nonnulli tepso.

Chamæcissos.

alio nomine chamæleuce, alio cissos acarpos, aut terræ corona, aut selinitis, Latinè hedera pluuiatica dicitur.

Buglossum,

magi æluri gonon, Osthanes tzauuchi, Ægyptii autuenrin besor, Romani linguam bubulam, alii libanium, Poeni asanaph vocant. Nascitur fabulosis, & exæqualis in planiciem locis. Colligitur Iullio mẽse: ferúntq; contra febriũ in accessione cũ tremore algores vtilem:

εὑίσκεται δὲ παρὰ βόσκοις πεδίοις. καὶ κρατεύας δείζοτόμος ἱστορεῖ· αὕτη χλωρὰ κοπεῖσα μετὰ ὄξυγγίου παλαιοῦ, ποιεῖ πρὸς λυττώντους καὶ βροχκικοὺς, ὑποθυμιωμένη δὲ φυγαδεύει θηρία.

231.b.17. Ἰὸν,

οἱ δὲ δασυπόδιον, οἱ δὲ πριαπήϊον ἄγριον, οἱ δὲ κυβέλιον, ῥωμαῖοι σεπάλιν, οἱ δὲ μουρραία, οἱ δὲ βιόλα πυρπύρεα.

232.a.13. Βούνιον,

οἱ δὲ ἄτον, οἱ δὲ ἀκτίνιον, οἱ δὲ ἀνεμόσφορον, πέρσαι παράδαχυ. αἰγύπτιοι ἐρξώιον, ῥωμαῖοι σκόπα ῥήγια, ἄφροι ζιγὰρ, οἱ δὲ τέψα.

232.b.2. χαμαίκισσος,

οἱ δὲ χαμαιλεύκη, οἱ δὲ κισσὸς ἄκαρπος, οἱ δὲ γῆς στέφανος, οἱ δὲ σελινῖτις, ῥωμαῖοι δὲ ἑδερα πλουβιάτικα.

232.b.23. Βούγλωσσον.

πέρσαι γόνος αἰλούρου, ὀδάξης τζαυουχεῖ, αἰγύπτιοι δὲ τονίσειν βέσωρ, ῥωμαῖοι λοξαίζουμ, οἱ δὲ λιβάνιν, ἄφροι ἀσαάφ. γίνεται εἰς τοπους ὁμαλοὺς καὶ ἀτμώδεις. σπάγεται δὲ ἐν ἰουλίῳ μηνί· φασὶ δὲ πρὸς ῥῖγος λυσιτελεῖν·

πρὸς

πρὸς μὲν τεταῖον τῶ ἔχοντος βυγλώσσου γ'. καυλοὺς ὅλους ἀπὸ τεττάρας μετὰ τῶν ῥιζῶν, καὶ τῶ σπέρματος τὴν βοτάνην, δίδου πεῖν, τῶ δὲ τέταρτος ἔχοντος τῶ τεταρταίζοντι. ἡ δὲ ἔμπλησις τούτων σὺν οἴνῳ καὶ πρὸς ἀποτήματα φασὶν αὐτὸ χρησιμεύειν.

res vtilem: non tamen simpliciter, sed ad tertianas eam quæ tres tantùm caules protulerit, totam cum radicibus ad tertiam decoctam bibendã dant: ad quartanas verò, quæ quatuor quidem etiam decoctum eius contra absceſſus ferunt in vino vtiliter bibi.

232.b.29. Κυνόγλωσσον,

οἱ δὲ φυτὸν, οἱ δὲ καβαλλάτιον, οἱ δὲ σπλήνιον, οἱ δὲ σκόλυμος, ῥωμαῖοι λίγγυα κύνις, οἱ δὲ λίγγουα κανίνα.

Cynogloſſum,

Alii phyton, alij caballatiõ, alii ſplenicon, alii ſcolymon, Romani linguam canis, aut caninam appellant.

233.a.12. Λεοντοπόδιον,

οἱ δὲ ζωόνυχον, οἱ δὲ αἰετώνυχον, οἱ δὲ κῆμος, οἱ δὲ δαμναμωνίν, οἱ δὲ ἰδιόφυτον, οἱ δὲ φυτοβασίλα, οἱ δὲ κρόκιον, οἱ δὲ κροκοφθόον, μάγοι αἷμα κροκοδείλου, οἱ δὲ κροκομήριον, Αἰγύπτιοι δαφνοειδὲς, ῥωμαῖοι μινέρκιμ, οἱ δὲ νευμάτους, οἱ δὲ παλλάδιουμ, οἱ δὲ φλάμμουλα.

Leontopodion.

Aliqui zoonychon vocant, alii aetonychon, alii cemos, alii damnamenẽ, alii idiophyton, nonnulli phytobaſilam, aliqui croſion, alii croſſophthoon, magi ſanguinem crocodili, alii crocomerion, Ægyptii daphnœnen, Romani minercium, alii palladiũ, alii neumatum, alii flammulam.

233.a.26. Ὑπόγλωσσον,

οἱ δὲ καὶ τῦτο ἀντίῤῥινον, οἱ δὲ ἀναῤῥίνον, οἱ δὲ ἐκ ταύτης λυχνίδα ἀγρίαν καλοῦσι.

Hyppogloſſum,

Aliqui & id antirrhinõ, aliis anarrhinon, nonnulli lychnida agriam vocant.

233.b.13. Καταναγκη,

οἱ δὲ δαμναμωνίν, οἱ δὲ διονυσιάς, οἱ δὲ θύρσιον, οἱ δὲ δῆμος, οἱ δὲ κῆμος, οἱ δὲ κρότιον, μάγοι δὲ ἀρχαρεάς, οἱ δὲ ἀρκόστους,

Catanance.

Catanance aliquibus dãnamete, aliis dionyſias, aliis thyrſiõ, aliis demos, aliis cemos, aliis crotiõ, magis archaras, aliis

arcopus, Romani herba silicula, aliis datisca, Dacis caropitha dicitur,

Tripolion.

Aliqui psiché, alii merida, alii potamogitona, alii stachyiten, Rom. caliummaré nominant.

Polytrichon,

Alii callitrichon, alii trichomanes, alii ebenotrichon, alii argion, alii corion enygron, Ægyptij epier, Romani cincinnalem, alii terræ capillum, alii superciliú terræ, Daci phithophthethela vocant.

adianton,

Aliqui pterion, alii opteron, Romani capillarem, alii pinulam, alii fidiculã, nonnulli & eam adianton appellant.

Vocant,

Latini lapam.

Ægilops,

aliquib⁹ sitospelos, aliis siphó, aliis bromos, Rom. auena dicit

Bromus,

aliqui siphonion, alii acrospelon vocát, Latini auenam.

Aspera,

aliis epapitis, aliis lycathemõ, aliis cynosbaton, aliis anicetõ, aliis heliophyton, aliis anatolicon, aliis dyticon, aliis helide, Ægyptijs lyisthe, Ro. mergina, Hetruscis radia appellatur.

myrtus,

ἀρκόπους, ῥωμαῖοι ἕρια φιλικλᾶ, οἱ δὲ δαπίσκα, οἱ δὲ ἰοδισμαδίους, δακοὶ καρωπίθλα.

233.b.32. Τριπόλιον,

οἱ δὲ ψυχῶ, οἱ δὲ μυελὶς, οἱ δὲ ποταμογείτων, οἱ δὲ σαχϊῖτις, ῥωμαῖοι καλιμάρης.

234.a.13. πολύτριχον,

οἱ δὲ καλλίτριχον, οἱ δὲ πευκομανὲς, οἱ δὲ ἐβενότριχον, οἱ δὲ ἄργιον, οἱ δὲ κόριον ἔνυγρον, αἰγύπτιοι ὀπὲρ, ῥωμαῖοι κυκινάλις, οἱ δὲ τέρρα καπίλλους, οἱ δ᾽ σκεπερκύλιουμ τέρρα, δακοὶ φιθοφθεθελά.

234.b.14. ἄντον,

οἱ δὲ πτέριον, οἱ δὲ ὄπτερον, ῥωμαῖοι καπιλάρεμ, οἱ δὲ πίνελαμ, οἱ δὲ φιλικλάμ.

234.b.27. λαπὰ,

ῥωμαῖοι λάπα.

235.a.16. Αἰγίλωψ,

οἱ δὲ σιτόσπελος, οἱ δὲ σίφαι, οἱ δὲ βρῶμος, ῥωμαῖοι ἀβένα.

235.a.26. Βρῶμος,

οἱ δὲ σιφώνιον, οἱ δὲ ἀκρόσπελος, ῥωμαῖοι ἀβένα μ.

235.b.31. Σμύλαξ.

οἱ δὲ ἐπάπιτις, οἱ δὲ λυκαίνθεμον, οἱ δὲ κυνόσβατον, οἱ δὲ ἀνίκητον, οἱ δὲ ἡλιόφυτον, οἱ δὲ ἀνατολικὸν, οἱ δὲ δυτικὸν, οἱ δὲ ἑλίδη, αἰγύπτιοι λυϊδῆ, ῥωμαῖοι μεργίνα, θοῦσκαι ραδία.

236.a.

myrtus.

236.a.34.ἀγρία,
οἱ δὲ ἱερόμυρτον, οἱ δ' ὀξυμυρσίνη, οἱ δ' μυάκανθα, οἱ δὲ ἄγονον, οἱ δὲ σίγκος, οἱ δὲ μίνθη, οἱ δὲ καταγγελος, οἱ δὲ ἀνάγγελος, οἱ δὲ ἄκαρον, οἱ δὲ ὀκνηρὸν, οἱ δὲ κίνλω, οἱ δὲ λειχήν, οἱ δὲ χαμαιτίτυς, οἱ δ' χαμαιμύρτη, βοιωτοὶ δὲ γυρλωίας, θεσσαλοὶ γόνος ἡρακλέους, ῥωμαῖοι μύρσινην.

aliis hieromyrton, aliis myacantha, aliis agonon, aliis scincos, aliis mintha, aliis catangelos, aliis anangelos, aliis acæron, aliis ocneron, aliis cinen, aliis lichene, aliis chamæpitys, aliis chamæmyrte, Bœotis gyrenia, magis Herculis genitura appellatur, Latinis muscũ.

236.b.25.στέφανη,
οἱ δὲ δάφνος, οἱ δὲ σαμοθρακικὴ, οἱ δὲ μέθριον, οἱ δὲ ὑπογλώσσιον.

Alexandrina.

alii daphnon, alii samothracicé, alii methrion, alii hypogloſsion vocant.

237.a.Δαφνοειδὲς,
ὅμοιον ἁλύπῳ ἄνθος ὡς νυμφαίας, ᾧ μέσον τύτε κάτω ἐμφερὲς ἐν ᾧ τὸ σπέρμα.

Daphnoides,

Daphnoidei alypo ſimile, flos vt nymphææ, cui⁹ mediũ nuci cypreſsi nó diſsimile, i quo ſemẽ.

237.a.26.χαμέλεαν,
οἱ δὲ δαφνίτιν, οἱ δὲ ὑδραγωγὸν, ῥωμαῖοι λαυρέολα, οἱ δὲ λακτάγω, γάλλοι οὐσουβίμ.

Chamedaphne,

alii daphniten, alii hydragogon, Romani laureolam, alii lactaginem, Galli vſubim.

237.b.6.λευκὸς,
οἱ δὲ ἀσκίδα, οἱ δὲ ἄτομον, οἱ δὲ πυγατόξαεις, θεσσαλοὶ γόνος ἡρακλείος, οἱ δὲ πολύειδος, οἱ δὲ ἀνάφυτος, αἰγύπτιοι σομφία, οἱ δὲ ουῆρε, ῥωμαῖοι βεραστρουμ ἄλβυμ, γάλλοι λάγινον, οἱ δὲ ἀνεψᾶ.

album.

aliqui aſcida vocãt, alii atomon, quidã pignatoxarii, magi Herculis genituram, alii polyidos, alii anaphyſton, Ægyptii ſomphia, alii vnre, Galli laginum, aliqui anepſa.

238.a.35.πολύῤῥιζον,
οἱ δὲ θεσσάλιον, οἱ δὲ μελανόῤῥιζον, οἱ δὲ κιττοειδὲς, θεσσαλοὶ ζομαείτιον, αἰγύπτιοι ἰσσία, οἱ δὲ ἐλαφινὴ, οἱ δὲ κεμεληβ,

nigrum,

aliq melãpodió vocãt, alii ecſtomon, alii polyrrhizó, alii ꝓtion, alii melanorrhizõ alii cyiranion, magi zomaritió, Ægyptii iſeã, alii elaphine, alii cemẽ

leg, Latini veratrum nigrum, alii saraca, Daci prodiorna.

Magnum,

aliqui sesamiten, alii sesamin, alii lycocytalion, alii hellebo-rum album appellant.

Paruo,

alii coronion, alii sesamon agrium appellant.

sylueſtris,

aliqui elaterion vocant, alii grynon, alii balin, alii syncri-sin, alii bubalion, alii scopion, alii pherombron, alii peuce-danō, alii notion, Romani an-cetum, alii agreſté, Pœni cusi-mezar.

Pedicularis,

alij triphyllon, alij ſteſion, alii aſtaphida, alii phthiroc-tonon, alii phthirion, alii apan-thropon, alii polyides, alii pſeu dopathes, alii arſenoten, Ægy-ptii ibeſacœdem, Romani her-bam p edicularíam vocant.

Thapſia,

aliqui hypopyon vocant, alii pancranon, alii ſcammonion, alii thelyterim, Romani feru-laginem, alij ferulam ſylueſtré, Pœni bœden.

Spartion,

aliqui lygō, alii lobō appellāt,

Narciſsum,

aliqui narciſson anydrō, alii autogenes,

λέγ, ῥωμαῖοι βεράτρεμ νίγρεμ, οἱ δὲ σαρέκα, δακοὶ πρασίορνα.

239.b.3. μέγα,

οἱ δὲ σησαμίτης, οἱ δὲ σησαμὶς, οἱ δὲ λυκοσυτάλιον, οἱ δὲ ἑλλέβο-ρος λευκὸς, οἱ δὲ ἀντικύρικον.

239.b.17. ωχρὸν,

οἱ δὲ κορώνιον, οἱ δὲ σήσα-μον ἄγριον καλοῦσι.

239.b.34. ἄγριος,

οἱ δὲ ἐλατήριον, οἱ δὲ γρῦ-νον, οἱ δὲ βαλὶς, οἱ δὲ σύγκρι-σις, οἱ δὲ βουβάλιον, οἱ δὲ σκό-πιον, οἱ δὲ φέρεμβρον, οἱ δὲ πευ-κεδανὸν, οἱ δὲ νότιον, ῥωμαῖοι ἀγ-τέτυμ, οἱ δὲ ἀγρέστεμ, ἀφροὶ, κυ-σιμεζάρ.

241.b. ἀγρία,

οἱ δὲ τρίφυλλον, οἱ δὲ στή-σιον, οἱ δὲ ἀσταφὶς, οἱ δὲ φθει-ροκτόνον, οἱ δὲ φθείριον, οἱ δὲ ἀπάνθρωπον, οἱ δὲ πολυειδὲς, οἱ δὲ ψευδοπαθὲς, οἱ δὲ ἀρσενο-τὴν, αἰγύπτιοι ἰβησαοισὴν, ῥωμαῖοι ἕρβα πεδικουλάρις.

242.a.13. Θαψία.

οἱ δὲ ὑποπῖον, οἱ δὲ πάγ-κρανον, οἱ δὲ σκαμμωνίον, οἱ δὲ θηλυτερὶς, ῥωμαῖοι φερυλάγο, οἱ δὲ φέρυλα σιλβέστρις, ἄφροὶ βοίδλιν.

243.a.21. Σπαρτίον,

οἱ δὲ λοβὸν, οἱ δὲ λύγον καλοῦσι.

244.a.12. Ναρκισσος,

οἱ δὲ ναρκισσος ἄνυδρος, οἱ δὲ αὐτογενὴς,

αὐτογλυὲς, οἱ ὃ βολβὸς ἐμετικὸς, οἱ δὲ λείριον, ῥωμαῖοι βούλβους μορβιτάριους.

244.b.7. Ἱππόφαὲς.

οἱ δὲ ἱππόφυὲς, οἱ δὲ ἱππόφανὲς, οἱ δὲ ἱππίον, οἱ δὲ ἐχίνιον, οἱ δὲ πελεκῖνος, ῥωμαῖοι λαππάγω, οἱ δὲ λαππελάμιεγα καλοῦσιν.

245.a.22. κρόκα,

αἰγύπτιοι σύδαμνα, οἱ δὲ τρίξιν, μεσοῦται αἷμα πυρετῶ, ῥωμαῖοι ρικίνιμ, οἱ ὃ λῶπα.

247.b.35. ῥίζαν,

ἰῶ καλοῦσι τύρπετ.

249.a.12. συκλῶ,

οἱ δὲ μήκωνα ἀφρόδη.

249.b.2. Σκαμμωνία,

οἱ δὲ σκαμβωνίας ῥίζα, οἱ δὲ κολοφωνία, οἱ δὲ δακτύλιον, ῥωμαῖοι κολοφώνιουμ, μεσοῦται ἀποπλεύμονος, αἰγύπτιοι σάνιλουμ.

250.a.35. χηλέιος,

οἱ δὲ χαμελαία μέλαινα, οἱ δὲ ἡράκλειον, οἱ δὲ βδέλυρα, ῥωμαῖοι κιτοκάκιουμ, οἱ δὲ ἐλεάγω, οἱ δὲ ὀλοσέλλουμ.

251.a.18. Ακτῆ,

οἱ δὲ ἄνδρεον ἄρκτου, οἱ δὲ ἥμερον, ῥωμαῖοι σαμβούκουμ, γάλλοι σκοβίμ, δακοὶ σέβα.

251.b.

autogenes, alii bulbon emeticon, alii lirion, Romani bulbū morbitarium dicunt.

Hippophaes,

alii hippophyes, alii hippophanes, alii hippion, alii echinion, alii pelecinon, Romani lappaginem vocant, alii lappolam minorem.

croton,

Ægyptii syſthána, aliqui trixin, magi ſanguinem febris, Latini ricinum, alii lupam.

radice,

quam turpet appellant.

Sycen,

alii mecona aphroden.

Scammonia,

aliquibus ſcambonia radix, aliis colophonia, aliis dactylion, Romanis colophonium, magis apopleumonos, Ægyptij ſanilum dicitur.

Chameléa,

alii chamelæa nigra, alii pyros achnen, alii heraclion, alii bdelyram, alii coccon gnidió, Romani citocacium, nonnulli oleaginem, quidam oleaſtellum vocant.

Sambuci.

Acten aliqui dendron arctu, alii hemeron, Latini ſambucum, Galli ſcobiem, Daci ſebā vocant.

Vocatur.

aliis helioſacte, aliis agria acte, aliis euboica, Gallis ducone, Dacis oliua.

Apios,

Latini radicem ſylueſtrẽ, Pœni thorphathſadæ appellant.

Colocynthis,

Zoroaſtri thrymbra, Oſtani autogenes, Romanis cucurbita ſyluatica, Dacis tutraſtra dicitur.

Epithymon,

alii cedoes, Romani inuolucrum vocant.

Vocant,

alii bucranion, Romani oblameniam, alii batanuram, alii betiſalcam, Daci priadelã, alii pegrinam, Aphri lauothem.

Filici,

alii pterion, alii pterineon, alii daſyclonõ, alii anaſphorõ, alii blechnon, alii polyrrhizon vocant, magi hermubain, Romani filicem, alii laculam, alii filiis fanariam, Ægyptii aſini ſanguinem.

Fœmina,

Latini linguam ceruinam vocant.

Filicula,

aliqui ſcolopẽdrion, alii pterin, alii polyrrhizon, Latini filiculam vocant.

Dryopte-

251.b 8. καλεῖται.

οἱ δὲ ἑλιοσακτὴ, οἱ δὲ ἀγρία ἀκτὴ, οἱ δὲ εὐβοϊκὴ, ῥωμαῖοι ἔθελεμ, γάλλοι δρυκωνὲ, δακοὶ ὄλμα

252.a.31. ζώστις,

ῥωμαῖοι ῥάδιξ σιλβέστρις, ἀφρικὴ θορφαθσαδὶ.

252.b.19. ἀλεξανδρίνη.

Ζωοδόκος θύμβρη, ὀδάνης αὐτόχυτος, ῥωμαῖοι κουκούβιτα σιλβάτικα, δακοὶ τούτραστρα.

253.a.17. Ἐπίθυμον,

οἱ δὲ κεδρὶς, ῥωμαῖοι ἰμβόλυκρουμ.

255.a.5. πλὴν,

οἱ δὲ βυκράνιον, ῥωμαῖοι ὄβλαμιλία, οἱ δὲ βατανάτα, οἱ δὲ βετισάλκα, δακοὶ πριαδίλα, οἱ δὲ πεγίνα, ἀφροὶ λαυοθέμ.

255.a.29. λυβρίζον,

οἱ δὲ πλέιον, οἱ δὲ πτερίνεον, οἱ δὲ δασύκλωνον, οἱ δὲ ἀναφορέων, θεοφῶντι ἑρμοῦ βάϊν, ῥωμαῖοι φιλισφαγαία· οἱ δὲ λακέλλα, οἱ δὲ φιλιλὲμ, αἰγύπτιοι αἷμα ὄνου.

255.b.21. πτέρις.

ῥωμαῖοι λίγγυα κερβίνα.

256.a.8. Πολυπόδιον.

οἱ δὲ σκολόπενδρον, οἱ δὲ πτερεὶς, οἱ δὲ πολύῤῥιζον, ῥωμαῖοι φολίκυλα λίκυ τάλις.

256.a.28.Δρυοπτεῖς,
οἱ δὲ πτέριον, οἱ δὲ νυμφαία πτερίς.

256.b.34.Λινόζωπις.
οἱ δὲ ἄργυρος, οἱ δὲ ἀετιτιλλὶς, οἱ δὲ χρυσῖτις, αἰγύπτιοι ἀφλοφὸ, ῥωμαῖοι ἕρβα μερκυριάλις ὑάσκυλα, οἱ δὲ πωτεκουλάτα, ἀφροὶ ἀσουμές.

257.a.25. ἄρρλω,
ἀφρεῖ ἁρμὰς, οἱ δὲ ἀσουμέσλαβον.

257.b. 3.μέγα.
οἱ δὲ σκορπίουρον, οἱ δὲ ἡλιότροπος, οἱ δὲ διάλιον, οἱ δὲ ἡλιόπων, οἱ δὲ σκορποκτόνον, οἱ δὲ σήσαμον ἄγριον, οἱ ἢ σκορπίου οὐρᾶν.

258.a.3,μικρὸν,
οἱ δὲ σκορπίουρον.

290.a.32.Λαμπάσιον,
οἱ δὲ γυναικεῖον,, οἱ δὲ χαλκηδόνιον.

352.b.23.τρόπος,
Περὶ ῥάμνου.

Τὸν ῥάμνον ὃν τις ἂρῃ ἐν λήθῃ σελήνῃ καὶ βαστάζῃ, ὠφελεῖ πρὸς φάρμακα καὶ πρὸς ἀνθρώπους φαύλους · ἁρμόζει δὲ φορεῖν αὐτὸν πρήγματα· καὶ πλοίοις περιτίθεται· ὠφελεῖ δὲ καὶ πρὸς πόνον κεφαλῆς καὶ δήγματα, καὶ ὀπτημπάς.

Περὶ ἀρτεμισίας.
Ἀρτεμισίαν τὸν βοτάνην εἴ τις ἔχει

Dryopteris,
aliqui pterion,alii nymphęã pterin nominant.

Linozoſtis,
alij argyron,alii aritrilin,alij chryſitin, Ægyptii aphlopho, Latini mercurialem maſculam, alij teſſeculatam, Aphri aſumes.

cynocrambe,
Aphris harmas,aliis aſumeſlabon dicitur.

Magno,
aliqui ſcorpiuron vocant, alii heliotropon,alii dialion,alii heliopon, alii ſcorpioctonon, alii ſeſamon agrion, alii ſcorpij vram.

paruum,
alij ſcorpiuron vocant.

Platyophthalmon,
alij gynæcion,alij chalcedonium.

ſe habent.

De rhamno.

Rhamnum ſi quis eruat ſilente luna,& ſecum ferat, cõtra venena & improbos homines proderit : pecoribus iuuandis appenditur : nauigiis circumponi ſolet : valet cõtra capitis dolores & laruas.

De artemiſia,

Artemiſiam herbam ſi quis

teneat, dum iter facit, lassitudinem discutiet: & si in pedib⁹ ferat, bestias & lemures abiget: si sanguis circa artus coaluerit, ramulos de rosaceo in olla feruefacito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est: strangulatui vuluæ mirum in modum auxiliatur: vrinæ stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo,

Pentadactylum si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tonsillarum tumores, vuam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, psoram perniciali fame contractam iuuat: remoratos à partu menses eiicit: infusa manibus ex aqua tepida cótra terrores, fascinum, & laraas, mirum in modum commédatur. Vellito herbam, cum luna crescit, oriente sole-

De verbenaca,

Verbenata recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appésa doloribus oculorú auxiliatur: contra hebetudines eorundé, & capitis doloré efficax est, trita ex aceto lassitudinem reficit. Strumas, callosos fauciũ tumores statim discutit: febrium

ἔχει ἐν ὕδατι, λύει τὸν κάματον· καὶ ἐν τοῖς ποσὶν ὁ φοιτῶν, ξενία διώκει καὶ δαίμονας· αἷμα δὲ ἐπιὼν περὶ τὰ ἄρθρα σκιρρώδη, κλονία λαβὼν μείζω μετ' ὀδύνου, καὶ πτίσσας ζέσαι εἰς χύτραν, σύγχριε τὸ πεπουϊσμένον ὅλον, ὡς ὑπαγῇ κειμᾶσθαι· καὶ ὑστερικαῖς γυναιξὶ παύει βοηθῶν· φαγγουείαν παύει, καὶ ὀπισθοπύους ῥῆγμα.

Περὶ πενταδακτύλου.

Τὸν πενταδάκτυλον εἴ τις φορεῖ περὶ τὸ σῶμα, ἄπονος μενεῖ, καὶ ὀφθαλμοῖς ὠφελεῖ, χοιράδας, ἀντιάδας, σταφυλὴν, καὶ τὰ ὑπὸ τὴν γλῶσσαν ἄρθρα τε καὶ νεύρων ὀδύνας καὶ ὀδόντας, ψόραν ἐπιλιμοκτονίας· λοχίαν ἔμμηνα καταστατέοντα· ἐν ὕδατι δὲ χλιαρῷ περισκυζομένῃ εἰς τὰς χεῖρας πρὸς φόβους καὶ βασκουσίας καὶ δαίμονας ὅτι πάνυ καλή. διὸ λάμβανε τὴν βοτάνην ὅτε αὔξει ἡ σελήνη, ἡλίου ἀνατέλλοντος.

Περὶ περιστερεῶνος.

Περιστερεὼν ὁ μὲν ὀρθὸς τείνει τὸ αἰδοῖον, ὁ δὲ ὕπτιος ξηραντικός ἐστιν. ὠφελεῖ δὲ ὁ ὀρθὸς πεπαυθεὶς πρὸς πόνους ὀφθαλμῶν. πιεῖν πρὸς ἀμβλυωπίαν καὶ κεφαλῆς πόνον, καὶ κάματον παύει πεισθεῖσα μετὰ ὄξους. χοιράδας, ἀντιάδας παραχρῆμα παύει· ὅτε

ὅτι δέ πε φεικιᾶ, ἀπὸ ταύτης, κλωνία λαβών, κατέναντι σήτω τῶν φεικιώντος μόνον, καὶ εὐθὺς θεραπεύεται.

Περὶ δικτάμνου,

Τὴν δίκταμνον ξηράνας, τέιλον ἐν ταῖς χερσίσου, καὶ ὡς λῆφιτον, ποιήσας, καὶ βαλὼν σταλαγμὸν οἴνου, ἅπτε τῷ σώματος πρὸς πάντα γὰρ τὰ ἕρπητα ἁρμόζει· ἕλκη τε καὶ τοὺς σαπροὺς νομὰς πληροῖ προσκαθαίρων· καὶ σκολοπενδρῶπις προσκατάπλαστε, καὶ εὐθέως ὠφελήσεις· πρὸς σπλῆνα δὲ καὶ τὰ ἐν χρυσίοις τόποις πάθη φλεγμαίνοντα, καταπλάσσε, ὡς ἄλφιτον ποιήσας. αἷρε δὲ τὴν βοτάνην ἕλκει καὶ ἐν ταῖς καύμασι καὶ ἐν τῷ φθινοπώρῳ.

Περὶ ἐλελισφάκου.

Ἐλελίσφακον λύει ψυγμὸν, βῆχα· πρὸς πάντα γὰρ τὰ κακὰ ἕλκη σὺν ῥοδίνῳ καὶ κηρῷ λιφθὲν ὠφελεῖ. σπλῆνος πόνον καὶ δυσεντερίαν θεραπεύει πινόμενον μετ' οἴνου λευκοῦ ἑξίσου· τῶν αἱμοπτοϊκοὶς προσποτιζόμενον θεραπεύει· καὶ πρὸς πάντα ποιεῖ λόχια γυναικός· αἱ κάκιστα δὲ γυναῖκας πρόσθεν ἐξ αὐτῆς ποιήσασαι, προσιζάσι καὶ ἐκβολήσιον ἔμβρυα.

Περὶ κυπαείσου.

Κυπάειτος βοτάνη ὠφελεῖ πρὸς βράγχους καὶ ὠτία, καὶ αὐτάδας, καὶ ὕδρωπα καὶ ἰχνάδας

febrium horrores ſanat, ſi quis ſolum ex aduerſo ſtans ramulos tenuerit.

De Dictamno.

Dictamnum ſiccatum manibus terito, & redigēs in farinam adiecta vini ſtilla, corpus tangito: ſiquidem contra omnes ſerpentium iniurias auxiliatur: vlcera & putreſcentes nomas præpurgās explet: adactis corpori aculeis oblinitur, vt præſenti ſit auxilio: ad lienem & in abditis locis vitia inflammatione turgentia, redactum in farinā illinito. Herbam vere, magnis æſtibus, autumnóque eruito.

De Saluia.

Saluia ſingultū tuſsímq; diſcutit: omnibus malis vlceribus cū cera & roſaceo ſumpta auxiliatur: lienis dolorem dyſenteriamq;, pota cū vino albo pari modo ſanat: ſanguinē excrean tib⁹, potu medetur: ad extrahēda vuluę onera efficax eſt: peſſimæ mulieres peſſū ex ea ſubiiciunt, vt partus excutiant.

De cupreſſo.

Cupreſſus herba contra raucedines auriculáſq; prodeſt: induratos tonſillarum tumores, aquam inter cutem, & coxendicum

dicum cruciatus perſanat.

De centaurio.

Centauriũ contra inflãmata vitia & pulſantes ict⁹ valet: fœminis vuluæ malo laborãtibus auxiliatur: ſtillicidij vrinæ, calculorumq; torméta leuat. Herbam vere oriente ſole legito.

De buphthalmo.

Buphthalmũ creſcéte luna legere oportet. Facit autẽ cõtra pauores, laruas, & mala medicamenta, faſcinationes, vtpote cum eas auertat. Radicẽ ſi quis mandat, dentẽ expuet, fluxionemq; confeſtim ſiſtens, auxiliatur: quin & ventré reſoluit.

De pæonia.

Pæonia herba per æſtus Caniculæ ante ſolis ortum vellitur: appenſaque contra venena, faſcinum, pauores & laruas prodeſt: item contra febrem cum horrore venientẽ, diutinam nocturnámve, & aduerſus tertianam. Proditur lemures à monte, in quo naſcebatur, fugaſſe.

De Moly herba.

Moly herba ſi ſecta radice feratur, veneficiorum & faſcinationis amuletum eſt.

De Marina quercu.

Marinã quercum cum roſaceo & oleo miſceto, & facié illinito das & serapiuet.

Περὶ κενταυρείου.

Κενταύριον ὠφελεῖ πρὸς φλεγμαίνοντα πάθη, καὶ κρούσματα πληγῶν· ὑστερικαῖς γυναιξὶ βοηθεῖ, φαγγουειῶν τάς τε παύει καὶ λιθιῶντας. αἴρει δὲ τὴν βοτάνην ἐν ἔαρι ἡλίου ἀνατέλλοντος.

Περὶ βουφθάλμου.

Τὸν βούφθαλμον σελήνης αὐξανούσης λαμβάνειν δεῖ, ποιεῖ δὲ πρὸς φόβους καὶ δαίμονας καὶ βασκοσύνας, καὶ φάρμακα κτ' ταῦτα ἀποτρέπουσα. καὶ ὀδόντα ἐκ τίς ποτ' τὴν ῥίζαν μασησάμενος ἀποπτύσει, εὐθὺς τὸ ῥεῦμα στέλλουσα ὠφελεῖ· λύει δὲ καὶ γαστέρα.

Περὶ παιωνίας.

Παιωνία βοτάνη αἴρεται ἐν τοῖς κυνοκαύμασι πρὸ τ' τὸν ἥλιον ἀνατεῖλαι, καὶ χρεμᾶται· καὶ ὠφελεῖ πρὸς φάρμακα καὶ βασκοσύνας καὶ φόβους καὶ δαίμονας, καὶ ὀπτομυπάς· καὶ εἰς πυρετὸν ὃν φρικιάσεως νυκτερινόν τε καὶ ἡμερινόν, καὶ τεταρταῖον. λέγεται δὲ ὅτι ποτὲ ἐν τῷ ὄρει ἔνθα ἦσαν δαίμονες φυεῖσα, τούτοις ἀπεδίωκεν.

Περὶ μώλεως.

Μῶλυ ἐολαίη ῥιζοτομηθεῖσα καὶ πρὸς τὸ σῶμα φορεμένη, ὠφελεῖ πρὸς φάρμακα καὶ βασκανίαν.

Περὶ ἁλιμίας δρυός.

Τὴν ἁλιμίαν δρυῦν ὅταν ἡ σελήνη λήξῃ, μίξον μετ' ῥοδίνου ὑγαίνου καὶ χλιαρ

χρίσον σου τὸ πρόσωπον, ὅπως ἐπὶ τοσοῦτον ἀπέλθῃς, ζωογονεῖ ὃ καὶ παῦλα ὑπὸ τὴν κοιλίαν φορεμένη, καὶ πρὸς τοὺς φόβους τοὺς γινομένους ἔχε κλῆνα. καὶ πρὸς βασκανίαν τε καὶ παντα τὰ κακὰ ὠφελεῖ· καὶ τὸ σῶμα φυλάττει· ὅταν δὲ οἱ βάσκανοι ἀφεστήκωσι, μέμωκεν, ἐρχομένων δὲ αὐτῶν ἐγγὺς, ἀνοίγει τὸ κάρφος.

illinito, cum ad negotia te conferes vegetiores reddit pueros, imo ventri appensa & ad arcēdos pauores nocturnos manu teneto. Contra fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tuetur: cum enim fascinantes recedunt, arescentem ramulum occludit, & cū propius accedunt, aperit.

Περὶ χρυσανθέμου.

Τὸ χρυσάνθεμον εἰ ἀπὸ ἄρτι ἐκ τῆς γῆς πρὸ τοῦ ἡλίου ἀνατείλαι καὶ περιάπτοις τῷ σώματι, καὶ ἐκ τοῦ βαλὼν ἀποκρημνιεῖ, ὠφελεῖ ἀποστρέφον τὰς φαρμακίδας γυναῖκας, καὶ πάντας τοὺς βασκάνους.

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortum eruatur, & collo appendatur, veneficas mulieres, omnesque fascinantes amolitur.

Περὶ ἐρυσίμου.

Ἐρύσιμον λεῖον μετ' οἴνου πρὸς κοιλίας πόνον πινέσθω· ἐὰν δὲ κόκκους ζ' εἰς οἰκίαν βάλῃς, ἀμφισβήτησιν ἔσῃ.

De Eryſimo.

Eryſimon cum vino tritum, aduersus ventris dolorem bibitur: si quis grana septem domum iniecerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

Περὶ ἐλλεβορίνης.

Ἐλλεβορίνη, οἱ δὲ ὀπτακτὶς, οἱ δὲ βόειον. θαμίσκος ὀστὶ μικρὸς, ἐλάχιστα φύλλα ἔχων. πίνεται πρὸς πᾶν θανάσιμον, καὶ πρὸς τὰ ἐν ἅπασι πάθη.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, aliis boion dicitur. Frutex est exiguus, minimis foliis constans. Bibitur cōtra omne venenum, & iecinoris vitia.

ΤΕΛΟΣ.

FINIS.

LECTORI.

CVM multùm diſsidentia inter ſe quibuſdam in locis vetera horum librorum exemplaria inuenerim, nec facile ſtatuere fuerit, quæ potiſsimum lectio vera ſit, ſatius eſſe duxi reſtitutis iam illis locis, quos me tutò emendare poſſe putaui, hoc quoque in quibus maior ſcrupulus ineſt, adnotare. (quanquam in his etiam ſunt varietates quædam, quæ parum ſententiam immutant) vt omni re cognita poſsit vnuſquiſque, quod ipſi melius videbitur, ſumere. Neque verè codicũ tantum in hac diligentia fidem ſpectaui, verumetiam, quam ſcripturam ſequuti ſint, qui olim in Latinum ſermonem hos libros cõuerterũt, animaduerti, Pliniũ, dico, Serapionẽ, Veterẽ interpretẽ, Hermolaum Barbarũ, Marcellum Virgilium, & Ioannem Ruelliũ. Et quoniã medici omnes ambitioſè multa ex hoc auctore ſumpſerunt. legimus etiã eorum commentarios, vt quod exemplar hi ſequuti eſſent videremus. Omnino effecimus, vt multis locis obſcuris lux afferretur, & quæ peruerſè deſcripta eſſent emendarentur. Vale.

Primus numerus folium ſignificat: ſecundus paginã: tertius verſum, in quo eſt aſteriſcus. quo indicamus vel locum corruptum, emendatum eſſe, vel variam huius eſſe ſcripturam.

Fol. 4. pag. 1. verſ. 12. alter codex manu ſcriptus ἔϕαγτε, ſed leue eſt diſcrimen.

4. 1. 20. hæc verba ſic legũtur in duobus exemplaribus manu ſcriptis δευτέρα δὲ ἀλιβυκὴ, λευκὴ κατὰ χρόαν πυῤῥὰ τοῖς γεῦσιν, παλαιούμθναι, &c. quæ interpretes omnes expreſſerunt.

Fol. & pag. eadẽ, verſ. 28. hic locus ſic legitur in veteribus libris, καθαίρουσι δὲ πάχη ἢ χολὰς ποτιζόμθναι, &c. Quam ſcripturam ſequuti ſunt Hermol. Barbarus, Marcell. Vergilius, & Ruellius. Vetus tamẽ vocẽ πάχη rectè omiſiſſe videtur, quòd vt ego quidem arbitror, ſi ea vox legatur, periſſologia quædã ſit,

ſit, Nam τὸ τῶν ὑγρῶν παχὺ ſatis his verbis, quæ paulò ſuperius ſcripta ſunt, καὶ τὰ δυσανάγωγα ὑγρὰ λεπτοποιοῦσαι exprimitur. Significat enim auctor, vt Paulus Ægineta interpretatur radices Iridis εὐαναγωγὰ ποιεῖν τὰ κατὰ θώρακα.

5.1.9. alter codex ſcriptus manu, καὶ εἰς ἐγκάθισμα ὡς ἶρις πρὸς τὰ γυναικεῖα ἁρμόζει, quā ſcripturā vetus interpres ſequutus eſt.

Fol. eod. pag. 2. verſ. 24. vterque antiq. βοηθεῖ.

6.1.1. alter codex hanc ſcripturam habet ὁ διαμασσηθεὶς κροκώδης εὑρίσκεται, quam ſcripturam Plinius & Hermol. Barbarus retinent.

7.1.19. In vtroq; libro manu ſcripto hoc loco eſt διουδάσκα. ſed opinor legendum in omnibus exemplaribus σαλιύγκα.

8.1.15. alter codex ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα ἐοικὸς γιγάρτῳ, ἔχον κάυλια γονιοειδῆ ὑπόβραχέα, ἀραιά, ῥίζαι, &c. quam ſcripturam Hermol. Barbarus, non ſine iudicio ſequutus eſt, quòd omnia hæc in aſaro comperiantur.

Fol. & pag. ead. verſ. 27. In altero veter. exemplar. ſcriptum eſt οὐεστίνοις, id eſt, apud Veſtinos, quam lectionem probamus, propterea ꝙ Dioſcoridis tẽpore ager Iuſtinenſis nondũ erat.

9. 2. 11. veteres libri βλαστὸς μωσυλιτικός, quæ lectio placuit Hermol. Barbar. In plinij exemplaribus ſcriptum eſt Moſsilicus portus, quò cinnamomum conuehitur.

Fol. & pag. ead. verſ. 15. Antiq. δάρκα, quod Hermol. probat.

10.2.10. hic locus ſic legitur in altero codice manu ſcripto ἔχον ῥίζαν, καὶ κασσίζουσαν, πέμπτον τὴν ὀσμὴν, ὑπόκιρρον, καὶ προσεμφερῆ τὸν φλοιὸν κασσίᾳ πυρρᾷ, ſed vulgata ſcriptura verior eſt.

11. 1. 27. veteres codices, ὀριγανίζον, quam ſcripturam vetus interpres & Hermol. expreſſerunt.

Fol. eod. pag. 2. verſ. 28. alter. ἔχοντα τοὺς ἰδίους κλάδους.

13.2.24. In altero veter. codic. hic eſt initium capitis, cuius titulus eſt περὶ ξυλοβαλσάμου.

14.2.20. hic aſteriſcus debuit præponi his verbis καὶ πρὸς τὰς ῥιζάνας, vt ſignificetur ea nõ eſſe in vtroque veteri exemplari, quæ etiã vet. interp. & Hermol. Barb. non agnoſcunt.

15.1.13. vera huius loci ſcriptura eſt in altero veteri codice, in quo

in quo hæc verba legimus ἢ ἀερχθίας, ἐοικὸς θυίνῳ ξύλῳ, quæ Hermol. placét. Quid sit autem θυία lege apud Theophrastū Cap.5.lib.5.de histor.plant.

16.1.17. variant hic exéplaria. alia enim ἀνελλιπὴς διὰ τοῦ ι. in tertia syllaba habent. alia verò διὰ τοῦ η. vt sit ἀνελλήπης, id est, situm nō olens, quam posteriorem scripturam veram esse ex Plinio facile intelligi potest.

Fol.eodé, pag.2.vers.9. In altero exéplari hæc verba hic leguntur, Θέσσαλος μὲν οὖν φησὶ μόνον ὐσῶδη αὐτὴν, οἱ δὲ ἢ θανάσιμοι, εἰ πιεῖν τις δῷ αὐτῆς < γ'. μεθ' ὕδατος, κτλ. δὲ τὸ ἀληθὲς ἔχει δύναμιν, &c. Quæ verba sic Hermol. cōuertit. Thessalus odoratū modo croci existimat, sed auctores quoque habentur, qui venenum id faciant, vtique si drachmis tribus ex aqua bibatur, Re vera autem emollit, &c.

17.1.17. In altero hic locus sic scriptus est τοιοῦτο δ' ἔστι ἀπὸ συείας. Quam lectionem Serapio & Hermolaus agnoscunt.

19.1.17. alter χρῶνται δὲ αὐτῷ αἱ γυναῖκες ὑπὸ τῷ στόματος ἐπὶ τῷ σπλῆνι, quæ lectio placet Hermol.

Fol.eod.pag.2.vers.14. Locus hic ita legitur in veteri ἄγει κτλ κοιλίαν ὠμὸν χυμὸν ἢ χολῶδες. Plinius legisse tātū videt χολῶδες.

21.2.9. alter veter codicum. καὶ βρεχομένου ὕδατι στεμῶ quæ lectio verior est, quam etiam in actuarij lib. περὶ συνθέσεως φαρμάκων inuenies.

22.2.24. vterque vet. ἀείση δὲ ὄζειν ἢ τοιαύτη διάκρισις, quam scripturam Hermol. sequutus est.

Fol.& pag.eadem, vers.29. alter συγγυμνασίας.

23.1.7. In codice quem aldus typis expressit hæc verba huic loco adscripta sunt ἢ κύπερου λίτρας ὰ. ἐλενίου λίτρας ὰ. καλάμου λίτρας ὰ. ἐλαίου ξέστας ς'. ῥόδων ξέστας ας', quæ in neutro codice veteri inueniuntur.

23.2.17. veteres cod. πρὸς τὸ μὴ ὄζειν, quod interpretes recte sequuti sunt. Sal. enim (vt Plinius ait) additur, vt olei natura coërceatur.

24.1.17. verior est scriptura in altero codice, ἢ φοίνισσα παλαιά.

Fol.eod.

Fol.eodem,pag.2. vers. 2. legendum est πτυοχάμπας, vt vetera exemplaria habent.

25.1.3. alter ἐν δακτύλῳ.

26. 1. 23. antiquus alter κόλπους κλιῶν, sed vulgatam scripturam sequendam arbitror,quam Actuarius in lib. περὶ συνθέσεως φαρμάκων conseruauit.

30.1. 22. In altero codice manu scripto hæc verba non leguntur, χρίνω, κηλάμῃ, ἠδυαμύρῳ δὲ ἀμαράκῃ, κόστῳ, ἀμόμῃ, ναρδῳ, καρπασίῳ σάμῃ. sed Paul. Aëtius,actuarius,& Nicol.Myrepsicus,qui amaricini descriptionem ex hoc loco sumpserunt, vulgatam scripturam antiquam esse ostendunt.

31. 2. alter, hoc loco hæc verba non habet καὶ ῥητίνης, Sed Aëtius & Actuarius ea legisse olim videntur, Id tamẽ vini in Aëtio Latino facto, in huius vnguenti descriptionem, quòd Zingiber pro Smyrna male scriptum sit. Qui error ex eo natus est,quod interpres hanc notã ζζ esse ζυγγιβέρεως esse putaret,qua tamen medici smyrnam semper exprimunt.

32.2.12. In altero hic caput est περὶ ἰασμίνου.

34.1.14. Scriptus alter ψαφαιὸς,quã Plinius probauit, & ob id retinendam arbitror.

37.1.7. hæc verba sic leguntur in altero manu scripto, ἐπιπάσσειν ἄλλοις ἑτέροις, περὶ τοῦ τὸν πρῶτον χόνδρον ἀποσβεσθῆναι παντελῶς, ἕτερον προσεπιπάσσει, vt Hermol.legisse videtur,& res ipsa postulat.

37.2.24. alter παύει.

39.1.2. in altero manu scripto hic capitis initium est.

Fol.eod.pag.2.vers. 29. Scriptura ita distincta est in altero veterum codicum,vt hic capitis initium sit.

40.1.17. hoc caput cum superiore coniunctum est in altero nostrorum codicum..

Fol.& pag.eadem,vers.26.Codices manu scripti hæc verba τουτέστι ἀπόκοπον non habent, propterea quòd nihil aliud sunt,quàm huius vocis ἀκόνητον declaratio,quę ex margine in contextum traducta est.

46. 1. 15. In antiquis codicibus, capita ita distincta sunt vt caput

caput περὶ αἰγείρου adſcriptum ſit capiti περὶ λεύκης, vt res ipſa poſtulat.

Fol.& pag.ead.verſ.12.alter ὕδατι ψυχρῷ.quam veterē ſcripturam eſſe,facile ex Plinio intelligi poteſt.

46.2.24. alter ὑπόλεπτος καὶ λευκός.

47.1.12. alter δίβραχος.

48.1.6. alter ὀπμήκη.

Fol. & pag.eadem,verſ.8.hæc verba ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα παρ' αὐτὴν λευκοτέρα non inueniuntur in altero.

Fol.& pag.eadem,verſ. 14. vterq; codex ſcriptus σφονδυλίῳ, quæ eſt veri huius loci ſcriptura.

Fol.& pag.ead.verſ. 18. alter ſcriptus ἀποκρίνειν, ſed leue eſt diſcrimen. Nicander idem de hac planta ſcribens ἀλεξιάρην eam vocat,id eſt, incubos nocturnos auertentem, quod intellexit Ouidius in faſtis,cuius hi ſunt verſus,

Hic fauis ſpinam qua triſtes pellere poſſet
A foribus noxas,hæc erat alba, dedit.
Et paulopoſt.
Virgáque Ianalis de ſpina ſumitur alba
Qua lucem thalamis parua feneſtra dabat.

Ianalis autē virga dicitur,quod Ianus eam Cranæ Nymphæ, (qua potitꝰ erat)cōtra ſtriges nocturnas ꝓ amuleto dederit.

49.1.27. in altero hæc verba ſic leguntur γίνεται καὶ μαλακτικὸν νεύρων, ἐν τῷ προσλαμβάνειν πυρωτικὰ μίγματα.

50.1.12. alter ὧν φύλλων.

Fol.& pag.eadem, 26. alter ἄμμου,ſed leue eſt diſcrimen.

51.1.5. in altero hæc ita legūtur αἰδοιικῶς ποιεῖ, vt legit Hermolaus Barbarus.

53.2.15. alter codicum habet hanc ſcripturā καὶ πορφυρωτέρα περίπλεως δὲ ἀκάνθης σκολοποειδοῦς,quam puto eſſe germanam.

60.1. 23. liber alter hanc ſcripturā habet, ῥοδοχροῦν καὶ πορφυροῦν.

64.2.29.Locus hic ſic mihi ex Plinio legēdus videtur,καὶ πρὸς λιθαργικοὺς μετὰ ἀμύλου καὶ ἡδυόσμου, cuius lectionis veſtigia quædam extant in lib.antiq.

65.2.20.

65.2.20.Lib.veteres hoc loco initium capitis habent.
66.1.15. alter cod. ἐξ αὐτοῦ.
69.1. verſ.vlt. hoc caput non eſt in veteribus libris.

EX LIB. II.

72.1.3. quidam codex habet προσκεκολλημένοις ἀγγείοις, ſed nullo ſenſu.

Fol. & pag.eadem.verſ.25.In altero codice ſcriptum inuenimus καταπλασθεῖσα, ſed vulgatam lectionem retinendam cenſemus.

76.2.12.vox hæc καταπνιγόμενοι,in altero codice deeſt;ſed eã Plinius & Hermolaus expreſſerunt.

78.1.25. Scriptura ſic in veterib. diſtincta eſt,vt hic ſit initium capitis, cuius hic titulus eſt ἀλεκτοροειδὲς τὸ κεφαλοειδὲς τὸ ἔντος, ſed hæc parui momenti ſunt.

Fol.eodem,pagi. 2. verſ.26.hoc caput cum ſuperiore coniunctum eſt in vetuſtis libris.

79.1.4.κείμενοι,ſed ſcriptura vulgata verior.

Fol.& pag.eadem,verſ.29.In veteri codice eſt ἀσυμφερόντων, ſed ea ſcriptura deprauata eſt.

81.2.2.hoc caput à ſuperiore diſtinctũ eſt in veteri codice.

82.1.25.codex antiq.τραχὺ,ſed nullo ſenſu,eſt enim lac ouiũ παχὺ,ſi conferatur cum lacte caprarũ,minus tamen craſſum quàm vaccinum.

83.1.18.In antiq.ſcriptum inuenio πόντες,quæ ſcriptura huic loco magis conuenit.

87.2.13. Nulla eſt hic capitum diſtinctio in antiquis libris, ſed tota tractatio στεάτων vno capite comprehenſa eſt.

89.1.10.hæc verba non leguntur in antiquis codicibus,ſed interpretes omnes rectè ea expreſſerunt.

90.1.20.hæc verba ſic leguntur in vtroq; ſcripta. ὡς ἂν τὴν δύναμιν καὶ τὴν ὀσμὴν τῶν σωμάτων ἀναλάβῃ,ſed vulgatam ſcripturam retinendam eſſe ſenſus oſtendit.

91.1.22.alter hoc loco ἐῤῥωμένως eodem ſenſu.

91.1.verſ. vlt. hoc caput coniunctum eſt cum ſuperioribus in antiquis libris.

Fol.eod.pag.2.27.In altero ſcriptum eſt περὶς ὅταν, ſed vulgata ſcriptura melior eſt.

92.1. 18. vetus ſcriptura eſt, & quæ adhuc eſt in antiquis libris ἐξοστέισας.

95.1.22.antiquus codex τῶ περισώπω quę ſcriptura prior eſt.

Fol.eod.2.1.hic locus ſic deſcriptus eſt in manu ſcripto καὶ χροΐζοντες ἐπ' ὀλίγον ἀγχούσῃ καὶ δι' ἀραιᾶς κοσκίνου εἰς σανίδια ἀποδοῦσιν quam lectionem Hermol.& Marcell.expreſſerunt.

Fol.& pag.eadem verſ.4.ad finẽ huius capitis hæc in antiquo codice adſcripta ἀνθρώπων δὲ ξηρὰ σὺν μέλιτι φυραθεῖσα καὶ ὑποτεθεῖσα τῷ λάρυγγι, ὡς καὶ ἡ τῶ κυνὸς σιωπαγχικοῖς βοηθεῖν εὐ ἀῤῥήτοις εὔοδμα, Quæ verba expreſſa ſunt ab Hermol. & ex eo loco ab omnibus ferè medicis deſcripta.

96.2.verſ.vlt. vetus interpres exemplar habuit, in quo hæc verba tantũ erant τὸ δὲ χειμεινὸν παχύτερον ὂν χεῖσθαι. Hermolaus Barb.legiſſe videtur hæc verba, καὶ λειόδακνον ὄζον. in veteribus lib.ſcriptura eſt ita deprauata vt non facile ſit eam reſtituere.Ex Plinio tamen intelligi poteſt hanc fuiſſe veterẽ ſcripturam, καὶ εἰρεϊκὸν ὄζον.

97.1.2.Tria hæc ſequẽtia capita cũ ſuperiore in veteri coniuncta ſunt.

99. 1. 12. hæc verba non leguntur in altero codice manu ſcripto.

103.1. verſu vlt.hæc verba non legebantur olim in veteribus codicibus, quemadmodũ intelligi poteſt ex veteri codice,Serapione, interprete antiquo,& Hermolao. quæ autẽ adſcripta ſunt,ſtudioſus quiſpiam ex Galeno in contextum tranſtulit,in quo ſcriptore ita leguntur, κύαμος καθ' ἑκάτερα τῆς μέσης χράσεως ὀδὴν ἐγγυτάτω κατὰ τὸ ξηραίνει, καὶ κῦ τὸ λύσειν. ex quibus verbis Dioſcorides facilè emendari poteſt.

106.2.1. alter ἐκλουομένων, ſed minus apté.

107.1.7. alter βολᾶς, ſed vulgata ſcriptura melior eſt.

Fol.& pag.eadem,19.alter ῥαφανὶς.

108.2.18.

108.2.18. In veteri hic caput est περὶ βοωλίου.

111.1.11. antiqui libri ὀδαξουμένης rectius.

115.1.21. In scriptis ξύσμα, sed leue est discrimen.

116.1.23. Totus hic locus sic legitur in veteribus libris πικρὰ δὲ πρὸς τὴν γεῦσιν ὡμοίωται δὲ κατὰ ποσὸν τῇ δυνάμει μίχωνι, ὅθεν καὶ τὸν ὀπὸν αὐτῆς ἔνιοι μίχωνι τῷ μηκωνίῳ. καθαίρει δὲ μετὰ ὀξυμέλιτος, &c. quã lectionẽ esse verã, nisi quod ὀξυκράτῳ legen dũ esse ex Plinio, veteri interprete & Hermol. intelligi potest.

117.1.25. alter φλεγμοναῖς βοηθεῖ πνεύμονος, quam lectionem expressêrunt Hermol. Bar. & Ruell.

120.1.14. Totum hoc caput sic legitur in veteribus libris, σκόρδιον τὸ μὲν ἔστιν ἥμερον καὶ κηπευτὸν καὶ τοῦτο ἐν αἰγύπτῳ μονοκέφαλον ὀζῶν, ὥσπερ τὸ πρᾶσον γλυκὺ, ἐμπόρφυρον, μικρὸν, τὸ δὲ λοιπὸν, πολύκρατον, λευκόν. καλοῦσι δὲ τὰς ἐν αὐτῷ ῥάγας ἄγλιθας, ἔστι δὲ καὶ ἄλλο ἄγριον ὀφιόσκορδον καλούμενον, δύναμις δὲ αὐτῶν δεῖ μεία θερμαντικὴ, δηκτικὴ, ἐκκριτικὴ, φυσώδης καὶ κοιλίας ταραντικὴ, ξηραντικὴ στομάχου, δίψης ποιητικὴ, ἐμπνευματώσεως μηνιωτικὴ, ὀπῶν φανείας σωμάτων βιβρωσκομένη. τὰ αὐτὰ δὲ ποιεῖ καὶ τὸ ὀφιόσκορδον βιβρωσκόμενον ὁ καὶ ἐλαφόσκορδον λέγεται. βιβρωσκόμενον ἕλμινθας πλατείας ἐξάγει καὶ ἕλκα κατάγει, ἰχνοδήκτοις τε καὶ αἱμορρόοῦσιν ἀρμόζει, ὡς οὐδὲν ἕτερον. λαμβανόμενον οἴνῳ σωτηρίως, ἢ σὺν οἴνῳ λεανθὲν καὶ πεφθὲν. καταπλάττεται δὲ πρός τε ταῦτα καὶ ὅπου τῶν λυοσδήκτων ὀφθαλμῶν, βιβρωσκόμενον δὲ καὶ πρὸς τὸν ξενισμοὺς, &c. Reliqua consentiunt cum vulgata lectione, Hermolaus Barbarus veterẽ hãc scripturam expressit.

121.2.13. verba hæc vsq; ad finem capitis nõ sunt in Oribasio: interpretes tamen omnes ea reddiderunt, & Dioscoridis esse facile ex Plinio quiuis intelligere potest.

122.1.5. vet. καὶ θρυγκοῖς καὶ τάφροις, sed leue discrimen est.

Fol. eodem, pag. 2. vers. 21. in altero λεπτῷ κέγχρῳ quod expresserunt interpretes.

Fol. & pag. ead. vers. 29. Hæc verba vsq; ad hãc orationẽ τὸ δὲ μέλαν, &c. non sunt in Oribasio, sed omnes interpretes ea reddiderunt.

125.1.25. Script. περιπίπτουσιν, quæ est vera lectio.

Fol.126.1. Sunt in veteri vestigia diuersæ cuiusdam scripturæ, sed vulgata optimum habet sensum, & quam veram esse existimo.

Folio & pag. eadem, 24. alter scriptus κατὰ τὸν μαεσμὸν, sed hoc leue est.

127.1.14. hæc verba non leguntur in manu scripto, sed ea exprimunt interpretes.

127.2.24. ver. ἐκπλομβύας ῥίζας, quod expresit Barbar.

Fol.& pag.ead.28. κοφώσει.

129.1.6. alter τμηθεῖσα διαλιθάντος λιναείου, sed idem est sensus.

131.1.20. alter χλοώδη, quam scripturam Hermolaus sequutus est.

Fol.eod.pag.2.vers.15.alter ἀφεμίδα.

Fol,& pag.eadem, in altero hæc ita leguntur, ὀψαίτιεν δὲ ἄωτα τῶν ἀνεμώνων, sed idem sensus est.

Fol.& pag.eadem, alter ἀφεμώνης, quod Hermol.expresit.

134.1.18.hæc verba sic leguntur in veteri τῆς κεραπίδος μύκητος χυλὸν ὁἰ δὲ, &c. sed vulgata scriptura melior est.

135.1.19.alter non habet hanc vocem κυανοειδῶν, quam scripturam Plinius expresit.

Fol.& pag.eadem,22. in altero non est μίλινα, sed vulgata scriptura rectior est, spectatur enim lutei flores in telephio.

EX LIB. III.

136.1.15.In veteri exemplari ante hæc verba ἢ ὑστερικῆς πνιξί, hæc legitur, ἢ ἱκτεριώδεσι, sed hæc superuacanea sunt quandoquidem paulò superius eadem verba leguntur.

136.2.14. alter ῥᾶ ἢ ῥεῖον.

137.2.9.alter, ἢ φλέμματα, quæ lectio sensum rei conuenientem habet.

139.1.29. hic locus sic legitur, δημεῖα μετὰ ποσῆς σύψεως καὶ γλισχρότητος ὑπερυθρὸς ὁμοίως, δὲ ἢ ὁ χυλὸς ἐρυθρὸς, quam lectionem Hermol.sequutus est.

Fol.&

Fol. & pagina eadem, vers. 21. hic locus ita legitur in vtroque veteri, ἐπειδὴ πάντα τὰ φλεγμαίνοντα πάθη πάυει πολυφάρμακος, quæ scriptura ab Hermolao recepta est.

141.1.3. vterque ποθεῖται ὅσον ὀξυδάφου πλῆθος.

Fol. eodem, pag. 2. vers. 20. hic locus sic legitur ἐλαφρὰν, δρεμμεῖαν, ὑποπλάτυν, & c. quæ lectio probata est veteri interpreti, & Hermol. Barbar.

142.1.6. in altero est κοῖλα δὲ, & c.

Fol. & pag. eadem, alter ὡς κηρωτῆς πάχος λαβεῖν, sed idem est sensus.

142.2.25. vetus codex alter μακρὸν, sed vulgata scriptura bona est.

143.1.10. alter λιπαρὰ.

Fol. & pag. eadem, 12. alter codex ὅλος δὲ ὁ δάκτυλος ἐπέκειται φλοιὸν ἢ πολιῷ χρωῖ ἐοικότα, quomodo Hermol. legit.

Fol. & pag. eadem, 13. locus hic omnino ita legendus est, vt est typis expressus ab Aldo καρπὸν ἢ γευομένῳ ἐυώδη ἢ δριμὺ, quam lectionem Plinius probauit.

Fol & pag. eadem, 26. hæc verba ex altero codice huic loco adscribenda sunt καθ' ὧν ἀρχοιεδὴς ὀδὲ χροιὴ, quam scripturam interpretes expressérunt.

Fol. eodem, pag. 2. vers. 17. altero ἰσῶσι, sed hoc leue est.

Fol. & pag. eadem, 20. hoc caput est coniunctum cum superiore in veterib. lib.

144.1.8. in altero addita est vox παχείας, sed interpretes nó agnoscunt.

Fol. & pagin. eadem, 8. in altero vox θερμαντικὸν deest, sed addenda, vt ex Galeno intelligi potest, & res ipsa ostendit.

Folio & pagina eadem, 13. alter codex habet hæc verba adscripta, τὸ δὲ ταύτης ἀφέψημα πινόμενον αἱμορροΐδας θεραπεύει πιέσευται, quam scripturam Hermol. expressit, sed non esse Dioscoridis ex eo coniicere licet, quòd Plinius & vet. interpres eam non agnoscunt.

Fol. & pag. eadem, 16. veteres codices λευκάνθεμον.

Folio & pagina eadem, vers. vltimo, hic asteriscus debuit

præponi voci πολλὰ verſ.28. vt quo indicatur,in altero codice eſſe φυλλάεια μικρὰ πολλὰ,ſed hoc eſt leue.

Fol. eodem,pagina 2. 19. alter παχέα, ſed interpres & res ipſa oſtendunt vulgatam ſcripturam rectam eſſe.

145. 1.3. Locus hic legitur in codicibus veteribus δυώαμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν ἡ ῥίζα ταύτης, ſed Galenus calefaciendi vim toti plantæ tribuit. Interpretes etiam vulgatam ſcripturam probant.

146.1.19. aſteriſcus hoc loco addendus non fuit.

147.1.5. legimus βεραχὲν ex veteribus libris.

Fol.& pag.eadem. 27. alter σὺν ῥοφήμασι φακῆς.

148.2.16.hic aſteriſcus fruſtra adſcriptus.

151. 2. 23. hoc caput coniunctum eſt cum ſuperiore in vetere.

153.2. 6. in veteribus codicibus Inuenitur hoc loco caput περὶ ἐλαφοσκόρδου his verbis.

154.2. 8.alter βάχαρεις βοτάνη ἣν δαμιώδης, &c.

156.1.6. alter ὄρνιθι.

Fol.& pag. eadem,verſ. 9. alter ἀλιάκμενα, ſed fortaſſe legendum ἀλακομβυαὶ, ex Strabo.μωχαφουμβύων lib.7.

Fol.eodem pag. 2. verſ. 27. vet. ſic legit παύακας, οἱ δὲ ἡβάκλειον, &c.

157.1.7. vet. σμικρότατα.

158.1.6. alter παύακας ἀσκλήπιον.

159.2.24. vet. μέγας,quod Hermol.expreſsit.

Fol. & pagin. eadem,verſ. vlt. cap. ſequens cum ſuperiore coniunctum eſt in veteribus.

160.1.9. alter ἐνωδέστερος.

Folio & pagina eadem, 14. alter ἀχαίνω, ſed vulgata ſcriptura melior.

Fol. & pagina eadem, verſ. 23. In antiquis hæc verba adſcripta ſunt fini huius capitis ἔχει δὲ κλωνία πολλὰ περασπίζοντα, μιλίζοντα, περφυείζοντα, ἢ ἐπ' ἄκρῳ ὅμοια τροχυλοειδῆ ἔχοντα ὡς σπερμάτια τὰ αὐτὰ, quæ Hermol.expreſsit.

Folio eodem, pagina ſecunda, verſ. 4. alter antiquus non hab et

habet hæc verba vsque ad hunc locum τὸν μὲν καθόλου, &c. sed interpretes sequuti sunt vulgatam scripturam.

Folio & pagina eadem, vers. 24. In antiquo vtroque hæc verba legũtur, ὁ δὲ καρκαβάδιον λέγεται, quæ post tempora Dioscoridis huic loco adscripta sunt. Nam recentiores κάρυον καρκαβάδιον vocare solent.

161.1.1. asteriscus his malè præpositus est.

Fol. eodem, pag. 2. 5. ἀνίσοι, sed hoc leue est.

167. 2. 18. hoc loco vetus alter habet, Caput περὶ διαφικίου.

168. 1. 2. alter habet μαραίνω, non σκαφαίω, sed vulgatam scripturam antiquam esse ex Plinio facilè intelligi potest.

169. 2. 10. alter habet λεπτὸν pro μικρόν.

170. 1. 9. vterque hoc loco præter verba vulgata φυσώδης habet, quæ vera est huius loci scriptura, vt quiuis ex Galeno intelligere potest.

171. 2. 5. alter τοῖς περὶ αἰτιείαν eodem sensu.

173. 1. 13. alter διάκει.

176. 1. 1. vterque κόμμι.

179. 1. 9. alter ἐρείπη, sed vulgata scriptura melior. ἔρειπος enim non legitur, sed ἐρείπιον quod significat πεπτωκὸς, καὶ ὀπὲρ γῆς κείμενον.

180. 1. 23. alter καραίαν, sed vulgata scriptura probata est ab omnibus interpretibus.

Folio & pagin. eadem, 24. Vterque στρεὰ, quod legisse videtur Hermol.

190. 2. 3. hæc in antiquo vtroque fini capitis adscripta sunt, φύεται δὲ ἐν ὑψηλοτάτοις ὄρεσι καὶ ἀκροτηρίοις, quam scripturam Hermol. expresit.

195. 1. 8. vetus vterque præter vulgatam scripturam in fine capitis habet ἡ δὲ ῥίζα τούτου σὺν οἴνῳ ἐμβαθεῖσα καὶ σοβεῖσα παρεπῶς καλῶς βοηθεῖν πιστεύεται· δεῖ δὲ τὸν πάσχοντα ἐν τῷ πίνειν περισκέπτεσθαι, καλῶς ἰδρῶτι γὰρ ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τὴν εὐχυμίαν ἐκ τούτου λαμβάνει, quam lectionem Hermolaus

probauit.

195.2.16. alter παχὼ quod Hermolaus probat.

199.1.23. in altero vox ὑποφρογύλον deest.

Fol.& pag ead,26. in altero μακφαὶ.

Fol.& pag.ead.27. alter ἐν χαεδάμαις, sed Plinius & alii interpretes vulgatam lectionem probant.

204.1.4. in altero hic est titulus περὶ ἐπίθεσιν ἔχει ἢ ὠκιμοειδῶν, quæ scriptura fuit in codice, quem Hermol. sequutus est.

211.2.5. vterque codex hunc titulum περὶ φλεγματιῶνος ὑποπίου. habet, vt Hermol. legit.

213.1.5. alter πηχῖς, sed interpretes vulgatã lectionem approbant.

Fol.eod.pag.2.17. alter λυκπυλίῳ.

Fol.214.2.5. vterq; ἐν ὀυίᾳ παλαίᾳ, quæ scriptura ab interpretibus recepta est.

216.2.2. ἢ μακρότερον addendum est ex vtroque antiquo, quod approbatum est ab interpretibus.

Fol. & pag. eadem 9. vterque sic legit δώσαμεν δὲ ἔχει μαλακτικὴν, συπλικὴν, sed sequendã vulgatam scripturam arbitror ex Galeno.

Fol.& pag.ead.9. alter καὶ ἁμματα.

218.1.21. vterq; ῥάγας, quæ est vera scriptura huius loci.

220. 1. vers. vltim. vterque οἱ δὲ ὀνεφόνον, quæ syncerior est lectio.

Fol.eod.pag.2.17. legendũ ἐκ σίρου, ex altero, vt superius annotauimus.

221.2.10. alter κυνόμορφον, sed vulgata scriptura rectior.

222. 2.15. alter ἐπικῤῥόν, sed prior lectio melior.

224.1.5. inducendus est asteriscus.

226.2.6. in veteribus hoc loco caput est περὶ τύφης.

228.1.20. Totus hic locus non est in veteri, sed hæc omnia agnoscuntur ab interpretibus.

230. 1. 20. alter ὑπόκοιλος pro ὑπόκῤῥος, sed scriptura vulgata melior est.

Fol.& pag.ead.24. alter διῤῥινημένας, id est limatas, rectius.

230.1.14.alter σύαγχος.

Fol.& pag.ead.15.vterq; πλατύτερα, quę ſcriptura vera eſt.

232.1.24.addendum eſt hic ex veterib. καὶ κλώνια, quod interpretes expreſſerunt.

233. 1. 15. alter πετιμιδώα quam ſcripturam Hermol. ſequutus eſt.

Fol.& pag.ead.19.Totus hic locus ſic legitur in vtroq; φασὶ δὲ ἐν ταύτῃ εὔχρηστον φίλτρῳ θελαπομιδώλῳ ἐν φύματα διαφορεῖν, quæ ſcriptura probata eſt ab interpretibus.

236.1.29.vterque codex vetus hunc locum ſic deſcriptum habet Μυρρίνη ἀγρία ἢ ὀξυμυρρίνη, ἧς ἀπέραστος νεοθαλὴς ἐσθίεται διυρητικὸς ὤν, καρπὸν ἔχει θελιφερῆ ἐρυθρὸν ἐν τῷ πεπαίνεσθαι, τὸ ἐντὸς ἔχοντα ὀστῶδες, κλώνια λυγοειδῆ, & cæter. vt ſunt deſcripta in vulgatis libris, quorum verborum ſenſus eſt. Myrtus agreſtis vel oxymyrrhine, id eſt acuta myrtus, cuius aſparagi teneri comeduntur, propterea quod vrinam ducũt, fructum habet rotundum, rubrum, quum matureſcit, atque intus nucleum oſsis duritię propinquum, &c.

237.2.17.alter ἀθραυστος, ſed vulgatã lectionem meliorẽ eſſe ex Serapione & interpretib⁹ facile quiuis intelligere poteſt.

Fol.& pag.ead.23.alter ἀντικύειος, id eſt ex anticyra.

Fol.& pag.ead.24.alter χοινώδης, quam ſcripturam Serapio ſequtuus eſt.

Fo.238.1.16.legendum eſt ex veteribus lib. & interpretibus σὺν πελτῆ ῥοφήματι.

239.2.22.hic aſteriſcus fruſtra adſcriptus eſt.

240.1.26.addendum ex veteribus νήστεσι παρ' ἡμέρας γ'.

241.1.14.alter δόσις.

242.1.14.legendum χαυλός.

242.2.10. hic locus ſic legitur in altero φλυκταινᾶται τὸ γιγνόμενον μέρη τῆς γυμνῆς σώματος, quomodo Hermol.legiſſe videtur.

243.2.11. hic eſt caput θελ βόλος in antiq.quod alio in loco in hoc libro inuenies.

244.1.15. hic locus ſic legitur in altero τὸ δὲ ἐξ ἀυτῆς ἐκθλιβόμενον ὑπόσιμα, ſed idem ſenſus eſt.

247.2.

247.2.verſ.vlt.locus ita legitur in altero ῥίζαν λευκὴν παχεῖαν ὅσον μασὸν, ἣν καλοῦσι τέρπετ.quam ſcripturam etſi Hermol. agnoſcit, additam tamé ſuſpicor à quodam, qui in libris Arabum verſatus ſit,qui(vt Actuarius ſcribit)πιτυοῦσαν turpetum appellant.

248.2.23.alter κοτύλης,quam ſcripturam Hermol.retinet.

249.2.3.alter ἐμφαίνοντάς τι δασύτητας.

Fol.& pag.ead.8.alter βραχίων,vt legit Hermol.

250.1.10.alter ἁλὸς,ſed vulgata lectio melior.

251.2.3.alter τερεβίνθου,ſed idem eſt ſenſus.

253.1.26.vocem illá reſtituimus ex veteri exemplari, quum prius legeretur πλατίκαρφος.

EX V. LIBRO.

261.1.12.veteres lib. hæc verba habent adſcripta fini huius capitis δυνάμει δὲ στυπτικὸν ἁρμόζον τοῖς βραδέως πέπτουσι λελυμένοις στομάχοις, καὶ ταῖς κυούσαις γυναιξὶ, καὶ εἰλεώδεσι, δοκεῖ δὲ βοηθεῖν καὶ ταῖς λοιμικαῖς καταστάσεσι ῥοφούμενον, quam lectionem Hermol.retinuit.

265.1.17.alter νομίζειν,ſed vulgata lectio verior.

274.2.5.hic locus ita legitur in veterib⁹ codicib.μνᾶν ἀψινθίου εἰς τὸ κεράμιον καθιᾶσι, καὶ τῷ μετρητῇ τοῦ γλεύκους ἐμβρίχουσι, quæ ſcriptura ab Hermol.expreſſa eſt.

276.1.13.alter δικτάμνου < α. εἰς γλεύκους & cæt.cui Hermol. conſentit.

277.1.24.hec ita leguntur in veterib. lib.ἀνίσου < γ,ταῦτα ἐνδήσας,vt Hermol.legit.

278.2.7.alter δεῖ γὰρ ἑκάστου οὐγγίας η.& cæt.quam ſcripturam interpretes ſequuntur.

279.2.20. hunc locum ita repoſuimus ex veteribus libris, & interpretibus.

281.1.15.hæc ἔτι δὲ κουφοτάτη verba nõ ſunt in veteri altero, ſed vulgata lectio rectior.

284.1.7.hæc verba ὅτι δὲ καὶ τῶν σφόδρα ἐχαρόντων huic loco adſcribéda

adſcribenda ſunt, ex veteri libro & interpretibus.

Fol.eod.pag.2.14.hæc verba χῦσις δὲ πάντων τῶν εἰρημένων πιπτόντων, εἰς τὰ ἀντιπόδια, addenda ſunt ex veteribus libris.

286.2.24.alter σέμφυλα σεσοφατα ſine negatione, cum quo facit Hermol.interpretatio.

288.2.26.hunc locũ reſtituimus ex veterib lib.& interpret.

292.2.26.alter καταγγίσας, vt legit Hermol.

293.1.18.alter τῶ καταμείου.

Fol.eod.& pag.2.5. hic locus ſic legitur in veteribus πνὶς δὲ κατὰ μέσον τῶ ἀγγείω χρεμῶσι ξύλον, καὶ ἐπὶ τὸ καλάμωμον βίζον ἐπιπιδείσειν ὡς μὴ ψαύειν τῶ ὄξυς.

294.2.28.alter ἐκκλάσιμα.

295.1.15.verba hæc σὺν κηρωτῇ non ſunt in altero, quæ etiã Hermol.non agnoſcit.

Fol.& pag.ead.19.alter μυίῳ quã ſcripturã Hermol.retinet.

296.1.7.quæ ſequuntur addenda ſunt ex veteribus libris & interpretibus. ῥίνημα δὲ χρυσοῦ πνόμμον ὑδραργύρου θαυμαστὸν βοήθημα.

297.1.4.alter ἀχρέωτον quam ſcripturam Hermol. non ſine iudicio retinuit.

Fol.& pag.ead.10. alter σωιχόμμα quod verbum huic accommodatius eſt.

Fol.& pag.ead.15.alter πυκνόν.

Fol.eod.pag.2.2.alter ῥυπικὸν, vt Ruellius expreſsit, ſed vulgatam ſcripturam rectam eſſe, ex Galeno intelligitur.

Fol.& pagina ead.5.alter σκιρόντων, ſed vulgata ſcriptura bona eſt.

299.2.21. hic locus ſic legitur in veteri τὸ δὲ ἄλλο βαχυοσμὸς καὶ ἀχροιδὲς, καὶ σανδαραχίζον τῇ χρόᾳ, καὶ βαλοσμὸς, vt interpretes expreſſerunt.

Fol.& pag.ead.21.hæc verba ſic leguntur in vtroq; ὄξραχον καινὸν ἀπερισπάμματος, quæ ſcriptura purior eſt.

301.1.25.veteres lib.καὶ σμύρνη, quod Hermol.expreſsit.

303.2.17.alter ἐνωδέστερον, vt legit Hermol.

304.1.2.alter λεπισμὸν, quã ſcripturam Hermol.retinet,

307.1.

307.1.2.locus ita legitur ἐν τοῖς ἀπὸ κύνα καὶ μασ.

313.1.21.alter ὀπία, sed verior lectio est σπία.

316.1.26. alter λαβεῖν, sed leue est discrimen.

320.1.10. in altero codice deest ἢ σισιλι, quam scripturam etiam Hermol, non agnoscit.

321.2.vers.vlt. vterque hunc locum sic scriptum habet ὧν ἧσσον μᾶλλον χαλᾶσι, vt Hermol.legit.

324.1.13.locus hic sic legitur in veterib. χρησόμεθα σφεστομῶ δειγαίῳ, ἢ πηγαίῳ, ἢ σφεσίῳ μετ' οἴνου ἢ ἀψινθίῳ, ἢ ἐυζώμῳ, ἢ ἀβροτόνῳ, ἢ χαμαιλαίᾳ ἢ χαμαιπίτυ, vt Hermol.legit.

Fol.eod. pag.2.11.alter λαλῶσι, quam scripturam Hermol, retinet.

326.1.12.hæc verba ita leguntur in antiq.lib. διδόντες καταξὺ διάστημα ἐν οἷς δίδυμα πεῖν γάλα βόειον, sed idem sensus est.

Fol.eod.pag.2.25. locus hic ita legendus ex veteribus libris & interpretibus εἴδη μὴ αἰγείῳ ἢ βοείῳ.

329.1.6.verba hæc ita restituenda ex antiquis codicibus & interpretib.ἢ φρυκῶν τὰ ὀστᾶ συὸ κριθῶν ἑφθήματι.

Fol.& pag.ead. 15. in altero addita est hæc vox λεφθέντες, sed hoc leue.

330.2.6. locũ hunc ita ex veteribus codicibus restituimus, cùm multa vulgatæ scripturæ deessent.

Fol.& pag.ead.10.locus hic ita legẽdus est ex vtroque antiquo codice, & interpretibus ὁρμίνου σπέρμα σμύρνης < ὑ. ἀψίνθιον, ὕσσωπον, σελινου σπέρμα.

331.1.25.locus hic ita legitur in veteribus libris ἢ πίστεσι ὠφελήμασι, τεκμήριον δ' ὄζειν & cæt.

335.1.24. alter εὔχρηστον, quam scripturam rectè Hermol. & interpretes retinuerunt.

336.2.7.alter διάσασιν, sed res ipsa ostẽdit legendum esse διάτασιν τὸ πυκνότερος, vt rectiss.Ruellius legit.

340.2.24. alter παραπλησιωτέρα habet pro πλείων, quæ scriptura multò rectior est.

343.2.24.alter sic hunc locum habet ἀυτὸς δὲ ὁ τύπος πίλος γίνεται, ἢ μίλας τὰ κυκλῳ.

349.2.

349.2.27. sic hunc locum ex antiquis restituimus.

350.1.7. in codicib⁹ antiquis hic est caput περὶ δράκοντος καὶ σκορπίου τῶν ἐν θαλάσσῃ, cuius hoc initium est, γίνονται δὲ ἰώδεις πλῆναι καὶ ὑπὸ δράκοντος καὶ σκορπίου τῶν ἐν θαλάσσῃ, καὶ φλεγμονίας χαλεπὰς φέρουσι, σπανίας δὲ ποτὲ νομὰς, ἀεμάζει δὲ περὶ τὰς πλήγας. & cæter. quæ verba Hermol. Marcell. & Ruellius expresserunt.

351.1.11. alter ἐχιοδήκτων, quæ scriptura rectior est.

352.1.22. Hermol. Barbar. exemplar sequutus est, in quo hæc scriptura videtur fuisse καὶ ἕρπυλλος σωὶ ἀσφοδίλῳ, ποτιζόμενα δὲ παραχεῖται καυταρεία τῆς ῥίζης < β'. συὶ οἴνῳ κυάθοις γ', ἢ ἀεισοληχμὶ ῥίζα, ὡσαύτως, & cæt. cuius vestigia adhuc in veteribus libris extant,

CASTIGATIONVM IN DIOSCORIDEM

FINIS.

BIBLIOTECA ROMA

QVÆ SEQVVNTVR, AB IPSO RVELlio ex veteri aliquo codice, quo ille vſus erat, addita fuerunt prioribus codicibus, quæ cùm Græca eis reſpondentia non haberemus, in hunc locum reiecimus.

Fol.32.pag.2.poſt caput malabathrinum, caput hoc inſertum fuit.

Iaſminum.

Apud Perſas fit quod Iaſminum cognominatur, ex albis floribus violæ: quorum ſextãs, in Italicum ſextarium ſeſamini olei demittitur, violis, vt in lilino diximus, viciſsim permutatis, Apud Perſas inter epulandum vſurpatur odoris cauſa. Nam toti corpori conuenit præſertim cùm in balneas deſcẽſum eſt. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationémque deſiderant: grauius enim ſpirat, quàm vt libenter à pleriſque recipiatur.

Folio 43.pag.2. in fine capitis Iuniperi hæc adiecta inueniebantur, folia acrimoniam habent: ideo tam ipſa, quàm eorum ſuccus ex vino, contra viperarum morſus illini aut bibi prodeſt. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit, Ramenta ligni deuorata interficiunt.

Fol.96.pag.ead. in calce capitis de vrina lyncis, hæc addita legimus. Aſininæ vrinæ potu renum vitia ſanari traduntur.

Fol.220.pag.ead.verſu 18, poſt iſta verba, capite cõſtat, ſubſequebãtur hæc: dulce, in purpureũ vergens, paruum: reliqua verò magna & candida, ex plurib⁹ coagmentantur nucleis.

Fol. & pag.eadem, verſ. 28. poſt illa, aciem oculorum eſu hebetat, hæc inſerta erant. Eoſdem effectus præbet anguinum, quod & elaphoſcorodon dicitur: latas ventris tineas in cibo ſumptum abigit, vrinas detrahit: cõtra viperarum ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodeſt, ita vt nõ aliud magis, ſi cum vino iugiter aſſumatur, aut tritum in eodem cibatur: contra rabioſorum morſus & illitu, & cibo valet. Magnæ & allio utilitates

Fol.198.

Fol.198.pag. 2. verſ. 12. & alterum clematitis genus addebatur: verba autem ſunt hæc. Eſt & altera clematis, quæ viticuloſum emittit ramulum, rubeſcentem, lentum: folium guſtu admodum acre, ac exulcerans: repit per arbores, vt ſmilax. Semen tritum, pituitam bilémque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita lepras purgant. Cum lapidio conditur ad cibos.

Fol.232. pag. 2.verſ. 23. poſt capitis verbum primum gloſſum, hæc erât, naſcitur in campeſtribus, & ſabuloſis, Iulio menſe colligitur. Aiunt eam quæ treis thyrſos emittit, cũ ſemine & radice tritam, potámque, contra tertianos horrores prodeſſe: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. herbam abſcefsibus vtilem eſſe volunt

Fol. 311.pag.ead.in fine verſus 22.hæc ſubiiciebantur, inter quæ tale a maximè laudantur. Gallinacea cerebella cum vino pota, ſemen ſatiuæ braſicæ tritũ & acetabuli menſura cum vino potum. Quinetiam bonum eſt digitum in liquidam picem intingere, deinde vinum quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc ſunt quæ contra viperæ ictus auxiliantur.

FINIS.

EXCVDEBAT BENEDICTVS PREVOST IN VICO FREMENTELLO, SVB SIGNO STELLÆ AVREÆ, MENSE AVGVSTO, 1549.

Digitized by Google